



RENDA
INSTVT

12104





N° 29/12 1^{re} édition, Paris, 1608.
Bibl. Nationale Te 136 4

~~Faculté de Médecine, N° 62701~~
~~2^e édition: Frankfurt, 1615. Fac. Méd. N°~~

~~3^e édition: Paris, 1623. Fac. Méd. N° 5115~~

~~Autres éditions: Frankfurt, 1609
Cologne 1622; Genève 1623, 1641;~~

~~Hannover 1631, etc.
Remontent même à 1616~~

CONTINENS

INSTITVTIONVM

PHARMACEVTICARVM,

LIB. V.

DE MATERIA MEDICA LIB. III.

PHARMACOPCEAM ITIDEM SIVE ANTIDOTA-
rium varium & absolutissimum,

AUCTORE IOAN. RENODÆO Medic. Paris. Regio.

Opus hac tertia editione ab Auctore infinitis locis emendatum & immutatum,
tertia plusquam parte auctum, ac suis Indicibus necessarijs instructum.

~~Quamvis~~ CUI ACCESSIT

NICOLAI EPIPHANII Med. Nobiliss. Pharmacop. Empirica.



Ex Libride **PARISIIS**, *Salvator D. M. 1725*
Apud **SOCIETATEM MINIMAM.**

M. D. C. XXIII. 1623
CVM PRIVILEGIO REGIS.





NOBILISSIMO ET
CELEBERRIMO VIRO RENATO
MOREAV DOCTORI ET PROFESSORI
Medico Paris. atque ordinario Nosocomij Lu-
tetiani Therapeutæ, S.



*I R Doctissime, prudenter Philo-
Iud. sanitatem meram & inculpa-
tam quam nullus morbus delibavit,
Deum Opt. Max. si eavtē mōis per
seipsum largiri dixit, morbi verò
depulsionem x̄ dià tē x̄vns x̄ dià iatē-
x̄ns artis Medicæ beneficio & inter-
uentu. Est enim Medicina, vel
Democrito teste, soror & contubernalis sapientiæ, quam
qui extra Deum quærit, quærit lucem in tenebris, & in
afflicta valetudine sanitatem. At quoniam diuinæ sapien-
tiæ sigilla ac velut stricturnæ lucent in admirabili rerum
omnium artificio & fabrica, idcirco par fuit Medici-
nam ubique sororem comitari, ac rebus singulis dum crea-
rentur à Deo infundi atque instillari. Hinc est quod sa-
pientissimi Viri cum ipso orbe conditam voluerunt Me-
dicinam; quam à primis parentibus eorumque posteris Chal-
dæi & Aegyptij, ab his Græci, à Græcis Latini & orbis
nostri incolæ omnes successione non interrupta velut per
manus acceperunt. Ut diuina fuit tantæ Artis procreatio
& exortus, sic admirabilis propagatio cum sine Medicina*



nulla gentium degat. Auspiciū duxit à simplicibus medi-
 camentis quæ ex terræ fodinis, ex stirpium germinibus, ex
 animalium bonis eruebantur: mox Verò increſcente morbo-
 rum ſegete ex ſimplicibus mixturas concinnauit, & admi-
 rabiles illas remediorum compositiones, quarum alias Θεῶν
 χεῖρας, alias ἰοδῆς, alias ἰσίδας, alias Διὸς τεοχίους, nonnullas
 ἀγαθίας, cæteras Baſilicas, Benedictas, Diuinas, Apoſto-
 licas, & Catholicas ob ſingulares effectus nominauit. Horum
 omnium numerum, qui prope infinitus eſt, certis finibus &
 formulis magni & in re medica illuſtres Viri iam pridem
 concludere aggreſſi ſunt. Sed recenti & felici memoria
 Ioan. Renodæus Pariſienſis Medicus, cuius librum de appa-
 ratu & compositione medicamentorum tuis auſpiciis in lu-
 cem eſſe immittendum cenſuimus. Sunt enim plurimæ mini-
 mæque obſcuræ rationes quæ nos in hoc inſtitutum & conſi-
 lium induxerunt. Studiorum & doctrine conſenſus, ius &
 ſocietas Collegij, pharmaceuticæ & botanicæ rei cognitio, di-
 ctionis venuſtas & facundia, multiplex polymathia & illa
 rerum, artium, linguarum peritia, reipub. litterariæ promo-
 uendi ſtudium, indefeſſa & legendo, & docendo, & ſcri-
 bendo diligentia atque induſtria, hæc omnia & plura quæ
 te inter & Renodæum intercedunt, tuo nomine & fauore
 opus hoc non indignum facile perſuaſerunt. Non eſſe hæc
 præconia Adulatorum Affentatorūque lenocinia (quibus non
 diffitemur duci ſæpenumero librorum patronos) qui te norunt
 ſatis intelligent. Peregrinationes in totam Germaniam, Bo-
 ruſſiā, Poloniā, Daniā à te ſuſceptæ, quantus ſemper fueris
 exoticarum nec vulgariarum rerum ſtudioſus & amator atte-
 ſtantur. Vbertas illa & verborum rerumque ornatus quem
 in docendo, in diſſerendo, in orando explicas quàm te ſupra
 vulgi ſenſum ſapere & loqui demonſtrat. Peritiam tuam

& in facienda Medicina experientiam quot hominum millia
 prædicant quos in tota Urbe Parisiensi, & in celebri atque popu-
 loſo eius Noſocomio à quatuor integris annis ex Orco exemiſti.
 Tuum verò rei Medicæ promouendæ deſiderium aperuiſti
 dum è mortuis Petrum Briſſotum excitares, & eius exuias præ
 ſenio attritas & exesas, nitidiores atque floridiores Medico-
 rum Pariſienſium collegio reſtitueres. Nec ignari ſumus multum
 tibi debiturã rempub. litterariam ubi opera illa, quib. adornandis
 diceris incūbere, iuris feceris publici. Hanc à te dum expeſtamus
 gratiã votis ne te ſubſtrabe noſtris, nec huius operis deſere patro-
 cinium, cuius auct̃or tibi fuit Collega. Vale (Vir litteratiſſime)
 & rem Medicam augere atque illuſtrare perge. Lutetiæ Pariſ.
 Aprilis an. M. DC. XXIII.

Tui ex animo Societatis
 Minimæ Pariſienſis
 Bibliopolæ.

ã ij



TYPOGRAPHVS LECTORI.

E Tractu Parisiensi in quo natus, educatus & excultus est Renodæus in Germaniā trāslatus fuit cælo, aere, solo, ingenio nostrā Galliā deteriorē. Excusa inquam, & typis Francofurtianis impressa ad exemplar Parisiense Renodæi Pharmacopœi nō castigatior aut emendatior, sed turpissimis erroribus, exili ac inuenusto charactere fœdata. Opus hoc medicum vt præclarum & difficile, sic à multis tentatum, sed à paucis impendiō absolutum & perfectum. Ioannes Renodæus Medicus Parisiensis cū nec vigilijs, nec sumptibus, nec laboribus vllis pepercisset vt suppellectilis Pharmaceuticæ notitiam assequeretur, tandem hoc opus tersum & limatum in lucē produxit, quod ad Medicæ artis complementum videbatur desiderari. Quamobrem distractis omnino & distributis Parisiensibus exemplaribus, cū tam turpiter deprauatum Germanicum aduerterem, cœpi de eo restituendo ac reparando cogitare. Cūque meum consilium quibusdam viris doctis communicarem, quos de nonnullis notis & breuib. scholijs quæ ad illustrationem operis deesse videbantur, adiungendis sollicitarem, ab eis monitus sum penes Renodæi viduam huius operis exemplar Auctoris manu exaratum, purgatū, & secundis posterioribusque curis auctum & illustratum asseruari. Quid plura? Non exiguis sumptibus comparatum autographum illicō prælo commissi, vt quod priuati & mei erat, fieret publici & omnium iuris. In eo Pharmacopœam Renodæi habes recentatam ac penē nouā. Cū enim plusculis capitibus auctior & plenior exeat, tum certē singulis penē paginis ornatior & locupletior; multa sedulus Auctor vt superflua deleuit ac purgauit, plura vt deficiētia suppleuit, adiecit, nonnulla velut dubia confirmauit, vel vt obscura illustrauit, adeō vt ex priori opere sola lineamenta atque vestigia superesse videantur. Præterea cū flagitari à nonnullis & plurimū expeti audirē Pharmacopœā Empiricāque cū Renodæana & Quercetana Ioan. Theobaldi operā in publicū exiuerat, feci quoque vt comitaretur Renodæanam, consilio præsertim quorundam Medicorū ductus & incitatus, qui multa arcana, nec minimē vulgaria remedia Medicinam facientibus ap-

primè vtilia & necessaria eo contineri opere suaserunt. Vtrūque opus locupletissimis indicibus adornatum est capitum & rerum memorabilium, quæ te, Lector, iuuare plurimum, & studiū tuum promouere poterunt. Te conatus nostros si æqui bonique consuluisset cognouero, huius laboris sumptus non me pœnitebit. *Vale.*

AVTHOR BENEVOLO LECTORI.

HÆc est Pharmacopœa magna, candide Lector, aut si maius, vniuersa artis medicamentariæ doctrina, quam vix adhuc ullus in opus vnum congeffit, aut debita methodo digessit, aut in artem redegit. Hæc, inquam, primæua est Medicinæ curatricis filia, quæ sedula artifex, ac veluti Medici manus, non modò salutarem quamvis Antidotum parat, sed ingerendam exhibet, & topicum admouet ipsa, atque sanandis ægrotis non exiguas suppetias adfert, cuius nunc laudes egregias à Medicina, tanquam radios à Sole prodeuntes huc attexere nec libet, nec licet: verum grauius fero tam vtilem artē indignè ac perperam à multis exerceri, quæ ne quidem priora illius elementa norunt, aut illis noscendis operam nauarunt. Eorum autem, qui huic arti segnè incumbunt, alij in antiquiores Græcos suæ vecordiae culpam reijciunt, qui vel simplicia incognita, aiunt, aut inusitata, aut indebitè parata præscribunt: Alij tum in Barbaræ gentis idiomata, non satis fideliter ab interpretib. expressa, tum in simplicia, quæ exotica telus eructat, sibi inuisa. Sunt qui suam opponunt ignauiam difficultatibus artis, cuius præcepta nullus hucusque simul omnia coniunxit, aut optima methodo, sine qua vix quicquam discitur, aut scitur, disposuit, sed hic tantum sparsim quædam, ille alia, prout in ea parte sese magis exercuit: Multorum tamen extant libri & vulgari, & Latino sermone conscripti, qui de re Pharmaceutica tractant, ad quos Lectorem remitto.

AD CELEBERRIMVM AMPLISSIMVM-
que Parisiensem Medicorum Ordinem.



a sic se
ridiculè
nominabat
Paracelsus

ESTER Renodæus, clarissimi artis Asclepiadicæ
præceres, vestra, quæ fatetur è vestro orto horto
vobis reddit, libat, vouet, consecrat. E vestris flo-
ribus tanquam apes mellilega, hæc Thymiamata
suxit, congeffit, digessit. Excipite, olfacite, quæso,
fauum, non fumū oient, nō pseudomedicum (a) Hohannehin seu
hariolum Bombast, ex quo vespæ Heracliense mel lābunt, suaque
Baliama & Momias mutuuntur. Vestra fragrantius spirant, a-
mabilius recreant, felicius expetuntur, salubrius ingeruntur.
Kirtla laborant, qui lutum & carbones habent in delitiis, hūque
torpet mens inscia recti, qui volatilis, & arsenicalis auræ
suffitu recreantur: Istis per me suum relinquatur caput mortuū,
vt & Tartarum, aliaque similia tenebrionum idola. Vobis ve-
stra, hoc est, optimis optima, doctis docta, probatis probata
magis placent. Probatis verò non obuia quæque, bardorum
more, qui bonum & malum idem sæpe putant, & vt vulgò fer-
tur, vix ab auro Molybdenam sine Lydio lapidē distinguunt,
sed tanquam Diui Apollinis filij nihil incompertum habetis,
nihil à vera Medicina alienum admittitis. Talem dico veterum,
quæ Theorematis, ratione certa, & experientia firmatis nū-
tur, & quæ simul medicamenta quædam, recentiorum doctri-
na probatorum sedulitate complectitur. Priscos enī nō omnia
vidisse, dixisse, nouisse, non tulit ætas; Et neotericos
de rebus præsentibus, quæ illis erant futuræ, certius loqui, &
maiorē rerum experientiam callere certissimum est. Hinc pe-
ritis ætatis nostræ viris, quædam inuenire, & inuentis addere fa-
cile fas est. Et si primis inuentoribus prima laus debetur; Poste-
rioris tamen sæculi doctoribus spectatissimis sua non denegan-
da; vt clarissimis scholæ vestræ alumni, D. D. Fernelio, Syluio,
Holerio, Tagautio, Gorreō, Dureto, Palmario, Riolano, scri-
ptis qui doctissimis Hippocrateam artem illustrarunt. Datur
liquidem rerum vicissitudo; Monarchiæ multæ fines imperij
vix constituentes affatim conciderunt; Quæquā quasi ex atomis
natæ

5

nata coronas coronis adiunxerunt Sæuit in Ægyptios olim frequens Elephantia sis, in Romanos Mentagra; At hæc fere nunc prorsus inuisa, illa tam rara, vt non fuisse putetur. Europæis ann. 1493. Indica lues noua fuit, & primo sui aduentu ita effera, vt pauci conualescerent: nunc ita mitis est, & quasi cicurata, vt in bene natis sponte sæpe desinat. Viros quoque ingenij acutie, & doctrina claros non quæuis ætas semper protulit, sed alia ignauorum, alia per celebrium ferax extitit. Desistit verò nunquam ferax virorum clarissimorum vestra schola, Theatrum quæ Apollinis est, in quo sedere tot Medicinæ principes: Templum quæ musarum, in quo virtutes omnes de excellentia certant: Terribilis quæ locus, vt vocitabat Carpentarius vester professor Reg. In quo perpetuus est musarum concursus, in quo quot magistri, tot oracula, tot lumina, tot sydera micantia quorum radiis & aspectu Hippocratica tribus foecundatur: quorum præsentia contremiscunt ægyptæ, circulatores & Empirici, qui dum medicos agunt, vel his similes sunt, qui in tragœdiis introducuntur: Reges enim simulant, cum homines flocci sint, vel pseudosyderibus, qui stellas micantes & bene uolas referunt, cum comete sint perniciosi, terræ qui pinguedinem absumendo: famem, nec raro pestem inferant, & adferant, Genus hoc hominum odi, spectatissimi viri, mores & humores auersatus sum, & pharmaca, seu ingerenda, seu topica, toxica quæ cuncta sunt, improbaui. Optima verò sunt tantum, & salutaria, quæ probatis: Probatis, quæ vestra, hoc est, nostra. Videte, si placet, legite, gustate: vestri poma sunt fruticeti: omnia matura, gratiosa, salutaria. Gratiosa forsan dedissent vestri collegæ Ioan. Tagautius & Anton. Gallus, quibus ante 70. annos, hæc prouincia fuerat demandata: Sed cum vterq; ad Pharmacopœam instruendam laboraret, immatura morte cuiusque opus est interceptum, inquit Fœsius. Eundem sponte laborem susceperat Stephanus Gormelenus: Verum tot, tantasque difficultates hoc in negotio honorandus, perdoctusque senex inuenit, vt ætatis occasu, & studiis irrequietis perfractus, vt sanitati prospiceret, ab incœpto statim opere destiterit. Hunc autem operæ multæ laborem, vt libenter, & ex animo suscepi, sic, DEO duce, feliciter peregi. Valet, legitimi filij Hippocratis, diu viuite, & animo grato meas lucubrationes accipite.

Hippocr. l. de lege.

Circa finem præfat. suæ Pharmac.

8

Vester RENODÆVS, vobis singulis deuotissimus.

IOAN. DE RENOV LECTORI.

MULTOS habes (candide lector) Antidotariographos, paucos, qui de medicamentis recte seligendis, accurate præparandis, & debite componendis scripserint; vix ullos, qui medicamenta tantum optima designarint, methodicè simul congesserint, & inepta quæque castigarint, & improbarint. In multis enim Antidotariis vulgaribus, tantum quædam veluti farrago medicamentorum, seu Receptarum, ut vocant, inutilium collecta videtur, quæ & tibi sunt oneri, si legeris: & damno Pharmacopæis, si pararint, & forsan ægrotis periculo, si sumserint. Nonnulla quædam excipio, doctrinæ quæ sunt politioris, experientiæ certioris, mixturæ melioris: ut quæ à dogmaticis, probatis, & expertis edita, illustrataque, Pharmacia studiosos multum iuvare queunt. Nulla tamen videre contigit, quæ omnium animos expleant: Quæque enim regio suam ut habet vivendi legem, sic medicandi modum. Et quod ægrius ferendum, Pharmacopæi eiusdem urbis, aut medicamenta inter se varia, aut eadem varie parant, & misere celebrem artem lacerant, singuli enim codicillos quosdam manuscriptos in scriniis asseruant, in quibus compositionum secretiores formulas, & parandi modos se solos habere putant: quos aiunt, à suis magistris, aut seniore quodam Apothecario acceperunt. Sic enim apud illos adeo invaluit hæc improba consuetudo, ut tyrones cautè, si possint, magistrorum, quibus operam dederunt, eiusmodi codicillos surripiant ante discessum. Omnes verò singulis medicamentis typo non excusis, vel addunt, vel adimunt, & immutant, atque in sua ignorantia typum omnia fingunt. Vnde Pharmacopolia multa pilis, arculis, & aliis pluribus vasis nitentibus ornantur, sed medicamentis optimis & probatis destituta, vel parum referta: Atque pyxidibus inscriptiones appositæ, simplicia aut composita quædam sæpe designant, quæ nec Pharmacopola novit, nec vidit unquam; sed sit esse putat, si ad ostentationem ea plebeculæ obiciantur, à quibus gloriam aucupatur, simul & lucrum. Ne igitur diutius ancipites Pharmacopæi in Pharmacopoliis extruendis, & medicamentis habendis, parandisque relinquuntur, illis hanc Officinam Pharmaceuticam damus absolutissimam quam Antidotarium Dogmaticorum vetus, & renovatum nominamus: Selectiora enim & probatiora medicamenta à veteribus tradita, à Chymistis spreta, ab ignorantis depravata, Empiricis ignota pristinae dignitati restituiimus: Eorum compositionis rationem ostendimus, parandi modum docemus, qualitates aperimus. Priscis tamen non tanta tribuimus, quin recentiorum quoque sedulitati multa nos debere fateamur: qui cum medicamentariam artem non parum auxerint, ex his confectio- nes quasdam salutares deprompsimus: Quibus adhuc alias, nobis usu longo probatas, & ex ratione descriptas adiunximus. Bene vale, Lector, & omni agrata mente, si placet, accipe.



INDEX CAPITVM

IN QVINQVE LIBROS INSTITUTIONUM Pharmaceuticarum.

Liber primus continet 25. capita.

- CAP. I. **Q**uid Pharmacia & eius
utilitas pag. 1.
2. Quid Pharmacopœus, qualis
esse debeat, illius subiectum, ob-
iectum & finis p. 3.
3. Quid medicamentum, alimen-
tum & inter vtrumque me-
dium p. 4.
4. Antiquitas solummodo sim-
plicium vsus & mirabiles eo-
rum proprietates p. 6.
5. Plantarum mira disparitas in
magnitudine, vultu foliorum &
florum, effigie, colore, odore,
sapore p. 10.
6. De Materia medicamentorum
& vnde sumatur. p. 14.
7. De facultatib. medicamentorū,
& quotuplex secundum gene-
rales facultates medicam. p. 15.
8. De primis & secundis medi-
camentorum facultatibus p. 16.
9. De tertia medicamentorum fa-
cultate seu proprietate occulta.
p. 18.
10. De facultate medicamentorum
purgantium, vnde promanat &
quomodo agit. p. 19.
11. De medicamentis quæ citra
ventris solutionem occulta pro-
prietate multos morbos sanant.
p. 21.
12. De simplicibus medicamentis
quæ proprietate specifica partes
quasdam respiciunt p. 23.
13. De perammatis seu Amuletis
quæ gestata vel appensa mira &
cæca virtute morbos multos cu-
rant. p. 24.
14. De periaptis physicis p. 37.
15. De venenis p. 33.
16. De facultatibus medicamen-
torum in genere quæ ab effec-
tis denominantur p. 37.
17. De generali delectu medica-
mentorum purgantium p. 41.
18. Vnde sumitur purgantium me-
dicamentorum delectus p. 42.
19. Quomodo sumitur medica-
mentorum electio à rebus enu-
meratis p. 43.
20. Particularis saporum disqui-
sitio p. 45.
21. Quis medicamentorum delec-
tus à saporibus sumitur p. 48.
22. De tempore colligendi medi-
camenta, quandiu vis eorum per-
duret, & quo tempore melior.
p. 49.
23. Quis medicamentorum pur-
gantium ex loco sumitur delec-
tus p. 52.
24. De delectu medicamentorum
purgantium à facultatibus sum-
pto p. 53.
25. Degradibus medicamentorum
p. 55.

INDEX CAPITVM.

Liber Secundus continet 32. capita.

CAP. I. **M**edicamentis omnibus vt alimenti de-
beri aliquā præparationem p. 58.

2. De præparationum differentijs p. 59.

3. De lotione p. 61.

4. De purgatione medicamentorū p. 64.

5. De infusione p. 65.

6. De humectatione alijsque infusionum differentijs p. 66.

7. De nutritione p. 66.

8. De Maceratione, infectione, & digestionem p. 67.

9. De Tritura p. 68.

10. De varijs triturae speciebus p. 71.

11. De Coctione p. 73.

12. De Assatione & fritione p. 74.

13. De vstione p. 75.

14. De extinctione p. 79.

15. De calfactione, insolatione & refrigeratione p. 80.

16. De putrefactione & fermentatione p. 81.

17. De dissolutione p. 81.

18. De liquatione p. 83.

19. De mollitione & duratione p. 84.

20. De ficcatione p. 85.

21. De expressione p. 86.

22. De extractione p. 87.

23. De extractis Chymicorū p. 88.

24. De cribratione p. 89.

25. De colatione & filtratione p. 91.

26. De despumatione p. 92.

27. De clarificatione p. 93.

28. De Aromatizatione p. 93.

29. De coloratione p. 94.

30. De conditura, salitura & faritura p. 95.

31. De destillatione p. 96.

32. de destillatione per descensū p. 99.

Liber tertius continet prima sectione 13. capita.

CAP. I. **C**um medicamenta componantur p. 102.

2. de syrupis in genere p. 103.

3. de propomatis p. 105.

4. de syrupis mellitis p. 107.

5. de succis mellitis p. 108.

6. de sapis p. 109.

7. de conferuis p. 110.

8. de conditis in genere p. 111.

9. de pulueribus p. 112.

10. de eclegmatis in genere p. 114.

11. de electuariis in genere p. 115.

12. de hieris p. 117.

13. de opiatis in genere p. 118.

14. de pilulis p. 120.

15. de trochiscis p. 122.

secunda sectione continet capita 5.

1. De oleis. p. 123.

2. De vnguentis. p. 126.

3. De ceratis. p. 127.

4. De emplastris. p. 129.

5. De Sparadrapis. p. 131.

Liber quartus continet capita 17.

CAP. I. **Q**uis primus medicamenta composue-

rit, & ratio compositionis p. 132.

2. de basi medicamentorum & eorū collocatione in formulis p. 134.

3. de formis & fine medicamentorum p. 136.

4. de medicorum ponderibus & notis p. 138.

5. de medicorum mensuris p. 140.

6. de quantitate medicamentorum exhibendorum p. 142.

7. Iustam medicamentorum quantitatem vix definiri, non tamen dum parum excedit aut deficit periculosam p. 143.

8. de his quæ innoxie magna quantitate sumuntur, quibus conueniunt & quando p. 144.

9. de his quæ parua quantitate præscribuntur p. 146.

10. Qua quantitate simplicia medicamentis componendis per-

<p>miscantur p. 147.</p> <p>11. de medicamentorum repotione p. 149.</p> <p>12. de conseruatione & duratione medicamentorum p. 151.</p> <p>13. de his quæ antonomasia quadam cæteris præstant, à quæ illorum denominatio sumitur p. 152.</p> <p>14. de radicibus, seminibus, floribus, lapillis & aquis quæ dignitate quadam cæteris præferuntur p. 154.</p> <p>15. de succedaneis p. 155.</p> <p>16. Quæ & quando rectè substituantur p. 157.</p> <p>17. de medicamentis adulteratis p. 162.</p>	<p>18. de opiatis. p. 187</p> <p>19. de conditis. p. 188</p> <p>20. de pasta regia. p. 189</p> <p>21. de mazapane. p. 190</p> <p>22. de pinsolato seu pignolato. p. 191</p> <p>23. de pandaleis. ibid.</p> <p>24. de hypoglottidibus seu sublinguis. p. 192</p> <p>25. de tabellis. p. 193</p> <p>26. de pulueribus. p. 194</p>	
<p><i>Liber quintus prima sectione continet capita 26.</i></p>		
<p>CAP. I. DE solemnibus quibusdam decoctionibus longo vsu celebratis. p. 163.</p>		
2. de dosi p. 167.		
3. de potione purgatoria p. 168.		
4. de iulepis p. 170.		
5. de destillatis restorationis p. 171.		
6. de gallinacci decrepiti iure p. 162.		
7. de carniū syntherimatis seu iusculi tortiuis. p. 173		
8. de gelatina. p. 175		
9. de apozematis. p. 177		
10. de gargarismatis. p. 179		
11. de emulsionibus. p. 180		
12. de amygdalatis. p. 181		
13. de ptisana antiquorū seu hordeato. p. 182		
14. de boucheto vulgari. p. 183		
15. de lohoch seu eclegmatis in re præsentem imperandis. p. 184		
16. de apophlegmatismis. p. 185		
17. de bolo purgatorio. p. 186		
	<p><i>sectione secunda continet capita 5.</i></p>	
	<p>CAP. I. DE errhinis. p. 195</p>	
	<p>2. de pessis. p. 196</p>	
	<p>3. de nodulis vel potius penicillis p. 197</p>	
	<p>4. de suppositorijs. p. 198</p>	
	<p>5. de clysteribus seu enematis p. 199.</p>	
	<p><i>sectione tertia continet capita 30.</i></p>	
	<p>CAP. I. DE balneis. p. 201</p>	
	<p>2. de semicupio seu infessu. p. 203</p>	
	<p>3. de vaporario, tepidario & emboto. p. 204</p>	
	<p>4. de hypocausto seu sudatorio. p. 205</p>	
	<p>5. de fomentis seu fotibus. p. 206</p>	
	<p>6. de epithematis. p. 207</p>	
	<p>7. de lotionē. p. 208</p>	
	<p>8. de embroche & asperzione. p. 208</p>	
	<p>9. de linimento seu litu. p. 209</p>	
	<p>10. de mucaginibus. p. 210</p>	
	<p>11. de collyrijs. p. 211</p>	
	<p>12. de lacte virginali. p. 212</p>	
	<p>13. de aqua aluminosa. p. 213</p>	
	<p>14. de frontali. p. 214</p>	
	<p>15. de cataplasmatibus & pultibus p. 215</p>	
	<p>16. de cataplasmatibus, empasmatibus & diapasmatibus. p. 216</p>	
	<p>17. de sinegmatis ac variis pulueribus topicis. p. 217</p>	

INDEX CAPITVM.

<p>18. de synapismis seu phœnigmis. p. 218</p> <p>19. de dropace & picatione. p. 219</p> <p>20. de psyllothis. p. 220</p> <p>21. de vesicatorijs. p. 221</p> <p>22. de pyroticis seu cauterijs. p. 222</p> <p>23. de cucufa vel potius pileolo medicamentofo. p. 223</p> <p>24. de scuto medicamentofo. p. 224</p> <p>25. de scuto p. 226</p> <p>26. de cucufa & semicucufa. p. 227</p> <p>27. de facculis. p. 228</p> <p>28. de dentifricijs. p. 229</p> <p>29. de odoramentis. p. 230</p> <p>30. de suffitu & auiculis cyprijs. p. 232</p>	<p>17. de adianto vulgari. p. 254</p> <p>18. de polytricho. p. 255</p> <p>19. de ceterach. ibid.</p> <p>20. de saluia vita. p. 256</p> <p>21. de quibusdam alijs capillaribus minus proprie dictis, & primū de hemionitide. ibid.</p> <p>22. de cuscuta & epithymo. p. 257</p> <p>23. de quinque radicibus aperientibus, & primū de apio. p. 258</p> <p>24. de petroselino. ibid.</p> <p>25. de asparago. p. 259</p> <p>26. de fœniculo. ibid.</p> <p>27. de rusco. p. 260</p> <p>28. de quatuor feminibus frigidis maioribus. ibid.</p> <p>29. de quatuor feminibus frigidis minoribus, & primū de lactuca & eius semine. p. 262</p> <p>30. de portulaca eiusque semine ibid.</p> <p>31. de alijs frigidis feminibus minoribus ac obiter de cichoraceis. p. 263</p> <p>32. de feminibus quatuor calidis maioribus & primū de aniso. p. 264</p> <p>33. de cumino. p. 265</p> <p>34. de caro. p. 266</p> <p>35. de quatuor feminibus calidis minoribus, & primū de ammi. p. 266.</p> <p>36. de anomo. p. 267</p> <p>37. de dauco. p. 268</p> <p>38. de eximijs aliquot floribus ex quibus aqua & olea trahuntur efficacissima, & primū de rosis. p. 268</p> <p>39. de nymphaea. p. 269</p> <p>40. de lilio. p. 270</p>
--	---

INDEX CAPITVM IN libros tres de Materia medica. *Liber primus continet prima sectione capita 41.*


<p>CAP. I. DE aqua. p. 239</p> <p>2. de vino. p. 240</p> <p>3. de aceto. p. 242</p> <p>4. de omphacio. p. 243</p> <p>5. de saccharo. p. 244</p> <p>6. de melle. p. 245</p> <p>7. de manna. p. 247</p> <p>8. de floribus cordialibus & primū de violis. p. 248</p> <p>9. de flore buglossi. p. 249</p> <p>10. de flore borraginis. ibid.</p> <p>11. de communibus quatuor emollientibus & primū de maluis. p. 250</p> <p>12. de acantho seu branca vrsina. p. 251</p> <p>13. de alijs emollientibus, & primū de mercuriali. p. 252</p> <p>14. de parietaria. ibid.</p> <p>15. de beta & atriplice. p. 253</p> <p>16. de quinque capillaribus & primū de vero capillo veneris. p. 253</p>	<p>sectione secunda continet capita 22.</p> <p>CAP. I. DE rhabbarbaro. p. 272</p> <p>2. de Cassia. p. 273</p> <p>3. de tamarindis. p. 274</p>
--	--

4. de myrobalanis.	p. 275	23. de fantalis.	ibid.
5. de aloë.	p. 276	24. de sassâfras.	p. 310
6. de senna.	p. 277	25. de guaiaco.	p. 311
7. de radice mechoacam.	p. 277	26. de sarsaparilla.	ibid.
8. de agarico.	p. 278	27. de chyna radice.	p. 312
9. de polypodio.	p. 279	<i>sextione quarta continet capita 84.</i>	
10. de carthamo.	p. 280.	CAP. I. D E pyrethro.	p. 313
11. de ebulo.	ibid.	2. de Synapi.	p. 314
12. de Esula.	p. 281	3. de Elaspî.	p. 315
13. de hermodactilis.	p. 282	4. de cruca.	p. 316
14. de turpetho.	p. 283	5. de vrtica.	p. 317
15. de scammonio.	ibid.	6. de inde.	p. 318
16. de elleboro.	p. 285	7. de helenio.	p. 319
17. de colocynthide.	p. 287	8. de cypere.	ibid.
18. de mezereo & chamelæa.	p. 288	9. de angelica.	p. 320
19. de thymelea.	p. 289	10. de libistico seu ligustico.	ibid.
20. de laureola.	ibid.	11. de fefeli.	p. 321
21. de ricino.	290	12. de gentiana.	p. 322
22. de brassica marina.	ibid.	13. de tormentilla.	p. 323
<i>Tertia sectione continet capita 27.</i>		14. de pœonis.	ibid.
CAP. I. D E zinzibere.	p. 291	15. de rubia.	p. 324
2. de zerumbet.	p. 292	16. de Onone.	324
3. de zedoaria.	ibid.	17. de eryngio.	p. 325
4. de galanga.	p. 293	18. de gramine vulgari.	p. 326
5. de acoro.	ibid.	19. de glycyrrhiza.	ibid.
6. de calamo aromatico.	p. 294	20. de cyclamine.	p. 327
7. de costo.	ibid.	21. de scilla.	p. 328
8. de bchen vtroque.	p. 295	22. de bulbis.	p. 329
9. de scecachul.	p. 296	23. de Satyrio.	ibid.
10. de cinnamomo.	p. 297	24. de porris.	p. 330
11. de nuce moschata, maci & macere.	p. 298	25. de raphano & rapo.	p. 331
12. de piperibus.	p. 300	26. de anemone.	p. 332
13. de caryophyllis.	p. 301	27. de Keiri.	ibid.
14. de cardamomis.	ibid.	28. de thymo.	p. 333
15. de cubebis.	p. 302	29. de serpillio.	ibid.
16. de carpobalsamo & cæteris balsami partibus.	p. 303	30. de sampsucho & maiorana.	p. 334
17. de Kermes.	p. 304	31. de pulegio.	p. 335
18. de Schœnantho.	p. 306	32. de polio.	ibid.
19. de folio seu malabathro	ibid.	33. de ozimo.	p. 336
20. de spica indica & nardis.	p. 307	34. de origano.	ibid.
21. de aspalatho.	p. 308	35. de Mentha.	p. 337
22. de agallocho.	p. 309	36. de calamintha.	p. 338
		37. de absynthio.	p. 339

INDEX CAPITVM.

38. de artemisia.	p. 340	77. de Periclymeno.	p. 363
39. de melissa seu melissophyllo.	p. 340	78. de genista.	ibid.
40. de prassio.	p. 341	79. de salina.	p. 362
41. de betonica.	ibid.	80. de roremarino.	ibid.
42. de veronica.	p. 342	81. de agno casto seu vitice.	p. 363.
43. de dictamno.	p. 343	82. de fraxino & ornithoglossio.	ibid.
44. de stæchade.	ibid.	83. de visco querno.	p. 364
45. de salvia.	p. 344	84. de populo.	p. 365
46. de hormino.	ibid.	<i>sextione quinta continet capita 36.</i>	
47. de scordio.	p. 345	CAP. I. DE mandragora.	p. 366
48. de Ruta.	p. 346	1. de solano.	p. 368
49. de lithospermo.	p. 347	2. de alKeKengi.	p. 369
50. de saxifraga.	ibid.	3. de hyosciamo.	370
51. de aristolochia.	p. 348	4. de papauere.	ibid.
52. de asaro.	ibid.	5. de semperuiuis.	p. 371
53. de pimpinella.	p. 349	6. de cynoglossio.	p. 373
54. de chamædri.	ibid.	7. de plantagine.	p. 374
55. de chamæpyti.	p. 350	8. de centinodia.	p. 374
56. de parthenio.	p. 350	9. de symphyto.	ibid.
57. de hyperico.	p. 351	10. de oxalide.	p. 376
58. de androsamo.	ibid.	11. de ozylapatho.	ibid.
59. de melanthio seu nigella	p. 352.	12. de hepatica, hepatorio, & eupatorio seu agrimonia.	p. 377
60. de hyssopo.	ibid.	13. de primula veris seu herba palyfis.	p. 378
61. de geranio.	p. 353	14. de brassica hortensi.	p. 379
62. de doronico & damafonio.	p. 354	15. de psyllio.	ibid.
63. de carduo benedicto.	p. 355	16. de tussilagine.	p. 380
64. de cardiobotano seu cardiaca.	ibid.	17. de lupulo.	ibid.
65. de chamaeleone nigro.	p. 356	18. de bistorta.	p. 381
66. de cynara.	ibid.	19. de fragaria.	ibid.
67. de phu seu valeriana.	p. 357	20. de pentaphyllo.	382
68. de fumaria.	p. 358	21. de spargula seu aparine.	ibid.
69. de euphrasia.	ibid.	22. de scabiosa.	p. 383
70. de centaurio minore.	p. 359	23. de gossipio.	p. 384
71. de rhapontino.	ibid.	24. de hispidula seu aeluro quem vulgus pedem cati nominat.	ibid.
72. de meu.	p. 360	25. de meliloto.	p. 385
73. de anetho.	ibid.	26. de lino.	ibid.
74. de petroselino macedonico.	p. 361	27. de fenugræco.	p. 386
75. de coriandro.	ibid.	28. de ciceribus rubris.	ibid.
76. de cappanibus.	p. 362	29. de orobo seu Eruo.	p. 387
		30. de lupinis.	ibid.
		31. de	
		32. de	

*Hujus Index
Sequentia est
5^o post 9 septembris
1610.*



MERITISSIMI DIGNISSIMISQUE VIRIS PHAR.

MACOPOEIS PARISIENSIBVS IOAN.

RENODÆVS perpetuam optat
fœlicitatem.



ARTIVM ingenuarum celeberrima ac nobilissima quidem est Medicina (viri dignissimi) sed quæ Pharmaciam eget auxilio. Illa verò tanquam regina de agendis ad hominum salutem statuit, iudicat, imperat; hæc parat, conficit, ministrat: Atque ciues vtraque sospites conseruando Rempub. conseruat ipsam; Immodò mundum, quia homines, propter quos & ipsum conditum credimus. In eo enim quicquid cerni, contrectarique potest, in illorū venit subsidium, seu in victū abeat, vestitū & ornatum, seu in medicamentum; quo vt instrumēto mala corporis sanantur, & sanitas seruator. Cū autem medicamenta rarò simplicia, sed ferè composita vsurpentur, & in Pharmacopoliis reposita seruentur ad futuros vsus, ea viribus, materia, figura, sapore, consistentia, & colore varia esse debent, vt quibuslibet ægris, & ægritudinibus apta, & salutaris Medicina detur. At vero non vbique simili, aut descriptione, aut apparatu confecta reperiuntur, sed quædam in Italia tantum parantur: Alia in Hispania, nec alibi videntur; Et quædam solū in Germania. Lutetiæ autem omnium præstantissima, & artificiosissimè composita prostant: Hæc enim quanto inter alias caput exierit vrbes, tanto Pharmacopœis aliis omnibus antecellit; Tanto Medicamenta præstantiora quæritis, paratis, habetis, & magis sedulam ægrotis operam, opemque tutiorem præbetis. Vestrū enco- mia singulorum recensere, nedum totius ordinis vestri dignitatem pluribus attingere, ob multas rationes nolo, nec debeo: sat enim mihi est, si ad Dei laudem, hominum salutem, & maiorem ordinis vestri splendorem, hæc à vobis exposculauero, vt spretis quibusdam Arabum & aliorum quorundam veterum erroribus, simplicia tantum cognita vsurpetis; Cognata succedanea solo medicorum consilio substituatis: Medicamenta composita Medicis Parisiensibus probata, probetis; Improbata, improbetis, Pharmaciam iuxta dogmata illorum optima exerceatis. Quæ vt rectè exequi valeatis, nostrum Iusiurandum accipite; Eo tyrones obstringite: Singulos in officio coërcete, vestrum ordinem fouete; nostras lucubrationes videte, legite, discite, & benè valete.

IVSIVRANDVM PHARMACOPOEORVM.

Rerum Creatorem, vnum in Trinitate Deum, quem pia mente colo, palam testor, hæc omnia me præstiturum.

In Christiana fide victurum & moriturum.

Parentibus debitum honorem persolaturum.

Medicis & præceptoribus quibus operam dedi, obsequium omne redditurum, eos, nec verbo nec opere læsurum.*

Nullum ex antiquioribus ordinis nostri, vt nec alium quidem, conuitijs laceßiturum.

Artis dignitatem pro virili exornaturum.

Eius arcana non eliminaturum.

Nihil inconsultò aut spe tantum lucri facturum.

In acutis sine medicorum consensu purgantia non daturum.

Nullius illicitè verenda, nisi causa medicandi, contrectaturum.

Secreta nullius detecturum.

Venena nulli vnquam exhibiturum. -

Nec danda, etiam hosti, suasurum.

Conceptrui perdendo medicamentum, nequaquam propinaturum.

Nec foetui excludendo, nisi Medicis imperantibus, paraturum.

Medicorum præscriptiones non immutaturum.

Succedanea sine consilio non adhibiturum.

Empiricorum exitiosam praxim improbatum.

Opem licitè concedendam nemini negaturum.

Exoleta, improbataque medicamenta in Pharmacopoliis non seruanturum.

Hæc vouenti & facienti diuinum faueat auxilium.

* Le passage souligné manque dans la 1^{re} édition (Paris, 1608).

EXTRAICT DV PRIVILEGE

du Roy.



OVYS PAR LA GRACE DE DIEV ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, A noz Amez & Feaux Conscillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Baillifs, Seneschaux, Prenoits, ou leurs Lieutenans, & à tous autres nos Iusticiers & Officiers, & à chacun d'eux ainsi qu'il appartiendra Salut. Nostre bien amé DENYS MOREAU, Marchant Libraire en nostre ville de Paris, nous à fait remontrer qu'il a recouuert vn liure intitulé *Dispensatorium Medicum continens Institutionum Pharmacenticarum Lib. V. De materia medica Lib. III. Absolutissimum auctore Ioanne Renodeo Medico Parisiensi Regio opus hac tertia editiōe ab auctore infinitis locis emendatum & immutatum, in tertia plus quam parte auctum, ac suis indicibus necessarijs instructum, cui accessit Nicolai Epiphani medici nobilissimi Pharmacopea Empirica*. Lequel il desireroit mettre en lumiere s'il auoit sur ce nos lettres à ce requises & nécessaires, & ces causes desirant bien & fauorablement traiter ledit exposant, & qu'il ne soit frustré des fruiets de son labeur. Luy auons permis & octroyé, permettons & octroyons de grace speciale par ces presentes d'Imprimer, ou faire Imprimer conioinctement, ou separement en tel marge & caractère que bon luy semblera ledit liure, iceluy mettre & exposer en vente, & distribuer durant le temps de six ans, à commencer du iour qu'il sera acheué d'imprimer, deffendant à tous Imprimeurs, Libraires & estrangers, & autres personnes de quelque qualité qu'ils sorēt d'imprimer, ou faire imprimer, ny mettre en vente durant ledit temps ledit liure sous couleur de fausses marques, & autres desguisemens, sans le consentement & permission dudit exposant, ou de ceux ayans charge de luy, sur peine de confiscation d'iceluy, d'amende de trois mil liures & de tous despens, dommages & interests enuers luy à la charge d'en mettre deux exemplaires en nostre Bibliothecque publique, auant que l'exposer en vente, suyuant nostre Reglement, à peine d'estre descheu du present Priuilege. Si vous mandons que du contenu en ces presentes, vous faciez souffrir & laissez ledit Moreau pleinement & paisiblement, & à ce faire souffrir, & obeir tous ceux qu'il appartiendra, en mettant au commencement ou à la fin dudit liure ces presentes ou vn bref extraict d'icelles voulons qu'elles soient tenues pour deuement signifiees, & qu'à la collation foy soit adioustée comme au present original. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le 21. iour de Feurier, l'An de grace mil six cens vingt trois, & de nostre regne le treziesme.

Ledit Sieur Denis Moreau consent & accorde que le Sieur Ioseph Cottreau, Sebastien Chappelet, Samuel Thiborst, & Iacques Quesnel,

ses associez, iouyffent du present priuilege, chacun pour faire part & portion comme luy, suguant l'accord fa. Et ce 26. Avril 1623.

Par le Roy en son Conseil.

RENOVARD.

Signé en queue DV TILLET.

ERRATA SIC EMENDABIS LIBRIS DE materia Medica.

P Ag 6. l. 19. lege betonica p. 7. l. 16. lege defolium l. 42. quod p. 8 l. 19. lege matri-
cep. 9. l. 1. lege quaidam l. 25. draconem p. 11 l. ult. lege Alchimilla p. 12 l. 5. l. ve-
ram falsi l. 14. columellam p. 12. & vbi que passim l. cariophyllo p. 14. l. 3. l. Elleb. p. 5. l.
5. asinum p. 16 l. 8. l. antipathia. p. 21 l. 4. l. conditio p. 24. in margine l. amuleto-
rum p. 26 l. 3. l. cum medietate p. 27. l. 12. l. Sereni p. 30 l. 19. l. ductorum p. 33. l. 4. l. in-
cantil. 9. l. loetu p. 34 l. 19. l. arsenicum p. 39 l. 10. l. partip. 4. l. 24. l. temperatum p.
44 l. 9. l. cyaneus p. 51 l. 4. l. quæ p. 56 l. 16. l. cum eadem l. & p. 59 l. 1. l. cribrato
p. 60 l. 1. l. castoreum p. 68 l. 10. l. concinnato p. 69. l. 13. l. pistino p. 70 l. 41. l. vltio-
nem pag. 73. lign. 34. l. excrementitium pag. 78. l. 1. adde in l. 21.
l. sic p. 86. l. 10. l. teracco p. 88. l. 36. l. electuarii p. 93. l. 33. l. si cariophyllis p. 105 l.
20 l. tantam p. 112 l. 15. l. affunduntur p. 15. l. 1. l. electuarium p. 110 l. 26. l. pilularum
p. 122 l. 4. l. del. 6. l. feminibus p. 156. l. 21. oleaginea. p. 148. l. 1. l. qualitatis l. 30. l.
calidissima l. ultimo lege menturantur p. 150. l. 21. l. aut cerap. 154. l. 3. l. morborum
p. 159 l. 3. l. pabulum l. 8. l. succo ancorum p. 111. l. 19. l. scbo p. 162. l. 36. lege belzoin
p. 163. l. vltima l. difficilius fol. 195. in nota numerali pone 165 p. 174. l. 16. l. quæ leuiter
desuper operta p. 176 l. 19. l. quoque p. 182. l. 17. leg. l. 29. l. nutritorium p. 184 l. 28. l.
arceril. 31 l. subidet p. 197. l. 27. affectus p. 100. l. 19. in margine legendum dedisse
fertur l. 41. ibid. legendum pingua non p. 109. l. 30. l. linimentum, p. 217. l. 32. l.
virtutis p. 220. l. 30. l. ab p. 223. l. 40. l. cephalico, p. 226. l. vltima l. gossipio p. 228.
l. 15. l. nigredini p. 229. l. 11. l. dentificij.

Errata Officina sic emendabis

P Ag. 2. l. 14. l. congestio p. 5. l. 24. l. ad p. 10. l. 12. lege quodā, p. 19. l. sin marg,
colmetis p. 24. l. 4. adde quæ p. 25. l. 35. l. addideris, p. 44. l. penultima adde vo-
lunt p. 49. l. 7. l. fragariū p. 55. l. 1. l. Myrtus p. 87. l. penultima l. eadem p. 172. l. 10.
l. Marcorem p. 190. l. 2. l. spafino pag. 226 l. 4. l. galliæ p. 227. l. 5. l. ladani, p. 238.
l. 40. l. methodice p. 240. in marg. l. cisterninæ p. 244 l. 5. l. vini p. 245. l. 9. l. casto-
nadam p. 251. l. 6. dele althea, s. p. 257 l. 4. l. dissentanea eadem l. à Clusio phyllitis pag.
725. l. 4. lege picturam p. 269. l. 17. dele integram lineam p. 271. l. antepenul. l. cassiæ,
pag. 277. l. 26. l. electuariis electuario p. 281. l. marg. l. non distant p. 196. in nota nu-
merali pone 196. p. 297. l. vlt. medicum p. 302. l. 10. lege addantur p. 306. l. 2. l. vltica
mas l. explicū, eadem l. 15. l. plex, ib. l. 34. l. licis p. 310. l. 6. l. peregrinop. 317. in marg.
p. 321. in nota numerali pone 321. p. 322. l. 14. l. & p. 344. l. 33. l. hominū p. 384. l. 21. de-
le quod non p. 410. l. 37. l. suop. 418. l. 20. l. vna p. 427. l. 24. l. diuersis eadem l. 10. l.
quodam p. 48. l. 1. l. altera p. 444. l. 26. l. crebrò p. 445. l. 5. adde ineptos p. 463. l. 1.
intercurfantibus p. 464. l. 1. l. albefactis p. 468. l. 7. l. balnearum p. 471. l. 6. l. pelagi
lito re, p. 475. l. 37. argenteis p. 491. l. 31. leg. metallorum p. 504. l. 6. dele se, p. 511.
l. 14. l. solida p. 516. l. 22. l. concrefcere p. 542 l. 7. l. proximam,

IOANNI RENODÆO, DOCTORI
Medico, Pharmaciam magnæ auctori.

Vlueret vnde magis Medicis inuenit in herbis,
Pro fene Cirnides redditus arte puer.
Vnde Renodæus Phœnicis tempora viuat,
In Medicis reperit doctior Antidotis.
Immo, illi longos dedit annos Pharmacopœa,
Huic docta æternos *ἰολογία* dabit.

Ph. Hebertius Rector Academia Parisiensis.

NEstoreos tu viue dies, charissime frater,
Viuet ut incolumis permultos hic liber annos,
Elleborum stultæ qui das bona Pharmaca menti;
Destruis & potu febres, Eclegmate rheuma,
Antidotis pestem sanas, pilulisque catharrum,
Porrigitis & Medicinam partibus omnibus omnem.
Chymica non spernis medicamina, sed Paracelsi,
Dogmata, sed mores, sed pessima toxica, fumos,
Nequitias, fraudes, periammata, verba, susurros
Carpis, & eloquio damnas Empeirica damna.
Ergo cum viles operas, cum turpia culpas
Agmina, tu diuos imitaris pectore recto:
Pharmaciam nam restituis veram, veteremque
Et medicamentis illustras, perficis, ornas.

LUCAS RENODÆVS Augustinens. Doctor Theo-
logus, authoris frater.

AD DOCTISSIMUM VIRVM D. N.
De Renou Doctorem Medicum hipastichon.

EST, qui res nouit ~~et~~ cunctas, quot Tartara claudunt,
Quot cælum, & Tellus, non ego mirer eum;
Est quoque, qui vires harum atque effecta recenset,
Quantò plus tantum miror Aristotelem.
Est & ad humanos qui cuncta hac applicat usus,
Qua nouit. Sacer hic Deus est homini.

N. IABOT scholæ Med. Paris.
Decanus.

IN ERVDITAM ET LABORIOSAM IOANNIS
RENODÆI *φρζμμικεὺ τιμὴν*. Epigramma.

SIC Renodæe dies, noctesque laboribus vrges;
Sic vota his studiis velificata tuis;
Condere plura cito, & condire volumina pulchrum est.
At, dare quæ populo sint bona, grata, Dei est.
Nam tua non tantum demulcet pagina mentem
Verum etiam multis adiuuat officijs.
Vis dicam ingenuè, quicquid complectitur orbis
Terrarum, hac parua clauditur in tabulâ:
Quàm graphicè expressam, verisque coloribus, ætas
Nulla erit in tenebris quæ sepelire queat.

Dionysius Guerinus, Doctor Medic. Parisiens.

INDEX CAPITVM.

*Hujus indicis
initium 7^o ante
id col. reperitur.*

32. de hordeo.	p. 388.
33. de sumach seu rhoe.	ibid.
34. de myrtho.	p. 389
35. de millefolio.	p. 390
36. de tamarisco.	ibid.
<i>Sectione sexta continet capita 32.</i>	
CAP. I. D E pomis.	p. 401
2. de pyris.	p. 402
3. de malo citrio.	p. 403
4. de arantiis.	p. 404
5. de granatis.	ibid.
6. de malo cotoneo.	p. 406
7. de mespilo.	p. 407
8. de sorbis.	p. 408
9. de cormis.	p. 408
10. de prunis.	p. 409
11. de malis armeniatis.	p. 410
12. de persicis.	ibid.
13. de cerasis.	p. 411
14. de moris.	p. 412
15. de moris syluestribus & Idæis.	p. 413
16. de sebesten seu myxis.	ibid.
17. de iuiubis.	p. 414
18. de ficubus.	ibid.
19. de dactylis.	p. 415
20. de oliuis.	p. 416
21. de vuīs acerbis & passulis.	p. 417
22. de ribes.	p. 418
23. de berberis.	ibid.
24. de auellanis.	p. 419
25. de pistaciis.	ibid.
26. de amygdalis.	p. 420
27. de nucibus.	p. 421
28. de nucibus pineis.	ibid.
29. de nucibus cupressi.	p. 422
30. de fructibus seu baccis lauri.	p. 433
31. de granis iuniperi.	ibid.
32. de gallis.	p. 424

Sectione septima continet capita 13.

CAP. I. D E succis seu plantarum humoribus.	p. 426
--	--------

2. Quid gummi, & qui differat a resinis & aliis liquoribus concretis.	p. 427
3. de gummi & arabico.	ibid.
4. de gummi tragacantho.	428
5. de ammoniaco.	ibid.
6. de lacca & caucamo.	p. 429
7. de sanguine draconis.	431
8. de asa foetida.	432
9. de sagapeno.	433
10. de galbano.	ibid.
11. de opoponace.	434
12. de sarcocolla.	435
13. de gummi hederæ.	ibid.

Sectione octava continet capita 7.

CAP. I. Q uid resina & eius varietas.	p. 436
2. de pice.	p. 437
3. de therebentina.	p. 439
4. de thure.	p. 440
5. de benjuino.	p. 441
6. de euphorbio.	ibid.
7. de lacryma oleæ Æthiopicae improprie gummi elemi dicta.	

Sectione nona continet capita 5.

CAP. I. D E mastice.	p. 443
2. De caphura.	p. 444
3. de styrace.	p. 445
4. de myrrha & stacte.	p. 447
5. de bdellio.	p. 449

Sectione decima continet capita 8.

CAP. I. D E opio.	p. 450
2. de elaterio.	p. 451
3. de ladano.	p. 482
4. de hypocistide.	ibid.
5. de tartaro.	p. 453
6. de succo glycyrrhizæ.	ibid.
7. de Cera.	p. 454
8. de succis quibusdam alijs alio loco aptius descriptis.	p. 456

Liber secundus sectione prima continet capita 15.

1 Præfatio. de mineralibus.	pag 457.
-----------------------------	----------

INDEX CAPITVM.

CAP. I. De terra lemnia.	p. 458
2. De bolo armena.	ibid.
3. de alijs & quibusdam terris minus vstratis.	p. 459
4. de Chrysocolle seu borace.	p. 461
5. de vitriolo.	ibid.
6. de alumine.	p. 463
7. de sale.	p. 464
8. de bitumine.	p. 465
9. de sulphure.	p. 468
10. de ambaro griseo.	p. 469
11. de ambaro fuluo.	p. 470
12. de corallio.	p. 472
13. de auripigmento.	ibid.
14. de nimio.	p. 473
15. de hydrargyro.	p. 475

*Sectione secunda continet capi-
ta 16.*

CAP. I. De smaragdo	p. 478
2. de saphyro.	p. 479
3. de rubiniis.	p. 480
4. de granatis.	p. 481
5. de sardio lapide.	ibid.
6. de hyacintho.	p. 482
7. de topazio	ibid.
8. de lapide lazuli.	p. 483
9. de magnete.	ibid.
10. de alijs quibusdam gemmis in medicina rarina vsurpatis.	p. 485
11. de marmore.	p. 487
12. de chrystallo.	ibid.
13. de gypso.	p. 488
14. de calce.	p. 489
15. de lapidibus spongiarum.	ibid.
16. de lateribus.	p. 490

*Sectione tertia continet capi-
ta 13.*

CAP. I. De auro.	p. 492
2. de argento.	p. 493
3. de stanno.	ibid.
4. de plumbo & molybdæna.	pag.

494	
5. de ære.	p. 495
6. de ærugine.	p. 496
7. de ferro.	p. 497
8. de septimo metallo.	p. 499
9. de cerusa.	ibid.
10. de cadmia vtraque.	p. 501
11. de spodio.	p. 502
12. de pompholige.	p. 503
13. de lythargyro.	p. 504

*Liber tertius continet capi-
ta 36.*

CAP. I. De sanguine humano.	p. 507
2. de mumia.	p. 508
3. de sanguine hirci.	p. 509
4. de sanguine leporis.	p. 510
5. de medulla cerui.	p. 511
6. de seuo caprino.	p. 512
7. de axungia suis.	ibid.
8. de axungia vrsi.	p. 513
9. de axungia anseris.	ibid.
10. de axungia anatis.	p. 514
11. de axungia gallinarum.	p. 515
12. de butyro.	p. 516
13. de pulmonis vulpis.	p. 517
14. de testiculis castoris.	p. 518
15. de moscho.	ibid.
16. de zibetho.	p. 519
17. de ictyocolle.	p. 520
18. de œsypo.	p. 521
19. de osse cordis cerui.	522
20. de ebore.	p. 523
21. de cornu minocerotis.	p. 524
22. de lapide bezaar.	p. 526
23. de Margaritis ac vnionibus.	p. 527
24. de vmbilicis marinis.	p. 529
25. de dentalio.	ibid.
26. de antalio.	p. 530
27. de testudinibus.	p. 531
28. de ranis.	p. 532
29. de cancris.	p. 534
30. de viperis.	p. 535

31. de scincis. p. 537
 32. de scorpionibus. p. 538
 33. de lumbricis. p. 539
 34. de cantharidibus. p. 540
 35. de formicis. p. 541
 36. de serico. p. 542
- Index capitum quæ in Antidotario continentur.
- Liber Isagogicus continet capita 17.*
- Cap. I. De domo & officina pharmacopœi p. 3
 2. de instrumentis officium necessariijs. p. 4
 3. de mortarijs & pistillis. p. 6
 4. de spatulis & coclearibus. p. 7
 5. de ahenis & alijs vasis. ibid.
 6. de torcularibus & prælis. p. 8
 7. de cubris & incerniculis. p. 9
 8. de colatorijs. p. 10
 9. de fornacibus. p. 11
 10. de alembicis & cucurbitis. p. 12
11. de mensis & abaco. p. 13
 12. de arculis, & pyxidibus & alijs p. 14
 13. de simplicibus in pharmacopolio seruandis. p. 16
 14. quibus aquis esse debet officina seruandis. p. 20
 16. de animalibus in pharmacopolis seruandis. p. 21
 17. de medicamentis compositis in officina seruandis. p. 22
- Liber primus Antidotarij prima sectione continet capita 32.*
- Cap. I. Syrupus violatus. p. 24
 2. syrup. de Tussilagine. p. 26
 3. Syr. florum persicorum. pag. 27.
 4. syr. de lupulo. p. 28
 5. syr. rosarum pallid. p. 29
 6. syr. de pede cati. p. 30
 7. syr. de papauere simplex. pag. 31
 8. syr. papaueris erratici. p. 33
 9. syr. delamio. p. 34
 10. syr. de nymphaea. p. 35
 11. syr. capillorum veneris communis. p. 36
 13. syr. capilli veneris Monspeliensis. p. 37
 13. syr. de quinque radicibus. p. 38
 14. syr. de althea fernelij p. 39
 15. syr. de cichorio cōpositus. p. 40
 16. syr. de endiuia simplex. p. 42
 17. syr. de fumacula simplex. ibid.
 18. de syr. de fumaria maior. p. 43
 19. syr. de cassia. p. 44
 20. syr. de succo buglossi. p. 45
 21. syr. de succo acetosæ. p. 46
 22. syr. acetatus simplex. p. 47
 23. syr. dinari seu de byzantijs. p. 48
 24. syr. de moris compositus. p. 49
 25. syr. ribes & berberis. p. 50
 26. syr. de agresta seu omphacio. p. 51
 27. syr. limonū & granatorū p. 51
 28. syr. citoniorum simplex. p. 52
 29. syr. de pomis simplex. p. 53
 30. syr. Regis saporis. p. 54
 31. syr. myrtinus compositus. p. 55
 32. syr. de mentha simplex & compositus. p. 56
- Lectio secunda continet capita 12.*
- Cap. I. Syr. rosarum siccarum fern. p. 57
 2. syr. Regius seu Alexandrinus. p. 58
 3. syr. de absynthio. ibid.
 4. de stœchade. p. 59
 5. syr. de clycyrrhiza. p. 60
 6. syr. iuiubarum. p. 61
 7. syr. de hyssopo. p. 62
 8. syr. de artemisia. p. 63
 9. syr. resumptiuus. p. 64
 10. syr. exhilarius. p. 67
 11. syr. de corallio. p. 68
 12. syr. de cinnamomo. p. 78

INDEX CAPITVM.

Sectione tertia continet capita 4.

- CAP. I. **O** Xymel seu acetum
mulsum. p. 71
2. oxymel scilliticum. p. 72
3. oximel compositum. p. 74
4. hydromel vinosum simplex. p. 75

75

Sectione quarta continet cap. 5.

- CAP. I. Mel rosatum. p. 78
2. mel violatum. p. 79
3. mel anthosatum. p. 80
4. mel mercuriale. ibid.
5. mel passularum. p. 81

Sectione quinta continet capita 5.

- CAP. I. Rob, seu sapa. p. 83
2. rob ribes ibid.
3. rob berberis. p. 84
4. rob de cornis. p. 85
5. rob citeniorum ibid.

Sectione sexta continet capita 11.

- CAP. I. Conserua violarum. p. 86
2. conserua tussilaginis. p. 87
3. conserua rosarum. p. 88
4. conserua hispidulæ. p. 89
5. conserua buglossi. p. 90
6. conserua borraginis. ibid.
7. conserua calendulæ. p. 91
8. conserua florum cichorij. p. 92
9. conserua nenupharis. p. 93
10. conserua anthos. p. 93
11. conserua betonice. p. 94
12. conserua saluie, melissæ, stœchados. p. 94

Sectione septima continet capita 15.

1. Cerasa condita. p. 96
2. ribes & berberis condita. ibid.
3. pyra condita. p. 97
4. nuces conditæ. p. 98
5. pruna condita. p. 99
6. citonia condita. ibid.
7. folia adianti condita. p. 100
8. folia tussilaginis condita. p. 101
9. caules lactucæ conditi. ibid.
10. caules cynaræ conditi. p. 102

11. radix pœoniæ condita. p. 103

12. radices eryngiorum conditæ. p. 104

13. radices symphyti conditæ. p. 105

14. radices enulæ conditæ p. 106

15. radices satyrij conditæ. ibid.

Sectione octaua continet capita 5.

1. Eclegma scilliticum. p. 108
2. eclegma de caulibus. ibid.
3. Eclegma depulmone vulpis. p. 109
4. eclegma sanum & expertum p. 110.
5. eclegma de pineis. p. 111.

Liber secundus prima sectione continet capita 15.

1. Diacassia. p. 114
2. electuarium lenituum. p. 115
3. elect. catholicum. p. 117
4. diaprunum seu diadamascenum simplex. p. 119
5. diaprunum compositum. p. 120
6. diaphœnicum. p. 121
7. elect. de psyllo. p. 124
8. benedicta laxat. p. 126
9. confectio hameck Fernel. p. 127
10. confect. hameck maior. p. 129
11. cariocostinum. p. 131
12. tryphera solutiuæ. p. 132
13. electuar. sennatum. p. 134
14. hydragogum eximium. p. 136
15. elect. rosatum. p. 137

Sectione secunda continet cap. 4.

- CAP. I. Hiera picra Galeni. p. 139
2. hiera picra cum agarico. p. 140
3. hiera Pacchij. p. 141
4. Hiera diacolocynthidos magistralis. p. 142

Sectione tertia continet capita 6.

1. Elect. diacarthami. p. 144
2. elect. de succo rosarum. p. 146
3. elect. de citro solut. p. 148
4. trochisci de rhabarbaro. p. 150
5. trochisci de agarico. p. 151
6. trochisci alhandal. p. 152

Sectione quarta continet capita 26.

1. pilulæ stomachicæ vulgò ante cibum. p. 153
2. pilulæ Rufi. 154
3. pilulæ mastichinæ. 155
4. pilulæ de tribus solutiuis. p. 156
5. pilulæ imperiales. p. 157
6. pilulæ de eupatorio maiores. p. 158.
7. pilulæ sine quibus esse nolo. p. 159.
8. pilulæ lucis maiores. p. 160
9. pilulæ aureæ. p. 162
10. pilulæ de agarico. p. 163
11. pilulæ coccinæ. p. 164
12. pilulæ de hermodactylis maiores. p. 165
13. pilulæ aggregatiuæ. p. 166
14. pilulæ de fumaria. p. 168
15. pilulæ de lapide lazuli. pag. 169
16. pilulæ asajaret. 170
17. pilulæ de aromatibus. p. 171
18. pilulæ de nitro. p. 172
19. pilulæ mechoacanæ. p. 174
20. pilulæ fœtidæ. p. 175
21. pilulæ de hydrargyro. p. 177
22. quibus pilulis officina pharmaceutica carere potest. p. 178
23. pilulæ de cynoglossò. p. 181
24. de laudano. p. 182
25. de pilulis bechicis. p. 183
26. pilulæ bechicæ albæ. p. 184

Liber tertius sectione prima continet capita 22.

1. Diamargaritum frigidum. p. 186
2. diamargaritum magistrale. p. 187
3. elect. de gemmis. p. 189
4. diambra. p. 190
5. diamoschi. p. 191
6. puluis elect. triasantali. p. 192
7. aromaticum rosatum. p. 194
8. diarrhodon abbatis. p. 195

9. puluis lætificans incerti auctoris. 197
10. puluis dianthos. p. 199
11. puluis dianisi p. 200
12. diaciunnamomum. p. 201
13. lithontripticon. 202
14. puluis diacalaminthos. 203
15. puluis contra pestem. 204
16. puluis antilissos. p. 206
17. crocus martis. 207
18. puluis diaireos. p. 210
19. puluis diatragacanthi frigidi. p. 211
- confectio de Rebecca. p. 213
20. puluis diapenidij sine speciebus p. 212.
22. de pinediis. p. 214

Sectione secunda continet capita 13.

1. Confectio alKermes. p. 215
2. confectio de hyacintho. p. 217
3. rosata nouella. p. 219
4. confectio de baccis lauri. p. 221
5. antidotus diasatyriou. p. 221
6. antidotus analeptica. p. 222
7. antidotum asyncritum. p. 224
8. philonium magnum. p. 207
9. opiata Salomonis. p. 209
10. elect. de ouo. p. 210
11. mithridatiū Damocratis. p. 212
12. Theriaca Andromachi p. 215
13. opiata Neapolitana. p. 218

Sectione tertia continet capita 20.

1. Trochisci de vipera. p. 220
2. trochisci hedichro. p. 222
3. trochisci scillitici. p. 224
4. trochisci cypheos. p. 225
5. trochisci galliæ moschata. p. 226
6. trochisci aliptæ moschata. p. 227
7. pastilli Neræ. p. 228
8. trochisci de caphura. p. 229
9. trochisci diarrhodon. 230
10. trochisci de carabe. 231
11. trochisci de antispodio. 232
12. trochisci de berberis. p. 236

IN DEX CAPITVM.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 13. trochisci gordonij. p. 234 | plex. p. 270 |
| 14. trochisci de capparibus. 236 | 3. oleum de scorpionibus compositum. p. 271 |
| 15. trochisci de myrra. pag. 237 | 4. Oleum de castorio. p. 272 |
| 16. trochisci alixiterij. pag. 238 | 5. oleum vulpinum. p. 273 |
| 17. trochisci hysterici. p. 239 | 6. oleum formicarum. p. 274 |
| 18. trochisci ad gonorrhœam. p. 240 | |
| 19. trochisci narcotici. p. 241 | |
| 20. trochisci rhasis. 242 | |

Sectione quarta continet capitula 10.

Liber quartus sectione prima continet capita 16.

1. Oleum violatum. p. 246
2. oleum keirinum. p. 247
3. oleum irinum. p. 248
4. oleum rosatum completum. p. 249
5. oleum rosatum omphacinum. p. 250
6. oleum rosatum simplex. pag. 251
7. oleum liliorum simplex. p. 252
8. oleum nenupharinum. p. 253
9. oleum de mentha. p. 254
10. oleum de absynthio. ibid.
11. oleum anethinum & chamæmelinum. p. 255
12. oleum hypericonis simplex & compos. p. 257
13. oleum de pommis mandragoræ. p. 258
14. oleum mirthinum, mirtillorum. p. 259
15. oleum cidoniorum. p. 260
16. pigmeleum seu mirelaum. p. 261

Sectione secunda continet capita 6.

1. Oleum mastichinum. p. 263
2. oleum nardinum. ibid.
3. oleum croci. p. 264
4. oleum de capparibus. p. 265
5. oleum ex eupatorio. p. 266
6. oleum moschellinum. p. 267

Sectione tertia continet capita 6.

1. oleum lumbricorum. pag. 269
2. oleum de scorpionibus sim-

1. Oleum amygdalarum dulcium. p. 275
2. oleum amygdalarum amararum. p. 277
3. oleum nucum. p. 277
4. Olea quædam raro parari solita. p. 278
5. olea de nuce moschata. p. 279
6. oleum ouorum. p. 280
7. oleum laurinum. ibid.
8. de oleo balsami, liquidambar, & petreolo. p. 281
9. liquidambar. ibid.
10. petrolæum. p. 282

Sectione quinta continet capita 16.

De oleis destillatione tractis, ac primùm de his quæ per descensum eliciuntur.

1. Oleum guaiaci. p. 284
2. oleum tamarisci. p. 285
3. oleum iuniperi. ibid.
4. oleum tartari. p. 286
5. oleum myrrhæ. ibid.
6. de oleis ascensoria destillatione tract s. p. 287
7. oleum de lateribus. p. 288
8. oleum vitreoli. p. 289
9. oleum sulphuris. p. 290
10. oleum mellis. p. 291
11. oleum ceræ. ibid.
12. oleum terebinthinæ. p. 292
13. oleum caryophyllorum. ibid.
14. oleum anisi. p. 293
15. oleum de spica. p. 294
16. oleum metallorum. ibid.

appendix de balsamiis. p. 295

*Liber quintus sectione prima continet
capita 28.*

1. Vnguentum rosatum. pag. 304
2. vng. album rhasis. p. 306
3. vng. populeum. p. 307
4. vng. nutritum. p. 308
5. vng. de bolo. p. 309
6. vng. stypticum. p. 310
7. deficcatiuum rubrum. p. 311
8. vng. diapompholigos. p. 312
9. vng. ad pruritum scabiosum. p. 313
10. vng. de ophthalmicum. p. 314
11. vng. de minio. p. 315
12. vng. resumptum. p. 315
13. vng. de althea. p. 317
14. basilicum maius & minus. p. 318
15. mundificatiuum expertus. p. 320
16. vng. aureum. p. 321
17. emulatum cum mercurio. p. 322
18. vng. ad vermes. p. 323
19. vng. ad achoras. p. 324
20. vng. Apostolorum. p. 325
21. vng. Ægyptiacum. p. 326
22. vng. agrippæ. p. 327
23. vng. aregon. p. 328
24. vng. martiatum. p. 330
25. vng. citrinum. p. 332
26. vng. pomatum. p. 334
27. vng. spleniticum. p. 335
28. vnguent. neapolitanum. pag. 336

*Sectione secunda continet capi-
ta 4.*

1. Ceratum refrigerans Galeni. p. 339
2. ceratum santalinum. pag. 340
3. ceratum stomachicum. p. 341
4. ceratum cœsydatum. p. 342

*Liber sextus continet capi-
ta 21.*

1. Diachylon album. pag. 346
2. Diachylon magnum. p. 347
3. emplastrum de mucaginibus. p. 349
4. emplastrum de meliloto. pag. 350
5. emplastrum oxycroceam D. myr. p. 352
6. emplastrum de Ianua D. Anselmi à porta. p. 353
7. emplastrum de Bethonica minus D. Henrici Hermond. p. 354
8. emplastrum de Betonica maius D. Andern. p. 356
9. emplastrum de baccis lauri. pag. 357
10. emplastrum Tonforis D. Ætij. p. 358
11. emplastrum Phœnicinum. p. 1
Palmeum, seu Diacalchiteos. D. Gal. p. 359
12. emplastrum de gratia Dei. pag. 360
13. emplastrum diuinum. p. 361
14. emplastrum de cerusa. pag. 363
15. Emplastrum pro stomacho. p. 364
16. emplastrum de mastiche. pag. 365
17. emplastrum pro matrice. D. Præpos. p. 366
18. emplastrum contra rupturam, vulgò Hermiam D. N. Præpos. p. 368
19. emplastrum catagmaticum, seu ad fracturas ossium. p. 370
20. emplastrum vigorium seu de Ramis. p. 372
21. Tela Galteri, vulgò Sparadrap. p. 374

INDEX CAPITVM.

*Appendix de quibusdam aquis
medicatis, arte paratis.*

*De aquis topicis seu exterius
adhibendis.*

Aqua theriacalis.	p. 376	Aqua opthalmica.	p. 379
aqua cinnamomi.	p. 377	aqua communitatis.	ibid.
aqua vulgò clareta dicta.	ibid.	aqua ad epiphoram & oculorum	
clareta alia.	ibid.	ruborem.	p. 380
clareta alia.	p. 378	aqua calcis.	ibid.
clareta vulgaris.	ibid.	aqua fortis.	ibid.
aqua contra calculum.	ibid.	de aquis compositorijs seu fucato-	
aqua ad gonorrhæam.	p. 379	rijs.	380


Finis indicis Capitum.




IOANNIS
RENODÆI MED.
 PARIS. INSTITVTIONVM
PHARMACEVTICARVM
 LIBRI QVINQVE
 DE
 MEDICAMENTORVM ELECTIONE.
 LIBER PRIMVS.

Quid Pharmacia, et eius utilitas.

C A P. I.



a Cor.
 Cels. c.
 1. lib. 1.
 b Gal.
 com. ad
 part. 6.



lib. 1. de
 victu
 acut.
 c Fern.
 prafar.
 ad l. 4.
 Meth.
 d Aph.
 1. lib. 1.

PHARMACIA^a est secunda Medicinæ curatricis pars, quæ per medicamenta^b absoluitur. Vel est ars quæ modum docet medicamenta seligendi, præparandi, & miscendi. In his siquidem tribus tota Pharmacopœæ doctrina consistit, quæ salutare morbo omni pollicetur subsidium: Rerum enim optima parens Natura suum cuique contrarium opposuit, sed fatiscētis naturæ c hebetudo id ipsum perpetuò consequi minimè potest; Tum quia hominis vita brevis est, d qui citiùs fati cedit, quàm vt artem perfectè nanciscatur. Vnde conqueritur Hippocrates, e quòd iam senex nondum peruenisset ad Medicinæ finem. Hæc siquidem ars longa est, quæ de omnibus sublunaribus in hominis^f fauorem à Deo creatis differit, vt primò sint illi nutrimentum, dein medicamentum, vel aliud ad sanitatem auxilium.

Cuique cō-
 trario con-
 trarium da-
 tur.

Amplissima igitur patet materiæ medicamentariæ seges, qua & ter-

Medicamateriae am-
plissima. *Medicamateriae* viscera gravidata turgent, & tota ipsius facies luxuriat, nihilq; in aëre volitat, aut voluitur, aut in aqua natat, vel nascitur, quod non trahi queat in hominis solarium. Nam ex angue saepe sanitas, ex luto levamen, ex fimo morborum profligatio: Ex medicamentis alimenta, hex alimentis i medicamenta saepe depromuntur.

Pharmaciae dignitas. *Pharmaciae* Est verò Pharmacia encomio multo celebranda, quae Medicinæ instrumenta, medicamenta nempe suggerit ac ministrat. Vtramque enim à mundi primordio non solum extitisse, sed ab altissimo ortum Sacrae paginae testantur: Animantia namque, stirpes, uniuersamq; medicam materiem Deus creauit, qua prioris saeculi magnates suae sanitati feliciter prospiciendo multos ad annos aetatem duxerunt.

Ægrotauit usque ad mortem rex Ezechias, & Esayæ præscripto malagmate ex ficibus super affecta parte admoto conualuit.

Ab omni peste & veneno sese vindicauit Mithridates, antidoto quæ ab ipso nomen habet, cui cum cessisset toxicum sumptum, ferro in viscera adacto sibi mortem consciiuit.

Reges olim multi medicamenta parabant. *Reges olim* Regium quidem olim putarunt Imperatores medicamenta parare, vel parata secum ferre, & his offerre quorum gratiam aucupabantur. Eam ob rem vnguenta & aromata Cambyses misit Ægyptiorum regi, quibus suam optimè tueretur sanitatem. Præstat enim regem, vel ducem militum in castris esse sine clypeo & casside, quam sine medicamentis. Hinc sapienter multi pluris faciunt aliquod salutare medicamentum quam thesaurum. Aiunt Darium tanti fecisse quoddam balsamum, ut non modò inter preciosissimam supellectilem reponeret, sed cunctis opibus præponeret. Idem scribitur de Tyberio imperatore, qui trochiscos ad herpetas apud se perpetuò seruabat.

Medici Dij tutelares. *Medici* Nunc verò reges ad castra non modò pixidem, aut paruulam lagenam oleo plenam aut balsamo, sed officinam pharmaceuticam circum ferri iubent, præsidiorum omni genere refertam, quibus & se & totum exercitum ab ingentibus malis & morte saepe liberant. Hinc Medici, Dij tutelares, vel ut cum Galeno loquar, Deorum filij merito perhibentur: Hinc medicamenta Deorum manus Herophilus vocat, quod præsentis quasi numine & sanandi celeritate ægros ab interitu vindicent. Vnde Antidotus quædam *Isidorus* appellatur, quod parem Deo vim obtineat: Et apud Myrepsum cuiusdam descriptio legitur, cui cum morbi cedant quamplurimi SANITAS nominatur. Ob vires tot egregias ab eodem alia describitur, dicta THEODORETOS, quasi munus diuinum, immissum cælitis morbis interioribus abigendis, ut Emplastrum diuinum externis.

Infinita penè ac mirandæ virtutis è suo penu medicamina promittit ars Pharmaceutica, quibus nulla domus, aut ciuitas, sine magna ciuium iactura & Reipub. detrimento carere potest. Hac siquidè arte

Eccl. 30.
Exod.

noluit Deus carere tabernaculum testimonij, quod vnxit t Moses vnguento sancto, ex mirrha, cinnamomo, calamo, casia, & oleo, opere vnguentarij composito.

Vnguentũ
sanctum.

vt. 50.
Genes.

Magni quoq; duxit Pharmacia Ioseph, qui mortuo patre Iacob v precepit seruis suis & pharmacopœis, vt corpus eius aromatis condirent. Non vulgari igitur commendatione digna est Pharmacia, quæ sano corpori conseruationem, ægrotanti salutem, mortuo honorem præstat.

*Quid Pharmacopœus, qualis esse debeat, illius subiectum, obiectum,
& finis.* CAP. I I.



T à manuum opera quâ quis dexterè, ac citò, tutò, & iucundè morbis medetur externis, Chirurgus; sic ab arte ea, quæ pharmaca docet facere, vel potiùs componere, Pharmacopœus nominatur; vt Pharmacopola, qui rudes ac magna ex parte simplices medicamentorum materias, præsertimque exoticas vendit. Vocatur & Apothecarius ab apotheca, id est, à loco in quo medicamenta reconduntur & veneunt; olim Seplasiarius, à Seplasia foro Capuæ, in quo vnguenta optima conficiebantur. Sed hæc nomina sæpiùs indistinctè vsurpantur, eorumque est inanis concertatio, quando res ipsa intelligitur.

Chirurgus
quis dica-
tur, & quid
præstet.

Pharma-
copœus.
Pharmaco-
pola.

Apotheca-
rius Sepla-
sarius.

Vitæ autem probitas non tam in Philosopho, quàm in Pharmacopœo, qui vel tuendæ, vel refarciendæ sanitatis gratia, medicamenta parat & porrigit, expetitur; in eius enim manibus morbus & sanitas, vita, & mors. Atque illi cùm mala mens est, vel nescia recti, libera patet nocendi & necandi potestas: sicque præstat Pharmacopœum esse virum bonum, quàm Socratem.

Vitæ probi-
tas Pharma-
copœo de-
sideratur.

Debet autem imprimis esse pietatis studiosus, diuini numinis cultor inuidiæ & liuoris omnis expers, sanus mentis, artis Grammaticæ gnarus, bonorum fortunæ nec indigus, nec auri vel pecuniæ sitiens, & laboris diurni nocturnique patientissimus. Atheos enim vt nihil ducit Creatorem, sic nec creaturam; Et inuidus alterius marcescit rebus opimis. Fatuus verò id habet proprium, vt velit nocere; Et imperitus nil nisi quod ipse facit, rectum putat, atque eo nunquam quicquam iniustiùs. Auarus autem nulli bonus, adeò vt sibi ipsi pessimus sit; & egenus facilè fit veneficus; Ad turpia enim cogit egestas.

Qualis esse
debeat
Pharmaco-
pœus.

Indigni quoque sunt Pharmacopœi nomine & dignitate scurræ, bibuli, histriones, mimi, erronei, garruli, impostores, agyræ, tenebriones, & circulatores, qui nugis, fraude, iactationibus, promissis vanis, adulatione & mendacio plebeculam decipientes, ipsius crumenam exhauriunt; nihil enim Reipub. magis infensum id genus

Indigni qui
sint Pharma-
copœi.

hominibus cane quouis peioribus & angue.

Pharmacia
inferuit
Medicinæ.

Cùm autem idem sit subiectum Pharmaciæ & Medicinæ, nempe corpus humanum, quatenus sanitatis est vel morbi susceptium, multa habent inter se communia Medicus & Pharmacopœus, vt prudentiam, probitatem, diligentiam, & medicamentorum cognitionem; Sed cùm Pharmacia inferuiat, ministret, atque subiecta sit Medicinæ, habeatque tantùm pro obiecto medicamentum, & pro scopò & sine formam debitam medicamenti, dum vlteriùs progredi Pharmacopœus audet, pro Pharmacopœo veneficus & circulator habendus est.

Qui Phar-
macopœi
periclitato-
res.

Multos Pharmacopœos in Gallia vniuersa noui, sed inter eos periclitatores semper expertus sum, qui verborũ lenocinio ditiores mulierculas decipiunt, quas argento non tantùm emungunt, sed fucos & purgantia gratissima, vt temerè loquuntur, exhibendo, morbidas in posterum relinquunt. Sunt & horum nonnulli qui viros etiam prudentiores, vt Senatores quosdam suis technis circumueniant: Medicos enim simulant, pulsus contrectant, vrinam inspiciunt, at-

Plin. c.
1. l. 29.

Qui Phar-
macopœi
improban-
di

Lactuca
medicamẽ-
tum esse
potest, ali-
mentũ, &
venenum.

que de morborum causis symptomatis, prognosi & curatione dis-
fidentes, ridicula multa fingunt & dicunt: sicque impiè suam falcem immittunt in Medicorum messem, & iniquissimè pharmaciã exer-
cent maximo mortalium damno. Nec sciolis quibusdam fidendum, qui medicamenta quauis, modo benigna, quouis tempore sine con-
silio, posse tutò exhiberi pronunciant; Lactuca enim non oportu-
nè, & nimia quantitate sumpta interficere potest, vt cicura; Et vino
licet naturæ familiarissimo, plures sæpe pereunt, quàm gladio; li-
cèt enim sit valdè cardiacum, & veluti senum lac, ac principiorum
vitæ restauratiuum, datum tamen non apto tempore, valde no-
cet.

Officium
Pharmaco-
pœi.

Officium igitur Pharmacopœi est medicamenta solummodò tra-
ctare, atque ad vsum salutarem medici probati iussu adhibere. Quod
vt feliciter consequatur, primò debet ea seligere, Secundò præpa-
rare, Tertiò componere. Sed antequam seligatur medicamentum,
quid sit noscendum est.

*Quid Medicamentum, quid Alimentum, quid inter vtrumque
medium.* CAP. III.

Homo
morbis infu-
sus obno-
xius,



OTVS homo totus morbus est, inquit Hippoc. ^a Talis enim ex vteri inquinamenti in lucem prodiit. Nam ex dissidio quatuor qualitatum ^b quibus constat illius corpus, ex iugi fluore cui obnoxium est, & ex prauo rerum non naturalium vfu, in morbos penè innumeros incidit, quos ars Medica docet abigere, vel optima victus lege, vt docet Hippocrates libris De diætã, Et Galenus li-

^a Epist.
ad Damog.
^b Cap.
4. l. 2.
de Eleus
Gal.

bris De sanīt. tuend. partim medicamentis, tum interiùs assumptis, tum topicis, seu exteriùs admotis.

Ea autem sunt vel simplicia, quibus vt plurimum utebatur Hippocrates, vel debita arte cōposita. Simplicia dicūtur quæ talia sunt, qualia natura produxit, vt cassia, Rhabarbarum, polypodium, colocynthis, & infinita alia, quæ naturalem tantùm compositionem, ex quatuor videlicet elementis sunt consequuta. Composita verò quæ ex multis virtute diuersis arte & industria simul vnitis constant.

Dissident autem inter se Medicamentum & Alimentum. Nam Medicamentum dicitur, quicquid intrò sumptum, vel foris admotum nostrum corpus immutare potest, vt piper, euphorbium, pyrethrum, nymphaea, cichorium. Medicamētum quid.

Alimentum verò quod intrò sumptum nostrum corpus nutrit, & auget, vt panis, vinum, caro animalium volatiliū & quadrupedum, quide non rapacium. Quæ enim viuunt ex raptō, prauī sunt succi, prauūque sanguinem generant, & tanquam immunda reiicienda. Propterea diuinā sanctione prohibitum est filiis Israël, ne comederent aquilam, vulturem, gryphem, coruum, accipitrem, & similia. Et prudenter nunc iuxta diuinum hoc decretum abstinemus à carne vulpium, luporum, leonum, & similiū rapacium. Inter vtrumque medium est alimentum medicamentosum, quod scilicet vtriusque est particeps; partim enim nutrit, partim alterat & immutat, vt lactuca, raphanus, cucurbita, allium, & infinita alia. Atque vt inter alimentum & medicamentum quoddam velut medium datur: sic inter alimentum & venenū: Illud enim reficit, conseruat, auget; hoc destruit, enecat, corrumpit. Inter autem vtrumque medicamentum est, quod neutrum efficit. Alimentum medicamētosum.

Medicamētum est medium inter alimentum & venenū.

Pauca nutriunt, vt olera; paucissima enecant, vt cicuta, napellus, aconitum, mandragora; Infinita medentur, vt reliqua, imo omnia morbis arcendis aut oppugnandis conducunt, vt lactuca, portulaca, petroselinum, asparago, quibus alterantur iuscula vel parantur decocta ad æstus interni contemperationem, aut soluendam obstructionem, aut mouendam aluum & vrinam. Venena quoque medicis dotibus insigniuntur. Nam cicuta testibus adhibita libidinis imaginationes compescit, & superposita mammis earum inflammationes tollit, ex Dioscoride. Aliaque alios salubres effectus ad affectus quosdam sæuos perfectiùs expugnandos præstare queunt, sed hominis ignauia vel ignorantia effecit, vt intactis remediis intacti & deplorati morbi relinquantur. Nullus enim est morbus absque suo contrario, licet incognito, nullum medicamentum tam efferum, quin proficuum, alioquin natura, non mater sed nouerca dicenda.

cap. 79
lib. 4.

*Antiquitus solummodo simplicium usus, & mirabiles eorum
proprietates. CAP. IV.*



ECTE Galenus ex Hippocrate scripsit hominem nunquam dolere, aut vnico egere medicamento, si vnico elemento constaret: Esset enim vniuscuiusque vnica natura, vnicus effectus, ratio redeundi ad naturalem statum vnica. Id quod absurdum est, cum infinita sint morborum species, vt etiam præsidiarum tam simplicium, quam compositorum.

*Li. 1. de
Elem.*

Medicamē-
ta quædā
composita,
quomodo
simplicia
dicuntur,

Inter simplicia numerantur oxymel simplex, Diairis, Diaprunum, & alia plurima, quæ comparatè tantum, & improprie simplicia dicuntur, quatenus scilicet ad alia magis composita referuntur. Proprie verò rosa, endiuia, plantago, menta, absynthium, plantarum genus omne, atque vt vno verbo dicam, omnia creata quæ ab arte nullam compositionem & mixtionem acceperunt, Simplicia à Medicis vocantur, quibus solis non nunquam vtuntur, vt succo plantaginis, vel sedi, aut nenupharis ad Erysipelata & ignem sacrum, succo veronicae ad cancerum, cui mirum in modum conuenit, vt succo capreolorum vitis, consilio Galeni, ad Herpetas, vt carne citoniorum adhibita regioni stomachi ad choleram morbum, & assumpta, ad dysenteriam, corpore prius repurgato, vt bethonica ad cephalalgiam, vt ferè omnibus plantis ad singulorum morborum expugnationem.

*Pæonia an-
tiepileptica
est.*

Superat verò fidem, quod de stirpibus multis scribitur, quæ videlicet effectus planè mirandos proferunt: Nam pæoniae radix vel capiti apposita, vel collo tantum adnexa Epilepsiæ paroxysmos eludit, eamque sanat. Mentha lacti imposita ipsum coagulari, & in caseum densari non sinit, vt ex probatæ fidei authoribus creditur.

*Æthiopidis
herbæ mira-
tis.*

Æthiopis herba, si vera narrat Plin. solo attactu ferras ferreas e-
*cap. 4.
lib. 26.*

Idem asserit Matthiolus de Lunaria, quæ quod soleas ferreas ab equis transeuntibus quasi extorqueat, *Sferra canale* ab Italis vocatur.

Author libri sanitatis asserit cum Tribio picum auem, cuneum, seu clauum ligneum nidi orificium obturantem, herbulæ cuiusdam solo contactu foras excutere, nonnulli hanc vim aut illi tantum tribuunt. Theophrastus rei herbariæ peritissimus alicuius plantæ meminit, quæ tam potenter congressus venereos concitat, vt si vera narrauit grauissimus author, credibile est, eam ipsam solis frigidis & maleficiatis vouisse naturam, vt salacibus viticem & Nympheam.

Clymenum rubrum tanta vi pollet ad fici sanationem, vt qui radi-

cem herbæ huius gestauerit, ab hoc morbo tutus erit, Vix credi potest quod Iosephus scribit de planta mirabili quæ à Baaran valle Iudeæ Baara dicta fuit. Ea extra terram erumpens fulgur quoddam igneum emittebat, & vt fax accensa noctu lucebat. A nullo autem hominum attingi patiebatur, nisi prius urinâ, aut sanguine muliebri irrigata, alioquin illam qui contrectarent illicò moriebantur. Euulsa vero deleteriam qualitatem amittebat. Et quod mirum est, maniacos; & à dæmonibus obsessos persanabat. Quod cum aduerterent regionis eius incolæ, illi canem prudenter & artificiosè alligabant, qui postea fame coactus, aut accitus plantam trahabat & euellebat.

Ficaria herbi.

Baara,

Non minus verò vera sunt quàm mira quæ de aliis stirpibus multis narrantur. Inter ficum genera quoddam ab exteris nationibus ad nos allatum est, & facile cicuratum, cuius tota planta folia sunt spinosa, crassissima, dura & ita viuida, vt quodque folium semimortuum & semideffosum humi, rediuiuam plantam exsuscitet, ficus Indica vulgo nominatur.

Ficus Indica mirabilis.

In Goa insula, & locis vicinis altera ficus longè dissimilior nascitur. Est nãq; arbor vastissima & feracissima, vt quæ mirabili brachiorum ac stolonum ab eodem trunco luxuriantium propagine sæpe iugerum possideat. Syluulam dixerit qui viderit. Sic se, pulchrum visu, propagat: Caudex prior & semper crassior, ex ramis quos ad latera spargit, quosdam nouellos & tenues ad terram demittit, vt radices agant; radicati nouos caudices efficiunt, priori tanquam patri continuos, qui postea iustam magnitudinem adepti, alios tanquam filios producit, sæpe tam numerosos, vt sub illorum vmbroso tegmine multa hominum millia possint hospitari. Illius historiam & iconem accuratè depinxit Clusius, vt & alias stirpes succiferas, laniferas, fariniferas, atque alias multas stupendis viribus præditas.

Altera magnis miranda.

Fidem superat quod scribit Christoph. à Costa de herba viua seu herba amoris, *Sulu* Turcis, & *suluque* Persis dicta, quibusdam Asiæ locis frequenti. Tam mira est, inquit, huius plantulæ natura, vt eam mens humana complecti nequeat. Nam cum maximè viret, si quis illam manu comprehendere tentet, ilico folia contrahit, & sub exilibus ramulis abscondit: Si vero apprehendat, mox tabida cernitur & exsiccata: sed magis mirum, amota manu mox pristinum nitorem refarcit, Totiesque marcescit aut reuirescit, quoties manu contrectatur aut capitur aut relinquitur. Gratissima est aspectu planta, quæ ex paruula radice ramulos octo profert, duos tantùm digitos longos, foliis vtrinque in ordinem digestis & ad erui folia tenella accedentibus. Scriptum est quemdam Philosophum in *Malabar* amentem redditum, quòd accuratiùs huius plantæ naturam indagasset. Credunt Barbari plurimum valere ad conciliandum amorem & virginitatem restituendam: sed hæc barbara credulitas irridenda.

Herba viua
Herba amoris.

Arbor tris-
tis.

Arbor no-
ctis.
Flos noctis.

Aues ex ar-
boribus
productæ.
In Scotia
arbores, a-
uificæ nas-
cuntur au-
thore Ænea
Syl.

Hoc cum herba viua cognatum habet ea quæ Mimosa dicitur, quod vtraque manus admotione marcescat, amotione reuirescat, in priore tamen fit vtrumque celerius, quam in Mimosa, quæ & hoc habet specialissimum, Occidente sole ita senescit vt exaruisse credatur, Oriente quasi refurgit & viriditatem recuperat priorem, eoque magis viret, quò solis æstus magis viget. Arbor verò tris-
tis contra die senescit & ferè emoritur, noctu latè viret, & suauiter olet. Arbor hæc noctis ex Malaca vbi sponte nascitur ad alias regiones, vt Goa, vbi vberri-
mè fruticat allata est. Apud nos solani quædã agnoscitur species, quæ quod noctu tantũ floreat, flos noctis nominatur.

Quid verò magis portentosum, quam ex arborum foliis & gemmis aues videre nasci? In Orchadibus tamen insulis & aliis quibusdam maritimis locis naturæ decreto quotidie accidit, vt arbores quædam auifico succo grauidatæ post legitimum exeundi, seu parien-
di tempus auiculas eructent ac proferant: quæ dum ex arboris mē-
branulis tanquam putaminibus prodeunt, si fors in aridam decidant contabescunt, ac moriuntur, si in aquas, vegetiùs animantur alacri-
ter motientur, celeriter adolefcunt, diutissimè viuunt. In trabe quæ diu in fundo maris latitaret & procellarum impetu ad litus euomi-
ta, auium vidi tanquam in matrices conclusarum rudimenta, em-
briones, & quasdam ita perfectas, vt solus exitus illis deesset.

Ex noua Hispania lignum quoddam enode ab effectu nephriticum dictum nobili virtute tam insignitum, vt aqua sola in qua minutula aliquot fragmenta maduerint, potenter vrinam, arenas & grumos crassiores deturbet & excludat. Est & notandum, & pulchrum & mirum aquam videre O pali, aut Iridis sed maximè cerulæo colore suffusam, ac micantem etiam si lignum candescat.

Color olei
hyperici.

Æquè notanda tincturæ florum hyperici mutatio, qui licet per-
flauī sint & solares, oleo tamen infusi idipsum efficiunt rubrum &
sanguineum. Sic nihil videor aspernari, omnia rimari, pauca tamen
mirari, ea nempe sola, quæ quid effatu dignissimum, & quasi porten-
tosum præ se ferunt; Cuiusmodi sunt in Indorum regnis arbores
multæ quæ mappam, mantilia, panem, butyrum, vinum, salem, lac,
mel, saccharum, & suauissima bellaria suggerunt.

Arboris
mira fecun-
ditas.
Caryotæ.
Funes ex
arbore, vi-
num.

Eadem ac maiora scribit Ludouic. Patritius Romanus de qua-
dam arbore Calecutiana. Est arbor, inquit, cognitu dignissima, quip-
pe quæ fecunditate, ac fructuum mira suauitate totius orbis arbo-
ribus longè præstantior est. Ea palmæ ritu Caryotas, seu fructus da-
ctylliformes edit, necnon glandes esu gratissimos. Item funes na-
uigationibus conferentes, pannos tenuissimos, qui colore idoneo
tincti, sericei videntur. Vinũ quoq; dat oleum & saccharum, fert
ligna alendo igni aptissima, & folia edium imbricamentis
construendis idonea, & sex menses aquam continentia.
Ex fructibus quos producit, si varij sint, vt innuere vide-
tur

detur authoris lectio, quosdam nuces vocat quarū exterior cortex igni adhibitus, ipsum luculentū efficit: Subest cortex secundus gossipiū, aut linū includens tam expolitū vt byssū dixeris. Ex floribus fit pānus serico similis. Ex proximo nucis cortice qui loco tertio succedit & crassissimus est, & nucleum oculit, carbones habentur: Cū nucleo latices ac vbertas aquæ & olei atq; alia commoda multa. Ex quodam arboris ramo inciso, aut mutilato succus elicitur qui coctus vinum quoduis virtute superat, temulentiamque & sæpe furorem inducit. Ex alio ramo saccharum extrahitur, sed parum suaue. Fert dicta nobilis arbor perennes fructus, nouellos, adultos, crassiores, virides, maturos, siccos, variique saporis & coloris vt ætate varios. Tedet me vnus arboris tot laudes & emolumenta recensere, quæ philosophus non irridebit, vbi videbit.

Quam varia ex vna arbore commoda.

Sed & miraculum reliquis mirabilius, quod stirpes amicitia vel odio inter se commoueantur, perinde ac animantia, quæ sæpius animi motibus aguntur. Efficit namque earum sympathia, & antipathia, vt quasi cogente naturali lege sese homines multi vel diligant, vel mutuis odiis prosequantur. Non potuit non amare Iul. Cæsar Marium, Damon Pithiam, Orestes Pyladem; non potuit non odisse Esaū fratrem Iacob, & Etheocles Polynicem, qui mutuis vulneribus frustrâ resistente Iocasta matre se confecerunt.

Sympathia & antipathia rerum.

Est & perpetuum odium inter lupum & ouem, Elephantum & Rhinocerotem, Ichneumonem & Crocodilum.

Antipathia.

Tinnunculus auis naturali virtute accipitres terret, Gallinaceus Leonem, Torpedo Simiam, Aquila Drachonē, Felis Murem, Cornix Noctuam, Miluus Pullum.

Contrâ concordēs sunt animātes multæ, vt Pauones & Columbe, Turtures & Psittaci, Merulæ & Turdi, Hircus & Equus, Ovis & Capra, Balana & Hegeter, cuius natia solertia ac regimine, illa ducitur, vnde pisciculū ἰχθυόσα, hoc est, ductorē nominant Opianus & Ælianus.

Brutorum Sympathia.

Ductor Balanæ.

Miraculum, inquam, est, inter stirpes agnoscere concordiam & inimicitias; vt vitē videmus vltimi delectari consortio, & rutam oleæ vicinia: myrtus & laurus mutuis federibus coniunguntur; scylla plantas omnes latas facit: malus granata Myrto vicina magis fruticat; contrâ tanta sunt inter quasdam plantas dissidia. vt aliæ aliarum viciniam ferre non queant, vt inter quercum & oleam: hæc namque cito marcescit, illius halitu & confinio. Vitis brassicæ inimicissima est & arundo filici; Origanum quoque & brassica mutuis odiis se prosequuntur, nec non quercus & nux iuglans, hedera, raphanus, brassica ebrietati resistunt & vitibus sunt inimica, vt si circum se ferantur, diffugiant. *Gal. libr. simpl.*

Stirpium amicitia.

Stirpium inimicitia.

Nec solum duo aut plura simplicia, latentes inter se inimicitias gerunt & insensissimam naturam, sed eadem planta pugnantēs ac contrarias qualitates secum gerit. Nam hedera vires continet op-

Contrariæ qualitates in eadem planta.

positas, vnam terrenam & frigidam, aliam acrem & calidam: nec deest tertia; Aqueam namque substantiam quamdam tepidam obtinet, hæc Gal. Brassica quoque contrarias promit facultates. Et lentacula ventrem soluit & sistit. Lapathi folia soluunt aluum. Semen assumptum cohibet: Gallinacei antiqui decoctum ventrem mouet, ipsius caro retinet. Idem efficiunt multa, sed efficacissimè & felicissimè rheum quod comprimendo & roborando, aperit, mouet, ducit. Ca. 29.
lib. 7.
simpl.
Ca. 14.
lib. 7.
simpl.

Planta eadem mors & vita.

Mirabilis adhuc est stirpium quarumdam natura, quæ animalia quædam alunt, alia enecant, vt ferula quæ asino cibus est sanus, equo vero mors certissima. Cicuta sturnos alit, homines occidit. Vetratum coturnices reficit, homines interficit. Hyosciamus alimentum est suis, hominibus venenum. Amigdalarum amararum vsus homini sanitatem adfert, vulpi aufert & necem infert.

Plantarum mira disparitas, in magnitudine, vultu foliorum & florum effigie, colore, odore, sapore.

C A P V T. V.



T inter passerem & Ruc Indiæ Orientalis auem ita prægrandem, vt bouem euehat, authore M. Paulo Veneto, inter Balænam & Gobionem, inter Elephantum & Murem, sic in genere plantarum inter Cedrum Libani & hyssopum, aut abietem & lichenem seu hepaticam: hoc enim tenella & perpusilla est, illa dura, vastata, prægrandis. Inter vtramque mediæ sunt stirpes, quæ nec ita assurgunt, nec tam deprimuntur: Cuiusmodi sunt arbuta, frutices & suffrutices.

Ἄνδρον
Arbor.

Arbor plantarum maxima, caudice simplici solet assurgere, ramos dein multos tanquam brachia quaquaversam spargens, summumq; verticem fastigiando altius erigens, vt abies, pyrus, quercus, taxus, vlmus, & aliæ arbores excelsæ.

Ἀνδρον
Arbutum.

Arbuta multi distinguunt ab arboribus, quod licet compage dura sint, & ferè furculo simplici emergant, sic aptè tamen natura breuiora sunt ac tenuiora, nec antiqua multum attolluntur, vt rhamnus, aquifolia, corylus, malus Persica, Cerasus, Spina alba, nigraq; & similia, quæ ab arboribus natura præcellis distant, vt ab althea, ricino & flore Peruuiano, herba solis dicto, anagalis, ros solis, anemone, aizoon & similes. Arbores tamen nani, seu arbusculæ maioris tantum & minoris ratione ab arboribus desciscere videntur.

Ἄνδρον
Frutex.

Frutices dicuntur qui arborum instar perennes sunt, nec quotannis vt herbarum maxima pars, tabescunt ac commoriuntur, sed an-

nos permultos viuentes, multos furculos ab radice proferunt & ad arbusculę magnitudinem interdum attolluntur, vt berberis, Ribes, lilac, Iuniperus, & ros marinus.

Suffrutices medij sunt inter arboream & herbaceam naturam, vt ^{φρύγανον} frutices; verum hi propius ad illam, vt illi ad hanc accedunt. Suffru- Suffrutex. tices enim ramulis pluribus & furculis lignosis fulciuntur duris ac tenuioribus, vt abrotonum, absynthiũ, salvia, laureola, Erica, vaccinium nigrum, ruscus & similia.

Herba stirpes omnes complectitur suffruticibus humiliores, seu ^{πῶα} perennes, vt gramina, veratrum nigrum, betam, plantaginem, oxalidem, seu annuas, vt lactucam, portulacam, borraginem, lampsanam, necnon frugum genera, vt triticum, hordeum & legumina.

Et vt varia est ac mira stirpium inter se magnitudo, aut proceritas & paruitas, sic variis in locis nascuntur. Quędam enim non nisi maritimis in locis nascuntur, vel littoralibus & sabulosis, vel saxosis & aqua ablutis, vt quercus marina, coralina, alga, Empetrum, seu crista marina, herba S. Petri multis dicta, quę cautibus & saxis adnascitur, viret, & viget, vt & stirpes alię multę lapidosę arborum & herbarum ritu brachiata, foliata, ramosę, nonnunquam rubentes, marinis petris sepius concolores. Alię in montibus præcellis etiam niuosis erumpunt, vt in Pyreneis, alię in altissimis & aridissimis locis oriuntur vt montibus Orientis plurimis, quędam in sterilibus desertis Syna, maris rubri vicinis; alię in murorum vel edicularum fastigiis, alię in syluis & locis opacis nonnullę in fluminibus & pratis; alię in mediis agris, alię in ipsorum tantum marginibus oriuntur, delectantur, & adolefcunt.

Natalis locus plantarum varius.

Vultum quoque plantarum quasi natura lasciuiens tam varię formauit, vt in re nulla adeo iucundę luisse videatur. Radices namque multarum testiculos referunt; alię ambo crura, vt mandragora: quędam sunt ita breues, vt non esse dixeris, vt succisę, seu morsus diaboli, alię tã prolixę vt vix ipsarũ extremitatem inueneris, vt sarseparylæ: quędam radices ex semine pusillo crassissime nascuntur, vt napi, alię ex crasso tantum tenues, vt cucurbitæ. In America est radix *Maniot* dicta, corporis humani crassitudine, qua ferẽ sola barbari nutriantur.

Vultus plantarum varius.

Radicum varietates.

Eadem in foliorum diuersitate iucunditas, quę certis in plantis duo tantũ sũt, in quibusdã tria, in aliis quatuor, in nonnullis quinque, in multis multa, eoque minora quõ plura. Quędam pro foliis spinas habere videntur, vt corruda, alię capillos, vt cuscuta, feniculum, asparago & alię permultę: Alię tam latę & planę, vt clypeum excedant. In Calecutio solo *Malapolanda* nomen fructus & fruticis est, cuius folia singula singulis hominibus ad pluuiam & solis estum fugandum sufficiunt. Formas verõ varias referunt vt Alarum auriculam, oxalis minor spiculum, alchimila leonis pedem, consolida re-

Foliorum magna varietas.

gia ungues alaundæ, vt quædam vel auriculas vrsi, vel linguam passeris, aut bouis aut cerui, vel pulmonis ranis aut hepatis ideam nō male representant.

Florum di-
uersitas.

Nihil autem æquè reficit animum atque diuersa florum imago. Inter multos tātum paucos referā. Est albi heratei falsi species cuius flos calceolum ostendit. Aconitum quoddā mihi cognitum cassidis figuram suo flore retinet. Digitalis à forma floris hoc nomē habet. Arum simili ratione pudendum canis vocitatur. Ophioglossum sic à flore dicitur, vt & lagopus. Hispidula ob eandem rationem, æluropus seu pes cati nominatur. Antirrhinū vituli nares dicit, tragopogon hirci barbā, Aster atticus stellā, chrysanthemon solē, bupthalmos bouis oculum. Ex Indis ad Europæos allata est planta, illis *Maraca*, his granadilla, signaturarum nomenclatoribus flos passionis dictus, qui flosculorum circinnitate, cui supereminet columela, cum adnexu triulcæ cuspidis extrema crassioris, tam apprimè coronam spineam columnam & tres clauos obiicit, vt mysteria passionis mysticus flos infideli populo demonstrare videatur. Cætera quæ ad mentem & manum habeo, breuitati studens defero.

Flos passio-
nis.

Florum co-
lor varius.

Quam elegans verò sit ac varius florum color, videri quidem potest, sed animo vix concipi, & verbis nunquam explicari. Demus etenim atrum & candidum, quæ aliorum colorum primordia tenentur, flauum, rutilans, ceruleum, glaucum, atque alios quosdam colores, paucos tamen distinctis vocibus à Philosophis designatos, vix ac ne vix quidem perspicendo centesimam florum varietatem in tinctura distinguemus: nam inter viginti flores purpureos totidem purpuræ varietates agnoscere fas est idem iudicium de reliquis: quid igitur de singulorum à summo pictore mixtura? Colorum videtur certus numerus, certa que lex & ratio, florum tincturæ prorsus incerta, imo infinita delineatio: quid enim rubor aut candor rosarum cum rubedine aut albedine papauerum, præoniarum, cyanorum, caryophyllorum & aliorum mille? Natura sanè primū sibi dein nobis placet; ista varietas illi ornatus est & perfectio, nobis delectatio & admiratio, niremur igitur illius opera quæ mens humana non semper capit.

Foliorum
color va-
rius.

Porro foliis sua sicut floribus est coloris elegantia; nam atriplex quoddam datur foliis saturatè rubris: quædam brassica candidis, alia latè purpureis, vulgaris quæque viridibus. Alba populus folia promit bicolora, vt tussilago, supernè viridia, infernè candicantia; cyclamen rutila; veratrum nigrum obscura, album iucundè virentia; verbascum incana, & ferè lanea; eringium horrida & concolora; lappathum rubrum sanguinea; chelidonium flaua: croceus enim succus quo planta hæc luxuriat, in foliis & floribus plurimū micat. In thymalorū genere & pluribus aliis secus accidit, quæ licet sint lacte prægnantes, non magis abescunt. Androsæmum succum profert

cruentum, granum kermes quasi sanguinem arteriosum; ob cuius similitudinem fors cordi confert.

Multæ autem stirpes mirè fœtent, vt cîcuca, vuluaria, agripalina, non satis probabili ratione Cardiacæ dicta, vt & Coryandrum, cuius semen suauissimè, reliquæ plantæ partes fœdissimè spirant. Aliæ gratiofo halitu cerebrum & partes principes valdè recreant vt rosæ, caryophilli, maiorana, stœchas, nardus, muscari, vulgo decadi, Narcissus moschatus, Hyacinthus vernalis, ozimum, lilac, laurus, mala citria aurentia & similia aromatica. Sunt quæ nullum odorem exhalant, aut fatuum, vt arbores, arbuta, fruticum pars maior, gramina, olera & mille alia.

Plantarum odor varius

Saporum verò diuersitates licet tantum nouem cum doctis viris statuerimus, vt postea patebit, ex singulorum tamen varia commixtione & cuiusque speciei particulari natura multo plures nascuntur. Dulcia quidem sunt mel, manna, lac, saccharum, vinum recens expressum & glycyrrhiza, verum quot dulcium, tot dulcedinis sunt discrimina. Item aloe peramara, amarissima Colocynthis, Absinthium quoque, cicuta, centaurium minus, fumaria, Lupini, & alia innumera, an igitur vna amaritudo? Idem sentiendum de reliquis saporibus, quorum alij linguam feriunt acutissimè, vt euphorbium, Synapi, pyrethrum, alij moderatè, vt rheum, alij sine molestia, vt rosa, viola, alij cum voluptate, vt saccharum.

Sapores plantarum diuersi ac multi.

Neque solum reges olim & Imperatores rebus præclarè gestis, sepulchris ac monumentis æternam sui memoriam, reliquerunt, sed & stirpibus ab illis exploratis, adamatæ & in pretio habitæ, quas suis nominibus quasi patrum, seu lustrici parètes donarunt: suo enim nomine Lyfimachia insigniuit rex Macedoniæ Lyfimachus; suo & Teucrii Teucer; suis & Gentianæ & Artemisiam Gentius rex Illyriorum & Artemisia Caryæ regina. Telephiū à Telepho rege Mysiæ nomen asciuit, vt Eupatorium ab Eupatore Plinio teste. Mithridatica quoque seu Scordium regiè cognominatur, vt Clymenum, Nymphaea & Centaurium. Ob miras adhuc quibus pollent vires egregia nomina multæ retinent, vt Angelica, Imperatoria, agnus castus, Chiliodinamis & aliæ quamplures, vt ex herbariæ rei lectione patet.

Reges plantarum nomina dederunt.

Cap. 8.
et 7.
lib. 25.

Alia multa Deus miracula in hoc pedum suorum scabellò quotidie oculis obicit, quorum fidem vnica tantum experientia facit: Nihil tamen humano generi modo quocunque infensum educit, quin ex aduerso salutarem illi antidotum proferat & suggerat. Contrarium enim opponit contrario, dissimile dissimili, vt aconito, Aristolochiæ longæ radicem; Cicuta, Apij semen; Hyosciamo, allium; Napello, semen Raphani; Viperæ, Anchusam; Scorpionibus, Polemoniam: Cuius radicem qui gestauerit, à scorpionibus non icitur, aut ictus nulla molestia afficitur. Manus quoque illitæ succo cotulæ fœtidæ, apum aut vesparum aculeis nunquā punguntur.

Miræ plan-
tarum na-
turæ, Non præter rem hic notantur miræ & variæ plantarum naturæ:
Quædam enim inter niues & gelu medium virent & florent, vt A-
cōitum Hyemale, & Eleborus niger: aliæ vernum æquinoctium ex-
pectant: Quamplurimæ calorem æstiuum: Et quædam Autumno tã-
tùm floribus coronantur & induuntur, quo tempore reliquæ penè
omnes & foliis, & floribus spoliantur.

De materia medicamentorum, Et vnde sumitur.

C A P V T VI.



RÆCIPVÆ medicamentorum simplicium tam no-
stratum, quàm exoticorum differentiæ sumuntur,
vel ab eorum materia, vel à facultatibus. Ex mate-
ria, cum triplex sit Dioscoridi & Galeno, tres statuū-
tur medicamentorum generales differentiæ. Aut
enim ex plantis sumuntur, aut ex mineralibus, aut
ex animalibus.

Medicamē-
ta ex plantis
sumpta. In primo genere continentur omnia stirpium genera, Earum par-
tes, & quæ ab ipsis proueniunt, vt radices, cortices, thyrsi, ligna, ra-
mi, folia, flores, fructus semina, gummi, resinæ, succi, lacrymæ, fungi,
liquores, visci, aquæ stillatitiæ, muscus, cachrydes, lanugo, nucamen-
ta, comæ, capillamenta, vngues, iuli.

Medicamē-
ta è mine-
ralibus sū-
pta. In secundo continentur elementa ipsa elementata, vt ignis, flāma,
fumus; Aër serenus, aut ventis agitatus, calidus, frigidus, humidus,
siccus; Aqua dulcis, salsa, pluuiialis, marina, bituminosa, sulphurea, ni-
trofa, ænea, ferrea; Terræ omnes species, vt bolus armena, terra lem-
nia, Melitea, Chymolia, Rubrica, Ampelitis, Erithrea, Ochra, Creta,
& vt paucis absoluiam, omnia mineralia, quæ scilicet è terræ visceri-
bus effodiuntur, vt lapidum varia genera, vt lapis Æthites, Cyaneus,
seu Lazuli, Iudaicus; vt metalla quæ septem à multis agnoscuntur,
Metalla se-
ptem. Aurum, Argentum, stannum, plumbum, ferrum, cuprum, & Hy-
drargirus, pro numero septem planetarum, quorum nomen mutuā-
tur, secundum Spagyricos. Ad mineralium ordinem referuntur
adhuc salis genera, Bitumen, Naphta, Calchantum, Succinum, &
Ambra.

Quæ reme-
dia impro-
priè ad mi-
neralia re-
feruntur. Syderum influxus, musici cantus & numeri secundum quosdam
crisim mouentes, cum vix ad materiam medicamentariam spe-
ctent, impropriè à nonnullis, ad istud genus secundum referun-
tur.

Medicamē-
ta ex ani-
malibus sū-
pta. In tertio genere continentur animalia, vel integra, vel eorum
partes. Integra, vt gallus gallinaceus annosus in iusculo ad ciendam
aluum & corporis nutritum, Hyrundo in pastu ad oculorum a-
ciem, galerita assa ad colicum dolorem, Cancri fluuiatiles tabidis,

Scorpiones triti ad ipforum puncturas ac morsus, cantharides ad ruptoria.

Partes animalium sunt cerebella passerum ad stimulum veneris, Cerebellum leporis ad odontalgiam infantulorum, pulmo vulpis ad phthisim, Hepar lupinum ad vitia iecoris, Asinium ad Epilepsiam, intestina lupi ad colicum affectum, Stincorum renes ad mentulæ tentionem, sanguis hirci ad frangendum calculum, fel perdicis & milui ad visus claritatem, ossa cranii ad morbum caducum, os de corde cerui ad animi deliquium, dentes apri ad pleuritim nascentem, pudendum cerui ad natam & progressam, dentes Elephanti ad cordis robur, cornu cerui, Monocerotis & Rhinocerotis ad infringenda venena, vnguis Alces ad morbum sacrum, seu comitialem.

Partes animalium ad multa commendantur.

Multæ sunt adhuc aliæ partes animalium, à quibus medicamenta sumuntur, vt medullæ, seuum; pinguedo vitulorum, ceruorum, suum, hedorum, anatum, caponum, anserum; lac muliebre, asininum, ouillum; caseus, butyrum, coagulum, serum; oua gallinarum, perdicum, pauo-gallinarum, senecta serpentis, testæ piscium, pili animalium & excrementa, vt ex medicamentorum compositione, quæ in nostra Officina, seu Antidotario describuntur, patet.

De facultatibus medicamentorum: Et quotuplex secundum generales facultates medicamentum.

CAPVT VII.

Gal. li.
de plenitud.
et l. i.
Simpl.



ACVLITAS medicamenti est causa quædam effectrix, à qua pendet eius actio. Vnde colligere est, tot esse facultates, quot actiones, vt apparet in Aloe, & permultis aliis simplicibus medicamentis. Aloe siquidem facultatem habet purgandi, ventriculum roborandi, vermes enecandi, tergend, & palpebrarum humores exsiccandi.

Facultas medicamēti quid

Aloes facultas.

Triplex est igitur omne medicamentum secundum facultates, Alteratiuum, Purgatiuum, & Roboratiuum. Alteratiuum dicitur, quod intrò sumptum, vel foris admotum, manifestam corporibus nostris adfert mutationem. Idque trifariam, vel secundum temperamentum, vel secundum materiam, vel secundum formam ex Fernelio. Vnde tria medicamentorum alterantium genera constituuntur; Primum, quod impensè calefacit, refrigerat, humectat, aut siccat; Secundum, quod materiæ commodationem & consistentiam mutat, vt quod nimis indurat, vel emollit, quod rarefacit, vel densat, quod astringit vel laxat, quod incrassat vel attenuat, Ter-

Tria medicamentorū alterantiū genera.

Medicamē-
tum substā-
tiam corrū-
pens.

tium quod substantiam & formam ipsam corrumpit, vel labefactat; cuiusmodi sunt quæ præter manifestam qualitatem, qua calefaciunt, erodunt, vel refrigerant, & stupefaciunt, occulta etiam proprietate substantiam ipsam destruunt ac corrumpunt, & putredinem cum fœtore inducunt, vt cicuta, anthora, napellus, aconitum, sublimatum, & alia quamplurima. Atque horum alia toti corpori, vt quæ dicta sunt, alia certis partibus inimica, vt lepus marinus pulmonibus, cantharides vesicæ, aconitū vtero, cerebro cicuta.

Roboratiū
quid.

Roboratiuum, seu Confortatiuum, vt vulgus loquitur, medicamentum est, quod proprietate quadam partem nostri corporis aliquam respicit, roborat, ac conseruat, vt cephalica caput, otica aures, ophtalmica oculos, odontica dētes stomatica os, stomachica stomachū, cardiaca cor, hepatica hepar, splenem splenica, renes nephritica, vterum hysterica, neruos nerualia. Quæ singula, aut eorum multa aptiūs suo loco postea docebuntur.

Catharticū
quid pro-
priè.

Catharticum, seu purgatiuum dicitur, quod vitiosum & sibi familiarem è corpore trahit humorē. Quod enim sine delectu, ac promiscuè quosuis humores euacuat, verè purgatorium dici non debet, vt Antimonium, Cataputia maior, & similia; sed quod familiarē ac propriū ad quam ipsa eius facultas dirigitur, educit ac purgat. Ista enim violentiora ad interitum sæpè præcipitant; de hisque loquitur Galenus, dū scribit cathartica qualitatem quandam deleteriam & venenosam habere. Quod sic confirmat Actuarius: Medicamenta, inquit, purgantia communi quadam generis ratione, ex cēsu sunt eorum, quæ perniciē creant, atque deleteria & nostri venenosa ac mortifera appellant. Verūm ab his quæ magna sunt corrumpendi vi prædita dissident, quod hæc eadē quantitate non perinde ac corrūpentia interimant. Ca. 12.
li. 2. de
vi<.

Purgantiū
odor ingra-
tus.
Eius vis.

Tanta verò est antiphathia inter purgantia & nostram naturam, vt odore solo displiceant, qui multis vix nares ferit quin simul corpus totum concutiat, Alijs ventriculum subuertit, & quibusdam aliquando aluum subducit. De purgantiū facultate, quomodo agat & vnde erumpat paulo-post fusissimè dicetur. cap. 7.
lib. 3.

Cap. 9.

De primis & secundis medicamentorum facultatibus.

CAPVT. VIII.



V M simplicia medicamenta sæpe duas habeant facultates, & aliquando tres simul. Prima dicitur simplex & elementaris, quæ ex elementorum quatuor permixtione confurgit. Altera materialis, ac secunda, quæ ex commodatione & consistentia materiæ cui diuersa proportionem quatuor qualitates inherēt, emergit. Præter has nonnunquam tertia conspicitur, nempe purgatoria

toria, quàm Fernelius occultam nominat. Syluius cum quibusdam nonvulgatioris doctrinæ quatuor simplicium medicamentorum facultates in vniuersum constituit, sed tertiam parùm notam, & quartam adhuc incognitam asserit. Verùm vtraque pro vnica passim vsurpatur. Nam quæcunque medicamenta proprietate quadam inexplicabili, aut non satisconspicua nec à primis, aut secundis prodeunte agunt, tertiis qualitatibus, aut totius substantiæ proprietate, aut viribus occultis agere dicuntur.

Facultas autem prima medicamentorum communis est, & tanquam basis reliquarum, ex ipsis elementis prodiens. Eaque consistit maximè in calefaciendo, refrigerando, humectando, siccando: In quibus singulis vel obscurè conspicitur, vt cum primo gradu agit, vel manifestè, vt secundo, vel vehementer, vt tertio, vel summè, vt quarto: Atq; in horum singulorum aut principio, aut medio, aut fine, Itavt medicamentorum & calidorum, & frigidorum, & humidorum & siccorum ordines duodecim constituentur. Quod etiam locum habet in his, quæ coniugatas sortiuntur qualitates; quæ scilicet vires habent calefaciendi & humectandi, vel calefaciendi & siccandi vel refrigerandi & humectandi, vel refrigerandi & siccandi. Has siquidem exerunt non tantùm obscurè, manifestè, vehementer, aut summè, sed in singuli gradus principio tantùm, aut medio, aut fine.

Qualitates
primæ me-
dicamentorum.

Qualitates
singulorum
medicamentorum
quot.

Qualitates secundæ primas, seu elementares ac simplices comitantur, earumque adiutu vt sint, & vires suas patefaciant, opus habent. Nam aperiendi facultas, rarefaciendi, attrahendi, tenuandi, calfactionem sequitur: Crassandi, densandi, claudendi, repellendi, refrigerationem: Molliendi, humectationem: indurandi siccationem. Siccitas enim indurat, vt ex luto, aquilonio, vel æstiuo statu indurato, & ex lateribus igne siccatis videre est: vt etiam humiditas emollit, modò cum calore modico perseveret. Glaciei enim humiditas dura, quòd omninò sit expers caloris.

Vires autem & qualitates secundæ in austeris, acerbis, acribus, amaris, aperientibus, tenuantibus, resoluentibus, contrahentibus, repellentibus, emollientibus, stupefacientibus, & dolorem lenientibus sunt manifestissimæ, atque euidenti ratione quod possunt præstant, perinde ac primæ seu elementares.

Qualitates
secundæ.

De tertia medicamentorum facultate seu proprietate occulta.

CAP. IX.

Facultas in-
explicabilis

PRÆTER primas ac secundas medicamentorum facultates, tertia quædam dicitur occulta & inexplicabilis, quod eius certa ratio minimè reddi possit, nec scientia exactissima comprehendì, sed per solam cognoscatur experientiam: Nam cur iaspis, inquit

Gal. c.
7. li. 3.
meth.

Galenus, tacto vulnere vnde sanguis prorumpit, eū sistat, nondum noui. Atque si particulatim cuiusque naturam explorare ad vnguem scirem, utique qualem fuisse Æsculapium mente concipio, talem me esse putarem. At verò proprietates quædam omnino dici, aut explicari non possunt ex Galeno. Nullus enim rationem adferre validissimam potest, cur Cātharides vesicam inflammatoria dispositione laceessant, ab ipsa etiam longius adhibitæ; ut neque cinis cancrorum exiccatorius cū sit, cur & per se, mirabilis sit proprietate specifica ad canis rabidi demorsos, & cur efficacior sit & præstantior gentianæ & thuri potiùs, quàm aliis medicamentis commixtus.

Ibidē.
Galen.Cinis can-
crorū pro-
prietas.Com. 198
6. epid.

Certum ac securum huiusce medicamenti successum admiratus Galenus, in causæ perquisitione non sese parū exercuit, tandē- que librum pollicitus est, De his quæ occulta proprietate quida-

Ca. 30.
li. 11. de
simpli.

Illa autem tertia facultas magnam habet latitudinem, complecti- tūrque sub se purgantia, morbos occulta vi curantia, partem quam- dam respicientia, periammata seu suspensa medicamenta & venena, de quibus particulatim differere cogitamus.

Tertiz fa-
cultatis
medicamē-
torum lati-
tudo.In alimētis
qualitas in-
explicabilis
notatur.

Neque verò tantū ineffabilis quædam proprietate agnoscitur in medicamentis & venenis, quā illa medentur, hæc perimunt, & quosdam aliquando morbos expugnant, sed etiam in alimentis, quæ perennis effluuij iacturam resarciunt. Esculenta enim multa multi fastidiunt, alii appetunt auidissimè; Quæ licet primū dissimilia, post multas coctiones similia redduntur & naturæ nostræ familiaria, vnde magna inter nutriens & nutritum similitudo perhibetur, quam vix ullus possit definire, & quare hic potiùs hoc edulio, ille alio delectetur. Carnium & piscium esus vniuersæ gen- ti familiaris est: At plures nouimus, inquit Amatus Lusitanus, qui ab esu carniū in torum abhorrebant. Alios quibus caseus non so- lū comestus, sed odoratus pro veneno habebatur. Sed & alium no-

Curat.
36.
Cent. 2.Historiæ
notatu di-
gnæ.

uimus, natione Hispanum, qui nunquam pisces gustarat: At quum ab amico semel ad cœnam fuisset inuitatus, ouaque degustasset quibus siccati piscis puluis cautè fuerat admixtus, in animi angustias, cordis pressuras, cum vomitu & secessu incidit, ita vt propè exanimis defecerit. Vidit & idem author celebris Monachum Venetum, qui sine animi deliquio rosarum odorem non poterat perferre: Quod etiam obseruaui in nobili matrona, & Iul. Scaliger in Illustrissimo Cardinali, vt asserit in exercitationibus contra Cardanum, vbi meminit cuiusdam fœminæ spectatæ formæ & virtutis, cui Franciscana nomen erat, quæ ante 14. annum sualū nullo flecti potuit, vt carnibus vesceretur. Asserit & vnum ex liberis omnino brassicam auersatum, vt eum ipsum Cressones, & in ciuitate Mediolanensi familiam quamdam haustu cassiæ fistulæ interire: Peculiare enim suum cuique est, & multi vinum quasi venenum respuunt, Alij tanquam Deum colunt.

Vinum tanquam venenum multi auersantur.

In cæterorum animantium pabulo obseruatur adhuc illa inexplicabilis & occulta qualitas. Quis enim rationum momentis aperire posset, Cur Struthiocamelus ferrum habeat in deliciis? Cur ceruus serpentes, vrsus formicas, asinus ferulam quæ perimit equos? Quædam enim tantum piscatu, alia venatu, quædam granorum cultu, alia plantarum solo naturali prouentu viuunt. Optimè siquidem anas, ardea, fiber pisculis aluntur; accipiter, aquila, vulpes auiculis; gallina, perdix, equus cerere; Bos, dama, ceruus paruulis stirpibus integris, aut earum partibus tenellis. At cur illa potiùs illo quàm hoc alimento gaudeant & pinguescant, hæc potius hoc, quàm illo ratione non satis dilucida explicatur. Fame enim citiùs perit vultur, quàm triticum attingat; phasianus, quàm ex rapto pabulum quærat.

De facultate medicamentorum purgantium, vnde promanat, & quomodo agit.

CAPVT X.



MEDICAMENTORVM purgantium facultatis disquisitio multorum exercuit ingenium: in illa enim dignoscenda quot capita, tot ferè sensus. Chymiatři manifestam credunt, vt quæ à mixtorum sale suboritur, & sales omnes purgatorios mordicè asferunt. Alij prorsus abditam tenent, nec ratione euidenti explicabilem. Sunt qui à speciali mixtionis temperie oriri credunt; Alij veluti quintam qualitatem concedunt. Mesue illam deducit à cœlo, & cœlestem facultatem nominat. Medicamentum, inquit, purgans non est à temperamento tale, non vt contrarium agens in

Chymistarum opinio de purgatoria facultate

contrarium, non vt simile trahens simile, neque vt graue deorsum, aut leue sursum humorem exagitas, sed quia talem cœlitus sortitum est facultatem.

Est verò cœlestis ea facultas, forma cuiusque medicamento purgantis; Aut formæ ipsius proprietas, quæ nullo sensu, nullaque ratione manifesta deprehendi potest, sed sola experientia, & ex effectis, quæ substantiæ ipsius facultatem demonstrant.

Varia qualitas purgantium appellatio- nes

Appellatur autem ipsa cœlestis facultas à quibusdam medicis & philosophis, facultas occulta, aliquando proprietas rei totius, ali- *Fernel.*
quando intimum cuiusque rei principium, aliquando causa incogni- *Scalig.*
ta, virtus superelementaris, totius substantiæ proprietas, & à quibus-
dam quinta qualitas; Sicque diuersa rei eiusdem nomenclatura. Quia
tamen vis illa cathartica ex primæ notæ philosophis, à syderibus or-
tum ducit, non improprie cœlestem Mesue vocat: Sed malè putat hu-
mores educere, non tanquam simile trahens simile, contra veterum
decreta, rationem & experientiam. Hippocrates enim medicamen- *Lib. de*
tum purgans humoribus detrahendis esse simile sic docet. Pharma- *nat. hu-*
cum, inquit, cum corpus intrauerit, primò id quod omnium maximè *man.*
sibi secundum naturam cognatum, atque simile est in corpore trahit,
deinde reliqua ducit & purgat.

Id ipsum autem manifestissimè probat hac eleganti comparatio-
ne, quemadmodum semina & stirpes terram ingressa, sibi quæque
quod in terra idoneum est, ac naturale trahunt, vel acre, vel dulce, vel
amarum, vel salsum, vel quodcunque, primamque & plurimum quod
ipsis maximè secundum naturam est alliciunt.

Hoc pluribus ostendit Galenus lib. 1. de natural. facultat. & alibi *Ca. 23.*
verbis expressis scribēs, qualitatum quæ in substantiis sunt, proprie- *li. 3. de*
tate actiones perfici. Idcirco medicamentorum purgantium quæ- *simpli.*
dam, vbi fortè purgatione frustrantur, non modò corpori nullam *l. de*
noxam afferunt, sed etiam homini alimentum præbent; Alia verò in *Ther.*
corruptionem & venenum vertuntur; Non tamen perpetuò est per-
mixta vis venenosa. Quare non perpetuò licet non purget, incom-
modabit. Verùm coctionem accipiet, talemque producet humorem,
qualem trahere natum erat, quod nunquam contingit in medica-
mentis mochlicis, seu valentioribus.

Medicamenta igitur purgantia similitudine quadam substantiæ hu-
mores attrahunt & educunt: Eaque ratione magnes attrahit ferrum
& succinum paleam; Non autem ferrum magnetem, aut palea suc-
cinum. Licet enim magna sit similitudo inter magnetem & ferrum,
tamen simile non est idem, nec magnes est ferrum, nec ferrum ma-
gnes. Trahens autem esse debet validius tracto, propterea ferrum
non trahit, sed trahitur.

Obiectio. At verò cum tractio fiat propter substantiæ similitudinem, quare
Responsio. magnes magnetem, & ferrum ferrum non trahit? Respondeo vnā

& eandem rem seipsam non trahere, sed quod cum ea ipsa affinitatē quamdam habet & similitudinē, Sic agaricus pituitam attrahit, Rheū bilem, senna melancholiam, quod inter illa sit quædam affinis conditio, aut conuenientia magis, quàm similitudo. Illa autem conformitas nec planè manifesta est, longè siquidem rheum à bile distat, agaricus à phlegmate, à melancholico humore senna.

Licet autem omnia cathartica humores attrahant, eorum tamen quædam specialiùs dicuntur purgare attrahendo, quæ nempe sunt potentioris virtutis, & humorem habent excrementitium, inquit Mesue, vt Scammonium, Turbith, Euphorbium: Alia comprimendo, vt myrobalani omnes, & Rhabarbarum: Alia, quæ lubricando & leniendo aluum subducunt, vt Cassia fistula, Tamar Indi: Alia denique quæ tantum molliendo, vt atriplex, viola, vt malua, lapathum, vt multa olera.

Quæ purgant trahendo.
Quæ comprimendo.
Quæ lubricando.

De medicamentis quæ citra ventris solutionem, occulta proprietate morbos multos sanant.

CAPVT XI.

NNUMERA & mira sunt medicamenta simplicia, quæ per os sumpta, aut exterius tantum adhibita, cæca vi, ac specifica proprietate morbos futuros arcet, & factos perfectè sanant, aut mirabiles alios effectus proferunt, vt in paucis quibusdam supra demonstrauimus, & mox in quàm plurimis demonstrabimus. Illa autem abdita facultas non in plantis modò, verum etiam in animalibus & mineralibus cernitur. Nam literarum monumenta fidem faciunt pollicem Pirrhi lienosos solo tactu sanasse, & Christianissimus ac potētissimus Galliarum Rex solius manus attactu strumas ad perfectam reducit sanitatem.

Pollex Pirrhi quid præstiterit.

In corporibus quoque demortuis occulta & efficacissima illa qualitas cernitur. Os enim milui piscis aurum trahere author est Simplicius, cui assentitur Scaliger. Et renes Scincorum triti & cum vino poti, aut cum idonea conferua subacti & sumpti veretri tentiginem excitant & ad veneris ludibria potenter mouent.

Os aurum trahens.

Priapus cerui siccatus, in puluerem læuigatus, & cum aqua cardui aut tussilaginis sumptus, valde pleuriticos iuuat.

Idem efficit dens apri in scobem tenuem redactus & haustus, maxime in huius morbi principio.

Cornu monocerotis mirabiliter cor tuetur à venenis & pestilentibus morbis omnibus succurrit.

Effectus ferè similes experiuntur, qui cornu cerui & rhinocerotis sumunt. Bouis astragalus cum oxymelite potus lienem minuit.

*Senecta an.
guinum.*

Caro leporis vsta, trita, & pota calculos atterit & expellit.
Viperæ exuium pulueratum & impositum alopeciiis mirum in modum pilos regenerat. Idem pollicentur vsta murium capita partibus glabris ex melle illita.

Galerita seu alaunda cristata assata, vel elixa sæpe comesta colicis affectibus obnoxios, vel detentos efficacissimè iuuat. *Gal. li. de Theriac.*

Vngula capræ, aut eius vesica vel etiam ouilla cremata, & ex posca sumpta, medetur his qui noctu stragulas permingunt.

Hepar lupi hepaticos proprietate specifica iuuare scripsit Gal. *li. 8. de*

*Excrementa
animalium.*

Aspidis senecta puluerata ex melle illita visum facit acutissimum. *comp. med. local.*

Excrementa quoque animalium occulta proprietate morbos quosdam abigunt, vt stercus pauonum epilepsiam, stercus canum, vt etiã nidi hirundinum anginam.

Pauca hæc pro multis ex animalibus sumpta sufficiant, vt ea omit- tam quæ lædunt, vt leporem marinum & torpedinem. Hæc enim neruosum genus vi abdita afficiendo stuporem inducit, ille solos hominis pulmones lædit; vt etiam cantharides, quæ vesicam inflammatione tentant & vrinam sistunt, vel stranguriam mouent.

*Occulta
proprietas
stirpium.*

Hanc proprietatem occultam in multis stirpibus admiratione dignam obseruamus, Nam sarsaparilla, guaiacū, Sassafras & illa radix, quæ à Chyna nomen habet, speciali & occulta proprietate luem veneream perfectè curant.

Satyrium & eruca penem erigunt, venerem accendunt, & frequentiores congressus efficiunt.

Vitex, & nymphaea contra libidinis ardores mitigant, semen extinguunt, & testium accretionem impediunt.

Opium phreneticos & delirantes iuuat, & placidum somnum conciliat, etiã paruula quantitate sumptum.

Viscus quernus tritus & potus epilepsiam fœliciter curat.

Iusculum pauonis, vt refert Michael Seti insigni proprietate pleuriticis confert.

Vua passa familiaritate quadam substantiæ hepati benefacit.

Staphisagria vi non satis cognita pediculos enecat, vt conysa pulices.

Brassica ebrietati reluctatur, vt etiam hedera.

Ptarmica sternutationem mouet. Necnon elleborus vterque.

Dictamnnum facultate prorsus abdita spicula euellit.

Fraxinus serpentes fugat, & eorum venenis medetur.

Lithospermon, saxifraga, & sanguis hirci calculos expellunt.

Sabina menses & fœtum seu viuum seu mortuum educit.

Symphitum maius vulnera citò glutinat.

Veronica vlcera maligna corrigit, ad sanitatemque accelerat.

Therebinthina vulnerum est balsamum optimum, quæ facillimè & citissimè sanat.

Mirum est autem plantas quasdam quadam sui parte hunc effectum præstare, alia alium & sæpè diuersum vel etiam contrarium: Nam flores chamæmeli olfactu profunt capitis dolori, folia summè nocēt si Galeno fides non denegatur.

cap. 2. l.

2 comp.

med.

Lapathi folia ventrem subducunt, semen assumptum retinet.

Brassicæ decoctum aluum soluit, ipsa brassica comesta vel com-
primit, vel pigriorem reddit.

lib. de

Ther.

cap. 6.

Gallorum vetulorum ius ventrem quoque mouet, caro sistit.
Idem adhuc asserit Galenus de ostreis & cochleis marinis.

Lactis pars serosa ac butyrofa subducit ventrem caseosa cohibet,
ac siccatur.

Miraculo autem tribuit Galenus, quod trifolij cuiusdam hyacin-
tho similis decoctum morsibus phalangij aut vipere pro fotu adhibi-
tum, statim dolores sedet & virus adimat: Parti verò sanæ idem ad-
motum dolores similes his quos inuehit, excitat. Huius tamen ef-
fectus ratio non videtur valde obscura, nec à reliquarum stirpium
natura & conditione aliena. Mirum enim non est, si fots, cuius ope
pars inquinata liberata est, & ab ea venenum eductum, parti sanæ
adhibitus, eidem impressum, veneni cuius est particeps, relinquat
vestigium: sed valde mirum esset, si decoctum illius herbæ, quo nul-
la fuisset pars fota, parti sanæ adhibitus, eandem aranæ ac ferarum
modo afficere, vt putauit medicinæ princeps Gal. quod non dixit
Dioscorides, ex quo sumpsit Gal. quæ nimium præcipitanter scri-
psit, lib. de Theriaca. cap. 6.

ca. 106.

lib. 3.

De specifica & admiranda hydrargiri virtute ad luis Indicæ cura-
tionem, Deque aliorum mineralium virtutibus occultis, & ferè di-
uinis speciatim fusius libro tertio de materia medica disputabimus.

Non mi-
randa tri-
folij quali-
tas cum
Galeno. ca.
6. lib. de
Theriaz.

*De simplicibus medicamentis, quæ proprietate specifica.
partes quasdam respiciunt.*

CAP. XII.



MULTA simplicia certis partibus tanta amicitia con-
iunguntur, vt eas vel sumpta, vel admota, vel sæpe
solo odore iuuent, reficiant, & à morbis multis libe-
rent. Non tamen illa ob id ita particularibus mem-
bris deuota censeo, vt omnes earum affectus tol-
lant, aut alijs quoque partibus non conferant, sed
speciali dote, quædam hanc potius quàm illam partem respiciant &
tueantur, alia aliam.

Sic multa Cephalica dicuntur, quod tota sua substantia capiti sint
amica & conferentia, longa virorum doctorum experientia & vsu
sic comprobata, vt inter aromata, moschus, ambra, zibethum, ca-

Cephalica.

ryophilli, macis, calamus aromaticus, schœnantum, eaphura, & inter alia simplicia vulgatiore, bethonica, rosmarinus, salvia, maiorana melissa, stœchas, cneoron, mirthus, flores vetonicæ caryophyllatæ & arantiorum.

ὀφθαλμικά

Ophthalmica sunt euphrasia, chelidonium, fœniculum, ruta, & horminum, cuius grana oculis imposita nullum molestiæ sensum adferunt. Facile enim sub palprebris continentur, & oculos à for-
dibus purgant.

ὀδοντικά

Odontica quædam dicuntur, quæ dentes roborant & nitidiores reddunt, vt lentiscus, salvia, mirtus, laurus.

Pulmonibus dulcia omnia conueniunt, sed peculiari facultate herba quædam pulmonaria dicta ad illorum affectus commendatur.

Πυλμονικά

Pulmo vulpis si hominis pulmoni conferat, vt veterum multi cre-
diderunt, id propter familiaritatem substantiæ contingit.

Passæ, strobili, pistacia, dactyli, iuiubæ, mel benefaciunt quidē pul-
monibus, sed tantum dulcedine, iris, hyssopus, & prassiū attenuatione.

Καρδιακά

Cardiaca sunt aurum, argentum, lapides pretiosi, cinnamomum, & alia aromata suaueolentia. Item & borrago, buglossum, carduus benedictus, scabiosa, vlmaria, oxytriphylum, viola, rosa, crocus.

Στομαχικά

Quæ stomachum respiciunt stomachica dicta, sunt nux moschata, mastiche, absinthium, mentha & anethum, hæc enim proprietate particulari illi profunt. Alia quoque penè innumera benefaciunt qui-
dem, sed potius calore, quàm speciali virtute, vt piperis genera, zin-
ziber, synapi, vinum.

Ηπατικά

Hepati familiaria sunt hepatica quædam dicta, vt agrimonium, cichorium, fumaria, rhabarbarum.

Σπληνικά

Splenica sunt ceterach, hemionitis, capparis, tamariscus, epithy-
mus, vt & alia multa, quæ causa breuitatis omitto.

Νευράλια

Nervos proprietate roborant salvia rosmarinus & primula veris, Articulos & hæc, & hamæpithis.

Quæ speciatim singulas partes respiciunt huc nolo reducere, cum his lector etiam morosus facile contentus esse poterit. Granū enim salis ei sat esse potest, qui ipsius saporem voluerit dignoscere.

*De periammatis, seu Amuletis, quæ gestata, vel appensa
mirâ & cecâ virtute morbos multos curant.*

C A P. XIII.

*Amulato-
rum duo
genera.*



D medicamenta quæ abdita facultate quasdam ægri-
tudines solvunt pertinent, quæ periammata, periapta
& amuleta hoc est, alligata & suspensa remedia vo-
cantur. Ea autem duum sunt generum, Alia enim so-
lis characteribus figuris & verbis constant, Alia sim-
plicibus collo aut alteri membro subnexas. Priora
tanquam infida, ridicula incertaque viri aspernantur medici, De his
enim

enim nec loquitur Physicus, nec Metaphysicus, nisi spiritu nequitiae deceptus ad Metaphysicam vetitam, seu Goëtiā aut Necromantiam illa referat. At Medicus & Philosophus est moralis, qui Deum Medicus timens, ac probitate clarus artibus illicitis ignaros & credulos non quis. decipit; & naturalis, qui rerum omnium causas perquirat: Scire enim est rem per causam cognoscere, & foelix rerum qui poterit cognoscere causas. Vnde Galenus, Medicina fit non morbo, sed causa Scire quid morbificā, qua sublata tollitur effectus. At periammata nec causam, nec morbum tollunt, neque symptoma, vt falso sibi persuadent hi quibus fuerunt appensa, eorū suāsu decepti qui Dæmones colunt & inuocant, atque eorum virtute omnia fieri sine alia causa putant; de quibus, horumque similibus nequissimis viris sic ait Poeta.

*Gens inuisa diis maculandi callida cæli,
Quæ nunc stare polos & fulmina mittere nouit,
Æthera sub terras adigit, montesque renellit.*

Quod de sagis seu incantatricibus Thessalicis affirmat Aristophanes, quæ carminibus incredibilia, imo impossibilia præstare pollicebantur, Nam

*Ille carminibus promittunt soluere montes,
Quas cupiant alyis diras immittere curas,
Sistere aquas fluuiis, & vertere sydera cæli.*

Duobus autem modis id præstant, Nam alij malos Dæmones virtute quadam maximè diuinorum nominum aduocant & cogunt, Magi. quippe cū omnis creatura timet & reueretur nomen illius qui fecit eam: Alij pessimis istis viris nequiores se dæmonibus submitunt, dæmonico-
læ. illis sacrificant & cultum quemdam reddunt.

Cur verò illi Goëtici solis vtantur Cacodæmonibus, ea ratio in promptu est, quia boni angeli difficilè comparent quia Dei iussu expectant, nec nisi mundis corde, & vita sanctis hominibus congregiuntur. Mali autem faciles se exhibent, ad inuocandum, falso Dæmonum
fraus. fauentes & diuinitatem mentientes, semper præstò sunt, vt astu suo decipiant, vt venerentur, vt adorentur.

Ex horum dæmonicolarum taberna profluxerunt omnes isti tenebrarum libri, quos improbatæ lectionis Vlpian. Iuriscons. vocat, Libri tene-
brarum. protinusque comburendos esse statuit; Cuiusmodi primus excogitasse dicitur Zabulus quidam illicitis & nefariis artibus deditus; Deinde Barnabas quidam Cyprius, & nostris temporibus Cornelius Agrippa, atque alij multo damnati viri, inter quos Paracelsus circulatorum princeps & diuini numinis desertor primas sibi vendicauit.

At verò cū ex huiusmodi virorum sceleratorum officina characteres & verba suspensa prodierint, nullis rationibus stabilita & humano generi pestifera, non solum medici, sed omnes Deicolæ debēt aspernari.

Fernelius tamen summus & Medicus & Philosophus, atque inter

clarissimos maximus, magnam vim verbis & omnibus amuletis concedit. Et certè si Hebræos virtutis & omnium disciplinarum optimos authores sequi velimus, maiorem in verbis, quam rebus naturalibus vim inueniemus. Quicquid enim, aiunt, est in mente, in voce, in verbo, in oratione, totum hoc in scriptura est, cuius literæ mysteriorum cœlestium plenissimæ sunt, ac in syderum positionem exarata: Vnde rerum altissimus creator seipsum nomine duarum literarum A & Ω vocare voluit.

Mechubales erant doctores Cabalisticæ. Præterea secretiores Hebræorum Mechubales ex literarum figura & simplicitate, compositione, tortuositate, defectu, abundantia, coronatione, apertura, ordine, transmutatione, colligantia & revolutione literarum, punctorum & apicum omnia explicare promittunt. Literis enim magna virtus est à Deo data, Nam viuunt propter verba, verba propter Deum, qui solo verbo omnia creauit. Dixit enim & facta sunt. Fœlicem literarum figuram expertus est M. Seruilianus Notianus Senator ad morbos oculorum, quibus erat obnoxius, dum in collo gestaret chartam appensam in qua erant scripta P. & A. Seu enim medicamentum, seu verbum, seu litera sanet, semper Deus est huius effectus author.

Figuræ quid valēt. Post Hebræos Pithagorei & Platonici maximam vim figuris, characteribus & verbis dederunt; figuræ siquidem Mathematicæ non videntur inanes, inquirunt, imò Physicis sæpius efficaciores, quòd vis influat cœlestis ac diuina in debitè paratos characteres. Nulla autem virtus aut in cœlo, aut in terra, quæ à Deo non descenderit. Descendit vero in subiectum capax & idoneum, quale est, quod arte debita præparatum est, & in conueniente figura exornatum, vt cum imago vrsi in Amethysto sculpta vim habere notatur Dæmones fugandi & homines ab ebrietate præseruandi.

Et ranæ figura in Berillo formata virtutem habeat inimicos conciliandi & homines discordes illius attractu amicos faciat. Eadem virtus agnoscitur in figura Arietis cū medietate bouis in aliqua gēma sculpta & annulo argenteo alligata: Nā quoscūque tetigerit, cōcordes facit.

Nolo gemmarum signaturas vltius persequi, tum quod innumeræ recenseantur ab authoribus fide dignis, tum quod virtus illa gemmis potius quam signaturis aliquibus tribuatur.

Characterū eximia virtus. Characteres igitur & figuræ egregias & inexplicabiles vires habent, quas qui negat, seipsum quoque sapere neget, in his maximè rebus quas mente complecti nequit. Smaragdum mortui Domini digitis quibus fuit gestatus obsilire quidam pro comperto tenent, incomperta tamen ratione, an ideo vanum aut magicum?

De verborum virtute multi certāt, verū experientia docuit illa eximios effectus præstare ad morborum profligationē: hancque curā di rationē non omisit Tralianus: Ad podagrā curandam, effodito ante solis occasum, cū Luna est in Aquario, aut piscibus, altercum *Circa finem lib. II.*

herbam, dicasque, *Adiuro te herba sacra, per sancta nomina Iaoth, Sabacth Adonai, Eloi,, Deus qui terram formauit, & fecit mare fluuiis abundans fluentibus, & qui exsiccauit uxorem Loth in statnam salinariam. Adiuro (inquam) te vt sistas fluxionem pedum.*

Ad dentium dolorem sedandum quatuor hæc verba, ridicula scribuntur, *Galbas, galba, Galdes, galda & collo appenduntur.*

Ad fluxum sanguinis sistendū, quidam hæc obmurmurant, *charat, cara, sarite, confirma, consona, imaholite.*

Ad canis rabidi morsum, pani comedendo hæc verba à quibusdam inscribuntur. *Irioni, Rhiciori, Eslera, Huder, Fare, vel pomi frustulo, Hax, Pax, Max, Drus, Adimax,* deinde voratur.

Vulgare nimis est illud Quint. Sareni Samonici aduersus hemitriteum *Abracadabra*, quod ita depingitur, vt in conum ad extremam vsque literam desinat, sicque collo alligatur.

Lamella aurea in qua voces hæ sculptæ sint, *opwa, spwde* collo subnecta lippientem sanat, ex Marcello.

Profluentem sanguinem, vt sistas, digito annulari partem tangas, at decies septies dicas, & quoties volueris repetes, donec fluorem peruincas, Socnon, Socnon, mirè prodest.

Ad paronichiam, digito parietem continges, inquit Marcellus, & rursus digitum ducens, dices ter, *Pu, pu, pu, nunquam ego videam per parietem repere.*

Ineptè sic mederi suadet Lippitudini Marcellus. De manu sinistra inquit muscam capies, & dum capies, dicere debebis, nomen eius cui remedium factururus es, te ad curandos oculos eius muscam prendere: Tum viuam eam ligabis in linteo, & suspendes collo dolentis nec retrò respicies.

Atalus asserit, si quis viso Scorpione dicat, *Bud.* ita eum cohiberi & quasi fascinari, vt nocere non queat.

Vltimo de re rustic. Varro aduersus coxendicem hæc verba proferebat, *Sista, pista, rista, xista.* Et in Odontalgia graui ter referebat. *Anasages, Anasages, Anasages.*

Ad scrophularum curationem, dum affectæ parti à nuda virgine aliqua herba admouetur, hæc enuntiantur verba, *Negat Apollo pestem crescere, quam nuda virgo restringat.*

Cato monumentis reliquit luxata membra verbis his restitui, *Danata, Daries, Dardaries, Astararies.*

Theophrastus Ischiadicis verba auxiliari credit, vt Marc. Varro podagricis.

Tacit. lib. 4. annal. Congressum verò venereum verbis impeditum experientia quotidie docet, Et Namantina vxor Syluani accusata est maritum verbis maleficiatum, & vecordem reddidisse.

Amasis rex carminibus ita frigidus euasit, vt aliquo tempore *Ladicem* uxorem subire non potuerit.

Idem scribitur de Theodorico rege, qui verbis magicis à suis pellicibus ita vietus & frigidus factus est, vt cum Hermenberga vxore primis matrimonij diebus res venereas exercere minimè valuerit.

Sanguinem sisti credit Cardanus vndecumque fluentem his verbis ter prolatis, *sanguis mane in te, sicut Christus fecit in se, sanguis mane in tua vena, sicut Christus in sua pœna: sanguis mane fixus, sicut Christus fuit crucifixus*

Sæpe obmurmurata & verbis quibusdam insusurratis, vt scribit Marcellus, sordiculæ oculum ingressæ & hordeoli eruuntur: Itemque si quid faucibus inhæserit, necantur quoque lumbrici, Odonalgia sedatur, tauri furiosissimi mitescunt, & à latratu canes desistunt.

Hæc cum promulgarit clarissimus Laurentius, non puduit recensere. Multi carminibus Homeri maximam inesse vim existimant, quibus potiores ebrios fieri non posse putant, si primis poculis certum illius metrum proferant. Cap. 6.
lib. 1. de
cura-
strum.

Asserunt nonnulli partum difficilem & periculosum facilem fieri & securum, adhibitis quibusdam, vbi in parturientis aurem prolata fuerint hæc verba, *su Cimy due*, quæ apud Picardos idem sonant ac, *Res hæc mihi durat.*

Quidam a febre prorsus liberatus est ex Amuleto, cui hæc erant inscripta.

Sancti Petre & Paule stultum hunc persanate.

Ridiculum
amuleti.

Quamplurima farinæ similis leguntur apud Mercurium, Marcellum, Tralianum, Albertum Villanouanum, & inter recentiores apud Fernelium, qui omnes grauissimi viri verbis tantam vim inesse pronuntiant, vt penè omnem naturam subuertere credant. Apuleius si quidem vir perdoctus asserit magico susurramine amnes agiles reuerri, mare pigrum colligari, ventos inanimos expirari, solem inhiberi, stellas auelli, diem tolli, noctem teneri, de quibus sic ait Poëta.

Carminibus vel cælo possunt deducere Lunam,

Ouid.

Carminibus Circe socios mutauit Pylis.

Cum volui, ripis ipsis mirantibus, amnes

Lucanus.

In fontes rediere suos, concussa que sisto.

Cessauere vices rerum, dilata que longa

Hæsit nocte dies, audito carmine mundus.

Historia
notanda.

Vis autem verborum maximè patet in morborum profligatione: Illa enim prolata, vel inscripta ac gesta multos affectus mira celeritate soluunt. Quod medici cuiusdam talia demirantis non parum exercuit ingenium, vt refert Pomponatius: quum enim duorum puerorum curam suscepisset, quorum alter morbo veluti Erysypelate laboraret, alter vero in ignem incideret, quidam superuenit, qui hos pueros solis verbis & carminibus liberauit. Additque alium fuisse, cui ferrum infixum erat, quod nulla medicorū poterat ope euelli, ab

codem tamen eadem curandi methodo euulsū.

In oppidis fere singulis quædam anus reperiuntur, quæ verbis aliquot nulli hominum notis, matricem releuant, sic enim loquuntur; hocque in viris etiam pollicentur imo præstitisse asserunt, licet matricem non habeant.

Vix possum omittere & mirari vix vnquam credibilem vnguenti armarij virtutem, quo sanatur fauciatus aliquis, cultello, à quo fuit læsus, vnguento dicto solum delibuto. Hoc si verum est, vt perdocti quidam viri testantur, ad verborum iussuū, quàm medicamenti quocumque modo parati facultatem eiusmodi curatio referri debet. Insolita namque remedia, nec arte præparata, sine susurro, superstitione, prece aut carmine inefficacia sunt sæpè, vnde Poëta.

Vnguentū
armarium.

Miscueruntque herbas & non innoxia verba.

Nihil vero æquè cachinū mouit atq; ridiculū & infœlix hoc Amuletū, quo fœliciter impium quemdam virum, circulator, cui erat notus, sanauit, his verbis collo subnexis, *Rapiat eum diabolus & similes eius.*

Impium A-
muletum.

Hæc autem ægrè refero, non solum vt anilia & nugatoria, sed nefanda & impia, quibus humani generis infensissimus hostis ignarissimum vulgus fallit.

Plura nolo periammata similia recensere ridicula & inepta quibus nullus vnquam perfectè conualuit. Iphis enim suspensis, aut verbis quibus constant prolatis, si quis forsan meliùs se habere fateatur, id accidit magis quadam opinione, quam illorum virtute. Verbis siquidem nulla vis agendi, nihilque per se possunt sed quatenus sunt notæ rerum, quas signant, aut ratione proferentis à quo sunt excogitata. Verba autem quibus vtuntur circulator, vt plurimum sunt incognita, nihilque significant, aut per se possunt, aut præstant, nisi Dæmonis interuentu, qui vt aniculas & ignaros decipiat, atque in signū confœderationis, quàm cum ipsis habere cupit, ista verba seminauit. Quibus, vt semine nequam, eos primùm inescare tentat, quos tandè in sua retia conijcere intendit.

Qua ratio-
ne verba a-
gant.

At verò diuini numinis cultores egrè ferunt sic imperitos & nimis credulos fascinari, vt verbis, susurro, aut similibus Cacodæmonum, technis se sacros credant, reprehendunturque à Theologis & omnibus viris pietate & virtute claris; Nam Rabi Moses, vt refert Laurentius, mendaces & stultos esse dicit, qui verbis solis & vocibus aëre fracto natis tantam vim tribuunt: Et rudis antiquitas, ait Seneca, credebatur cantibus imbres attrahi & repelli, quorum nihil posse fieri tam est palam, vt huius rei causa nullius Philosophi schola sit adeunda: vnde Athenis lege cautum fuit, ne quis verbis mederetur. Cuius æquifimæ sanctionis rigorem experta est mulier quædam in Achaia, quæ quòd verbis mederetur lapidibus fuit obruta.

Mulier la-
pidata cur.

Simili pœna digni sunt omnes similis culpæ rei, & qui barbaris vocibus aut alio quocumque modo tacitum fœdus cum Dæmoni

bus etiam nescientes contrahunt, vt Medicos agant, aut aliquid miri faciant, quo gloriam aut pecuniam aut vtrumque consequantur.

Historia
notanda.

Eos autem pœna mulctandos statuebat Anton. Caracella imperator, qui ad tertianas & quartanas febres sanandas Amuleta gestabant. Idem fuit Periclis de iisdem remedijs iudicium, qui, vt refert Plutarchus, à morbo conualefcens ab inimicis interrogatus est, quàm grauitè ægrotasset? Ispertiapta ab Agirtis collo alligata demonstans, dixit: Ex his conijcere valetis quàm crudeliter & corpore & animo laborarim, qui ridiculas eiusmodi quisquiliæ admiserim. Ego verò cum Pericle sentio ista amuleta ridicula prorsus esse nec vllam agendi vim habere, sed his veluti signis malos Spiritus alligi, aut cogi ad agendum, ob fœdus cum improbis magis aut superstitionis aniculis tacitè vel expressè contractum.

De cantu &
sono.

De cantu ac musica multa quoque afferuntur non modo ad morborum curationes, sed alios quoque mirandos effectus consequendos. Nam oues vtrius aut fistulæ cantu delectantur, & auidius herbulas pascunt. Aues sonorum illecebris capiuntur, Cameli oneribus grauati Doctorum Lenocinio leuantur: Sonore & amœnæ voces Elephantos demulcent: Ischiadicorum dolores modulis lenibus minuuntur. Thales Cretensis Maniacos & Freneticos cantu sanabat, Asclepiades non solum deliros, sed aliis morbis multis correptos musica leuabat. Saûlem Regem ira percitum & furem citihara Dauid mulcebat. A Tarantula seu Phalangio quodam ex Araneorum genere ieti non nisi instrumenti musici sono securè & cito sanantur. Arion, Orpheus & alij multi citharoedi mira fecisse dicuntur fistula, Lyra, Modulis, voce, sono, cantu. Vnde Poëta dignus venia, dum in hæc verba prorumpit.

Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.

Atque satas alio vidi traducere menses.

Sagæ autem & aliæ aniculæ quæ eiusmodi cantibus, vt fiant mentis compotes, vtruntur, incantatrices dicuntur, quarum famulatio subdoli spiritus, seu Cacodæmones ad maleficia plâtis & animalibus inferenda delectantur: Vineas enim & segetes incantasse nonnumquam experientia monstrauit.

Cantus tri-
plex.

Ne vero Lectorem diutius morer, dico triplicem cantus differentiam assignari: Alius enim est diuinus vt Psalmistæ, qui citharâ laudabat Dominum, & illi cantabat canticum nouum. Alius Poëticus & fabulosus vt Orphei quo montes moti & saxa flexa dicuntur. Quid tamen per montes & saxa poëtæ velint & per citharædorum cantus & similes fabulas, nec me latet, nec fusiùs explicare libet. Est & tertius magicus seu illusorius, quo filius tenebrarum idiotas & ignarissimos decipit, atque in sui cultum & obsequium adducit: Ne verò de Dæmonum ac magorum technis tam diffusa ac

prolixa lectio lectori tedium pariat, aliam affinem sed magis certam
& rationibus Physicis stabilitam subnectamus.

De Periaptis Physicis.

CAP. XIII.



VLLAM vim characteribus & figuris tribuendam, exiguam cātibus & sonis, magnam physicis periam-
matis ratio docet. Hæc namque medicamentis sim-
plicibus constant, quæ miranda proprietate quas-
dam partes respiciunt, sanant & tuentur, non modo
sumpta sed admota, & quod mirum magis, solùm

In mixtis
quid agnos-
cendum.

gestata aut appensa, vel alligata virtute cæca ac prorsus inexplicabili
futuras ægitudines arcent, & præsentis curant. Crassius namque
philosophantur qui in simplicibus nihil præter odorem, saporem, &
colorem vident, aut comminiscuntur; Nam cælestium cum elemen-
taribus conspiratio præter qualitates sensuales elementis tributas,
alias cælestes & abditas à cælo deriuatas naturæ arcanorum inda-
gatores agnoscunt, quæ stupendos effectus præstant, & quasi mira-
culo morbos indomitos vincunt.

Hanc vim cœlestem agnorunt prioris sæculi patres, nuperi elu-
cidarunt & experientijs pluribus fecerunt notissimam. Ea namque
constat radicem præniæ collo appensam morbum sanare caducum.

Idem præstat viscus quercinus: vt etiam alces vngula tantum an-

Ca. 32. nulo inclusa. Stercus lupi ad ilia gestum instar Amuleti, inquit Aër.
ret. 3. colicos dolores sedat. Similis effectus tribuitur ipsius intestinjs sicca-
ser. 4. tis & ventri superpositis.

Radices acetosæ & arnoglossi suspensæ strumas discutiunt. Ossi-
culum de poplite leporis admotum nephritidi & spasmo à flatu au-
xiliari dicitur. Cor corui gestum somnium impedit. Qui gesta-
bit pedes & chelidas anteriores cancri, aprorum incursum vitabit.

*Demo-
crit. in
Geopo.*

Moly herba à Circes insidijs Vlysssem liberauit.

Nec præter rem est Icteri miranda curatio, quæ tum accidit ægro
si ipse hanc auem quam Holerius Gulbulam, Galli Lorientum vocat
attentè conspexerit. Est & mirum auem egrè conspectum Ictერი
perferre, perinde ac si malum ex hoc in illam abiret. Hydropiper seu
perficaria maculata dextra manu detenta hæmorrhagiam sistit, herba
quam canis perminxerit auulsa luxatis celerrimè mederi creditur.
Hyosciami radix appensa collo conceptum impedit: femori gra-
uidæ alligata, partum accelerat & facilem reddit. Radix cynoglossi
circa collum adhibita, linguæ nigredinem, quam vulgus imperitè
cancrum nominat, delet. Æthiopis herba, si verè scribunt Democri-
tus & Theophrastus attractu solo seras omnes aperit. Et furem Vene-
tijs suspèdio damnatū, qui hac herba fores aperiret Mathiolus asserit.

Icteri mirā-
da curatio.

Æthiopis
herbæ mira-
virtus.

Lunariæ herbæ contactu etiam celeri, celeriter ferreæ equorum

soleæ euelluntur. Dictamnus adhibitus incredibili proprietate spicula trahit. Hoc cerui docuerunt.

Hydrargirus gestatus à morbis pestilentibus tuetur.

Scilla ad ianuæ limen appensa medicamenti mali noxam tollit. *Diosco.*
Hypericum & artemisia dum manu gestantur, nocentes feras & daemones fugant & à maleficijs defendunt.

Bethonica gestata hominem custodit, & noctu ambulantes à maleficijs adhuc tuetur, vt ex Ant. Musa refert Laurent. Ruta Siluestris capiti circumuallata tutum à fascino reddit. Idem efficit flos caryophyllus, vt & alij flores innumeri.

De Amule-
tis ex mine-
ralibus.
Ex mineralibus quoque periammata efficacissimæ virtutis parantur, quæ solo contactu miros effectus edunt, vt lapis Æthites, qui inter mammas, aut ventriculo alligatus fœtum retinet, femori vero adnexus, præcipitat.

Selenitis inclusus annulo nudæ cutis attactu sanguinem è parte quauis manantem sistit.

Smaragdus collo suspensus ab epilepsia liberat, & gestantis castitate conseruatur. Aleætorius contra, gestantem reddit ad venerem magis pronum & aptum, atque gratiosum & audacem.

Iaspis quadam proprietate auxiliatur stomacho seu ori ventriculi dum appenditur, vt scribit Aët. Sardonius lapis appensus & alligatus ventri fœtum retinet & abortum impedit. Turchesius equites à casu tutos reddit, aut cadentes à læsione tuetur; huncque qui gestarit fessore equitatione vix fatigatur. Heraclius lapis, magnes vulgò, præter miram vim, qua pollet ad trahendum ferrum, manu tantum detentus Chiragricorum & Podagricorum dolores leuat. *Ca. 35. ret. 1. ser. 2.*

Hystericus lapis.

Lapis quidam nunc Lutetiæ visitur ab India delatus, qui solo contactu strangulatus hystericos sanat, hystericus ob id dictus. Hæmatites sanguinem sistit gestatus. Idem facit Corallus, necnon Carabe, seu Succinum.

Nephriticus lapis.

Est & lapis Nephriticus ex Iaspidum genere virescens, qui nephriticis dolores sedat & arenulas deturbat dolenti reni superpositus. Sarda gemma nobilis gestata cor recreat, somnia tristia pellit, timorem aufert & hæmorrhagiam compescit.

Nolo plura quæ de gemmis traduntur amuleta, hoc est, miracula recensere, quæ licet aliquando pisi magnitudinem vix superent, diuinos prope dixerim, effectus edunt. Quod Galeni iudicio confirmari potest, qui res quasdam parue molis tactu solo maximas alterationes inducere scribit: exemplo est remora pisciculus, qui nauim vento, velis & ramis agitatam sistit. Item & torpedo, quæ decepta hamo funis extremitati adacto, piscatoris manum, virgam cui fuerat alligatus funiculus, tenentem, paraliticam reddit; transmissa narcotita vi à pisce ad hamum, ab hamo ad funem à fune ad conthû, seu virgam longiorem, ab hac ad piscatorem. *Cap. 5. li. 6. de loc. affect.*

Amuletorum

Amuletorum tamen vulgarium, quibus aniculæ & circulatores vtuntur, ratio valde dissimilis est, vt quæ ludicra sint, ridicula, inania, falsa & impia, vt quæ nihil præstent physica virtute, sed tantum auspiciis & auxilio Dæmonū, quorum versutiis in cauti decepti leuiter credunt, libenter obsequuntur, & imprudenter magica remedia sumunt, quibus falsò se sanatos imaginantur. Vix siquidem dici potest quanta sit remedij huius energia quod æger multum expetit, aut magni facit aut efficacissimum opinatur. Hinc accidit imaginationem saepe miranda præstare, vt quæ non modo vim habeat in proprium corpus, sed alienum; Hoc manifestè patet in grauidis, in quarum fonte tenello adhuc in vtero stabulante excogitatæ rei imago pingitur & simulachrum refertur, relinquiturque: Exempla qui requirit, ostendi solem postulat ille sibi.

Imaginat
tionis vis.

Sæpius autem adsunt maligni Spiritus his qui verbis, susurris, carminibus & amuletis: ad morborum expulsionem vtuntur, quibus virtutem (si quam habeant) concedunt quidem, non tam vt profint quàm vt cautè plebeculam decipiant. Nihil enim boni fecisse Cæcodæmones certum est, licet sub specie boni multos imprudentes & incautos circumueniant, veluti cum eos docent Necromantiam, Magiam vetitam, artem fascinandi, & medicinam nefariam, qua & morbos curare & alia multa facere contendunt, quæ nullo pacto queunt effici per naturalia media aut causas physicas.

Lapis dolitas cum ad alia plurima tū ad rigores qui per circuitus reuertuntur & præsertim ad quotidianas facit si corpori alligatur.

Aliud ad eosdem vsus à Traliano probatus fœliciter appensum in folium oleæ ex communi atramento inscribit.

Ca. Roi. capito autem inquit, folium oleæ ante solis occasum & collo suspendito.

Aliud naturale ad quotidianas animalculum quod desiderat & texit, vt muscas venetur benè facit, si linteo illigatur, & sinistro brachio appendatur. Alex. Tral. cap. 7. lib. 12.

Lapis Lazuli suspensus tremores infantium remouet. Serap.

De Venenis. CAP. XV.



CCVLTA quoque qualitas venenis inest, de quibus physiologi ac rerum naturalium indagatores aliquando loquuntur, item & scelerati venefici; illi vt omnipotentis nature prudentiam & sagacitatem in bonis simul & perniciosis rebus agnoscant, & ornatum mundi contemplantur, hi peste peiores, & humani generis hostes perniciosissimi, vt singulos quorum vitam, ac fortunas molestè ferunt, exaniment, atque ex rerum natura tollant. Miro siquidem artificio saporem, odorem, coloremque venenorum

adulterare solent, quæ adeo astutè cibis & medicamentis recondunt, vt etiam prudentes & cautos decipiant, & pro pane lapidem, pro pisce serpentem, pro saccharo sublimatum porrigunt: Sicque boni à malis non tam possunt esse tuti, quàm omnes homines ab omnibus serpentibus & aliis belluis.

De illis verò loquitur Medicus, vt Logicus de Sophismate & fallacijs, quas docet aduertere & auertere, Theologus de vitijs, quæ monet fugere: Nec mala suadet, vt inde bona contingant: in quo sanè discrepat à Medico, qui nefarios quidem veneficos damnat, de venenis tamen loquitur, quatenus in corporibus nostris vel generantur, vel mala sorte ingeruntur, vel ad malignorum morborum curationem expetuntur, alioquin eorum tractatio perniciofa: & re vera eos damnat Galenus, qui venenorum compositionem tradiderunt, vt Horum Mendesium, Aratum, Heliodorum Atheniensem, & Orpheum. Ca. 42. li. 2. de antid.

Improban-
tur qui ve-
nena com-
ponunt.

De simplicibus autem venenatis liberè scribit, vt ante hunc Dioscorides, & post vtrumque Nicander, vt dignoscantur, vitentur, & in quibusdam morbis fœliciter à docto medico vsurpentur. Ad carnem enim vlcerum cadauerosam arrhenicum aliquando adhibetur; Oleum viperarum ad luis Indicæ stigmata, pustulas & duritates gummosas: Oleum scorpionum ad ipsorum ictus; pilus canis rabidi ad vulnus ex ipsius demorsu inflictum: Trochisci de vipera intus & extra ad venenatos quosuis affectus.

Venena in
corpore
hominis in-
terdum ge-
nita.

In corpus verò non solùm ingeruntur, sed aliquando generantur, ex Galeno, similesque producunt & affectus & effectus his, qui pernicioso epoto veneno contingunt. Nam pestis venenum est, quæ interdum sponte sine causa manifesta in corpore generatur, atque in mulieribus hystericis retetum semen venenatæ qualitatis est particeps. Et canes per ætatem feruidissimam facilè rabie percelluntur. Hæc autem medicis præscienda sunt, vt sanitatem ab omni labe tueantur, & morbos quosuis profligent. Cap. 5. lib. 6. loc. aff.

Venena ali-
quando nu-
trunt.

Et si autem venena deleteria sint, consuetudine tamen, quod valde mirum, alimenta fiunt. Notã enim historiã puto, de puella quadam, cuius Auicenna, Ruffus & Gentilis meminerunt, quæ à primis annis veneno solo educata, halitum pestiferum, & proximè astantibus deleterium inspiraret.

Historia.

Alia Agripinæ vixit, referente Alberto, quæ araneas in deliciis haberet, cum tamen paucò vino epoto in quo suffocata sit aranea multi perire possint.

Rex angui-
uor.

Porus quidam Indorum rex serpentibus & venenis quotidie vescabatur, hocque alimenti genere diutissimè alitus, adeo venenosus factus est, vt cæteros homines vel tactu, vel halitu, vel sreatu perinde ac serpentes alij, perimeret.

In Hellesponto genus est quoddam hominum, qui venenis solum aluntur Ophiogenes propterea dicti.

Ophiogenes.

Marfi & Psilli simili victu delectabantur, nec serpentum morsus & venena reformidabant. Cuius rei certum dedit experimentum vnus ex ista familia Exagon vocatus, qui Consulum Roman. iussu in dolum serpentibus plenum iniectus, intactus euasit.

Plin. c. 29. l. 6. Athenagoras Argius dicitur à scorpionibus nunquam ledi potuisse, vt neque Æthiopes Hydaspidis fluuij incolæ.

Lib. 3. simpl. ca. 17. Refert Galenus anum quandam Atheniensē innoxie magnā sepe cicutæ quantitatem esitasse. Idem narrat Sex. Empiric. de alia vetula.

Alia historia.

De Liside ferūt historia, quod opij vnciā dimidiā sine sanitatis iactura vorabat. Vidi mulierem Nemoxii, quæ quotidie semidracmam fumeret.

Familia quædam in Creta solo aspectu fascinabat, & pueros in tabem deducebat. Quid plura? venenis assueti ab his tandem sunt immunes.

Desumuntur porrò omnia venena vel à plantis, vel animalibus, vel mineralibus. A plantis, vt à papauerum genere, ab hyosciamo & mandragora, quorum licet qualitas perhibeatur venenata, vsus tamen quotidie fœliciter ad morborum curationem celebratur. Et quæ hominibus ac belluis præsentissimum sunt aliquando venenum, si ritè tractentur & dentur, sæpè securum sunt auxilium.

A quibus venena sumuntur.

Aconitum pharmacum quidem toxicum est, oculorum tamen medicamentis leuandi doloris gratia adiicitur. Et cicuta sacros ignes & vlcera serpentia illitu restinguit.

Venenæ sūt sæpè medicamenta.

Nerium quoque contra serpentium morsus præsidium est è vino potum. Sedum maius Erysypelata & herpetas extinguit. Solanum omne adhibitum dolores quosuis mitigat.

At hæc omnia venena sunt Dioscoridi, vt etiam ranunculus, esula, hermodactylus, quorum vt quotidianus, sic saluberrimus est vsus. Præterea Napellus, herba Paris, taxus, stibium, & alia pleræque sunt & medicamenta, & venena; interficiunt namque & medentur.

Fungi verò non quidem medicamenta sunt, sed aliquando alimenta, aliquando venena, horum enim esu ingenui quinque adolescentes Lutetiæ literis operam dantes interierunt; Aulici tamen talium eduliorum auidissimi sunt liguritores.

Alias stirpes venenatas quæ Medicis vsibus quotidie fœliciter inferuiunt, nolo recensere, cum pauca quædam attigisse sufficiat; Omnia siquidem hoc capite complecti nec opus, nec facile est.

Ex animalibus autem venenatis quotidie medicamenta parantur. Nam caro Scincorum pigrioribus maritis ad ciendum libidinis æstrum sæpe datur.

Ex animalibus venenatis medicamenta sumpta.

Viperæ Elephantis & venenatis affectibus detentis quasi miracu-

lo profunt. Item & Colubri, quorum, vt decet, apparata caro multa ad venena securissimum est alexipharmacum.

Dracon
marinus a-
limen-
tum & ve-
nenum est. De Dracone marino superat fidem quod narratur: Is enim aculeum osseum in dorso gerit, adeo homini infensum, vt quæcumque punxerit, nisi maturè succurratur, ad interitum præcipitat. Illius autem caro salubriter & suauissimè hominem alit, vulgus Gallorum Viuam nominat, sicque mirum videtur, quod animalia quædam simul & alimentum & medicamentum, & nonnunquam venenum homini suggerant. In ipsorum enim parte quadam vita est, in alia interitus.

Venena ve-
nenum tra-
hunt. Adhuc vero valde mirum animalia venenata, cum corporibus suis nostro prorsus inimica sint, subitoque nos interimant, moribus ac puncturis à se illatis securè mederi, & ferè sola ab eiusmodi vulneribus & periculis liberare; quia nempe, simile sibi simile alliecit, & quasi suam substantiam renocans, partem læsam à veneno & damno vindicat. Sic à Crocodillo læsos ipsius adeps impositus sanat, & à Scorpionibus icti ab hisdem tritis & admotis conualescunt, Idem efficit mus araneus, vbi aliquem momordit, si tritus adhibeatur, sanat.

Admiratione quoque dignum est, venena non solum venena trahere, sed plurima etiam spicula & aculeos à corporibus nostris sine dolore foras educere, quæ tantè vix vi, aut arte vlla extrahi potuerant.

Multa autem animalcula tota homini malefica sunt, vt cantharides, buprestis, salamandra, pinorum eruce, lepus marinus, rubeta rana palustris mutæ; non tamen semper inutilia & sanitati incommoda. Nam cantharidib. lacertis, scorpionibus, formicis & similibus animalibus extra audacter vimur interiùs verò non ita liberè. Tutum enim minimè est, quæ praua qualitate à natura donata sunt, in corpus ingerere. Sic nefariè egit circonforaneus quidam & imperitus Agyrta, qui probo, sed parùm prudenti viro mihi noto, medicamentum ad tentiginem mentulæ proritandam postulanti, cantharides exhibuit, eumque non ad campos veneris amœnos, sed Charontis cymbam dimisit.

Nonnulla vero & si malefica, quæque vel morfu vel instratu lædunt, ab expertis artificibus preparata, à Medicis doctis præscripta, & opportunè data non modo non nocent, sed mirabiles & salutares præstant effectus. Vinum enim in quo vipera quodam casu extincta fuit, elephanticum iamdiu à cõmuni ciuium societate seiunctum perfectè sanauit. Idem polliceri & præstare potest coluber. Quid igitur vtriusque caro vt decet apparata?

Ex minera-
libus vene-
na multa.

Ex mineralibus denique venena quàm plurima habentur eff. cacissima, tam sponte nascentia, vt hydrargirus, cinnabaris, gyspum misy sory, sandaraca, magnes, antimonium crudum, atque etià ada-

mas, quàm a tetralia reddita, vt sublimatum, calx, erugo, cerusa, aqua fortis vulgo dicta, & alia penè innumera, quæ præstat ignorari, quàm sciri. Sat enim est simplicia quædam attingere morbis quibuidam vtilia, quorum alia aliis vt naturæ minùs infensa, & rebus sanitatis magis idonea præferuntur.

De facultatibus medicamentorum in genere, quæ ab effectis denominantur.

CAPVT XVI.



MEDICAMENTA multa specifica virtute quædam artes respicere & reborare, vt cephalica caput, ophthalmica oculos, pulmonica, hepatica, splenica, pulmones, hepar, lienem, & alia alias, ab ipsisque denominata paulò superiùs ostendimus: Nunc quæ ab effectis suam nomenclaturam habent, breui & generali dilucidatione recenscamus, vt in promptu sint medicinam facturo; ad propositos & consequendos effectus, medicamentorum qualitate requisita dignotio & appellatio. Verba enim cum sint notæ rerum, si ipsis convenientissime, vt decet, aptentur, aptiùs docent, & artificem meliùs regunt & dirigunt.

Medicamenta autem ferè omnia idioma Græcorum, à quibus primò fuit impositum, retinent: Nonnulla ex Arabum balbutie profecta vix ad antiquam euphoniã redierunt, & annorum lapsu quamdam gratiam compararunt. Ab effectu igitur medicamenta sic à quibus. Medicamentorum appellatio à quibus. classici auctoribus appellantur. Catharticum medicamen dicitur quod modo quouis à corpore noxios humores, seu per vomitum, seu per secessum educat Cholagogon medici vocant, quod bilio- καθαρτικόν. sum humorem ducit: phlegmagogon, quod pituitosum; Melanagogum quod melancholicum; Hydragogum, quod aquas seu sero- χολαγόν. sos humores purgat; Panchymagogon, quod omnes.

Polychrestum sic nominatur, quod multos exhibet vsus.

Eccoproton inter benigna medicamenta numeratur, atque id dicitur, quod tantùm fœces deturbat.

Hypercathartica, hoc est, superpurgantia sunt, quæ primùm humorem sibi familiarem purgant, dein alios ad sequendum parationes, υπερκαθαρτικά. postremò sanguinem adeo vt dysenteriam suscitent. πύλα.

Emetica vocantur, quæ vomitum excitant, & foras humores per os excludunt. εμετικά.

Allostica, hoc est, alterantia, quæ intemperiem quamdam emendant, vt calida frigidam, frigida calidam, humida siccam. Euchyma & cacochema ad alimenta spectant; Illa, quæ sanguinem optimum, hæc, quæ prauum gignunt, dicuntur. Epicrastica, quæ

succum optimum paulatim sufficiunt in locum pravi paulatim vacuati, Vnde Epicrasis.

Hypnoticum, quod somnū potius, quā soporem conciliat. Narcoticum, quod non modò soporem, sed stuporem & sæpè necrosim, siue mortificationem adducit.

Vreticum, quod vias diducendo, laxando & pellendo vrinas & arenas mouet & sæpè expellit.

Lithontriptica, hoc est, saxifraga, quæ lapides seu calculos frangūt, seu atterunt & foras eijciunt.

Anodynum, quod moderato calore dolorem aliquem delinit & sedat. Vocatur quoque Paregoricum, & aliquando Lysiponium, hoc est, laborem soluens, seu dolorem sedans.

Chalasticum medicamentum generali significato vocatur, quod partem quamdam cui adhibetur lenit, & temperato calore solatur: Strictius verò sumptum, quod relaxat & tensioni medetur, sine qualitatis excessu, vt adeps, butyrum, cæsyus.

ἀναστοματικόν. Quod venarum orificia diducit ac reseat, & sanguinem ad exitum suo calore & acrimonia excitat *ἀναστοματικόν* dicitur, cuiusmodi est allium, sabina, porrum, cyclamen & alia quamplurima.

ἀποκρηστικόν. Repercussium medicamentum Græci *ἀποκρηστικόν* nominant, quod qualitate refrigerante & astringente humores in membra irruentes repellit, vt plantago, sorbæ, pilosella. Quædam tamen sola qualitate refrigerante repellunt, vt aqua & alia simplicia repercussiva, Galenus. Omnia autem repellentia medicamenta tantum admo-
lib. 14. metho.

ἑλκτικόν. Helcticum, seu epispasticum vocatur, quod humores ex alto euocat, contrariumq; est repellentibus; calidum enim est, & partium tenuium, Repercussiva frigida & crassarum. Et quodcunque calidum trahit; frigidum quoduis repellit. Quod gradu secundo calidum est, manifestè trahit: quod tertio, partim trahit, partim digerit, vocaturq;
Li. 10. compos. med. loc. cap. 25. l. 1. synopsis. ca. 16. lib. 5. simpli.

μετασυγκρηστικόν. Attrahentium autem medicamentorum tres sunt differentia. Quædam enim qualitate elementari trahunt, vt quæ calida sunt secundo recessu; Alia casu, vt putrefactione, eoque modo fermentum validissimum est tractorium. Alia quadam similitudine, vt venena venenum; alia occulta proprietate, vt dictamnus spicula, magnes ferrum:

διαφρητικόν. *Διαφρητικόν* est, quod seu intro sumptum, seu foris adhibitum, attenuando & detergendo non solum meatus aperit, sed obuios humores incidit, digerit, ac sudore vel halitu resoluit. Eorum duo traduntur discrimina, quædam debiliora sunt *ἀραιωτικὰ* dicta, hoc est, relaxantia, quæ calida quidem sunt ac tenuium partium, sed non desiccant, & magis humores ad resolutionem apparant, quā resoluant. Materia resoluentium multa est: nam quæ à medio secundi gradus ad finem tertij calefaciunt, & sunt tenuium partiū, resoluūt.

Στεγνωτικόν, seu σωμακτικόν hoc est, stipans seu obstruens, anastomotico contrarium est: Vasorum enim oscula claudit, & vacuationes sistit: Eius si quidem substantia crassa est, proinde facile occludens.

Πυκνωτικόν seu condensans, vim quidem habet occludendi, sed imbecilliolem, atque cutis tantum meatus stipat; Stegnoticum officia venarum.

Ἐμπλαστικόν seu glutinosum vocatur, quod patri cuiquam illitum tenaciter adhærescit, & cutis meatus obstruit, multoque infarctu implet, ut resinæ & gummi. Quædam Emphrastica dicuntur, quæ scilicet poros suo lentore obstruunt & visciditate opplent.

Incrassans Græcè παχυντικόν, dictum succos consistentia tenues & liquidiores multo crassiores reddit: Illius vis sita est in materia crassa & terrestri, acrimoniæ omnis experte.

Huic contrarium est λεπυντικόν, quod nempe crassos & compa-
ctos humores attenuat, varièque dissolvit. Valdè tenui substantia constat, seu frigidum sit, ut acetum; seu calidum, ut aqua vini, quam vulgus aquam vitæ, & Chymistarum multi Elixir nominant
Ἐκφρακτικόν, Id est, infarctu liberans, quod humore viscido & lento vias expedit. Eius autem facultas varia est, pro varia humoris ob-
structionem committentis ratione. Nam, quæ à glutinoso succo nascitur, Ecphrastico attenuante & incidente opus habet, Quæ simul duritiem coarctat, emolliente qualitate simul eget.

Μελακτικόν seu emolliens appellatur, quod durum corpus, ut scir-
rhum emollit, & in statum naturalem reducit, estque saltem gradu secundo calidum, & in humiditate & siccitate temperatum. Quod in calore temperatius est, potius suppuratorium existit. At, quod duritiei ex siccitate natæ adhibetur, esse debet humidius, & in calore moderatius ut oleum, & medullæ multæ.

Διαπυντικόν, seu suppuratorium vocatur, quod nostræ naturæ simil-
limum est, atque calore & humiditate quasi symmetrum, Vnde manus admota cuiquam parti, in qua materiam in pus vertere cupimus, si in ea diutius detineatur, facile suppuratum efficiet & movebit. Remollientia verò calidiora sunt, non ita tamen, ut ea qualitate humiditatem exuperantem discutiant. Itaque suppurantia potius quantitate, remollientia qualitate id ipsum quod pollicentur præstare dicuntur.

Πεπαστικόν, simillimum est, sed peculiariter id dicitur, quod humorem concoquit, Diapyyeticum quod in pus mutat.

Ρυπτικόν, seu detergens ac mundificatiuum humores quosvis crassos & tenues, & sordes omnes expurgat, unde purgatiuum quoque dicitur: Sapore id ferè amarum est, aut fæluginoso & aliquantum exiccante.

Ἐναιμον dicitur quod cruentis vulneribus adhibetur; vocatur & ἑναιμον.

ἱσχαίμων, hoc est, sanguinem sistens.

σαρκοπικόν.

Σαρκοπικόν, quasi incarnatiuum, seu medicamentum quod vim re-
generandæ carnis habet, dicitur. Estque siccum primo gradu & mo-
dicè ac sine morfu detergens.

Cap. 15.
lib. 5.
simpl.

κολλητικόν.

Κολλητικόν hoc est, glutinatorium medicamentum appellatur,
quod agglutinat & coniungit solutas partes, vt in naturalem vnita-
tem redeant. Dum cruentis vulneribus adhibetur Εἵναιμον & τραυμα-
πικόν, à quibusdam Symphiticum & aggregatiuum dicitur.

Ε 3.
Meth.

καταγματι-
κόν.

Καταγματικόν, quod fractis ossibus solidandis & porrò sarcoide ci-
tiùs meliùsque ferruminandis conuenit.

ἐπιλωπικόν.

Εἰπωλωπικόν vel synuloticum, quod vlceri cicatricem inducit, hoc-
que præstat efficacissima siccitate & astrictione moderata; Siccit
enim tercio recessu, Colleticum secundo, Sarcoticum primo tantū.

καθαίρει-
κόν.

Καθαίρεικόν medicamentum est, quod superfluam carnem, cui ad-
hibetur absomit, & ad natiuam superficiem reducit; vnde à qui-
busdam σαρκοφαγόν nominatur. Calidum est 3. gradu.

σαρκοφαγόν.
ἐσχάρωπικόν.

Εἰσχάρωπικόν, quasi crustificū quod vehementissimo ac igneo calore
partem adurendo ei crustam relinquit, cuiusmodi est sublimatum
& pyrotica.

σηπτικόν.

Σηπτικόν, id est putrefaciens, malignæ qualitatis est particeps, &
partem quam attingit fœtorem & prauam qualitatem inducendo
destruit ac putrefacit, vt Sandarach, aconitum & alia multa.

Quædam ἐκπλωπικὰ dicuntur, quæ callum absument, quæ verè
cathartica sunt, aut hæc facilè in illorum locum substituuntur.

Nonnulla quoque vsurpantur ad mortuos fœtus excludendos, quæ
φθορία nec non ἐκβόλια nominantur.

τετανωδρὰ.

τετανωδρὰ ἢ τετανώματα medicamenta sunt erugatoria, seu quæ
rugas in vultu tollunt, & cutem faciei ad læuorem nitorem quæ redu-
cunt. Expetuntur à vetulis, quæ cum maritis inuenibus nuptias cō-
traxerunt.

ὀφθαλμορρηγνὰ.

ὀφθαλμορρηγνὰ dicuntur medicamenta, quæ oculos vix vitio percepti-
bili affectos, imperfectè tamen suo officio fungentes emendant, &
ad pristinam & bonam sanitatem reducant. Remedia vero quæ id
præstant maximè sunt Collyria, de quibus postea suo loco.

Hæc præcipua cum sint facultatum medicamentorum ab effectis
sumpta nomina, cætera non persequemur.

De generali delectu medicamentorum purgantium.

CAPVT. XVII.



RIA si benè nouerit pharmacopœus, artis suæ peritissimus habetur, Simplicia nempe medicamenta seligere, eadem præparare & componere. Electio cognitionem prænuntiat; Vix enim bonum à malo discernet, & seliget illud, nisi nouerit vtrûmque. Præparatio quoque supponit industrium artificem, qui in arte diu exercitatus, multis modis, aqua, igne, manu simplicia maligna castigat, bona meliora reddit, imbecilla validiora efficit. Compositio autem sine electione & præparatione nulla: Simplicium namque cumulus confusio, non compositio est.

Erit itaque delectus medicamentorum, primum pharmacopœi officium, qui sic solet definiri. Delectus est boni à malo discretio ac distinctio, noxi à innoxio, malefici à benigno. Benignum medicamentum purgans, seu beneficum dicitur, quod clementer purgat, & placidè aliûm subducit, vt cassia, māna, thamarindi Rheubarbarum. Malignum & insalubre, quod violenter trahendo purgat nostrâque corpora conturbat, ob eam quam habet nostræ naturæ essentiam aduersam.

Delectus
quid.
Benignum
medicamentum
quid.

Est vero medicamentum malignum duplex, Vnum toto genere tale, cuius nempe genus vniuersum effrane est, & violentum, qualecumque sit, & vndequaue desumptum, vt Euphorbium, Laureola, Antimonium. Alterum specie aliqua & ex accidenti secundum aliquod indiuiduum sui generis, quod à natura sui desciiuit, atque degenerauit, vt agaricus niger, turbith nigrum, Colocynthis vnica in planta, vel ex vnica planta in agro, quia sola in agro planta, vel solum in planta pomum, omnem vel agri, vel plantæ amarorem & malignitatem creditur ad se rapere.

Mesuc.

Ab his autem ambobus malignis purgantibus abstinere debemus, nisi in magnis quibusdam affectibus, quibus benigna aut nihil, aut parum profunt, aut desunt. Tunc enim malignis ritè correctis & præparatis peritus medicus poterit vti, quandoquidem morbis multis venena etiam sæpe sunt salutaria, vt vipera Elephantiasi, caro scorpionum vulneribus ab hisdem excitatis, sanguis canis rabiosi à cane rabioso demorsis; Vnde prouerbum. A Scorpionibus icti solent ab ipsis remedium accipere.

Apho.

16. lib.

4.

Ab his etiam quæ blanda vocantur abstinendum, nisi ea optimè, vt decet, exhibeantur iusta quantitate & tempore, & quibus conferre creduntur. Sanas enim carnes habentibus, ait Hippocrates, medicamentum purgans noxium, iuxta illud, Benè valentibus non opus est medico.

unde sumitur purgantium medicamentorum delectus.

CAPVT XVIII.

Essentia medicamenti quid.



LECTIO medicamenti purgantis desumitur ex ipsius essentia, seu natura & facultatibus. Essentiam vocamus ipsam cuiuscumque medicamenti rationem, quæ ex materia & forma confurgit. Vel, id omne quod in medicamento spectatur, & inest absolute citra ullam comparisonem. Facultatem vero vim ipsius medicamenti, quam in nostris corporibus exercet, vel exercere potest. de qua postea suo loco.

Facultas medicamenti quid.

Bonam vel malam medicamenti purgantis essentiam ostendunt illius substantia, qualitates primæ, seu temperamentum, qualitates secundæ temperamentum sequentes, & dispositio extrinsecus acquisita. Substantiæ nomine intelligitur materiæ commoderatio & consistentia, quæ ab elementis certa inter se proportionem mistis, nascitur; unde alia grauiora, vel leuiora, alia densa vel rara, alia crassa vel tenuia, alia lenta vel friabilia dicuntur. Ex quibus differentiis dispositio quædam nascitur, & virtus ipsi medicamento, per quam in eodem genere bonum à malo distingui potest, vt exemplis innotescit, capite sequenti specialius adductis.

Cap. 22
huius
lib.

Substantia medicamentorum.

Secundo à primis qualitatibus delectus sumitur, hoc est; à temperamento, cuius octo constituuntur differentiæ, calidum, frigidum, humidum, siccum, quæ simplices qualitates vocantur, & totidem compositæ calidum humidum, calidum siccum, frigidum humidum, frigidum siccum, quibus adiungitur medium temperamentum, seu temperatum, in quo consistit hominis natura, à quâ cum variè recedant aliæ temperaturæ, quædam vno, quædam duobus, quædam tribus, & quædam quatuor gradibus, ob eam causam gradus varij excessus distinguuntur.

Temperamenti quot differentiæ.

Tertiò sumitur electio medicamentorum à secundis qualitatibus quæ quatuor potissimum generibus distinguuntur: Etenim aliæ tactiles sunt, aliæ odoratiles, aliæ gustatiles, aliæ visibiles. Audibiles omittuntur, quoniam ab his certus non potest sumi medicamentorum delectus: Tactiles dicuntur, quæ tactus iudicio discernuntur quarum aliæ sunt elementorum propriæ, quibus scilicet qualitates primæ, calidum, frigidum, humidum, siccum, tactu dijudicantur, Aliæ temperamentum sequuntur, & dicuntur secundæ quarum ratione medicamentum graue dicitur, aut leue, durum vel molle, lentum vel friabile asperum aut læue, vt dictum est.

Secundæ qualitates quot differentiis includuntur.

Quartò medicamenta seliguntur ab odore, qui vaporosa quædam est substantia, quæ à re odorabili expirans, & ad nares delata sensum mouet odoratus. Eius autem tot sunt species, quot saporum;

Odor quid.

Odores enim saporibus proportionem respondent ab hisque denominationem plerumque mutuuntur. Non ita tamen sunt distinctæ species odorum atque saporum, quia sensus odoratus in hominibus est admodum obtusus: hinc fit, ut mille sint odorum species, qui proprijs nominibus careant: Generaliter tamen omnia odorabilia in beneuolentia & graueolentia distinguuntur.

Lib. 4. simpl. med. Gal. cap. 21. Quinto à sapore de medicamentorum delectu sumitur iudicium, certius quidem quam ab odore, quia saporum quam odorum magis *Sapor quid.* sint species discrete. Est enim sapor qualitas gustu perceptibilis, cuius nouem differentiæ constituuntur; quarum tres, à vincente caliditate in substantia vel crassa, vel tenui, ortum habent, acer nempe, amarus, falsus; tres ab exuperante frigiditate, acidus seu acetosus, austerus, acerbus; Et tres à moderato calore, dulcis, pinguis, quor, insipidus, horum postremus ad frigiditatem, dulcis & pinguis ad calorem magis inclinant.

Gal. ca. 2. li. 4. Sexto medicamenta seliguntur à dispositione extrinsecus acquisita, quæ oritur à tempore aut loco. Addit Mesue magnitudinem, paruitatem & numerum; his enim medicamenti qualitas validior aut imbecilior redditur. De temperie & delectu medicamentorum à colore & sono certa satis & vniuersalis regula statui non potest, per quam maligna à benignis discerni queant. Cum enim potissimum à substantia, temperamento & facultatibus benignitas vel malitia medicamenti pendeat, in singulis coloribus frigida, humida, calida, sicca reperiuntur, nec colores ipsi medicamentorum temperamenta insinuant: Potest enim facillimè color medicamenti extrinsecus immutari.

A sono etiam ut à colore incertissima est benignitatis vel malignitatis medicamentorum indicatio: Vniuersalis enim non est illa dignotio, sed particularis tantum, & ex accidenti in quibusdam, ut in cassia, carthamo, & paucis quibusdam.

Quomodo sumitur medicamentorum electio à rebus enumeratis.

CAPVT XVIII.



CATHARTICVM quidem omne consociale sibi humorem primum attrahit in aluum, sed specialius quædam dicuntur à Mesueo trahendo purgare, ut omnia valentiora; alia comprimendo, ut styptica; alia leniendo, ut viscida ac lubricantia; & quædam molliendo, ut malactica multa.

Inter ea verò, quæ trahendo purgant, quo leuiora, eo meliora iudicanda; ut colocynthis agaricus & scammonium grauiora verò maligna: leuitas enim substantiæ tenuitatem & raritatem indicat; *Eorum quæ trahendo purgant quæ nam meliora.*

grauitas densitatem & crassitiem. Quæ verò crassa materia constât, grauius afficiunt. Quæ etiam humiditatem habent superfluam, quo leuiores, eò meliores, nisi exoleuerint: leuiores siquidem minùs habent superfluæ humiditatis, quæ ventriculum subuerit & tormina concitat.

Quæ comprimendo purgant quomodo feligenda.

Contraria est eorum ratio, quæ purgant comprimendo facultate quadam styptica in terrestri materia residente, vt rhabarbarum quæque natiua conditione ac temperie Solida sunt, non rara: vt lapis Cyanus: Quæ etiam pleno & vacuo iudicantur, ceu quæ natura sua plena debent esse, non vacua vt cassia fistula tamarindi & carthami semen. Hæc enim quo grauiora sunt, eò meliora; vt etiam quæ purgant, leniendo, lubricando, & molliendo, vt pruna & siliqua Ægyptia, seu cassia fistulosa. Molliendi siquidem facultas, vt & lubricandi, ab humiditate est, quæ grauitatem inducit. Humiditas autem illa naturalis est, & à proprio temperamento, non excrementitia, quæ deteriora semper efficit medicamenta.

De reliquis autem substantijs, videlicet de rara vt de leui, de densa vt de graui iudicandum est. Leuitas enim est comes raritatis, vt grauitas densitatis, eaque inter se reciprocantur. At non est eadem friabilis & tenuis ratio; Non enim quicquid friabile est, idem & tenue, nec quicquid lentum idem & crassum; nec contra: Sed si quod tenue est, id quoque purum fuerit, erit & friabile ac tenerum: Et si quid crassum est, idem etiam impurum fuerit, erit quoque glutinosum ac viscidum: His exceptis, quorum substantia est lenta humida, vt mel, manna, butyrum, oleum. In his enim quod purius, idem & melius: quod impurius, deterius. Crassum propriè dicitur, quod ægrè læuigatur, seu quod vix in tenues partes comminuitur; Tenue quod facile. Densum, quod nullis aut perexiguis meatibus est peruium; Rarum, quod multis. Graue, quod in se coactum, pondere quam molle magis est conspicuum; leue quod laxius mole quam pondere. Lentum & friabile sic inter se opponuntur, vt vix illud rei trahenti & terenti cedat; Hoc verò sæpe digitorum attactu & compressu in pollinem minuatur.

Crassum.

Tenue,
Densum,
Rarum.
Graue.
Lentum.
Friabile.

Ratione autem temperamentorum calida medicamenta frigidis, humida siccis in simplicibus temperaturis sunt meliora. In compositis calida humida salubriora; frigida sicca, pessima. Si ab intentionis gradu delectus capiatur, cum hominis temperamentum in mediocritate sit constitutum, quanto medicamentum est hominis temperamento medio propinquius, tanto salubrius iudicatur: Quanto remotius, tanto malignius; Itaut quæ à medico quatuor gradibus, deciscunt, deterrima sint: Et quæ extremè, quatuor nempe gradibus superant, venena potius dicenda sunt quam medicamenta vt calx & sublimatum.

Ratione verò qualitatum secundarum, vt tactilium sic iudican-

dum est. Quando in eodem genere medicamentorum quædam dura, alia mollia esse contingit, aut aspera vel leuia, in his mollia duris, & læuia asperis anteponenda sunt. Durum id vocamus ex Gal. cui nostra caro cedit: molle contra, quod cedit nostræ carni: Est-

De delectu
in secundis
qualitati-
bus.

Cap. ult. lib. 3. de diff. puls. que tale vtrumque bifariam, natura nempe, vel arte sic effectum. Læue autem vocatur, cuius superficies est æqualis: Asperum, cuius hæc eadem inæqualis est, propter partes quasdam eminentes, alias verò depressas, vt in prunis, Sebesten, myrobalanis, & alijs multis.

Durum
quid. Mol-
le.

Ab odore autem ea de causa fit medicamentorum delectus, quia odor suavis spiritus reficit, vires instaurat, partes principes exhilarat, & facultates roborat. Grauis odor & fœtidus contra, caput ferit & grauat, mentem percellit, ventriculum subuertit, inficit spiritus, nauseam mouet & difficilem ac laboriosam purgationem efficit, & vomitum sæpe concitat. Propterea medicamentis purgantibus, & electuarijs cardiacis aromata solent misceri, quibus illorum ingratus odor emendatur, & partes principes aduersus qualitates malignas medicamentorum muniuntur. Aromata enim omnia corroborant, vitæ fontem & principiū. Proinde suavis odor olido & fœtenti præferendus. Hic enim cordi & cerebro inimicus, ille verò vtrumque exhilarat. Est enim spiritui contento in ventriculis cerebri familiaris, quem dum reficit facultates vegetiores reddit.

I que quid.
Asperum,

Delectus
ab odore.

Aromata
cardiaca
sunt.

*Cap. 21.
lib. 4.
simpl.*

Particularis saporum disquisitio.

CAPVT XX.



X nouem saporibus diximus cum melioris note medicis, tres esse calidos, tres frigidos & temperatos tres. Calidissimus omnium est acer, qui à calore nostro excitatus à quo in actum de potentia redu-

Saporacer
qualis.

*Oribas.
cap. 5.
lib. 14.
collect.*

citur, mordicat, rodit, igneæ qualitatis sensum exprimit, & propemodum exurit, vt capficam, seu piper Indicum, vt pyrethrum, vt flammula.

Gal. ca. 17. lib. 4. simpl. Sunt autem acrium multa genera, nam alia sunt ignea & sicca, quantum caloris gradum superantia, & venena sunt, vt sublimatum, calx, & arsenicum. Alia cum igneo calore multam habent humiditatem admixtam, à qua dulcia quodammodo sunt, & esui apta, vt allium, cepa, porrum, nasturtium hortense, & similia. Alia intra tertium ordinem continentur, vt galanga, piper, sabina, thlaspi, arum, helenium. Alia moderatè talia sunt, vt hyssopus, thymus, anisum, coriandrum, raphanus, origanum. Sunt & acria quædam absolutè & simpliciter talia, & quædam aliis saporibus permixta, vt quæ acria sunt, simul & amara.

Amarus sapor acri proximus est, præsertim qui ex tenuium par-

Amarus sa-
por.

tium terrestrium affatione oritur, habetque vim non rodendi, vt a-
cer, sed detergendi magis quàm salsus, adeo vt linguam moleste
exasperet. Est verò duplex, vnus calidus, iam dictus, qui ex partium
terrestrium affatione generatur, quo modo dulcia fiunt amara, vel
coctione, vel vetustate: Alter frigidus, qui ex vehementi congela-
tione fit, velut in opio, in cichorio syluestri, in lactucis, cicuta &
fructibus quibusdam immaturis, vel qui fit à coctione inchoata,
seu imperfecta, vel potiùs à calore remisso, qui pro frigore habe-
tur, vt alius ab intenso. Vix enim mixtum datur, quod naturis &
qualitatibus diuersis non sit præditum. Vnde mirum non est, si o-
pium & cicuta partim sint calida, partim frigida. Scriptulus enim
colocynthidos poterit aquæ duabus libris amarorem, non calorem,
nisi valdè occultum & perpusillum inducere. Schegkiius tamen pu-
tat, nonnulla propter amaritudinem calida esse, sed abstrusa & oc-
culti vi refrigerare, vt opium & cichorium.

Paul.
Aegin.
cap. I.
lib. 7.
Gal. c.
10. lib.
4. sim-
pl.
Lib. de
occulta
medic.
facult.

Auerrhoes in Collect. amara quædam esse dicit infra mediocrem
caloris gradum, alia supra: Illa pro frigidis habentur, vt opium, &
cichorium; Hæc verò calida semper, vt absynthium & colocinthis.
Est autem amarus sapor vel simpliciter talis, vt in aloë; vel aliis sa-
poribus permixtus, vt in absynthio, cui coniuncta est stypticitas seu
astrictio, vt etiam in multis fructibus experimur, qui perfectam
magnitudinem nondum adepti, sæpe sunt acidamari, maturi vero
simul & amari, & acido dulces.

Salsus.

Salsus sapor amaro finitimus est, sed minus calidus & siccus pro-
pter aqueam humiditatem, à qua substantia terrena in eo tempe-
ratur. Proinde moderatè abstergit, linguamque abluit moderatiùs
quàm amarus, estque gustantibus satis gratus, aliquid habens a-
strictionis, non tamen quæ linguam contrahat, vt sapor austerus,
vel acerbus.

Orib. et
Gal. ca.
20. lib.
4. sim-
pl.

Est autem salsus sapor duplex, vnus naturalis, artificialis alter.
Naturalis, vt in sale, in aqua maris, & in salibus multis fossili-
bus: Artificialis, vt in lixiuio, calce, capitello, & in salibus chymicis.

Acidus.

Acidus omnis sapor ex se frigidus est, siue talis sit à natura, vt in
his quibus frigida intemperies tenuitati substantiæ coniuncta est, vt
in succo limonum, arantiorum, acetosæ, agrestæ, & similium, siue
ex accidenti, vt à putredine; qua ratione vinum acidum dicitur,
non tamen absolutè; Est enim acrimoniæ cuiusdam particeps, vt do-
cet Galenus.

Act. c.
1. et. 1.
serm.
Lib. 1.
de sim-
pl.

Hinc acidì saporis alia statuitur diuisio, in eum videlicet qui ex-
actè talis est, nullius alterius saporis particeps, cuiusmodi sunt enu-
merati succi, & in eum qui non exactè acidus est, sed cum alio sa-
pore coniunctus; siue dulci, seu amaro, vel acri. Hinc acidodulces fru-
ctus, vt mala punica, pruna mora, cerasa. Multi quoque fructus
cum aciditate amarorem habent adiunctum, vt mala persica & ce-

rasa quadam. Acetum autem est acrimoniæ particeps, & mixtæ
Gal. c. qualitatis, vt loquitur Gal. propter caliditatem acquisitam. Vincit
19. 21. tamen in eo aciditas acrimoniam, vt acrimonia aciditatem in oleis
26. sulphuris & vitrioli, arte Spagyrica eductis, quæ propterea linguam
lib. 1. vellicant & rodunt, & sola exhibita insigniter calefaciunt. Porro
simpl. sapor acidus, quantum ad impressionem in lingua attinet, penetrat,
 mordicat, deterget, vellicat, sed citra calefactionem, nisi mixtam
 habuerit aliam qualitatem, inquit Gal. in quo discrepat ab acri,
cap. 2. quanquam acida terram fermentent ob partium tenuitatem, cum
lib. 4. caliditate à putredine nata.

simpl. Austerus sapor siue stypticus moderatè linguam & os constringit,
 exasperatque, atque quodammodo siccatur & refrigeratur, estque val- *Austerus.*
 de peculiaris multis fructibus immaturis, vt malis cotoneis, cornis
 & pyris multis, præsertim agrestibus. Cōsistit in media materia, quæ
 scilicet terrestris & aqueæ est naturæ particeps, & in qua frigiditas
 dominatur. Quare sapor omnis austerus frigidus est, moderatè a-
 stringit, & fluxiones repellit: Differtque ab acerbo, quia magis
 aqueus minusque stringit & exasperat: Cuiuscunque enim saporis
 vires aquea retundit ac hebetat humiditas, inquit Galenus.

cap. 7. Quum autem naturalis calor in ea ipsa materia dominari cœperit,
lib. 4. & aquea illa materia terrenæ mixtæ pepansim, hoc est, maturatio-
simpl. nem acceperit, tunc depulsa, ac euicta austeritate in eadem mate-
 ria succedet dulcedo: Sicque dulcescunt fructus austeri post matu-
 rationem, non tam materiæ, quam qualitatis mutatione.

Acerbus sapor ponticus & stypticus aliquando dictus, ab austero *Acerbus.*
Act. maioris tantum & minoris ratione dissidet: Eo enim grauior & mo-
cap. 1. lestior, atque os & linguam magis constringit, & asperitate validio-
tetr. 1. re coarctat. In materia siquidem magis terrena siccaque consistit,
ser. 1. nec aqueæ humiditatis manifestè particeps, in eaque non calor, sed
Act. frigus cum siccitate dominatur: Nam acerbum omne frigidum est.
cap. 4. Est vero maximè conspicuus hic sapor in galla, in mespillis & sor-
lib. 2. bis immaturis.

Dulcis sapor gustu suauis est, & iucundus, & ventri ac visceribus
 amicus, inquit Gal. quia caliditatem habet mitem, seu temperiem *Dulcis.*
 laudabilem, quare dulcia solum nutriunt, & infans in vtero solum
 trahit sanguinem dulcissimum. Ab vinctuoso verò dulce distingui-
 tur, quod minus sit gustu iucundum, cum alioquin temperamento
 conueniant, & ferè similes in lingua impressiones faciant. Quod
Gal. ca. enim dulce est, linguæ fibras lenit & dilatat, asperitatem demulcet
14. lib. & quicquid inhæret linguæ abluit. Elucet verò dulcis sapor potissi-
4. simp. mum in saccharo, melle, manna, glycyrrhiza, lacte, passulis, iuiui-
com. ad bis, & fructibus maturis. Eius saporis à Theophrasto quatuor spe-
aph. 37 cies constituuntur, lacteus, melleus, aquosus, vinosus.
lib. 5.

Vinctuosus sapor qui & oleosus, & pinguis dicitur, dulcis est, &

Vnctuosus.

nutrit. Et quicquid nutrit, ex genere est dulcium, ait Galenus. Inter se tamen dissident, quod dulcium humiditas aquea sit, pinguium aërea, unde celeriter in igne liquefcunt, & eduliorum sunt potius condimenta quam alimenta. Exasperatas enim linguæ partes leniunt & implent, vt butyrum, medulla, oleum. Est verò sapor vnctuosus vel exquisitè talis, vt sunt oleosa & pingua; vel moderatè, vt radix althææ & liliorum.

Cap. 9.
lib. 4.
simpl.

Insipidus.

Insipidus sapor ad dulcem accedit, deflectit verò magis ad frigiditatem, ob aqueam substantiam ab insito calore minùs elaboratam, inueniturque in rebus imperfectè coctis & frigidis; nam alimentum omne ex insipidis pituitosum est. Propriè verò in aqua, citrulo, cucurbita, blito, spinachijs & similibus obseruatur: Nulla enim manifesta qualitate linguam afficit, nec propriè sapor est, sed saporis velut quædam priuatio, vt nominis indicat notatio. Latini fatuum solent appellare, quòd nulla qualitate manifesta sensum excitet, impressionem verò relinquat in lingua ei ferè similem quæ ab hydræleo excitatur.

Ca. 10.
lib. 3.
de ali-
ment.

Cap.
64. lib.
2. de
facul.
alim.

Quis medicamentorum delectus à saporibus sumitur.

C A P. X X I.



A T V RÆ nostræ conseruatio in sanitate; Sanitas in temperamento consistit: A quo quæ magis recedunt maligniora sunt iudicanda. Et quæ naturæ nostræ magis sunt affinia, eò salubriora. Ex saporibus autem acer & amarus maximè sunt naturæ nostræ alieni & ingrati, Dulcis familiaris & amicus. Quapropter,

quantò medicamentum purgans ab acri & amaro magis recedit & longiùs, tantò minùs malum putandam est. Nam quæ exactè acria sunt, pessima habentur & nocentissima, vt euphorbium & thymelea, quæ ob acrimoniam & caloris vehementiâ viscera exulcerât.

Exacte ac-
ria pessi-
ma.

His proxima sunt acria simul & amara, vt succus rhamni. Ab his quæ exactè amara, vt colocynthis, & cucumeris syluestris succus, elaterium dictum.

Acria & a-
mara.

Quæ acria & amara sunt simul, & styptica vt aloë (quæ venas potius occludit quàm aperit, contra Serapionem) non ita mala. Minùs adhuc mala, quæ acria sunt & styptica simul, vt epithymum.

Diosc.
cap. 24.
lib. 3.
Galen.

Amara &
styptica.

Amara & styptica omnium minimè mala, vt rhabarbarum, & absynthium ponticum. Licèt enim amara omnium minimè putrescant, minimèque vermes procreent, attamen quæ exactè talia sunt, cùm omnibus prope animantibus nedum hominibus esui inepta sint, authore Galen. quò sapor aliquis est minùs amarus, eò magis seligendus.

cap. 4.
lib. 5.
Meth.
Pint.
cap. 4.
lib. 27.

In

In bonorum & salubrium genere, saluberrima sunt dulcia, vt cassia, Dulcia sa.
luberrima.
Insipida.
manna, mel, glycyrrhiza zizipha.

Secundò, his proxima insipida, vt althea, lapatum, violæ. Tertiò, dulcia & acida simul, vt pruna, tamarindi. Quartò, dulcia & amara, vt polypodium. Quintò dulcia, amara & styptica, vt rosæ. Quæ enim astrictionem habent salubriora iudicantur. Ideoque quibus medicamentis purgantibus à natura non datur astrictio, ea sæpe adijcitur arte.

*De tempore colligendi medicamenta. Quamdiu vis eorum perduret,
Et quo tempore melior.*

CAPVT XXII.

ILLA medicamenti dispositio, quæ extrinsecus acquiritur, quæque magnam vim habet ad ea ipsa eligenda vel ortum habet à tempore, quo colligenda sunt, vel à loco, in quo sunt asseruanda. De tempore verò tria hæc scitu dignissima sunt: Primum, quando sunt colligenda. Secundum, ad quod vsque tempus vis eorum integra perduret. Tertium, quo tempore melior ac utilior existit. Quædam enim recentia meliora sunt, quàm vetera: Alia medio tempore.

Quod attinet ad primum, dicimus medicamenta tunc esse colligenda, quando vis eorum melior est, ac utilior. Verum enim verò non æquè ac vno & eodem tempore omnes stirpium partes efficaces sunt & salutares: Nā alio tempore radices, alio tirsii seu caules, alio folia, alio flores & fructus, semina, succi, lachrymæ colligi debent. Quo tempore colligenda medicamenta.

Sicque radices singulis anni constitutionibus possunt colligi, & non autumno tantum, vt placuit Dioscoridi, Auicennæ & alijs multis. Neque etiam vere solo, vt voluit Saladinus: Sed nonnullæ quouis tempore effodi queunt & colligi, quæ scilicet semper vegetæ sunt, & succulentæ, licet caulis aruerit, cuiusmodi sunt radices buglossi, acetosæ, glycyrrhizæ, osmundæ regalis, apij, rusci, cyperi, cyclaminis, liliorum, althææ & aliorum quamplurium. Nonnullæ cum primum suis folijs exuuntur, quo videlicet tempore, vis plantæ confugit ad radicem, tūcque magis est percoctus humor quàm alio tempore, vt enula campana, angelica, peonia, brionia, buglossum. Quædam verò euellendæ ac colligendæ antequam in stolones, folia, flores & semen tota plantæ vis abeat, vt polypodium iris, sigillum beatæ Mariæ, gentiana, satyrium. Quædam tamen Vere & Autūno collectæ optimæ sunt, vt radix althææ, liliorum, eringiorum, acori, oxalidis, raphani, & multorum, quæ copiosum naturalem succum continent. Quouis tempore quædam radices colligendæ.

Stipites autem & caules colligendi sunt cum perfecti fuerint: folia & flores antequam sponte decidant, semina cum siccare coeperint & antequam excidant, tunc enim magna ex parte perfecti sunt. Fructus ubi maturuerint, Succi herbarum & foliorum germinantibus adhuc cauliculis.

Lachrymæ verò eliciendæ & exprimendæ inciso caule per adolescentiam, ut Vere nouo, aut æstatis initio, dum in stipitem succus ascendit. Omnia verò si fieri possit, cæli constitutione serena colligenda sunt, consilio Dioscoridis.

Quandiu autem vis medicamenti non modò purgantis, sed etiam alterantis & roborantis perduret, non diffinitè statui potest ac iudicari. Cum enim sua sit cuiusque ætas, & suum in singulis vetustum ac recens non idem est omnium durationis tempus. Nam rhabarbarum trium annorum adhuc recens est ac masculum, hoc est, potens ac validum. Alia citius exolescunt, ut ex radicibus quæ tenues sunt & substantiæ raræ, velut radix phu, asari, satyrionis, quæ efficaces & valentes anno tantum durant.

Nonnullæ quinque vel sex, ut aristolochia, cyperus, rui-cus: aliæ decem, ut centaurium maius. Et, ut placet Theophrasto, aliæ triginta annos durant, ut veratrum: Aliæ quadraginta, ut chameleo niger. Et quædam centum, ut elaterium. Et si vera narrat idem author, elaterium repertum est ducentorum annorum, quod optimum erat & pretiosum. Ideoque in genere vix statui potest, ad quod usque tempus, vis medicamenti præsertim purgantis perduret efficax, sed speciatim tantum de singulis, cum de his particulatim differetur in officina pharmacopolarum, ubi medicamentorum compositio fusissimè declarabitur.

Hæc tamen regula generalis de his statui potest, si non perpetua, saltem in plerisque vera: ut quæ medicamenta rara tenuique substantia constant, quæque plurima luxuriant humiditate, breuiore tempore durant efficacia. Quæ verò crassa & solida, minusque humida, longiore, quia vis eorum non ita facile exoluitur aut perit.

Quandō vis
medica-
mentorum
præstatio-
rior.

Tertium superest inuestigandum, quo scilicet tempore vis medicamentorum purgantium sit melior; cum alia recentia sint meliora quàm vetera; alia cōtra alia ætate media. Atq; ut hæc dignotio certa sit, & electio optima fiat, desumi debet ex quibusdam saporum differentiis, & ex substantiæ varietate, quibus iudicamus, recentia quædam vetustis esse meliora, ut styptica, ut amara: Quæ cum propter infinitam siccitatem mala sint, vetustate fiunt deteriora, quia siccitas in his tempore augetur. Recentia verò humiditatem obtinent, quæ in ipsis excessum tum caloris, tum siccitatis temperat.

Quæ etiam virtute imbecilla sunt, ut flores violarum, borraginis, hyacinthorum, buglossi, rorismarini, vel quorum in superficie virtus est posita, ob idque facile resolvable, propter substantiæ rarita-

tem, ea recentia vetustis sunt meliora, vt flores pene omnes, quorum præsertim odor citò perit.

Contra vero vetusta quædam recentibus meliora sunt, primùm quidem acria, qui tenuium sunt partium, quia igneus calor in superficie positus, à quo mordent & vrunt, vetustate expirat. Quæ verò acrimonia intus remanet, tempore mitescit ac frangitur, vt de Euphorbio narrat Galenus. Quando vetusta meliora.

Cap. 2. De allio & cepa non est eadem ratio, quoniam acrimonia à calore *lib. 3. de* est cum humiditate multa coniuncto, qua assumpta, redduntur acriora: proinde recentia sunt meliora. *comp.*

med. gē. Secundò quæ validam habent à temperamento virtutem, & difficilè resolubilem, ob substantiæ densitatem, nec in superficie positam, sed intus reconditam, ea vetera recentibus sunt meliora: quæ enim est in his excrementitia humiditas, ac superflua, tempore absumitur, manente naturali, ob substantiæ densitatem.

Media verò ætate multa meliora sunt. Primò dulcia: Secundò insipida: Tertiò salsa. Dulcia quidem, quia recens collecta ob humiditatem multam indigestam flatulenta sunt; vetustate verò amarescunt. Quæ media ætate meliora.

Insipida etiam recentia humore superfluo abundant, à quo flatulenta sunt & nauseabunda; antiqua vero exanimata sunt.

Salsa denique nec valde recentia, nec vetusta debent esse: Hæc enim propter auctam siccitatem & absumptam humiditatem propriam amara fiunt & acria, proinde deteriora; Illa verò propter superfluum humiditatem ventriculum turbant ac subuertunt.

Antiqua autem & recentia pro cuiusque natura, non ex dierum, mensium, vel annorum pari numero sunt intelligenda: Vnde vetustum ac recens in omnibus æquè statui non potest, cum non eodem dierum numero omnia perdurent omnino, sed alia citiùs, alia tardiùs senescant. Vetustum & recens non omnibus æquum

Mirum est quod de Mandoc seu Maniot radice quadam crassissima & medulosa narratur, quæ sicca & in farinam, seu puluerem tenuissimum redacta multis barbaris, vt Brasiliensibus, quibus panis nullus, suaue & salutare & solum fere nutrimentum; viridis venenum præsens ac certus interitus.

Quis medicamentorum purgantium ex loco sumitur delectus.

CAP. XXIII.



EDICAMENTVM purgans benignum à malo fecernitur loco, vel natali, in quo plantæ nascuntur *Gal.* & viuunt; vel alteri plantæ vicino aut remoto; vel *cap. 1.* Soli propinquo, aut remoto magis, vel illi exposito *lib. 3. de* aut obtenebrato. Neque enim parui est momenti, *sympt.* quo quæque loco planta proueniat, cum ab eo vna *caus.*

cum alimento, virtutem quoque alliciat, quam ipsa natura ipsi loco impertiuit. Arbor enim ex Perside non solum in Numidiâ & Ægyptum translata malignam qualitatem deponit, sed etiam apud nos aduecta salutaris est, & poma fert esui gratissima & salubria.

Cloacarum fœtor ac putredo plantas insalubres reddit. Locus autem in quo planta & medicamenta à plantis desumpta proueniunt, vel est congestitijs, & fimo, cœno, tetrisque halitibus conspurcatus, vel liber ab omnibus olidis inquinamentis, vel calidus aut frigidus, humidus aut siccus.

In loco libero, cloacarum sentinam & sordes non admittente, plantæ medicamentosæ, atque etiam alimentares proprietatem acquirunt suo generi & propriæ naturæ debitam ac conuenientem, dum naturali sua facultate attractrice humorem ex terra sibi familiarem attrahunt, & in sui nutricatum conuertunt; vt quæ dulci gaudent humore, dulcem, quæ amaro, amarum quæ salso & nitroso, salsum & nitrosum.

Hortorum suburbarum insalubria olera.

In loco verò non libero & coacto, vt sunt horti sub-urbani, qui magis finum quam terram redolent, alioqui melones, cucumeresque alere minus idonei, non suo generi, vel naturæ debitam, sed rei admixtæ, vt fimi vel alterius rei acquirunt proprietatem. Proinde melones, lactucæ, aliaque olera, quæ in eiusmodi locis putidis aluntur, insalubriores. Et omnia medicamenta quæ in loco libero nascuntur, meliora, & potius eligenda.

Calida loco calido nata qualia.

Quæ verò immoderatè calida sunt, in loco calidiore nata, deteriora sunt; frigida, in frigidiore. Loci enim ad plantas similitudo qualitatem & malitiam intendit & auget, dissimilitudo temperat ac reprimat. Vnde quæ humido abundant excrementitio, vt turpetum, hermodactili, polypodium in loco humidiori nata & educata, quia propter humiditatem terræ siccitas & acrimonia retunditur, vt ex pyrethro, hydropipere & alijs quam multis est notum.

Vicinia autem & societas plantæ vnius ad alteram, qualitatem aliquando meliorem, & sæpè deteriore efficit: Proinde nec est ad medicamentorum delectum aspernanda.

Lupini enim vitem meliorem reddunt, quòd racemos ferat dulciores, si iuxta eam ferantur; raphanus hermodactilos,

Epithymus ex thymo laudatur: Improbatur qui colligitur ex ocy-

mo. Polypodium quernū optimum est: quod ex muris & parietibus vetustis colligi solet, damnatur.

Cap. 8. hu. lib. Cassia quoque arbor in agro sola, vel eiusdem arboris, vnica si-
liqua melior. Contrarium verò de colocynthide verum esse supe-
rius ostendimus. Quædam enim vicinia & numero meliora, alia
deteriora sunt.

A loco autem subsolari, seu Soli, vel astris quibusdam magis pro-
pinquo aut remoto, quædam meliora existunt, aut deteriora. Sic
senna orientalis, Iris Illyrica & Florentiana, angelica Hispanica,
thymus Creticus, bitumen Iudaicum, cuminum Æthiopicum, Pe-
troelinum Macedonicum, capillus veneris Mompelliensis, scæchas
Arabica, opium Thebaicum; amomum Scythicum, mastiche Chia,
pruna Damascena; manna Calabriensis, rhabarbarum, hoc est, radix
Barbariæ, Arantia ex agro Narbonensi aduecta meliora, quàm ali-
undè creduntur, ob terræ proprietatem, & causæ efficientis nempe
cælestis virtutem.

Verum à Solis & syderum aspectu, & à vicinia parum certa est
indicatio, & maligni à benigno parum tutus delectus; quoniam vix
scire possumus, quo loco quæque proueniant, vicina alijs nec ne:
Aut quæ astra benigna vel maligna quæque respiciant, estque fides
penes eos, qui vel radices effodiunt, vel reliquas plantarum par-
tes colligunt.

Et quemadmodum in quibusdam numerus vim immutat & qua-
litatem, vel intendit vel remittit, vt pomum colocynthidos in plan-
ta vnicum ostendit; Sic etiam magnitudo, aut paruitas. Nam vis
plantæ & terræ diffusa, multò remissior est: Coacta verò in plantam
vnicam, aut vnicum fructum valentior. Multi tamen fructus par-
uitate, vt cappares & Massilienses ficus; alij magnitudine, vt semen
carthami & medulosa semina laudantur.

De delectu medicamentorum purgantium à facultatibus sumpto.

C A P. XXIIII.



QUOMODO medicamenta purgantia seligi debe-
ant, indicatione sumpta ab illorum substantia, tē-
peramento proprio, qualitatibus secundis tempe-
rumentum sequentibus, à dispositione extrinsecus
acquisita, ratione loci, temporis, numeri, magni-
tudinis & paruitatis breuiter, perspicuè tamen,
ostensum est. Superest, vt eorundem delectum, qui à facultate
purgatricè sumitur paucis adhuc perstringamus. Ea autem licet iu-
uetur à primis & secundis qualitatibus, cælestem tamen, ait Mesue
fortitur originem, & eam proprietatem habet specificam, quâ
medicamentum in ventriculo receptum, & à nostro calore solici-

tatum, humorem sibi familiarem, vt alibi notauimus, ex venis & meatibus corporis sensum effugientibus, ad se, ac in alium attrahit, Tuncque grauata natura & medicamenti & humoris attracti onere: viam vtrique parat ad excretionem; aut vomitu per os, aut deiectione per inferiora. Vnde purgantiũ medicamentorũ duo genera distinguuntur, vnum vomitorium, seu eiectorium; Alterum deiectorium, quę distinctio ab excretionis seu vacuationis modo sumitur.

πυρόκολλος
ἄνω quo-
 modo pur-
 gandi.

Est verò deiectorium vomitorio per se optabilius, cùm natura viam inferiorem expurgandis recrementis dicauerit; Superiorem verò excipiendis alimentis. Vnde frequentius dum sua sponte agit natura, nulla laceßita causis morbificis, per loca conferentia, inferiora nempe ducit, seu deijcit. Interdum tamen vi medicamenti per se vomitorij, aut humoris turgentis impetu proritata, medicamentum & humores simul foras per os excludit. Quò fit, vt eiectoria deiectorijs aliquando potiora & vtiliora, vt his accidit, quibus prima corporis, & maximè superioris ventriculi regio multa bile saturata est, quæ propter leuitatem & tractionis facilitatem, facilius & citius per vomitum extruditur. Propterea his & gracilibus qui vt plurimum biliosi sunt, Hippocrates imperat vomitum, præsertim æstate. Graciles, inquit, & ad vomendum faciles, per superiora purgandi, cauendo hyemen. Et alibi. Æstate superiores magis ventres, hyeme inferiores purgare decet. Humor enim crassior & frigidior, hyeme collectus per secessum facilius educitur. Vnde peritus medicus aliquando deiectorijs, & nonnunquam eiectorijs vtitur, prout humoris turgentis conditio postulat, & ægri natura facile fert. Nemo enim cogen-
 dus est vomere, ait Galenus, nisi sit ad vomendum procliuius. Et tabidi nunquam per vomitum purgandi. Nec qui pectus habent angustum.

Aphor.
6. lib. 4.

Aphor.
40. lib. 4.

lib. 1. de
loc. af-
fect.

Quæ vomitoria seligenda.

Quod si vomitus aliquando quibus conuenit imperandus, per ea concitetur medicamenta, quæ sine molestia graui ventriculum subuertunt, minimeque per Elleborum album, Galeni iudicio, ne vas aliquod thoracis disrumpatur. Minus adhuc multo per stibium, quo vafri circulatores multos, & interdum seipsos interimunt, vt ex mirabili constat historia apud Cornelium Gemmam de naturæ diuinis characteris.

libro,
quos,
quando,
& quib
medicã.

Idem delectus seruandus in cæteris purgantibus, vt benignioribus semper vtamur morbificis humoribus analogis: Nam oportet biliosis dare cholagogum, ait Gal. pituosis phlegmagogum, melancholicis melanagogum: aliter grauius peccatur.

Cap. 4.
lib. 2.
pag. 239
linea 14.

Sanguini purgando medicamentum non dandum.

Sanguini autem per os, aut sedem purgando, nullum præscribitur medicamentum hæmagogum, quia iugulare, non purgare homines foret, ait Galenus. Quod confirmat historia cuiusdam rustici Thracij Bithiniensis, qui herbam inuenit, quam si quis assumpsisset, sanguinem primò, tum vitam emittebat. Multis itaque hoc pa-

Cap. 6.
lib. de
purg.
med.
facul.

&o morientibus, cum hoc fascinus diligenti inquisitione dignum ar. *Historia*
bitraretur magistratus, veneficum comprehendit, qui interrogatus, *notanda.*
à quo tam deleterium edicisset venenum: Respondit à nullo didis-
cisse: Verum cum in suburbanum aliquando iecur suillum deferret,
urgente ventre super herba quadam iecur deposuisse, quod aliquan-
to post, cum sustulisset, vidisse ex vniuerso iecore vniuersam saniem *Herba san-*
ad herbam confluere. Ex hoc coniectura facta corpori sanguinē ea *guinē pur-*
detrahi posse, periculo mox in obuio quodam facto, vt verum com- *gans.*
perit, quod fore iudicabat, ad malos vsus herbam deinceps tran-
stulisse; Se tamen alicui hanc herbam, quæ in illa regione erat
plurima, monstrasse negauit. Hæc veneficus inter tormenta retu-
lit, & vinctis oculis ad crucem ductus est, ne inter eundem herbam
indicaret.

Relictis igitur medicamentis quæ sanguinem ducunt tanquam ve-
nenis, alia alijs humoribus analogæ non modò seligenda, sed etiam *Medicamē-*
quæ partes quasdam affinitate respiciunt. Sic prudenter medici præ- *ta partibus*
scribunt agaricum, stœchadem, betonicam ad capitis multos affe- *affinia.*
ctus; mannâ & cassiam ad thoracis & renum morbos; Aloë, my-
robalanos, absynthium ad ventriculum purgandum & roborandum;
Sennam, asplenium, seu scolopendrium ad lienem; Hermodactilos
& chamæpitum ad articulos; Saluiam & rorem-marinum ad nervos.
Non ita tamen astricta sunt cuiuspiam parti hæc medicamenta simpli-
cia, quin alijs quoque conueniant.

Gal. ca. Et quemadmodum familiaritate quadam multa medicamina siue
1. lib. 1. simplicia siue composita, peculiariter certam partem roborant; Sic
compos. nonnulla opposita ratione, partes corporis quasdam destruunt, vel
medic. manifestè lædunt, vt lepus marinus pulmones, cantharides, vesicam,
cicuta cerebrum vt superius notatum est.

*per ge-
nera.*

De gradibus medicamentorum.

C A P. XXV.



Orpus hominis cum sit temperatissimum ab omni-
bus qualitatibus afficitur, quarum aliæ absolutè ta-
les sunt & actu suas vires exerunt, vt ignis qui pri-
mo contactu calefacit, vt nix refrigerat, alia potesta-
te, quarum nempe sopita virtus, ac intus delitescens
non nisi à nostro calore suscitata depromitur, (in
corpore namque mortuo vt mortua & otiosa manet) & in actum
exurgit: Et quælibet mixta cuiuscumque sint qualitatibus, primo ap-
pulsu frigida percipiuntur, vixque contrectando folia cicute, aut
pyrethri, erucæ aut oxalidis agnosces, nū hæc illis, vel his illa cali-
diora sint, aut frigidiora.

*Actu quæ
sunt.*

*Quæ pote-
state.*

Per se quoque agere dicuntur, quod enērgia & actu vim suam ex-
peditissimè communicent, & statim immuteat, vt ignis, & ferrum *Quæ per
se.*

candens; quod per accidens etiam calefacere dicitur: nam vt ferrum
quæ peras- deberet refrigerare, sed per accidens ignitum vrit.
cidens.

quæ com- De medicamentis autem medici loquuntur, quæ & potestate &
paratè: comparatè talia iudicantur, quatenus scilicet ad corpus symmetrum
id est humanum comparatur. Omnes siquidē stirpes, vt & alia mixta
in suo genere perfecta sunt, sed ad hominem cuius vsui inserviunt,
relata quædam dicuntur calida aut frigida, alia calidiora aut frigidio-
ra, quædam calidissima, & nonnulla calidissimis calidiora vt quæ
adurunt & venena censentur, è censu medicamentorum expuncta.
Sic statuendum de alijs qualitatibus, quæ quò longius ab eucrasia &
nostra temperie discedunt, eo insalubriora & inimiciora nobis di-
cenda.

quatuor
gradus me-
dicamen-
torum. Quatuor autem medici qualitatuum gradus, seu ordines constitue-
runt, primus is dicitur qui obscurè talis est, vt exempli loco, medi-
camentum seu simplex, seu compositum, de vtroque enim eadem
est lex, primò gradu calefacere dicitur, quod tam ignauè id præstat,
quæ 1. gra- vt parum discedere à tēperamento tēperato dicatur, cuiusmodi sunt
du calef. iuiubæ, ficus, passulæ, pistachia, amigdalæ, oriza, semen lini glycyrrhiza,
oleum dulce, saccharum lac & similia.

quæ 2. gra- Quod secundo gradu calefacit, vel refrigerat, vel humectat, aut
du calef. siccatur, iam id manifestè præstat, vt inter calefacientia nux moscha-
ta cinnamomum, calamus aromaticus, cyperus, maiorana, anethum,
anisum, coriandrum vinum. &c.

quæ 3. gra- Quod agit tertio recessu, vehementer & importuno sensu vires
du calefac. suas promit, vt piper, galanga, zinziber, enula campana, iu-
niperus, thymus, ruta, sabina cum iumamomum aron at infinita
alia.

Quæ 4. gra- Quod ordine quarto suas actiones promit, violentum est vt in-
du calida. ter calida euphorbium, flāmula, synapi, cupficum, lepidium, py-
rethrum ranūculus bulbosus, laureola & alia multa, quæ ma-
ximam feruoris impressionem partibus relinquunt.

Quæ vltra hos recessus calida sunt, vt calx, sublimatum, arrheni-
cum, pyrotica intus non sumuntur, nec nisi maturo consilio ad-
hibentur, extrinsecus, cum venena sint, aut venenis affinia.

quæ gradu
1. frig.

Eadem est de alijs qualitatibus doctrina. Gradu primo refrigerant
gramen, hordeum, malus, atriplex, rosa, viola. secundo cucurbita
cucumer, endiuia, solanum hortense, lactuca, lens palustris, plan-
tago. Tertio, nenuphar, hyosciamus, semperuiua. Quarto, man-
dragora, opium, cicuta. Ne verò nimius sim in exemplis adducendis
de alijs qualitatibus subitico, cum facili sit ex dictis, quænam me-
dicamenta humectant vel siccant, primo aut secundo recessu, vel
tertio aut quarto dignoscere. Vix tamen vlla ex se quarto gradu sic-
care dicuntur, nam quæ summè siccant, ad humidi radicalis vsque
dissipationem, id agunt potius adiuncta caliditate, quam siccitate
natiua

natiua & peculiari. Quod dixi de simplicibus medicamentis, idem de compositis iudicandum, quæ prout nos obscure, vel manifestè, vel vehementer, vel summè nos afficiunt calida sunt, vel frigida, vel humida aut sicca, gradu primo, secundo, tertio, aut quarto.

Cuiusque verò gradus cum sit manifesta quædam latitudo, tres Graduum
partes. constituuntur partes, principium, medium & finis. Quædam enim dicuntur calida, aut frigida in principio secundi gradus: quæ scilicet parum desciscunt à primo, alia in medio secundi, vt quæ manifestè talia sunt, alia in fine eiusdem gradus secundi, vt quæ prope accedunt ad principium tertij gradus. Atque hæc conformitas finis cuiusque gradus cum principio sequentis efficit, vt quædam dicuntur à nonnullis calida aut frigida secundo gradu, ab alijs tertio, perinde ac finis hyemis affinis est principio veris, & huius finis principio æstatis.

Qualitates medicamentorum secundæ seu materiales à primis, vt Gradus se
cundus quatuor. sint, & vires suas magis aut minus exerant dependent; Nam aperientia, attenuantia ac incidentia pro ratione caloris adiuncti vel moderatè, vel validè aut validiùs agunt, incrassantia similiter pro comite frigiditate parum aut multum incrassant & obstruunt.


Cum autem secundarum qualitatum sicut & primarum disperfit agendi virtus, quædam enim obscure, alia manifestè, nonnulla potenter, & alia potentius agunt, in quatuor classes distinguuntur, Classes 4.
secund
qualitat. nam quæ aperiunt, incidunt ac tenuant vel occludunt, emolliunt vel obdurant, relaxant vel constringunt, rarefaciunt vel densant, exasperant vel læuigant, dissoluunt vel repellunt, hos sanè effectus primo gradu, aut 2. aut 3. aut 4. promere dicuntur: Nam exempli loco, aqua simplex astringens & percussivum, quæ ordine primo repellit & densat, succus plantaginis secundo, succus mirthi tertio, succi rhois obsoniorum, sorbarum, mespillorum & prunellorum immaturorum quarto.

De compositis medicamentis eadem lex statuitur, quæ si nolit Gradus
medic
pos. quis ex gustu explorare & dignoscere ex mixtorum sibi cognitorum concursu & congerie faciliè iudicabit. Nam eorum virtus vel est ignaua vel summa, & sic primo aut quarto gradu sese promit; vel medio modo, & sic secundo aut tertio: hoc quidem si propius ad quartum, illo si ad primum accedat. Notandum tamen aquam non nihil de sua conditione simplicibus ei admixtis & incoctis impertiri maximè si ipsius non exigua quantitas post coctionem relinquatur; calefacientium enim & desiccantium vim obtundit, refrigerantium augeat, fouet, aut certè nusquam infringit.

Quærent nonnulli cur medicamenta quædam quarto gradu calida, esculenta sunt & amica, vt piper & allium, & nonnulla frigida tertio tantum recessu interficiant, vt hyosciamus & semperuiua: Res- Quæstio
Solutio. pondendum, calida amiciora nobis, vita enim in calore consistit, &

præterea hyosciamus, papauer, mandragora, non tam primis qualitatibus agunt, nempe frigore, quam secundis, narcotica scilicet virtute, qua vitæ principia læduntur.

Sic breuiter satis & facile videor. graduum medicamentorum doctrinam peregrisse, quam Alchindus adeo prolixè & obscurè, vt tædium lectoribus adferat, & ferè nauseam inferat.



INSTITUTIONVM PHARMACEVTICARVM, LIBER SECVNDVS, IN QVO DE MEDICAMENTORVM præparatione agitur.

CAPVT I.

Medicamentis omnibus, vt alimentis, aliquam præparationem deberi.



ON modò medicamen compositum antequam ex multis arte & industria simul vnitis emergat, varia præparatione eget, sed etiam quod sua sponte & naturaliter tale est, ac simplex, ad vsus humanos vix refertur, apparatu quodam non immutatum. Alimenta etiam quibus vescimur, si assatione, aut cli-

xatione; aut alia præparatione conueniēti careant, belluarum magis quàm hominum videntur esse. Boum siquidem est & iumentorum fœno vesci & eruo, naturæ solius opera paratis; quæque simul & creat, & apparat maris insecta pisciculis, & piscibus pisciculos. At homini quasi ingrata tellus & malè feriata, neque vinum, neque panem porrigit, sed messoribus tantùm post indefessos labores & expectationem longam, triticum pollicetur, quo solo multa cœli volatilia, quadrupedæque nutriuntur c̄ptimè: Homo verò nequaquam, nisi ex eo, aqua & fermento conficiat panem. Homini enim non sufficit idem cibus ac potus, ait summus Dictator, qui boui ac equo, & omnibus alijs, veluti sunt ex terra nascentia, fructus, herbæ & fœnum ex quibus aluntur & viuunt. Nam differt corpus à corpore, natura à natura, alimentum ab alimento, inquit idem. Non enim omni animantium generi, eadem aut non conferunt, aut commoda sunt, sed sunt alia alijs magis conuenientia.

Medici panificium docuerunt.

Quæ verò nunc inuenta sunt edulia, multa arte sunt à Medicis ex-

lib. de
veter.
medic.
lib. de
flatib.

cogitata, qui ex tritico cortice purgato molito, cribato, subacto & cocto panem conficere docuerunt.

Si igitur esculenta, potulentaque hominis temperamento familiaria, præparatione quadam, vt assumantur, egent: multo magis medicamenta simplicia: De compositis enim dubium non est, cum talia esse non queant, nisi arte prius & præparatione multa condita fuerint ac concinnata.

Actua.
c. 7. l. 3. Inter simplicia autem quod catharticum appellatur, nature nostræ qualitatem aduersam habet, ac pene deleteriam, qua ratione tale est, & vincere, non vinci natum habetque medicamentum omne purgans quidpiam ipsi ventriculo & præcipuè stomacho infensum & ingratum. Proinde vt noxia vis ab eo remoueatur, aut gratia quædam ipsi concilietur, præparatione & correctione priusquam exhibeatur, eget, vt eius actio sit melior, & agro ipsi minus molesta. Nihil enim à natura gignitur, quod in hominis mensam trahi debeat citra quamdam præparationem.

Præparantur autem medicamēta, vt vsui & compositioni reddantur commodiora: Ea enim vel gratiora, vel validiora, vel salubriora, vel magis miscibilia, vt loquitur Syluius, efficit præparatio. Sic vtimur radicibus & folijs lotis & coctis, non crudis; vt etiam pulueribus, infusionibus, succis, aquis stillatitiis, liquoribus, decoctis, non plantis integris. Sic medicamenti facultatē vnā noxiā tollimus. vt cum viperæ virgis cæsæ, ac capite ac cauda abscissis, minus venenatæ redduntur: vel desideratam detegimus, vt cum sanguis hirci ad comminuendum calculum redditur efficacior, si prius saxifragis & lithospermo educatus fuerit: vel nouam acquirimus, vt cum capram aut asinam scammonio, esula, aut alijs purgantibus herbis alimus, vt lac purgatoriam facultatem nanciscatur.

De præparationum differentijs.

CAPVT. II.



MNIS medicamentorum præparatio generaliter fit tribus modis additione, detractiōe, & immutatione. Additione præparatur agaricus cum zinzibere & vino: coriandrum cum aceto: caro viperarum præmissis flagris cum pane & aniso. Detractione præparantur cantharides abscissis pedibus & alis: hordeum detractis glumis & cortice: amygdalæ dum mundantur: radices dum lauantur, purgantur, & illarum meditullia neruea eximuntur. Immutatione cum artificiosa quadam industria ipsum medicamentum sic paratur, vt vis eius noxia ab eo remoueatur, vel melius ipsum aut ad vtendum, aut ad componendum efficiatur. Indiget verò sæpe artificiosa ista præparatio alijs duobus modis, adiectione scilicet eorum quæ prosunt, & eorum detractiōe quæ obsunt.

Præparationes tantum tres generales.

Sic additur costoreum & crocus opio, vt illius malefica vis emendetur: sic cyaneus lapis vritur, vt illius pereat purgatoria facultas, antequam abeat in confectionem Kermeticam.

Quatuor
præparatio-
nes secun-
dum Me-
sicam.

Præparationis autem medicamentorum artificiosæ quatuor modi magis particulares à Mesue traduntur, coctio nimirum, lotio, infusio, & tritura; præter quos alij plures traduntur à Medicis recentioribus, qui Pharmacopœam excoluerunt, vt lotio, purgatio, infusio, humectatio, maceratio, dissolutio, clarificatio, emollitio, colatio, extractio, solutio, digestio, fermentatio, tritura, puluerisatio, confectio, rasio, limatura, fissio, coctio, calefactio, vstio, frixio, assatio, liquatio, putrefactio, insolatio, extinctio, refrigeratio, despumatio, exsiccatio, induratio, destillatio, digestio, mixtio, fartura, extractio, conseruatio, duratio. Generaliter tamen humectatio, maceratio, dissolutio, emollitio, & quæ aqua vel humido quodam emolliuntur, sub infusione solent comprehendere; puluerisatio, rasio, & quæ attritu læuigantur sub tritura; calefactio, vstio, frixio, & quæ igne aut calore parantur sub coctione: sicque infiniti pene præparationum modi ad aliquot summa genera facilius reducuntur.

Cohobatio
quid.

Spagyricis frequētes sunt isti præparationū modi, calcinatio, digestio, fermentatio, destillatio, circulatio, sublimatio, fixatio. Ad destillationē pertinet exaltatio, exhalatio, circulatio, cohobatio, rectificatio. Cohobationē vocant destillationē iteratam, qua liquor destillatus denuo affunditur ad suum caput mortuum, & rursus destillatur.

Quæ potissimum me-
dicamenta
probanda.

Verum relictis præparationibus chymicis, quas sæpè præstat scire quam experiri, medicamentorum solitos apparatus & principum medicorum salutaria remedia persequamur, quibus securè, ac sine metu periculi, quiuis ad morborum depulsionem & sanitatis tutelam vti possit: cuiusmodi sunt ea quæ à Pharmacopœis quotidie parantur ac coram omnium oculis parantur: atque vel in rem præsentem, vel ad multum tempus in officinis conseruantur. Ex his enim pro rei exigentis necessitate, modo hæc, modo illa seligit Medicus; & quantum & quale huic vel illi morbo conueniat abigendo, præscribit. Non verò parat neque præbet, sed fidus Pharmacopœus, qui propterea Medici manus vocatur. Sic enim tutius est sanitatem & vitam duobus committere, quam vni, qui dum solus medicamenta præscribit, parat & præbet, vt ius habet vitæ & necis, sic impunè sæpè occidit. Quod cum sit impium, instituendus est Pharmacopœus, qui solito more medicamina parat, & ad futuros vsus conseruet.

Chymica
remedia nō
negligēda.

Nolo tamen omnia Chymicorum remedia à Pharmacopolio ablegare: Multa enim sunt eximie virtutis ad plures affectus contumaces soluendos, sed quibus docti tantum debeant vti, non ignari circulatores & agyræ vafri, qui vix norunt antimonium calcinare & vitratum efficere, quin Galeno & Gebro doctiores se profiteantur.

Qui debeant
vti Chymi-
cis reme-
diis.

Ad rem igitur reuersus, varias esse dico medicamentorum præparationes; quas vt ordine persequar, initium sumam à lotione: mox de his acturus, quæ interdum cum aqua etiam simplici fiunt sepe cū medicamentaria vel alio succo aut liquore: Tum eos apparatus ostendam, qui iectu, aut attritu & confricatione perficiuntur. Quartò quos calor absoluit explicabo, quibus eos adiciam, qui mixto modo peraguntur.

Lotio.

Infusio.

Trituratio.

De lotionibus. CAP. III.



LOTIO medicamentorum vltimus est præparationis modus Syluio, quibusdam medius; nobis verò primus, quòd plura medicamenta priusquam vsui nostro inferuiant, ante omnem præparationem debeant primò lauari, licet quædam non nisi vsta, aut trita, vel pinsita abluantur.

Primus præparationis modus, & med.

Est autem lotio medicamentorum duplex, vna superficialia tantum, quæ sordes in superficie radicibus herbarum & aliorum medicamentorum simplicium inhaerentes detrahit: Estque communis etiam cæteris rebus, quæ luto, aut alijs inquinamentis conspurcatæ abluuntur. Altera verò magis intima, quæ scilicet fit foris & intrò, & per totam rei abluendæ substantiam; Fitque ea medicamentorum præparatio in aqua vel alio liquore ad noxiam quamdam qualitatem remouendam, vel vtilem aliquam introducendam, prout morbus, vel ægri natura, vel occasio postulat.

Lotio duplex.

Lotio quid

Res autem abluenda vel dura est, solida, & lapidosa, qualis est testarum, ossium, lapidum, succorum concretorum, lacrymarum siccarum, & metallorum; vel per se liquida, vt terebinthina, vt oleum; aut facillè liquabilis, vt cera, pix, resina, butyrum; aut dissolubilis, vt calx, bolus armena, lythargirium.

Quæ dura sunt & solida, antè lotionem tenuissimè puluerisanda sunt; aut vrenda, deinde terenda, si citra vstionem teri non queant, vt ebur, aut cornu: sicque humor aut liquor partem quamlibet attingit, abluit & purgat.

Quæ facillè liquantur, vt cera, prius calfacienda sunt, vt liquata faciliùs cedant, & permeabilia fiant. Si per se promptè dissoluuntur, aqua vel succo quodam perfundenda sunt, deinde lauanda. Si per se liquida sunt, talia sunt abluenda, qualia ipsa sunt.

Liquor autem in quo fit lotio, aut aqua pura est, vt fontana vel pluuialis; aut medicamentosa, qualis sulphurea, marina, bituminosa, vel alius humor, vt lac, vinum, acetum, succus plantarum, aquæ stillatiuæ, & decocta simplicium medicaminum. Est verò lotio vel multa & fortis, vel pauca & leuis, vel mediocris. Res enim quæ lauantur ad sordium detractionem, vel fortiter vel leuiter abluì postulat, toties aqua mutata, donec pura remaneat, & omnis impuritas fue-

In quibus liquoribus fiat lotio.

rit segregata & eiecta.

Imbutio
quid.

Quæ verò medicamentoſo liquore lauantur, ea in ipſo per noctē aut horas aliquot reſidere debent, vt ex liquore maiorem vim attrahant, aut malignam à ſe qualitatem magis abijciant. Abuſiue tamē lotio dicitur Syluius, cū ſit potiùs infuſio, aut maceratio, vel vt ipſe loquitur, imbutio. Liquor enim medicamento facultates vel non, vel rarò adfert, ſæpius aufert, vt in infuſo rheo videmus, cuius vis purgatrix in ſucco, aut liquore remanet.

Quid effi-
ciat ablu-
tio.

Aloë cur
abluatur.

Medicamenta autem non tam lauantur, vt eorum facultas aboleatur, quàm vt augeatur. Sic aloë lauatur, Meſuei iudicio, cum aqua ſpecierum aromaticarum, vt magis roboret; & aliquando cū decocto purgante, vt aluum magis ſubducatur. Non tamen ſemper lauatur, vt eius purgatrix facultas intendatur, ſed calor illius obtundatur, vt cū aqua endiuiz, vel cichorij, aut ſimili abluatur, ne iecur illius uſu nimium exaſtuat; frequentiùs autem nutritur, quàm lauatur.

Itaque lotio, medicamentis vel adfert, vel aufert, efficitque non modò, vt ſordes detergeantur, ſed vt acrimonia quorundam hebeſcat, malignitas pereat, violētia obtundatur, & ſœliciùs aſſumantur vel admoueantur.

Metallica
vt abluen-
da.

Tutiz lo-
tio.

Metallica vt commodè lauentur, debent tenuiſſimè leuigari, deinde in aquam puram, aut aliam medicamentoſam immiſſa, totum diem in feruido ſole rudicula commoueri, & per noctem reſidere: Manè verò aqua effunditur, & alia denuo affunditur, atque ſimul omnia, vt priùs agitantur, donec aqua tandem effuſa pura remaneat ac limpida: hocque pacto mordacitatem & acrimoniam, ſi quæ ſit, deponunt. Pompholix enim ſic lota, mordacitatis omnis eſt expers, atque ob id ea vtimur ad tenues & acres fluxiones oculorum, ait Galenus^a Idem ſentiendum de calcitide, miſy & pluribus alijs a cap. 2.
metallis, quæ uſta & lota acredinem multum remittunt, vt pluribus lib. 4.
docet idem 4. compoſ. med. gener. cap. 2. de cōp.

Cadmiz
lotio &
præpara-
tio.

Veteres cadmiam uſtam lacte aſinino mitigabant: Secundò & med.
tertiò vrebant & extinguebant, Tum in mortario diutiſſimè aqua local.
effuſa ducebant: ſiccata rursus bis aut ter in mortario cū aqua ducebant: Tandem ſiccabant, & ad vlcera oculorum ſiccanda, & arcendas fluxiones ſeruabant.

Vlceribus
oculorum
cadmia lo-
ta conue-
nientiſſima.
Ceruſæ lo-
tio.
Chalibis
lotio vul-
garis.

Ceruſa ſæpè in lacte lauatur, nonnunquam in aqua pluuiæ; & aliquando in ſtillatitiâ pro vario Medici ſcopo.

Vulguſ Pharmacopœorum chalybis ſcobem in aceto lauat, Ara-
bum conſilio, deinde ſiccatur in latere calido, vel feruente ſole; ſic lib. 3.
cam rursus ex aceto terit, ſiccatur vt ante: idque ſepties repetit. Iſte offic.
tamen apparatus ſimplex non eſt lotio, ſed multiplex præparationis phar-
modus. Laborioſius adhuc à Chymicis præparatur limatura ferri, mac.
quo ſuum Crocum martis efficiunt, de quo alibi diſſerimus;

Plumbum dicitur abluui quando aquâ pluuiâ in mortario plumbeo tamdiu pistillo plumbeo agitatur, ac ducitur donec aqua instar limi cuiusdam nigricantis crassescat : Tunc liuescens ille liquor colatur, exsiccatur, in pastillos formatur, & seruatur.

Plumbi lotio.

Adipes & medullæ liquantur, deinde percolantur, vt eximantur fibræ, venulæ & membranæ: Tum in aqua succussantur, quæ postea effunditur, & rursus alia affunditur donec pura remaneat.

Adipum & medullarum ablutio.

Iecoris lupi præparatio, illius lotio est & exsiccatio: Lauatur vino odorato simplici: sepe & eo in quo absynthium fuerit incoctum. Probè lotum exsiccatur in clybano, deinde cum absynthio sicco aut menta reconditur in loco sicco.

Iecoris lupi præparatio.

A quibusdam commendatur ad hepatis atoniam & imbecillitatem, illius tamen saporis & odoris insuauitas ita displicet, vt apud me vix commendetur, sed omnino reijciatur.

Eodem modo lauatur & seruatur intestinum lupi, sed in aëre tantum aquilonio exsiccatur. Laudatur à quibusdam proprietate speciali ad colicum dolorem, vt notauimus supra.

Oleum dum in aqua lauatur, non est multum verberandum, ne aquæ adeò misceatur, vt post ablutionem vix possit ab aqua separari, sed ita vt paulisper quiescere siueris, facile queas innatans detrahere, ait Galenus.

Olei lotio.

ca. 15. l.

2. Simp.

Resinæ, cera, pix liquantur primum ad ignem, deinde in aquam puram fontis demerguntur, vbi permouentur & expurgantur, ex Gal.

Resinarum & picis lotio.

c. 14. li.

1. Comp.

Med. gē

c. 58. li.

9 desim.

med. fa.

ca. 3. lib.

6. Meth.

Calx quoque licet vehementer vrat, abluta tamen bis, terque, mordacitatis est expers, & neruo puncto exquisitissimo sensu prædito salubriter admouetur. Melius nonnulli septies vel etiam pluries aqua noua abluunt, & postea cogunt in offas, quæ siccantur & seruantur.

Calcis ablutio.

Minutiùs autem singulas cuiusque medicamenti præparationes inuestigare superfluum, ac lectori onerosum videretur: tum quia de his iam fusissimè Syluius egit: tum quia in Officina nostra multas multorum medicamentorum lotiones, aliasque præparationes adiunximus, quæ compositiones in illa descriptas ingrediuntur.

De purgatione medicamentorum.

CAPVT. IV.



LOTIONE quidem sordes permixtæ medicamentis eluuntur, sed pars illorum inutilis, aut superflua, vel noxia non repurgatur. Millies enim elotum hordeum vix decorticatur; neque alia semina à suis glumis & inuolucris, nec fructus à cute accorticibus, aut nuces, à putaminibus, neque adipēs à suis membranis sola lotura repurgantur. Proinde cremor hordei, iussu Hippocratis, ab eo ipso prius mundato, seu cortice purgato elicitur. Et prudenter artis Pharmaceuticæ proceres semina quatuor frigida maiorain Catholici descriptione à suis squammis spolienda esse statuunt.

Radicum
purgatio.

In vniuersum omnia pœne medicamenta plus minùs repurgantur detractiōe, quæ non tam lotione fit, quam sectione, rasiōe, fractione, aut alia quadam artificiosa manus industria. Sic radicum cortex exterior abraditur, aut capillamenta præscinduntur, aut meditullium eximitur. Aliquando tamen medicamenta non quidem à cortice purgantur, sed cortex ab illorum partibus singulis tanquam superfluis vel inutilibus. Ex cynamomo enim sola cortex multum expetitur, ex zinzibere radix, ex santalis, lignum; ex cannis, medulla; ex capillaribus folia, ex rosis flores, ex pipere semen. Reliquæ partes ferè inutiles cum sint, repurgantur, vel minus expetuntur.

Malum Me-
dicum.

Eam ob rationem medulla fistularis secernitur è canna & seminibus passulæ purgantur ab acinis, dactyli à nucleis, ex rosis eiicitur lanugo, ex colocynthide semē, ex multis seminibus cortex, ex multis fructibus nihil. Cortex namque citri, seu mali medici succus, semen, odor, omnia vtilia.

Nucum
& amygdal-
alarum
preparatio.

Nuces & amygdalæ cum triplici induantur inuolucro, ter debent repurgari. Primum siquidem corium aliis crassius eximitur, dein nucamentum confringitur, tum quod proximè nucleum, tanquam amnios fœtum inuoluit; seiungitur.

Adipum
purgatio.

Debent verò in aqua calente macerari, & digitorum contrectatu confricari, vt faciliùs repurgentur: hordeum tamen vix exiit post macerationem, nisi multo pistilli attritu variè ductum fuerit ac commotum.

Metallorū
purgatio.

Adipēs vt purgentur à membranis frustratim solent diuidi & cultello aut digitis separari. Nonnunquam igne liquantur, & per linteam traiciuntur, sic enim pinguedo sola facilè transmittitur, remanentibus in linteo pelliculis & membranis.

Metalla solent repurgari attritu, fusione, & aliis præparationibus, de loqui-

de quibus postea fusiùs agemus. Quibusdam verò maior purgatio debetur, alijs minima, quib⁹ scilicet rei inutilis est perpusilla portio.

De infusione CAPVT V.



INFUSIO est præparatio medicamentorum, qua *Infusionis*
in humore aliquo nostræ intentioni conueniente, *vsus.*
medicamenta minutim incisa, aut trita infundun-
tur; idque per horam tantum, aut plures, vel dies,
vel etiam hebdomadas, pro varia medicamenti na-
tura, & Medicorum scopis. Quæ enim duram ha-
bent substantiam, compactam, & qualitatem firmiter substantiæ
inhærentem, diutiùs terenda & infundenda sunt: Quæ raram & im-
becillem, minùs.

Infusionis autem tres potissimum vsus traduntur; vt malefica vis
medicamentorum emendetur, aut penitus absumatur; vt bona me-
lior reddatur; vel vt eorum qualitas in humorem aut succum vten-
dum transferatur.

*Turpethi
præparatio
Mezerei &
Laureolæ
apparatus.*

Infunditur turpethum in lacte recens multo, deinde siccatur,
vt minùs ventrem, dum assumitur, torminibus exerceat. Mezereon
& laureola, quibus conueniunt, antequam dentur, in vino albo so-
lent infundi, dein siccari, vt eorum vis nimis effrena magis he-
bescat.

Radices quinque aperientes in aceto sæpe macerantur, vt visci-
dam pituitam magis incidant, & viam excernendo lotio dicatam
citiùs diducant. Semen vrticæ infusum in decocto tragacanthi, &
assumptum ad vitia thoracis (tussiculosis enim & asthmaticis pro-
dest) guttur, & alias partes quas permaneat, vrere desinit.

*Vrticæ se-
men quib⁹
conueniat.*

Maximè verò purgantia medicamenta & aromata infunduntur in
vino aut aqua simplici, vel in decocto cõueniente, aut aqua stillatitia,
vel succo ex plantis extracto, pro variis medicorum scopis, vt qua-
litates proprias amittant, & in succum aut liquorem transmittant.
Sic rheum, agaricus, & radix Mechoacana solent infundi, non mo-
dò, vt illorum virtus in liquorem idoneum abeat, sed vt melior red-
datur.

*Catharti-
corum in-
fusio.*

*Vinum hy-
pocriaticum.*

Ex vino simplici componitur hypocraticum, relictis in illo per
infusionem tynamomi viribus, ac dissoluto zuccharo. Sæpè tamen
cautè aliquid ex zinzibere permiscetur à Pharmacopolis, vt bibulo-
rum palato magis arrideat.

*Gummorum
infusio.*

Infunduntur in aceto, & interdum in vino gummi ammoniacum,
galbanum, opoponax & sagapenum, antequam vel accedant ad mix-
turam emplastri de mucaginibus, vel dissoluantur ad alios vsus.

*Florum in-
fusio.*

Flores nymphææ, rosarum, & violarum infunduntur in aqua
simplici calente, & inde colatura facta, & addito saccharo, sirupi
coquendo conficiantur.

De humectatioⁿe, alijsque infusionum differentijs.

CAPVT. VI.



Ad infusionem reduci solent humectatio, maceratio, infectio, seu tinctura: Ad humectationem immersio & irrigatio, seu inspersio. His enim modis humescunt medicamenta aceto, lacte, aut aqua, vel alio humore insuccata, vt commodiùs & fœliciùs in compositionem & vsum veniant.

Quæ medicamenta egeant humectatione

Vtilis est humectatio ad exotica medicamenta, quæ ad nos è longioribus plagis aduecta, sicciora sunt, & minùs succulenta: Proinde natiuam humiditatem resarcimus vel fouemus immersione leui, vel irrigatione: Sæpe etiam sola repositione & asseruatione in vdo loco vt cum cassia in cella vinaria asseruatur, vel theriaca in pyxide plumbea reponitur, ne vis illorum tam citò exhalet.

Aromatum humectatio

Aromata etiam multa, vt caryophylli, ambra, moschus solēt humectari, si terēda sint, ne subtiliores partes ac magis odoratæ dissipētur.

Vtilissima verò est humectatio ad condiendos fructus, atque à corticibus repurgandos. Amygdalæ enim siccæ, vt facilè exuantur, aqua tepente prius humectandæ sunt. Et nuclei pinei, & nuces virides, ante condituram pluries in aqua sunt infundendæ, humectandæ & macerandæ, vt illarum acrimonia & amaritudo retundatur. Mitescunt enim omnia, quæ insignem habent qualitatem, si in aquam, aut alium liquorem sæpe immergantur.

Caphura, colocynthis euphorbium, & alia pleraque pulueranda, ante trituram pauco oleo amygdalino aut alio humectantur, vt cōminuantur facilius, & eorum vis difficilius expiret.

Ad humectationem reducitur irrigatio, quæ velut parua quædam humectatio est. Quæ enim improbantur, vt sicciora, leui aspergine humescunt, & vsui sunt aptiora.

De Nutritione. CAPVT VII.



IX probabili ratione medicamenta dicuntur nutriri, nisi quatenus mutua appositione duorum vel trium, aut plurium medicamentum aliquod accretionem capeffit, quam vulgus Pharmacopœorum nutritionem vocitat. Fortassis etiam id nominis inditum est, quia medicamenti miscendi, vt nutriti nutrimenti fieri debeat alteratio.

Nutritio humectationi affinis

Est autem nutritio humectationi non multum dissimilis: In vtraque enim humor aliquis, aut succus necessario permiscetur, sed qui copiosus est in humectatione, in nutritione paucus, in qua non affatim, vt in illa, sed paulatim ac subinde affunditur.

Nam quod semel humore pauco irrigatum est, illico siccatur Sole, aut igne, de in adhuc humectatur, atque ter, quater, aut quinquies iterum irrigatur. Quemadmodum Sarcocolla lacte mulieris, aut asinae nutritur, sed pauco: copiosiore enim lactis copia macerata liquatur, acescitque lac ante sarcocollae desiccationem.

Sarcocollae nutritio.

Spagyrici solent metallica humore cognato certo modo apparato nutrire, ut facilius liquecant, aut diluantur; vel succo velut nutrita & aucta tumescant.

Ad confectionem vnguenti crudi, seu de lithargyro, quod paratur ex parte vna lithargyri, quatuor olei, & aceti quinque, tandiu terendo nutritur his succis lithargyrus, ut in vnguenti consistentiam absque ignis ope, & ceræ mixtura coeat.

Vnguentum crudum quibus conficitur.

Radices multae nonnunquam vino, interdum aceto irrigantur, ut turgeant, quemadmodum & myrobalani lacte nutriuntur aliquando, vel alio liquore pro vario Medicorum proposito.

Mirobalanorum nutritio.

Aloë nonnunquam nutritur decocto aromatum, aut alio liquore idoneo pro Medici scopo: Sepissimè verò succis herbarum, foliorum & florum, ut rosarum vel rubrarum ad robur, vel pallidarum ad purgatricem eius vim augendam: aliquando in succo endiuiae ad calorem ipsius mitigandum. Dissoluitur autem primum in succorum ipsorum aliquo, deinde exsiccatur: teritur rursus, eademque succi eiusdem portione diluitur, agitur, nutritur, & denique exsiccatur, atque hoc toties iteratur, donec succi aut liquoris expetitam quantitatem aloë ebiberit.

De maceratione, infectione & digestionem.

CAP. VIII.



MACERATIO humectationi tam finitima est, ut pro vno eodemque præparationis modo vsurpentur. Ad eosdem enim vsus, & eodem artificio medicamenta infunduntur, humectantur, & macerantur: longiori tamen spatio temporis est opus ad macerationem; flores enim populi & semen abietis, Galeni consilio, macerantur oleo, sæpè tres, aut quatuor, vel plures etiam menses: postea oleum exprimitur, ad omnem lassitudinem soluendam aptissimum.

Oleum a-copum.

Zinbiber, radices duriores, amygdalæ virides & duri fructus antè condituram tanto tempore macerantur donec mollescant, vel inutilem aut ingratam qualitatem amittant.

In syrupo de papauere simplici macerantur capita papaueris in aqua diem integrum aut alterum, & sæpè triduum, donec tenerescant, & illorum qualitas ad aquam transmittatur.

Syrupus de papauere.

Lignum pali sancti, & illa radix peregrina quam Orientales Indi

Gaiacum.

Radix Chi- Lampatam vocant, suas qualitates vix suggerunt, nisi longa macera-
 na. tione prius maduerint ante concoctionem.

Idem fit in cæteris lignis & radicibus, quæ diutissimè macerantur
 in apto liquore, vt vires eorum, qualescunque sint, in decoctum
 aut aquam transmittantur.

Dactyli tres dies integros aceto macerantur, Mesuei decreto, an-
 tequam ad Diaphœnici mixturam trahantur. Macerantur quoque
 tamarindi & mirobalani in sero lactis capræ, aut aqua, vel succo cõ-
 ueniente, ne lædant stomachum, ait Mesue, & nocumentum emen-
 detur.

Infectio seu Affinis quoque est infusioni, humectationi, & macerationi tinctu-
 tinctura. ra seu infectio: quæ enim inficiuntur, debent in succum quemdam
 immergi. Non tamen semper medicamentum immergitur, vt colo-
 rem solum acquirat, sed etiam qualitatem præstantiorem, vt cùm
 sericum crudum succo cocci baphicæ tingitur, antequam confectio-
 nem Alxermes ingrediatur, vt vim magis cardiacam nanciscatur,
 coloremque magis rubellum, imò totum ipsum quod habet lauda-
 bile, ab eo succo mutuatur.

Digestio. Ad macerationem adhuc digestio reduci potest, per quam res di-
 gerenda vase, tanquam ventriculo includitur, & maceratur, eiusque
 pars minùs & tractabilis, & mitis edomatur digerendo, & mitior e-
 uadit, atque operibus aptior, superaddito, vino, vel aceto, vel oleo,
 aut succo conueniente. Latius tamen patet Chymicis digestio, sub
 qua rectificationem, insolationem, & nutritionem aliquando com-
 plectuntur.

De tritura. C A P. IX.



V M medicamenta per se dura & solida lassumi, vel
 cõuenienter adhiberi non queant, à Pharmacopœis
 tanta industria solent præparari & immutari, vt eorũ
 vsus sit postea facilis & salutaris. Ea enim ipsa per-
 cussu vel friatu comminuunt, & in puluerem redu-
 cunt, aut tenuiorem, aut crassiolem, pro vario Me-
 dicorum proposito.

Tres scopi
 triturationis.

Sunt autem tres præcipui terendorum medicamentorum scopi, vt
 alijs nempe medicamentis exactè commisceantur, vel vt ipsis noua
 facultas conquiratur, vel vt malefica corrigatur.

Terendi mo-
 dus varius.

Modus verò terendi plurimum varius; multa namque in mortario
 lapideo, vt marmoreo; alia metallico, vt ferreo, aneo, plumbeo, &
 aliquando vitreo; alia in ligneo, vt buxæ, cum pistillo, simili ferè ma-
 teria concinato, teruntur. Pistillus siquidem ferreus mortario ferreo
 aptior est, ligneus ligneo, plumbeus plumbeo, vitreus vitreo.

Nonnulla minimè possunt ita exactè puluerati percussu,
 atque friatu, qui fit super lapidem planum, ac marmoreum vel

potius porphyrium, cui pistilli loco apponitur parua mola marmorea, quæ manu concepta, hac illac circumducitur, vt nihil intactum ex medicamento terendo relinquatur. Hocque modo gemmæ, & lapides pretiosi solent læuigari, donec amplius nulla digitis inæqualitas percipiatur. Sic læuigatum puluerem vulgus porphyratum vocitat; quo modo solent ea medicamenta attenuari, quæ vel tabellas cordiales, vel vnguenta ophthalmica ingrediuntur.

Gemmæ autem in mortario porphyrio teri debent, non in marmoreo, quod atterunt sæpè ac permeant nonnulla mineralia, vt potè duriora, sicque nonnihil interdum ex ipso marmore referunt; Cadit namque mollius duriori, imbecillius validiori.

Gemmæ
tritura.

Quædam molis versatilibus colliduntur seu moluntur, perinde ac triticum aut hordeum in pistino. Sic enim magna seminum duriorum quantitas facilè & paucò tempore colliditur, & in pollinem abit.

Quæ mul-
tam trituram
desiderant.

Pauca autem debet esse tusio eorum medicamentorum, quæ ad coctionem tantum apparamus, atque eorum quæ raram habent texturam, & virtutem facilè dissipabilem, quæ nimirum multa tritura exoluuntur promptè, cuiusmodi sunt flores pene omnes.

Multam verò trituram patiuntur medicamenta dura, crassa, solida, neruosa, & fractu contumacia, quæque maligna qualitate participant, vt colocynthis, quæ cum læuiter trita sumitur, eius portio crassior gyris intestinorum inhærens, partem eam exulcerat, ac dysenteriam mouet.

Quæ mediocri substantia constant, vt aromata multa, moderatè terenda sunt, ne tenuior eorum portio ac magis odorata exhalet, atque dissipetur. Si quando tamen ad electuarij alicuius cōfectionem trahenda sint, tunc tenuissimè læuiganda.

Quæ partes remotissimas petere volumus, in pollinem reducenda: si eadem in ventriculo, intestinis, & primis venis diutius immorari, nec promptè vasorum ora subire cupimus, crassiusculè pulueranda, modò nulla sint prædita maligna qualitate. Nonnulla quoque læuissimè terantur, vt citiùs id actu sint, quod potestate esse dicuntur, hoc est, vt celeriùs suas vires exerant.

Quæ te-
nuissimè
læuiganda.

Radices & herbæ nunc teruntur virides, nunc siccæ, nunc crudæ, nunc coctæ in varios vsus. Semper verò mediocriter teruntur dum concoqui debent. Maior tamen tritura radicibus, quam foliis semper debetur, fructibus minor; seminibus mediocris. Medio siquidem modo inter herbas & radices semina teri desiderant.

Porro multa vix possunt sola in puluerem reduci, nisi quid admisceatur, vt pomum colocynthidos, sericum crudum, caphura, & alia multa, quæ terendo latefcunt, si quid ex oleaginoso non superaddatur. Nonnunquam vino quædam irrorantur, vt etiam aquæ

Colocyn-
this, ca-
phura & se-
ricum quo-
modo faci-
lè terenda.

tantillo, tum vt commodiùs teri possint, ac puluerari, tum vt fœli-
ciùs intentioni nostræ inferuiant.

Partes animalium duriores, vt ossa, cornua, & ungues: Si affa-
tione, vel vstione, vel alio modo torrida sint, puluerantur faciliùs.

Malè seri-
cum aduri-
tur, vt pul-
ueretur.

Sunt qui sericum crudum, lanam & pilos animalium ante tritu-
ram adurant, sed vires amittunt priores, & nouas conquirunt. Pro-
inde minutim præstat eadem secare, dein valenter terere, & in pul-
uerem minutulum reducere.

Quæ pistil-
lo vix queūt
puluerari.

Semina quædam oleosa, vt quatuor frigida maiora, quia sub ictu
pistilli percutiētis latefcunt, ac pinguescunt, minutim crebrò cultel-
li verberatu inciduntur, cortice tamen antè spoliata.

Multa gummi, lacrymarum, & succorum genera fibrosa, & velut
coriacea, ac fractu & solutu contumacissima, atque per se sicca mi-
nùs, quàm vt sola puluerari queant, minutim inciduntur, dein cum
aliis ficcioribus teruntur. Tragacanthum, mastiche, gummi Arabi-
cum, thus, sarcocolla, & succi qui lentum retinent humorem, non
facilè tundendo puluerantur, nisi pistillus velut friando per fundum
ad latera mortarij ducatur, & in quibusdam priùs affusis aliquot
aquæ guttis.

Quæ facile
ac citò læ-
uigantur.

Quædam adeò sunt friabilia, vt etiam digitis summis attrita citò
læuigentur, vt amyllum, agàricus albissimus, & multæ terrarum spe-
cies, Alia & validè & diutissimè contundenda ac terenda antequam
in vsum veniant, quæ scilicet crassam, duram, ac compactam habēt
substantiam & virtutem profundam, ac validam, & agrè vanescen-
tem, vt metallica, ligna, ossa, cornua: hæc enim omnia tundendo
vix puluerantur.

In genere autem quæcumque validam concoctionem postulant,
eadem & maiorem trituram: & quæ minus aut mediocriter coquen-
da minùs quoque vel mediocriter terenda.

Debet verò inter terendum corio quodam aut charta mortarium
operiri, ne dum aromata aut gemmæ teruntur, pars subtilior exha-
let, aut fragmenta foras euolent & pereant: vel dum euphorbium
& veratrum puluerantur, tenue pollen nares aromatarii molestè
feriat, & sternutationem moueat importunam.

Is verò seruandus est ordo, inquit Syluius, in medicamentis pul-
uerandis, vt primùm iniiciantur in mortarium crassa, dura, lenta,
dein minùs solida, tandem quæ pistillo minùs reluctantur.

Puluis plū-
bi.

Plumbum sic ex Fernelio pulueratur. In laminas tenellas pri-
mùm ducitur, quæ minutissimè concisæ, aceto quàm acerrimo im-
merguntur, maceranturque triduo, permutato quotidie, si vide-
tur, aceto, postea exemptæ, & igni siccatae citra vstionē, in morta-
rio laboriosè teruntur, sic tandem in tenuissimum puluerem redi-
guntur, cuius vis eximia est ad maligna vlcera blandè corrigenda,
expurganda & ad cicatricem perducenda.

cap. 16.
lib. 16.
method.

Facile quoque pulueratur, si ipsius scobs super Porphyrio diutissime moluta cum aqua rosarum teratur: Sic namque in puluerem reducitur. Ex illius adhuc liquati lib. i, cui hydraigyri ʒiii. ex arte permiscebuntur fiet puluis plumbi.

De varijstrituræ speciebus.

CAPVT X.



T multiplex est materia terenda, sic multiplex ac varius terendi modus, non solum enim medicamenta comminuuntur terendo, molendo, ducendo & friando, sed etiam atterendo, confricando, secando, frangendo, radendo, limando: hinc trituræ multæ species constituuntur, quæ pistillo quidem & mortario minimè peraguntur, sed alijs instrumentis, vt cote, malleo, securi, scalpro, lima: vnde attritio, confricatio, sectio, fractio, rasio, limatio.

Plin. Attritio dicitur Syluio præparationis quidam modus, quo medi- Attritio.
cap. 7. camenta nonnulla in cote medica, qualis ad nos Naxia ex Cypro
lib. 16. insula aduehitur, atteri solent, vt lapis Iudaicus, aut collyria in pa-
 stillos formata & sicca, quæ ad cotem cum aliquo humore idoneo,
cap. 4. confricantur, vt materia hoc apparatu tenuior facta dolentem ocu-
lib. 4. lum cui adhibebitur, minimè lædat vel exasperet. Galenus.

cap. me- Atteritur nõnunquam butyrum in mortario plumbeo, cum pi-
dic. lo- stillo materiæ similis, donec similem colorem acquirat, ad prurigi-
cal. nem, & cutaneos affectus mitescendos; sicque butyri qualitas non
 communicatur plũbo, sed plumbi qualitas isto attritu butyro per-
 miscetur. Idem sentiendum de cæteris liquoribus aut succis simili-
 ter in simili materia attritis.

Confricatio leuis quædam est attritio, per quam res facile pulue- cōfricatio.
 rabiles, digitorum friatu, aut solidioris corporis confricatu citò læ-
 uigantur, vt amyllum, aut cerusa, quæ statim vt confricantur, pulue-
 rantur: sicque confricatio & attritio secundum magis & minus
 tantum discrepare videntur.

Sectio.
 Ex arboribus radices & ligna primum serra aut securi præscin-
 duntur, dein ad Pharmacopolium aduecta minutius secantur, vt in
 pyxidibus aut folio commodius queant asseruari; tandem minutuli
 fiunt pulueres vsibus nostris inseruiendi. Ossa, ungulæ, cor-
 nua hisdem ferramentis diuidi solent, vt frustulatim vaneant:
 vsus tamen tempore, scalpro rasorio, & tusione assuescunt læ-
 uigari. Hic autem apparatus qui per sectionem fit ab instituendo
 Pharmacopœo non parum remotus censetur, cum potius ad medi-
 camenti venditorem quam emptorem spectet: Proximè tamen ad

eum spectat subtilior illa sectio, per quam semina oleosa, vt cucumeris, citrulæ, melonis, peponum, pistaciorum & similium, scalpro sutorio, huc, illucve identidem inclinato, vel frequentissimo cultelli verberatu in tenuissimas partes inciduntur, pro Medici instituto.

Secantur crassiusculè forcipibus aut cultello radices multæ, caules, & folia plantarum, antequam terantur, vt elixentur ad medicinales vsus.

Fractio.

Franguntur herbæ tenellæ, dum manibus præhensæ intorquendo trahuntur: partes verò illarum sicciore nonnisi extremis ad sese adductis per medium quasi crepitando abrumpuntur. Mineralia sæpè casu franguntur, sæpiùs industrioso percussu.

Fissio.

Finduntur eo modo radices cultello, necnon caules multi, quodoliarum sua vimina findunt. Crassiora & duriora ligna interdum ascia egent, interdum & cuneo ferreo, & malleo.

Rasio.

Raduntur multæ radices tum ad corticem eximendam, tum ad inutilia expurganda. Ligna verò seu duriora, vt buxus, guaiacū; seu minùs compacta, vt xylo aloë, santala, dentes apri, cornua cerui, vnicornis, & Rhinocerotis, vngulæ Alces, priapi animalium siccati, & pleraque alia, vt faciliùs postea puluerentur, vel coctione suas vires in humorem transmittant.

Rheum, agaricus, zinziber, nux moschata & zuccharum sæpè lamina ferrea, incurua, multis exasperata foraminibus abraduntur: Nonnunquam & mala cytonia, vt ex his maior succi quantitas eliciatur, quàm si in mortario terantur, inquit Syluius.

Limatio.

Limantur præsertim metalla, quæ rasione aut tusione puluerari non queunt, diutissimè namque percussa, vel tudi aut pistillo non cedunt, aut latefcunt potiùs quàm laeuigentur.

Aurum & argentum ideò limantur, vt illorum scobs minutula citra preparationem aliam exhibeatur. Chalybs, ferrum, æs plumbum ferè limantur, vt vrantur, atque postea teruntur, vt rei exigenti inferuiant. Limantur & dentes, vel veriùs cornua elephanti, ossa caluariæ humanæ, & quædam ligna perdura: sic enim minutiùs quàm rasione diuiduntur: nam limaturæ ramentis sunt tenuiores.

De Coctione.

CAP. XI.



T medicamenta gratiora, salubriora & vsui ac compositioni magis idonea reddantur, solent concoctione conuenienti commutari; Est enim coctio ^{Codtio} a rei concoquendę alteratio vel commu- quid.
tatio.

Eius autem tres ^b constituuntur differentię, maturatio, elixatio, & assatio, Sed quia maturatio ^{πένανσις} Gręcis dicta, naturalis quędam est coctio, hęc omittitur, quoniam de artificiali tantum agimus, ad quam elixatio, vstio, cal-
factio, frixio, despumatio, & quę calore mutationem quamdam ac-
quirunt, tanquam ad genus solent referri.

Pro rerum autem coquendarum substantia & viribus, fit coctio leuis, aut valida, aut mediocris. Quędam enim leuem tantum coctionem sustinent, quorum scilicet virtus longiore coctione facillę resoluitur; vel quia imbecilla est, aut in superficie posita, aut quia rara substantię textura constant, vt semina quędam, aromata multa & flores pene omnes.

Alia longiorem coctionem desiderant, vt quę contrario modo affecta sint, quorum nempe virtus non facillę resoluitur; aut quia valida est, ac firma; aut quia in substantia crassa ac densa resider, aut quia in profundo est sita: cuiusmodi sunt radices, ligna gummi, lapides, & acria, vt cepe & allium, quę coctione mitescunt. Quędam mediocrem coctionem patiuntur, quę inter dicta extrema media sunt, in substantia & viribus, vt santala omnia, iuiubę, passulę, tamarindi, molliusculi fructus & semina multa.

Coctio autem quę fit in humido a calore moderato, elixatio dicitur. At humidum illud, cui medicamenta incoquantur, magna ex parte aqua est, eaque verę simplex, vt communis, vel medicamento-
sa, & composita, ad quam reducuntur lixiuium, hydromel, lac, serum, vinum, acetum, succi plantarum, aquę salis, vel sulphureę, & liquor omnis in quo medicamenta excipiuntur, & inco-
quantur.

Est verò multiplex elixationis vsus; primò siquidem humorem medicamento excrementium coquendo resoluit; Vnde colocynthis & elleborus coquantur, ne molestę ventrem perturbent, & torminibus exerceant. Contrarium tamen accidit his medicamentis, quę leniendo & lubricando purgant, quęque cum plena sunt, eadem meliora, vt cassia & tamarindi: Coctione namque deteriora fiunt, quia humiditas illorum natia imminuitur, & vis purgatiua deperditur.

Secundo elixatio flatus crassos & mordaces ad nauseam

ventriculum laceffentes, ab eodem medicamento diffipat, vt in fenna, polypodio, carthamo, ebulo.

Tertiò acrimoniam, violentiam & qualitatem vlcerantem frangit, vt de scammonio fcribit Mefue, quod illius iuffu, in malo auftero, vt citonio, vel fucco rofarum coquitur, & præftantiùs redditur, vt omnia acria coctione fiunt meliora.

Quartò, vehementiorem medicamenti attractionem & maligniorem obtundit: proinde elleborum album, & medicamenta valentiora incoquimus, vt illorum violentia fracta maneat; ficque omnia medicamenta redduntur benigniora, dum in aqua vel fuccis herbarum, feminum aut fructuum coquuntur.

Denique elixatio facultates medicamentorum diuerfas optimè permifcet, vt ex his omnibus vna refultet veluti concreta facultas: quæ fi fuerit imbecilla in planta quadam, leuius coquenda eft; fi potentior ac validior, validius; eoque magis quò fubftantia illius craffior, folidiorque fuerit. Idcirco primum ligna, dein radices, tertio femina, poftèa lignorum cortices, tum fructus, poftremò flores igne lento, tetri fumi experte concoquuntur, dum arida, duræque mollefcent, cætera contabefcant, & in aquam aut liquorem fuas vires deferant.

Ordo co-
ctionis me-
dicamen-
torum.

Quo modo
fiat apo-
zemati.

Tempus
coctionis.

Hic elixationis ordo femper tenendus in omni medicamentorum & maximè apozematum apparatu, quæ fiunt ex decocto radicum, foliorum, feminum & florum faccharo aut fyrupis quibufdam dulcorato.

Tempus autem coctionis, non vnâ horâ, aut aliquo temporis certo fpatio, vt quidam arbitrantur, fed vno artificis periti iudicio definitur. Quædam enim ad elixationem multum temporis, alia parum exigunt.

De affatione & frixture.

C A P V T XII.



ASSATIO eft medicamentorum cum fucco tantum proprio concoctio: Quo præparationis modo, carnes, radices & fructus fine aliquo humore aduentitio coquuntur.

Ea autem affatio fit modis pluribus: Carnes enim veru transfixæ verfatili ad ignem coquuntur; vel catino figulino exceptæ in clybano; vel fuprapofitæ crati fuppositis prunis ardentibus affantur. Radix quoque betæ nigræ fub cineribus affatur, vt & caftanæ in pertufa fartagine: Sed hæc cuncta magis ad popinam quàm pharmaciam pertinere creduntur.

Beta Ro-
mana.

Affantur verò medicamenta multa, vt qualitatem inutilem deponant & retineant falutarem: alia vt fiant mitiora: nonnulla vt

faciliùs & citiùs puluerentur. Sic rheum affatur aliquando, vt minùs sit purgatorium, & valentiùs astringat; quemadmodum & scylla, vt illius vehementia obtundatur, qua interanea lædit, ex Dioscoride. Sic & cerebella passerum affantur, vt sicciora sint & magis pulverabilia, vt commodiùs his permisceantur quæ venerem suscitant.

Cerebella
passerum
venerem
excitant.

Multa quoque præparantur affando, vt copiosa & excrementitia illorum humiditas absumatur. Dum verò super tegulam ignitam, vel in furno, aut sartagine affantur, cochleari, aut rudiculâ quadam ferreâ debent versari, ne vrantur, atque amoueti antequam nigrescant.

Hoc autem discrimine dirimuntur inter se affatio & frixio, quòd illa fiat cum succo proprio, hæc vero cum aduentitio, vt cum oleo, butyro, vino, aceto, aut alio succo vel liquore, quo modo multa alimenta friguntur, vt fabæ & cicera, tum vt suauiora sint, tum vt flatum magis deponant, ex Galeno.

Fruxio.

cap. 29.
lib. 2. de
Alimen-
tis.

Coriandrum frigitur, hoc est, præparatur cum aceto, vt illius qualitas cerebro noxia obtundatur. Frigitur & viticis semen, vt flatulentus magis discutiatur, & venereos appetitus inhibeat. Nonnulla verò friguntur in oleo amygdalarum dulcium, vt myrobalani citrini, chebuli & nigri in compositione Trypheræ Persicæ. Alia in omphacio; Et quædam in vino, aut alio succo, pro vario medici scopo, vt qualitatem meliorem acquirant, vel deteriorem amittant.

Coriandri
præparatio.

De Vstione. CAPVT XIII.



VLTIMA medicamenta præsertim solidiora, vt mineralia, vel quæ malignam habent qualitatem, priusquam veniant in vsus humanos vruntur. Nonnulla etiam vruntur, vt citius queant puluerari, vt ossa, cornua, vngues, sericum, & pili animalium. Alia vt mutant colorem: Alia vt facultatem, & nouam nostro proposito idoneam nanciscantur. Multa acria interdum vruntur, vt mitescant, & acrimoniam amittant, & quædam non acria, vt eandem acquirant. Sicque acria, vt notauit Galenus, multum caloris amittunt vsta; At quæ eiusmodi non sunt, assumunt. Hoc probat exemplo calchanti, quod mitius, moderatiùsque redditur per vstionem. Nonnulla verò non acria, vrendo redduntur calidiora, & magis erodentia, vt fæx vini, hydrargyrus, calx cruda, & alia multa.

Inproe-
mio lib.
9. simpl.

Qua autem ratione idem efficiens effectus tam oppositos promat, sic sentiunt medicinæ proceres. Acrimonia acquiritur, aucto calore ad certum gradum, quem dum per adustionem excedant acria, suam acrimoniam amittunt. Quæ verò acria non erant, cum ad-

Dubij cu-
iusdam ex-
plicatio.

istum caloris gradum, seu secundum aut tertium peruenierunt, eadem acquirunt, quorum usus à Galeno improbatur. Laudat enim æs vstum rubrum, reiecit nigrum quod nimis sit vstum.

Spagyrici tamen malunt acrimoniam amitti vstione, propter dissipationem sulphuris & salis volatilis; acquiri verò in non acribus. dissulso sulphure volatili, cui nulla aut exigua erat acrimonia, ac remanente sale fixo, cuius acrimonia hebes erat & obscurata à sulphure ante vstionem.

Multiplex
vrendi mō-
das.

Porro varius est vrendi modus. Quædam enim in Clybano vruntur; alia in patina, alia in olla fictili cruda, alia in vrceolo æneo, alia in catino cupreo, & quædam in fornace aurifabrorum, vel in reuerberio Chymistarum.

Puluis lepo-
tis vsti ad
calculos at-
terēdos Vi-
perarū vstio

Vritur lepus in clibano, quo vsque possit in puluerem læuigari, ad calculos atterendos & saburram renum pellendam vtilissimū. Vritur viperæ, Galeni consilio, in olla noua ad salem theriacum, lepris & impetigini agresti discutiendis maximè idoneum. Sed inter vrendum cauendum est, ne vapor teter, ac venenatus cerebrum lacestat;

c. 2 lib.
ii. simp.

Vruntur animalia pleraque integra si pusilla sint; vel partes grandiorum, vt ossa, cornua, pili, pennæ, corium, ungues. Excipiuntur verò fictili nouo, & in furno, vel fornace, & interdum solis circum circa prunis subditis vruntur, donec facili negotio puluerari queant.

c. 33. li.
de the-
ria.

Rami arborum, arbuta, sarmenta, & multa simplicia per se accensa, interdum & vase quodam terreo aut metallico concepta, solent vri.

Puluis can-
ciorū vsto-
rū quos af-
fectus sanat

Canceri nonnumquam vruntur in sartagine ærea, quandoque in olla, sape inter carbones ignitos donec cinesiant; vel saltem quousque ex his torridis fieri queat puluis tenuissimus, qui commendatur ad cancerosos affectus, & eos qui à rabioso cane infliguntur.

Lapidum
vstio.

Lapides inter prunas ardentes à foliis excitatas vruntur. Cyanus tamen, Phrygius, & alij pretiosi in partes exiguas, ante vstionem frangi debent, & olla fictili, noua, operculo recta perforato, excipi, vt facilior exhalationi pateat exitus, dein tamdiu vri donec igniantur.

Vstionis
terminus

Vstionis enim terminus in quibusdam est ignitio. In alijs dum nihil fumidum amplius expirat. Multi tamen lapides ter aut quater igniuntur, & toties humore quodam suffunduntur ante trituran.

Facis vini
vstio.

Facis vini tamdiu torretur donec albescat, atque tantam acrimoniam acquirat, vt linguam & palatum quasi vrendo mordicet.

Quorum putamina, ostreorum, & limacum testæ, cornua & dentes animalium ita debent accendi, vt coflagrent, & albescant, & fiant puluerabilia.

Accendantur & vruntur nonnunquam resinæ, styrax, thus, pix, therebinthina & multa similia, vt ex his accensis fuligo quædam medicamentosa excipiat ad futuros vsus.

Alumen in patina ignita vratur, quousque bullas excitare desierit. Et calchantum donec colorem mutauerit.

Sal vratur olla exceptus & opertus ne exiliat. Exilit verò & strepit vrendo, donec perfectè crematus fuerit. Nitrum quoque est eodem modo vrendum.

ca. 103.
lib. 5.

Cerussa, inquit Dioscorides, trita in fictili nouo, flagrantibus igni carbonibus, assidue versando vratur, donec cinereum colorem traxerit: Tunc exime, refrigerato, vtitur. Vel, in patinis nouis super prunas vrito, & ferulacea rude moueto, donec colore fiat similis Sandarachæ. Quæ verò sic parata est, Sandix à quibusdam dicitur, inquit idem author.

Cerussæ præparatio.

Sandaracha.

Sandix.

Braſa-
uol. in
exam.
simpl.

Est autem Sandarach non quidem gummi iuniperi, quod vulgò vernix, & à Mauritanis Sandarax dicitur, sed species auripigmenti rubelli. Eadem enim in fodina Sandarach & auripigmentum effodiuntur: Imo simul mixta sunt, & vires easdem possident. Alio nomine Sandarach vocatur, à Chymistis Arsenicum rubrum vt & Auripigmentum, Arsenicum croceum. Porro Cerussa vsta in Sandica transit, ait Galenus, nunquam tamen in Sandaracham, quæ

Sandarach quid.

cap. 66.
lib. 9.
simpl.

est vrentis facultatis. Sandix verò nulla sui parte calefacit, sed potius refrigerat; Hacque pictores vtuntur, vt Cerussa, cuius colorem vrendo & aliquando acetum permiscendo variè permutant.

Vernix.
Sandarax.
Arsenicum rubrum.
Auripigmentum
Arsenicum croceum.
Sandarachæ vires.

cap. 53.
lib. 9.
simpl.

Auripigmentum torretur in testa noua, viuis carbonibus subiectis, assidueque versatur, donec igne flagret, & mutet colorem. Et

Sandicis qualitas.
Auripigmenti vitio.

c. 80. &
81. l. 5.

Sandaracha eodè modo vratur, & dos vtriusque eadem, ait Dioscor. Cruſtas enim cum vredine vehementi excitant, capillos euellunt, excrescentia reprimunt, & tubercula discutunt.

c. 45. l. 5
Dioscor.

Cadmia crematur carbonibus obruta donec translucida spectetur & scorix ferri modo bullet, mox extinguitur. Nonnulli exustâ terunt in vino, rursusque fictili crudo vrunt, donec pumicosa videatur: Iterumque tritam ex vino tertio vrunt, donec prorsus in cinerem redigatur.

Cadmix præparatio.

Pumex crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, & vbi canduerit, extractus vino restinguitur odorato: Iterumque incensus restinguitur, & tertia vstione exemptus, & per se refrigeratus ad vsus

Pumicis vstio.

ca. 125.
lib. 5.

conditur. Diosc. Vratur ærugo minutissimè fracta & comminuta in fictili patina flagrantibus prunis superposita, versaturque donec se mutet, & colorem cinereum concipiat.

Aeruginis vitio.

Ibidem
lib. 5.

Calcitis vratur fictili nouo viuis carbonibus superposito. Finis autem vstionis in humidioribus est, vbi ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & perfectè inaruerit. In reliquis verò dum mutata

Chalciteos vstio.

floridum colorem fuerit, & sanguineum aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est.

Chrysocolle patinis supra carbones vritur: Et Ochra cadmiæ modo. Dos Chrysocolle ad purgandas cicatrices: excrescentem carnem coërcet, astringit, excalfacit, & modicè corpus mordendo exest. Ochra verò astringit, erodit, collectiones & tubercula dissipat. Dioscor.

Plumbum
multis mo-
dis vritur.

Halitus
plumbi ce-
rebro &
neruis no-
xius.

Plumbum multifariam crematur. Antequam tamen vstionem experiatur, solet vel in scobem vel in laminas attenuari, dein fictili nouo excipi, & addito sulphure ita conflagrari, vt in cinerem perfectè redigatur. Interijcitur verò sulphur laminis, & dum vtrumque conflagratur, rude ferrea versatur; interea sedulo cremandum ne halitus plumbi nocentissimus naribus excipiatur. Cerebo enim multum obest propter admixtam hydrargyri portionem, cuius ratione neruos etiam lædit, & plumbarijs sæpè stuporem & paraly- sim inuehit.

Adijcitur verò, ad rem comburendam aliquando sulphur, aliquando nitrum, cum scilicet admodum valida est, & indomita rei compages. Alioquin volatilia eiusdem citius dissiparentur, quam fixa vincerentur à flamma, vt placet Spagyricis.

Vritur adhuc sic cito, ac facilè plumbum, in vase primum vel fictili, vel ferreo liquandum, à recrementis purgandum: dum ignis ita fouendus & augendus, vt vas candeat: tum assidua motione cum ferrea rudicula agitandum, vt in calcem abeat.

Et quemadmodum assatio finitima est vstioni, imo quoddam velut iter ad vstionem, sic vstio ad calcinationem, & calcinatio ad cinesfactionem. Propriè tamen cinesfactio rebus cremabilibus & flammis concipere natis competit. Ex mineralibus enim in quibus vix comperitur flammæ pabulum, vix cineres post vstionem relinquuntur; Ex lignis succensis, quid nisi cinerum cumulus? Equè tamen cremabilia & incremabilia possunt læuigari; Illa dum cinesciunt, hæc verò dum post vstionem puluerando, vel super tabula marmorea ducendo in alcool, seu pollinem leuissimum attenuantur. Hæc si lectoris animum non expleuerint, specialio- rem medicamento- rum, quorum est frequens apud nos vsus, vstionem, in officina pharmacopœorum à nobis illustrata comperiet.

De extinctione.

CAPVT XIII.



EXTINCTIO est ignitæ materiæ in aliquo humore suffocatio. Illa verò materia extinguatur sæpius vsta sæpè & ignita tantum; vt cùm gemmæ, & multa metallica, priùsquàm vrantur perfectè, vino, aceto, aqua simplici, vel stillatitia, vel succo quodam, aut liquore extinguuntur donec planè refrixerint.

Extinctio
quid?

Multa pluries extinguuntur, vt lapis pyrites; Nonnulla semel tantum, vt galla, & quædam extinguuntur ex se sola, citra materiæ cuiusdam humectantis affusionem.

Vueckerus Syluij transcriptor argentum viuum salua hominis ieiuni extingui dicit. Impropiè tamen non ignita dicuntur extingui, sed emendari, seu præparari. Præparatur autem hominis ieiuni salua emendatur salua: Nam vt melius alijs miscendis concorporetur recte salua cogitur, quæ tamen illius qualitatem nihilo meliorem efficit; Salua verò castigat & minùs efferam reddit. Dicitur enim salua quasi saluatric: Cerebrum namque & neruos plurimùm roborat, quibus argenti viui malefica vis plurimum obest, quæ succo saluæ debet emendari.

Auri massa sæpius ignita nonnunquam extinguatur aqua comuni, quæ vtiliter datur dysentericis ad occludenda vasorum oscula, & elephantiscis ad robur partium principum & exilarandos spiritus. Non enim temerè creditur aurum, vt exteriora reficere, sic & interiora.

Aqua extinctionis
auri.

Vt aqua salutaris est ad multorum effectuum profligationem, in qua pluries chalybs fuerit extinctus: Sic chalybs ipse in scobem reductus, ignitus & extinctus aceto, eximius est ad multos vsus, de quo alibi fusiùs.

Tanta vis est extinctionis, vt vires humoris quo aliquid extinguatur in se trahat & retineat. Sic Cadmia interdum vino, interdum aceto, pro varia intentione medici extinguatur: Et ferrum ignitum nonnunquam hydræleo extinguatur, vt magis ductile fiat, ad cassides & alia arma facienda. Aliquando verò aqua sola extinguatur, & magis fragile redditur.

De calefactione, insolatione & refrigeratione.

CAP. XV.

Calefactio
quid?

CALFACTIO est medicamentorum tam simplicium quàm compositorum præparationis quidam modus, quo ea ipsa non quidem coquuntur, aut vruntur, sed moderatè calefiunt, vel in sole, vel igne vel rerum putridarum calore, vt commodiùs percolentur vel malaxentur, vel misceantur, vel faciliùs & fœliciùs exhibeantur. Sic medicamentum infusum antequam percoletur, calefit, vt illius qualitas non modo tota in liquorem transmittatur, sed vt liquor promptiùs permeet, & totus eliciatur.

Clysteres colico dolore laborantibus præscripti, solent fœliciter à Pharmacopœis paulo calidiores iniici, modò non sit à bile; febrientibus vero tepidiores, ne feruor magis incandescat, sed mitescat. Et vomituriens aqua tepida bibenda datur, vt naturæ motum adiuet, humorisque fiat sursum per os facilius exclusio. Cum vix quidpiam actu frigidum debeat exhiberi, siue topicum sit remedium, vel intro sumendum, vt & balneæ, & ipsa lintheamina priusquam ægrotis inseruiant debent modicè caleferi. Multa quoque medicamenta calefactione indigent vt faciliùs terantur, misceantur, dissoluantur, & percolentur.

Insolatio.

Insolatio calefactioni tam est finitima, vt altera alterius vicem faciliè queat subire. Vtraque enim eundem effectum pollicetur, & instar cuiusdam coctionis est: vt cum circa caniculam, aut vigentibus cæli squaloribus, dies circiter quadraginta insolatur hydromel, vt sic magis concoctum vinosum reddatur. Non tamen ea arte sola fit vinosum, sed quod paratur ex libris quatuor aquæ fluuiatilis & vna mellis, tamdiuque coquitur ante insolationem, donec ouum crudum supernatet.

Hydromel
vinosum
quomodo
fiat.

Conseruæ recentes insolantur, vt omnes earum partes simul fermententur, & humidior quædã materia discutiatur: maximè verò quæ ex folijs & floribus frigidis paratæ, ad multum tempus debent asseruari.

Scyllæ succus, consilio Galeni, elicitur insolatione. Obscuro tamen cælo, igne extrahitur. Et quæ medicamenta insolari hyemis constitutio denegat, eadem igne calefiunt per hyemem, vt æstate per solem. ca. ult.
lib. de
puro
Epile-
ptico.

Olea multa ex infusione florum, vel rerum aliarum permixtione parantur, insolanturque diebus vel pluribus, vel paucioribus, pro infusæ rei quantitate & viribus. Calidiora namque & sicciora, aut nulla, aut pauca egent insolatione, frigida & humida diuturniore.

Par est ratio de aceto, varijs floribus alterato. Rosaceum enim diutiùs

diutius debet insolari, sambucinum minus, & quod allia, mentam & vetonica gariophyllata flores admittit.

Refrigeratio quoque medicamentorum ad apothecarium spectat. Refrigeratio.
Quæ enim post coctionem cogi desiderat, ea ipsa refrigerat, vt gelatinam: Quæ etiam calore præparata in pharmacopolio reponit, vt electuaria solida, conseruam siccam, & emplastra. In hoc verò differt refrigeratio ab extinctione: quòd quæ extinguuntur, refrigerantur, non contrà.

De putrefactione & Fermentatione.

C A P. XVI.

c.9.lib.
2. de
dif.feb.
& cõ-
ad par.
1.lib.3.
epid.



PUTREFACTIONEM ab externo semper oriri calore in materia humida, ex Aristotele docuit Galenus. Vt enim calor internus coquit, non corrumpit Sic quod omni ex parte siccum est, nunquam manifestè putrescit. Neque si quidem regula, nec aurum nec argentum putrefieri cernuntur.

Et quia putrida ab alieno calore talia sunt, putrefactio coctio quædam est, vt cùm medicamentosa quædam materia putrere relinquitur, in ampulla sepulta fimo, seu ventre equi, vt loquuntur Chymistæ (Sic enim forsan arti fictæ ficta nomina donant) dies triginta & aliquando quadraginta: qui postremus terminus ab illis vocatur mensis philosophicus, vt & liquor putrefactionis, menstruum.

Mensis philosophicus
chymicorū
Menstruū
quid chymicis.

Hunc autem præparationis modum Spagyrici tanquam peculiarem sibi vendicarunt; Galenus tamen multis sæculis ante illos natos, calcitim & lithargyrum ossa noua cum aceto excepta, & obruta fimo putrefieri docuit. Nostræ ætatis pharmacopæi Galenum quoque sequuti, furculos populi nigra plures menses macerant, & putrefaciunt, vel axungia porci, ad confectionem vnguenti populeonis, vel oleo ad medicamenta acopa, seu lassitudini conferentia.

Fermentatio non tantum ad medicamenta, sed potulenta & esculenta pertinet; fermentatur enim massa triticea subacta, vt ex ea panis conficiatur & suauior & salubrior.

Fermentantur vinum & zithum dum efferuescunt, fitque tunc sinceri succi à fecibus segregatio Fermentantur quoque syrapi, conserue & electuaria, dum recens parata in vasis efferuescunt.

Fermentatio

Sua est & chymicis fermentatio, quam interdum viuificationem & aliquando resuscitationem vocant. Per eam enim, inquiunt, velut ex mortuis reuocatur destructa materia, & vires acquirit nouas.

Talem fermentationem vani pollicentur aurifices ad metallorum transmutationem, sed fermenti materiam nondum norunt, nec conficiendi modum.

De dissolutione. CAP. XVII.

dissolutio



MEDICAMENTA variè solent immutari priusquàm exhibeantur, vt plurimùm verò cùm integra displiceant tritura quadam & dissolutione in succo quodam apparantur. Est autem dissolutio velut tritura quædam, per quam medicamenta tam simplicia, quàm composita diluuntur in humore quopiam idoneo, ad consistentiam mediocrem: & aliquando liquidiorē, vel crassiusculam pro varijs medicorum scopis.

Dissolutio-
nis vsus.

Ob varios autem vsus medicamenta dissoluuntur, primò vt faciliùs assumantur. Dein vt promptiùs alijs misceantur ad compositionem. Tertiò, vt citiùs distribuuntur. Quartò, vt in affectam partem penetrare valeant, & illic si fuerit opus diutiùs immorari, vt cùm in vterum, vesicam, intestina, aut vlcus sinuosum liquida medicamenta iniiciuntur. Quintò medicamenta dissoluuntur, vt postea queant percollari, atque vt illorum virtus ab excrementis repurgata, citiùs partes subeat interiores.

Lithontri-
ptica.Anacathar-
sis quomo-
do mouen-
da.

Sic medicamenta quæ calculos atterunt, dissoluuntur interdum in vino albo, aliquando in succo limonum & aqua parietariæ, raphanorum, aut simili, vt faciliùs renum cuniculos & vterum ductus possint peruadere. Contra quæ sputo mouendo imperantur; in liquore quodam spissiore, vt syrupo bechico dissoluenda, vt potiùs eclegma vel linctus, quàm potus appareatur,

Vt verò dilutioni inferuit tritura, sic & infusio, & sæpe calefactio. Quæ enim dura sunt, aut lenta, vel viscida, vix possunt dissolui, nisi priùs terantur aut infundantur, & sæpè calefiant ad ignem aut solem.

Sic multa medicamenta statim diluuntur trita, vt multæ terrarum differentia. Alia non nisi diu agitata, vt blactæ byzantiæ, conchæ, opium thebaicum, & infinita alia. Quædam maceratione & calefactione egent, vt gummi multa quæ vt dissoluantur, debent priùs aceto forti, vel aqua vini, aut vino generoso macerari.

Non quæ-
uis in quo-
uis liquore
diluuntur.

Nō autem in quouis succo aut liquore metallica atque etiam mineralia faciliè dissoluuntur, sed vel in succo limonū, vel aceto destillato aut aquis illis, quas Spargyrici valentes nominant. Ideoque non omnia in omni liquore dissoluuntur, sed in idoneo & quasi determinato. Therebinthina enim diem naturalem in aqua aut decocto ducta, vix vnquam diluetur, nisi quid ex ouorum vitellis superaddatur.

In summa liquantur igne axungia; medullæ, pinguedines vt dissoluantur, & ingrediantur faciliùs vnguentorum & emplastrorum compositionem. Diluuntur species aromaticæ in aquis cardiacis.

vel alterantibus pro Epithematis. Soluuntur catapotia, vel alia purgantia tam simplicia quam mixta in aqua vitæ, vel alia conuenienti, ad extractorum eliciendorum artificiosam sedulitatem. Denique solida quæ sunt, cum ea forma non possint aut debeant exhiberi, prius sunt atterenda, & idoneo succo aut humore dissoluenda, vt facilius & vtilius assumantur.

De liquatione.

CAPVT. XVIII.

cap. 6.
ar. 7. l.
meteor.



Ossvnt quidem omnia dissolui prius vt decet apparata, sed pauca liquari. Vruntur namque lapides, accenduntur ligna, concreta tamen cum non sint à frigore, haud quaque liquantur. Est enim liquatio, ait Arist. eorum, quæ à frigido concreuerunt in liquidiorum consistentiam ac fluxilem, à

Liquatio
quid.

calore facta solutio, vt adeps, medula, oleum hybernum, & similia, quæ cum leui frigore cocant, leui quoque calore funduntur.

Sed quæ vehementi ac diuturno frigore obriguerunt, ægerrimè liquefcunt, vt aurum, æs, & ferrum, quorum sanè fusio ad eos potiùs qui metallica quam qui pharmaceutica tractant, pertinet.

Differt autem liquatio à dissolutione, quòd liquatio semper fiat à calore, & sine aut rarò cum humore, dissolutio verò semper cum humore, & rarò cum calore.

Dissolutio
non nisi fit
cum humore.

A calore solo facilè liquatur plumbum, sulphur facilius, pix, & resina. In aqua calida nonnumquam liquantur sal, manna, saccharum, gummi hederæ, pruni, iuniperi, & pleraque alia, quæ sic sæpè funduntur, vt dissoluantur.

Chymici pyrothecnam illustrarunt, multaque adinuenerunt, quibus ars fusoria ditatur, vt cum illorum doctrina, sal ammonius semel sublimatus cum sale communi, postea bis per se, statim fluere facit dura metalla. Aliter quoque breui cuprum funditur, si inter liquandum aliquid vngulæ caballinae iniiciatur.

Quomodo
metalla fa-
cilè liquen-
tur.

Porro magnus est liquationis in pharmacia vsus. Efficat enim vt medicamenta formam mutant, & aliam nanciscantur, tum, vt purgentur, & eorum pars impuriore à syncera & puriore separetur.

CAPVT XIX.



VLTAE medicamentorum præparationes tantam inter se habent affinitatem, vt eadem ferè iudicentur, vt liquatio & mollitio quæ tantum secundum magis & minus videntur discriminari, Itaut mollitio sit liquationis principium. Cuncta enim quæ liquantur, prius mollescunt, & multa postquam fuerint emollita, si diutiùs calefiant, liquefcunt, non tamen omnia. Ebur enim vngues & cornua possunt emolliri, non liquari.

Mollitio fit
duobus
modis.

Fit autem mollitio duobus modis, vel solo calore ignis, solis, aut animalis, vel rei cuiusdam putrescentis; vel affuso humore; vt cum cera emollitur in aqua calente; aut cum massa quædam medicamentosa durior in aliquo syrupo aut succo idoneo malaxatur, vt mollescat & tactui cedat. Arbiter enim duri corporis & mollis tactus est, ait Galenus.

cap. ultimo li.

Duratio.

Vniones conchæ & ouorum putamina, aceto destillato macerati adeo mollescunt, vt ad libitum tractentur, & ducantur. Ebur quoque zitho creditur emolliri atque etiam dum sex horas cum radice mandragoræ percoquitur.

3. de differ. puls.

Cornua mollescunt igne rarefacta, aut aqua diutiùs cocta, vel sub fimo per septem dies sepulta. Et coralia succo berberum, & margaritarum succo limonum, & lapides multi certis liquoribus, vt decet, apparatus creduntur emolliri.

Porrò cum dura sint, ait Plato, quibus caro nostra cedit, & mollia, quæ carni: durationis & mollitionis, vt oppositorum, eadem erit ratio doctrinæ. Locum autem habet in pharmacia duratio, in medicamentis compositis, quæ ad conseruationem & vsum, plus, minus sicca, solidaque debent esse, cuiusmodi sunt, electaria, conseruæ siccæ, emplastra, pilulæ, trochisci, & miuarum genera.

Galen. cap. I. lib. 4. de diagnosis. puls.

Indurantur verò medicamenta frigore, calore, & rerum siccarum admixtione. Frigore, quando quæ liquata sunt, aut tantum emollita, ab igne remouentur; & aëri exposita refrigerantur & coalescunt. Calore, dum ad iustam consistentiam medicamenta coquuntur, & pars humidior absimitur. Tunc enim sicciora reddita indurantur. Admixtione quoque rerum siccarum medicamenta durefcunt, siue vt diutiùs asseruentur, siue vt consistentia faciliùs & fœliciùs exhibeantur.



QUÆ in hyemem sunt asseruanda simplicia, vel ad nos è peregrinis regionibus aduehenda, priusquam in arculis, aut pyxidibus & sacculis reponantur, debent accuratè siccari. Excrementosa enim illorum humiditas coacta, nec difflata citò corrumpitur, peritque tunc salutaris cuiuslibet medicamenti qualitas.

Neque verò conseruationis gratia tantùm medicamenta siccantur, sed sæpè vt puluerentur, vel, vt viribus polleant insignioribus. Quicquid vero humidius est & aridum expetitur, id ipsum vel igne, vel sole siccandum, vel in vmbra relinquendum perflatili, pluuia & pulueris experte, donec tabescat, illiusque superflua humiditas penitus dissipetur.

Quare medicamenta sicceantur.

Ignis calore siccantur ad puluerationem, quæ in fornace, vel clibano vruntur, vel in carbonibus accensis, vt ossa, vngues, cornua, conchæ; vel in olla fictili, vt pili animalium; & quæ sartagini calidæ imponuntur, vel catino, aut calatho excepta, suprâ, aut intra furnum, à quo panis de nouo extractus est reconduntur. Sic enim pruna, pira, cerasa solent desiccari, fructusque alij humidiores.

Solis calore siccantur æstate & autumnò potissimum folia & flores, quorum color in his aridis expetitur, vt etiam semina, quæ collecta ante perfectam maturitatem, vel cœlo pluuioso, vt necessitas rei cogit aliquando, vix nisi sole, aut igne possunt exactè siccari.

Quæ in sole melius siccantur.

Radices quoque crassiores & magis succulentæ, nisi minutius diuidantur, melius in loco soli exposito, vel aëri perflatili & aquiloni, quàm in vmbra ventis non agitata siccantur, estque multorum minus idonea desiccatio, nisi præcesserit insolatio.

Paruæ tamen radices in vmbra facilè arescunt, vt aliæ maiores, quæ per frustula, ac talleolas incisæ & transfixæ filo, vmbroso aëri, ac ventoso & minimè pluuiali exponuntur. Facilius vero folia quæ manipulis ligata, in folio pensa, partim aëri externo, partim calori ignis ferè iugis officinarum exponuntur: Omnium facillimè flores: Papyro enim aut catino excepti & subinde versati citò siccescunt.

Exsiccata vero folia sacculis canabinis, aut papyraceis reponuntur, radices, flores & semina. vasis vitratis aut ligneis.

Quomodo cortice & flores siccandi.

Flores nenupharis quia crassiores & humidiores sunt, filo transfiguntur, vt sic aëri expositi, commodius arescant. Eodem modo & cortices arantiorum, limonum, granatorum, & lignosæ radices in officinis solent desiccari.

Pulmones vulpium in vino loti siccantur in clibano parum

calido, priapi ceruorum in aëre libero, intestina lupi in vmbra, ficus & passulæ in solatu, vt & confectiones solidæ, quæ post condituram in saccharo, siue syrupis debent asseruari.

De expressione. CAPVT XXI.



T purior tenuiorque medicamentorum substantia separetur à terrestri & crassiore, valido sæpè compressu opus est, quem cùm solæ manus exequi minimè valeant, prælum quoddam siue torcular à Mesuæo est inuentum, quo medicamenta sacculo excepta, aut panno forti, vt cannabino, aut seraceo inuoluta, tam validè comprimuntur, vt tenuis substantia tota exilire cogatur, remanente crassiore & magis compacta.

Pomaceū
qui fiat.

Intinctus
viridis.

Vinum ex
herbis.

Aqua alu-
minosa
quibus
confitet.

Acacia.

Mel Ana-
cardinum
qui fiat.

Quomodo
succu diu
sine putre-
dine ser-
uandi.

Sic in torculari ab vuis attritis vinum expressum in dolia aut cupas delabitur. Sic pomorum educitur succus ad pomacei aut Syrupi regis Saboris confectionem. Eodemque modo seplasiarij plantæ frumentacæ nondum adolescentis succum extrahunt, ad condimentum illud cum paucis aceto pane tosto & speciebus aliquot parandum, quod intinctum viridem nominant. Quibusdam Græcis, *αἶνος βοτάνης* vinum ex herbis vocatur.

Pleraque tela excipiuntur, dein manibus premendo contorta, sufficienter exprimuntur, vt succus agrestæ, portulacæ & plantaginis, pro aqua aluminosa, additis ouorum albuminibus & alumine.

Simili modo fit expressio rhabarbari, vel agarici, aliorumque medicamentorum in decocto, aut aqua conuenienti infusorum, vt ex his quod profuturum est habeatur, eiiciatur quod nociturum.

Acacia ex succo seminis spinæ Ægyptiæ exprimitur, qui siccatus in vmbra, niger, si ex maturo semine, subrufus si ex viridi eliciatur, apparet.

Expressio igitur fit aliquando succi tantum simplicis alicuius medicamenti, nonnunquam eiusdem in decoctione vel aqua macerati, vt cum exprimitur infusio oleorum, & decoctio syruporum & apozematum. Mel Anacardinum exprimitur ex Anacardis exiguis ac recentibus diutius coctis. Ex his enim sic tabefactis, liquor aliquis enatat ferè mucaginosus, quem mel Anacardinum appellant. Quod vt probè fiat secundum Arnaldum de Villa noua debent Anacarditeri, & diebus septem in aceto macerari; Octauo coqui lento igne ad duarum partium dissipationem. Colatura autem cum melle cocta à multis perhibetur mel Anacardinum.

Vt expressi succi diutissimè seruentur absque putredine, sal admiscetur, vel reponuntur in vase oris angusti, superfuso oleo sufficienti, vt digiti crassitudine.

cap. de
memor.
defect.

Infusa medicamenta & succi nunc leui, nunc forti expressione extrahuntur. Olea verò simplicia, vix nisi validissimo compressu extrahi queunt, siue cum, siue sine igne. Vtroque enim modo educitur amygdalinum, & quod ex nucibus, pistaciis & fructibus multum oleosis elicitur.

De extractione.

CAPVT. XXII.



MNIS expressio quædam extractio est, sed non contra: Nam multa extrahuntur sine expressione, vt succi & resinæ ex plantis incisis vel percussis; Sic enim euphorbium ex Lybica arbore conto vulnerata extrahitur, nam succus è plaga confestim stillat in pelles ouinas arbori circumligatas; Tanta siquidem eius est acrimonia, vt gustum & olfactum molestissime feriat, & ardorem ori naribusque maximum excitet. Propterea rustici quidam vocantur ad huius succi collectionem, qui spe mercedis allecti corticem arboris feriunt è longinquo, vt minùs ab acerrimo euphorbij feruore lædantur, nunquam tamen tuti ac illæsi discedunt.

Euphorbium.

cap.
148.
lib.4.

Ex fructu cucumeris agrestis elaterium extrahitur cõsilio Dioscoridis, hoc modo. Decerpti cucumeres qui tacti protinus exiliunt, seruantur vna nocte. Postridie imposito supra craterem aut peluim rariore cribro, vtrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum versus aciem habente finduntur, atque per cribrum humor in vas subiectum exprimitur, & quod carnosum cribro hæsit, vt faciliùs exudat, eliditur. Humor in pelui agitur, dein residere sinitur. Tum linteo opertus soli exponitur: & cum steterit, supernatans aqua identidem effunditur, qua partim effusa, partim exhausta quod remanet sedimentum in mortario teritur, & cogitur in pastillos.

Elaterium
quomodo
parandum.

Ex plantis integris, vel earum partibus extrahuntur non modo succi, vt hypocistis ex germinibus adnatis Cisti radicibus; succus glycyrrhizæ & laserpitij seu Cyrenaicus; Sed alij quoque varij liquores, ex incisis arborum, & fruticum cortice, & stipitibus, vt gummi resinæ, lacrymæ.

In gummi censu numerantur ammoniacum, sagapenum, opoponax, galbanum, bdellium, mirra, styrax, thus, & alia multa, quæ pro varia cuiusque natura faciliùs, aut difficiliùs extrahuntur. Nonnulla sine arboris vulnere, dehiscente per calores æstiuos cortice sponte defluunt.

Gummi.

Resinæ extrahuntur faciliùs quia magis fluxiles, & ferè sine manuum auxilio deciduæ vt quæ ex Terebintho lachrymatur, quæ resinis omnibus antecellit, ait Dioscorides. Proxima lentiscina, dein,

Resinæ.

Lacrymæ.

quæ è pinu & abiete extrahitur.

Inter lacrymas multa locum habent, vt aqua è vite resecta defluens, lac tithymallorum omnium, & papauerum succus ille crassior, qui dum plenè coaluit, opium nominatur.

Sauciatur ergo in plantis multum tantum cortex, inde stillat *ῥάγιον* hoc est, lachryma in peluim aut aliud vas appensum. In multis radix vulneratur, vel secatur omnino: interdum & rami. Ita Balsamum extrahitur cortice fruticis præciso, cultello quodam eburneo. Ferrum enim sine magno sui dispendio tolerare minimè potest.

Fit adhuc oleorum extractio, sed modo multifariam artificioso. Vel enim extrahuntur destillatione, quæ fit per ascensum, vel descensum, de qua plenæ sunt chymicorum farragines: vel expressione: vel infusione: de quibus iam supra loquuti sumus, fusiùsque loquemur in pharmaceutica officina.

De extractis Chymicorum.

C A P V T XXIII.



NON paruum est discrimen inter extractionem Pharmacopæorum & Chymicorum: Illi enim liquorem tantum quemdam, vt lacrymam, resinam & gummi, vel quid simile ac fluidum extrahunt, secernuntque à substantia crassiore ac solidiore: Hi verò non modò corpus illud crassum deferunt, sed & tenuiorem substantiam exhalant, relicta eius portione crassiuscula ac pauca, cui, vt subiecto virtus vnita adherescit. Vnde extractum quasi essentiam à corpore separatam appellant.

Eiusmodi enim extractum parua mole vires habet eximias, illiusque dragma non minoris est efficacæ, quam vncia medicamenti tota cum sua substantia crassiore exhibita.

Solent verò his extracta dari, quorum nausæat ventriculus super pharmacopæorum medicinis, & quibus maxima est rei familiaris vbertas. Extractum enim rhei aut vnionum pauperi præscribere, vitæ illi eripere est.

Extractum
quo modo
parandum.

Fiunt autem extracta ex medicamentis tam simplicibus quam compositis sepiùs hoc modo. Immergitur medicamentum minutim incisum, vel si fuerit massa catapotiorum aut electarij, dissolvitur in aqua vitæ optima, vel alio liquore idoneo, ita ut ad duos digitos emineat, in vase bene obturato; tum relinquitur duos aut tres dies in loco calido; Dein valida fit expressio; quæ postea in balneo Mariæ ponitur, vt separetur aqua vitæ à facultate medicamenti, quod exigua quantitate crassiusculum remanet in fundo vasis, Tuncque colligitur, & reponitur in vase vitreo, aut fictili, sed vitrato.

Cum.

Cum validius extractum quis parare voluerit, in priore expressione aliud eiusdem generis medicamentum macerabit, & post diutina ac perfectam infusionem exprimet, ut antè. Idque ter, aut quater, si extractum potentiùs expetierit; tandemque facta expressione vltima, vel ignis calore blando, vel balneo Mariæ segregabit aquam vitæ, vel insolatu dissipabit, solo remanente extracto, quod exiguo corpore viribus est eximium.

Rhabarbarum & alia medicamenta pretij maioris, post primam macerationem & expressionem abiicienda non sunt, ut vulgaria, sed bis, aut ter, vel etiâ quater, in alia aqua vitæ infundenda, donec colorem & saporè prorsus amiserint, & quicquid illis inerit virtutis in aquis ipsis reliquerint: tunc enim fieri debet vltima expressio, quæ aliis miscetur, à quibus omnibus aqua vitæ separatur, per balneum Mariæ, quousque subsidentia, seu extractum relinquatur.

Non verò semper extracta fiunt per aquam vitæ, sed multoties per herbarum decocta, aquas stillatitias, & aliquando per aquam pluuiam vel fontanam. Massæ enim pilularum nonnunquam macerantur in aqua pluuiæ per octiduum, adhibitis, si videtur idoneum, succis buglossi, vel betonicæ, vel alterius pro exigentia rei. Postea igni lentissimo coquuntur, filtrantur, & coagulantur.

Hoc modo rhei optimi minutim concisi libra vna maceratur per diem integrum in libris duabus succorum depuratorum borraginis & fumaricæ; Deinde igne lentissimo coquitur, donec succi absumentur: Tunc fit expressio fortis, quæ denuo igne coquitur læto in diplomate ad mellis crassitudinem. Sunt qui saccari duas vncias adiciunt, sed augetur moles, & hebescit extracti facultas.

Multis alijs modis extracta parantur, quos pluribus persequi nostri nunc non est instituti, quandoquidem pharmaco pœi instituendi methodum non Chymici hoc in libro meditamus, de Chymicis operationibus alio tractata fusiùs dicturi.

De cribratione.

C A P. XXIIII.

VT agricola paleas & acus à tritico excutit vanno, sic ab optimis marcida secernit semina cribro, ipsique potiùs quam Pharmacopœo, cribratio competit, sed vterque illo vtitur instrumento ad farinam à furfure secernendam, quod tamisium vulgus nominat, nonnulli incerniculum, & aliquando setaceum, quod ex seta equina concinnetur, interdum ex tela cannabina, & aliquando ex sericea. Cribrum verò fit ex pergamina multis foraminibus rotundis aut longis peruia, per quæ lolium & semina minutula facile descendunt, remanentibus succulentis,

ac melioribus. Vsurpatur itaque cribratio pro eo medicamentorum apparatu qui cribro, aut incerniculo peragitur.

Cribratio
huius vsus.

Est autem multiplex huius præparationis vsus; per eam enim flos seminum molitorum, seu farina à furfure separatur: Radices coctæ à corticibus mundantur, & fructus ab acinis repurgantur.

Pulpa quoque fistularis cannæ cibro equina tela concinnato transmittitur, ut medulla sic à siliquis confractis & seminibus perpurgata sola extrahatur.

Eodem modo & Tamarindi & dactyli macerati aceto vel alio liquore per setaceum traijci solent ad definitos vsus.

Semina multa coquuntur ad crepaturam, ut radices & folia ad putrilaginem, deinde transmittuntur per setaceum crinibus equinis concinnatum ad cataplasmatum, vel aliorum diuersæ formæ remedium confectioem.

Pulveres cardiaci, ut etiam alij qui medicamentorum compositiones ingrediuntur, tamisio sunt tenuissimo cernendi, & maximè qui obstructionibus liberandis, urinæ & mensibus mouendis dicantur. Quò enim tenuiores sunt, eò citius ad partes attingendas deferuntur.

In quibusdam pulveribus cernendis tamisia setacea exquiruntur, in aliis multitia, vel quæ ex linteo fiunt tenui & raro.

In summa cribratio fit ad mixtionem commodiorem rerum pulueratarum, vel certè iam mole minimarum, & ad tenuioris portionis sæpè melioris, à crassiore sæpè deteriore separationem.

Ut autem varia sunt quæ Cribrationi inserviunt instrumenta, sic uariis cribrandi modus, nam propriè Cerealia, ut & legumina cribro excepta suspensa, manu agitantur, & hac, illac versando semina, quæ mala sunt ablegantur, retinentur quæ bona.

Pulveres
cardiaci
quomodo
cribrandi.

Eodem modo cardiaci pulveres cernuntur, cribro inter manus versato, nec violenter succussato, ut tantum pulveris pars tenuior transmittatur, relicto crassiore.

Nonnulla verò ut optimè transmittantur, debet incerniculum numeroso percussu in abacum aut aliud corpus solidum succussari, ne partes crassiusculæ cribro impingantur. Proinde terenda ferè sunt omnia antequàm cribro volutentur. Et quæ cribrum vix permeant ob crassitudinem, denuò terenda, donec ob tenuitatem tota transmittantur.

De Colatione & filtratione.

CAPVT. XXV.



VA ratione medicamenta sicca cribrantur, eadem colantur humida: Vt enim sordes omnis secernatur, habeaturque purus humor ac syncerus, colo transmittitur, vel denso, aut raro, vel textura mediocri, pro rei exigentia & commodiore vsu. Ideoque pharmacix proceres iubent in officinis multa cola asseruari rara, aut densiora: eaque vel lanea, vel linea, aut cannabina, vel setacea, & sæpe detrita; Sæpius tamen noua, vt validiori compressu totus succus colandæ rei absque telæ crepatura traiciatur.

Vt rectè colentur crassa & viscida, tria expostulant, vt ampliorem humore diluantur, vt colo traiciantur rariore ac nouo, & diutius calefiant ante colaturam. Sic enim illorum densitate magis rarefacta faciliùs transmeant. Miua seu gelatina carniū & fructuum, sic priùs calefacta colatur. Et mellis genus omne, & manna per os ex liquore quodam sumenda, vt res quædam extranea ac sordida, si quæ sit admixta, per colaturam separetur.

Quæ tenuia sunt, vt succus herbarū, limonum & multorum fructuum, tepida colari solent, & sæpe frigida; Sic namque terrestrior pars ac crassior remanet, traiecta puriore ac magis syncera, veluti defæcata. Lac tamen colatur frigidum, nec non aqua turbida; vt ab illo, pili si qui sint allapsi, ab hac verò vt conspurcamenta secernantur. Sæpè tamen per residentiam ab aqua id omne separatur, à quo turbida reddita est, vt in cystemis videri potest.

Vinum quoque Hippocraticum ter aut pluries colatur frigidum per manicam laneam, oblongam & acuminatam, ad sacchari, vini & aromatum, quibus conficitur, mixturam & consistentiam iucundiorē.

Quædam tamen non nisi calidissima percolanda sunt, alia frigida, quædam tepida. Et multa vnica tantum colatura egent, quædam duabus, & nonnulla tribus, donec clarescant.

Apozemata percolantur stamine vulgari extenso; interdum & facculo laneo, aut lineo: Syrupi verò qui ob sacchari vel mellis admixtionem & longiorem coctionem crassiores sunt, nec tam facile transmeare queunt, linteo raro dum percolantur egent.

Simili modo decocta colantur quibus vnguenta parantur, vt etiam vnguenta ipsa liquefacta, dum quid crassiusculum quod vini pistilli aut ignis effugerit, secernendum est.

Multorum medicamentorum tenuior portio à crassiore segregatur per aliam colationis speciem, quæ filtratio nuncupatur: Quo apparatus modo solent vti, qui lac virginale dictum con-

Filtratio.

ficiunt, vel tenuiorem alicuius medicamenti substantiam tantum expostulant. Fasciam enim laneam, duos, aut tres digitos latam & oblongam assumunt, eiusque extremum in vasis fundum quod medicamentum filtrandum continet, immergunt; Alterum verò extra vas ascendens in aliud vas propinquum spectat, ac propendet, in quod humorem quem a priore vase continenter quasi sugendo trahit, stillatim eructat.

De Despumatione.

CAPVT XXVI.

Spuma
quid.



DESPUMATIO dicitur cum spuma innatans detrahitur vel cochleari solo, vel penna si pauca fuerit, vel colatura. Nam cum spuma sit succus quidam lentus includens flatum; generatio enim omnis spumæ duarum substantiarum mixtura perficitur, inquit Galenus, quarum spiritiuosa vna est, altera humida, proinde varia agitatione mouetur ac disiciitur; Idcirco spumæ secernendæ ouorum adduntur albumina, quæ suo lentore & visciditate eam ipsam cogant, ac colligant, vt quando gelatina, syrupi multi & apozemata coquendo despumantur. Comm.
ad
aphor.
43. lib.
2.

Cum autem motus & calor sint efficientes causæ spumæ, nihilq; crudum & immotum spumescat, despumari tantum debent quæ agitatione vel coctione spumam edunt.

Vt mel aut saccharum despumetur, humoris æqua portio, & sæpe dupla adiicitur, dein coquendo, spuma cochleari pertuso deraditur, ne simul cum ea ipse humor in quo fit concoctio abiiciatur. Quod si hac arte imperfecta videatur despumatio, singulis libris singula ouorum albumina adiunguntur, quæ continuata elixatione simul vt indurantur, spumam colligant, vnde postea spumæ facilis est à liquore secretio, vt quæ per colaturam vnà cum albuminibus in colo seu stamine relinquuntur, humore syncero solum transmissio. Si mel valde impurum est, cum triplo humore coquitur ad dimidias, vt optimè despumetur. Idem iudicium de cæteris rebus despumandis valde impuris.

Quando
mel per se
despumantur.

Per se autem mel aliquando despumatur & purgatur, si modo cuiusdam alienæ qualitatis expers sit vel cum tam longam coctionem sustinere non potest viribus integris, vt ea quæ cum illo admiscuntur: Tunc enim præstaret non despumatum miscere, quam cum miscendis despumare.

Saccharum despumandum tandiu coquendum est, vt post despumationem admixti liquoris vncie duæ aut tres solum, pro sacchari libra supersint.

Condiendi fructus dum coquuntur cum saccharo, aut mellis portione, vt nonnulli faciunt, solo cochleari despumantur; vt decocta & succi laneo

colatorio. Solent enim traijci per pannum extensum clavis affixum vt spuma & fæces desuper relinquuntur.

De clarificatione. CAP. XXVII.



CLARIFICATIO est sordium crassiorum à medicamentis liquidis expurgatio; sic enim gratiora palato redduntur, & faciliùs distribuuntur. Clarificantur autem multa per se sola dum portio magis fæculenta subsidet, vt succus pomorum, arantiorum, citriorum, buglossi, acetosæ: Quædam despumatione, alia colatione, nonnulla coctione additis sæpiùs albuminibus ouorum, aliquando etiam sine his, vt cum succi plantarum & fructuum coquantur ad tertiæ partis consumptionem, deinde biduum sinuntur, donec clarescant. Vnde clarificatio modis quinque fieri dicitur, quiete, colatione, despumatione, aceti vel acidæ rei mixtione, & albuminum ouorum cum re clarificanda agitatione & coctione. Decocta enim & syrupi si acetum recipiant, per se magis ac magis aceti vi purgântur. Ouorum autem albumina scopulis agitanda sunt, donec tota spumescant tum syrupis admiscenda vel decoctis, quæ postea recoquuntur. Et ubi coctione perfecta perfectè albuminibus spuma colligata est, artificiosè deradenda ac separanda vel traiectione communi, quæ fit per pannum quatuor angulis totidem clavis firmatum, vel colatura magis particulari, quæ fit per manicam Hippocratis. Debet verò ter aut quater iterari colatio, donec syrupus aut decoctum planè claruerit.

Clarificatio
quot modis
fit.

Recentiores quasdam potiones forma zulapij conficiunt, quæ cum sint consistentia valdè claræ, Claretæ nuncupantur. Tales verò redduntur modis superiùs enumeratis.

De aromatizatione. CAP. XXVIII.



AROMATIZATIO dicitur attificiose præparationis modus, quo medicamenta magis odorata ac sua uolentia redduntur, ad gratiam palati, cordis, ac facultatis vitalis, & animalis robur & oblectationem. Medicamenta si quidem ventriculum subuertentia, sic cariophyllis, aut cinnamomo, aut alijs aromatis condiantur, minùs infensa sunt, ac molesta partibus præcipuis, & salubriùs humores excrementitios per secessum, aut etiam vomitum, si contigerit, educunt.

Licet autem aromata calida sint omnia Galeno, facultatemque vitalem exhilarent, quædam tamen magis respiciunt cerebrum, vt cariophylli, quædam cor vitæ fontem, vt cinnamomum, alia ventriculum vt nux moschata, alia iecur, vt santali, & quædam v-

uterū, vt moschus, ambra, zibethū; nō quod sanè his delectetur vterus sub odoris specie; organū etenim non est odoratus, sed afficitur tantū odoribus ratione materiæ tenuissimæ, seu vaporis aërei, quo recreantur spiritus quibus genitalia turgere omnibus est in confesso.

Multas confectiones aromaticas descripsit Mesue, vt diacinnamomum, aromaticum rosatum, diamoschum vtrumque, diambra, electarium de gemmis, & pleraque alia, quorum fœlicissimus est vsus ad robur principibus membris conciliandum & conseruandum, putredinem arcendam aut corrigendam & reficiendos spiritus.

Qui ex morbo conualescunt, aut valdè sunt senes, satisque valent opibus ad iacturam virium resarciendam, consilio Medicorum, conditis solent vti paratis ex conseruis, syrupis & pulueribus cardiacis, quorum eximia vis aromatum odori suauissimo maximè tribuitur.

Cur medicamenta aromatizentur.

Similem ob causam syrupi multi aromatizantur confectione Alkermes, aut trochiscis gallæ moschatae, vel moscho, ambra, zibetho & alijs suaueolentibus inclusis nodulo, ita vasi, quod syrupum aut liquorem continet, alligato, vt circa illius medium suspensus maneat. Sic enim aromatica vis æquè distribuitur ad totum humorem, quod etiam norunt Oenopolæ, qui vinum fragrantius & suauius reddunt, suspensis in dolio zinzibere, cinnamomo & similibus.

Quibus facies ad venerem vitæ.

Qui inter aulicos ditiores sunt, salaciores & magis desidiofi, vt belluarum more potentiùs ruant in venerem, ad illiusque ludibria sint vegetiores exercenda, ouis interdum vescuntur sorbilibus, vel frixis cum multo moscho, aut zibetho, ita vt naturam destruant magis quàm reficiant.

Multi verò fructus, vt nuges & pira, ante condituram cinnamomo aut cariophyllis configuntur, cum vt palato, tum vt cordi gratiora sint & magis amica.

Iulepi sæpiùs aromatizantur aqua rosacea, apozemata cinnamomo, aut santalo citrino; opiata & condita confectionibus aromaticis, pomata ambrâ vel moscho vt & alia multa medicamenta styrace, benzoin, caphura.

De coloratione CAP. XXIX.



LICET color, Galeno docente, medicamento facultatem non ostendat, quia tamen qualitas est corporis visibilis, quæ quòd vel obsit, vel profit, magis aut minùs expetitur: Vt enim nigredo videndi vires lædit, vt etiam albedo: sic viridis color exhilarat, vt præter experientiam Philosophus scripsit. Ex medicamentis tamen nonnulla magis expetuntur alba, quædam rubra, alia nigra, vel alius coloris.

cap. 2. l. 1. Simplic. c. 30. l. de histor.

Probl. Color autem illis acquiritur quatuor potissimum modis, lotione, *60. sect.* agitatione, coctione, mixtione. Lotione cādida fiunt multa, vt oleū, terebinthina, cera. Quædā etiam agitatione talia euadunt, vt penidia, vnguentum album Rhasis, emplastrum diachylon, & ceratum refrigerans Galeni: Ea enim omnia quò diutiùs tractantur & subiguntur, eo magis albescunt, vt pilulæ albæ, Bechicæ confectiones, & saccharata omnia. Motus siquidem seu agitatio colorem expetitum medicamenti conciliat. Hoc non tantum in enumeratis cernitur, sed manifestissimè in vnguento crudo, quod ex lithargyro, oleo & aceto paratur: Hæc enim tamdiu in mortario agitantur, donec formam vnguenti albescens acquirant. Coctione adhuc medicamenta magis colorata fiunt, aut albiora, aut nigriora, prout cōcoctio validior ac diuturnior, vel imbecillior erit. Sic emplastrum ex cerusa cruda paratum candidum est, ex eadem vsta rubrum, & ceratum quod æruginem crudam recipit viride est quod vstam albū ac melinum. Denique pro rerum admixtarum vario colore, varius est medicamentorum color. Quæ enim recipiunt crocum flauescunt; quæ cinnabarim, rubent: quæ cerusam, albescunt; quæ cassiæ medullam, nigrescunt.

De conditura, salitura, & fartura.

CAPVT XXX.

VT salitura & fartura potiùs ad popinam quàm Pharmacopolum spectare videntur, sic conditura ad artem aromatariam. Medicamenta tamen hisdem interdum egent: Nam salitura plurimum facit ad conseruationem, fartura ad saporis gratiam, conditura ad vtrumque. Condiuntur enim non tantum fructus, aut flores, sed & cauliculi, cortices, & radices tenellæ, tum vt diutiùs asseruentur, tum vt iucundiùs edantur. Sic radix zinziberis tenella, siliquæ cassiæ fistularis quæ non multum adoleuerunt, nuces moschata, myrobalani, & alij fructus exotici recentes condiuntur, vt fœliciùs ad nos sine magna virium iactura è longinquis regionibus aduehantur. Nostrates fructus dulces, subacidi, aut alius saporis iucundi palato, statim atque selecti fuerunt, & à cortice nudati, si sit opus (multi enim non decorticantur, vt ribes, berberis, agresta) cum saccharo, aut melle vel vtroque coquuntur. Amari vel acidissimi & acres tandiu in aqua macerantur, donec vehementem qualitatem deposuerint.

Solent verò potissimum Pharmacopœi condituras, vt vocant, humidias parare, sicut dum cum saccharo & aqua, vel cum syrupo fructus aut radices tandiu concoquunt, vt humiditatem omnem aqueam amittant: tum cum syrupo perfectè cocto recondunt & asseruant.

Salitura.

Epicureis
anima pro
sale.

Aromatarij verò non solum condituras eiusmodi conficiunt, sed etiam siccas, vt loquuntur, quæ fiunt ex fructibus vel saccharo extrinsecus incrustatis, vt tragetæ omnes species, vel intrinsecus coquendo saccharatis & postea insolatu exsiccatis. Fructus verò multi vel sale condiantur solo, vt cappares, vel addito aceto, vt cucumeres in frustula secti, vt portulaca, lactucæ, & multa olera vt sine putredine ad hyemem vsque possint asseruari. Sal enim miram vim habet desiccandi & conseruandi: Vnde carnes & pisces saliti in plures non tantum menses, sed annos, sine corruptela reconduntur, Ob eam rationem anima à philosophis quibusdam dicta est sal corporis, quia quamdiu in ipso remanet, tandiu ab omni putredine vindicat ac tuetur. Confert etiam vt medicamenta qualitatem a'iam præter peculiarem nanciscantur, propterea carnes viperinæ & multorum animalium partes insperguntur sale marino aut fossili (Sunt enim omnes eiusdem facultatis Galeno) eoque pauco, si saporis, vel copiosiore si condituræ gratia adhibeatur.

Fartura.

Quæ autem alimenta medicamentosa desiderantur, si cavitatem habeant manifestam, fructibus aut herbis farciuntur, aut radicibus, quibus etiam sæpè configuntur. Nunc multa animalia farciuntur ante assationem vel elixationem, vt palato magis arrideant, & aliquando vt sanitati resarciendæ aut conseruandæ magis conueniant, vt cum polypodium, cappares, passulæ, hordeum, vel aliæ plantarum partes ventre exenterati caponis vel anseris includuntur. Gallinaceus annosus hordeo solet farciri, vt simul cum facultate aluum subducendi quâ pollet ex Galeno & Oribasio detergeat & nutriat. Cucufæ sæpè farciuntur è cephalicis pulueribus exceptis bombace, syndone duplici interfuto, vel vt vulgus loquitur, interbastato. Simili modo paratur topicum remedium forma scuti quod regioni stomachi adhibetur. Excipit verò pulueres roborantes & stomachicos, quales præscribi solent in ventriculi debilitate. Propriè tamen fartura dicitur, per quam exenterata animalia, vel excauati fructus medicamentosis rebus, vel alimentosis, & aliquando aromaticis tantum ad iucunditatem farciuntur,

De Destillatione.

CAPVT XXXI.

Balneum
Mariæ.

ESTILLATIO est humoris aquei vel oleosi ex re quapiam vi caloriseductio. Fit autem ea vel per ascensum, vel per descensum, idque calore humido aut sicco Humido calore destillationes fiunt in Balneo Mariæ, & in vapore aquæ calentis. Balneum Mariæ aut maris, vt aiunt nonnulli, dicitur vas quoddam cupreum aut æneum aquam calidam continens, in quod vas aliud immittitur, quod

que materia destillandam contineat. Cucurbita seu boccia vocatur, solet, cui aliud vas rostratum super imponitur, quod vulgus alēbicum seu capitellum nominat, dein glutine ex farina & ouorum albuminibus facto, simul arctissimè compinguntur.

Destillatio in vapore aquæ calentis fit quoque in vase duplici, v. Balneum
roris. num materiam destillandam continet, & in alterum vas oblongum cupreum aut aneum immittitur aqua semiplenum, ita vt relinquatur sufficiens spatium inter cucurbitam & aquam bullientem, cuius solo vapore sursum elato, destillanda materia incalascet, & ad capitellum rostratum vapores extollat.

Varia vtriusque balnei formæ describi solent; quisque enim pro arbitrio aliquid mutat, innouat, addit, aut detrahit, potiùs ad vatum elegantiam, quàm destillationis facilitatem. In omnibus autem, ignis qui causa est efficiens destillationis tam conuenienti loco est astruendus, vt negotio facili materiam in boccia contentam calefaciat. Variæ sunt
formæ bal-
nei.

Debet verò ignis luculentus esse, non fumidus, aut fœtidus, vt Ignis in de
stillatione
qualis. qui ex ligno putri aut carbonibus indebitè extinctis paratur; atque ita regendus, vt nec valentior sit, & materiam adurat; nec ita paruus vt ante perfectum opus extinguatur. Antequam aqua feruendo deficiat, alia substituatur calida, aut saltem tepida, atque eo feruoris gradu calefacienda, quem materiæ postulat conditio. Quædam enim vapore tantùm benigno, alia validiore, nonnulla aqua feruente commodiùs destillantur.

Plantæ recentes integræ, vel earum partes in frusta sectæ in humido balneo conuenientissimè destillantur. Siccæ si fuerint, humore quodam idoneo madere debēt ante destillationem. Sic enim aquæ destillatæ plantarum vires & qualitates melius retinent, sed quia sunt magis excrementosæ, non ita possunt seruari. Aquæ tamen multæ sapes plantarum non retinent, quod substantiæ terrenæ ita inhæreant, vt calore etiam vehementissimo non ascendant. Plantarum
destillatio.

Balneum autem humidum aquis destillandis, siccum verò (si modò balneum dici debeat, vt multis placuisse video) & aquis & oleis educendis aptissimè conuenit: Propriè quidem dicitur siccum, quòd cucurbitæ non supponatur aqua, sed solus ignis, interpositis aliquando cineribus, aut arena vel limatura ferri aut chalybis. Quod vt commodè fiat, ea industria fornax astrui debet quæ ima sui parte ostium apertum habeat, per quod cineres eximantur, qui à prunis accensis craticulæ transversæ superpositis deciderint. Super cratem aliud patebit ostium, per quod carbones immittentur, dein super ostij concamerationem, trabeculæ ferreæ transversim inferentur. Tum desuper lebes aneus, aut figulinus, vel ferreus collocabitur, in quem cucurbita imponetur, sepeliaturque adiectis arena aut cineribus: Tandem capitellum rostratum superponetur. In for- Fornacis
structura.

nacis parte summa, quædam ventilia seu foramina constituentur, per quæ fumus exilire queat.

Alembicus

Frequens nunc est vsus instrumenti cuiusdam cuprei, quod alēbicum vocant, in cuius camera inferiore trabeculæ ferreæ, quæ prunas ardentes sustinent, continentur, in media boccia, in suprema capitellum rostratum ac coniforme, & aliquando rotundum cum refrigeratorio instar aheni efformato, vt copiosam aquæ quantitatem continere valeat, quæ dum validiùs incaluit, per epistomium in eius parte decliui situm, effunditur, vt noua & frigida denuò affundatur.

In multis alembicis rostrum prominet longissimum, rectumque & sæpè instar serpentis, à quo subinde nominatur, flexuosum, vt per dolium frigida plenum traijciatur, & aqua prolectata magis concrescat & contemperetur.

*Retorta
Vesica.*

Inseruit quoque destillationi quæ fit per arenam, aut cineres boccia quædam vitrea, incurua, retorta dicta, vt etiam alia recta, quæ à vesica nomen habet, figura ouali, vitrea aut cuprea intus stanno obducta, quæ his inseruit destillandis, quæ facili negotio in altum subleuantur; vt radices semina, folia flores & aromata. Quæ verò difficiliùs, attolūtur, vt pinguedines, resina, lachrymæ, gummi, retorta vitrea, densissima, aptiùs sublimantur.

*Variæ de-
stillandi
formæ.*

Sunt verò tam variæ destillandi formæ, tamque varia destillandi instrumenta & instrumentorum materiæ, vt vix possint certis legibus coërceri. Verus tamen hæc inualuit consuetudo, vt vulgus Pharmacopœorum plantas recentes multaque alia medicamenta destillet alembicis plumbeis, intus stannatis, quæ non tantum adferunt nocumēti vt plerique reformidant. Vitrea tamen & figulina meliora sunt, sed quæ faciliè franguntur; fracta eiiciuntur inutilia. Quæ autem caloris vehementiam non sustinēt, meliùs in Balneo Mariæ destillantur, dein in cineribus, in quibus, vt in balneo, calor mittis ac temperatus asseruari potest ac foueri. In arena & limatura ferri non item. Hæc enim vix nisi calore acerrimo incalescunt, vnde oleis destillatione prolectandis commodissimè vsurpantur: Debent verò aquæ destillatæ dies aliquot insolari in vasis charta foraminulenta obturatis, vt impurior magisque excrementitia portio resoluatur, simulque impressum deleatur ignis vestigium, quod aquas destillatas solet comitari.

De destillatione per descensum.

CAP. XXXII.



VTRoque calore & humido & sicco fit destillatio, tam per accensum quā per descensum. Per ascensum quando vi caloris ignis solius, aut aquæ, vel alius corporis interpositi, materiæ in cucurbita latentis portio tenuior sursum ad capitellum aduolat, ibique condensata ad rostrum decliue suo pondere delabitur, & ad lagenam aut vas aliud, recipiens dictum, rostro subditum effluit. Atque vt destillatio per ascensum fit pluribus modis, sic etiam quæ per descensum. Alia enim propriè dicitur fieri per descensum, quando sine exaltatione humor eductus stillat deorsum. Alia per inclinationem, alia per transudationem, alia per lacinias seu filtrationem.

Quæ fit sine calore, vt exprimendo & colando, impropriè destillatio nuncupatur, ad huncque locum minimè debet referri.

Destillatio autem per descensum, aliquando fit sine calore, vt cum in aëre vapido, vt in cella vinaria sacculus suspenditur impletus mirrha aut tartaro. Hæc enim vt alia multa in vdo loco diu asseruata tabescunt, & succum purum velut exudant, atque in catinū subditum emittunt. Frequentiùs verò fit cum igne, cuius vi non solum aquæ, sed etiā olea per descensum prolectantur. Sic enim aqua rosarum aut florum quorumlibet optimè destillatur. Olla sumitur cuprea, aut ænea, vel figulina, pāno regitur lineo, aut cānabino vnde quaque firmiter succincto; rosæ desuper aut alij flores imponuntur, dein patina prunis impleta superponitur floribus, ex quibus calefactis exudabit aqua optima in ollā subiectā. Ignis autē ita regendus, ne flores adurātur, proinde multi prudenter chartā inter vas ignem continens & flores adhibēt: Sic enim vim caloris tutiùs perferunt. Hic verò destillandi modus vt facilis, sic plebeculæ familiarissimus.

Destillatio fit interdum sine calore.

Quomodo aqua educatur per descensum.

Sunt qui in fimo aut alia re putrente aquas destillant, sed quibus facile carere possit Pharmacopœus, penes quem mundities omnis esse debet, & selectiorum remediorum præparatio. Magis arridet illa destillatio quæ fit in calore Solis, hoc modo: Rosæ aut aliis floribus impleta matula, ollæ alteri subiectæ probè applicetur & firmiter coniungatur, dein Soli exponatur splendidissimo: Si enim illius radij ollam superiorem verberarint, aqua stillabit optima in inferiorem.

Destillatio in fumo.

Oleorum autem per descensum destillatio difficilior est, vixque Oleorum nisi magno cū apparatu, labore & tēpore perficitur. Est verò Chymica valde familiaris, qui variis modis olea per descensū prolectant. Ita enim vasa, aliaque instrumēta destillationi inferuiētia apparāt, vt

destillatio per descensum.

via non detur sursum ascendendi, sed velut colliquefactus & educus humor deorsum instar stillicidij exudat. Locum habere solet in his quæ calor ascensorius destrueret, vel à fortibus spiritibus dissiparentur antequam consistere possent.

Destilla-
tio per in-
sudatio-
nem.

Huius autem destillationis varij traduntur modi; Alia enim fit in fornace per transudationem, per quam humor prolectatus transudat, & guttatim in excipulum delabitur, igne supra adhibito. Alia quoque fit per transudationem, sed inhumando, quando scilicet fouea in terra excavatur, in quam demittitur olla, cuius orificio alterius ollæ fundum foraminulentum adaptatur, & optimè coniungitur. Orificium verò superius superioris ollæ materiam destillandam continentis operculo commodo tegitur & firmiter agglutinatur: tum adhibita terra sepelitur vtraque olla vsque ad ventrem superioris, ita vt commissura lateat: Dein ignis admouetur per gradus, pro destillandæ materiæ conditione & natura. Res enim solidior maiorem postulat calorem, minùs solida minorem.

Destilla-
tio per in-
clinatio-
nem.

Est verò alia destillatio media inter ascensoriam & descensoriam quæ fit per inclinationem, in qua scilicet parua fit eleuatio, indeque mox deorsum reflexio. Vocatur quoque destillatio per retortam, quia fit in boccia reflexa, in cuius curuatura spiritus coadunati descendere coguntur in receptaculum inferiùs locatum, & proboscidi retortæ probè iunctum. Debet verò retorta in fornace, vt decet extructa decumbere, cuius venter in catino arenario vel cinereo sepeliatur, & cornu per rimam extra propendeat.

Quando
retortæ in
destillatio-
nibus vsur-
pandæ.

Porro solent vsurpari retortæ in his quæ difficillimè ascendunt, vt in oleis metallicis & spiritibus mineralium, in quibus educendis, cum ignis sæpius vehementissimus desideretur, cauendum ne retortæ disrumpatur. Proinde antequam igni adhibeantur, luto, aut argilla, aut alia conueniente materia debent incrustari, maximè verò si ipsis nitrosa includantur, & sine intermedio cinere aut sabulo igni violentissimo adhibeantur. Sed quia nostri non est instituti Spagyricorum destillationes recensere, nec illorum matrattia, cucurbitas, ampullas, vasa hermetica, circulatoria, sublimatoria, catinos, ollas & fornaces describere, destillationis præcepta non vltèrius persequemur, hæc enim multò faciliùs & citiùs praxi & manuum actione ediscuntur.

Sublimatio.
Cohobatio.

Caput
mortuum.

Plures autem non modò destillationes, sed præparationes aliæ à Chymicis traduntur, vt sublimatio, cohobatio, exhalatio, euaporatio, exaltatio, & aliæ multæ, quarum pleni sunt eorum libri. Sublimatio dicitur quando extractum vasis partem sublimè attingit, ibique subsistit. Cohobatio, quando id quod prolectum est, denuò capiti mortuo redditur, Caput verò mortuum illis est velut exuccafæx, & expers qualitatis excrementum: fit tamen interdum materia salis chymici.

Exhalatio est spirituum siccorum per calorem in aëra dissipatio. Exhalatio.
 Euaporatio humidorum resolutio. Exaltatio autem non idem ac Euaporatio.
 sublimatio designat; Est enim artificiosa præparatio per quam res Exaltatio.
 quodammodo immutatur, vt ad altiorē substantiæ & virtutis di-
 gnitatem perducatur; vt cū rude quidpiam crudum ve maturatur Maturatio
 & perficitur. Huic dicuntur inferuire maturatio & gradatio: matu-
 rationi, digestio & aliquando circulatio. Maturatio est exaltatio è Digestio,
 rudi crudo ve ad coctum & magis elaboratum atque perfectum.
 Digestio est maturatio simplex, per quam res inconcoctæ & intra- Circulatio.
 ctabiles calore digestorio coquuntur, & mitiores tractabilesque
 redduntur. Circulatio est liquoris puri per solutionem circularem, Gradatio-
 ope caloris in vase Hermetis, seu Pelicano, exaltatio. Gradatio
 verò propriè ad metalla pertinet: Est enim illorum ad bonitatis &
 perfectionis gradum maiorem exaltatio, quâ pondus, & color, &
 consistentia ad excellentiorem gradum perducuntur. Sed ne lon-
 gius à proposito digredi videar, Chymicis suas præparationes re-
 linquam: Tractatio enim destillationum eò me impulit, vt hæc
 obiter attingerem, & velut parergon, ad latus, breuibus lineis de-
 pingerem.





INSTITVTIONVM

PHARMACEVTICARVM.

LIBER TERTIVS.

De compositione medicamentorum general.

Cur medicamenta componuntur.

CAPVT. I.



T simplex composito natura prius est, sic medicamenta simplicia compositis; primūque veteres Medici, referente Plinio, ad morborum curationem simplicia tantum præscribebant, vt Diocles, Praxagoras, Chrysippus, & Erasistratus. Hippocrates quoque, qui primus artis Medicæ fundamēta stabiliuit, ac leges condidit, omnibus pæne affectibus medebatur solis simplicibus

c.2.l.26
nat.hist.

medicamentis. Necessitas tamen exercitatos coëgit Medicos, inquit Aëtius, aliquando noua conquirere remedia, & ex simplicibus quædam componere, cum scilicet simplicia vbique mederi non possunt. Nam si solis simplicibus, ait Galen. vniuersos præter naturam affectus curare liceret, nullus vtique compositi vnquam vsus foret: & ait Villanouanus, vbi in promptu habentur simplicia morbo profligando sufficientia, dolus est, si quis compositis vtatur. At nullū datur tale simplex, quod id semper præstare valeat in omnibus. Quare compositionis medicamentorum necessarius est vsus: maxime verò in morbis, qui contrarias simul medicamenti facultates desiderant, quæ in his, quæ suapte natura proueniunt, non inueniuntur.

c.25.tet

4.ser.2

c.5.l.1.

comp.

med.

general

Multæ cau-
sæ sunt cō-
positionū
medica-
mentorum.

Multæ autem sunt compositionis medicamentorum causæ. Prima, quando morbo profligando deest aliquod simplex medicamentum omnino contrarium: tunc enim aliquod compositum vsurpatur, quod simplicis suppleat defectū; vt cum ad vlcus moderatè

Serapio

c.2.l.7.

detergendū, miscemus duo simplicia medicamenta, vnū quod potēter, alterū quod negligēter id præstat, ex quorū cōcursu accōmissiōne, vnū nascitur moderatē deterforiū. Secūda cōpositionis causa est, vt violentia medicamenti obtundatur, vel vt eius ignauia excite-
tur. Violenta illius qualitas hebescit admixtione benignioris, aut oppositi, vt cūm acribus lenientia permiscetur, amaris dulcia, im-
pensē calidis refrigerantia, malignis cardiaca Tertia ratio depromp-
ta est ab affectuum curandorum varietate. Quot enim sunt affectæ partes & humores noxij, tot medicamenta his analoga & destina-
ta debent præscribi. Cerebro siquidem & pulmonibus aut aliis per-
tibus malè affectis, id dari medicamentum debet, quod singulis prospiciat, & à causa morbifica liberet. Situs quoque & dignitas par-
tium affectarum, compositionem necessariam demonstrant; Nam pars quælibet non solūm roboranda, quæ principatum obtinet; vt
cap. I. l. cerebrum cephalicis, cor cardiacis, vt iubet Galenus; sed etiam se-
I. comp. pè alteranda, & ab humore peccante vindicanda, quod vno atque
med. simplici medicamento fieri minimè potest. Pars insuper longè a re-
gener. medijs dissita, ostendit sepè attenuantia permisceri debere, vt facilius
 qualitas medicamenti ad partem deferatur, vt ostendit Galenus lib.
 I. De comp. med. per genera.

Sunt aliæ quædam compositionis causæ minùs necessariæ, vt cūm ad gratiam palati, vel cordis medicamenta dulcorantur saccharo aut melle; vel condiuntur cinnamomo aut alijs aromatis; vel diluuntur in decoctis idoneis, vel in forma boli, aut electuarii solidi componuntur. Ad odorem enim, saporem, colorem & iucunditatem medicamentorum atque ad eorundem conseruationem in futuros vsus, multa sæpe adiunguntur, permiscetur, & simul vniuntur.

De Syrupis in genere. CAPVT. II.



CVM plantæ multæ non semper nobis sint ad manum, sed earum vel folia aruerunt, vel radices in terra latent hyeme, vel earum vis post flores & folia amissa perit, nec dum vrgente necessitate expetuntur possunt inueniri; ex his ad futuros vsus aut succi extrahuntur, aut decocta parantur mellis, aut zucchari, aut vtriusque simul quantitate sufficienti condita, vt possint in tempus longissimum, viribus integris manentibus asseruari, præcedente multa concoctione, vt syrupi consistentiam acquirant. Est autem syrupus medicamentum quoddam liquidum, ex succis, vel decoctionibus, cum melle aut zaccharo, ad saporis gratiam & conseruationem tamdiu coctum, donec iustam consistentiam acquirat: cuius indicium est, si guttula in marmor effusa non diffuat, sed hæreat, aut digitis excepta, horum abductione in fila ducatur.

Syrupus
quid.

sugarab.

Sunt verò syrupi Arabum inuenta, quos Auicenna vocat decoctiones, vel succos inspissatos cum dulcedine, iuxta vocem Arabicam *sugarab*, quæ potum quemlibet, modò suauem, vel *srab*, quæ vinum dulce vel potius syrupum nostro more paratum, aut potionem medicatam designat: Græci propomata, vel propotismata, & aliquando ἀποκωλίσματα vocare solent: Sapiùs tamen his nominibus veteres Oinomel, aut alias portiones mellitas intellexerunt, nam antiquioribus Græcis vix Syrupi nomen, eiusque parandi modus innotuit.

lib. 5.
sum.
tract. 6.

Contendunt nonnulli probabiliùs syrupos dici ab ὀποῖς, id est, succis, & σὺρω, i. traho, quasi sint succi extracti; Siue quod è Syria primum sint allati; siue ab eo, quod Alexandro Aphrodisæo dicitur σίραιον, defrutum, mustum, sapa, aut dulcis ex vino & melle potio.

Perfectè autem coquuntur syrupi cum melle aut saccharo, ne corrumpantur, totoque anno sint vsui, habentque propterea consistentiam crassiorem, eamque mediam inter sapam & iulepum, vt apozema inter iulepum & syrupum. Syrupus enim est minùs crassus sapa, syrupo, iulep, apozema iulepo. Sapæ enim vt & syrupi, quia crassiores, diutiùs & tutiùs sine corruptione seruantur, apozemata & iulepia quia tenuiora minùsque cocta, minùs: Vix enim integram hebdomadam perdurant, solentque à Medicis in rem præsentem imperari, vt quoties rei necessitas postularit ægrotis exhibeantur. De his verò fusiùs libro sequenti tractabimus: Nunc enim de his agimus quæ apud Pharmacopolas in longissimum tempus asservantur ad futuros vsus: Ex illis tamen in rem præsentem, vel apozemata conficiuntur, si in plantarum decoctis; vel zulapia, si in aquis stillatitiis dissoluantur. Sæpè quoque eclegmatum, opiatarum, & conditorum confecturam ingrediuntur, tum vt gratiam & vim præstantiorem, tum vt consistentiam acquirant scopo proposito conuenientiore. Per se tamen & impermixti sæpiùs præscribuntur: maximè verò qui sensim lambendo, ad expectoratum mouendum debent assumi, vt syrupi omnes bechici, cuiusmodi sunt syrupus de tussilagine, violatus, de glycyrrhiza, capillorum veneris, de hyssopo, aliique quamplurimi, qui propter dulcedinem sputum concoquunt.

Materia
syruporum

Fiunt autem syrupi ex decoctione herbarum, radicum, fructuum, seminum, florum, vel earum succis, atque etiam aliis quibusdà quæ scèliciter possunt decoqui. Eliguntur verò decoquenda quæ intentioni respondeant, seu ad partem quamdam roborandam, seu ad humorem quemlibet vitiosum emendandum, vel educendum, vnde syruporum nunc prostat tanta varietas. Componuntur enim ad calefaciendum, refrigerandum, humectandum, siccandum: Ad aperiendum, obstruendum, incidendum, incrassandum & purgandum.

Deco-

Decoctio verò eorum ex quibus syrupi parantur, fieri debet in aqua, interdum pluuiâ, sæpius fontana, aut fluuiatili, eaque optima, qualitatis scilicet omnis experte. Cuius quantitas rerum coquendarum quantitati & duritiei respondeat. Quæ enim duriora sunt, vt radices & ligna, vix nisi tempore multo, & aqua multa coquuntur citra adustionem. Proinde quantitas aquæ augenda est quando simplicia diutius coquenda sunt, vt etiam quando nimis sunt amara.

a *Act. cap. 30.* Decoctum colatum & clarificatum denuò coquitur cum pari quantitate sacchari, aliquando mellis: sæpè cum ambobus, & interdum cum sapa & alterutro, vt in Officina patebit.

De Propomat. CAPVT III.



ELLE dulcoratos omnes potus, generali significato, veteres Græci a Aëtij & Pauli iudicio Propomata nominarunt. Cùm enim illis vix zuccharum innotuisset, potulenta multa ad gratiam palati mellita reddebant, quæ nunc nos saccharata, vt suauiora efficiamus. Quædam tamen non sacchari defectu

b *Diony. A. reop.* melle condiuntur, tùm ad peculiarem saporis conditionem, tùm ad qualitatum, quibus pollet eximiarum consequutionem. Mel enim præter dulcedinẽ quã adfert linguæ iucundissimã, tandem vim habet

c *Herod. in Thalia d c. 177 de simp. medic.* conseruãdi, vt salis loco in multis vsurpetur. Babylonij b enim corpora mortuorum olim in melle sepeliebant: Et Appius c cocus, vt sine sale diu carnes asseruaret, melle contegebat. Multa quoq. condita vt & alia pleraque medicamenta mel excipiunt, tum vt magis arrideant, palatoque sint gratiora, tum vt securiùs absque corruptela conseruentur, & vires acquirant insigniores. Vnde Galen. d re-

Melle qui corpora condiebãt.

e *ca. II. lib. I. de alim. f Pau. c 14. lib. 7. de re-med.* ctè scripsit mel omnibus antidotis posse tutò commisceri: Est enim dulcissimum, e succumque gignit tenuissimum; & medicamentis admixtum efficit, vt ea permaneant f ac durent. Non tamen omnibus eque salutaris est illius vsus; Nam vt g senibus & frigidis confert, sic acutè febricitantibus & iuuenibus præsertim biliosis obest fæ-

g *cap. 8 li. 2. de fac. nat. h ca. 16 lib. 4. simp. i ca. II. li. I. de Anti-* pissimè, quia in corporibus calidis citò mutatur, & bilefcit, & amarescit, atque igni si plusculum admoueatur h amarum efficitur, vt etiam vetustate. Pater enim i Galeni mel quoddam habuit ita amarum, ac si in Ponto natum foret, eo in tractu, vbi ex absynthio mel apes colligunt. Idipsum tamen & Atheniense & optimum fuisse dicebat: verum temporis diuturnitate amarum euasisse, Mel autem primus ostendit Aristæus quidam Atheniensis, authore Plinio: l Et Curetes populi omnium primi, illius vsum docuerunt, licèt Bacchus illius perhibeatur author ab Ouidio, dum ait, *Liber & inuenti præmia mellis habet.*

Pater Galeni mel amarum habebat.

Porro ex melle multa medicamenta parantur, nec non potiones quadam vel liquidiores, iucundæ Paulo dictæ, vt hydromel aquosum & parum coctum, vel crassiusculæ, & diutius coctæ, vel info-

late, vt hydromel vinosum vulgò dictum, vt oxymel, & alia pleraque medicamenta, quæ à melle habent nomenclaturam, vt mella medicamentosa ex violis, anacardis, rosis, & similibus.

Quid Hydromelitis nomine intelligendū. Hydromelitis verò nomine multa comprehenduntur, vt mulsamelicratum, hydromel aquosum & vinosum, simplex & compositum. Nullum tamen est adeo simplex, quin melle constet & aqua, vt nominis indicat notatio, verum sic ad differentiam magis compositi nuncupatur, cuius multæ differentiæ sparsim describuntur à primæ notæ Medicis.

In Hydromelite quæ mellis ad aquam proportio. Varia autem est in hydromelite conficiendo, mellis ad aquam proportio, pro vario Medici scopo, atque sumentis temperatura. Ætatis enim tempore, & iuuenibus aquosissimum præscribitur: hyeme, & senibus, & pituosis magis vinosum seu melleum. Sic enim placuit maioribus nostris hydromel parum aquosum & perfectè

Hydromel vinosum. coctum, non improprie nominare. Saporem namque & calorem vini cuiusdam generosi, vt maluatici referre videtur. Sputum enim potenter mouet, pituitam concoquit, calorem fouet natium & stomachum roborat. Eius genuina descriptio & parandi modus traditur in officina à nobis edita.

Melicratū mulla & hydromel, Idem. Et licet vna non sit aquosi melicrati seu mulsæ, aut hydromelitis (hec enim nomine tantum non re discrepant) conficiendi norma, vulgaris tamen preparatio, à Mefue tradita, est aquæ librarum octo ad vnam mellis, tamdiu solum simul coctorum, donec spuma amplius non emergat, quam opinionem sequitur author luminaris maioris. Multi tamen cuique libræ mellis, aquæ libras decem, & aliquando duodecim miscent, pro intentionis varietate.

Hydromel rusticorum Rustici loturam fauorum colatam, æstate decoquunt, optimèque despumant, dein in vasis amplissimis reponunt, & suspenso in vase paucio fermento nodulo ligato, biduum aut triduum relinquunt; Tum magna voluptate ad sitim explendam bibunt. Est enim potus hic dulco-acidus, & illorum palato suauissimus. Alij incoquunt mellis libras sex in aquæ fontanæ libris quinquaginta, optimèque despumant. Deinde fermenti vnciam vnam cum dimidia vel vncias duas dissoluunt, & in dolia coniiciunt, relicto quodam spatio, vt duorum, aut trium digitorum vacuo.

Apomeli. Apomeli verò parum dilutum est, viresque vt equat hydromelitis vinosi, sic mellis ad aquam proportionem habet eandem eundemque parandi modum, vt n̄ alibi demonstrauimus.

Oinomel. Inter potiones mellitas annumeratur Oinomeli, quod fit ex partibus duabus vini veteris, & vna mellis. Interdum etiam ex partibus sex musti & vna mellis secundum Oribasium. Et quia mel tenuissimum est partium atque dulcissimum, medicamenta quæ illud admittunt, ad crassorum humorum attenuationem, coctionem & expurgationem maximè conducunt.

vt à G.
lib. de
Dina-
mul &
Paulo l.
7. de re-
med.

mpart.
3 dist. 6

n In of-
ficina.

oc. 25.
lib. 5.
collect.



a Gal. lib. 1. simpl. lib. 2. comp med. loc. **Q**UOD Græcis oxymeli dicitur, & Arabibus Secania-
bin, pharmacopœi sæpè, nec impropriè acetum mul-
sum nominant. Est enim acetosus syrupus, ex aqua &
melle seu mulsâ, & aceto paratus, vnde dulco-acidus
gustu percipitur: Saporemque vt mistum habet &
varium, sic quoque vires mistas, tam ratione mellis ad acetum,
quã aceti ad seipsum. Acetum enim pugnantibus qualitatibus constat, *Acetum ca-
lidum &
frigidum,
Oxymeli-
tis quali-
tas.*
estque a frigidum & calidum, discussorium & repulso-
rium. Proinde Oxymel morbis calidis prodest & frigidis, humores crassos &
lentos incidit & attenuat, abstergit, sputum educit, obstructions
aufert, humores frigidos ad expulsionem præparat, calidos tempe-
rat, & sitim extinguit. Mel enim humoribus frigidis reluctatur, ace-
tum illorum lentori, aqua calori: Efficetque præterea, vt mel diu-
tius concoquatur, commodius despumetur, & oxymelitis virtus
meliùs distribuatur, vt rectè Mesuei interpres notauit. Non solum
autem mel esse debet optimum, dulcissimum nempe & acerrimum, *Mellis op-
timi notæ.*
colore pallidum, nec valde crassum, nec dilutum, & quod spumæ
parum egerat, sed etiam aqua: quæ cum sit tam sanis quàm egrotis
commune solatium, vt loquitur Galenus, omnibusque maximè ne-
cessaria, purissima ac optima esse debet. Talis autem indicatur gu-
stu, visu, olfactu. Gustu, si nullam planè qualitatem præ se ferat,
sed videatur ab omni qualitate immunis: Visu, si pura, sincera &
exquisitè clara. Olfactu, si eorum nihil inest, quæ in aquis vitiosis
esse olfactus testatur. Acetum quoque optimum sit est necesse, &
album potius quàm rubrum, non stillatitium, nec aquosum: sed *Acetum
quodnam
optimum.*
acerrimum, quod vim habet ad incidendum & tenuandum poten-
tior. Ab aceto siquidem id habet oxymel, vt inter pharmaca
numeretur, cum vix in eorum censu sit mulsâ, inter vtrumque est
Apomeli, à Serapione Acumeli dictum.

Cum autem cuiuslibet aceti non sit eadem virtus, nec singulis ho-
minibus in gustando eadem delectatio, apud omnes mellis ad ace-
tum non est eadem proportio. Sunt enim qui magis, alij qui minus
mellitum, aut acetatum desiderant. Vnde Serapio censet debere
fieri secundum illum qui bibit ipsum, vt loquitur. Descriptio tamen
à Mesue & Oribasio tradita recipitur, & vbique parata inuenitur.

Fit autem ex aceti vna parte, mellis partibus duabus, & aquæ
quatuor: omniaque simul coquuntur ad consistentiam syrupi liqui-
dioris. Licet enim minùs perfectè coquatur, ratione tamen mellis,
tutò ac diu sine corruptela seruetur. *Oxymelitis
præparatio.*

Dicitur verò oxymel simplex, colatione facta ad magis compo-
situm, quod scilicet, præter aquam, mel, & acetum, multas excipit
radices, aut fructus, cuiusmodi multæ formulæ describuntur à Ni-
colao Myrepso & recentioribus.



Gelenia-
bin.

Mel passu-
latum.

Mel rosa-
rum folia-
tum.

Quomo-
do mel ex
fructibus
parandum.

ROSTICORVM saccharum est mel, quo sæpè cerā-
sa, ribes, agrestam, & pira condiunt. Pharmacopœi
verò non sacchari defectu, sed recto Medicorum
consilio sulti, fructus quosdam, succos & flores
melle conficiunt, efficiuntque velut conseruā, sapā
& syrupum. Conseruam quidem, vt mel illud rosa-
tum, geleniabin Arabibus, & Rhodomel Græcis dictum, quod fit ex
vna parte florum rosarum rubearum contusarum, & triplo mellis
despumati: Sapam, vt mel passulatum, quod ex libra vna passula-
rum mundatarum, in libris tribus aquæ per diem integrum mace-
ratarum, coctarumque ad dimidias, & postea colatarum, & aqua
mellis despumati quantitate conficitur: Syrupum, vt mel aliud rosa-
tum, quod ex pari mellis despumati & succi rosarum rubrarum pō-
dere paratur. Mel quoque mercuriale simili modo conficitur & co-
quitur in consistentiam scilicet syrupi crassioris.

Vt autem varia est mellis rosati consistentia, sic varia descriptio
preparatioque. Multi enim eandem quantitatem rosarum ab vn-
guibus purgatarum & mellis ponunt, vt Mesueo placuit, non ta-
men, vtille, excoquant igne, sed Soli æstiuo per dies decem aut
duodecim exponunt, antequam in Pharmacopolio reponant. Sic
citra colaturam paratum rhodomel, à recentioribus vocari solet
mel rosatum foliatum, & à nonnullis, Conserua mellis rosarum.

Quod verò ex partibus æquis succi rosarum rubearum, & mellis
despumati conficitur, propter saporem, consistentiamque, syrupus
mellis rosati nuncupatur. Inter vtrumque medium est, quod partim
ex foliis rosarum & earum succo, atque pari mellis pondere præ-
paratur. Prior tamen parandi modus magis recipitur, illiusque in-
star cetera mella medicata ex alijs floribus conficiuntur.

Præstat autem ea insolari, quàm igne decoqui, quia facilè dissipa-
bilis florum odor perit, illorumque qualitates vix integræ remanēt
post cocturam. Insolatum verò facillimè ferunt, qui calore potiùs
blando, ac longiore, quàm feruido ac breuiore agens, ista medica-
menta meliùs permiscet. Mel tamen illud quod ex rosis paratur re-
centibus, igne lento solet concoqui; quod ex siccis, tantùm insolari.

Quoquo modo paretur mel rosatum, seu ex floribus integris, vel
pistis, ante vsum debet paululum calefieri, vt percoletur, vocatur-
que tunc mel rosatum colatum.

Vt autem fructus duriores sunt, coctu difficiliores & minùs diffi-
pabiles foliis & floribus, sic mel ex illis medicatum dissimili modo
paratur. Insolatus enim non sufficit, sed longa concoctione opus
est; idque in aqua, priusquam mel accedat ad confectionem.
Atque vt ritè fructus percoquantur, debent viginti quatuor

horas in aqua tripla macerari, dein ad tertias aut dimidias feruefieri. Tandem colaturæ par mellis pondus additur, peragiturque concoctio ad consistentiam syrupi.

De Sapis. CAP. VI.



X herbis fructibusque succi educuntur, qui ubi colati & expurgati fuerint, & Solis aut ignis beneficio consistentiam nacti fuerint duriusculam, sapæ & succagines medicatæ, Græcis ἀπικυλίσματα, & Arabibus Rob, seu Robub nominantur. Sapa tamen Sapa quid. propriè loquendo, vinum est ex vuīs albis maturisve expressum, & ad mellis consistentiam percoctum, estque verum Rob Arabum. Alia verò quæuis succago extracta, & ad iustam spissitudinem percocta, generaliùs Robub appellatur.

Ista tamen Barbarorum nominum distinctio ferè negligitur, & sine discrimine Rob & Robub pro quouis inspissato succo vsurpantur, vt ex Mesue liquet, qui propriij idiomatis non ignarus, quosuis concretos succos, potiùs Rob quàm Robub nominat, licet aliter senserit interpres.

Extrahuntur autem succi vel prælo, vel solo manuum compressu, dein per mantile traiciuntur, vt quicquid inest sordium linteo adhærescat, & purior tantùm succus transmittatur; qui postea lebetes, aut alio vase exceptus insolatur, vel igni lento coquitur dum crassescat, & formam solidam acquirat. Sic enim illius aquea humiditate resoluta, in multos menses, annosve sine putredine asseruatur.

Porro succaginum aliæ simplices sunt, aliæ compositæ. Ex simplicibus quædam substantiam habent friabilem, & facultatem purgatoriam: coquunturque diutiùs vt perfectam soliditatem acquirant: cuiusmodi est aloë, scammonium & similia: Aliæ substantiam habent magis lentam & viscidam, & qualitatem vt plurimum astrictoriam acidamque, vt sunt omnia Rob à Mesue tradita. Compositæ succagines dicuntur, quæ præter succos concretos saccharum admittunt, vt Rob berberis conditum, rob citoniorum, mororum & similibus fructuum.

Sapæ simplices & compositæ.

Vt ergo defrutum dicitur vinum dulce ad tertias tantùm coctum & expumatum, ac liquidum adhuc manens, sic sapa propriè dicitur vinum expressum in consistentiam duriusculam calore inspissatum, quod & rob, & robub dici potest. Si quis nominum quàm rerum magis sollicitus est, liceat illi Robub ad omnes æquè succos potius referre.

Defrutum quid.

Vsus saporum ad multa commendatur, præsertim ad morbos oris, sæpèque præscribuntur per se, nonnunquam & aliis confectionibus admiscuntur, vt diamorio, diacodio, & quibusdam syrupis.



FLORVM virtus facilè cum sit dissipabilis, vix diu retinetur integra, sed multum coctione, vel tēpore imminuitur & resoluitur sæpè. Vt autem retineatur, flores saccharo aut melle condiri solent, efficiturq; conditum, quod multos menses annosve, sine magno virium dispendio conseruatur, vnde conserua non improprie nominari consuevit. Cuius duæ differentiæ statuuntur, vna dicitur liquida, seu mollis: digitis enim prementibus cedit, illisq; nonnihil lentoris relinquit. Altera vocatur sicca, quæ solidior est multò, atque in pastillos efformatur, quibus potius digiti cedunt.

Quia verò flores omnes substantiam non habent æque compactam nec eandem temperiem, non omnes modo simili condiuntur, nec eandem sacchari quantitatem in sui conditura postulant.

Qui humidiores sunt, in loco, nec humido, nec valdè calido, diem vnum aut alterum parum tabescent, vt superflua illorum humiditas resoluatur. Sicciores, quo recētiore & magis succulenti, eo meliores.

Inter humidiores ex quibus conseruæ fiunt, numerantur flores nenupharis, rosarum, cichorij, violarum, borraginis & buglossi. Sicciores sunt flores saluix, hyssopi, rorismarini, arantiorum, iasmini, betonicæ, persicorum, atque multorum aliorum simplicium, qui nunquam aut rarissimè condiuntur.

Humidiores, maiorem quantitatem sacchari ad sui confectio-nem desiderant, sicciores minorem. Quibusdam æquum sacchari pondus sufficit; Aliis sesquiportio: Multis duplum requiritur: Rosis & nympheis conceditur triplum.

Nonnulli cum sacchari duplo pondere, aut quantitate idonea integri commiscentur, & vnum, aut duos menses, pro florum crassitie vel tenuitate relinquuntur insolari.

Conserua
rosarum
qui fiat.

Alij, vt rosæ ex vnguibus purgatæ, in mortario lapideo, cum pistillo buxæ laboriosæ teruntur, & sacchari triplo exquisitè permiscentur, postea recunduntur in vase figulino, vitrato, charta rectè obturato, non foraminulenta, ne florum vis dissipetur.

His peractis vas mensem integrum aut dies quadraginta insole-tur; Sic enim nulla virium aut odoris dissipatione, optima fiet con-diture fermentatio, cuius singulas partes calor solis fœliciùs perua-det, si singulis hebdomadis bis aut ter rudicula quadam agitur.

Quidam saccharo liquato & ad electuarij consistentiam cocto, flores aliquando integros, sæpiùs tamen tenuissimè tritos, immer-gunt, perfectè que commiscent. Dein vbi eiusmodi mistura refrigit, pyxidibus recondunt & insolant.

Si inter condiendum, parum succi limonum aut agrestæ adiciatur, rubeus color, viuidusque comparabitur, vix intra annum de-
bilis, si adhuc calens vase reponatur. Simul enim atque refrigerat, Quomodo
conserua
rubra fiat.
crustula quædam in superficie adnascitur, quæ colorem, odorem
& virtutem diutius tuetur.

Folia autem cum substantiam habeant magis compactam & qua-
litatem minus euanidam, raro conseruæ ex illis parantur. E longin-
quis enim regionibus fœliciter aduehuntur viribus integris. Quæ-
dam tamen cum facultatem habeant eximiam, eamque in superficie
positam vix sine facultatum iactura exsiccantur, vt oxalis & capil-
lus veneris verus. Proinde ex illis optimè repurgatis conseruæ parā-
tur, vt ex capillo veneris Monspeliensi; Præ cæteris enim laudatur, Monspeliē-
sis ager
multis sim-
plicibus
luxuriat.
Mōpessu-
lani medici
celebres.
vt & alia multa simplicia, quæ vberrimè illo in tractu luxuriāt; Au-
dio tamen Monspessulum magis ob medicorum quam medicamen-
torum præstantiam commendari.

Vt vt sit conserua capillorum veneris optima ex agro Monspe-
liensi in multas Gallia regiones aduehitur, quæ ex æquis partibus
foliorum mundatorum tritorum, & sacchari puluerati simul misto-
rum, parata est, & legitimo tempore ac sufficienti insolata.

Sunt qui hanc conseruam meliorem putant, si ex herbæ decocto
& saccharo syrupus fiat perfectè coctus, cui rursus folia herbæ mun-
data & optimè trita permisceantur. Sic enim vim acquirit præstan-
tiorē, & consistentiam magis idoneam.

Conserua verò sicca fit ex rosis siccis tenuissimè læuigatis cum
octuplo saccharo ad consistentiam electuarij cum aqua rosacea Conserua
sicca.
cocto, cui parū succi cuiusdā acetosi, vt limonum, aut agrestæ com-
miscetur. Reddit enim hoc acidulum conseruam non modò dulco-
acidam & gustui suauissimam, sed colore magis rubram, ac iucun-
diorem.

Eadem arte ex alijs floribus siccatis ac tritis, sicca conseruæ pa-
rantur.

De conditis in genere. CAP. VIII.



ADICES, fructus & aliæ plantarum partes con-
diuntur, vel ad conseruationem, vel ad saporem,
vel ad vtrumque. Ad conseruationem, sale vel ace-
to, & ambobus sæpè multa condiuntur, vt oliuæ, Conditura
cur fiat.
cappares, crithmum, cucumeres & flores genestæ.

Ad saporem, cortex citri, arantiorum, amygdalæ,
pinei, cariophylli, nuces & multa semina, melle aut saccharo confi-
ciuntur. Ad vtrumque radices multæ, vt & fructus & flores. Sic
enim radix Satyrionis, pyra, pruna, berberis, agresta, & flores bu-
glossi, aut violarū suauius edūtur, & melius ad tēpus lōgū asseruātur.

Conditali-
quida.

Quæ autem condienda sunt, prius syrupo idoneo concoquuntur, & vasis fictilibus aut vitreis simul cū eo reponuntur, asseruanturque, & à pharmacopœis condita liquida nuncupantur. Quòd si post coctionem perfectam, ea ipsa aëri exponantur, donec illorum extima superficies aruerit, vduſque lentor, quo digiti contrectantium inuiscantur, planè resolutus fuerit, confecturæ siccæ nominantur.

Confecturæ
siccæ.

Huc quadam rerum affinitate referri posset quædam conditi species quæ pasta regia vocari solet, sed de ea magis appositè libro quinto agemus, in tractatu remedium particularium.

Tragemata.

Ad condita solida spectant ista bellaria, quæ aromatarii trageas & tragemata nominant. Ignis enim adiutu, & appulsu sacchari præparantur, vt cætera condita, modo tamen dissimili. Si enim semina, exempli loco, condienda sint, saccharum prius in consistentiam syrapi coquitur, dein sensim semina affunditur: Tum manu agitantur. Idque toties repetitur, donec ea ipsa saccharo prorsus obducta sint & incrustata. Hoc modo arantiorum cortex minutim secta, vt & cinnamomum solet condiri. Fructus cū sint humidiores liquidam confecturam desiderant; semina quia sicca, siccam.

De pulueribus. CAPVT IX.



Puluerum
in Chirurgia frequẽs
vſus.

PULVERIBVS ars pharmaceutica minimè carere potest. Cū enim medicamenta plūs minus humida sint, vel arida ^{ἐνπλά} Græcis dicta; hæc pulueres, vt plurimum sunt, illa maiori ex parte, sunt pulueribus concinnata, vt electuaria, conseruæ solidæ, trochisci, emplastra, & pleraque alia medicamenta, tum quæ intrinsecus assumuntur, tum quæ adhibentur exterius. Nihil liquidem in Chirurgia tam frequenter auditur, præscribiturve, quàm puluis, sarcoticus, astringens, escharoticus; Nihilque tam sedulo à pharmacopœis præparatur ac custoditur, atq; pulueres cardiaci, cephalici, & roborantes, qui non solū aliis remedium formis cōmiscuntur, sed etiam per se sæpissimè imperantur ad varios vſus, affectusue, vt ad principes partes roborandas, conseruandas vires, extinguenda venena, fluxiones compescendas, coctionem iuuandam

Puluis vul-
nerarius
optimus.

& aluum sistendam aut ciendam.

Puluis epu-
loticus ep-
timus.

Affectus verò externi sæpè solis, vix sine illis curantur, vt vulnus puluere rubro, ex partibus duabus sanguinis draconis, & vna thuris composito; vt vlcus cauum & deterſum puluere sarcotico; vt ad cicatricem vtrumque perducendum puluere epulotico, cuiusmodi est puluis pompholigis, cadmiæ, cerusæ, spodij, terræ lemniæ, & plumbi vt decet præparati.

In summa, vel medicamenta forma puluerum dantur, vel ex his soli-

solidiores formę paratur, materiamque mutantur suam. Hi etenim non solum in varias formas medicamentorum coaptantur, sed ipsorum, seu corpus, seu qualitatem spectes, ex maxima parte sunt, Pulueres in medicina quid præstent.

Fiunt verò pulueres ex selectissimis medicamentis, plus, minusve tritis, pro medicamento natura & exigentia rei. Verum, quæcūque læuigata sunt, ac in pollinem redacta, generali nomine, Latinis pulueres dicuntur, quos distinctius Arabum idiomata his tribus designant, suffuf, alkool & sief. Suffuf puluerem quemlibet lauem aut crassiusculum complectitur: Alkool tantum signat tenuissimum: Sief, quorundam trochiscorum attritionem denotat, quæ fit in cote, ex aqua rosarum, aut feniculi, vel alterius conuenientis ad affectus oculorum. AlKool.

Ex pulueribus autem nonnulli condimentis sunt tantum destinati, qui scilicet ex aromaticis parantur, vt pipere, zinzibere, nucem moschata, galanga, cinnamomo, & similibus aromaticis speciebus, vocanturque à Seplasiarijs, minutæ species, Minutæ species. quas solent in sacculis coriaceis asseruare. Alij dicuntur cardiaci ac roborantes qui ad medicamentariam artem tantum spectant, vt puluis diarhodonis abbas, diacinnamomi, dianisi, lætitie Galeni, & similes pulueres cordiales qui reponi debent in pyxidibus aut vasis vitreis, Pulueres cordiales. vel figulinis optimè clausis, ne subito eorum virtus expiret. Alij parantur pulueres cathartici potius in rem presentem, quam in futuros vsus, quia diutius asseruati vires amittunt, aut imbecilliores multo redduntur.

Vix autem quilibet puluis intro sumitur solitarius & immixtus sed aqua vel alio liquore excipitur. Exteriùs verò non item; nam vulneribus, vlceribusve sæpè solus adhibetur.

Suffitores & cosmetici, quique fucis vetulas erugant, & tetrum expirantem ab edentulis odorem fascinare ac tegere pollicentur, varios pulueres ex aromaticis & suauolentibus conficiunt, vt ex radice Ireos, rosas, santalis, storace calamita, belzoino, sibernanto, calamo aromatico, cinnamomo, caripopl'yllis, maiorana, ambra, moschio, zibetho: Ex quibus & aliis odorem iucundum spirantibus, varia proportione mixtis, pulueres duos insignes, Chyprium nempe & violeteum- vt vocant, conficiunt, aliosque multos ac varios, pro varia eorum à quibus expectantur, delectatione. Solent verò reponi in sacculis sericeis, & in arculis cū vestibus asseruari & gestari. De his autem parum sollicitus esse poterit pharmacopœus, quem magis decet puluerem diamargaritonis habere optimum, quam Chyprium. Cosmetico rum studiū.



Daſperię arterię & pulmonum affectus medicamen-
tum quoddam paratur, ſyrupo craſſius, & electario
quouis liquidius, quod Arabibus Lohoch, Græcis
Eclegma & ἐκλειπὸν, & aliquando ἀρτηριακόν, Latinis
linctus nominatur. Senſim enim velut lingendo, ſeu
lambendo ſumitur, vt ſic in via diutiùs cupēdando,
aliquid in thoracem deerret, vel ſaltem illius bechica viſ ad ina-
nia thoracis ſpatia & bronchia pulmonum deferatur, ſputum con-
coquat & moueat ad excluſionem, quæ ſœliciter naturæ robore
ſuſcipitur ex ſputo concocto, per anacatharſin, ſeu per os expecto-
rationem.

Eclegma-
rum vſus.

Exhibentur non ſolùm manè, ieiuno ſtomacho, ſed etiam veſpe-
ri, ac inter paſtus ſapè, ad varios effectus, pro varia intentione &
medicamentorum, quibus conſtant, materia & intenſione, & qua-
litare: dantur enim ad leniendum, detergendum, increſſandum, in-
cidendum, expectorandum, & ſanguinem ſiſtendum. Proindè ex
medicamenti cuiuſlibet ſaporis, vt olim veteres, eclegmata poſſunt
confici. Diſplicent tamen valdè amara & acerrima, quæ ſcilicet,
præter ingratum, quem adferunt palato ſenſum, tracheam arteriam
& fauces exaſperant, & pulmones moleſtè laceſſunt. Acidula ta-
men interdum præſcribuntur ad craſſorum humorum attenuatio-
nem.

Nunc verò ſic apud omnes inualuit bechicorum vſus ad eclegma-
tum confeſturam, vt ſolis dulcibus ferè componantur, vt ſucco gly-
cyrrhizæ, pineis, iuiubis, ſaccharo cando, roſato, penidiis, diatraga-
cantho & eiufmodi electariis tritis, & melle aut ſyrupo idoneo ex-
ceptis.

Quod ſi alicuius præter naturam affectionis conditio, amara vel
acria poſtularit, ea minore copia reliquis medicamenti immiſcen-
da ſunt, tum vt liberiùs ſumantur, tum vt humorem contentum al-
terando, continentem partem non lædant. Eiufmodi lohoch prop-
ter vim quam habent inſignem incidendi & aperiendi imperantur
Aſthmaticis, & hiſ qui propter craſſos humores pulmonibus con-
tentos difficilè ſpirant.

Solent verò eclegmata ſumi ex bacillo glycyrrhizæ parùm contu-
ſo, vel ex cochleari, & in ore detineri donec ſua ſponte liqueſcant,
& ſenſim dum per œſophagum delabuntur, aliquid ſubditâ in arte-
riam ſeſe inſinuet.

Reponuntur in vaſis fictilibus vitratis, & annum integrum aſſer-
uata, vires ſeruant integras. Quæ tamen amygdalas, nuces aut pi-
neas excipiunt, vt rauceſcunt citiùs, ſic illorum virtus citiùs ſeneſ-
cit.

Prostat in officinis electarium quoddam liquidiusculum pro clysteribus, ex libra vna decocti violarum, maluæ, mercurialis, parietariæ, betæ & absynthii, cum pari pondere medullæ cassiæ & mellis despumati paratum; Quod cum sit syrupo quouis crassius, & à cassia colorem mutuetur & virtutem, lohoch de cassia nominatur.

Lohoch
pro clysteribus.

De Electuariis in genere. C A P. XI.

lib. 5.
simpl.



EDICAMENTA quæ foris adhibita, veneno cuilibet siue intra corpus sumpto, seu morfu inflicto, medentur, Alexiteria dicuntur Græcis; vt antidota, quæ non quidem extrinsecus adhibita, sed intrò sumpta, grauissimis affectibus auxilio sunt. Suntque Galeno media inter venenum & nostram naturam. Eorum autem triplex est differentia, nam alia ad lethalia medicamenta, alia ad bestiarum virus, alia ad morbos ex prauo victu dantur. Verum Galenus nihil ducit istam quæ solet adferri inter alexiterium & Antidotum differentiam, nam apud Hippocratem alexiterium, idem est, ac *Condrina* id est, remedium, & *ἀνέξαστα*, idem quod *Condrin* Latini vero interdum, vt nomen vtrumque retinent & confundunt, sic sæpius electarij nomine designant. Veterum enim antidota, recentiorum electuaria sunt quorum pro consistentiæ varietate duo genera constituuntur: Alia enim solida sunt, & liquida, in tessellas, seu lozengias, vt vulgus pharmacopœorum loquitur, cōplanata; Alia molliora in opiata consistentiâ subacta & formata. Si verò Galeni arbitrio, antidotorum, seu electariorum differentia sumatur ab illorum qualitate & viribus, alia medicamentorum lethaliū gratia assumuntur; Alia valent aduersus bestias virus eiaculantes; Alia morbis ex prauo victu contractis offeruntur. Sunt verò quædam ad hos omnes vsus accommoda, vt quæ non modò salubriter intro sumuntur, sed etiam exterius admouentur, vt theriaca, & mithridatium.

Electaria
liquida.

Pro varia igitur electariorum soliditate, quædam dicuntur sicca & tabulata, alia minus dura, quæ scilicet opiata consistentiam, eamque mediam inter eclegma & pilulas, vt omnes antidoti, quarum pulueres sapa, melle, aut vino subiguntur, qui si saccharo, vt decet apparato, excipiantur, & ligneo pistillo agitentur, iustam electarij solidi consistentiam acquirunt: Itaut pro mellis aut sacchari adiectione, & artificiosa mixtione, vnum & idem electarium, liquidum aut solidum possit efformari. Rarò tamen quæ cassiæ medulam, aut fructuum pulpas admittunt, in tabellas complanantur.

Proportio
mellis, aut
sacchari in
electarijs.

Tanta verò esse solet mellis proportio ad pulueres in electariis liquidis, quanta sacchari in solidis, ita nimirum, vt vni libræ sacchari,

aut mellis, tres vnciæ puluerum commisceantur. Alterutrum tamen modò augetur, modò minuitur, prout antidoti vis desideratur validior aut imbecillior. Quo enim maior sacchari aut mellis quantitas puluerib⁹ additur, eò vis electuarij imbecillior; quò minor, eò maior.

Tabellis purgantibus solet dragma vna tantum pulueris vnciæ sacchari paulò supra consistentiam Syrupi, in aqua aut succo cocti permisceri. Cardiacis accedunt sæpè vnciæ duæ sacchari ad dragmam vnā puluerum, quorum quantitas tanto minor esse debet, quanto qualitas validior, & sapor magis ingratus.

Medicorū
error.

Debent autem medici iustam sacchari mellisve quantitatem definire. Dum enim vtriusque tantum, quantum satis, more nimium solito, in suis formulis præscribūt, ancipitem in electario conficiendo pharmacopolam relinquunt, illiusque arbitrio salutem cōmittunt ægroti, ita ut possit vim medicamenti vel imbecillio rem vel intensiorem, vti libuerit, efficere; Vixque duos pharmacopœos inuenies, qui eidem remedio, eadem proportionē mel aut saccharum adiiciāt, vbi quantitas vtriusque subicitur.

Electarium
liquidum
faciendi
modus.

In mollis antidoti confectura, mel cum aqua pauca diluitur, sensimque moderato igne coquitur, ac despumatur, dum aqua, vel alius liquor antè mixtus exalarit. Tum ab igne remouetur, & antequam plane refrixerit, puluerum confusorum vnciæ tres in mellis sic preparati singulas libras paulatim insperguntur, & ligneo pistillo permiscuntur, dum mixtorum quædam sit æqualitas.

Si pulpa cassiæ, vel tamarindorum, aut manna, dactyli, amygdalæ, aliive fructus admiscendi sunt, non debet istorum causa, mellis pondus immutari. In legitimæ enim consistentiæ electario conficiendo, puluerum maximè siccorum ad sapam, mel, aut saccharum est habenda ratio.

Nō debet autem electariū molle in pyxide reponi, antequā planè refrixerit, ne illius pars superior extrinsecus velut mēbranula quadā incrustetur, meliùs fermentetur, & vbique sit æqualis crassitudo.

Electarium
siccum fa-
ciendi mo-
dus.

Saccharo quoque sua debetur preparatio, antequam pulueres excipiat. Debet enim aqua stillatitia, aut alio liquore idoneo solui, igne despumari, & lentè ac tandiu coqui, dum syrupo crassior euadat, eiusque gutta extracta propter spissitudinem vix effluat: Dein aliquantum refrigerato, species paulatim admiscuntur, confunduntur, & agitantur pistillo, donec totum soliditatem & æquabilitatem adeptum sit. Tum marmori priusquam refrixerit admouetur, pistillo dilatatur, complanaturque Refrigeratum in tabellas discinditur, quadratas, vel rhomboideis, easque pondere dragmæ vnus aut duarum, triumve, quæ postea in sacchari duritiem concretæ, in arculis reconduntur.

Cuiuscumque sit consistentiæ electarium, siue solidū, siue molle, simpliciū vires optimè, ac diu seruat integras. Diutius tamen solido,

molle, cuius humiditas maior medicamento facultates magis coërcet, impeditque ne tam cito ab aëre dissipentur.

Quò electaria quæuis palato gratiora sunt, eò citiùs hebescit illorum energia ac facultas: Vix enim annum durant efficacia. Amara & ingrata biennium, & triennium sæpè; Interdum theriaca sine magna virium iactura decennium.

De Hieris. CAP. XII.



HIERÆ parum admodum differunt ab Opiatis, Opiatæ ab electariis liquidis: Consistentia enim omnibus est eadem, & sæpè vis purgandi. Electaria tamen & opiatæ interdum nec purgando aluum turbant, nec molestè feriendo gustum, palato displicēt.

At hieræ præter purgatoriam quam semper habent facultatem, valdè sunt amaræ, & ingrata, vt cognominis indicat notatio. Picræ siquidem dicuntur, ob insignem amarorem, vt hieræ, id est, sacra, ob insignes effectus. Conficiuntur ex laxantibus & amaris, eustomachicis tamen, quæ scilicet à ventriculo, & regione prima corporis, crassos ac pituitosos humores incidunt, & clemēter expurgant: Maximè verò ea, quæ à Galeno immutata & emendata, ab ipso nomen habet, quæ biliosarū quoque ventris affectio-
num, optimum est remedium, inquit ipse, adeò vt in vno die sæpè multos stomachicos creditos perfanet. Nam ex his quæ ei admiscētur, cū aloë stomacho valde sit cōmoda, & cinnamomum vim habeat aperiendi, extergendi & attenuandi, est enim partium tenuissimarum, si quid crassum sit, aut viscosum in humoribus, ad omnes affectus circa ventrem, & stomachum ex vitiatiss succis vtiliter exhibetur, modo ex acuta febre non incanduerint.

Hieræ siquidem facultas calfactoria cū sit & exsiccatoria, febribus his per quas humores accenduntur in vasis, & corpus totum estuat, vix securè potest exhiberi, licet per febres nō vehementes, aliquando Galeni consilio detur.

Sunt verò hierarum, præter picram Galeni variè descriptam, variè compositiones, quæ omnes ab effectu, hieræ, à sapore, picræ nomen sibi vendicant: vt à materia, quæ in compositione, quantitate aut qualitate præpollet, quædam hiera colocynthidos dicitur; Et aliæ Logadij, Pacchi, aut Myrepsi nomine conficiuntur, quòd illarum compositiones primi inuenerint, aut inuentas castigarint, auxerint, immutarint.

Hieræ picra Galeni dicitur quod eam emendat.

Hieræ variè descriptæ.

cap. 2. Singularum descriptiones extant in officina, earum compositio
lib. 4. docetur, & vires fusissimè explicantur.

de loc. Porro, ex hieris, quædam vim purgatoriam ab aloë tantum
affect. mutantur, eamque fortem non habent, & vix, ait Galenus, vsque ad

locos circa hepar conscendunt, nisi ampliori pondere fumantur. Suffusionibus enim oculorum vtiliter dantur, quatenus ex stomacho potius quàm cerebro noxios humores educunt. Verùm quæ colocynthidem, vel agaricum, vel vtrumque recipiunt, aut scammonium, potenter aluum turbant, & inutiles succos ab vniuerso corpore trahunt, forasque propellunt.

De Opiatis in genere. CAP. XIII.



INTER electaria liquida Opiatæ numerantur, id sortitæ nominis, vel ab opio mixto, aut hypnotico simili, vel ab illius recens inspissati consistentia, & fortassis colore, qui vt plurimum idem est in opio & in mollibus antidotis, tam cardiacis, quàm laxantibus.

Opiatarum appellatio amplissima.

Et licet angustiori significato, opiatæ tantum dicantur veteribus, medicamenta, quæ opium admittunt, cuiuscunque sint consistentiæ, vel solidæ, vt ladanum chymicorum, & pilulæ de cynoglossa, vel molles, vt Philonium Romanum, nunc tamen latius pro quibusuis confectionibus molliusculis vsurpantur, cardiacis, alterantibus, purgantibus & narcoticis; Seu opium admittant, vt Theriaca; siue cardiacis tantum & alterantibus consent, vt confectio Alkermes & de hyacintho; siue purgantibus, vt Triphera, Diaprunum, & similia, quæ tamen frequentius, electariorum & confectionum nomine designantur.

Opiatæ cur inuentæ.

Fuerunt autem opiatæ ab antiquioris notæ medicis inuentæ, ad *Gal. ca. 2. lib. 2. de loc. affect. Aret. cap. 12. lib. 2. de sign. & cau. diut. morb.* sauitiam dolorum leniendam. Nam cum dolor sit tristis sensus, naturæ grauis, & toleratu molestissimus; humores variè exagitat, sanguinem corrumpit, febrem accendit, deicitque vires; Ita vt cogatur interdum medicus, morbum relinquere priorem, vt tanto symptomati his præsidii medeatur, quæ licet morbi causam non tollant, sensus tamen sopiendo conciliandoque somnum, vires symptomatum acerbitate fatiscentes, animumque adeò reficiunt, vt postea vegetiore conatu morbificam causam faciliùs extrudant.

Doloris vehementia desperationis interdum patens.

Narcoticorum igitur vsu fallenda nonnunquam doloris acerbitas, quæ multos eò dementiæ impulit, vt crucem quàm vitam potius eligentes, manus sibi violentas attulerunt.

Confectiones colicæ.

Tam sauos cruciatus multoties obseruauit Galenus in doloribus colicis, qui nullis mitescerent remediis communibus vt ad illorum sedationem, opiatas quasdam narcoticas, posteritati consulens descripserit, confectionesque nominauit colicas, vt quæ symptomatis huius feritatem lenirent, motum compescerent humoris, & sensus stupidos redderent. Hinc opiatæ dicuntur narcoticæ, quod veluti necrosim quamdam, seu mortificationem adferant,

Paregorica quæ.

cap. 5. lib. 7. comp. med. loc.

Vocantur & anodynæ, quod dolorem ad tempus mitigant sedant
 ve. Anodyna namque non sunt vniusmodi omnia, Alia enim vo-
 catur paregorica, seu lenientia quæ temperata sunt, & nostro calori
 similia, vt hydræleum radix liliorum in lacte cocta, & oleum amyg-
 dalinum. Alia dicuntur Alliotica, quæ cum lenientia sint, sedant Aliotica.
 quidem dolorem, cui præterea quadam qualitate opposita aduersã-
 tur, vt oleum rosaceum aut violarum ad dolorem moderatè, neu-
 pharinum ad impense calidum; Laurinum vel anethinum ad frigi-
 dum. Alia denique Narcotica sunt, quæ sensum stupefaciendo, do- Narcotica.
 lorem auferunt: quorum tamen vsus non est temerè vsurpandus:
 nam diutiùs admota, calorem partis extinguunt, nervos resoluunt,
 vnâque motum & sensum adimunt, & quantitate paulo maiore
 sumpta, Galeno iudice, interficiunt.

e. 18. li.

s. simp.

med.

Quod ex periculosis circulatorum experiencijs constat, qui cum
 suo stibio vitrato, tormina, aliaque sæuissima symptomata excita-
 rint, vt suum errorem alio tegant peiore, narcoticis indebitè para-
 tis, & exhibitis, dolores quidem summovent, & facilè somnum con-
 ciliant; verùm agrotos in æternum dormituros, ad cimbam Cha-
 rontis intrudunt. Vnde Empiricorum hypnoticum, sæpè malorum
 omnium medicina est.

Somni fe-
 rum Em-
 pirico-
 rum.

Nolo nunc historias de sceleratis istis periculatoribus mihi notis-
 simas memorare, ne longiùs à proposita institutione discedam, quæ
 in immensum cresceret opus, si quæ à fide dignis viris accepi, huc
 referre vellem.

Ipsa autem Narcotica improprie, ac solùm nomine tenus, ano-
 dyna vocantur. Præter enim qualitatem elementarem, qua refri-
 gerant, aliam habent calori natiuo inimicam & deleteriam, nisi exi-
 gua quantitate, ac debite apparata, & quandò conuenit, sumatur
 vt opium, mandragora, hyosciamus, cicuta.

Anodyna verò proprie sumpta, paregorica sunt, calida in primo Anodyna
 gradu, seu temperata, vel parùm symmetriam excedentia, quæque quæ.
 tutò sumuntur & admoventur.

Medicamenta igitur, quæ opium, vel alia narcotica excipiunt, par-
 uo pondere sumenda sunt, vereque opiatarum nomen, cuiuscunque
 sint consistentiæ merentur: Reliquæ tamen confectiones molliuf-
 culæ, alterantes, purgantes, & roborantes, etiam nunc opiatæ vo-
 citantur.

De pilulis. CAPVT XIII.

Pilula car-
dicta.



Forma pi-
lularū quid
præstet.

PILULA à paruę pilę & velut globuli forma sibi nomen adoptauit, quę quod non diluatur, sed deuoretur integra, *καταπότιον* Gręcè dicitur. Propter enim ingratum saporem, odoremve simplicium ex quibus pilulę conficiuntur, vt aloë, colocynthide, agarico, opopanace, sagapeno, & alijs acribus, fœtidis, & amaris, consistentia solida, ac spherica effigie formatur, & parua exhibentur quantitate, vt facilius, ac minore molestia sumantur, Efficit namque medicamento exigua molles, vt iucundius deglutiat, Soliditas, vt minus diluatur; forma teres, vt citius delabatur, in ventriculo diutius immoretur, à partibus remotis efficacius trahat, nec tam citò prorumpat ad intestina, vel per vomitum excludatur. Medicamenta namque liquida, eodem instanti sepe sumuntur & vomuntur.

Ad insuauitatem catapotiorum tegendam ac fallendam auro foliato extrinsecus artificiosè velantur, aromataque varia nonnunquā permiscuntur, quibus gratia conciliatur maior visceribus & palato. Si tamen paulisper ante deglutionem stabulentur in ore, atque dentibus aut lingua compressius attingantur, quemdā tristitię sensum gustui non tantum excitant, sed velut horrorem & ventriculi subuersionem.

Pilularum
sapor, in-
gratus.

Omnes autem pilulę amarę sunt paucis exceptis, vt bechicis, quę non affatim deuorantur, sed diu in ore detinentur, vt liquecant ac sensim deglutiantur, non catapotia aut pilulę, sed pastilli seu trochisci potius nominantur.

Insuauitas verò pilularum aloë potissimum tribuenda, quę est earum ferè omnium basis, quęque vix alio modo sumi potest propter insignem illius amarorem. Tum quia visciditatis cuiusdam est particeps, qua pulueres faciliè coniungit, & in pilulas cogitur.

Augetur ista amaritudo rerum ingratarum, vt colocynthidis, agarici, sennę, & aliorum purgantium commixtione. Quę eò magis palato displicent, quò plura fuerint admixta, cuiusmodi sunt, quę ex colocynthide, aloë, agarico, scammonio, & gummi Arabico parantur, quas ad plures excrementorum purgandas species imperat Galenus.

Pilularum
magna va-
rietas.

Sunt verò pilularum differentię multę, partim sumptę à membrorum quibus destinantur, partim ab humorum, quos trahunt diuersitate. Partium ratione quędam dicuntur Cephalicę quę scilicet à capite pituitosos humores purgant, vt Coccie, & de agarico. Alię optice, quia multis constant, quę oculis conferre creduntur, vt pilulę lucis, maiores & minores. Alię stomachicę, vt pilulę ante cibum

cap. 14.
lib. 5.
meth.

cibum & de rhabarbaro. Aliæ arthriticæ, quæ ab articulis educunt humores. A quorum discrimine, quædam dicuntur phlegmagogæ, quæ pituitam: aliæ cholagogæ, quæ bilem, aliæ melanagogæ, quæ melancholicum succum deturbant. Atque pro operandi modo aliquando dicuntur aluum soluere constringendo, vt pilulæ de rhabarbaro, & de myrobalanis, vel moderatè trahendo, vt pilulæ de agarico, vel trahendo simul & fundendo, vt pilulæ de euphorbio.

Porro ad massam catapotiorum conficiendam, maxima pars miscendorum simplicium, in puluerem tenuem debet comminui, dein excipi melle despumato, vel tragacathi mucagine in succo conueniente soluti, aut potius syrupo quodam idoneo, ita ut viscositatem aliquam habeat, quod pulueres confusos est excepturum, vt commodius mixtura cohæreat, siccitate non tam cito interhiet, simplicia intus conclusa fermententur, & minùs promptè eorum exhalet facultas. Ob eam causam, inquit Syluius, pilularum species melle cocto debent comprehendì. Nam aqua aut succo comprehensæ non coherent, & panis furfuracei modo, promptè siccantur, faciliè friantur, citò senescunt.

Pilularum
compositio
vt rectè fiat

Quòd si lachrymas, gummi, aut succos inspissatos induratosve pilulæ exceperint, ea liquore quodam tenui antè debent mollescere, calido pistillo duci; dein pulueres commisceri: Ac postremò mellis, aut liquoris alius viscidì tantum, quantum mixtura postulat confusè permisceri, vt fiat velut pasta quædam, seu massa primùm molliuscula, in dies enim induratur, quæ exacto biduo, aut triduo, paucò oleo amygdalino extrinsecus liniatur. Tum aluta obuoluatur, aut corio quodam tenui; tandem in stannea pyxide reponatur.

Vsus tempore, istius massæ portio, quæ definitæ dosi respondeat, cum idoneo succo, si opus fuerit, teritur, vt mollescat, ex eaque globuli maiores, minoresve aut mediocres fingantur, prout eos diutius aut minus in ventre cunctari desideramus.

Crassities
pilularum
qualis esse
debeat.

Quæ validè trahunt à capite & aliis partibus remotis, horis quatuor, aut quinque à cœna tenui, vel circa mediam noctem debent exhiberi; quibus sumptis superdomire confert.

Pilulæ valio-
diores quâ-
do sumendæ.

Quæ blandè purgant, tutò hora vna, aut duabus ante quosuis paustus deuorantur. Quæ medio modo se habent, securiùs ieiuno ventre, ac manè sumuntur.

Benignæ
quando.


Ad aluum ciendam tantum, dragmæ dimidiæ pondus, ex eccoproptis fat esse potest. Ex validioribus, ad validiùs purgandum integra dosis. dragma sepè datur, & aliquando sesquidragma in robustis corporibus, quæ crassis potissimum humoribus scatent.

Pilularum

Sunt qui pilulas omnes auersantur; alij nullas. Quidam non nisi crassiores: paruulas verò tantum ex cochleari cum multo syrupo sumunt. Alij quasuis, modò pauciores. Multi vix nisi cerasorum conditorum, aut passularum cortice inuolutas assument: nonnulli in oui-

vitello reconditas, aut spinachiorum vel lactucarum coctis foliis obductas, alij, alio modo facilius deglutiunt. Ingratus enim sapor, eas mille modos sumendi adinuenit.

Di trochiscis. CAPUT XV.



Placentularum effigie medicamenta quædam *ἀπτόχοι*, quasi parui panes, rotundi, hominibus lupinorum similes, & aliquando *τροχιχοί*, Latinis pastilli, & orbiculi dicuntur. Sic autem efformantur ad medicamentorum conseruationem, & interdum castigationem. Tutius enim medicamenta sine virium dispendio, in ea forma solidiore conseruantur, quam in puluerem reducta.

Pilulæ bechicæ. Vfus tamen tempore, cum assumi vix queant integri, puluerantur, his solum demptis, qui diutius in ore detinentur, vt liquecant, pilulæ bechicæ, à nonnullis, vocati. Nam trochisci de Scylla & de viperis in Theriacæ confectura, pastillorum formam amittunt, dum in pulueres reducuntur.

Fiunt verò ex medicamentis, vt plurimum siccis, tritis vè, cum aqua, aut vino, vel alio liquore malaxatis, donec catapotiorum consistentiam aquirant; dein formantur in rotulas aut orbiculos, qui postea siccantur in vinbra, priusquam in pyxidibus reponantur; vbi annum durant integrum; sæpè duos, & aliquando tres, præsertim qui opium excipiunt, vel medicamentum quoddam validissimum, cuius vires non faciliè dissipantur. Trochisci igitur ob duritiem & densitatem vim medicamentorum quibus constant, diutius conseruant, faciliùsque resistunt iniuriis aëris: Pulueres multò minus; quia cum tenues sint, statim aër eos subit, atque ita faciliè alterantur. Non tamen omnes trochisci fiunt ex pulueribus, vt qui ex medicamentis quibusdam, quæ minimè possunt puluerari, vt Scylla, & viperarum carne parantur.

Trochisci roborantes. Non solum autem trochisci intus assumuntur, sed adhibentur extra. Qui per os ingeruntur, vt ex omni medicamentorum genere parari queunt, sic facultatem habent roborantem, aut purgantem, vel alterantem. Roborare dicuntur, qui partem quampiam specialiùs respicientes, illius robur adaugent; vt trochisci galliæ moschatae, cerebrum; terre lemniae, cor; rhabarbari, iecur; diarhodonis, ventriculum; capparum, lienem. Qui conficiuntur ex catharticiis, simplicium vires retinēt, & aluum ducendo, foras humores propellunt, vt trochisci de agarico, alhandal, & de rhabarbaro. Idem iudicium de alterantibus, qui qualitate opposita intemperiem quamuis immutant; vt frigidam, calida; calidam, frigida; sicca humidam; humida siccam.

Nec desunt etiam affectibus externis pastilli, vt illi sunt, qui à forma, colore, authore, trochisci albi Rhasis nominantur: vtque alij multi, qui atteruntur in cote, vt fiat sieff, pro collyrijs ad multos affectus oculorum.

Peculiaris trochiscorum confectio, in officina fusissimè explicatur. Sequitur nunc vt de his medicamentis agamus, quæ tantùm extrinsecùs adhibentur.



SECTIO SECVNDA

LIBRI TERTII, IN QVA GENERALIS MEDICAMENTORVM externorum explicatio traditur.

De oleis. CAPVT I.



T morbi omnes intus generantur, vel extrinsecùs adueniunt, sic remedia quæ illis subueniunt, vel interna sunt, de quibus abundè supra, vel externa, de quibus nunc agendum. Inter quæ oleum cùm iure quodam primas tenere dicatur, ab eo medicamentorum localium explicationem auspicabimur.

Multis siquidem medicamentis phatmacopœus interdum cārere potest, oleo vix vnquam. Ad mensam enim non tantùm trahitur, præsertim quod dulce est, & ex oliuis maturis expressum; De eo namquè semper est intelligenda olei absolutè dicti denominatio, sed lituum vnguentorum, emplastrorum, & ceratorum velut basiseft, & commune simplicium ex quibus conficiuntur, vinculum. Atque per se, quod temperatum sit, seu calidum & humidum in primo recessu, vel, vt loquitur Galenus, inter calefacientia & refrigerantia, humectantia & siccantia medium, acopum est, seu lassitudines tollit, asperitates lenit, squalidam cutim emollit, alijsque multis affectibus, quorum alibi meminit, salubriter suauiterque medicatur.

Oleum autem
mentum
est &
medica-
mentum

Olea autem quorum vsus est frequens, vel simplicia sunt, vel composita. Simplicia dicuntur, quæ homogenea sunt, habentque nihil ab arte præter extractionem, quæ sine rerum aliarum mixtura peragitur. Quo modo Pallas omnium prima oleum eduxit, vel ar-

Pallas olei
inuentrix,

tem educendi docuit, vt scribit Diodorus. Nam ante illius hortum erat oliua omnibus ignota; oleique vsus tunc nullus antequam exprimendi modum docuisset.

Oleum o-
motribes.

Simplicia verò ferè sunt olea omnia, quæ expressione trahuntur, vt oleum simpliciter dictum, quod ex maturis oleæ fructibus, omotribes, seu omphacinum, quod ex hisdem immaturis exprimitur: vt oleum amygdalinum, caryinum, & alia multa ex fructibus, seminibus ve educta; quæ tantum inter sese discrepant, quantum ipsa semina à se inuicem dissident. Ex seminibus calidis, calidum: Ex frigidis frigidum oleum extrahitur. Vetustate tamen oleum quodcunque aliquantum immutatur, & aquosioris partis dissipatione, quod ex se calidum est, potentiùs calefacit, quod frigidum segniùs refrigerat: nam vetus oleum, iudice Galeno, digerendi vim, quæ effectus est caloris, habet.

c.6.l.1.

Oleum o-
norum.

Pro fructus etiam ipsius, ex quo trahitur oleum, diuersitate, cum is maturus aut immaturus extiterit, præparandi modo, & alteratione artificio inducta, aliam atque aliam acquirit qualitatem & efficaciam alterandi. Oleum de vitellis ouorum, exempli loco, licet sit impermixtum, ob præparationem tamen, humiditatem quandam amittendo, calidius ac siccius efficitur, fitque medicamentum ad cutim detergendam, impetiginem, & alios plures cutaneos affectus persanandos, & vlcera quædam fistulosa & maligna curanda.

Olei amygdalini facul-
tas.

Idem omnibus accidit, quæ vi ignis exprimuntur, ex quo calorem acquisititium perpetuo retinent. Et cum simili modo amygdalinum extrahitur, tantum extrinsecus applicatur: Cum absque igne, instar lohoch pergrati lingitur, ad demulcendam tracheæ arteriæ asperitatem, & ad sputum coquendum, ac mouendum: vt solet dari cum pauco saccharo pueris tussiculosis, & quibus aliquid è cerebro ad pulmones delabitur. Extra quoque calatticum, & omnium maximè anodynum medicamentum.

Olea expri-
mendi mo-
dus.

Vt exprimantur olea, debent fructus & semina repurgari, perperamque faciunt apothecarij, vt obiter dicam, qui ex amygdalis non decorticatis oleum extrahunt. Mundata semina pistillo contunduntur: Contusa excipiuntur lebece, igni adhibito, agitanturque paulò diutius, vt calefiant, dein setaceo inuoluuntur, subiiciunturque ligneo torculari, donec compressu validissimo olea exprimantur.

Quæ nullo caloris aut ignis adiutu educere volumus vbi minutim attrita fuerunt, statim prælo committuntur, vt oleum guttatim exudet.

Inter olea simplicia annumeratur, quod ex petra eductum petroleum vocatur. Sed de his nostra tantum agit institutio quæ arte parantur. Simplicia quoque sunt liquidambor & Balsamum, quæ ex arboribus exoticis incisis guttatim stillant, de quibus in Officina suis agemus.

Interdum etiam eliciuntur destillatione tam per ascensum, quàm per descensum olea quædã simplicia, vt è iunipero, guaiaco, cariophyllis & similibus, tam lignis, quàm fructibus siccis; quibus olla cõprehens, vi ignis suppositi, aut superpositi oleum in vas supernè, aut infernè annexum ascendit, aut descendit: Non omnia tamen, nec sèper caloris adiutu, per descensum eruuntur. Ex tartaro namque & mirrha sacculo conclusis & in vdo loco, vt cella vinaria suspensis, absque ignis interuentu, oleum facilè exudat, de quibus olea parandi modis omnibus aliàs.

Composita verò olea quibus potissimum pharmacopola debet esse munitus, ea sunt, in quæ stirpium, fructuum, florum & quorumuis simplicium materia immergitur, maceraturque. Deinde totum insolatur, dū materiæ istius vires, in oleo remaneant: quod postea exprimitur, atque reconditur, Hoc modo fit oleum violaceum, rosatum, hypericonis, nenupharinum, lumbricorum, & alia multa quæ veteribus Græcis *μύρα*, Latinis vnguenta nominabantur, potissimumque ea, quæ lacrymarum, & rerum odoratum admixtione spissiora redderentur. Vnde myropolæ, seu vnguentarij dicuntur, qui eiusmodi olea odorata, & vnguenta vendunt, apud quos oleum quoduis fragrans vt laurinum, pro vnguento sæpè est, vt vnguentum pro oleo.

Olea veteres vnguenta nominabant.

Vix eorum probatur sententia, qui olea tantum simplicia vocant quæ ex floribus, fructibus, aut alijs simplicibus in oleo oliuarum infusis, maceratis & insolatis parantur: Composita verò, quæ cum vino, aqua infuso, aut decoctione idonea, lento igne coquuntur, donec omnis ferè admixtus humor absumatur. Hæc enim illis non minus imò magis videntur composita, quod rerum infusarum non modo tota vis, sed substantiæ cui inhaeret, non exigua portio confusè, cum oleo post expressionem remaneat. Hinc oleum, licet nullius excessus particeps, sed temperatum, tale perpetuò est, qualis infusæ rei conditio: Si frigida, frigidum, si calida calidum, & ex siccatatorium, si ea ipsa vim siccandi habuerit.

Quæ expressione sola, vel maceratione & expressione simul eruuntur olea, optimè seruantur reposita in vasis vitreis, aut figulinis, validissimo fornacis calore perfectè induratis. Quæ verò destillatione tam per ascensum, quàm per descensum eliciuntur, quæ vulgus Chymicorum essentias appellat, in vasis semper vitreis, ac solidissimis, & angusto ore, benè obturato seruari debent, ne substantia ac qualitas eorum facilè dissipabilis citò expiret.

Quibus vasis olea seruanda.

De Vnguentis. CAPVT II.



VNGVENTA veteribus dicuntur, Galeno teste, oleagine medicamenta ex odoramentis confecta; Actuaria, quæ exterius adhibentur, & illita tantum opem ferre creduntur partibus, quæ alia remedia non facile ferunt; ut quæ, inquit Oribasius, cataplasmatibus grauantur, & madefactionibus fluentibus læduntur.

Vnguenta
cur dicta &
inuenta.

Sunt verò vnguenta crassioris consistentiæ, quàm olea, & velut media inter hæc & emplastra; ut linimenta, inter olea & vnguenta. Vnguentum siquidem liquidius, sæpè vocatur linimentum, de cuius parandi modo & usu lib. 5. fusiùs; Consistentia tamen cum sit parum dissimilis vnguentorum, linimentorum & ceratorum, pro hisdem ferè vsurpantur. Nam linimentum dicitur, quo iuuandæ partes liniuntur; vnguentum, quo inunguntur; Ceratum, quod ex cera & oleo paretur.

Arabes sub vnguenti nomenclatura, cerata & emplastra sæpè cõplectuntur, ut multi olea quæuis spissiora, ut veteres Græci odorata sola. Sic Dioscorides libro primo olea pleraque odorata, vnguenta vocat; Et Hippocrates, medicum non tantum optima corporis constitutione, & ornatu decenti, apud ipsum vulgus, gloriam capere debere, vult, sed etiam vnguentis odoratis, hoc est, rebus aromaticis, ac suaueolentibus.

Vnguentum
quid.

Clarioris tamen explicationis gratia à se inuicem, distinguuntur; Et specialius, vnguentum dicitur, medicamentum quoddam oleaginum, mediæ inter oleum & emplastrum consistentiæ: Quæ tamen semper vniusmodi non manet. Nam quo tempore calor vehemens est, vnguinea & pinguis magis liquat, & vnguenta liquidiora & molliora reddit; quo imbecillior, eò solidiora. Propterea solent myropolæ plus olei hyeme: minus æstate, vnguentis commiscere, frigus siquidem vnguentum quantumvis fluidum, ut & oleum ipsum inspissat, quod etiam obseruauit Galenus in cerati stomachici compositione,

Olei pro-
portio in
vnguentorum
confectura
qualis

Ea verò proportio olei in vnguentorum confectura seruatur, ut vnciæ olei, pulueris dragma, & ceræ dragmæ duæ commisceantur, siue ut loquitur Galenus, ceræ quadruplum oleum adiiciatur, pulueribus octuplum, hoc est, singulis olei vnciis singulæ dragmæ puluerum, quorum materia ex herbis arefactis, metallis, & terris depromitur: eaque cerato refrigerenti confusæ ac paulatim permiscetur, & accuratè rudicula agitur, ne quid grumosum remaneat.

Cum succos vnguenta recipiunt siccos, puluerare eos oportet & dissoluere: Si liquidos & fluidos, reliquæ materiei commiscere, & coquendo absumere,

Cap.
ult. lib.
7. simp.
pl. me.
dic. c. I
lib. 5.
meth.
cap. 27.
lib. col-
lect.

lib. de
medic.

Cap. 3.
lib. 8.
comp.
med. ge-
ne.

cap. 2.
lib. 4.
comp.
med.
gen.

Quæ probè puluerari queunt, tenuissimè debent læuigari, vt radices, ligna, resinæ, & ipsa etiam gummi, quando sunt sicciora : Sin minus pistillo calido subiiciuntur, vt mollescant, vel aceto aut humore idoneo soluuntur.

Quæ humidiora sunt, vt terebinthina, instillantur. Herbae humidiore, vt & animalia, vel eorum partes vix puluerabiles, vino, vel alio liquore perfectè coquantur, donec tabescant, & absumpta propè sit humiditas: Dein in percolato liquore, reliqua dicta proportionè, commiscentur materialia, vt legitimæ consistentiæ fiat vnguentum; Cui oleum & cera, non modò formam, & multam materiæ portionem suppeditant, sed reliquorum admixtorum vim connectunt, & diutius asseruant.

Fiunt verò vnguenta nunc igni, vt omnia quæ ceram admittunt. nunc sola subactione, sed longa, vt quæ sine cere concursu paratur: cuiusmodi est, vnguentum crudum, siue de lithargyro, quod ex oleo aceto & lithargyro, simul diuturno pistilli percussu nutritis nutritum nominatur.

Vnguentum crudum.

Porro multæ sunt vnguentorum differentia, partim sumptæ ab eorum coloribus, vt viride, album, citreum, aureum: partim ab effectis, vt resumptiuum, analepticum, mundificatiuum: partim à qualitatibus primis, quarum ratione, quædam dicuntur calida, vt apostolicum, Ægyptiacum, Martiatum, Enulatum: Alia frigida, vt Nutritum; alia siccantia, vt diapompholix, & dessiccatiuum: alia humectantia vt rosatum.

Vnguentorum varietates.

Cera autem alba magis expetitur ad frigidorum, flaua ad calidorum vnguentorum confectionem. Sine tamen discrimine pharmacopœi modò hanc, modò illam assumunt, prout suæ res alterutram habendi faciliorem præstant commoditatem.

Reponuntur vnguenta pyxidibus, seu vasis stanneis, & aliquando fictilibus vitratis; Durantque annum integrum, sæpè biennium, & quædam triennium.

Quibus vasis vnguenta reponenda.

De Ceratis. CAPVT III.



ERATA vnguentis, ceronea emplastris sæpè designantur: Illa quòd molliora; hæc quòd duriora: Ambo sic dicta, quòd ceram admittant, vt emplastra multa, quæ indiscriminatim ab his ceronea perpetuò dicuntur, qui omnibus morbis emplastra quædam catagmatica, in myropolarum officinis empta, adhibent: Itaut adeò inualuerit nunc apud vulgus Ceroneorum vsus, vt omnia emplastra ceronea dicantur. Quidam Lutetiæ emplastrum quoddam, ceroneum vocat, ad omnem dolorem, omneque morbi genus adhibet.

Ceronea & cerata à cera dicta.

Est autem ceratum, de quo præsens examen suscipitur, medica-

Ceratum quid.

Oli quan-
titas in ce-
rato non
semper ea-
dem.

mentum, consistentia quodammodo medium, inter vnguenta & emplastra: his etenim non ita solidum, illis non ita molle. Quisque tamen modò olei pondus adauget, modo minuit, & pro arbitrio, ceratum, nunc vnguento solidius, nunc liquidius efficit. Vt re vera vniuersi modi si semper paretur, sic semper, dum asseruatur, diu manere non potest. Nam cum glaciali tempestate, & rigido cælo, quantum vis liquidum faciliè concreascit, & æstuoso solidum liquetur, hyeme plus olei, minùs ceræ; æstate, plus ceræ, minùs olei adiungitur.

Cùm verò ambientis aëris constitutio vel temperata fuerit, vel qualitates primas non multum excesserit, solet quadrans ceræ, aut paulò plus minusve olei libræ liquari & permisceri, vt per cæli mutationes, cerata non contingat multum liquefcere, aut incrassari. Pauca tamen diu in pharmacopoliis asseruantur, quia omni & paucò tempore parari queunt, ex oleo & cera à quibus cerata propriè dicta, vel potiùs Cereleæ nominantur. Quædam enim minùs propriè sic dicuntur, quòd præter ceram & oleum, alia multa recipiant, cuiusmodi sunt, ceratum santalinum, stomachicum, ac pleraque alia: vt quæ ex tempore, prout res postulat, fiunt ex emplastris, oleo liquatis, quando scilicet partis affectæ conditio, solidioris cuiusdam emplastri duritiem ferre minimè potest. Sic enim cerata quædam acopa, seu lassitudinem leuantia, fatigatis neruis, & affectis lassitudine musculis vtiliter adhibentur.

Adhibentur & regioni lienis, ventriculi, iecoris, vteri, & ossium fractorum, extensa priùs super corio, ad similitudinem partis, cui superponenda sunt, efformato.

Quod ad lienem imperabitur, formam habebit oblongam, instar bubulæ linguæ. Quod ad ventriculum, erit scutiforme: Ad reliquas partes: pro varia singularum inter se figura, variè concinnabitur.

Cereleæ cõ-
ficiendi
modus.

In cereleæ confectione cera minutim secta in oleum coniicitur, eaque igne lento liquatur liquata ab igne remouetur, & cõtinenter spatha permiscuntur dũ coeant, Postremò affusa paulatim frigida denuò agitantur, & percutiendo lauantur. Sic enim ceratum, aquæ multæ affusione, quantum scilicet absorbere poterit, subactum, accuratèque madefactum, magis refrigerat, & Galeno iudice morbis omnibus calidis admotum confert, maxime, si vbi affectæ partis ardore nimis incaluerit, subinde mutetur.

Cùm ceratis minus propriè sumptis, adipēs, medullæ, axungia & mucagines adduntur, vt sæpè fit, ea paulatim refrigerantibus permisceantur, quemadmodum & pulueres, quorum eadem ac in vniuersi generis ad olea proportio ferè obseruatur.

Reponuntur in vasis stanneis aut fictilibus, sed quæ faciliè quouis tempore parari possunt, ea præstiterit recentia habere.

Cap. 6.
lib. 1. de
simpl.
med.

De emplastris CAP. IIII.

Galen.
c. 12. l. 1.
comp.
med. ge
ner.



VAE medicamenta topica in solidiorem massam coacta Arabes Cerota, & Graeci veteres emplastra vocarunt, iuniores euphoniae cuiusdam gratia, addita littera, maluerunt emplastra nominare: Qua detracta eorum qualitas non emplastrica, sed emplastica, seu *ἐμπλαστική*, quasi dicas infarciens appellatur. Dum

enim emplastrum parti superinducitur, propter substantiae, qua constat, visciditatem, cutis meatus videtur occludere, halituosos retinere spiritus, & calorem partis coercendo, suppuratum aliquando mouere. Illius namque glutinosa substantia vix intrò sese insinuat, sed foris tantum insidens, tenaciter corporis meatibus inhaeret. Minimè tamen ipsius qualitas otiosa manet, sed calore partis excitata, adiutaque, varios effectus pro varia ipsiusmet facultate producit. Si glutinatoria, labrorum vulneris coalitum adiuvat: Si catagmatica, ossium fractorum ferruminationem: Si sarcotica, hanc naturae fert opem, ut facilius nouam carnem generet: quod non tam medicamentorum, quam ipsius naturae proprium est opus.

ἐμπλαστική
πινγ.
Medicamenta.

Sarcosis nō
tam medi-
camētorum
quàm natu-
rae est opus.

cap. 9. l.
5. de
simpl.
med.

Vt autem varia ac multiplex est emplastrorum compositio, sic etiā qualitas: Ex omnibus enim propè medicamentis componuntur; unde non omnia perpetuò emphractica sunt, seu lentore suo poros stipantia, sed quaedam ecphractica, hoc est, farctu liberantia, & quasi expurgantia; Alia epispastica seu extrahentia, & diaphoretica; alia rhyptica, quae sordes ex cute & vlcere detergunt; Et quaedam, quod multis affectibus conueniant, ut pleraque alia medicamenta, polychresta dicuntur, quae scilicet contrarijs constant medicaminibus.

Eccathartica
ἐπλάστρα;

Gal. i.
nitio li.
5. cōp.
med.
gen.

Debet tamen medicamentum emplasticum omni mordacitate vacare, nam si qua illi insit acrior & mordacior qualitas, haerere poris vix poterit, ait Galenus, sed excernetur facile, aliquam partem liquando, aut humorem aliquem ex alto attrahendo; Proin terrenae consistentiae & viscosum esse oportet emplasticum.

c. 9. l. 5.
comp.
med.
gen.

Porro componendorum emplastrorum duo sunt scopi praecipui, consistentia crassa, ac solida & facultas. Odor & color saepe expectantur, atque ad aegrorum potius gratiam, quam medicamentorum naturam, & efficaciam conciliantur.

Emplastro-
rum confi-
ciendorum
scopi,

Consistentiam idoneam & materiam suggerunt, cera, oleum commune, lithargyrus, & interdum resinae, virtutem verò nullam aut exiguam. Quae superadduntur propè omnia, corpus emplastro & facultatem impertiuntur, ut mineralia, metalla, radices, furculi, ligna, flores, semina; Quae si arida fuerint, pulueranda, & emplastro ab igni remoto, miscenda. Siqua ex his vix friabilia sunt,

humore aliquo solvuntur; qui absumitur coquendo, antequam illa emplastro perficiendo commiscantur: vel simul eidem sæpè commixtus coctione dissipatur.

Herbæ virides, ut quæ in pulverem attenuari non possunt, ex idoneo liquore coquuntur, colo trahuntur, miscentur: vel succo ex his tritis educto, alia incoquuntur; quo absumpto, viribus tamen relictis, si quæ supersint adicienda, quæ longam coctionem non ferunt postremo commiscantur.

Humiditas
emplastris
conficien-
dis aduersa.

Diutius verò coquenda sunt emplastra, quæ succos, vel aquam, acetum, vinum, aut decoctum aliquod recipiunt, quia cum emplastrum esse debeat omne spissum, & viscidum, ut parti cui adhibetur, adhæreat, humiditas illi contraria est, quæ tamen sæpè admiscetur & calore resolvitur, ubi qualitas illius accessura est, & in emplastro conficiendo retinenda. Nam quæ succis incoquuntur, eorum facultates servant, etiam ipsis exhalatione dissipatis. Efficit quoque humiditas, quæ conficiendis emplastris accedit, ut reliquorum virtus altius subeat, & ad partes magis diffusas deferatur.

Ex materialibus oleum quidem additur, non modò, ut corpus emplastris præstet, sed, ut cera cum ipso liquetur, acria, vel austera obtundantur, & vim magis anodynam & emollientem emplastra nanciscantur.

Oleum vetus simplex, & quod infusione paratur, vel quodvis compositum, aliquando in emplastrum emittitur, ut præter materiam suam quoque virtutem immittat.

Cera verò materiam duntaxat emplastris præbet, sed vim agendi nullam, ut & resina quædam. Non tamen omnia ceram, aut resinam excipiunt, quæ scilicet, aliunde materiam illis analogam, ut thus aut ladanum copiosum, aut simile medicamentum admittunt.

Emplastro-
rum confi-
ciendorum
modus.

Primum autem, si cera emplastrum ingrediatur, ea liquatur in oleo: Si lithargyrium, & id quoque in illo coquitur, dein muccagine & succi, liquores si permiscendi, cum his adhuc feruefiant, dum aquea & humidior portio resolvatur: Tunc resina & adipēs inducuntur, ut & gumi genera: ex quibus nonnulla pura miscentur, alia non nisi vino, oleo, aut aceto macerata & percolata. Postea permiscetur terebinthina emplastro percocto & ab igni semoto, ut nullam ignis vim, vel minimam sentiat. Postremo his omnibus confusis, & in legitimam consistentiam decoctis, igne subducto, pulveres creti paulatim insperguntur, & sedulo rudicula versantur, agitanturque, dum omnia in massam coquant, nec mollem, nec planè duram, sed lentam, glutinosam, & adhærentem, non ita tamen, ut partem, cui adhibetur, vel inquinet, vel difficillimè auellatur.

Et ut magis legitima emplastri forma existat, si in illius confectio- nem adeps veniat, aut medulla, aut terebinthina, minuendum erit oleum: Si arida quævis, ut lachryma non pingues, friabiles succi, re-

Anæ, stirpes aridæ, & mineralia puluerata commiscenda sint, augenda olei quantitas.

Ea autem olei proportio ad arida seruatur, vt singulis puluerum vncijs, tres olei tribuantur. Cera verò quadrupla sit ad oleum, adeo vt, ad huius quartarium ceræ libra aut paulò minus esto.

Olei proportio in-
emplastro-
rum con-
fectura.

Hæc tamen singulorum in temperatione quantitas, cum potiùs iudicio, quàm certis legibus vbique definiri vix queat, hodie pulueris & olei designato ponderi, ceræ quod satis est, adijci solet, vt liquidis, siccis, viscidis, malaxatione simul coadunatis, lenta, sequax ac idonea emplastri moles inducatur: Ex qua magdalie vnciæ dimidia, vel etiam integræ, si libuerit, pondere formentur, chartis oleo inunctis inuolutæ, vt sic in pharmacopolio, ad futuros vsus reponantur.

Sic fiunt emplastra propriè dicta, ad aliorum discrimen, quæ citra ignem & ceram parantur, quorum scilicet materialia, melle, aut mucaginibus, aut viscido quodam cremore malaxata, in emplastri consistentiam coagmentantur: cuiusmodi est emplastrum de crusta panis, & de bacchis lauri, & alia quædam parari solita, quæ inter emplastra & cataplasmata ambigunt.

Ad emplastra quoque refertur & ceratum illud durius ex pari ceræ & olei pondere confectum, vt & cerota, seu ceronea, de quibus abundè supra.

De Sparadrappis.

CAPVT V.



TELA Vtrinque emplastica in multis prostat officinis, quàm recentiores modo Sparadrappum, modò telam Galterij, primi forsan illius inuentoris, vel potiùs infectoris nominant. In emplastrum enim idoneum, iam paratum, sed liquefactum, tela vetustate quodammodo attrita demergitur, & inculcatur sæpè dum planè infecta & inquinata fuerit, ac vnde quaque velut incrustata: Tum extrahitur, & exponitur aëri, vt refrigerata obdurescat, ac postea ad rerum exigentiam seruetur.

Tela Gal-
terij.

Eius autem varietates inueniuntur multæ, quæ non à telæ, sed ab emplastrorum in quæ immergitur diuersitate sumuntur. Aliæ enim caragmaticæ sunt, quæ fractis ossibus solidandis, & roborandis partibus conueniunt, quæ scilicet ex emplasticis, astringentibus, & roborantibus parantur, vt.

℞ ol. citonior. & rosat. sebi. ariet. an. ℥iij. thuris, mastiches, picis, boli armenæ, farinæ volatilis an, ℥ij. ceræ albæ q. suff. fi. emplastrum, in quod liquatum tela immergatur.

Aliæ vim habent exsiccantem & epuloticam, & vlceribus

ad cicatricem perducendis cōmendantur, cuiusmodi est, quę sic describitur.

Tela catag.
matica.

℞ ol. rosat, lib. j. cerę citrinę lib. ss cerusę venetę, thutię añ. ℥ ii. lithargyri auri ℥ iii. fi. emplastrum, & cum tela vestutate quodāmodo iam attrita, fi. Sparadrap.

Plures alias formulas describit Ioannes Vigonius in suo opere chirurgico, quas huc transcribere, nec volui nec debui: Cū minimo negotio, quisque varia, pro vario scopo, emplastra sumere potest, & in his liquatis linteum inculcare: Nam qui pręscribendi & conficiendi emplastra modum nouit, is ex hisdem telam inquinare, seu sparadrappum efficere facillē poterit.



INSTITVTIONVM PHARMACEVTICARVM.

LIBER QVARTVS.

De legibus in compositione medicamentorum seruandis.

Quis primus medicamenta composuerit, Et ratio compositionis.

CAPVT. I.



VM morbus omnis sit via ad interitū, antequam supra modum augeatur, omni pręsidiorum genere profligandus, atque in medicamentis inuestigandis seligendisque tanta sedulitas est adhibenda, vt quę singulis pręter naturam affectibus oppugnandis cōducunt, perpetuō sint ad manum, & quasi medicamentorum eximiorum sylua pręstō sit nobis.

Ea autē nec simplicia exhibentur, nisi arte quodam modo immutata, nec composita, sine multo pręcedente apparatu, vt supra demonstratum est, quo simplicia singula non solūm abluuntur, siccantur, teruntur; vel infunduntur, macerantur, exprimuntur; aut alia pręparatione, commistioni magis idonea, vel vsui fœliciora redduntur, sed ea ratione & proportionē simul vniuntur, vt omnium concursu, noua quędam ē totius complexionē mixtura comparetur, seruata tamen singulorum virtute, si non integra, saltem primis mensibus conspicua, cum adhuc scilicet recens est mixtorum cōitio, nec perfectam adepta fermentationem.

Cap. 2.
lib. 1.
comp.
med.
gen.

cap. 13. lib. de ther. ad pif. Quia verò medicamenta interdum exhibita sola, nocent, cæteris admixta profunt mirificè; cùm medicamenti cuiuspiam qualitas probatur, improbatur alia: diuersas enim qualitates in simplicibus medicamentis reperiri, certum est: per compositionem, alterius admixtione, noxia deletur, aut obtunditur; optima magis exurgit, & effectus præstat insigniores. Et licet quædam simplicia non lædant, quia tamen non satis iuuant, citra alterius mixturam non veniunt in vsum, vt medicamen emplasticum, quod simplex nullum tale est, inquit Gal. vnde primi emplastrorum authores, non temerè ex oleo quædam liquare, & emplastra conficere excogitarunt.

cap. 2. l. 2. comp. med. gen. Ob multas rationes alias libro allatas superiore, medicamentorum fit compositio, cuius omnium primus defenditur Mautias Herophilæus, Dein Cappadox Heras, Musa, Asclepiades & Andromachus: Sed omnium maximè Galenus pharmaci componendi rationem inuenit, mixtorum legitimam proportionem, & vtendi modum docuit; Non Empiricorum more, qui ad insomnia, casum, & fortunam medicamenta propè omnia referunt, paucis exceptis; quæ communi * iudicio, quò pluribus eiusdem facultatis consent, per compositionem meliora redduntur, & ex eis nonnulla curandi corporis naturæ idonea inueniantur. Quod tamen exemplo optimi Sarcotici, ex cerato & duodecima æruginis parte confecti, Galenus negat, probatque medicamenta ex duobus aut pluribus oppositæ facultatis, optimè componi. Ceratum namque sordes parit, ærugo carnem vlceratam erodit, ex his tamen pharmacum exurgit optimum, quòd carnem generet, & cauum vlcus impleat. Sic calida frigidis, discutientia roborantibus, cardiaca venenis miscètur, & ex diuersi generis simplicibus medicamenta præstantissima componuntur.

Quis primus medicamentorum compositio- nem tradi- dit.

Sarcoticum optimum ex facultatibus oppositis.

cap. 29. lib. 9. de fac. med. Cuidam ex eorum numero qui citra rationem, & experientia sola, medicamenta esse composita tenent, pharmacum podagricum iactanti, aduenit fortè fortuna, quidam podagricus, qui tam medicocriter laborabat, vt incedere etiam posset, qui pedi medicamentum apposuit. At misellus totam noctem egit insomnem; ac postero die tantum abest, vt commodè sicut antea, incederet, vt nec quidem gestari posset.

Historia Galeno nota.

cap. 1. lib. 2. comp. med. gē. Ex fortuita igitur medicamenti compositione, fortuitus & sæpius infœlix euentus, vt pluribus ostendit Galenus, præter historiam allatam, qua pseudomedici vanitatem & ignauiam irridet, censetque medicum, non modò compositorum medicamentorum causam, sed componendi viam & rationem habere, & ad singulos affectus, optima pharmaca, dùm est necessum, componere; Ne illi graue forsitan accadat, quò duobus medicis Galeno cognitis, quorum ob amissas medicamentorum compositorum formulas quasdam, alter contabefactus periit, alter ab operibus medicis destitit.

Historia notanda.

CAPVT. II.



IN medicamento prescribendo debet primum illius quedam basis constitui, hoc est, medicamentum aliquod simplex, in compositione præcipuum, & morbo depellendo accommodatissimum, cui cetera innitantur. Vt cum morbus aliquis suscipitur oppugnandus, si quidem fuerit simplex, nullo prauo symptomate comitatus, seligendum est tantum aliquod simplex medicamentum, quod viribus sit par, & partem iuuet: Sed si simplex, nullum detur idoneum; ex multis vnum concinnetur, cuius basis & veluti columen affectui auerfetur; Atque alia adiiciantur, quæ membrum affectum robovent, qualitatem medicamenti ad partem longè dissitam deferant, atque reliqua permisceantur, quæ vel palato gratiam concilient, vel opus fœlicitent, ac promoueant.

Multæ bases aliquando in vno medicamento.

Basis autem sæpius qualitate quàm mole præpolet, vt in confectiõibus aromaticis & purgantibus: Atque quò depellendus morbus fuerit grauior, eò basis remedij prescribendi maiores vires habet: Et sæpè ad expugnationem affectionis alicuius prauæ, multæ bases confusè in quandam compositionem referuntur, quæ in mutuam operam conspirant: & vicem gerunt vnius; vt cum ad sedationem doloris vehementioris, multa simul anodyna medicamenta confunduntur.

In componendis igitur medicamentis, primum basis quærenda affectui & affectu parti accommodatissima, sed non semper omnium prima in compositione collocatur. Non enim affatim, ac promiscuè inordinatèque omnia, quæ in compositionem veniunt, simul confunduntur, sed alia aliis priora, aut posteriora. Et cum miscendorum ordo negligitur, medicamentum sæpè nec vires habet eximias, nec formam idoneam. Quæ enim longiore coctione egent, si parum: & quæ breuiore, si multum coquantur: nec illorum integra virtus vt quæ nondum exierit: neque horum, vt quæ iam perierit, comparabitur.

Ordo seruandus in describendis formulis medicamentorum.

Accuratè quoque debitus ordo seruandus in formulis medicamentorum describendorum faciendis, vt ne posteriùs in recepta, vulgi more, vocata, scribantur, quæ priore eius parte & capite describenda sunt: In quem errorem incidunt, qui medicamentorum substantiã, qualitates, & apparatus ignorant: Vt etiam interdum iuniores medici, qui longo medendi vñ nondum probati, quæcumque veniunt in mentem, modò facultates illorum norint, confusè.

inordinatēque describunt.

Peius agunt, qui, quæ citra virium iacturam vim ignis non patiuntur, diu concoquunt; quæ propter insignem amarorem in bolum fingenda & tegenda, in potu dant; Quæ debent concoqui, cruda: quæ puluerari, integra: Quæ tantum infundi, dissoluta, nec expressa porrigunt.

Qui ista parum cauti negligunt, vix antiquiorum pharmacopœorum effugiunt censuram, quia peritioribus medicis edocti, non solum componendi medicamenta modum habent compertum, sed ex his multi rationem ordinis, quo simplicia singula collocanda sint, habent perspectam.

Hæc autem sit prima lex describendi medicamenti, vt ea primo loco scribantur, quæ longiore apparatu, vt diuturna, coctione, aut laboriosa tritura egent, veluti radices & ligna non odorata: Postremo, flores & aromata: Medio inter vtrūque, herbæ, fructus semina. Prima lex medicamenti describendi.
Qui secus faciūt, ligna, radices, folia, flores, & aromata, nullo ordine, & affatim, eodemque instanti miscentes & concoquentes, vel horū qualitatem facile dissipabilem non retinent, vel illorum ægrè separabilem non assequuntur: Istoque improbo parandi ac miscendi modo, medicamentum efficiunt, quod, nec singulorum vires genuinas habebit, nec medici votis respondebit.

Secunda ordinis seruandi lex in præscribendis medicamentorum formulis hæc est, vt si angustia temporis vrgeat, & quædam coquenda sint, vel infundenda, & alia pulueranda, ab his semper incipiat, quæ cocturam, vel macerationem postulant: vt dum hæc fiūt, alia comminui & læuigari queant, & eodem tempore suum quæque habeant apparatus. Secunda lex.

Tertia obseruatio est vt quæ vel quantitate, vel qualitate præpollent, cæteris in compositione describenda, præmittantur, ita tamen vt præparationis, mixtionisque modus, cuius potior est habenda ratio, non dissentiat. Tertia.

Hæc quarta lex ferè perpetua seruatur, vt in compositionum formulis ea postremo scribantur loco, quæ materiæ rationem habent, vt mel in magnis confectionibus, saccharum in electariis solidis, in multis vnguentis oleum, aut cera, & sæpius vtrumque. Quarta.

Hic ordo si seruetur, tyronibus medicamenta parandi miscendique viam aperiet scilicet, atque in mixto firmiores eorum vires manebunt: quæ nisi arte debita retineantur, aut hebescent, aut periclitantur.

De formis & fine medicamentorum. C A P. III.



T qui sano sunt corpore difficilè ferunt, sic minus appetunt medicationes. Et qui vel ad prophylaxim imminentis morbi, vel præsentis halosis seu profligationem, medicamento quodam opus habent idoneo, sæpiùs antequam mali feritas inualuerit, Medicum non vocant, aut medicamentum respuunt, aut ea arte & mixtura paratum desiderant, ut odore, colore, sapore, naribus, oculis, palato arrideat. Sed apud imprudentes eiusmodi viros & pueros: Coquus, inquit Galen. ex Platone, Medico præstat, & maiore laude dignus, *Aphor. 37. lib 2 Hipp*

ut qui gulæ noua quotidie irritamenta paret. *Li. 2 de prano- tione.*

Coquus apud quos Medico præfertur.

Sed cum per ea puniatur, per quæ quis peccat, morborumque penè omnium nutrix sit immanis gula, iure quasi diuino, medicatio quæ fit per os, ultionem commissi peccati in eo ipso relinquit. Medicamenta enim ferè omnia, præsertim cathartica, propter dissentaneam quam cum nostra natura qualitatem habent, gustui ac olfactui displicere, non est mirum; Cum non ut alimenta mutari, sed mutare nata sint, & noxiam humorum qualitatem emendare, vel eosdem foras protrudere,

Quæ inodora insipidaque sunt, & mole parua variè corpus exagitando, susque deque humores excutiunt, ut stibium, his postponenda medicamentis, quæ maiore quantitate exhibita, licet ingrata, blandè, ac cum delectu è partibus affectis vitiosos succos educunt.

Forma medicamentorum quid præstat.

Forma autem medicamentorum non solum efficit, ut assumantur ipsa faciliùs, alij enim liquidis, alij solidis tantum delectantur, sed ut effectus diuersos, pro formæ diuersitate polliceatur. Quod enim ad incidendum & extenuandum imperatur medicamentum, forma liquida accommodatius est, ut solida ad astringendum.

Non hinc formam, quæ dat esse rei, nec ipsam rei facultatem effectus causam appello, sed ipsam compositi medicamenti consistentiam qualemcumque, solidam, liquidam, mediocrem: præterquam, & alia interdum in multis, præsertim siccis, industria pharmacopœi manu effingitur, aut sigillo imprimitur: aut materia in pilulas trochiscosve formatur, vel complanatur in tessellas, nunc quadratas equilaterales, nunc rhomboides, seu altera parte longiores.

Ista verò impressa forma exterior, & veluti sigillatio, parui momenti est, ut quæ nihil opis adferat ad effectum medicamenti promouendum, aut fœlicitandum, ut superstitiosi quidam autumarunt, ut illud omitram, quod Spagyricorum nonnulli somniant, de signaturis plantarum externis, quibus illarum dotes partibus corporis accommodant, cum quibus certis notis, aut externa forma, si Deus

si Deus voluerit, conueniunt. At illa medicamenti forma, qua ipsum densum est, tenue, vel liquidum, multos ac varios præstat vsus: Nam idem nunc vrinam mouet, nunc aluum deicit pro vario componendi modo.

Cap. 13.
lib. 4.
de san.
tuen.
Gal.

Quæ tenuissimè læuigantur, instar pollinis, cirissimè deferuntur ad renes & vesicam: quæ crassiusculè, diutiùs subsistunt in intestinis, & aluum per secessum turbant. Si obstructio nem quis liberare voluerit, mensesque mouere, nec satis fœliciter solida medicamenta exhibebit: vt neque liquida, si è cerebro & partibus diffitis noxium sit educturus humorem. Et vt partibus quibusdam roborandis, & affectibus depellendis, medicamenta quædam crassa debentur, alia liquida: sic nonnullis, inter ambo media, qualia sunt eclegmata, & antidota quædã inter remedia interna: vnguenta, litus, mucaggines, cataplasmata inter externa.

Crassities
aut tenuitas
puluerum
quid effi-
ciat.

Quæ autem forma singulis medicamentis sit idonea, superiùs abudè dictum est, speciatim verò de his postea disputabitur, quatenus formantur variè, pro partium conditione, quibus adaptantur, vt cum ex emplastro stomachico scutum formatur regioni ventriculi apponendum, pessarium sinui pudoris, glans subdititia podici, turunda vulnere.

Sunt qui nulla ratione formam medicamentorum non tantùm idoneam, sed illorum quoque sumptuosam confecturam expetunt, alioquin tanquam vilem & inutilem aspernantur, cuiusdam diuitis exemplo, qui cum à Galeno postulasset, excepissetque formam medicamenti, quo vlcus malignum in famulo curaret, vidissetque omnia quibus constabat pharmacum esse vilis pretij: Hoc, inquit, mendicis serua, me autem sumptuosius aliquod medicamen doceto.

Nimis sum-
ptuosa me-
dicamento-
rum confe-
ctura sæpè
vana. Hi-
storia.

Sic multi medicamenta etiam eximia parui ducunt, si nouerint, vilia verò ignota sibi, pro secretis habent, & tanquam aliquod deductum è cœlo remedium sæpè mirantur. Proinde Medicinæ dignitati consulunt minùs, qui tam diuinæ artis arcana detegunt, & plebeculæ vt arrideant, medicamenta idiomate vulgari conscripta præbent.

Artis arca-
na non de-
tegenda.

Præstiterit enim gratis medicinam facere, & pauperi medicamentum dare, aut aliquod parui pretij præscribere, quàm illius compositionem docere: quam dum semel nouit, periculum in aliis, vt in se, fœliciter tentans, eos ducit ad exitium. Medicamentum enim quoduis, maximè catharticum, bonum & malum est, & pro ratione benè vel malè vtentis, sanat vel interficit.

Finis autem compositionis medicamentorum est, cuius gratia ea ipsa suscipitur: vel ad quem omnia quæ mixtioni sunt necessaria referuntur, vt tandem medicamenta ex arte composita, sanitati vel tuendæ, vel exornandæ vel morbis profligandis inseruiant.

Finis com-
positionis.

Ponderum
magna va-
rietas.



VIQUE nationi & ditioni sua semper fuerunt, ut adhuc sunt pondera & mensuræ. Libra mercatorum Constantinopolitanorum pendet uncias viginti sex: Mediolanorum, viginti quatuor: Parisiensium sexdecim: Lugdunensium, quindecim: Hispanorum, quatuordecim: Genuensium, duodecim. Aurifabrorum octo tantum: vulgus Markum nominat.

Veteres quoque Græci, Arabes & Romani non solum propria habebant idiomata & characteres, sed etiam pondus. Et nisi regia potestate arcerentur mercatores, nulla esset certa ac definita statera, quandoquidem pondere volunt emere maximo, & minimo diuendere.

Quia verò in Medicina sæpè bis peccare non contingit, & errata in præscribenda dosi ferè semper periculi plena sunt, Medicis omnibus communia & definita debent esse pondera, ut vna lege vnus sit omnium consensus.

Libra Me-
dicorum.

Libra autem illorum semper uncias duodecim pendet, quæ sic scribitur lib. i. Vncia dragmas octo, cuius hæc est nota ζ i. Dragma scrupulos tres, quæ sic pingitur, ζ i. ita ut in vncia tot sint scrupuli vel scriptuli, quot in Alphabeto Græco litteræ, nempe viginti quatuor, iuxta illud Faunij poetæ.

*Vncia sit dragmis bis quatuor, unde putandum,
Grammata dicta, quod hæc viginti quatuor in se
Vncia habet, tot enim formis vox Græca notatur,
Horis quot mundus peragit, noctemque, diemque.*

Quibus verbis scriptuli videntur quasi vicè gerere literarum; dragmæ syllabarum; vnciæ, dictionum; libra orationis; vel saltem periodi completæ. Sunt tamen pondera quædam minutiora scriptulis; nam granum est omnium ponderum minimum, seu minutum, è quo fit obolus, seu scriptulus dimidius, qui sic notatur δ β. Granum verò duabus litetis gr. simul iunctis, & aliquando g solo designatur.

Granum est
omnium
ponderum
initium

Cum sesquilibram, seu libram vnam cum dimidia, & sexcunciam, hoc est, unciam vnam semis notare volumus, maiori ponderi picturam hanc lib. j β; minori, istam ζ j β damus,

Granum igitur γένον Græcis, omnium minimum est, indiuisibile & minutum, minutia ob id nominatum.

Chalcus, seu æreolum, pendet minutias seu grana duo.

Siliqua, seu Ceration, Kirat Arabicè dictum, chalcos duos, hoc est, grana quatuor.

Semiobolus areola tria, i. siliquam vnam & dimidiam.

Obolus siliquas tres, seu chalcos sex, aut grana duodecim, & secundum quosdam scriptulum dimidium.

Scriptulus duos obolos, seu chalcos duodecim, aut grana viginti-quatuor, vel pro vsu nunc recepto 20. grana tantum. γρόνισμα.

Denarius est octaua pars vnciæ Romanorum, & pendet scriptulos tres, seu obolos sex, vel grana septuaginta duo, pro recepto olim vsu. δηνάριον.

Dragma est octaua pars vnciæ Græcorum, & leuior est denario, pendetque tantum sexaginta grana. hoc est scriptulos tres vulgares, quorum singuli grana solum viginti pendunt. δράγμα.

Olim denarius decem asses seu libras valebat, vnde illi nomen ait Syluius, nunc libræ tantum est pars octogesima quarta, vt dragma nonagesima sexta: Libram intelligo Medicam, quæ vncias duodecim pendet.

Multi autem pro denario dragmam ponunt, illo non multò leuiorem, vt pro dragma denarium, iuxta Græcorum interpretum versionem, qui cum nihil haberent, quod exactè denario Romano responderet, pro denario dragmam reliquerunt. Denarius tamē dragma grauior est ita vt vnciā denariis tantum septem constet, dragmis vero octo. Libra medica.

Sicilicus duas dragmas valet, estque quarta pars vnciæ.

Semivncia media est vnciæ pars sicilicos duos continens.

Vncia medica octo dragmas, negotiatoria denarios totidē pedit. ἡμισυσίον.

Scrib. Larg. Dragmam quoque interdum ab antiquis Hexagion dici compendioso, mercatores vulgò *grossum* appellant. ἑξάγιον.

Bes continet vncias octo, & media pars est *mnæ*, seu *minæ* medicæ, quæ sexdecim vncias continet, videturque libra mercatorum.

Ex Disc. Gal. At medicorum λίτρα, i. libra, minor est, & vncias tantum duodecim valet.

Omnia autem sic in pauca contrahere lubet, vt memoriæ mandentur facilius.

Libra seu pondo, & As sepè dicta, pendet vncias duodecim; deunx, vndecim: dextans, decem: dodrans, nouem: bes seu octunx, octo: septunx, septem: semis, sex, vel mediam ponderis cuiusque notati partem: quincunx, quinque: triens, quatuor: quadrans seu quartarium, tres. Nam quartarium non quatuor vncias, sed tantum tres, quartam scilicet libræ medicæ partem continet.

Vncia continet sicilicos quatuor, sicilicus dragmas duas, dragma scriptulos tres, scriptulus obolos duos, obolus duas siliquas semis, siliqua duos chalcos, chalcus duo grana. Vncia tamen ex ponderibus tot minoribus gradatim collectis constituta, negotiatoria videtur, cū 72. grana pendeat; medica vero tantum 60. leuiorem nāq; grauioremve medici è suorum ponderum censu excludunt. Proinde scriptulus medicus non 24. grana sed solummodo 20. pendere de-

bet. Duella est tertia pars vnciæ. Sextula est ϑ iiii. pondus.

Nomina ponderum Arabibus familiaria non subticuissim, sed tam varia deprehendi, vt infida arbitratus sim, apud quos vnciam *adar*, *alsatil*, *sacros* & *assathis* dici comperi. Dragmam quoque modò *alchi*, modò *nabach*, & aliquando *darchamet* nominant; vt scriptulum aliquando *guanthus*, sæpè *gormin*, & aliquando *Kermec* & *arme* nominant: Obolum verò *Seminen*, *Seminet*, *Onolos*, *Onolosat*, *Ologinat* indiscriminatum efferunt, mediam eius partem *Danich*, tertiam *Kirat* nūcupantes: Sibi autem sua vocabula relinquenda, nobis nostra ex vfu sunt.

Herbæ
quomodo
mensuran-
tur.
Manipulus
quid.

Porro cū herbæ mensurentur manipulis, per literam M: flores pugillis, per literam P. designantur. Manipulum vocant Medici, quantum manu complectuntur; Pugillum, quantum tribus digitis capere valent.

Ana quid
signet.

Cū verò æquale pondus, aut mensura duorum aut plurium simul medicamentorum præscribitur, hæc dictio *Ana* additur, quæ singulorum medicamentorum præscriptorum æqualem assumendam esse portionem indicat.

Inter notas ponderum, vel potiùs quantitatis finiendæ in præscribendis medicamentorum formulis, cū fructus multi nec trutina librentur, nec cyathis, conchis, acetabulis, aut vasis similibus concavis mensurentur, sed numero tantum ponantur, solita litera N apposita, numerus illorum notatur; Non tamen quantus, nisi quoque notam ponderis quo opus est, vna subiungatur; vt exempli loco, si amygdalæ, sebesten, pruna, aut similia præscribenda sint, quæque numero duo, tria, quatuor, quinque, sex aut plus, minùsve pro vario Medici scopo præscribuntur, præstat Rondelio testante, in numero signando notis præcorum Romanorum vti, quæ sic depinguuntur, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, quàm aliis characteribus, Ciphra nomine vulgaris noncupatis, atque sic designatis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ne forsan ignarus quidem tyro dum dragmas duas aut tres sic 3.2, 3.3, depictas oscitanter legit, perperam triginta duas aut triginta tres dragmas assumat.

De medicorum mensuris. C A P. V.



ON sine ratione Deum omnia pondere, numero & mensura creasse Literæ Sacrae testantur. Nam cū numerus sit actus rationis, Plato hominem animal ideo sapientissimum asseruit, quòd nouerit numerare, omniaque Deus iusto pondere & mensura præcepit trutinari.

Per mensuras, instrumenta quædam instar pyxidum concaua, ceris speciebus excipiendis, mensurandisque accommodata, intelli-

Leuit.
19. ϑ
Deut.
25.

mus, quibus medicamenta, tam simplicia quàm composita, sicca, liquidæ non modò Pharmacopœi, sed mercatores dimetiri solēt.

Sepiùs tamen ad liquores, vt oleum, acetum, ptisanam, decoctũ, vel similia dimetienda efformantur, eaque industria adaptantur pōderibus, vt alia sint vnciæ tantũ vnus, alia duarum, aut trium, alia librę vnus, alia quinque aut decem, vel plurium sit capax.

Omnium minima mensura capere potest ꝓ j & ꝓ ß vini substantiæ mediocris, vocaturque cochlearium.

Alia maiuscula, Cheme dicitur, & duplo superiore maior est, Cochlea-
capitque vini ꝓ ij. & ꝓ j. rium.

Tertia adhuc maior, ligula interdum dicta, & à nonnullis, mystrũ, Ligula.
seu cochlearium paulò maius, capit eiusdem ꝓ ij ß. aut ꝓ iiij. Mystrum.

Concha continet mystra duo, seu chemas duas, vel ꝓ v. Concha.

Cyathus conchas duas, seu ꝓ x vel ꝓ j. ß.

Acetabulum, Oxybaphum Græcis dictum, sesquicyathum, seu Cyathus.
ꝓ ij & ꝓ ij, vel ꝓ ij. ad summum. Acetabu-
lum.

Quartarius acetabula duo, seu ꝓ iiij. ß. vel paulò plus. Oxybaphũ

Hemina, seu hemisextarius quartarios duos, seu ꝓ ix.

Sextarius, seu chopina Parisiensis, duas heminas, hoc est, ꝓ j. ß. Hemina.

Chœnix, seu modulus sesquiseptarium, nempe ꝓ ij. & ꝓ iiij.

Chus seu Congius sextarios sex, hoc est, lib. i x. Chœnix.

Vrna congios quatuor, seu libras quadraginta.

Amphora urnas duas, seu libras octoginta. Congius.

Metretes seu Ceramium Græcè, Cadus Latinè, sesquiamphoram Amphora.

Culeus amphoras viginti seu urnas quadraginta. Metretes.

Sic enim ab ea mensura, omnium minima, sensim ad maximã pro- Cadus.

grediendo mensurę liquidorum, vt solidorum à granis, incipiunt. Culeus.

Atque vt maior numerus continet minorem: sic maius pondus, aut mensura, vtrumque minus.

Mensurarum igitur alię parvę sunt, alię magnę, alię mediocres: Et ex illis quędam liquidis, alię siccis, alię ambobus mensurandis desti-
nantur.

Culeus, amphora, urna, congius & quartarius, liquidis; modius & semimodius, siccis; sextarius, hemina, acetabulum, cyathus, his Modius.
& illis dimetiendis inferuire solent.

Nonnulli pro mensura minima digitum mathematicum sumunt, qui pars est duodecima pedis, vt vncia librę, multique Botanici in describendis stirpium dimensionibus, modo vnciarum, modo digi-
torum vocabulo vtuntur; apud quos plantę cuiusdam furculus 4.
vncijs crassus, dicitur læpè, qui 4. digitos in latitudine vt 14. vncijs
longus qui totidem digitos in longitudine habet. Sic iudicandum de
palma, quę continet 4. digitos pes medicinalis tres palmas, lon-
gior vero quatuor, cubitus sesquipedem. Hęc forsā curiosi non
indigna putabunt.

De quantitate medicamentorum exhibendorum.

CAP. VI.

IN componendis medicamentis non tantum simplicium qualitas requiritur, sed qua quantitate singula misceri debeant, vel iam compositum exhiberi, est inquisitione dignum. Minor enim quantitas ut sæpe non prodest, sic maior obest sæpius; nec minus lactuca interficit ipsa cicuta; pluresque vinum quam aconitum occidit.

Quod si alimenta plus æquo ingesta veneni sunt loco, summa artis & artificis laus est medicamentorum iustam describere quantitatem & quæ, ac quanta, cuique sexui, ætati, naturæ, & tempori conueniunt, definire. Purgat enim potenter turpethum, colocynthidis, veratrum; imbecillimè polypodium, tamarindi, ius galli veteris: moderatè cassia, senna, rheum: difficillimè, senes & melancholici autumnno; facillimè pueri humidiores hyeme, & vere; ut & biliosi æstate: Qui mediorum particeps sunt, medio modo purgantur.

Idem medicamentum non eadem semper præstat.

Et cum per ætatum, tempestatumque mutationes humorum conditionem mutari contingat, contingit quoque ut idem medicamentum eadem quantitate non similiter moueat ac operetur. Nam cum humores turgent & vrgent, natura leui sæpe medicamento proritata molitur excretionem materiæ grauantis, eamque vel per secessum, aut vomitum excludit. Ut contrà, cum propter lentorem tenaciùs impingitur, nec sua qualitate naturam ad exclusionem laceffit, validissimum nonnunquam medicamentum ignauum est, nec aluum satis turbat, ducitve, aut certè molestos ac redundantes succos tantum mouet, non promouet.

Odor medicamenti cur ventis aliquando ducat.

Fallit hæc sæpe diuersitas humoris incautos, qui cum experientiâ didicerint, cassiam vncijs, non granis; scammonium granis, non vncijs; rhabarbarum dragmis præscribi & exhiberi, dum cuiusque pro efficacia agendi conuenientem dosim præscripsisse putant, ne semel quidem, aut contrà, impensè & profusè vident aluum moueri. Nam cum in orgasmò natura est, turgetque superfluous humor, pauca sæpe grana rhei ventrem turbant, imo & cathartici cuiusvis odor eum aliquando solus exagitat.

Quare non imprudenter agunt Medici, si ab agrotis, à quibus vocantur, & à se nunquam antea visis sciscitentur, num illorum aluus facile & blando eccoprotico moueatur. An mochlico & validiore indigeat; vel sit ne perpetuò liquida, vel dura, & clysmis quotidie solita moueri. Sic enim fœliciùs imperabitur medicamentum purgans quod nec supra, nec infra vires ventrem agitabit; & quæ sita purgari oportet purgabit. Ea tamen lege, ut si totum corpus

præuis scateat humoribus, non affatim, sed partitè, nec vno die; sed pluribus, si opus fuerit moueantur. Natura si quidem non facile fert magnas cuiuscumque humoris etiam laudabilis euacuationes; Semperque cum ea benè agitur, si omnia paulatim fiant, nec quicquam immoderatè ac violenter ducatur.

Iustam medicamentorum quantitatem vix definiri, non tamen, dum parum excedit, aut deficit, periculosam.

CAP. VII.



EDICA quidem ars coniecturalis est, sed quantæ experientia iuuat, auxit ratio, & doctorum auctoritas stabilivit, qui ex causarum indagatione effectus perquirentes, ac longa obseruatione prudentiores facti, theoremata posteritati reliquerunt multis rationibus validissimis, & necessarijs fulcita, quibus morbi dignoscuntur, remedia inueniuntur, & medicamentorum quantitas describitur, si non iusta ac definita, saltem adeò naturæ & morbo accommodata, vt illa vincat, hic vincatur. Quid enim mali reformidandum, si vbi cassiæ vncia, aut rhabarbari dragma conuenit, illius tantum dragmæ septem, vel etiam nouem, huius verò scriptuli duo aut quatuor exhibeantur? Nam paruulus error non valdè pertimescendus; Atque vt sine sanitatis insigni iactura, per medicamentum humores excrementitij non semper omnes educuntur, sic cum præter illos nonnihil ex his qui qualitate non laedunt, educitur, graue quid suspicari nihil est necesse: Cum nec ipsa edulia potulentæ eadem semper copia, nec hisdem horis ingerantur. Vt nec si cacochema sunt, morbos statim inuehant. Multis sæpè contigit innoxie aliquod cicutæ folia in iusculis comedisse ancillarum incuria, quæ petroselinum, cui externa quadam formâ conuenit, selegisse putabant. Et qui ranas habent in delicijs, buffonum coxas interdum sine periculo mandunt.

Paruulus error non pertimescendus.

Summo autem iudicio, artificiosaque coniecturâ efficiendum est, vt medicamenti quantitas naturæ vitibus, & educendæ sarcinæ respondeat, quæ si copia grauet, nec medicamentum illi proportionatum vna vice tuto possit exhiberi meliùs erit partitè diebus singulis, vel alternis, totam illuuiem deplere, quàm affatim humores & vires simul deicere.

Miserum est etiam corpus iterato medicamento repurgare, cum vnico tantum egeat, aut violentum porrigere, quum oneri tollendo blandum satisfaciat. Hypercatharsis namque seu superpurgatio timenda, quæ venas nimium referando, dysenteriam interdum excitat, sanguinem vacuat, & virium integritatem prostermit. Prodest

Super purgatio timenda.

si quidem magis aliquid ex superfluis humoribus deferere, quàm immoderata vacuatione portionem optimorum vnà cum excrementijs protrudere,

Quomodo
medicamen-
tum idem
varios pro-
mit effectus

Et quemadmodum idem medicamentum eidem homini, eadem quantitate, sed diuersis temporibus datum, plerumque diuersos promit effectus: sic semper dum variat illius quantitas, agit variè, & modo huic, modò illi morbo tutiùs fœliciùsque datur. Si enim grauidam purgare consilium est, vt certè quadrimestrem vsque ad sex-
tum mensẽ, fas est, medicamentum roborans audacter illi parua quantitate dabitur, vt molestiæ causa, de qua per grauiditatem pri-
mis mensibus conqueri solet, blandè subtrahatur, nullamque ex
medicamento fœtus aut prægnaus percipiet noxam. *Aphor. lib. 4. Hipp.*

Quæ ma-
gna religio-
ne pon-
deranda.

At verò, cùm opij diagredij, aut alius medicamenti, quod parua mole maximas vires habet, quantitas exquiritur, ea religiosiùs, ac prudentiùs præscribi debet ac ponderari, vt si iustè definiri vix queat solùm tantilo plus exuperet aut deficiat. Cùm enim lex non sit de minimo, nec de eo iudicet prætor, vt vulgò fertur, leuiter in excessu vel defectu minimo peccatur.

De his quæ innoxie magna quantitate sumuntur, quibus conueniant, & quando. CAP. VIII.



MNE medicamentum aliquod naturæ negotium, aut maius, aut minus facessit, prout illius facultas imbecillior fuerit aut validior. Quod catharticum
est, vt odore, saporeve magis displicet, sic mole-
stiam adfert maiorem: Nam quæcumque purgant, *C. vl. l. quos quando & qui. bus.*
omnia, inquit Galenus, ventriculum lædunt, & ma-
ximè eius ostium, quod neruis quam plurimis constat, & acutè sen-
tit. Propterea excogitatum est purgantibus beneolentia & plerum-
que castigantia admiscere, vel ea seligere, quæ non multùm ingrata
sunt, nec aluum immoderatè turbantia: Quæ talia dum habentur,
non tamen imprudenter exhibenda, sed quibus conueniunt, atque
ea quantitate, quæ viribus naturæ respondeat, eaque facilè fe-
rat.

Dosis me-
dicamento-
rum pur-
gantium.

Quantitas autem illa varia est pro varia singulorum facultate; quæ quo imbecillior est, eo maiore dosi sumitur; quo validior, eo minore. Imbecilla dicuntur purgantia, quæ lentè ac benignè ven-
trem ciendo, primam corporis regionem eluunt, atque vncijs po-
tius, quàm dragmis mēsurantur: cuiusmodi est mianna, pulpa ta-
marindorum, medulla cassiæ & similia: Valida, quæ exigua molle,
vt quæ granis tantùm aut scrupulis ponderantur, magnos & sæpè
violentos præstant effectus, de quibus postea. Inter imbecilla
quoque numerantur omnia quæ vncijs, inter violenta, quæ granis
mensu-

mensurantur: interambo, media quædam sunt, vt rheum, fenna, aloë & similia, quæ dragmis ponderantur; quæ omnia, vt quæcumque lubricando & roborando purgant, maiore quantitate sumuntur.

Idem est iudicium de alterantibus medicamentis, quæ quò minus à symmetro corpore distant, vt calida, aut frigida primo ordine, usque ad secundum, cò maiore dosi præscribuntur; Quo longius ab eodem recedunt, vt quæ ad quartum recessum caloris aut frigoris accedunt, eo minor ipsorum quantitas adhibetur: Tutum si quidem non foret piper, pyrethrum, euphorbium, aut cicutam, Sedum, nympheam larga copia porrigere, cum horum vsu algerent interiora; illorum, conflagrarent.

Alteranti
dosis.

Roborantia verò cùm à se inuicem dissideant agendi viribus valde dissimili quantitate præbentur, vt aquæ cordiales, vncijs, conseruæ principum partium roboratrices, dragmis; Alexiteria efficaciora scrupulis, lapis bezahardicus & cornu monocerotis, granis.

Quæ item forma liquida sumuntur, ad roborandum, alterandum, aut purgandum, ea semper dosi maiore solent imperari.

Qui medi-
camentis
validis qui
benignis e-
geant.

Porro non ex parte tantùm medicamenti, sed corporis status & humoris, quantitas augeri debet, vel minui. Robustum, firmumque corpus, laboribus & crebris purgationibus assuetum, aut multis obstructionibus impeditum, blanda imbecillaque medicamenta aspernatur. Molle, ac rarum, quale puerorum & mulierum est, vt è diuerso, macilentum, exuccum, medicamentis tantùm eget blandioribus, vt & mulieres grauidæ, & qui ex longo morbo resurgunt.

Humoris quoque species & copia medicamenti quantitatem distinguunt. Nam lentus humor, crassus, frigidus, melancholicus, pituitosus, & tenaciter cuius parti adhærescens pigre delabatur, validioreque cathartico ad illius exclusionem habet opus. Tenuis, calidus biliosus, interdum sponte per vomitum excernitur, aut facile blando medicamento purgante per secessum educitur.

Frigidus &
crassus hu-
mor tardius
purgatur.

Præterea cœli status, regionis natura, & anni tempestatisque conditio, non idem semper medicamentum, eademque copia, exhibendum arguunt. Namque cùm tempestate aquilonia alui duræ sint, & hyeme rigida corpus coarctetur, denseturque præsertim in regione gelida, humor tunc partibus tenaciter obhærescens, non nisi valido medicamento, aut blando liberalius, aut sæpius exhibito profunditur. Et vt annus tales plerumque morbos facit, qualis est eius constitutio pro humoris morbum committentis specie, cuius prouentum magnum facit aut minorem; sic immutari quoque suadet non tantùm medicamenti genus, sed quantitatem, quæ copiosior esse semper debet, cùm vel ratione corporis, humoris, cœli status, regionis, consuetudinis purgatio difficilis esse solet: vt cōtraria ratione cum facilis est, illius etiam copia debet esse minor, vt mox docebitur.

Medicamē-
ti dosis pro
cœli & soli
natura im-
mutanda.

De his quæ parua quantitate præscribuntur.

CAP. IX.

Blandum
medicamē-
tum quale.



VA cuiusque medicamento est purgandi virtus fortis, aut imbecilla; sua & virtutis particularis proprietas, qua hunc potius, quàm illum humorē blandè aut potenter educat. Blandum illud dicitur, quòd mediocri tantum quantitate sumptum, aluum pigrè ac benignè mouendo, pauca deijcit, superflua tamen ducit, dum superfluo pondere sumitur. Si enim rhei vel cassiæ, quæ inter familiarissima naturæ pharmaca recēsentur, immoderata quantitas, vt illius sesquiuincia, & huius selibra ingeratur, magna immoderataque ventris turbatione, humores agitando per secessum, aut vomitum, aut vtrumque mouebit,

Potenter purgat, quod exigua mole; vt quæ granis ponderatur, citam ac copiosam deiectionem efficit; proinde parua semper quantitate datur: vt & omnia quæ ingrata sunt, aut rara, magnoque venduntur pretio, aut vires habent efficacissimas, ac malignæ cuiusdam qualitatibus participes.

Ingratum
quale.

Ingrata sunt, quæ vel odore molestè feriunt nares & cerebrum, vt castoreum, sagapenum & assa fœtida, quam ob tetrum halitum Germani stercois diaboli vocant; vel sapore, cuiusmodi sunt amara vt colocynthis, centaurium minus; acris, vt euphorbium, pyrethrum, acidissima, vt oleum sulphuris & vitrioli, cuius aliquot guttæ syrupo violatopro portione debita commixtæ, eundem calore ex rubro micante, fucant, & acidulum simul reddentes, oculis & palato suauem admodum efficiunt. Eiusmodi syrupum arte dicta alteratum, aulicus quidam medicus, primò sui aduentu, omnibus æquè morbis, proprijs manibus dabat plebeculamque vanis ostentationibus fallendo arcanum omnium arcanorum asserebat.

Quæ rara sunt, nec nisi magno enuntur, vt gemmæ, smaragdi, vniones, balsamū, aromata pretiosa, ambra, moschus, zibethum, & quæ quarto recessu calefaciendo aut refrigerando corpus immutant minore quantitate præscribuntur.

Quæ mag-
na cautela
sumenda.

Religiosius adhuc assumuntur, quæ antipathia quadam & speciali dote vitæ primordia spiritum & calorem impetere, carnes colliquare, & sanitatis integritatem destruere nata sunt, vt caro viperarum ad pestem & lepram, renes, vel potius lumborum caro stinchorum ad æstrum veneris ciendum, cantharides ad ischuriam; hæc enim, vt decet præparatæ, alijsque medicamentis idoneis permixtæ & quantitate parua datæ, urinam mouent innoxie, maiore copia sistunt, & vesicam impensè quoque calefaciunt.

Mineralia quoque, vt ea omnia, quæ facultates habent

*Rõdele-
tius.*

efficacissimas, parcius; quæ minus validas ac remissas liberalius sumuntur.

Præterea, quæ ad aromatizationem, vel correctionem, vel aliorum medicamentorum deductionem conducunt, ea semper minori quantitate ponuntur, vt cinnamomum, vel santali, aut schœnatum ad odoris, saporisve suauitatem pharmacis conciliandum, zinziber ad agarici, crocus ad opij castigationem; incidentia & aperientia ad reliquorum medicamentorum virtutem medicandis partibus deferendam.

Quæ passim
dosi præscribuntur & si
tuta.

Nihil verò æquè pharmaci cuiusdam magnam dosim dehortatur, atque vis illius effræna, præpotens & maligna, quæ cum intro subit, simul vt educitur in actum, sæpè naturam anxie ducit, & symptomatum excitat cateruam.

Quæ rara sunt, pretiosaque principibus & diuitibus, maiori pondere, si res postularit, audacter præscribuntur.

Qua quantitate simplicia medicamentis componendis permisceantur.

CAPVT X.



EDICAMENTA pauca inueniuntur multis simplicibus eadem proportionem mixtis composita, quin duo, vel plura reliquorum quantitatem superent. Superant, quæ materiæ vicem gerunt, & idoneam medicamentis formam inducunt, vt oleum, cera, lithargyrus emplastris & vnguentis: vel præcipuam agendi vim præstant, & basis locum in compositione obtinent, vt aloë in multis catapotijs: vt etiam quæ sub magna mole vires habent imbecillas, vel ad reliquorum conseruationem adhibentur, vt mel & zuccharum in electarijs & syrups.

Hæc verò præcipua lex in medicamentorum miscendorum proportionem seruanda est, vt, quò quid maiorem medicamento vtilitatem affert, eò in huius compositione, copia maiore adhibetur.

Æquali pondere miscentur, quæ symbolo quodam conueniunt, habentque inducendæ formæ medicamento aptam materiam, & æque affectui, affectu parti, causæ & symptomati aduersantur: quod videtur obseruatum in vnguento tetrapharmaco, seu basilicone, quod cere, picis, resinæ, adipis tauri partibus constat æquis: vt etiam in electario Iustino descriptione Nic. Myrepsi quod partes æquales, triginta simplicium excipit, quæ proprietate quadam omnia calculos atterere, & vias lotio dicatas referare creduntur. His excipiendis additur mel aut saccharum diuersa proportionem commistum, vt ex omnibus simul electarium paretur, quod formam sibi conuenientem, ac consistentiam idoneam habeat, & ad futuros vsus diutius conseruetur.

Quæ simul
æquo pondere possunt
misceri.

Electarium
Iustinum
ad quid
utile.

Cap.
40.3.

Radicum
quantitas
in medica-
mento cō-
ponendo.

Porro ex medicamentis simplicibus alia pondere, alia numero, alia utroque modo, quædam mensura, nonnulla manipulis, alia pugillis mensurantur.

Radicum quantitas pro singulis dosibus variè, pro varia illarū virtute & agendi efficacia mensurantur. Si blandè alium ducendi facultatem habeant, dragmis; si potenter, scrupulis: Si tantum alterant, unciijs integris, vel mediatis: Et cum balneas ingrediuntur, libris, & aliquando manipulis, si tenuiores sint, ponderantur.

In syrupis magna quantitate conficiendis, ponuntur ab ℥i. ad ℥ij. aut ℥iij. In apozematis pro vna dosi, a ℥ij. ad ℥ss. vel ℥i. aut plus, minusve, pro radicum viribus. Si pro multis dosibus parandum sit decoctum, eadem proportionē ipsarum augenda quantitas,

Cū verò duæ vel tres, vel plures qualitates eiusdē, aut ferè similis radices præscribuntur, singularum minor quantitas poni debet, adeo ut omnes simul iunctæ æquipolleanť vnius quantitati, inquit Rōdetlet. Quod etiā fieri debet in alijs omnibus simplicibus medicamentis, facultate similibus, dum æquè affectui propugnando, & parti iuandę conueniunt. Atque ut paucis repetam, quæ acrimoniam quamdam, aut facultatem habent exiniām, parua quantitate; quæ blandam aut imbecillam, maiore ponuntur.

Herbarum
quantitas.

Idem est iudicium de herbis tam recentibus, quàm siccis, quæ manipulis mensurantur, aut singulis aut pluribus, pro illarum facultate & medicamenti parandi natura. Singulas enim ad vnam dosim, aut alteram, manipulo solo; & plerumque tantum dimidiato metimur. ad fots parandos, manipulis duobus: Ad balneum pluribus, & interdum fasciculis vsurpamus.

Flores.

Minutuli flores sicci, aut recentes, ut roris marini, violarum, buglossi modò pugillis, modò pondere mensurantur: Maiores ac recentes, ut liliorum, nymphææ, rosarum sæpius manipulis: aridi dragmis, unciijsve in trutina expenduntur.

Semina.

Semina quæuis calida, frigida, temperata, acria, acerba, amara, vel ingrata pondere semper librantur, sed diuersa quantitate in compositione medicamentorum ponuntur, pro illorum diuersa virtute & medici scopo.

Callidissima, frigidissima & narcotica, dum extrinsecus adhibere consilium est, dantur à ℥ij. ad ℥j. Si intrinsecus sumere, à ℥j. ad ℥j. aut paulò plus, aut minus, pro illorū vi potentiore aut imbecilliore.

Fructus
numero &
pondere
mensuran-
tur.

Fructuum, ut radicum cū sit diuersa magnitudo & qualitas diuersa quoque illorum quantitas præscribitur, diuersoque modo iudicatur, Minimi pondere, ut ribes & berberis: maiusculi numero ut sebesten & pruna: nonnulli utroque modo, ut amygdalæ, iuiubę & passulæ. Multi, quia crassissimi sunt, nec integri expetuntur, frustatim secandi sunt, & à cortice, nucleis & acinis repurgandi; postea dragmis, aut unciijs mensurantur.

Et vt summam omnia complectar, liquida sæpius mensuris, solida pondere, fructus numero, folia manipulis, flores pugillis mensurantur. Atque pro varia singulorum qualitate, varia quæque dosi præscribuntur: hinc lignorum, corticum, leguminum, animalium & eorum quæ ab ipsis sumuntur, dosim, mensuram, & pondus minutius persequi superfluum videtur, cum ex eorum consistentia & qualitate, atque ex his quæ superius dicta sunt, hæc omnia facile dignoscantur.

De medicamentorum repositione. C A P. XI.

VT accuratam ac dilucidam medicamentorum compositionem explicaremus, illarum conficiendi modum, basim, formam, finem, & singulorum mixturam ingredientium quantitatem, atque eorundem æqualitatis aut inæqualitatis rationem fusissimè aperuimus: Sequitur nunc vt medicamentam iam composita, his in locis reponantur, in quibus diutissimè viribus integris queant assèruari.

Medicamentum autem quodque seu simplex, seu compositum, nam vtrumque assèruandum est, non vbi vis ante vsum reponitur, sed in loco idoneo, ne alteretur, corrumpatur ve, & adhuc validum vtendi tempore, quibus conuenit, opportunè ac fœliciter detur.

Simplex primùm seligitur, & à sordibus, eiusque partibus excrementitiis, aut inutilibus repurgatur: dein, vt assèruetur, siccatur: humida namque diu seruari non possunt, quin marcorem & putredinem acquirant.

Siccantur autem herbæ in vmbra, vel sole non multum feruido, nec loco marcido, sed sicco, aut fumi, puluerisque experte, & manipulis, aut fasciculis colligatæ, reponuntur in sacculis canabinis, aut papyraceis, ne à prædictis detrimentum capeant. Flores modo simili siccantur, reponuntur & conseruantur; Estque conseruatio tam affinis repositioni, vt hæc ad illam referatur.

Frigus non item officit, cum ab eius rigiditate tuta sint omnia, quæ sicca sunt, aut crassa, sed liquida, ac humida facile cogit, quæ adueniente tepore statim ad pristinum statum redeunt. Aquæ tamen destillatæ, immoderato gelu concretæ, de sua bonitate non parum amittunt, sæpiusque lagenis vitreis quibus continebantur, per hyemis sæuitiam abruptis effunduntur, nisi prudenter aromatarij prouiderint.

Anno salutis 1608. mensib. Ianuario & Febr. dum hæc conde-
rem, hebdomadas sex integras adeo sæuit hyemis rigiditas, vt vasa
confringeret non modo figulina, vitrea, stannea, sed cuprea etiam
crassissima quibus aqua continebatur: Atque tum panis recens è
clybano extractus, mox in duritiem velut lapidam concresebat,

Sæuitia hye-
mis anni
1608.

nec in cellis vinariis à glacie tutus erat. Mitescente verò frigoris sæuitia, singulæ ædes Lutetiæ intus & extrâ horrido gelu incanescebant, Multi autem morbi pulmonum & partium spirabilium toto illo tempore grassabantur, quibus quamplurimi peribant.

Fructuum
repositio.

Fructus reponuntur aliquando in horreis vt poma, interdum in doliis, vt pruna, sæpè in pyxidibus vitreis aut ligneis, charta vt dect obturatis, vt iuiubæ, ne à fumo, aut puluere alterentur, aut à muscis inquinentur, & erodantur.

Semina priùs siccata reponuntur in vasis vitreis, & aliquando ligneis, & loco sicciore seruantur.

Radices purgatæ, & arefactæ seruantur in arculis & pyxidibus ligneis, gossipio nonnunquam inuolutæ, si pretiosæ sint, vt rheum, ne ab æris nociua qualitate, aut caloris edacitate, vis earum pereat, ac citò corrumpatur.

Succi liquidi excipiuntur lagenis, aut aliis ore angusto vasis, quibus desuper oleum affunditur, ne ab ære alterentur.

Succorum
liquido-
rum re-
positio.

Sicci pyxidibus ligneis, aut vasculis vitreis, fictilibusve reponuntur: vt etiam lacrymæ, gummi, animalia, vel eorum partes, & mineralia.

Liquores & olea, vt liquidambar & balsamum vitreis lagenis excipiuntur, & subere, aut ca & membrana quadam obturantur, ne citiùs ab ære dissipentur.

Terebinthina non tantùm optimè vase ex ferro albo, aut vitreo reposita seruat, sed etiam figulino.

Quædam in ædium parte suprema; alia in mediâ: alia non nisi in cella vinaria, aut alio loco madente, & vliginoso, sæliciter reponuntur & conseruantur, vt cassia.

Syrupus ca-
pilli veneris
Monspeliensis.

Medicamenta composita pro diuersa illorum consistentia & viribus, in diuersis vasis reponuntur, vt hydromel in doliis, syrapi in vasis fictilibus, & aliquando vecturæ facilioris gratia, ex ferro albo confectis, vt syrupus capilli veneris Monspeliensis, qui eiusmodi vasculis exceptus, commodiùs ad longinquas regiones vehitur; electaria solida in arculis ligneis: liquida in vasis stanneis & figulinis vitratis: pulueres in vitreis: vnguenta in ollis stanneis. Sicque singula variè, pro varia singulorum natura reponuntur.

De conseruatione & duratione medicamentorum.

CAP. XII.



VT medicamentacomposita pro vna tantum dosi non solent confici, sic nec simplicia colligi, sed quæque ad futuros vsus maiore quantitate seliguntur & parantur: Atque vt à puluere, fumo, putredine, iniuriis aëris & insectis, vt muscis, formicisve tuta sint, reponuntur in vasis idoneis, aut includuntur sacculis, aut inuoluuntur chartis, & in pharmacopoliis asseruantur, his solum exceptis, quæ in loco vel humidior vel siccior vtilius asseruantur, vt cassia in spelunca vinaria: & saccharum, conditura, tragemata, omniaque saccharata in fornace aut scrinio, iuxta ignem.

Multa ad sui conseruationem aceto, aut sale, aut vtroque condiuntur, vt cucumeres, cappares, oliuæ: vel saccharo, aut melle, vt omnia medicamentorum genera, ex quibus electaria vel syrapi componuntur.

Decocta, æstate biduum, aut triduum: hyeme hebdomadam integram: aquæ destillatæ & conseruæ annum vnum durant.

Syrapi perfectè cocti, electaria, trochisci, pilulæ, olea, vnguenta & emplastra biennium sæpè conseruantur: vt & radices, ligna, cortices, succi sicci, lacrymæ, gummi, triennium & aliquando quadriennium: elaterium triginta annos: vngues, ossa, cornua seculum.

Præter hæc quædam vix diu conseruantur, nisi eorum fruuntur præsentia, cum quibus familiaritatem quamdam habent, vt magnes cum ferro, cuius limatura, quasi nutritur, qua absente citò senescit, amittitque vigorem. Ferrum magnetis alimementum.

Alia securius vires suas tuentur, si rerum quarundam appulso, ab aëris iniuriis & teredine vindicentur. Sic caphura granis milij aut phylj obruta tutius seruatur; mala citria, arantiaque aceruo tritici sepulta tardius putrescunt, & radix Mechoacan absynthio inuoluta, non tam citò carie eroditur, eiusque facultas magis integra conseruatur.

Moschus & zibethum tutò seruantur in pyxidibus plumbeis, nec credibile est, ea mediis in latrinis suspensa, aut recondita, vires amissas, vt Plateario placuit refarcire. Non probatur Plateari consilium.

Crocus, cariophylli, piper, macis, & alia aromata optimè ac diu seruantur in sacculis coriaceis: Storax, benioin, in pyxidibus vitreis: Santali, pyloale, lentiscus, schoenanthum, semina, & alia penè innumera in capsulis, seu vasis ligneis, vt fusiùs in Officina docebitur.

Medicamenta igitur tam simplicia quam composita, si dicto modo, ac sedulo seruentur, diutius durant: Si negligenter, celerius senescunt. Quando medicamenta mutanda.

Pars autem illorum maxima singulis annis debet mutari. Si quæ tamen colorem, odorem, saporem diutiùs seruant, durant quoque diutiùs, vt sesquiannum, aut biennium, aut triennium: vt quæ crassam habent substantiam, & vires firmiter substantiæ inhærentes, vt contra, quæ easdem faciliè vanescentes habent, & substantiam raram, minùs durant, vt flores, & ea omnia quorum virtus superficialis est & citò dissipabilis. Tutiùs vero ac diutiùs semper seruantur, quæ in arculis optimè clausis, aut vasis strictè operculatis includuntur, sic enim illorum virtus securiùs retinetur, multi theriacam in vase plumbeo durabiliorem putant, quæ tamen tempore Galeni in pretioso, vt nunc in figulino ferè semper reconditur.

De his, quæ antonomasia quadam ceteris præstant, à qua illorum denominatio sumitur. CAPVT XIII.



Terueret Deus hominem ab ærumnis & egritudinibus quibus quotidie laceffitur, terram hanc tantquam paradysum inferiorem, seu hortum locupletissimum stirpibus innumeris ditauit, quarum amœno halitu reficitur, colore vario recreatur, in sanitate nutritur, in morbo iuuatur, & à morte liberatur.

In illo autem fecundissimo solo permulta fruticant, & quotidie nobis occurrunt generis eiusdem, & qualitatis parum dissimilis, quæ eodem quoque nomine designantur ac nuncupantur. Nam iridum & graminum infinite penè dixerim recensentur differentiæ, nec certo quis hucusque numero eas definire valuit: vt nec geraniorum, hyacinthorum, anemones, narcissorum, aliarumque multarum stirpium, in quarum omnium varietate varianda naturam delectari, & quasi ludere videmus.

Aloë quæ
nam me-
lor.

Ex his verò dum absolute quedam scribuntur, sine ampliori aut peculiari singulorum descriptione, ea semper sunt eligenda, & usurpanda, quæ meliora & usu longo probata: hocque theorema in his, quæ analogiam habent inter se perpetuò est obseruandum, Vt, in quoque genere semper assumendum est, quod optimum. Veluti quando aloë simpliciter ponitur ea quæ succum citrinum habet, succotrina hinc vulgo dicta, aut si mauis succutrina à succutri Persiæ insula, in qua melior nascitur, intelligenda venit.

Atque vt pauca, pro multis exempla sint, cum simpliciter acetum ponitur, non acetum zithi, sed vini sumendum est. Si balsamum, natium illud ex arbore Ægyptia elicatum. Si benjoin, illud quod à maculis candidis, instar amygdalarum, amygdaloides dicitur, sumendum. Quando etiam absolute cassia ponitur, fistula usurpanda: quando corallus, ruber, qui præstantior iudicatur.

Sic

Sic quoque cetera de præstantioribus semper intelliguntur, vt

Dictamus	}		Cretenfi,
Aristolochia			Rotunda.
Dulcis radix	}		Glycyrrhisa.
Endiuiā			Cichōrio latifolio.
Epythymus	}	DE	Cassythā thymo innata.
Fœniculus			Marathro.
Fel terræ	}		Centaurio minore.
Gummi			Arabico.
Granatum	}		Acido.
Hepatica			Lichene.
Hedera	}		Corymbifera.
Iasminum			albo.
Iusquiamus	}		albo.
Lactuca			Satiua
Lilium	}		albo, ac bulboso.
Marrubium			Prassio albo.
Menta	}		Vera & hortensi.
Nigella			Semine tantum.
Nymphaea	}		alba.
Nasturtium			Semine eius.
Oleum	}	DE	Oliua.
Opium			Thebaico.
Papauer	}		albo.
Polypodium			Querno.
Quercula minor	}		Chamædri
Quinquē neruia			Lanceolata.
Rosa,	}		Rubra.
Regina prati			Ulmaria.
Stœchas.	}		Arabica.
Santalum.			citrino.
Tapſus barbatus	}		albo.
Terebinthna			Veneta.
Veronica	}		Mascula
Viola			nigra vel potius cerulea.
Xyloaloc.	}		nigricante.
Yris.			Florentiana.
Zinziber,	}		Maluarico, quod nulli

bonitate cedit, & à Persis, Arabibus, & aliis Barbaris maximè omnium expetitur.

De radicibus, seminibus, floribus, lapillis, & aquis, quæ dignitate quadam cæteris præferuntur.

CAPVT XIII.



PER MULTA simplicia etiam diuersi generis, qualitates habent affines; Ex his tamen alia alijs esse præstantiora vsus comprobrauit, & ad morbum profligationem conuenientiora; vt quæ qualitate quadam alterante, roborante vel purgante cæteris præstant, & effectus exhibent fœliciores: Cuiusmodi

Radices aperientes maiores.

Radices aperitinae minores.

Semina frigida. 4. maiora.

Semina. 4. calida maiora. Et totidem mi-

nora. flores cordiales tres.

sunt plantæ multæ, vel earum partes, & quædam mineralia, Quæ cum absolutè scribuntur, ancipitem sæpè eum relinquunt pharmacopœum, quem latet genuina delucidatio; Cuius tenuitati fauentes, dicimus, radicem quinque aperientium nomine, radices apij, asparagi, petroselini, fœniculi, rusci intelligi. Præter quas adhuc aliæ quinque, nempe graminis, rubiæ maioris, ænones, capparis, eryngij multum celebrantur.

Semina frigida quatuor sunt maiora citruli, cucurbitæ, melonum, cucumeris; & quatuor minora, lactucæ, portulacæ, endiuia, cichorij.

Totidem etiam calida, tam maiora, anisi, fœniculi, cimini, carui, quam minora, ameos, amomi, apij, dauci.

Flores cordiales tres tantum perhibentur, violarum, buglossi & boraginis: Qui si tales sunt, maximè quidem, dum recentes sunt adhuc, & colorem, saporemque retinent. Exsiccati enim vt insipidi, & inodori, sic nullius aut imbecillimæ sunt qualitatis.

Idem est iudicium de floribus alijs seruari solitis, quorum odore, sapore, colore pereuntibus, qualitas perit.

Rosas verò quæ cum suauitate, hæc omnia diutissimè retinent, maximè cardiacas puto, vt & flores vniuersos, qui odore gratioso spiritus exhilarant. Flores enim suauiter olentes, non herbarum modo, vt tunicis, lilij conuallij sed etiam arbutorum, arborumve, vt lilacis, arantiorum, tilia, cordiales sunt, possuntque in vsu medicamento fœlicitè vsurpari.

Flores chamæmeli, meliloti, anisi inter cordiales calidos numerantur, sed arantiorum, iasmini, ireos, saluia, anthos veronica cariophyllata, aliosque penè innumeros flores, qui fragrantia ac suauitate nares iucundè feriunt, & mentem recreant præfero.

Capillares herbæ quinque sunt, capillus veneris verus, Monspelienis vulgo dictus, adiantum vulgare, polytrichum, ceterac, seu asplenium, & ruta muraria, nulla ratione, saluia vita dicta. Quibus epithymum & cassuta species possunt annumerari.

Herbæ capillares quinque.

Quatuor emollientes herbę communes sunt, malua, althea, viola nigra, acanthus satiuus, seu brancha vrsina : quibus adhuc alia quatuor adiunguntur, Mercurialis, parietaria, sicla, vulgò beta, & atriplex. Omnium siquidem vsus æquè celebratur in decoctis clysterum & cataplasmatum emollientium parandis.

Emollientes herbę 8 sunt.

Fragmenta pretiosa multa sunt, sed quinque potissimum in vsu medico commendantur: Sapphiri, granati, smaragdi, hyacinthi & sardæ seu cornallinæ.

Fragmenta pretiosa quinque.

Quatuor aquas cordiales plebecula tantum nouit, endiuia scilicet, cichorij, buglossi, borraginis, nec quintam dari censet : Ego verò præter has adhuc octo etiam magis cardiacas puto, cardui nempe benedicti dicti, scabiosæ, calendule, morsus, hoc est, succisæ, oxytriphylly, vlmariæ, acetosæ, nenupharis.

Duodecim aquæ cordiales.

Cerebro quoque roborando quædam aquæ conferunt, cephalicæ propterea dictæ, quæ quaternario numero describuntur, videlicet, aqua betonicæ, melissæ, rosarum & florum arantiorum.

Quatuor aquæ cephalicæ.

Præter ea quatuor in officinis vnguenta calida prostant, Aregonium, Martiatum, Altheæ & Agrippæ. Et totidem frigida, album, rosaceum, populeum & citrinum.

Quatuor vnguenta calida & quatuor frigida.

De Succedaneis.

CAPVT XV.



SUCCEDANEIS rarò, nec nisi quasi coacti medici debet vti, cum scilicet quedam defunt vel incognita, vel non satis probata, vel ita rara, ut haberi, vel ita pretiosa ut emi vix queat; Tunc enim pharmacopœi medicorum consilium sequuti, in eorum quæ deficiunt locum alia subrogare possunt, Ita tamen ut succedanea deficientibus specie, genere, viribus, sint valde similia, & affinia: Debet enim, si fieri possit, simplex medicamentum poni pro simplici, compositum pro composito, vt

planta pro planta,	minerale pro minerali,
radix pro radice,	sal pro sale,
cortex pro cortice,	terra pro terra,
folium pro folio,	lignum pro ligno,
flos pro flore,	femen pro semine,
lapis pro lapide,	liquor pro liquore,
gemma pro gemma,	gummi pro gummi,
metallum pro metallo,	resina pro resina,
animal pro animali,	oleum pro oleo,
pars pro parte.	

Medicamē-
tum com-
positum
facile ad-
mittit sub-
stitutionē.

In compositis quoque seruatur eadem lex, sed non adeo strictè: Solet enim & debet sumi puluis pro puluere, eclegma pro eclegmate, electarium pro electario, syrupus pro syrupo, sæpè tamen est tanta virium affinitas inter composita medicamenta consistentiæ diuersæ, vt facile admittatur substitutio; Si quis enim auersatur eclegma bechicum, ei securè & scèliciter imperabitur syrupus iuiubinus, aut de vngula caballina; & qui catapotia respuerit quidni catharticum aliud forma potus, aut boli, viribus analogum assumiet? Sic nonnunquàm medici solent ægrotis indulgere, quibus solida respuentibus, liquida præscribunt, aut contrà, solida imperant, quibus nauseat ventriculus super liquidorum vsu.

Non semper autem substituitur simplex medicamentum pro simplici, nam cùm vix duo simplicia facultatibus omni ex parte similia reperiantur, sæpè alicuius penuria, cui nullum simile datur, duo aut plura miscentur, quorum concursus illi vires similes exhibet, vel in qualitatibus elementaribus caloris, frigoris, humiditatis, aut siccitatis, vel in secundis, quæ materiæ commodationem sequuntur. Sat enim est, si suppositium medicamentū id efficiat, quod genuinum ac defectiuum pollicebatur. Qui enim eguerit simplici quodam raro & pretioso, secundo gradu calefaciente, aut refrigerante, habueritque duo alia vnum quod tertio gradu, aliud quod primo sit tale, ambo si permiscuerit, vnum quid efficiet, quod pari recessu aut calefaciet, aut refrigerabit, scopo proposito accomodatissimum. Eadem est in attenuantibus, incrassantibus, digerentibus, & alijs permiscendis ratio.

Yris ab iri-
de multum
differt.

Quia verò solum & cælum qualitates simplicium immutant, vt ostendimus suprà, de arbore persica, & de yuca stirpe indica narratur quæ in cōtinenti solo sata salutaris, in insula verò nata noxia, diligenter obseruandum quæ optimè substitui possunt, Nam multū est discriminis inter yridem nostratē & florentinā. Hæc enim cephalica & bechica est, illa phlegmagoga & potenter serum ducendo ventrem subducens. Et quemadmodum vinum Canariæ generosius est Hispanico, & Hispanicum Gallico: sic & racemi è quibus exprimitur, aliam atque aliam sortiuntur qualitatem, saporem nempe & caloris excessum. Proinde licet eiusdem generis & speciei simplicia deligantur, non tamen pari qualitatū recessu suam temperiem nacta sunt omnia, Nam quod in solo calidiore creuit, calidius

Quomodo
gradu ter-
tio aut
quarto ca-
lidum sub-
stituitur
pro minus
calido.

est: quod in frigidiorē, frigidius.

Quando igitur id ipsum quod ratione loci calidius est, præscribitur nec reperitur aliud eiusdem generis substitui potest, licet frigidius modo maiore quantitate sumatur.

Quod enim quarto recessu calidum est: ea potest quantitate summi, vt tertio tantū gradu vel etiam secundo calefaciat. Euphor-

bium, exempli gratia, quod quarto recessu calefacit, si infra quatuor grana detur, tertio tantum gradu calefaciet, atque quò minor illius quantitas dabitur, eò minus calefaciet. Verum cuilibet medicamento est determinata dosi: alioquin posset dari medicamentum tam exigua portio, atque etiam ipsius ignis, ut nec calefaceret nec vreret. Et caryophylli ordine tertio calidi, si minus octo granis dentur, infra tertium gradum calefacient, ut principio, vel medio, vel fine secundi, pro maiore, vel minore illorum quantitate. Et sic de reliquis qualitatibus in singulis gradibus dicendum

Cuiusque autem gradus tres partes, seu mansiones constituuntur, principium, medium & finis, quæ sic inter se habent, ut principium vnius coincidat cum fine alterius, ut principium quarti cum fine tertij: Sic finis hyemis vix veris initio dissimilis

Cuiusque
gradus tres
partes.

Vsitata dosi calidorum in quarto gradu est granorum quatuor, cuius cum sint tres mansiones, summa eorum dosi quæ finem eiusdem gradus attingunt est granorum duodecim: quæ medium, granorum sexdecim: quæ principium, granorum viginti, qualis est eorum dosi quæ in fine tertij ordinis calefaciunt.

Quocirca qui medicamentum aliquod in fine primi gradus calidum, aut frigidum non habebit, aliud quod initio secundi tale erit, poterit substituere: qui medicamento in fine secundi calido indigebit, aliud pro succedaneo, quod calefacit in principio tertij exhibebit.

Compositorum autem doses cum è simplicibus deducendæ sint, pro singulorum deficientium qualitate, alia substituentur ipsis analogæ, in quorum mixtione si dictæ leges seruentur, compositum exurget, optimum deficienti substitutum.

Quæ & quando recte substituantur.

CAPVT. XVI.



E quid igitur nostræ institutioni pharmaceuticæ desit, nec præsidii destituatur eger; cum ad opem illi ferendam, vocatus medicus, nonnulla præscribit, quæ nec in officinis, nec hortis pharmacopolarum inueniuntur, quædam in eorum quæ deficient, locum supponenda, quæ ob id Græci ἀντιβαλόμενα, Latini succedanea & substituta, & myropolæ vulgò, quid-pro-quo nominant.

Quid pro-
quo.

Debent autem substituta viribus esse his similia, quorum defectum suppleant, vicemque gerunt, ut dictum est. Quæ si talia non queant inueniri, ea saltem eligenda veniunt, quæ ab illis non multum dissentiant, sed in pluribus respondeant. Absurdum namque est

Substituta-
quæ mala.

succedanea illa vocare, quæ non succedaneas & symbolas, sed oppositas qualitates fortiuntur. Neque vlla ratione, euphorbium pro agarico, pyrethum pro lapatho, melilotum pro malo cydonio in quibusdam codicibus videtur substitutum. Hæc enim inter se, affinitate nulla consentiunt, ut sanè consentire debent, quæ subrogantur.

At verò cum meliorum penuria, quædam imbecilliora substituantur, horum qualitas quantitate aucta, compensatur, & duplum pondus substituitur: ut contra, succedaneum validius si sit, & efficacius, de eius quantitate detrahatur, ut qualitas minuatur.

Succedanea
sine medici
consilio nō
danda.

Hoc autem fieri neutiquam fas est, absque periti medici consilio, quod tamen permulti non aspernantur modò, sed medicamenta præscribunt ipsi, magna civium internecione, cuius maximè sunt authores nonnulli vafri nebulones, ac importunè dicaculi, qui cōpoto vestitu ægrotis assident, & blando sermone ac fallaci incautos decipiunt. De improbis tantum loquor, qui de corio humano audacter ludentes medicastulos simulant, & iniquè bardos ac imperitum genus fœminarum ludificantur. Sciunt pellaces quid velim, in quos tamē nihil acerbius dicā, cū pauci sint multi verò & pij & prudentes qui nil temerè suscipiunt, & cum de hominum salute agitur, medicos accersunt, quorum consilijs & præceptionibus adiuti affinia, legitimaque antiballomena, in eorum quæ desunt, vel iam exoleuerunt locum, appositè substituunt.

Qui sine delectu & ratione, quævis medicamina, ut quæ manibus sese offerunt priora, pro genuinis & optimis reponit, periculosum medicamentum, quid-pro-quo faceret dictum, dedisse creditur.

De tali Ardelione quidam festinè illud ex Niniuita inculcare solebat, sæpè loco illius quid pono. Noui bibulum pharmacarium qui deficientia non curabat haberi, sicque tutius ægri res ibant, quam si inepta aut incognita, ut multi faciunt, substituisset.

Simplicium autem in eadem compositione pluralitas efficit, ut nonnulla sæpè desint, & succedanea quarantur, idcirco non satis prudenter agunt qui simplicium ferruginem simul miscent, imprudentissimè verò qui vel rarissima, vel exotica, vel incognita, nec valde probata simul congerunt frustra enim sit per plura quod eque bene per pauciora fieri potest. Quid igitur dum arte nulla magnus simplicium cumulatur aceruus? Si tamen medicamenta quædam ex arte composita, usuque longo probata, quibusdam proposito scopo valde conuenientibus deficiunt, alijs quantum fieri potest analogis repleantur, ita tamen ut generis sint eiusdem & speciei, modo qualitatibus oppositis non multum dissideant; nam cum inter aïzoa quod semperuiuum maius dicitur sit frigidissimum, minus verò calidissimum, alterum alterius succedaneum esse non potest, ut neque partes partium semper eorundem simplicium; Nam co-

randri semen salubre medicamentum est, vsualeque plurimum, illius tamen succus perniciosus: & vt draco marinus, viua vulgo dictus, homini dat pubulum salutare, ipsius verò aculeus dorso prominens illi necem adfert, sic multorum animalium quædam partes homini iuuando, aliæ nocendo, genitæ videntur. Hoc satis notum in Theriacæ apparatu, carnem quæ viperarum retinet, abscissis & eiectis duobus extremis, cauda & capite, vt nociuis.

Ne igitur succedenæorum repositione quis error committatur, recentiores Galenum sequuti, simplicia deficientia, aut exoleta ordine alphabeti scribunt, illisque antiballomena, seu simplicia substituenda opponunt: vt quæ incipiunt à littera A primo loco, quæ à littera B. secundo, & ita deinceps scribantur. Ergo substituitur pro

Abfynthio, origanū, vel abrotonum.
 abietina pice, resina pini.
 Abrotono, origanum.
 acacia, hypocistis.
 achantho, malua.
 acoro, calamus aromaticus.
 acetosa, oxytriphylum.
 adianto verò, commune.
 adipe vulpis, adeps mustellæ.
 adipe cerui, adeps capræ.
 agarico, semen carthami.
 aloë, abfynthij succus.
 althea, malua.
 alumine, sal fossilis.
 amygdalis amaris, nuclei persicorum.
 amygdalis dulcibus, auellana.
 ammi, anisum.
 amomo, acorus.
 ammoniaco, propolis.
 amylo, farina filiginis.
 androsamo, hypericum.
 aniso, daucus.
 apio, petro felinum.
 aqua pluuiæ, fontana.
 aqua marina, salita.
 arsenico, sublimatum.
 aristolochia rotunda, longa.
 Balauftio, malicorium.
 balsamo, terebinthina limpida.
 bethonica, verbena.

blito, atriplex.
 berberis, ribes.
 borragine, buglossum.
 bolo armena, sanguis draconis.
 butyro, oleum amygdalinum.
 Cadmia, lapis calaminaris.
 calamo aromatico, schœnātū.
 calamintha, menthastrum.
 calamento, sampfucus.
 chamelæa, thymelæa, velesula.
 chamædry, chamæpithis.
 carpobalsamo, cubebæ aut semen lentis.
 cardamomo, piper longum.
 cassia lignea, cinnamomum crassum.
 cataputia, kerua.
 centaurea, polium.
 cichorio syluestri, hortense.
 cinnabari, minium.
 cinnamomo, canella vulgaris.
 citri succo, succus limonum.
 cornis, forbæ.
 cortice granati, quercus.
 coriandro, fœniculum.
 costo, imperatoria.
 cumino, daucus.
 cypero, enula.
 Dactylis, ficus Massiliensis.
 dauco, pastinaca.
 dente apri, porcinitus.

dictamno,	salvia.
diphryge,	æs vstum.
dorycnio,	mandragora.
draguntio,	arum.
dulci radice,	passulæ.
Ebulo,	sambucus.
elleboro albo,	elaterium.
eleboro nigro;	lapis lazuli.
epithymo,	epithymbrum.
eruca,	erysimum.
eringio,	œnone.
erugine,	squama ferri.
euisco,	radix capparis.
eupatorio,	lichen.
Fænugræco	orobus.
fœniculo,	apium,
felle perdicis,	fel coturnicis.
Felle bouis,	fel tauri.
flore æris,	ærugo.
foliculis fennæ,	duplū foliorū.
folijs myrthi,	bacca eius.
folijs ebuli,	folia samburi.
fu,	elelispacus.
fumaria,	cicerbita.
Galanga,	acorus.
galbano,	sagapenum.
gentiana,	radix tormentillæ.
glycyrrhiza,	passulæ.
Helenio,	yris.
hepatica,	agrimonium.
hyssopo,	satureia.
hypocisti,	acacia.
hyperico,	androsenum.
Iasmini floribus,	anthos.
iride,	enula.
iuiubis,	passulæ.
iunco odorato,	calamus aromaticus.
iussquiamo,	papauer.
Lactuca,	cichorium sativum.
lapatho,	viola nigra.
lacca,	styrax.
laureola,	mezereum.
lepidio,	draba seu Iberis.

leuistico,	semen pastinacæ.
leucopipere,	nigrum piper.
lithargyro,	plumbum vstum.
lini semine,	semen altheæ.
Magnete,	lapis phrygius.
malua;	atriplex.
mandragora,	papauer.
marathro,	radix asparagi.
marrubio,	melissa.
melle,	saccharum.
meliloto,	chamemelum.
minio,	cinnabaris.
molybdena,	lithargyrus.
mumia,	pissaphaltum.
myrtho,	sumach.
Nardo Syriaca	schænanum.
nardo montana,	gallica.
nepetha,	mentastrum.
nasturtio aquatico,	berula.
nuce moschata,	caryophylli.
nymphaea,	lactuca.
Oesypo,	medulla vituli.
oleo,	butyrum.
omphacio,	succus limonum.
opio,	meconium.
opobalsamo,	ol. caryophyllorū
opoponace,	galbanum.
origano,	hyssopus.
oriza,	farina tritici.
oxyacantha,	ribes.
oxalide,	trifolium acetosum.
Papaueris succo,	lactucæ succus.
passulis,	iuiubæ.
peplo,	tithymallus.
petro selino,	apium.
plantagine,	pilosella.
pompholige,	cadmia vsta.
polytrico,	adiantum.
polio,	calamentum.
pulegio reguli,	ceruinum.
phyllitide,	asplenium.
Quercula minore,	chamæpithis.

quinqueneruia ,	plantago.	spica indica,	Syriaca.
quinquefolio ,	fragaria,	Tamarisco,	asplenium.
Raphani semine, semen attri-		tamarindis ,	pruna.
plicis ad vomitum ciendum.		tanaceto,	parthenium.
rhapontico,	rhabarbarum.	taraxaco,	cichorium.
resina,	terebinthina.	terebinthina ,	mastiche.
rosmarino,	maiorana.	thymo,	satureia.
ribes,	berberis.	thymælea ,	chamelæa.
ruta,	tanacetum.	tussilagine,	pulmonaria.
Sagapeno,	resina pini.	Veleriana hortensi, sylvestris.	
salvia,	calamentum.	veronica mare,	fœmina.
sambuco,	ebulus.	venerea concha ,	ostreorum.
satyrio,	erucæ semen.	conchæ.	
santonico,	abrotonum.	veratro albo ,	turpetum.
sapa,	vinum dulce.	viola nigra,	alba.
satureia,	thymus.	vino rubro,	album.
sedo,	solanum.	vino granatorum ,	austerum.
sepię ossibus,	pumex.	vuis passis,	daçtyli.
sapo ceruino ,	caprinum.	Xylocassia,	cinnamomum.
seride,	condrilla.	xylobalsamo ,	furcuti len-
scariola,	cichorium.	tisci.	
scammonio , gutta quod , aut		zinzibere,	piper
gunga vulgo gutta Dei.		zibetho,	moscus.
saxifraga,	pimpinella.	zurumbet,	zedoaria.
spica alba,	lauendula.		

Quiaverò in medicina bis peccare sapè non contingit , diligenter caueant illi barbatuli ac iuniores apothecarij (de ignaris loquor) sine consilio quid piam substituere : Alioqui vt illi ipsi succedanei, vel veriùs spurij sunt, sic spuria medicamenta pro legitimis exhibere & vendere solent. Vt ab ignaris quibusdam audaculis fieri milles obseruaui, qui sine discrimine simplicia quauis in eorum quæ deficiunt locum perperam substituunt.

Potuiſſet in codicillum caput hoc de substitutis exurgere, si quæ ab authoribus scribuntur transcripsissem, verùm hunc laborem neglexi, quia inutilem duxi.

Dē Medicamentis adulteratis.

CAP. XVII.

IMMANIS hominum auaritia cō nequitia multos interdum rapit, vt medicamenta notha & adulterata pro veris & natiuis exhibeant, quorum dignotio magni est in medicina faciendā momenti, & à medicis & pharmacopœis accuratè perdiscenda, vt ægrotis medicamenta tantū optima exhibeant, quibus fœlicitè adiuti, breui conualeſcant, non adulterata, quibus anxie laceſſiti, vel ſtatim periclitentur, vel miſerè diuturno languore pereant.

Illa igitur ſubticuiſſe non viſum eſt, ne parum prudens pharmacopola à præſtigiatoribus & circumforaneis quibuſdam agyrtis decipiatur, qui ſæpè Carthami flores pro croco, & ebur pro monocerotis cornu vendunt, vt & alia multa ſimulant, præſertim rariffima & precioſiſſima, quorum uſus multū expetitur, & ob vires eximias celebratur.

Propterea ne pharmacopœus, penes quem ægrotantis eſt mors & vita, imprudenter ab improbis & cautis inſtitoribus circumuentus, pecuniæ reſarciendæ, aut maioris lucri cauſa ægros circumueniant, his artibus inſtructus impiorum dolos ac fraudes aperiet & vitabit.

Moschi adulterium.

Moschum ſimulat maſſa quædam è ſanguine hædi, pane aſſo, & trito, atque ladano ſubacta, in pyxide, aut alio vaſe, idoneo ſeruata, in quo diu moschus verus aſſeruatus fuerit. Fraus ſubtiliùs occultatur, ſi portio moschi optimi commiſceatur. Sed detegitur non modo conſiſtentia & colore, ſed odore, qui in fictitio citò vaneſcit.

Ambra fingitur puluere Agalloci læuigato benjoin, ſtyrace, calamita, ladano, & paſta auicularum Cypriarum.

Verū peculiariſ ambre natiue halitus facilè ab artificiali diſcernitur: Adde quòd illa longiore manuum attritu moleſcit, hæc potiùs friatur.

Cinnamomum adulteratur corticibus tamaricis in aqua cinnamomi maceratis & poſtea ſiccatis; Sed guſtu facillimè à vero diſtinguitur.

Caryophylli iam vetuſtate in odori fragrantès redduntur, ſi vino maduerint, quod optimos antè caryophyllos ad macerationem admiferit. Verū fugax eſt acquiſitus hic odor, & qui breui perit.

Beluin fraudulentè ſimulatur mixtis ſimul refina, thure maſculo cū pauco ſtyrace. At vt odor valdè diſſimilis, ſic & color qui maculis albidis in ſpurio, vt in vero non eſt variegatus.

Caphuram nonnulli referri putant gummi ſolo iuniperi: Sed uſu diutiori tantū & ignauis ſic malicioſè vaſtri imponunt. Quiſq;

enim vel mediocriter in re medicamentaria versatus primo intuitu fraudem aperit.

Opobalsamum oleo liquidambar representatur dolo parùm fallaci, cùm vtrumque viribus sit affine. Tam astutè autè solet à multis adulterari, vt etiam exercitatissimos fallat.

Balsamoli-
quidambar
affine.

Terra Orientalis Lemnia dicta fingitur bolo, vel etiam argilla vulgari, siccata, puluerata, aqua plantaginis subacta, in pastillos formata, & Turcarum Imperatoris sigillo, cuius multiplex à Belonio character datur, notata. Ast deprehenditur falsitas, si vtraque multa diluatur aqua, quæ post residentiam in Lemnia reperitur pinguior, in spuria tenuior, ac limpidiior.

Bitumen vitiatum pice mista: quod facilè dignoscitur igni dum admouetur: Nam quod picem admisit halitum efflat gratiorem.

Opium adulteratur meconio, seu succo foliorum & caulium papaueris nigri; Sed error innotescit ex pinguitudine, quæ in illo maior, ac ferè resinosa, in hoc minor, vel potiùs nulla.

Manna thuris adulterium admittit facilè, cùm pollen resinæ illà perbellè referat. Ignis autem fraudem detegit.

Tacamahaca gummi, vel potiùs resinæ elemi mixta inexpertis syncera putatur; Vtriusque enim color idem, aut parùm absimilis consistentia affinis, & odor non multùm varius: Altera tamen gratiùs alterà nares ferit.

Tacamaha-
ca.


Sagapenum, galbanum, opoponax, Serapinum, quòd satis vulgaria sint, adulterari non solent. Bdellium quòd rarius, illorum quodam admixto nonnunquam immutatum idiotis venditur.

Sassafras antiquioribus Europeis fuit ignotum, & cùm primùm adferri cepit, magno vendebatur: Ob id adulterio non fuit diu expers. Noui hominem qui puluerem buxi & seminis fœniculi pro sassafras polline vendidit. Sed cùm vbertas natiui postea fuisset aduecta desijt adulterare.

Os è corde bouum pro osse cordis cerui latrunculi quidam vendunt. Sed qui vtrumque norunt, illud multo maius affirmant, hoc prorsus expers eximiæ qualitatis.

Pro tamarindis nonnulli pruna crassiora non malè substituunt: verùm hæc iniquè Tamarindos nominant, cum nucleo, pulpa, sapore, manifestè dissentiant.

Mille possem alia medicamenta & adulterandi modos ex Dioscorid. & aliis antiquis, necnon ex recentioribus recensere, sed reticere melius duco, Cùm mens hominis non tam ad bona, quàm praua, prona sit, & fallendi satis gnara. Hoc obiter adhuc dicam, aquas, liquores, succos & medicamenta composita facilè posse adulterari, simplici ad difficilis, præsertim integra.



INSTITUTIONVM PHARMACEVTICARVM. LIBER QVINTVS.

De Medicaminum formulis, quorum vsus ad morborum
præcautionem vel profligationem celebratur.

Seçtio prima de his est quæ per os sumuntur.

R P Æ F A T I O.



Talimenta quædam rerum diuersarum mixtura
condiuntur, laboriosoque parantur artificio, vt
sine corruptela aut marcore possint diutissimè
conseruari, vt artocrea, Lucanica, farcimina
multa, & panes bis cocti, quibus nauta, dum ve-
lis, ventoque feruntur ad Indos, anno sæpè, &
interdum biennio vesci coguntur: vt & puluis il-
le Turcaram castra sequentium zonis, quibus cinguntur, loculo-
rum instar efformatis, inclusus, quo solo, aqua diluto, & ad pultis
consistentiam cocto, mensem integrum victitant. Alia verò diem
vnum, aut biduum, imò quædam tantum horam sine alteratione
conseruantur. Sic medicamenta multa annum integrum, aut bien-
nium viribus integris durant, vt quæ superius à nobis, in genere tra-
dita, in pharmacopoliis, tanquam in penu ditissimo ad futuros vsus
conseruantur.

Alia verò recens tantum parata optima sunt, vel diem, aut bi-
duum, vel ad summum triduum, æstate, sine virium iactura perdu-
rant, vt ea medicamenta, quæ in rem præsentem parantur, curandis
ægrotis exhibenda, de quibus ordine, hoc postremo libro disputa-
re, nunc nostrum est consiliu; Initio ab his sumpto, quæ intra corpus su-
muntur, vel per os vel alia loca conferentia, vt nares, sedem, vterum,
vesicam: Quæ non solum pro varietate morbi & naturæ variè com-
ponuntur, sed etiam partis affectæ: Cui vt commodè adhibeantur,
vel inhæreant, vel vt ad eam facilius deferantur, aliam, atque aliam
consistentiam nanciscuntur, vel liquidam, vt quæ bibuntur, vel iniici-
untur, aut solidam, vel mediam, quæ sumuntur, deuorantur, induntur, ad-
hibentur. Quæ omnia vt sigillatim persequamur, à potulentis auspi-

Miles Tur-
ca fert in
ona victu
nenstru-
am.

ibri huius
dispositio.

Cap. 4.
et 5. l.
de The-
riar. ad
pisen.

cabimur, dein alia medicamenta solidiora in libri huius sectione prima describemus. In secunda quæ in anum, aut vterum induuntur, iniiciuntur ve lectione speciali subiungemus; In tertia verò eorum medicamentorum descriptionem dabimus, quæ tantum externis corporis partibus adhibentur.

De solemnibus quibusdam decoctionibus longo vsu celebratis.

CAPVT I.



IMPLICITVM medicamentorum substantia non raro per se datur, vt aliquando succus, & sepiissime decoctio, quæ vt facilius vtiliusque assumatur, fieri solet in aqua simplici, aut stillatitia, vel aliquo humore conuenienti pro medici intentione & exigentia rei. Is verò liquor in quo fit decoctio per os su-

Decoctio
potulentorum ex val-
de in gratis
non parat-
da

menda, de ea enim tantum loquimur, qualitatē nec valde insuauem nec violentam debet habere. Potulenta siquidem decoctione in succo absynthij, centaurij minoris, sorbarum immaturarum, vel in lixiuio, aut aceto parare, nec tutum, nec gratum esset: quæ verò exterius adhibentur, vt vnguenta quædam, cataplasmata, fots, ad quorum preparationem decoctione est opus, humore quouis idoneo decoqui possunt, amaro, acerbo, salso, ac etiam oleo, si ita curandi morbi, & partis sanandæ conditio postularit.

Nunc autem de ea specialiori agimus decoctione, quæ colata, per os assumitur, vel sola, vel aliis mista simul dissolutis. Cuiusmodi est decoctio communis medicine, & decoctio pectoralis, quibus vix bonus therapeuticus carere potest.

Quarum
decoctionum
frequens
usus.

Est verò omnis decoctio levis, aut valida, aut mediocris, pro rerum coquendarum substantia & viribus. Quædam enim leuiter tantum decoquenda, vt quæ facultatem habent imbecillam, facileque dissipabilem, & substantiam raram; Alia validiorem decoctionem sustinent, quorum scilicet substantia firma est, crassa, densaque, & virtus non facile resoluitur; Alia mediocrem, quæ substantia & viribus, inter dicta media sunt, vt fructus, qui nec tam leuiter, vt flores, nec tam validè, vt radices decoquuntur.

Quæ parum
& multum
decoquen-
da.

Cum verò absolutè imperatur decoctio sine speciali liquoris designatione, semper ea fieri debet in aqua, vel pura & simplici, vt fontana, aut fluuiatili, & aliquando pluuiæ, cuius quantitas simplicium decoquendorum quantitati respondeat, ita vt nec multum exuperet aut deficiat. Nam cum per decoctionem simplicia vires suas in aquam deponant, si hæc valde copiosa fuerit, & illa pauciora, decoctio tandem colata vires habebit imbecilliores: Vt contrà, si in aqua pauca decoquantur multa simplicia, illius cita fiet exhalatio, dissipatioque, horum potius vstio, quam elixatio, quæ à calore

Aquæ quantitas inde-
coctis par-
randis.

moderato fit in humido, naturæ, & quantitati rei coquendæ proportionato.

Quæ longissimam decoctionem sustinent, copiosiore aquam postulant; quæ breuiorem, minorem. Multam quoque quæ multa sunt, itaut hæc in aquam demersa, ab ea duos digitos, aut tres, si duriora sint, & coctu difficilia, superentur. Sicque certa aquæ mensura vix potest definiri, & industriæ pharmacopæi sapiùs relinquitur,

Aquæ quantitas pro dosi paranda.

Cum vna dosi tantum paranda decoctio proponitur, sat est, pauca quædam simplicia in libra dimidia igne lento, ad partis mediæ dispositionem elixare; Si pro duabus, in libra integra; Si pro quatuor, in duabus. Hocque pacto sensim, vt aquæ, sic simplicium quantitas agenda.

Tres decoctiones valde vsuales.

Tres porro decoctiones in medicina facienda valde sunt vsuales, Prima dicitur communis, quæ communiter, ad dissoluenda purgantia, & interdum incoquenda folia sennæ, aut alia quædam tantum infundenda vsurpatur.

Secunda vulgò dicitur pectoralis, quòd omnibus constet, quæ partes ad pectus attinentes iuuant. Tertia est decoctio clysteris, de qua postea suo loco.

Singularum autem descriptiones apud omnes eadem non sunt, quisque pro suo arbitrio quicquam adiiciens, aut detrahens. Vulgaris & maxime vsualis decoctio communis hæc est.

Decoctio communis medicinæ.

℞. hordei mundat. p. j. prunorum dulc. nu. vj. passul. glycyrrhizæ rasæ an. ʒ β. anisi, & fœnicul. añ. ʒ ij. hyeme: Æstate vero, sem. quatuor frigid. maior. an. ʒ ij. flor. trium cord. an. p. j. si. decoctio in lib. ij. aquæ, ad partis mediæ consumptionem. Colata hæc decoctio satis esse potest, pro dosibus quatuor mediocribus, vel tribus tantum maiusculis.

Decoctio pectoralis, cuius frequens est vsus in affectibus pectoris variè quoque præscribitur sed quam Rondeletius restituerat sic non ineptè Bauderonius emendauit.

Decoctio pectoralis.

℞. hordei integr. p. j. caricarum, iuiubar. an. nu. vj. dactylos num. vj. passul. glycyrrh. an. ʒ β. hyssopi mediocriter siccæ m. s bull. in lib. ij. aquæ pluuiæ aut fontanæ ad dimidias

Sunt qui sebesten pro iuiubis substituunt, alij hyssopi quantitatem augment, alij capillares & flores cordiales adiiciunt, sed cum satis pectoralis sit eorum vis, quæ in præscripta formula continentur, eam pluribus onerare nihil videtur necesse, cum præsertim difficilius parentur, assumanturque ea, quæ pluribus, quam quæ paucioribus simplicibus medicamentis constant.



DOSIS vocatur illa medicamento cōueniens ac certa quantitas quæ vna vice, ac iterum, si sit opus ægroto præscribitur, vel potius datur: *Dosis* enim datio est, cuius tot sunt varietates, quot medicamentorum, & corporum, quibus offerantur, naturæ & diuersæ proprietates. Alia enim dosis est liquidorum; Alia solidorum; Alia mediam consistentiam habentium, Dosi quoque varia dantur cathartica, quæ semel corpus ingressa, si validiora sint, aut maiore copia exhibita, superfluos humores non solum exagitant, sed etiam laudabiles, & viscera laceffendo, facultates illis inhærentes lædunt. Item & alia medicamentorum dosis pueris datur, alia adultioribus, vt & prouectioribus ætate & senibus alia, pro singulorum natura, consuetudine & viribus. Liquidorum dosis vnciis mensuratur, daturque. Solidorum nonnunquam granis; sæpiùs dragmis, & interdum vnciis.

Dosis medicamento-
rum varia.

Alterantia medicamenta raro vncia sola, nisi pueris dantur, aut qualitates eximias habuerint ac validissimas, cuiusmodi est, aqua vitæ, cinnamomi, & ea quæ imperialis vulgò dicitur.

Alterantiũ
medicame-
torum do-
sis.

Vsitatior dosis vnciarum est trium, aut quatuor. Quæ maiore copia exhibentur, nauseam sæpè mouent, ventriculum subuertunt, ac sine prospero successu foras per os excluduntur.

Roborantia quoque potissimum liquida, dantur ab vncia vna ad vncias tres aut quatuor. Solida aliquandò granis, vt puluis monocerotis; Aliquando scriptulis, dragmisque dantur, vt cardiacæ confectiones, & antidota multa.

Roboran-
tium dosis.

Eodem modo mensurantur, danturque purgantia, quorum nonnulla dantur à granis tribus ad sex aut octo, vt diacrydion; Et forsan stibium, quod licet efferum sit ac immite, arte tamen castigatum atque domitum, & à prudente medico exhibitum, sæpè fœlices producit effectus: Eiusque vsus ad contumacis morbi curationem, cum meliora desunt, non videtur omninò respuendus.

Si enim fas est, ex serpentum carne, imò ex eorum senecta & recrementis, in hominis subsidium remedia mendicare, vix nefas esse potest, ex illis medicamentis solatium expectare, quæ recentiorum sedulitas inuenit, industriosa dexteritas secura reddidit, multa experientia probauit, licet illa veteres minus norint, aut neglexerint, vel indebitè dederint: vt nunc verpæ multi ac benefici circulatores, qui suo stibio malè parato, & improba dosi, nec quibus, nec quando conuenit exhibito, penè innumeros interficiunt.

Neoterico-
rum in in-
ueniēdis re-
mediis se-
dulitas.

Et vt ad propositum redeam quædam cathartica, tantum parua dosi, vt granis paucis dantur, alia scrupulis, vt colocynthis & veratrum; Alia dragmis, vt rheum; Alia vnciis, vt manna, cassia, Tamariindi.

Quam va-
ria cathar-
ticorum
dosis.

Dosis igitur medicamenti quantitatem idoneam, vna vice exhibendam denuntiat, vt cùm forma potus, pharmacum quoddam ex vncijs, vt plurimum, tribus aut quatuor, decocti, vel aquæ stillati-
tiæ paratur, In quo, vel roborantia, vt pulueres, antidota, & con-
fectiones cardiacas aliquando diluimus, vel cathartica, infundimus,
vt agaricum; vel dissoluimus, vt catholiconem aut diacarthamum;
quorum etiam sua dosis est particularis, qua singula maiore aut mi-
nore copia dantur, pro cuiusque viribus imbecillis aut validioribus.
Hæc verò singula pro cuiusque medicamenti & corporis natura
velle complecti, integram curandi methodum amplecti est.

De potione purgatoria. CAPVT III.

Catharti-
cum liqui-
dum citius
ducit.



MEDICAMENTORVM genus omne forma qua-
uis dari potest, sed sanando morbo & iuuandæ parti
non semper idonea. Vsitatior cuiusque forma li-
quida est, eorum præsertim quæ meatus obstru-
ctione liberant; vasa diducunt & menses, atque
vrinam mouent. Maximè verò quæ vim habent
purgatoriam, forma potabili sunt conuenientiora. Sic enim prom-
tiùs sese diffundunt, subeuntque venas exiles, & humores partibus
inhærentes efficacius deducunt. Sola siquidem dragma solidioris
medicamenti humore quodam diluta, non minus aluum turbare so-
let; quam eiusdem integri, duplum pondus. Vnde cùm medicamen-
tum purgans absolutè dicitur, de portione solutiua semper intelli-
gitur; Cuius dosis raro tres vncias excedere debet, ne ventriculum
proritando, vomitu statim excludatur.

Sunt autem variæ potionum purgantium differentiæ, pro varia
humorum ducendorum & medicamentorum natura, Nam singuli
humores proprio cathartico ducuntur, sanguinem, si exceperis, qui
sola venæ, aut arteriæ sectione vacuatur. Quod bilem purgat, cho-
lagogum dicitur, Melanagogum, quod melancholicum succum,
phlegmagogum, quod pituitam.

Ex his verò singulis tam simplicibus, quàm compositis, liquore
idoneo maceratis, infusis, vel solutis, aut coctis, purgatoriæ potiones
parantur, vt ad bilis educationem, hoc modo.

Chalago-
gon.

℞. radic. chicor. oxalid. glycyrrhizę an. ʒij. endiuix, fumar. agrimon.
an. m. ss. flor. trium cordial. an. p. j. fi. decoct. in parua quantitate aquę
in aqua, infund. rhabarb. ʒij. ss. santal. citr. ʒss. in express. dissol. syrup.
violat. ʒ. vj. fi. potio.

Cùm validius purgandum est, augenda rhei quantitas, aut poten-
tiora præscribantur medicamenta, vt.

℞. diapr. solut. vel electuar. de succo ros. ʒijj. Dissol. in ʒijj. de-
coctionis supra descriptæ, vel aquæ endiuix, adde syrup. de ci-
chor.

chor. composit. cum rhabarb. \mathfrak{z} j. fi. potus.

Ad purgandum humorem pituitosum, vt ad biliosum, multa dantur tam simplicia, quàm composita medicamenta: Ex quibus pauca quedam, pro multorum exemplo, forma potus sic optimè præscribuntur.

\mathcal{L} . polypod. quern. graminis, passul. an. \mathfrak{z} iij. sem. cartham. \mathfrak{z} ij. chamædr. chamæpith. betonic. an. m. β . anil. \mathfrak{z} j. fi. decoct. In qua decoque lento igne folior. sennæ \mathfrak{z} ij. β . in colatura infunde agaric. \mathfrak{z} j. β . macis \mathfrak{z} β . in express. dissolue syrup. rosar. pallid. \mathfrak{z} j. fi. potio. Phlegmogon.

In simili decocto colato possunt dilui electarij diachartami \mathfrak{z} iij, vel \mathfrak{z} β . & syrupi rosar. pallid. \mathfrak{z} j. vt fi. potus.

Senna quoque, rheum, & polypodium pituitam vacuant, vt & turpethum, semen carthami, colocynthis, mezereon, veratrum album, semen & radix ebuli, benedicta laxatiua, diaphœnicum: Ex quibus artifex peritus varias potiones purgatorias parare potest.

Sua quoque sunt melancholico humori ducendo destinata cathartica, vt epithymum, lapis lazuli, senna, elleborus niger: & inter cõposita confectio Hamech, catholicum, diasenna. Syrupus regis Saboris. Ex quorum vno aut altero in conuenienti liquore soluto, aut infuso, aut cocto purgans medicamentum, potabili forma confici potest, hoc modo. Melancholiam quæ ducant.

\mathcal{L} . cortic. radic. cappar. tamarisc. radic. bugloss. glycyrrhizæ, passul. corinthiacar. an. \mathfrak{z} iij. hordei integr. \mathfrak{z} β . ceterac. adianti, politric. calendu. borrag, an. m. β . flor. trium cord. an. p. j. fi. decoctio in qua infunde & coque folior. sennæ \mathfrak{z} β . sem. fœnicul. dulc. \mathfrak{z} j. in colatura dissolue Syrupi regis Saboris \mathfrak{z} j. fi. potus. Melanagon optimum.

Item. \mathcal{L} . glycyrrh. passul. mundat. an. \mathfrak{z} iij iuiubar. n. vj. epithymi, scolopendrij summitatum lupuli, oxalidis, fumarizæ añ. m. s. flor. genistæ p. ij. fi. decoctio, in qua dissolue confectionis Hamech. \mathfrak{z} j. β . diasennæ \mathfrak{z} ij. syrupi violar. \mathfrak{z} vj aut \mathfrak{z} j. fi. potus.

Vtiliter quoque catholicum ad melancholiam ducendam imperatur. Cùm enim polychrestum sit, & quosuis humores noxios clementer purget, facile his sese accommodat, quibus permiscetur: vt additum rheo bilem purgat: dilutum decocto sennæ, aut commixtum confectioni hamech, melancholicum succum. Catholicum polychrestum est.

De Iulepis. CAPVT IIII.



VLEPI & syrupi vix est dissimilis apud Arabes acceptio, qui de vtroque simul ac confusè hisdem capitibus loquuntur: Et per iulep absolutè positum, zuccharum aqua rosata dissolutum, & in modum syrupi coctum intelligunt. Nos autem distinctius loquentes, de ambobus diuersis capitibus & libris scribimus; de syrupis nempe, longiore

re coctione inspissatis, in officina, de iulepis verò nunc assumendis, & leuius coctis, in hoc libro de remediorum formulis.

Iulep quid.

Est autem iulep nomen Persicum potionem dulcè significans, quam Græci ζελαπών nominant, parantque ex aquis quibuscumque stillatitiis, dulcoratis, vt syrupis ex succis, vel decoctis simplicium, cum saccharo aut melle ad crassiorem substantiam elixatis.

Syrupus simplex.

Ad fugiendam odoris & saporis insuauitatem, Serapio ex aqua sola & saccharo iulep, vel potius hydrosaccharum conficit, quod syrupum simplicem vocat. Auicenna maioris suauitatis gratia tertiam rosaceæ partem adiicit. Mesue non tantum ex aquis iulepos conficit sed etiam ex succis, infusionibus & decoctis. Et vulgus potiones quaslibet limpidissimas & saccharatas, non tantum ex aquis destillatis, sed etiam ex pauciorum simplicium, nec insuauium, & aquæ multæ decoctione colata, clarificata & dulcorata paratas, iulepos vocat; Cuiusmodi est iulepus zizyphorum, vel veriùs syrupus. Cum enim fiat ex iuiubis maiusculis numero centum, & aquæ fontis libris quatuor ad medias coctis, cum libra vna sacchari, consistentiã habet zulapio crassiorem, sæpeque vtendi tempore aqua simplici, cocta, aut prisana diluitur, cum ex se iulepi satis sint diluti. Improprièque syrupus ille, qui ab Alexandria, vbi frequens est eius vsus, nomen habet, iulepus rosatus nominatur, cum æquè, ac reliqui syrupi, coctione inspissetur, & asseruetur.

Syrupus Alexandrinus.

Zulepus rosatus qui fiat.

Fit vere ex aqua rosarum cum dimidio saccharo cocta prope ad crassitiem syrupi, aut multo minus, si mox sit assumendus, vt vulgares iulepi, qui in rem præsentem fiunt ex saccharo, vel syrupo quodam cum aqua tripla: vt

Syrupus rosaceus R ondeletij.

℞. Aquæ endiuia ℥ iij. syrupi limonum ℥ j. fi. zulapium. Siciulepi consistentiam habent liquidiorē, vt colari possint: Sed qui diutius concoquuntur, vel duplam tantum aquam ad saccharum recipiunt, vt rosaceus R ondeletij, vel vtriusque æquale pondus, vt Syluio placuit, ob crassitiem pigre defluunt, vixque colo traiciuntur.

Pro diuersa igitur coctione & quantitate aquæ ad saccharum fit, vel syrupus, ex vtriusque scilicet partibus æquis, vel iulepus, ex aqua tantum tripla ad saccharum, vt leubertus voluit.

Paratu cū sint facillima eiusmodi zupia, vnius tantū aut alterius formulam subducam.

℞. A quarum fumariz & oxalidis an. ℥ij. sacchari ℥j. coque lento igne ad vnius vncie resolutionem, si iulep. pro vna dosi. Dosis iulepi.

Ad somnum conciliandum iulep. hypnoticum sic recte parabitur.

℞. Aquæ nenupharis ℥ij. aquæ betonicæ & syrupi de papauere simplicis an. ℥j. misc. si iulep. hora somni sumendum.

De Destillatis restauratiuis. CAP. V.



MANIA medicamenta analeptica, quæ scilicet habitum corporis, longo vel morbo, vel inedia absumptum reficiunt, & instaurantia, quæ ad virium languore quodam effætarum, resarciendum robur, imperantur, non tantū ex medicamentosa, sed etiam alimentosa materia sumuntur. Cū enim partim alant corpus, partim affectibus, à quibus malè habet, medeantur, multiplici, ac varia qualitate esse prædita, ratio manifesta suadet.

Dicuntur autem destillata, quod per alembicum guttatim in vas subiectum destillent; Instaurantia verò quod ex carnibus euchymis, conseruis, pulueribus cardiacis, atque his omnibus, quæ vel odore vel substantia, spiritus instaurare, & partes nobiles roborare valent, extrahuntur. Destillata cur dicta.

Multiporò maiorum consuetudinem vix probant, qui carnem caponum, aut perdicum crudam, ab ossibus & pinguedine purgatam destillat, adiectis pulueribus & conseruis. Cū enim caro cruda non nisi longo tempore possit concoqui; facultas verò puluerum sit citò & facile dissipabilis, non iusta ratione, simul cruda & dura pulueribus dictis commiscentur: tum quia ex carne cruda quæ primum stillat aqua citius corrumpitur. Æquius videntur agere, qui carnes ex dimidio coctas cum proprio succo, in vase destillatorio, cū reliquis materialibus permiscent.

Neque eorum iudicium probatur, qui cathenas aureas cum carnibus decoquunt, cū nihil ex ipsis dissoluatur, aut extrahatur præter sordes, quæ ex contrectantium manibus impuris contrahuntur. Cathenas aurearum decoctio non utilis.

Laudabilior est eorum consuetudo, qui panniculos auri coniungunt, vt solent Parisienses pharmacopœi, qui nullis sumptibus parcunt, vt sua probè destillata restauratiua, vt & reliquas compositiones conficiant.

Sic verò ista solemnis & eximia destillatio parabitur optimè.

℞. Iuris vnius caponis & duarum perdicum lib. ii. aquarum bu-glossi, oxalidis & nenupharis an. q. j. conseruæ violarum, cichorij,

Destillatum restauratiuum. optimum.

& rosarum an. ℥ii. pulueris diamargariti frigidi, electarij triasantali & diarhodonis abbat. an. ℥i. trochiscorum de caphura ℥ii. foliorum auri nu. xii. ponantur omnia in alembico vitreo pasta rectè obturato, & per balneum Mariæ fiat destillatio, vt artis est.

Aliud val-
de cardia-
cum.

Destillatum aliud ad febres syncopales & malignas imperari potest hoc modo descriptum.

℥. aquarum oxalidis, vlmariæ, cardui, cichorij, an. ℥iiii. decoctionis caponis vnius agrestis alterati lib. j. conferuæ nenupharis & rosarum an, ℥i. theriacæ ℥ß. radicum angelicæ, tormentillæ pulueratarum an. ℥ii. dictamni ℥i. sem. cardui benedicti & citriorum an. ℥ii. florum saluiæ & arantiorum an. p.iii. ponantur omnia in vase vitreo, bene obturato, quòd in lebetem aqua feruida plenum postea immittatur, & si. destilatio.

Vsus tempore destillati huius portioni addi poterit succus quidam idoneus, vt citri, vel granatorum cum paucò saccharo communi, vel rosato, si ita efflagitarit ægrotus.

De gallinacci decrepiti iure.

C A P. V I.



N medicina facienda eò res ægrorum sæpè deueniunt, vt non solum alterantia sed roborantia, neque hæc aut illa tantùm vel coniunctim, vel seorsim postulent, sed & alimenta medicamentosa, quæ simul corpus alendo & morbos oppugnando sanitatem adferant. Idcirco non absre erit post iuleporum & destillatorum restaurantium doctrinam, de præsiidiis quibusdam analepticiis, quorum vsus suauis, salutaris, & facilis etiam infantibus ipsis est, pauca quædam propalare. Incipiam autem à decocto gallinacci veteris veteribus olim vsitatissimo, & nunc recentiorum incuria ferè neglecto, vt medicum denuò redeat in vsu: Græci siquidem & post eos Arabes magni fecerunt annosi galli cum sale diutissimè cocti iusculum non tantum alendo corpori, sed ventri ducendo, hisque conuenit inquit Gal. quibus attenuans victus imperatur, nec non pituita & melancholia redundantibus: vtrumque enim humorem multa quantitate sumptum sine molestia purgat. Mirū autem est in gallinaceo & gallina contrarias inesse facultates, nam huius caro aluum compescit, illius contrà mouet ac ducit. Et quod mirandum magis, in illo contrarietas agnoscitur, vt ex Gal. lib. 3. simpl. med. & experientia patet nam gallosum veterum ius inquit, ventrem soluit, tamen si caro eundem sistere potest.

lib. de
atten.
vict.

cap. 14.
Paul.
cap. 3.
lib. 7.

Diffimilior autem multo est contrarietas illa quę in brassica præsertim rubra inuenitur, cuius primum decoctum ventrem subducit, posterius, seu diutinum retinet seu strictiorem efficit. Nihil verò tam verè contrarietate seu qualitates oppositas eodem apparere subiecto demonstrat, atque draco marinus, cuius caro suavis & sanus est cibus, aculeus vero dorso prominens certus hominis interitus.

Brassica rubra.

Draco marinus viua vulgo dicta.

Oribas c. 3. lib. Porro Gallinacei iusculum pigrè admodum mouet, nisi is cum multo sale ac diu coquatur. Nitrosa namque facultas qua luxuriat, aduentu salis intenditur, & humores proritati celerius per secessum excluduntur.

24. Multis autem modis paratur, sed qui sequitur est medicatior & vſitatior. Polypodium & semen carthami contusa gallinacei implumis & exenterati ventre concluduntur, & cum sale & radicibus petroselini fit coctio ad putrilaginem. Colatura datur magna mensura mane ieiuno stomacho. Admixtorum autem ea debet esse proportio, vt non insuauissimè capiatur. Salis quidem multum aucthores probant, sed nimium natura improbat.

preparatio :

Nonnulli hordeo mundato gallinaceum infarciunt, alij passulis Corinthiacis, quidam addunt epithymum, alij alia pro scopo proposito & fine.

Partim alit puriore succo, partim medetur nitroso, dum ventrem proritando, pituitam & melancholicum succum elicit & excludit.

Vires.

De carniū Syntherimatis, seu iusculis tortiniis.

CAPVT VII.



ARNIVM euchimarum ad putrilaginem coctarum ius colatum, vel expressum Synterima & σντηριμα, vulgò colatitium & consomatum dici solet; quod sæpè medici præscribunt vel longo morbo confectis, vel alio breuiore sed vehemētiore macilentis, & his omnibus qui ob ventriculi infirmitatem firmiores ac solidiores cibos non appetunt aut conficere non queunt. Datur quoque ditioribus à morbo conualescentibus, tabidis, & his omnibus quos breui reficere consilium est. Mulieres opulentæ & macræ agrè cum ferant flaccidas mammas tabidum pectus & e carne iugulum, quotidie mane & aliquādo noctu Synterimata, seu tortiua iura liberali manu sumunt, vt citiùs pinguescant, & viris placeant magis.

Consummat.

Fiunt porrò tortiua iura, seu colatitia, non ex gallinaceis annosis, qui sane parum nutriunt, sed ex caponibus mediæ ætatis, perdibus, armis vitulinis ac arietinis & pluribus alijs carnibus, modo euchymis, ita simul in aqua coctis, vt tabescant. Postea brodium

Preparatio Tortiua iura quibus fiant.

mundo mantili colatur; Eodem elixæ carnes excipiuntur, ac exprimuntur, vt totus alibilis succus transmeet; qui idoneo vase receptus, vbi refrigeratur, instar gelatina coit, ac condensatur, tūmq̃ pinguedo supereminens adimitur. Inter coquendum vel saltem vsus tempore parum salis additur.

Adduntur sæpè & simul coquuntur olera quædam, vt borrago, buglossum, oxalis, lactuca, portulaca, lapathum & similia. Quæ quod fuscum aut nigricans iusculum efficiant, multi relinquunt. Cichorium hortense & candicans præferentes, quod nec ingrato sapore afficit, nec colore inficit.

Eiusmodi colatitia iura macilentis omnibus conducunt: Alunt namque plurimū, absumptas carnes reparāt, & totū habitū reficiūt.

Aqua carnis. Aliud expressum ius iubeo sæpè parari pro macie confectis & languidis hoc modo carnes vitulinæ, caponis perdicis aut phasiani vel similium in frustula secantur, & abiecta pinguedine, vrna figulina includuntur, qui linteo desuper operata in balneo, vel cacabo, aqua feruente ad medium pleno reponitur, & ita adaptatur, vt pars vrnæ superna feruentem aquam & cacabum superemineat. Atque ita 4. aut 5. horas, vel tamdiu bulliat, quousque succus alibilis totus à carne cocta eliciatur, qui à colore aqueo, & consistentia admodum tenui aqua carnis vocitatur. Paucam aquam nonnulli sectis carnibus adiiciunt, alij reiiciunt; Attamen sic & sic, hi & illi rectè agunt. Qui cum sectis carnibus elixandis in nummos aureos includunt, nec valdè profunt, nec profunt.

Vires.

Aqua carnis modo educta dicto, reficiendis corporibus, omnibus alijs præstat iusculis.

Ius spatulæ veruecinæ. Similem suppeditat alimoniam armi veruecini, vel caponis assorum ius præli compressu ductum & extractum. Quod parua quantitate multum nutrit, hora quauis exhibetur, deperditam plenitudinem refarcit, & vires auget, eque autem alunt ius spatulæ veruecinæ, & pressum caponis, sic enim vocitantur, sed hoc temperatius illud verò paulò calidius creditur.

Pressum caponis.

Albus cibus.

Albus cibus, vulgò dictus, plurimum quoque pabuli subministrat, sed quod diutius in ventriculo stabuletur, antequam descendat, cum si sit imbecillior, magis grauatur, nisi minore copia sumatur, familiaris est senum diuitum cibus. Parari sic à multis consuevit.

Apparatus.

Caro caponis vnus coct. præfertur alba, vt esse solet ea, quæ inter alas & crura, antica partē continetur, sumenda, & abiecta pinguitudine, in frustula secanda, diutissimè terenda, per setaceum transmittenda, colatitio iuri carniū succi laudabilis commiscenda, modicum orizæ tritæ aut micæ panis albi exsiccata & puluerata adiiciendum, nec non parum salis, sacchari verò plus aut minus, pro assumpturi palato, aut delicijs; Atque tota mixtura idoneo vase fictili, aut argenteo concipienda, & simul igne moderato co-

quenda in pulmenti consistentiam ; quam vbi refrixerit, duriusculam nanciscitur. Non solum datur recens paratum, & adhuc calens sed refrigeratum, Et quauis hora, & prima aut vltima mensa, vel simplex vel simul cum alijs cibis.

Lac capræ.

Quibus res domestica partior est lac, caprinum aut vaccinum dabitur, si ocyus, vberius, & facilius nutriri ac pinguescere sit mens: multum si quidem alit, nec vllum faceffit naturæ negotium, vt in nutrica tumabeat, cum sit veluti sanguis dealbatus, facileque in sanguinem redeat.

De Gelatina. CAP. VIII.



VM vitanda sint edulia, quæ non esurientem edere rogant, & quasi cogunt, vt sapiens philosophus promulgauit, heluonum, aut liguritorum palato indulgentes nouos ac voluptuosos ciborum apparatus inueniunt, è Repub. bene instituta, politicisque moribus splendida procul ablegandi. Illi tamen venia imo gloria digni sunt, qui vt morborum insultum, aut periculum eludant, & ægrum vel tabidum, vel exanguem ad pristinam, aut optabiliorem, si fieri queat, incolumitatis statum reducant, nouas, modo salutiferas, eduliorum, potulentorumque præparaciones comminiscuntur.

Hippocratis & Galeni temporibus Alica & ptisanæ cremor seu succus erant ferè selectiora morbosorum pabula, at nunc vtriusque vicem subeunt panatella & hordeatum. Alica quidem copiosa nutrit, sed crassarum cum sit partium, obstructions parit, parumque palato grata est. Fiebat namque Galeni tempore ex quodam tritico & aqua cum mulso, aut vino dulci simul coctis, & aliquando cum oleo, sale & aceto.

Cremor ptisanæ.

Alice.

Panatella gratior est, & copiosius alit, nec ita humores impingit, fit ex mica panis resiccata & subtilissimè puluerata, ac debita coctione cum iusculo carniū in pultem redacta. Pro carniū iure sæpè lac sumitur, vtrumque enim plurimum alit.

Panatella.

Hordeatum quomodo fiat, etiam mulierculæ norunt: Sumunt namque hordeum mundatum, in aqua coquunt horas. 5. aut 6. & saccharum permiscunt ad placitum. Simul & deterget, & copiosum exhibet alimentum. Amygdalatum non item, sed auidius sumitur, & facilius ac citius paratur, Ex amygdalis nempe decorticatis & tritis. in aqua & saccharo ad modum coctis, sed hæc tam vulgaria, vt tantum sicco pede percurrenda.

Hordeatum.

Amygdalatum.

Gelatina conuinalis.

Gelatina quoque vulgarissima, vt quæ in conuiujs lautis apponatur, & in ægrotantium diæta celebretur. Vt verò dissimili modo vsurpetur, sic paratur, Nam conuiujs ea tantum arridet, quæ cum

albo vino satis copiosè & vberioribus aromatis paratur. Aëgris verò quæ sine his aut paucioribus, eius talis apparatus optimus censetur.

℥ Armum vitulinum, & caponem vnum; excipiantur olla fictili noua, & coquantur simul in aqua, cum octaua parte vini albi donec carnes faciliè disgregantur ac in frusta diuidantur: Innatans pinguedo auferatur; addetur tertia sacchari pars, aut plus, minusve pro assumpturi delitijs aut desiderio: superijciatur parum croci triti, atque in omphacio modico diluti, Tū denuo tota mixtura ad ignem ponatur; albuminibus ouorum clarificetur; parum cinnamomi misceatur; Tandem per manicam Hippocratis semel aut bis traijciatur. Sæpè pedes vituli pro poplite aut spatula eiusdem cum gallina aut capone ponuntur, quod minus probo. Efficiunt namque vitulini pedes, vt gelatina citiùs coaguletur, sed non tam laudabile alimentum præstat.

Vires.

Gelatina
cornu cerui.

Vix datur aliquis æger, cui Gelatina non conducatur, sed alijs plus vt macilentis, alijs minus, vt obesis, & acuta febre laborantibus. Maximè verò confert, his alendis, qui tussi premuntur, vel alijs affectibus, qui malè thoracem & spirabiles partes exercent.

Medicata quæque fit Gelatina quædam ex tenellis & adhuc villosis ceruorum cornibus quæ circa finem veris erumpunt, aut etiam proluxa nonnunquam assurgunt. Assumitur enim ex his quod tenerius est, in frustula diuiditur, in aqua calida maceratur, atque debito tēpore elixatur. Tum percolato iuri sacchari tertia pars aut paulo plus, vt magis coeat & sapiat, additur, cū pauco cinnamomo in succo citri diluto. Tandem ex arte coquitur, colatur & seruat. Medicatior est præcedente sed minus alibili. Confert palmo, lypothimiæ, virium languori a causa interna intus latente & morbis omnibus

Alia galatina.

malignis.
Ex cornu quoque cerui vetusto & iam pridem resiccato, in scobem redacto, infuso, ac diu manerato Gelatinam fieri ars docet, & experientia monstrat, additis nempe addēdis vt saccharo copiosiore, vel si placet exiguo tragacantho, aut simili glutinante, quod illius concretionem iuuat, facultates habet præcedenti similes, sed ignauiores aut minus efficaces.



OELIX quidem Germania, vt obiter dicam, quæ simul viros percelebres gignit, & cunctis opibus luxuriat: vt tamen arbor frugifera simul, cum pomis fragrantibus fungos vel inutiles, vel venenatos aliquando profert. Sic illa fecunda tellus duo naturæ monstra peperit, heresiarcham Lutherum, qui sa-

cras paginas fœdissimis erroribus labefactare tentauit, & pseudo-
 medicum Paracelsum, qui suæ medicinæ diabolum authorem professus est, atque characteres & verba, medicinas demonum nominauit, vt syrupos & apozemata hominum. Sanctiūs hæc, vt & reliqua medicamenta Philosophus antiquus deorum manus auxiliatrices nuncupauit, vt quæ diuinis ac mirandis viribus prædita corpus humanum, vel morbidum sanent, vel salubre tueantur. Ob eam rationem Heraclitus inter philosophos non incelebris, sacrificia solebat medicamenta vocare, quoniam pharmaci præpotentis instar, animam, vt medicamenta corpus, à suis morbis expurgant.

Characteres sunt
 medicinæ
 demonum
 Paracello.

Hera-
 philus.

Celius
 Rho-
 dig. ca.
 2. lib.

12.

Verè autem dixit nebulo, & forsàn semel, apozemata esse hominum medicamenta, quibus scilicet peccantium humorum qualitas contemperatur, mille cruciatus sedantur, mortis ante diem ferociētis impetus eluditur, symptomatum acerbitas lenitur, partes ad natiuam bonitatem & vigorem reducuntur. Parantur enim ex omni genere medicamentorum, præsertim alterantium & roborantium: Quibus interdum simplicia quædam purgantia ac benigna, atque exigua quantitate infunduntur: Vocare enim apozema, decoctum quoddam nigricans, valde ingratum, & multa senna laxatiuum, cui crassioris cuiusdam electarij, vt catholici, vel lenitiui sesqui vncia dissoluta fuerit, absurdum est: nam ἀποζέμα Græcis, decoctum est, à verbo ἀποζέω feruefacio, decoquo, & apozema tantum pro herbarum tenuiore decocto vsurpatur.

Apoze ma-
 tum esse-
 ctus.

Est vero omnis apozematum materia à plantis, ex quarum aquis fiunt iulepi, decoctis apozemata & syrapi: inter quæ precipua hæc differentia constituitur, vt iulepi tenues sint, syrapi crassi, apozemata, vtcunque media; omnia melle aut saccharo, vel vtroque simul dulcorata, & pro varia cuiusque consistentia, magis aut minùs cocta.

Apozema-
 tum mate-
 ria.

Olim veteres aquam mulsam cui plantarum folia quædam inco-
 xerint, apozematum vice utebantur, vt multi adhuc hodie iusculis virentium stirpium mixtura alteratis. Equè enim in brodio pulli per elixationem relinquitur herbarum vis, atque in aqua simplici; & minore sumptu, auidiùsque eiusmodi alterantia iuscula sumuntur, quam apozemata. Potest tamen æger his & illis vti, & à coquo,

Veterum
 apozemata.

qui nil præter leberem & veru nouit, iuscula herbis idoneis, medici concilio, alterata repetere; A pharmacopœo verò apozemata, iustaratione, industriosoque artificio parata: non quidem ad alendū, vt iuscula, sed calfaciendum, refrigerandum, humectandum, siccandum, aperiendum, aut alio quouis modo immutandum. Propterea radices, aut aliæ platarum partes sæpius amare, aut alia qualitate insuaues modò viles aliquando sumuntur, purgantur, & in aqua sufficienti coquuntur: Atque ex iusculo colato, saccharo aut melle dulcorato, & santalis aut cinnamomo, si ita videtur, aromatizato, apozema ad plures aut pauciores, pro decocti quantitate doses, paratur.

Quomodo
apozemata
differà sy-
rupis.

Neque verò æstate tantū, dum adhuc stirpes virent, sed etiam hyeme, cum desunt, aut aridæ tantū suppetunt, apozemata conficiuntur, licet per id temporis, syruporum sit frequentior vsus, qui ab apozematis non differunt, nisi coctione, quæ in syrupis longior est ad maiorem crassitiem & custodiam, in apozematis, breuior: itaut syrupus vicem apozematis gerat hyeme, apozema syrupi, æstate: videturque eadem res, nomina diuersa: Sed in syrupis maior quantitas sacchari requiritur, vt huius & decoctionis æquale pondus: in apozematis varium, vt tertia aut quarta tantū pars sacchari, vel mellis ad decoctum. Sat enim est singulis huius libris, quadrans, hoc est vncias tres sacchari, vel syrupi, vel ad summum triēs, seu vncias quatuor permiscere: Cum tamen liquoris sapor valde est ingratus, sacchari pondus solet augeri, & cum ouorum albuminibus apozema paratum despumari, & à sordibus expurgari.

Porro apozemata variè fieri solent, ad varias intentiones, vt ad liberandas obstructions, hoc modo.

Apozema
aperitiuum.

℞. rad. asparag. rusci, graminis, cichor. glycyrrhizæ, passul. mundatar. an. ʒ. β. adianti, polytric, agrimonij, pimpinellæ, summitatū lupuli, arthemisiæ an. m. β. summitatum hyssopi p. ij. florum trium cord. an. p. j. fi. decoct. in lib. ij. β. aquæ ad medias. in colatura dissolue syrupi capilli veneris, aut sacchari ʒ. iij. fi. apozema clarum, pro quatuor dosibus.

Ad bilis feruorem contemperandum aliud sic parabitur.

℞. radic. cichor. oxalidis, lapari acuti an. ʒ. β. glycyrrhizæ, passul. corinthiac. an. ʒ. iij. endiuia, scariol. taraxaci, oxyrriphylli, fumariæ, lactucæ, portulacæ an. m. j. florum ros. alb. recentium m. s. vel florum trium cordial. an. p. j. fi. decoct. in sufficienti quantitate aquæ. In colatura dissol. syrupi de succo acetosæ, aut limonum, vel sacchari rosati ʒ. iij. fi. apozema clarum aromatizatum santali citrinj ʒ. β. pro quatuor dosibus.

De Gargarismatis. CAP. X.

cap. 23.
lib. 5.

D oris, gingiuarum, palati, pharyngisque vitia gargarismata instituuntur, quæ vim habent, inquit Celsus, vel leuandi vel reprimendi, vel euocandi. Leuant lac, & cremor hordei: Reprimit aqua, in qua vel lenticula vel rosa, vel rubus, vel coroneum malû, vel palmula decocta sint. Euocant synapi, piper &

cap. 6.
lib. 3.
method-
med.

acria similia; Quibus tamen gargarizationes non fiunt, nisi dulcibus quibusdam admixtis, Actuatio iudice, ne gustum plurimum offendant.

Nam cum liquor haustus ad gurgulionem vsque reuocetur, totum oris concavum eluit, & mordacius, dum acrior est, organa gustatoria ferit. Proinde acria, quibus gargarizatus fiunt, hydromelite misceri solent, vel aqua simplici, cui syrupus vel de stœchade, vel de rosis siccis, aut alius, qui propositæ rei conueniat, ea quantitate dissoluitur, vt acria, vel amara, multum de sua qualitate ingrata deponant: vt cum è cerebro & faucibus est elicienda pituita, gargarisma sic ritè parabitur.

℞. Radicis pyrethri ℥ij. rad. cyperi, turpeti, an. ℥ij. enul. campan. ℥ss. summitatum origani, hyssopi, saluix an. m. j. fi. decoct. in lib. j. ss. ad consumptionem tertiæ partis. In colat. dilue oxymelit. ℥ij. fi. gargarisma. vel sic.

Gargarisma ad educendam è cerebro pituitam.

℞. Glycyrrhizæ, sem. carthami an. ℥ss. baccarum lauri, staphysagrie an. ℥ij. synapi, macropiper an. ℥ij. galang. ʒj. stœchad. betonic. an. m. ss. fi. decoctio in hydromelite. Colatura sit pro gargarizatu.

Ad roborandum & detergendum collutiones oris multæ fieri solent, vt quæ sequuntur.

℞. Foliorum pruni, summitatum rubi, plantaginis, pilosellæ, rosarum an. m. j. balaustiorum, summitatum myrthi. an. m. ss. hordei, berberis an. ℥ss. fi. decoctio in lib. ij. aquæ ad medias: Colaturæ adde syrupi rosar. siccar. & sapæ an. ℥ij. fi. gargarisma.

Gargarisma roborans & detergens.

Ad vlcera pharyngis venerea, & reliquarum oris partium, hæc confert gargarizatio.

℞. Scobis ligni sancti ʒj. sarsaparillæ, sassafras an. ℥ss. lentisci ℥ij. fi. decoctio in lib. ii. aquæ ad tertiæ partis absorptionem, addendo sub finem glycyrrhizæ ʒvi. rosar m. ss. florum saluix & anthos. an. p. j. Colatura detur ad oris collutionem sapissimè iterandam.

Vtendum gargarismatis quouis tempore, præcipuè que matutino, & subinde inter pastus; atque his quidem recenter paratis: diutius enim seruata corrumpentur, & ore excepta, eius concavo partes contentas læderent, non sanarent.

De Emulsionibus. CAP. XI.

Emulsi-
o-
num vsus
multus.



Vitiorum morbus vnus multis ac diuersis forma medica-
mentis aliquando curatur, sic vnicum medicamen-
tum morbos sæpè diuersos curat, vt Emulsio, iunio-
ribus dicta, quæ ad vsus multos institui potest: Plu-
rimum enim confert ad pectoris, pulmonumque
vitia lenienda, somnum conciliandum, immoderatum calorem re-
frigerandum, acrimoniam vrinæ contemperandam, & renum ar-
dorem extinguendum. Proindè videntur illi falli qui gonorrhœæ
virulentæ curationi emulsiones tantùm inseruire putant; In multis
namque apozematum vicem gerunt & hordeatorum, cùm ex con-
tulis seminibus fiant, quæ vim habent refrigerandi, leniendi, vrinam
mouendi, interdumque somnum conciliandi; quibus inter conte-
rendum, vel ptissana superfunditur, vel decoctio simplicium, quæ
viribus polleant, institutioni propositæ conferentibus; vt cùm ad
faucium aspredinem contunduntur amygdalæ mundatæ, & strobili
cum decocto iuiubarum & passularum; ad viscerum æstus semina
frigida, cum decocto lactucarum & florum nenupharis; ad vrinæ
acrimoniam, eadem cùm decoctione radicum vel seminis altheæ,
glycyrrhizæ & ficuum.

Pro quantitate seminum contusorum decocti quantitas augetur
vel minuitur, nec emulsio crassior sit, aut liquidior, & velut media
inter apozema & syrupum, cuiusmodi sunt amygdalata dilutiora,
quæ colore & sapore, non multùm ab emulsionibus differunt: ferè
tamen sunt spissiora, vt hordeata amygdalatis, & syrupi hordeatis,
eclegmata syrupis, electuaria eclegmatis.

His verò formulis emulsiones optimè describuntur, vt ad pectoris
& pulmonis vitia.

℞. Amygdalar. dulc. mundatar. ℥j pinearum non rancidarum ℥ss.
seminum citrull. cucurbit. melonum, bombacis an. ℥iij. pistentur in
mortario lapideo cum lib. j. decoctionis iuiubar. & passular. sensim
affusa, & sacchari ℥iij. fi. emulsio ad quatuor doses.

Ad renum ardorem extinguendum & acrimoniam vrinæ demul-
cendam, ex vsu erit aptissimo, sic emulsio parata.

Emulsio ad renum ar-
dorem. ℞. Sem. quatuor frigid. maior. an. ℥ss. sem. lactucæ & papauer. alb.
an. ℥ij. pistentur in mortario marmoreo cum libra vna aquæ sim-
plicis, vel ptissanæ, adde syrupi de nymphæa ℥iij, fi. emulsio ad
tres doses.

Ad gonorrhœam virulentam, præmissis vniuersalibus remedijs,
hec conuenienter imperabitur emulsio.

℞. Lentis palustris, sem. lactucæ an. ℥ij. sem. portulac. & plâtag. an

3j. sem. quatuor frigid. maior. an. 3 ℥. pistentur in mortario lapideo cum lib. j. ℥. aque coctæ; adde sacchari rosati 3iij. si. emulsio pro quinque aut sex dosibus, sumendis, horis duabus ante pastus.

De amygdalatis CAPVT XII.



AMYGDALÆ vel amaræ sunt & prorsus medicamē-
tosa, vel dulces, quæ partim alimentosa sunt, par-
tim etiam medicamentosa. Ex his potus quidam pa-
ratur instar lactis albidus, qui febrientibus & thora-
cis affectibus lacescit solet exhiberi. Licet enim a-
mygdalæ moderatè calidæ sint ex Paulo Aegin. &

*Lib. 7. de re-
med.
Cap. 2.
lib. 2.
synop-
seos.* Oribasio, vel potius temperatè, trita tamen & aqua dilutæ feruo-
rem contemperant, & vi quadam incidendi & attenuandi viscera,
thoracemque expurgant. Ex earum autem cremore sorbitiuncula
paratur, quæ simul & nutrit & asperam arteriam lenit, & humores
in thorace contentos proiectu faciles reddit. Sic verò paratur,
℥. amygdalarum mundatarum 3ii. terantur in mortario cum a-
quæ elixatæ paulatim affusæ lib. ℥. adde sacchari 3vi. misce, & coque
parum. Detur.

Amygdala-
tum quo-
modo pa-
randum.

*Aetn.
cap. 7.
de spi-
rit. ani-
mal.
nut.* Nonnulli grana duo aut paulò plus salis commiscent, alij res-
puunt. Datur quauis hora, maximè his, qui iuscula, & alia edulia
auerfantur, sed sæpius datur hora Somni tuncque parum seminis pa-
paueris albi, aut lactucarum adijci solet, maximè cum ægroto præ-
scribitur, qui vigiliis assiduus malè exercetur. Nonnulli terunt amyg-
dalas cum aqua tepida, & addito pauco saccharo potionem parant
ignis vim non expertam, talemque porrigunt. Præstat cum aqua pa-
rum feruefacta terere, & rursus parum elixare iuxta modum descri-
ptum & consuetum. Solet augeri vel minui sacchari quantitas pro
affectus conditione. Nam ut dulcia bechica sunt, & vitiis pulmo-
num & thoracis convenientissima: sic amygdalatum multo saccha-
ro dulcoratum ipsis sunt convenientiora; febrientibus magis con-
uenit, si sacchari receperit minus.

Lutetiæ familiaris est iste dulciarius potus, quem & ipsæ mulier-
culæ quotidie parant, nec formula communi medici præscribunt,
sed pharmacopœorum relinquentes arbitrio solùm imperant, ut
paretur amygdalatum. Quibus magis arridet crassius, siue ad alimo-
niam, siue ad gratiam, maior amygdalarum & sacchari quantitas
adiicienda: quibus liquidius, horum minus, aquæ verò multum
commiscetur.

Amygdala-
ra Lutetiæ
vitatissima

De ptissana antiquorum, seu hordeato.

C A P. XIII.



PTISSANA vulgaris & officinarum potus est, ex glycyrrhiza, aqua, & paucis hordeo, & sæpè sine ipso confectus: Antiquorum vero ptissina cibus est, ex hordeo selecto, & pinsendo exteriori cortice purgato, & aqua confectus: Hinc ptissanæ nomen

ἀπό τῆς πίσσης, hoc est, pinsere, & decorticare sum- cap. 2.

Hordeati
præparatio.

ptum. Debet verò sumi, Galeni consilio, hordeum carnosum, nullius adscititiæ qualitatis particeps, non nimis recens, nec nimis ve-

lib. de
ptissana

tustum nec corrugatum: Ita selectum in aqua maceratur: dein in mortario tunditur, vt exterior cortex & quodque glumosum excutatur: Tum manibus confricatur, abluatur, à furfure purgatur: Postea siccatur & seruatur. Cùm autem vsus postulat, eius portio cum aquæ optimæ & probatissimæ partibus duodecim igni lento diutissimè coquitur, vt quam amplissimè intumescat, flatum omnem deponat, & in succum læuem, continuum, æqualem & lubricum abeat Sic suam veteres ptissanam primùm coquebant, & ægrotis exhibebant: Eorum tamen nonnulli sapam, aut mel, aut amyllum, vel cuminum, Alij parum olei, aceti & salis permiscebant. Nos verò forsan deliciores nihil istorum addimus, sed tantùm saccharum, & aliquot interdum amygdalas. Atque vt antiquam mixturam non retinemus, sic neque nomen, & hordeatum non improprie vocamus, quod Hippocrates & Galenus ptissanam proprie vocant, quæ sic Lutetiæ parari consuevit.

Antiquorum
ptissana.

Hordeatum
optimum.

℥. hordei electi, à corticibus purgati, ℥ii. coquantur lento igne in aqua limpidissima, quæ vbi parum efferbuerit, proijciatur & affundatur alia. Tum coquantur denuò per quatuor horas, aut quinque, igni blando; dein colo transmittantur: Colaturæ adde sacchari ℥vi. aut ℥i. postea rursus parùm coque: Sic enim hordeatum habebis crassius & magis nutritorum. In Italia non solet recoqui post colaturam, tuncque liquidius est, & auidius à multis sumitur ægrotis, sed minùs nutrit, propterea non tantùm semel in die circa horam somni datur, sed bis, & sæpè ter, zulapiorum ritu.

Cō. ad

part. 30

lib. I. de

vi&u&.

cur. .

16. l. I.

de alim.

lib. I. de

alim.

l. I. de

vi&u&.

acut.

ca. 237.

li. de

simpl.

med.

Hordei
qualitas.

Cùm autem hordeum frigidum sit ex Galeno, nam quocunque modo paraueris, nunquam calefacit, ptissana ex his duobus parata more Hippocratis, febricitantibus optimum est & medicamentum & alimentum: Nutrit enim & medetur, & nutriendo vicem præstat potus & cibi, ac similiter operatur, vt alicæ vel orizæ succus, vt narrat Galenus passim; multus namque est in recensendis laudibus ptissanæ præsertim hordeaceæ, quæ citò & benè nutrit (nam aliarum rerum dantur ptissanæ, quæ minùs, vt constat ex com. 4. l. I. apho-

ris.) quæque bonus est cibus, & optimum sanguinem gignit, & omni noxa vacat, & competit naturis biliosis, & acutis morbis, & alijs multis remissioribus, & à pituita natis. Detergit namque non sordem corporis solum sed humorem quoque in ventre pituitosum expurgat. De ipsius dotibus plura scribit Gal. lib. de ptissana. li. de cibis boni & mali succi. Comment. in lib, Hip. de victu acut. & alijs multis locis.

Recentiores ergo ex antiquorum ptissana esculenta, ceu alimentaria, potulentam & sitis sedatiuam fecerunt; quam denuò vendaces quidam pharmacopœoli nimis nummis inhiantes, pauca Sen-
 na laxatiuam efficiunt, eamque pro saccato raro & pretioso, his qui volunt decipi, magno vendunt.

Quinam
ptisanam
laxatiuam
venditant.

Assumunt verò foliorum oriental. mundat. zii. Infundunt per diem integrum in lib. iij, cum paucissimo coryandro, aut fœniculo dulci: dein parum calefaciunt, & per manicam aut linteum bis aut ter traiciunt.

Ptissana la-
xatiua
quid.

Quidam parum radicis cichorij coquunt in aqua ante sennæ macerationem; nonnulli cum senna santalum citrinū, aut cinnamomum exigua quantitate adiiciunt. Si quæ sanè sit ars, maximè pharmacaria ea est, quæ facile astu & mangonio fallere potest. Alchymia verò falsa imponendo, fallendo, furando nulli cedit.

De Boucheto vulgari. CAPVT XIV.



NON semper ægrotis omnibus, vt nec sanis, idem potus suauis; nam abstemios & hydropotas multos vidi, qui tam à vino abherrerent, vt ne ipsius odorem libenter se passuros affirmarent; alios contra ita merobibas & Baccho deditos, vt eum præ cæteris dijs colerent. Quamque gentem adhuc quotidie videmus suo ac peculiari delectari potu, nec non cibo, vt Anglos cereuisa & zitho. Normanos pomacio, apud quos tam generosum hoc potionis genus paratur & bibitur, vt bonitate vinum optimum æquet, salubritate superet. Fatentur qui gustarunt, & experiri sunt. Sanitatem enim non tantum incolumem tuetur, sed affectus melancholicos atque alios quam multos oppugnando segniùs ad senium ducit & æuum producit, vix enim vlllo in loco homines vlli ita longæui, atque vbi frequens pomacij potus.

Anglorum
potus.

Pomacij fa-
cultates.

De sanitate verò potiùs resarcienda, quam tuenda hic agens, aio ægrotantes in potulētis multum inter se discrepare: Alij nāque petunt aquam tātum simplicem, ac crudam, seu fontanam, aut cisterninam, vel fluuiatilem pro vario singulorum appetitu: Alij coctam
 malunt: nonnulli ptissanam, bibuli vinum, quidam hydromel, alij
 potum diuinum, vt vocat Aëtius, id est, aquam simplicem, ceu

Potus diui-
nus quid.

crudam, ceu elixam in qua taleolæ seu rotulæ quædam citri non decorticati maduerint.

Bouchetū
quibus fiat.

Permuli quæque hydrosaccharum, bouchetum vulgò dictum expostulant; quod fit ex aqua & 8. aut 10. parte sacchari, cum modico cinnamomi. Alij plus, alij minùs vtriufque & sacchari & cinnamomi commiscent pro singulorum palato.

Hydrosac-
charum
quomodo
fit.

Vt meliùs fiat, aqua debet priùs aliquod tempus elixari, dein saccharum adiici & parum coqui, postea cinnamomum & mox ab igne auferri, Tum per manicam hippocratis traici. Sic enim bouchetum fit pergratum febricitantibus saluberrimum.

Secūda de-
coctio.

Aliud potionis genus magis compositum & ingratum sic nunc audio vocari, quo ad recuperandam sanitatem vtuntur Indica lue detenti, à quibus secunda decoctio nuncupatur; fitque ex guaiaci, sarsaparillæ, & similium sudorificorum antè semel infusorum magmate, cui aqua copiosior superaddita est denuo cocta & saccharo, vel passulis aut glycyrrhizâ dulcorata, qua sese intus abluere solent miselli quos venus momordit.

Bouchetū
rusticorū.

In maritimis quibusdam locis, in quibus mel copiosum habetur, ex fauorum lotura, sapore mellis saturata, vt decet cocta & colata, in quam fermenti parum iniectum est, pergratum fit quoddam hydromel, quod rustici bouchetum nominant.

De lohoch, seu Eclegmatis in rem præsentem imperandis.

CAPVT XV.



DE Eclegmatis in genere egimus fusissimè, nunc de his quæ ex tempore parata solent ægrotis exhiberi, nec diu sine alteratione queunt asseruari: Altero siquidem aut tertio die tanta fermentatione exurgūt, vt vix in pyxidibus possint arcere, nisi rudicula, aut bacillo glycyrrhizæ, vt mos est, subinde agitentur:

Eclegma-
rum vsus.

Sic enim saccharum liquori accuratiùs permiscetur, & mixtura faciliùs subsidit, ac securiùs cohibetur. Præscribuntur autem lohoch ad varios effectus, pro varia medicamentorum, quibus constant materia & qualitate, quæ cùm dulcis est ac palato gratiosa, asperam arteriam lenit, humores concoquit, sputum mouet, educit: si dulcoacida, pituitam lentam & crassam incidit, attenuat, præparat; si dulcoamara, deterget, coquit, expurgat. Quia tamen amaror propter insuauitatem valdè gustui displicet, amara vix nisi parua quantitate veniunt in eclegmatum confecturam. Solis enim dulcibus fere componuntur, vt succo glycyrrhizæ, iuiubis, pineis, saccharo rosato, aut cando, penidiis, electario diaireos, aut diatragacantho, aut confectiōibus aliis similibus, pulueratis, & melle aut syrupo

po idoneo, & interdum vtroque simul exceptis & subactis.

Ad crassos humores incidendos & attenuandos conferet lohoch hac arte paratum.

℞. electarij diayreos simplicis ℥i. sacchari candi ℥ β. anisi condi- Lohoch in-
ti ℥ij. syrupi de hyssopo & oxymelitis simplicis an. ℥j. β. fiat loho- cidens.
ch, cuius frequens sit vsus manè ieiuno stomacho, & inter pa-
stus.

Ad humorum coctionem & expectorationem, aptissimus erit eclegmatis sequentis iteratus sæpè vsus.

℞. diatragacanthi frigid. ℥ vj. diayris Salomonis, Alphenici an. Lohoch
℥ β. cum syrup. de glycyrrhiza aut capill. vener. q. suff. fiat lohoch. conco-

Ad compescendum catharri in pulmones irruentis impetum, sic præscribatur eclegma.

℞. penidiarum, diatragacanthi frigid. an. ℥ β. sacchari rosati ℥ vj. Lohoch
terræ lemnis ℥ ij. cum syrupo de papauere albo vel iulepo rosato, catharum
fiat linctus. sistens.

Item ad fluxiones erodentes, & vitia pulmonum sananda, vel saltem ad meliorem statum reducenda.

℞. manus Christi perlatę ℥j. terræ sigillatę, pulu. diatragacanthi
an. ℥j. coralli rub. ℥ β. lapidis hēmāthit. ℥ j. cum syrupo resumpti-
uo si. lohoch.

De Apophlegmatismis. CAP. XVI.



VLTIPlici remediorum genere caput humore excrementitio, maximèque pituitoso grauatum depletur, sed nullum hoc præstare sine reliquarum partium molestia cernitur. Portiones enim phlegmago-
gæ, vel catapotia dum è cerebro pituitam eliciunt, importunè ventriculum & associata membra lanci-
nant, aliumque turbando dolores sæpè mouent acerbos, nec raro cordis morsus & lipothymiam excitant. Apophlegmatismi verò sa-
pore non ita ingrato, leniter totum oris concavum ferientes, per Apophleg-
emissaria palati, copiosam pituitam è cerebro attrahunt, quæ sen- matismo-
sim postea frequenti sputatione facilè excluditur. Sunt autem om- rum utili-
nia simplicia quibus parantur apophlegmatismi calidæ & sæpè acris tas.
facultatis per quam non solum humorem frigidum attenuant, inci-
dunt, attrahuntque, sed etiam facultatem expultricem ad opus suū
stimulant.

Per palatum hæc pituitam facile proliciunt masticata aut gargari- Materia a-
zata mastiche, saluia, staphisagria, thymus, pulegium, carthamus, pophleg-
piper, synapi, pyrethrum, zinziber, acorus, radix ireos & cyperi: ex matico-
quibus nonnulla, vel in partes minutas concisa mastificantur atque rum.
dentibus atteruntur, vel puluerata liquore idoneo excipiuntur, & in

globulos seu trochiscos confinguntur, vel tenui linteo obuoluta in nodulos efformantur, vel elixantur, & colata decoctio in ore, instar gargarismatis continetur.

Vsitatio forma solida est, vt diutius in ore detineatur, & subinde masticetur, vnde apophlegmatismus pro masticatorio, & contra masticatorium pro apophlegmatismo vsurpatur. Caput autem inter masticandum inclinandum est, & labra diducenda, vt attractus & congestus humor liberius ac citius effluat.

Multæ huiusce remedii formulæ parari possunt, quas hîc recensere lectori forsan esset molestum, cum vna aut altera tantum illius animum explere valeat, vt.

℞. staphysagriæ ʒ iij. mastiches ʒ ij. cubebar. ʒ j. pyrethriz ʒ. fiat omnium puluis qui excipiat succo vel syrupo rosar. pallidar. fiat pastilli manfiles, vel sic:

℞. radi. cireos ʒ ij. piperis longi, synapi, pyrethri, agarici an. ʒj. staphysagriæ ʒ ij. ʒ. terantur omnia, excipiantur melle, & fingantur globuli, linteo raro inuoluendi, qui vsus tempore in ore contineantur.

De bolo purgatorio. CAPVT. XVII.



Bolus
quid.

VI vomituriunt, & dilutas purgationes aspernantur, nec catapotia propter insuauitatem, aut cœli squalores admittunt, medicamento egent, inter potum & pilulas, consistentia medio, quod bolum, iam pridem vsitatus mos nominare consuevit. Sic enim dicitur, quod frustatim, seu per morsellos, vt loquuntur barbari, sumatur, itaut bolus sit medicamenti cuiusdam purgantis, opiata consistentiæ frustulum, ingestioni aptum, cuius crassitudo ea sit, quæ integra deuorari facile possit. Eam nonnulli latinorum buccam vocant

Paratur ex omni purgantium genere, his solum exceptis, quæ vel propter insuauitatem fastidium mouent, horroremque excitant, vel malignitatem castigari, nec in propria substantia dari debent.

Nonnunquam ad efferam purgantium vim corrigendam, vel gratiam odoris, saporisve conciliandam, vel partium quarumdam robur augendum, alterantia, & aromatica permiscuntur, sed parua quantitate, ne boli moles nimis intumescat, quod ægroti plurimum auersantur: Multi enim ad primum medicamenti cuiusque solidi frustulum rigent, ad secundum stomachantur, ad tertium desipiunt.

Modus conficiendi bolum simplicissimus est, vt qui ex cassia ferè sola, & sæpè paretur. Est enim velus basis reliquorum medicamentorum in bolis, vt aloë in pilulis. Per æstus cœli feruidiores, eiusmodi bolus, vt frequens, sic aptus & salutaris esse solet.

℞. pulpæ cassiæ orientalis cannæ pingui recens extractæ ʒj. ʒ.

Delicati
purgantia
auersantur.

pulueris fantali citrini ℥ j. misce. fiat bol. cum saccharo, vel syrupo violato, ex cochleari, paulò ante iusculum sumendus. vel sic.

Bolus ec-
coproticus
& reſige-
rans.

℞. medullæ cassiæ optimæ recenter mundatæ ℥ vi. pulpæ tamarindorum pinguium ℥ ss. electarii lenitiui ℥ ii. fiat bolus. Sumatur cum syrupo capilli veneris.

Sæpè solet cassiæ rhabbarum, aut aliquid ex diagrediatis adiungi, vt ad bilis educationem, hoc modo.

℞. Medullæ cassiæ orientalis recens mundatæ ℥ i. Diapruni solutini ℥ ii. puluer. glycyrrhizæ ℥ i. fiat bolus cum saccharo, vel syrupo cichorii sumendus.

Quia verò cassia flatu excitando sæpè dolores in aluo parit, quorum molestia leues animi defectus delicatulis interdum contingūt, eius quantitas vel minor esse debet, vel ad eorum vaporem quæ flatu discutiunt extrahi, vel ex his nonnihil permisceri, vt,

℞. Pulpæ cassiæ fistulæ ad vaporem decoctionis anisi extractæ ℥ vi. electarij de succo rosar. ℥ ij. rhabbari optimi ℥ ss. cum saccharo fi. bolus.

Si defuerit cassia, nec deerit tamen boli conficiendi modus & vsus cum ex pulpa prunorum, tamarindorum, passularum, & electuarijs multis facillè queat parari. Ex his enim & alijs pluribus medicamentis purgantibus, tam simplicibus, quàm compositis fiunt opiata laxatiuæ quæ forma boli ieiuno ventre sumuntur.

Boli nō sē-
per cassiam
habēt pro-
basi.

De Opiatis. CAPVT. XVIII.

e. 13. l. 3.



VIDE de Opiatis in genere sentiendum, abundè supra disseruimus, nec bis de re eadem idem dicere, cum non videatur æquum, particulares quarundem Opiatarum formulas, tantum hic paucis describam, quarum paradigmate, quasuis alias cōficere non erit arduum.

Non solum autem Opiata ad conciliandum somnum imperantur (ab opio enim appellationem habent suam) sed ad purgandum, roborandum, & alio modo quouis immutandum, vt electaria liquida in quorum censu iure numerantur, cum eandem consistentiam habeant, & compositionis rationem.

Fiunt enim ex pulueribus syrupo aut melle, & aliquando sapa exceptis, & accuratè pistillo simul subactis, quibus conferuæ quædam, aut aliæ confecturæ cordiales aut cephalicæ permisceri solent, vt ad roborandum cor, & facultatis vitalis integritatem tutius conseruandam & exhilarandam. Pro ditioribus Opiata rectè parabitur in hunc modum.

Materia o-
piatarum.

℞. Conferuæ florum bugloss. & borraginis an. ℥ iij. conferuæ flor. calendulæ, corticis citri conditi an. ℥ i. ss. confectionis Alkermes & de hyacintho an. ℥ i. puluer. electarii de gemmis,

Opiata
multum
cordialis.

de gemmis, diamargarit. frigid & lœtitiæ Galenian ℥j. lapidis bezahardici & cornu monocerotis an. ℥ l. cum ℥ij. syrupi de conseruatione myrobalanorum, vel limonum. fiat Opiata.

Qui minùs valent opibus, hanc sibi parandam curabunt.

℞. Conseruæ rosarum ℥j conseruæ rad. enulæ campanæ. ʒß. boli orientalis in aqua vlmariæ vt cardui lotæ ʒß. cum syrupo acetoso, fiat opiata.

Opiata cephalica.

Roborando cerebro, & sopitis facultatibus animalibus recreandis formula sequens valde conferet.

R. Conseruæ bethonicę ʒ vj. conseruę rosarum ℥ß. confectionis Alkermes ℥iiij. pulueris electarii dianthos ℥ij. specierum electarij diamargarit. frigid. dianisi, diamoschi an ℥j. cum syrup. de stœchade q. suff. fiat opiata.

Languenti ventriculo ob frigiditatem, vel humiditatem, & cœtricis facultatibus imbecillitatem, prospero successu imperabitur opiata hoc modo concinnata.

Opiata stomachica.

℞ Conseruæ veteris rosarum ʒß. conseruæ anthos ʒij, nucis moschatę conditę ʒj. pulueris aromatici rosati ℥ij. puluer. diacinnamomi ℥j. diambraę ʒß. syrupi de menta, vel iulepi rosati quantum sufficit. fi. opiata, cuius ʒj, detur manè ieiuno stomacho, & in fine singulorum pastuum.

De conditis. CAPVT XIX.

Materia conditorũ.



De earum partium quæ principatum in naturæ œconomia tenent, mixtura quædam inuenta est, opiatis suauior, quam recentiores conditum vocarunt.

Paratur ex conseruis, pulueribus cardiacis & saccharo, quantitate multum inter se dispari mixtis. Granulatum enim vt fiat, plus additur conseruæ, quam in opiatis, minus pulueris & sacchari plurimum, soletque conspergi foliis auri conditura, tum ad oculorum gratiam, tum ad virium præstantiam. Conficitur namque ex omni genere cardiacorum, modo gustui non ingratorum. Cum enim eius vsus frequens esse debeat, quibus imperatur, vt macilentis, languidis, & his qui ex longo morbo conualescere incipiunt, nullius, si fieri possit, aut pauculæ insuauitatis particeps esse debet.

Si verò ad iacturam virium omnium refarciendam, conditum rectè parabitur.

R. Corticis citri conditi ʒii. conseruæ buglos. & rosar. an. ʒß. specierum electarij de gemmis, diambraę, & diamargaritionis frigidi an ℥i. ossis de corde cerui ʒß. scobis vnicornis lapidis bezohardici. ʒ. gr. vj. folia auri n. vj sacchari rosati triplum, aut quod sufficit, fiat conditum granulatum.

Conditum cordiale.

Quibus præ imbecillitate subinde nauseat ventriculus, vel esculenta, potulentave, statim vt assumpta fuerunt eructat in intestina, fœliciter exhibebitur conditū, si iuxta formulam hanc conficiatur

℞. conferuæ veteris rosar. ʒvj. conferuæ symphiti maioris ʒij. pulueris diarrhod. abb. ʒii. scobis eboris, coralli rubri an. ʒi. cum sacchari rosati triplo pondere, aut q. suff. fiat conditum, de quo manè ieiuno ventre, atque ante & post singulos pastus ʒi. sumatur.

De pasta regia. CAP. XX.



PASTA regalis & opiata non parum habent affinitatis, ex hisdem enim ferè constant ambo, eaque sola, Rondeletio teste, distinctio intercedit, quod regalis pasta sit opiata siccior, & electario humidior, imò vtroque solidior: Consistentia enim electarii & opiata tam parum dissimilis est, vt eadem esse putetur. Vt vt sit, pasta regia, non quidem massapanis est, vt putat Gorreus, sed confectio quædam sic à recentioribus dicta, quæ alio nomine, electarium regium à Mesue nuncupatur. Propter enim vires quibus polet regias, i. eximias ad expectorationem & alios pectoris affectus, id nominis sibi vendicauit.

Constat verò conferuis, pulpis, syrupis, pulueribusque tanta industria præparatis & simul subactis, vt ex mixtura quædam exurgat tractabilis massa, instar pastæ, à qua nomen, & ex qua boli, aut par- Electarium regium.
uuli panes dulciarii, cuiusvis figuræ concinnantur, qui sensim exsic-
cantur, ne vsus tempore digitos contrectantium lentore quodam commaculent. Sic autem eiusmodi pastæ conficiuntur.

℞. amygdalar. dulc. pistacior. mundatorum, strobilorum per Panes dul-
diem in aqua rosarum maceratorum an. ʒß. pulpæ iuiubar. dacty- ciarij.
lor. passular. damascenar. an. ʒiii. gummi tragacanthæ ʒi. amyli
ʒß. sacchari rosat. quod sufficit. fiat pasta.

Ad sputum mouendum Rondeletius pastam imperat descriptam hoc modo.

℞. conferuæ capillor. vener. & bugloss. an. ʒß. puluer. diatra-
gacanti frigid. diayreos simplic. an. ʒii. penidiarum sacchar. cand.
an. ʒii. syrupi de glycyrrhiza parum, vel quantum sat est, fiat pasta:
Cuius consistentiam si paulo maior syrupi quantitas liquidiores

*Pasta regia
ad sputum
mouendū.*

De mazapane. CAPVT XXI.



AZAPANIS vel marci panis confectio est à recē-
tioribus sic nominata, quæ pro bellariis frequentius
habetur. Esui enim gratissima est, plurimumque nu-
trit, vnde macilentis imperatur, & his qui pulmo-
num pectorisque præter naturam affectibus diue-
xantur.

Ad eius confectioem bechica ac dulcia multa accedunt, vt sac-
charum, pistacia, strobili, & alij fructus suaues, ex quibus tuis, &
cum aqua vel simplici, vel rosacea accuratè subactis fit massa, de
qua placentulæ, vel morselli, vt loquitur Rondeletius, concinnā-
tur, & in furno leniter concoquuntur, donec colorem ex rufo fla-
uescentem & duritiem mediocrem acquirant.

Marci - pa-
nis quibus
constet.

Vulgaris huius confecturæ modus apud dulciarios pistorum simpli-
cissimus est, vt qui ex amygdalis, rosacea & saccharo tantum præ-
parent.

Aromatarij verò præter hæc adiiciunt nonnunquam medicorum
consilio, quæ partem quamdam respiciant, humorem noxium con-
temperent, & simul alendo & medendo sanitatem tueantur, vel re-
farciant.

Marciopa-
nis opti-
mus.

Est autem vsitatissima suauissimaque massæ panis hæc confectio.

R. amygdalar. dulc. decorticatar. ℥ iij. pistaciorum mundar. ℥ j.
pistentur in mortario lapideo cum pauca aqua rosar. adde sacchari
albiss. lib. β. fiat pasta, de qua formentur cylindri, vel placentulæ,
quæ in clybano leuiter coquantur.

Est & hic conficiendi marcipanis modus vsitatus, & ad flatus
discutiendos accommodatus.

R. pistaciorum ℥ j. amygdalar. dulc. à cortice purgatarum ℥ ij. ani-
si ℥ j. cinnamomi ℥ j. terantur fructus in aqua rosata; adde sacchari
℥ iij. fiat pasta, quæ si ob aquæ copiam liquidior fuerit, lento igne
leuiter feruescat in pelui, donec crassescat; deinde formentur placē-
tulæ, in furno, post extractum panem parum coquendæ.

Panis bis-
coctus.

Huc rerum affinitate spectare possunt illi paruuli ac oblongi pa-
nes, ex farina, triplo, aut quadruplo saccharo, & pauco coriandro,
cum exigua ouorum portione subactis simul confecti, quos vulgus
panes biscoctos appellat. Sed cùm sua cuique relinquenda sint, nec
in messem alienam falx injicienda, eiusmodi dulciarij panes pisto-
ribus conficiendi sunt relinquendi.

De piniolato seu pignolato. CAP. XXII.

On multum dissimili modo fit aliud pastæ genus à neotericis pignolatur & piniolatum dictum, quod ex pineis mundatis paretur immersis in saccharum liquatum, & ad sacchari rosati consistentiam coctum,

Vt autem pinei rancorem omnem deponant, debent prius in aqua diem integrum aut saltem dimidium macerari, & saccharum in rosacea liquari. Sic enim confectura gustui erit amicior, vt & olfactui, si moschi aliquot grana commisceantur, vt in multis bellaris interdum fieri videmus. Quæ in principum mensis apponuntur. Vsitatior autem conficiendi pineolati formula hæc est.

℞. Sacchari paulo infra consistentiam electarii solidi in aqua rosarum cocti lib. s. misce pinearum mundatarum & in aqua subinde mutata per duodecim horas infusarum ℥ij. Dein rudicula agitentur simul vt probè tota massa subigatur, cui antequam planè refrixerit, adde moschi ʒi. fiat pasta, de qua formentur cylindri super charta reponendi & exsiccandi, vt indurescant.

Pineolatū
optimum.

De Pandaleis. CAPVT XXIII.

LIVD solidioris adhuc pastæ genus pandaleon dictum, ad pulmonum & pectoris affectus à Rondeletio præscribitur. Ex multis enim constat, quæ humorem lentum attenuant & coquunt, & ad expectorationem mouent; videnturque pandalea omnia bechica esse, nec ab eclegmatis & syrupis pectori destinatis, nisi consistentia differre, vt nec ab electariis solidis nisi forma quadam externa. Simili namque modo componuntur, parantur, & coquuntur; sed electaria solida duriora sunt, & in tabellas complanantur figuræ cuiuslibet, quadratæ, aut oblongæ; pandalea vero integra seruantur in pyxide lignea, perinde ac conseruæ in vitrea aut fictili, & vtendi tempore frustum aliquod cochleari aut cultello confringitur, quod perinde ac tantillum alpheñici aut tabellæ alicuius bechicæ in ore retinetur, vt lique scat, & paulatim iustar lohochi deglutiat. Eandem consistentiam habent, & in similibus vasis solent asseruari, saccharatæ illæ confectiones, seu condituræ, in Hispania celebratæ, quas vulgus Marmeladas appellat.

Pandalea
qui differāt
ab ecleg-
matis & e-
lectarijs so-
lidis.

Marme-
ladas.

Fiunt igitur vt plurimum ex puluere quodam non insuauis & saccharo in aqua conueniente liquato & perfectè cocto vt concre-
re valeat.

Conseruæ nonnunquam adduntur, vt & portio mellis, si ita rei

exigentia postularit, ita, tamen paratum pendaleon, vtcumque palato displicet, aridet verò plurimum quod paratur hoc modo :

℞. puluer. diayreos Salomonis ℥ j. diatragacant. frigid. ℥ ij. puluer. santal. citrini ℥ i. sacchari in aqua tussilaginis, vt decet, cocti, ℥ iiii. fiat pandaleon, quod in vase ligneo reponatur.

Sunt etiam qui pandalea conficiunt ex pineis, vel amygdalis decorticatis atque contusis, & saccharo, vel melle, ad hunc modum.

℞. pinearum mundatarum & contusarum ℥ j. penidiarum ℥ β. mellis despumati & cocti quantum satis, fiat pasta solida, seu pandaleon.

De hypoglottidibus vulgò sublinguis.

C A P V T X X I V .



L V S S I S & oris fætor obuios quosvis exercent molestissime, cum aures illa, hic verò nares importunè feriat. Vtrique affectui medentur bechici & aromatici quidam parui pastilli, qui à terete forma, quam illis non raro pharmacopæi tribuunt, & à qualitate qua insigniter pollent, ad humorem tussim cõmittentem expectorandum, pillulæ bechicæ nominantur; Ab vtendi modo, quòd sub, vel potius superlingua contineantur, hypoglottides; ab odore, quem à moscho mutuuntur, moschardini nuncupantur.

Moschardini,

Suaues sunt quæ iuxta hanc formulam componuntur.

℞. sacchari albissimi ℥ i. penidiarum ℥ β. Treos ℥ β. santali citrini cinnamomi an. ℥ i. moschi ℥ β. cum mucagine gummi tragacanthæ in aqua rosacea extracta. fiat pasta: de qua formentur parui pastilli figuræ cuiusvis, teretis, quadratæ, rhomboidis, in ore sæpè inter pastus continendi. Facilis quoque est paratu & vsu suauissima hæc descriptio.

Sacchari
quantitas
in tabellis.

℞. sacchari rosati ℥ ii. sacchari candi ℥ i. amyli ℥ ii. specierum diacinnamomi, dianisi, & Treos an. ℥ i. macis ℥ β. zibethi gr. vi. cum mucilagine tragacanthi in aqua melissæ extracta fiant hypoglottides. De hypoglottidibus autem postea fusiùs agemus lib. 3. nostri Antidec.

De tabellis. CAPVT XXV.



TABELLÆ ad electaria solida pertinent, imo electaria sunt ipsa, cum ex pulueribus fiant & saccharo perfectè cocto, vt consistentia durior acquiratur, & diutius, ac securius absque virium dispendio conseruetur. Sacchari
quantitas
in tabellis;

In tabellis autem conficiendis par sacchari quantitas, vt mellis in electarijs liquidis additur. Alterutrum tamen nunc augetur, nunc subtrahitur, prout electarij virtus expetitur validior, aut imbecillior.

Tabellis purgantibus dragma vna tantum pulueris solet commisceri vnciæ sacchari in aqua aut alio liquore, vt decet, cocti. Roborantibus ad gratiam palati, maius sacchari pondus additur, vt vnciarum duarum, ad dragmas singulas puluerum.

*Cap. II.
l. 3.* De tabellis autem paucis nunc, ac obiter tantum in hoc libro de remediorum formulis ago, cum iam supra in medicamentorum, quæ in officinis diutissimè conseruantur, descriptione, non modò de electarijs liquidis, sed & solidis, seu tabellis fusissimè differuerim.

Sed vt medicinam facturo omnia remedia, quæ ad manum esse debent, suggerā, aliquot tabellarum roborantium formulas describam vt.

*Tabellæ
roborantes.*

℞. specierum electarij diamargarit. frigid. electarij de gemmis an. ʒ β. puluer. ossis de corde cerui ʒ β. scobis eboris tenuissimè leuigati ʒ i. cum sacchari in aqua rosar. soluti ʒ iii. fiant tabellæ, pondere ʒ i. aut ʒ ii. Singulæ sumantur mane ieiuno stomacho

Qui valent opibus, & ex longo morbo resurgunt, vel à quacunque causa, Palmo, aut lypothimia laborant, has tabellas curabunt preparari.

℞. puluer. aureæ alexandrinæ ʒ β. diacinnamomi, hyacinthorū, smaragdor. margaritar. subtilissimè tritarum an. ʒ i. cornu monocerotis lapid. bezaardic. an. ʒ. β. cum sacchari in rosacea dissoluti ʒ iii, aut iiii. fiant tabellæ paruæ.

Ad hoc caput attinent tabellæ, manus Christi vulgò nuncupatæ, quæ nihil aliud sunt, quàm saccharum rosatum, vel simplex vt vulgare. vel magis compositum, quod margaritas recipit, vocaturque manus Christi perlata, cuius hæc est descriptio.

℞. sacchari albissimi in aqua rosarum optima soluti, & supra syrupi consistentiam cocti ʒ ij. margaritarum electarum tenuissimè leuigatarum ʒ i. fiant tabellæ.

Tabellæ bechicæ vulgarissimæ sunt diaireos simplicis, Salomonis ac diatragacanthi frigidi, præter quas aliæ pro medici voto possunt effingi, vt quæ de glycyrrhiza nunc ad tussim quotidie parantur, hoc modo. ℞. pul. glycyrrhizæ electæ & tusæ ʒ ij. cum sacchari ʒ iiii. in aqua tussilaginis cocti, fiant tabellæ pro tussientibus & his, quibus

partes spirabiles humore multo sunt obsessæ.

De pulueribus. CAPVT XXVI.



PRÆTER eos pulueres qui in officinis ad futuros vsus aſſeruātur, de quibus alibi diximus alij quoque multi in rem præſentem ſolent præparari, vt ad frigiditatem ventriculi, & facultatis coctricis imbecillitatem, puluis digeſtiuus vulgò dictus, qui ex ſtomachicis, roborantibus, coctionem iuantibus &

Puluis fla- flatus diſcutientibus conficitur. hoc modo.

tus diſcu-
tiens.

℥. anethi & coriandri præparatorum an. ʒ ii. corticis arantiorum conditorum ʒ i. β. cinnamomi ʒ i. macis, cariophyllorum an. ʒ. β. ſacchari candi ʒ ii. aut ʒ iii. fiat omnium puluis.

Puluis ro-
boratiuus.

Alius quoque puluis virtutis eximiæ ad corroborationem ventriculi & partium ſignificationi dicatarum, & ad flatuum diſſipationem ſic parari poterit.

℥. ſcœniculi dulcis & coriandri conditorum an. ʒ i. ſcœnanthi, calami aromatici an. ʒ β. dianifi, diamargar. frigid. & diacinnamomi an. ʒ i. cruſtæ panis toſtæ ʒ ii. ſacchari albiffimi ʒ ij. fiat omniũ puluis.

Ad earum partium, quæ nobilitate cæteris præſtant, & facultatũ robur, in febribus malignis confici poſſunt pulueres cardiaci & alexiterij hoc modo.

Pul. alexi-
terius.

℥. radic. angelicæ, tormentillæ an. ʒ β. ligni aloës ʒ i. ſeminis citri cinnamomi an. ʒ β. offis de corde cerui, ſcobis eboris, margaritarum electarum an. ʒ i. cornu monocerotis, lapidis bezaardici an. ʒ β. dictamni ʒ β. ſacchari roſat. ʒ i β. ſi. puluis, qui ieiuino ventre, aut longè poſt paſtus detur cum aqua ſcordii, aut cardui, aut deſtillato reſtauratiuo, vel alio liquore idoneo.

Inter pulueres locum habent minutæ ſpecies ſeu aromata quædã trita, à Paulo dicta, quorum vsus refertur ad culinam; Cuiuſmodi eſt puluis bibulorum, qui ſua acuitate palatum feriens efficit, vt vinum auidius & vberius bibatur. Conſtat namque pipere, zinzibere, granis paradifi & ſimilibus. Idem facit, ſed ignauius puluis albus, qui parari ſolet ex zinzibere pipere albo, & paucò pane reſiccato & leuigato.

Sunt qui gratiffimum ad condimenta puluerem aulicorum ſic faciunt.

℥. cinnamomi, cariophyllorum, nucis moſcatę an. ʒ i. macis, piperis longi an. ʒ β. piper. nigri cardamomi an. ʒ iii. zinziber galangæ an. ʒ i. fiat omnium puluis.

Piunt & pulueres ꝑꝑici, qui vulneribus ſolidandis, vel vlceribus carne implendis admoventur, de quibus ſuo loco.



SECTIO SECVNDA

DE HIS QVÆ VEL INDVN- TVR VEL INIICIUNTVR.

De Errhinis. CAPVT I.



EDICAMENTA vel sumuntur, vel induntur & iniiciuntur, vel admouentur. Assumuntur zupia, apozemata, syrupi & alia plerâque, quæ non nisi per os ingeruntur, de quibus supra: Induntur, iniiciunturve errhina, glandes, pessi, & enemata: Admouentur vnguenta, emplastra, fots & alia multa, de quibus ordine nunc differendum, initio ab his sumpto, quæ corpus

quidem ingrediuntur, sed non per os, sed per nares, vterum, aut sedem; per easque partes habent egressum, per quas ingressum.

Quæ naribus immittuntur errhina ob id, & nasalialia vulgò dicta, Nasalialia. medicamenta sunt, quæ naribus purgando capiti exhibentur; vnde & caputpurgia etiam communi therapeuticorum medicorum consensu vocantur.

Fiunt ex his quæ facultatem acrem habent & extergentem, quæ vis expultrix validiùs laceffita, humorem in cerebro stabulantem mouet & foras excutit: cuiusmodi est betæ, cyclaminis, cucumeris agrestis, & maioranæ succus; vt & puluis euphorbii, ellebori, piperis, & similiū qualitate acri præditorum, qui in nares insufflatus sternutamentum mouet, & cerebrum purgat. Nonnulla quoque sunt ex astringentibus & agglutinantibus, vt quæ ad hæmorrhagiam sistendam præscribuntur.

Errhinorū
materia.

Dantur sub varia forma, vel liquida, quæ per nares attrahitur, vel solida, quæ intra ipsas inditur, vel forma pulueris qui insufflatur.

Errhinum liquidum sic rectè parabitur.

℞. succorum radicis betæ & foliorum maioranæ an. ℥ i. succorum brassicæ marinæ & cyclaminis an. ℥ ss. misce & fiat errhinum, cuius portio vt ℥ ss. manè per nares attrahatur, & subinde iteretur, & aqua in ore contineatur, ne ad ipsum è naribus errhinum refluat.

Quædam dantur forma vnguenti, quo narium interiora liniuntur valentque in diuturnis capitis affectibus, oculorum caligine,

epilepsia & odoratus hebetudine, corpore prius vt decet repurgato. Sic verò parabuntur optimè.

℞. radicis cucumeris syluestris, pyrethri an. ʒj. piperis albi, car-
peliſorum, ſtaphyſagrie an. ʒß. cum paucō oleo Ireos & cera fiat li-
nimentum.

Errhinum ſolidius ad ſiſtendum ſanguinis è naribus profluuium,
ſic poterit parari.

℞. boli armenæ ſanguinis draconis an. ʒj. roſar. balauſtior. pul-
ueratorum an. ʒß. cum paucō albumine oui ſimul agitentur, im-
mergantur pili tenuiores leporis, vel lanugo ſalicis, & fiat velut tu-
rūda, ſeu errhinum forma pyramidali naribus intromittendum, cui
filum alligabitur, vt pro arbitrio queat extrahi.

Puluis ſter- Puluis ptarmicus ſeu ſternutatorius, cūm ad naſalia pertineat, ſic
nutatorius. à nobis deſcribetur.

℞. ellebori vtriuſque an ʒj. euphorbii ʒß. radicis Ireos noſtratis
ſiccæ ʒß. fiat omnium puluiſtenuiſſimus, de quo portio tantilla in
nares inſuffletur, præmiſſo conueniente cathartico.

De Peſſis. C A P. II.

Priapiſco-
ta.



OMINE peſſi, ſeu peſſarii omnia quę intra ſinum
pudoris adhibentur, intelligere licet, quę ab Hip-
pocrate *πεσθερα* vno verbo nominantur, vt vnguen-
ta, litus, radices, aut herbæ intritæ, & penicilli. Hic
verò ſumitur pro medicamento oblongo, digiti craſ-
ſitudinem & longitudinem æquante & aliquando
ſuperante, quod intra mulierum naturalia reconditur, eique filum
alligatur, cum penitiùs intrudendum eſt, vt commodiùs extrahi
poſſit.

Forma peſſarij pyramidalis eſſe debet, læuis, retunda, nulláque
inæqualitate aſpera, ne collum vteri lædat; debentque duo aut plu-
ra inæqualis magnitudinis parari, vt primò tenuius immittatur, po-
ſtea craſſiora.

Peſſorum
duæ diffe-
rentiæ.

Sunt autem duæ huius remedii differentiæ: vel enim ex materia
quadam ſolidiore, vt plumbo, ſit peſſus turundæ canulatæ ſimilis,
qui vtero anguſto, agglutinato, obſtructo & clauſo inferuit, ape-
riendo, referando & dilatando: vel ex alia materia medica, & ſan-
guini tenuando, vel incrallando, vel mouendo vel ſiſtendo conue-
nit. Ferè autem ex aromaticis parantur cūm menſes præſertim du-
cendi ſunt, aut hyſtericæ ſuffocationis ſymptomata compeſcenda. Aromata enim non parùm recreant vterum, licet non ſub odoris
ſpecie, & ſuo vapore benigno & acreo vaſorum ora diducunt, & ob-
ſtructa liberant, ob idque fluorem menſtruum concitant. Sed ca-
uendum ne acria valde ſint ipſa, aut talia ſimul miſceantur, ne os
vteri & ceruicem exulcerent, quando diutiùs in vteri vagina peſſus
hæreere debet.

Aphor.
28. lib.
5. Lib.
de mor.
mul.
Hip.

Anteverò intromissionem pessarij, aditus vteri rebus odoratis inūgatur, vt oleo moschelino, aut liquidambar, vel simili quod zybethum aut moschum exceperit: ex quibus & cera sunt sepè litus, quo virginum naturalia inunguntur: pudor enim puellaris pessaria respuit, quę nō nisi refractis virginitatis repagulis queūt intromitti.

Porro materia pessorum ferè ad vnguenti formam reducitur, in eamque liquatam immergitur lana pexa, aut gossipium, & formatur pessus iustæ longitudinis tenui linteo aut panno sericeo inuolutus, cui filum appēditur, propter causam superiūs allatam.

Sic autem ad menses ducendos conficietur pessus.

Pessus ad
mensum.
accelera-
tionem.


℞. nigellæ, baccarum lauri an. ʒss. myrrhæ ʒj. sabinæ, dictamni an. ʒiij. castorei ʒj. puluer. hieræ picræ ʒij. cum oleo nardino & pauca cera, fiat linimentum, quo insuccata lana pexa panno sericeo inuoluatur, & fiat pessarium, oleo moschelino, aut nardino, ante intromissionem liniendum.

Non omnia priapiscota obuoluuntur, sed instar suppositorij, ex materialibus ad consistentiam solidiorem redactis formatur pessus, qui penis longitudinem referat, vt ad sistendos menses, hoc modo.

Pessus ad
menses si-
stendos.

℞. boli armenæ, sanguinis draconis an. ʒij. pulueris myrtillorum, rosarum, balaustiorum, hypocistidis an. ʒj. vnguenti comitis sæ ʒj. igne lento simul commisceantur, & fiat pessus formæ pyramidalis, & iustæ magnitudinis.

De Nodulis, vel potius penicillis. CAPVT III



PARTIS cuiusque conditio & natura non omnia semper remedia etiam eximia ferre potest, vt quæ propter pondus grauant, vel duritiem lædunt. Vnde emplastra ad effectus alicuius curationem etiam optima relinquuntur, vel ad formam vnguenti reducuntur, vt facilius possint tolerari: hinc in ano, qui condylomatis vel rhagadibus exasperatur, & in orificio pudendi muliebris externo, quod vlceribus scatet, nec suppositoria, nec pessif adhibentur, sed penicilli molles, quos non satis propriè quidam nodulos vocitant cū apophlegmatismi veriūs nomen hoc sibi valeant arrogare.

Penicilli namque non in nodum efformantur, nec perinde sunt duri, sed mollissimi, vt qui ex cotone, vel lana fiant, succo vel vnguento quodam idoneo insuccata: Sicque à partibus affectis sine molestia admittuntur, & facile feruntur. Vt etiam in curandis vlnneribus fieri cernimus, intra quorum labra duo, aut plures aliquando reconduntur.

Sæpè autem adhibentur ano, vt anteriori vulue, cū harum partium vlceratarum conditio alia remedia non facile ferat: sunt verò ex materia diuersa pro affectus cui destinantur, varietate, vt ad dolorem ani, quem acer humor inuexit, demulcendum.

Penicillus
anodynus.

℞. cerati refrigerantis Galeni ℥ β. vnguenti crudi seu nutriti ℥ ij. cum dimidio oui vitello fiat linimentum, quo flocculus lanæ inungatur, & admoueatur affectæ parti.

Alius de-
tergens.

Ad vlceris sordidi deterfionem penicillus hic erit vtilissimus.

℞. syrupi de absynthio, mellis rosati an. ℥ j. myrrhæ, aloës an. ℥ β. misce., & cum lana fiant penicilli.

Idem præstat hapsus lanæ aut gossipij, vnguento de apio imbutus & parti admotus.

Ad vlceris desiccationem commendatur, & hic.

Alius de
siccatur.

℞. vnguenti albi Rhasis ℥ β. desiccadini rubri, & vnguenti diapompholigos an. ℥ ij. misce & cum pexa lana, vel carpto bombace fac penicillos,

De Suppositorijs. CAP. IV.

Ventris se-
gnities na-
turam ma-
le laceffit.



X ventris torpore humorum confusio & immensa morborum propago, quæ vt vitetur, alius pigriora alimentis humectantibus lubricanda, vel clysteribus eluenda, vel glandibus subdititiis sollicitanda, vt singulis diebus, præcedentis diei excrementa deponas: fœcibus namque diutiùs cohibitis, nec pro assumptorum ratione descendentibus, ad caput vapores ascendunt, corpus ingrauescit, ciborum concoctio læditur, ac reliquæ functiones euadunt deteriores.

Quibus igitur pudor obrepit, vt virginibus sepè, nates pharmaco- pœo nudare, de aluo per clysterem sollicitanda, cogitanti, aliud dabitur medicamenti genus, à supponendo, suppositorium dictum- quod quisque proprijs manibus, intra anũ recondere facillè poterit.

Glans sub-
dititia.

Olim subdititium hoc medicamentum glandis formam à qua & glans sæpius vocatur, referebat, nunc verò longius efficitur, & digiti aut pessi cuiusdam longitudinem æquat.

Est autem plurimus suppositoriorum vsus: cùm enim facultas expultrix hebes est, nec statò tempore fœces ad exclusionem cogit, suppositorio acri, velut aculeo stimulanda, seu quando rectum in- testinum induratis fœcibus nimio perè saturatum, nec clysmum admittere potest, seu iam admissum egerere nequit.

Multum verò conferunt eiusmodi subdititia medicamenta, asca- ridibus enecandis, & his affectibus, quibus aluum fluere optimum est, nec enematis eluere tutum, vt in enterocèle, & in intestini re- cti ab humiditate nimia prolapsu & inuersione.

Supposito-
riorum ba-
sis.

Basis eorum est mel, quo solo sepè eousque cocto dum crasses- cat, nec amplius in quinet digitos concinnantur. Mel enim cùm te- nuum sit partium, acrimoniæ quiddam habeat necesse est, ait Gale- nus, qua aluum ad excretionem proritet.

Melli nonnunquam additur sal communis, aut gemmæ, aut pul- vis hieræ, aut alius simplex, vel compositus.

Ca. 38.

lib. 3.

de ali-

men.

Suppositorium commune ad facultatis excretrici stimulum paratur hoc modo.

℞. mellis ℥ ij. salis communis ℥ ij vel salis gemmæ ℥ iij. lento igne coquantur in paruulo cacabo ad crassitudinem legitimam, & fiant suppositoria iustæ longitudinis multa pro quantitate mixtorum, vix enim vnicum suppositorium ex cocto melle tantum paratur, sed simul plura fieri consueuerunt, ne exigua mellis portio, quæ conficiendæ glandi sat esse potest, citius vratur, aut patina ignita pereat, quam tractabilem consistentiam acquirat.

Ad vermes sedis enecandos, & ad pituitam qua nutriuntur educendam, sic parata suppositoria feliciter induntur.

Suppositorium ad vermes.

℞. aloës ℥ j β. agarici absynthij an. ℥ j. salis gemmei ℥ β fiat omnium puluis, cui adisceantur mellis, vt decet, cocti ℥ ij. fiant suppositoria, quorum singula oleo amygdalarum amararum, aut absynthii, vel felle bouis peruncta, dum opus erit, indantur in anum.

Pro infantibus interdum exacuitur frustulum oblongum saponis albi, ad formam glandis, & inditur; Aliquando & cauliculus betæ vel mercurialis butyro illita vicem gerit suppositorii, hæc enim omnia blandè aluum exonerant,

De Clysteribus seu enematis. CAP. V.



CLYSTER vel clysmus nomen à Græcis mutuatum ablu-tionem significat, vt enema iniectionem, atque pro eadē vtraq; vox vsurpatur; per inferiora enim aluus ablui non potest, nisi iniectione quadam præmissa, quæ per sedem in intestina infunditur, ad vim eorum excretoriam pigriorem iustò proritandam, duritiem ventris emolliendam, interperiem alterandam, dolorem sedandum, flatus discutiendos, fluorem cohibendum, intestinorum vermes enecandos expellendosque.

Com. Ad alios quoque multos effectus consequendos, clysteres instituuntur, quia nulla ferè corporis pars est, quæ ex illo solamen aliquod non percipiat. Si caput dolor exercuerit, si oculos lippitudo, si fauces strangulatio, si pectus suffocatio, si ventrem inflatio, si renes inflammatio, si mezentereum obstructio, si vesicam dysuria, ischuriavè, his omnibus prosperè clysmus medetur malis.

Magnus clysterum usus.

Sui quoque sunt & vterò clysteres, per metrenchytem in illius fundum iniiciendi, sui & vesicæ; Sui nec vlceribus desunt, quorum os angustum est, & sinuosa profundaue cauitas.

Sumitur verò pro medicamento liquido, quod per sedem in intestina infunditur, cuius descriptiones traduntur variae, pro affectuum, quibus destinantur, varietate, vt ad emolliendam aluum hoc modo.

℞. maluæ, violarum, althææ, brancae vrsinæ mercurialis, parietariæ, communis an. m. i. seminis fœniculi, ℥ β. hyemali tempestate, æstiuà verò, seminū clysterium.

Decoctio

quatuor frigidorum maiorum \mathfrak{z} j. fi. decoctio in sufficiente quantitate aquæ, de cuius colatura sumatur lib. i. β . ad summum pro grandioribus, libra dimidia pro infantibus, & lib. i. vel paulò plus aut minus, pro his qui inter pusillos & proceros mediæ sunt staturæ.

Seruatur eiusmodi decoctio biduum æstate, in frigidiore loco in- corrupta, hyeme quatrimum; recens tamen parata semper melior iudicanda, perperamque faciunt multi pharmacopœi, qui hebdomadam integram idem decoctum ad quosuis vsus seruant.

In ea sæpè decoquuntur folia orientalia, vel dissoluuntur electaria quædam & mel, pro vario medicorum scopo, vt ad segnitiam ventris & humorum illic cunctantium educationem.

\mathcal{L} . Quatuor emollientium, atriplicis, parietariæ florum meliloti & chamæmeli an. m. i. fiat decoctio in sufficiente quantitate aquæ; in colatura ad lib. i. dissolue mellis mercurialis \mathfrak{z} ij. sacchari rub. \mathfrak{z} j. benedictæ laxatiuæ \mathfrak{z} vi. hieræ picræ Galeni \mathfrak{z} β . fiat clyster, iniiciatur manè vel longè post pastus.

Clysteris
inuentio-
nem auis
dediffertur.

Ad sopitam vim magis irritandam, quidpiam salis communis, vel gemmei solet adiici, cuius facultatem ad ciendam aluum nouisse creditur auis quædam nomine Ibis, ciconiæ non multum dissimilis, quæ aqua marina rostro oblongo excepta, ac in aluum immissa, se proluit, vsumque clysteris, etiam referente Galeno, docuit. Cauendum tamen ne clysteribus ad dysenteriam præscriptis, falsugo quædam dissoluatur; dolorem namque intestinorum redderet multò acerbiorem. In præ-
fatione
sui in-
trodu-
ctory.

Ad flatus discutiendos clyster carminatiuus, vulgò dictus, ad hunc parabitur modum.

Clyster
carmina-
tiuus.

\mathcal{L} . Althææ, parietariæ, comarum anethi, origani, calamenti, abrotoni, florum meliloti & chamæmeli an. m. i. coriandri, anisi, cumini an. \mathfrak{z} β . fiat decoctio in colatura ad lib. i. dissolue mellis anthosati \mathfrak{z} ii. benedictæ laxatiuæ \mathfrak{z} vi. electarii de baccis lauri \mathfrak{z} β . olei anethi. \mathfrak{z} iii. fiat enema.

Sunt qui pro oleis ex infusione paratis, \mathfrak{z} i. olei anisi arte spagyrica educti, aut paulò plus, minusve, pro corporis & morbi conditione dissoluunt: quod sæpè successu fœlici sum expertus, dum cæteravotis non respondebant.

Validius
purgant
clysteres
qui pingui-
ano ad-
mittunt.

Hic notandum venit, enemata quibus oleum permiscetur, aut butyrum, vel vtrumque, segniùs humores attrahere. Pinguium enim adiectione, cathartorum vis magis hebes, ac ignaua redditur, sed leniuntur, sedanturque citiùs dolores intestinorum. Propterea ad emolliendum potiùs & leniendum, quàm attrahendum olea, pingua vè commiscantur, vt,

\mathcal{L} . Decoctionis quatuor emollientium lib. i. dissolue mellis violati, sacchari rubri, catholici an. \mathfrak{z} i. β . olei chamæmeli & butyri recentis an. \mathfrak{z} ii, fiat clysmus

Nec omittendum est, enemata non solum inferiora intestina proluere, sed etiam media, & superiora nonnunquam, cum scilicet ventriculus male affectus est, & ab inferioribus intestinis trahit, ita-
 vt inquit Galenus, nonnulli portionem clysteris per vomitum ex-
 cluserunt, quamuis alibi contrarium tenere videatur.

cap. I. l.
3. de
Sympto
caus.

Hoc quoque accidit, dum macilento clyster ex lacte, vel decocto carniū paratus inijcitur, cuius dulcedine & gratioso tepore fame-
 licus, & inanis ventriculus allectus, velut sugendo liquorem ad se tra-
 hit, quo sese reficiat, vt ex Auenzoare scriptū legim⁹ in suo Theysir.

cap. 18.
tract.
10. l. 1.

Ad lethargum, apoplexiam & alios affectus cerebri, in quibus
 sensus torpent, ignauaque est vis facultatum, clysteres hoc debent
 modo parari.

℞. Betonicæ, maioranæ, calamenti, saluæ, origani, an. m. j. mer-
 curialis, atriplicis an. m. ij. fiat decoctio, in qua bulliat foliorum sen-
 næ ℥j. cum ℥ij. anisi. In colatura ad lib. i. dissolue mellis anthosati
 ℥ij. confectionis hamech & hieræ diacolocynthidos an. ℥β. aut 3vj
 salis ℥ii. aut ℥iij. fiat clyster. Adapople-
xiam.

Ad dysenteriam & alium ventris fluxum citaciorem cohibendum
 dabitur enema sic paratum.

℞. Plantaginis, centinodie, tapfi barbati an. m. i. bulliant in lib. i.
 lactis & lib. β. aque fabrorum ad tertię partis cōsumptionē, In cola-
 tura dissolue boli armenæ, amyli an. 3. ij. vitellum oui i. fiat clyster. Ad dysen-
teriam.



SECTIO TERTIA, DE HIS QVÆ EXTRINSECVS AD- HIBENTVR, ET PRIMO.

De Balneis. CAP. I.



V M absolutè balneū dicitur, de tepido ex aqua dul-
 ci, seu pluuiali, seu fluuiatili parato, intelligitur non
 de fordido Celtiberorū balneo, qui vrina diu serua-
 ta lauari, vel potius cōspurcari curabāt, nec de bal-
 neis medicatis, quæ in diuersis terræ plagis scaturi-
 unt, quæque pro varietate mineralium, quæ proluunt,
 varium saporem & halitum sortiuntur, & vim ad multos affectus
 curandos eximiam. Tot enim ferè medicatarum aquarum scaturi-
 gines, quot morbos terra profert. Multas nunc insignesque Norma-
 nia, penèque tota Gallia fundit, vt & Germania, Italiaque, sed hīc
 loquimur tantum de balneo quod ex aqua simplici, vel herbarum
 decocto in singulorum ædibus parari potest.

Balneum
cur vsurpa-
tum.

Balneorū.
superba
structura.

Balnea Ro-
mani habe-
bant in de-
licis.

Balneorum
magna uti-
litas.

Paratur autem triplicem ob causam, ob delicias nempe, sanitatis custodiam, & morborum depulsionem. Prioris, quod scilicet ad molliciem & voluptatem refertur, veteres romani fuerunt olim cultores mirum in modum profusi, nam balnea publicis vsibus, magna mole ac inimitabili artificio struxerunt, Alexandrico & Numidico marmore. Nam parietes Thasio lapide partim fulgebāt, partim picturis nitentes visum non parum reficiebant, atque in eorum piscinas argentea epistomia aquam vel tepidam, vel calidiorem ad libitum fundebant. Tanto enim studio prosequiebantur balnea, ut ex his nonnulli septies singulis diebus lauarentur; maxime verò Imperatores & patrij, qui seorsim lauabātur. Cū tamen balneum voluptuaria sit res ut asserit Iure consultus, ad maiore voluptatē, olim ante Antoninum Philosophum, promiscua fuerunt viris æque & mulieribus lauacra, quæ gymnasia vocantur à Iudæis, qui apud Tripolim & Damascum degunt.

Gal. c.
5. l. 1. de
sanit.
tuend.

Alpian.
mus.

Ad sanitatis custodiam, qui feruido sunt iecore, vel cutim habent squalidam, balneae aquæ tepidæ ac dulcis sæpè & fœliciter ingrediuntur.

Ad morborum depulsionem multus quoque est balneorum vsus. Laudat namque Galenus in hæctica febre, in diaria, & etiam aliquando in putrida, obseruatis obseruandis.

Oribas.
c. 27. l. 1
c. l. 10.

In plerisque morbis conferre Hippocrates ante Galenum multis in locis scripsit. Cutis enim spiracula soluit, humores discutit, feruorem viscerum temperat, lassitudinem tollit, terrenumque ac melancholicum humorem diluit, temperat, lenit.

meth.
med. c.
20. lib.
12.

Hæcticis ditioribus parabitur balneum ex lacte vel solo, vel aquæ portione adiecta. Alijs minus opulenti aqua sufficiet, eaque potius fluuiatilis, aut pluuiæ, quam fontana aut pluuiæ, cui proderit stirpes quasdam vel integras, vel earum partes incoquere, ut.

Part.
44. l. 3.
de vi-
tutibus.

℥. althææ, maluarum, violarum, foliorum vitis & ruscilaginis an. m. iij. bulliant in sufficiēte quantitate aquæ fluuiatilis aut pluuiæ pro balneo.

tor.

Ad morpheam & alias cutis fœditates proderit, corpus primū in balneum immergi supra descriptum, modo ante per vniuersalia remedia, catharsim phlebotomiamque, praua succorum colluies emendata fuerit, & sanguinis copia imminuta; dein in infra descriptum, quater aut quinquies, aut pluries in ipsum, si vitium postularit, lauare.

℥. foliorum enulæ campanæ, oxylapathi, scabiosæ an. m. vj. clymenii rubri, fumarie an. m. iij. bull. in sufficienti quantitate aquæ, balneo quæ satisfaciat parando.

Credidit olim nimis insipienter perdita quædam gens, Elephantiasim balneo ex humano sanguine parato, sanari; Sed hoc cū sit horrendum etiam dictu, & a cacodæmone quodam inuentum, prorsus

fugiendum. Tantum enim malum, in quo tota naturæ œconomia labefactata est, nec remedio cuipiā externo, nec ei quod intrinsecus assumitur, nec sæpè simul omnibus cedit.

De Semicupio, seu infessu. CAP. II.



VT balneum corporis totius est lauacrum, excepto capite, quod tamen sæpè vaporibus tentat, sic semicupium dimidij: Est enim balneum abdominis tantum, vel dimidium solium, aqua vel decocto idoneo plenum, cui æger ad ventriculum vsque insidet, crucibus & tibijs extra porrectis. A Græcis *ἐνχυσίωμα* vocatur, a Latinis infessus, & infessio, & aliquando Semicupium. Fit ex eadem materia, qua fots & balneum, quorum altero maius & altero minus est, ac velut inter vtrumque medium. *ἐνχυσίωμα.*

Huius præsidij multiplex agnoscitur vsus. inseruit enim vtero molliendo, vasis eius referandis, colicæ affectionis cruciatibus sedandis & alijs doloribus, qui vel renes à calculo obfitos, vel vretes obstructos, vel alias ventris partes imas excruciant, mitigandis.

Ad doloris nephritici sedationem, vbi emollitione & vasorum di- Semicupium
ad nephri-
ticum do-
lorem.
ductione opus est, sic parabitur semicupium.

℞. Berulæ, althææ, maluarum, violarum, parietariæ, florum meliloti, summitatum anethi an. iij. seminis lini ℥ij. coquantur omnia in aquæ pluuiæ, vel fontanæ pro semicupio.

Sunt qui materialia excipiunt sacco, parti magis dolenti, in ipsa infessione admouendo. Ante ingressum corpus crudis & viscidis humoribus scatens medicamento idoneo, si tempus permiserit repurgandum, sin minus, alius tantum clystere laxanda.

Ad ventris exsiccationem, duritiem, tensionem & colicum dolorem encatismata parantur aliquando ex omazorum decoctione; quibusdam lac additur, alijs vinum, nonnullis oleum.

Vbi dolor colicus à flatuum copia ortus, ventrem distendit & excruciat, semicupium parabitur ad hunc modum.

℞. Polij, calamenti montani, origani, summitatum anethi florum meliloti, maioranæ an. m. iij, seminum anisi, fœniculi, cumini, baccharum lauri an ℥j. Includantur omnia duobus sacculis qui bulliant in aqua sufficiente, & fiat semicupium, in quod æger resupinus, à genibus ad vmbilicum demergatur.



EX hisdem paratur vaporarium, quibus Semicupium, sed quantitate minore. Sat enim est in lebete pauca quædam concoquere, quorum vapor sursum per cathedræ foramen, cui æger insideat, delatus, vel vterum, vel anum feriat. His enim maximè partibus medetur, cum scilicet referendus est vterus, menses euocandi, vel sistendi, hæmorrhoides aperiendæ, vel constringendæ, dolor sedandus, & intemperies quædam alteranda.

Ad mensium prouocationem, ne vapor disgregatur, & in ambientem exhalet aërem, cathedra pertusa, cui mulier insidebit, accuratè panis multis inuoluetur; Sic enim sursum ascendens, ad sinus pudoris orificium facilè deferetur, & vasorum ora permeans, sanguinem attenuabit, & ad motum concitabit.

Vaporariū
ad mensiū
& hæmor-
rhoidum
concitatio-
nem.

Remedium hoc sequenti formula descriptum; mensibus & hæmorrhoidibus ciendis erit idoneum.

℥. arthemisiæ, calamenti, calamenthæ, hyssopi, satureiæ, maioranæ an. m. j. sabinæ. m. β. althææ m. ij. florū melilot. chamemeli & iasmini an. m. β. fi. decoctio in aqua & quarta parte vini albi, cuius vapor admittatur dicto modo.

Ad fluore vtrūq; sistendum, accommodatissimū erit sic descriptum.

℥. bursæ pastoris, centinodie, pilosellæ, plantaginis, equiseti an. m. j. rosarum m. i. balaustiorum m. i. fi. decoctio in aqua fabrorum, cuius vapor inhiens naturalia.

Ad hæmorrhoidum dolorē leniendū, placādumque, sic parabitur.

℥. rapsi barbatim. ii. althææ m. i. sem. lini ℥ β. bulliant in lacte, & podice tepidus vapor excipiat.

Tepidariū.

Tepidarium à vaporario vix discrepat materialibus & vsu sed vtēdi modus parum dissimilis; Nam per tepidarium eger in loco quodā admodum paruo quiescens tepidè incalescit, in illum delato vapore medicamentofo, per tubos altera parte cacabo, instar Emboti iunctos, in quo medicamenta quædam scopo idonea decoquuntur.

Quod autem tepidarium est toti corpori, id specialiùs alicui parti est, Embotum vulgò dictum, quasi *ἐμβοτῆς*, ac solum aquæ calentis & medicatæ, cuius halitus ascendit velut per infundibuli tubum, seu rostrum oblongum parte superna incuruum, deferiturque ad partem agram dolore leniendam vel intemperie soluendam & solandam. Sæpius locum habet in aurium tinnitu & sibilo. Tumque anisum, anethum, coryandum, cuminum, bacce lauri & similia carminatiua in cacabo feruescunt ac concoquuntur superposito infundibulo seu emboto per cuius fistulam discussoria carminatiuorum qualitas ad partem morbosam deuehitur interdum ad vitia pulmonū vsurpatur, excepto vapore bechico per os, & ad thoracē delato.

De Hypocausto, seu Sudatorio. CAPVT IV.

HYPOCAVSTVM locus est, ad fornaculæ cuiusdam instar concinnatus, in quo sudor elicitur sicco calore ab igne subiecto, per spiracula parua ascendente, Alio nomine vocatur Laconicum, quod eo præcipuè Lacones vterentur, vt balneo Romani. Morbis confert frigidis ac diuturnis: Illius enim calor acer & feruidus, cum externum corporis habitum non modò calefaciat, sed etiam præcordia & partes omnes internas, potenter meatus aperit, humores calefacit, liquat, & per sudores prolicit.

Sed quia calor eiusmodi sic extrinsecus occurrando, & simul intro sese insinuando, humores affatim prolicit, vix horæ quarta parte tolerari potest, sine spirituum dissipatione, & iactura virium, quam lypothimiæ non raro consequuntur: Maximè verò delicatuli in Hypocausto animo deficiunt, vt etiam hi quibus est corpus impurum, & excrementis pluribus onustum. Proindè qui suæ sanitati optimè consultum voluerit, ipsas fornaculas adibit nunquam, nisi prius humorum sarcina, medicamento sublata idoneo, & sanguine, si plenitudo suaserit, imminuto. Sic enim vtilius succorum, qui habitum corporis infarciunt, reliquiæ foras per sudores ablegabuntur.

Que ingressum hypocausti præcedere debent.

Non est improbanda rusticorum consuetudo, cum inopia Laconici, artificiosa industria, vt decet, extructi, dolium iustæ magnitudinis, vel ad ignem, vel cacabo carbonibus ignitis, vel decocto quodam feruente impleto, ac in fundo illius reposito, calefaciunt, illicque sedentes profusè sudant, & facillè sine animi deliquiis.

Ex his nonnulli furnum à quo nuper panis extractus est, ingrediuntur, atque caput extra præfurnium tantum exerunt, & illic sudant ad libitum.

Ad sudorem his promouendum, qui lue venerea laborant, Chirurghi quoddam æstuarium ex viminea textura effinxerunt, instar caueæ cuiusdam, in qua cicurandæ aues incarcerantur, vocantque nec improprie, nec infacetè caueam, in qua quidem aues non nutriunt, sed ab his nutriuntur.

Illic inclusi xiselli, cum lateribus aliquot ignitis, & stragulis inuoluti, coguntur, donec sudor copiosissimus ex vniuerso corpore proliciatur, præbuito antè guaiaci cremore aut sarseparrillæ, aut alterius alexiterij, quod simul sudores moueat & virus luis venereæ deleat.

De Fomentis, seu fotibus. CAP. V.



Fotuum
magna uti-
litas.

AN TA fotus habet commoda, vt nulla pars est corporis. quæ foueri, hoc est, per fotum curari non patitur. Hunc præscribit Aëtius oculis malè affectis; Trallianus auribus, alui profluuium, imò dolori cui libet sedando quoddam describit cōuenientissimum. *Initio lib. 6.*

Nec in febre Celsus omisit fomenta validiora: vt nec omittenda pleuriticis, hepaticis, lienosis, calculosis, arthriticis, & partibus omnibus, quarum nec vlcus continuitatem diuisit, nec vulnus secuit integritatem: cutim enim ad transpirationes raram faciunt, ait Oribasius, sanguinem attenuant, eius portionem discutunt, & sic efficiunt, vt affectæ partes mitius dolore premantur. *cap. 12. lib. 3.*

Ad multas igitur intentiones fit fomentum, vt ad robur ventriculo conciliandum, sic. *ca. 29. lib. 9.*

℞. absynthij, menthæ vtriusque, comarum anethi, rosarum an. m. ij. pulegij, maioranæ an. m. j. balaustiorum, nucum cupressi contusarum an. ℥j. bulliant in aqua cum quarta parte vini sub finem decoctionis additi, fiat fotus cum spongiis.

Ad lienis mala Trallianus varios fotus præscribit, ex his quæ vel ipsum roborant, vel humores incidunt, digeruntque, vel eius intemperiem quamlibet immutant: vt, ad illius robur, obstructionemque liberandam, corpore prius ritè purgato, fiet sic fomentum.

℞. ceterach, scolopendrij, absynthij Romani, stæchados vtriusque, tamarisci, an. m. ij. florum genistæ, Iasmini an. m. j. fiat decoctio in aqua & vino, modò nulla sit inflammationis suspicio: vel, In aqua sola, & singulis decocti libris olei capparum ℥iij. adiciantur, pro fotu partis cum spongiis, vel facculis, dictis simplicibus, impletis.

Ad pleuritidem fotus sic descriptus vtiliter admovebitur.

℞. althææ, violarum, maluæ an. m. ij. florum meliloti & chamæmeli, comarum anethi an. m. j. feminis lini ℥j. fiat decoctio in aqua, vel lacte, pro fotu lateris dolentis, cum lana aut spongiis.

A fotu liniatur pars oleo quodam paregorico, vt liliorum, amygdalino, violarum, aut butyro recenti.

Fotus calculosis sæpè imperantur, regioni renum adhibendi, vt

℞. nasturtij aquatici, parietariæ, berulæ, violarum an. m. ij. fœnugræci ℥ij. si. decoctio in hydroleo, pro fotu regionis renum.

De Epithematis. CAPVT. VI.



INTER fotum & Epithema nihil discriminis quidam constituunt; Fernelius contra medicamenta diuersa esse tū formula, tū viribus rectè putat. Fotuum siquidem est multiplex qualitas, & parandi modus, ferèque partibus singulis possunt admoueri. Epithemata verò duabus potissimum qualitatibus eximia sunt, alterante, qua intemperiem quamdam emendant, & roborante, sæpèque alexiteria, qua viscus nobile tuentur, & virus aliquod oppugnant, atque iecoris ferè cordisque regioni tantum admouentur.

Parantur sæpius ex aquis stillatitijs, cardiacis & alterantibus, aut liquidissimis decoctis, quibus pulueres viribus singulares permiscentur. Proportio pulueris est scrupuli vnus, aut dragmæ dimidiæ tantum ad vncias singulas stillatitiarum aquarum, quibus parum aceti solet commisceri.

Epithema-
tum mate-
ria.

Diluitur interdum puluerum loco, nonnihil ex confectioe quadam alexipharmaca, tempore pestilenti, vel cū egrotus ipse, maligno quodam morbo, qui cor & facultatum robur impetit, iam correptus est; tunc enim securum est parum Theriacæ, aut mithridatij epithematis commiscere.

Ad iecur ex febre exestuans, refrigerandum & roborandum sic fiet epithema.

℞. aquarum cichorij, endiuicæ, nenupharis & plantaginis an. ℥iij. aceti rosati ℥j. pulueris triasantali ℥j. β. pulueris diarthod. abbat. ℥j. trochisci de caphura ℥β. fi. epithema, quo tepido insuccentur panni lanei, vel linei, & subinde admoueantur regioni hepatis.

Ad muniendum cor, & tuendum vitalis facultatis robur, epithemata sic parata optima sunt.

℞. aquarum buglossi, scabiosæ, cardui, oxalidis, & rosarum an. ℥iij. aquæ theriacalis ℥ij. specierum diamargarit. frigidi, triasantali an. ℥j. β. pulueris radicū tormentillæ, gentianæ, dictamni & grani tinctorii an. ℥β. misce, & fiat epithema, quo linteam insuccatum regioni cordis applicetur.

Veteres pannum coccineum laudant, qui cū in baphia arsenico multo inficiatur, à recentioribus improbatur. Probo tamen ego in morbis venenatis, in quibus ipsa venena sæpè sunt salutaria.

De Lotione. CAP. VII.



ON hîc per lotionem intelligimus balneum aquæ *c.7.l.1.* frigidæ, quemadmodum Oribasius & Paulus, sed par- *c.51.li.* ticularis alicuius membri ex decocto medicato ablutio- *i.* nem, ad sordes auferendas, intemperiem corrigendam, humorem digerendum, partem robarandam, dolorem mitigandum & somnum conciliandum. Ad pediculos quoque capitis enecandos lauari capillitium prodest, vt decocto ad hunc modum parato.

Lotio ad
phthiasim.

℞. Staphysagriæ ℥ij. absynthij, tanaceti, betonicæ, centaurij minoris an. m. ij. bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Coletur decoctio, qua caput abluatur cum spongiis vel linteis.

Vetulis, quæ moleste ferunt canos habere capillos, quod à maritis despiciantur, hæc denigrans capillos imperabitur lotio.

℞. Corticum quercus & alni an. ℥ii. galarum ℥ii. corticis nucum viridium lib. ss. foliorum maligranatæ & myrthi an. m. i. fi. decoctio. cui adde aluminis ℥ii. vitrioli ℥i. Decocto colato abluatur capillitiū, nec detergeatur linteis, sed in sole non feruido, aut aëre calidiusculo exsicceatur.

Quæcunque tamen præ deliciis seipsas ornant, inquit Galenus, *c.2.lib.* harum nulli tale quippiam a me petenti exhibui. Sic enim multæ se- *i. de* se fucant, vt fallant. *comp.*

Olim autem frequentius, quā nunc, caput lauabatur, nec sine ra- *med. lo.* tione, vulgare prouerbium auditur, nunquam caput lauandum, ra- *cal.* tione pedes, sæpè manus.

Ad somnum conciliandum lauantur aliquando pedes, decocto simplicium, quæ calorem mitigant & sensus sopiunt, ad hunc modum parato.

℞. Lactucarum m. iij. betonicæ, florum nenupharis an. m. ij. florum papaueris m. j. fiat decoctio in aqua pro lotionem pedum.

De Embroche & aspersione. CAP. VIII.



ER Embrochationem oleum, vel alius liquor, vt decoctum affectioni curandæ accommodatum, instar pluuiæ, super partem aliquam delabitur, sicque dicitur, a Græca dictione *ἐμβροχέω* id est, pluo, seu irri- *cap.172* go, vnde em- *serm.* brochatio, quasi à pluuiâ descendente irrigatio. Hoc *3. te-* *tra. 2.* medicamentum in vsum venit, ait Aëtius, vbi ob aliquam circumstantiam balneum adhiberi prohibetur. Et in vigiliis, & in febribus & in delirantibus valde conuenit, velut est decoctum papaueris & chamemeli. Archigenes præceptor-
rem

rem suum Agathinum ex vigilijs delirantem, confestim à delirio & vigilijs liberauit capite eius multo oleo calido irrigato.

Eiusmodi irrigationes à fetu tantùm dissentire videntur, quod illæ supra partem ex alto delabantur, hic verò admoueat cum spongijs, aut pannis, & aliquando sacculis.

cap. 23.
lib. 9. Iam verò irrigamus, inquit Orbasius, vbi inflammatio resolueda, aut abscessus suppurandus. Aspersione verò vtimur ad faciem, atque in febribus ardentibus; æstiuo tepore, aqua frigida, hyberno, ea ipsa calidiore. Verùm in simplicioribus febribus, & in stomachi subuersione etiam poscam aspergimus. Vtimum adhuc aspersione in oculis fluxione infestatis, ocymi decoctum velut efficacissimum adhibentes, sed subiicienda mento spongia sicca, ne defluat aqua ad pectus.

Irrigatio.
Aspersio:

Componitur autem embroche, seu irrigatio ex simplicibus vino, aqua, lixiuio, aut oleo coctis, vt ad lethargum, hoc modo.

Embroche
ad lethargũ

℞. Cyperi, calami aromatici, iridis, ligni lauriani. ʒss. saluie roris-marini, pulegij, sampsuci, calamenti, stœchados vtriusque an. m. ʒ schœnanthi, seminis coriandri, cumini an. ʒij. fiat decoctio in libris tribus aquæ ad tertiæ partis consumptionem. Colaturæ adde aquæ vitæ ʒiij si embroche capitis.

Ad somnum verò conciliandum, ex simplicibus contrariam facultatem habentibus parabitur irrigatio ad hunc modum.

℞. Lactucarum m. ij. florum nymphææ, rosarum albarum an. m. j. florum papaueris, betonica an. m. ʒ fiat decoctio, cuius colatura pro embroche capitis esto.

Ad irrigationem referri potest aquarum medicatarum, vt Borbonensium stillicidium, seu gutturnium, de quibus agere, nostri non est nunc instituti.

De Lenimento seu litu. CAP. IX.



INIMENTVM mediæ est consistentiæ inter vnguentum & oleum: Illo siquidem liquidius est, hoc verò crassius, nam ad sui spissitudinem parùm ceræ, aut pinguedinis admittit, ne tam facile diffluat, nisi sole, aut igne parùm, ante incaluerit. Basis illius oleum est, cui nonnunquam additur aliquid ex resinoso & pinguibus præter ceram; Ita tamen vt consistentiam semper retineat molliusculam. Est enim litus, seu linimentum nil aliud quam vnguentum valde molle, ad cuius confectionem oleum quoduis assumi potest, modò viribus polleat proposito scopo accommodatis. Omnis autem ferè litus, cum paregoricus sit, & doloris sedatiuus, ex oleo, vt plurimum simplici, vel amygdalino, violato, aut simili, quod nullo excessu temperiem quandam immutet, conficitur

vt ad lateris dolorem in pleuritide sedandum hoc modo.

Litus ad
pleuritidem

℞. olei amygdalarum dulcium ʒij. ʒ. butyri recentis infusij. ceræ parum, fiat litus.

Ad odorem ex intemperie ab humore frigido natum, oleum quoddam assumendum est, quod pari gradu calefaciat, quo & humor ipse à temperie discessit. Idem est iudicium de intemperie contraria ad medicamentum viribus contrarium. Litus enim ad dolorem ex humore calido natum, ex oleis refrigerantibus parandus est, ut

℞. Olei nenupharini ℥ii. s. olei rosati ℥ss. ceræ ℥iii. liquecant omnia simul, & fiat linimentum. Vel sic:

℞. Olei violati ℥ii. mucaginis seminis althææ, vel lini, ℥i. ceræ parum, fiat litus, affectæ parti admouendus.

Intemperiei frigidæ, sic paratus litus applicabitur.

℞. Olei chamæmeli & anethi an. ℥i. s. axungia anatis. ℥i. ceræ ℥iii. liquecant omnia simul, & fi. litus.

De Muccaginibus. CAP. X.



VONIAM de mucagine sæpè fit mentio, quæ vel sola admouetur, vel aliis remedijs admiscetur, de ea quoque paucis, ut agamus, nunc nostrum suadet institutum.

Imprimis autem efficax est ad molliendum, humectandum, & dolorem leniendum, ut quæ ex glutinosis radicibus, & seminibus extrahitur: Nonnunquam & ad digerendum, & attrahendum, ut quæ ex gummis multis educitur. Semina ferè sunt lini, fœnugræci, maluæ, citoniorum, psyllii & althææ, cuius & radices aqua tepida macerata, multa mucilagine luxuriant. Multam quoque eructant ficus, gummi Arabicum, tragacanthum, & ictyocola, si per noctem in aqua, vel alio liquore infundantur, & postridiè recalfecta, exceptaque tela noua, aut sacculo fortiter exprimantur Sic extrahitur mucago bdellii, sagapeni, ammoniaci, galbani ad confectionem emplastri de mucilaginibus accessura.

Singulis autem aquæ vel liquoris alterius vnciiis, singulæ radicum, vel seminum vnciæ solent imponi. Si tamen crassior mucago expectatur, augenda seminum, aut radicum quantitas; si liquidior, minuenda, & dragma tantum seminis vnciæ liquoris infundatur.

Ad inflammationes quasuis proderit mucaginem adhibere sic paratam.

Mucago ad
inflammationem.

℞. Radicis althææ ℥ss. seminis psyllii ℥ii. infunde super cineres calidos, per diem integram aut dimidiam in aquarum nymphæ & solani ℥iiii. Deinde eliciatur mucago, dolenti parti admouenda.

Oculorum dolori à causa calida mitigando conueniet, & quæ sic elicitur.

℞. Seminis citoniorum ℥iii. infunde per noctem in aquarum nenupharis, solani & euphratis an. ℥i. s. manè fiat extractio mucaginis affectæ parti admouenda.

De Collyriis.

CAPVT XI.



EDICAMENTVM optimum non tantum affectui sed affectæ parti accommodatū est. Nō enim quoduis auribus, ori, naribus, vtero præscribitur, sed quod accommodatè singulis exhiberi potest. Oculis peculiaria quædam decernuntur, collyria dicta, quæ qualitatibus eximiis prædita, illorum vitijs eximie succurrunt. Cuiusmodi sunt, quæ Galenus libro de Oculis, & libris 4. & 5. composuit. medicament. loc. litteris mandauit, vt etiam Paulus & Aëtius multis in locis Generaliùs vero quædam οὐδὲν ἔχοντα dicuntur, quæ oculos nullo sensibili vitio affectos, male tamen suo munere fungentes corrigunt, & in integrum restituunt. Cuiusmodi sunt aqua communitalis, aqua Ephrasie, fœniculi, rosarum & aliquot Collyria à Galeno celebrata lib. 4. καὶ τῶν ἄλλων.

Sunt autem Collyriorum duo genera, Alia Sicca, ab Arabibus Sief, à Græcis ξηροκολλύρια, à Latinis Collyria sicca dicta, alia υγροκολλύρια, quæ humida sunt, & à recentioribus absolutè Collyria nominantur, seu quod ex forma liquida meliùs adhibeantur: vix enim oculi remedium aliquod durum crassumve perferunt, seu quod ex Collyrijs siccis fiant, ad cotem leuigatis, & in aqua, aut alio succo idoneo solutis. Ex humidis quædam habent consistentiam mellis, aut vnguenti molliusculi, vt thuria multa vstione & lotionè præparata, & cum succo fœniculi, aut alio idoneo liquore ad vnguenti formam redacta. Alia planè liquida sunt & fluxilia, vt quæ ex aquis euphrasie, rosarum, aut plantaginis cum exigua portione trochiscorum Alborum Rhasis parantur.

οὐδὲν ἔχοντα

Collyria sicca.

Thuriaz præparatio.

Hæc in vitreis lagenis reponi solent, vt solidiora in vasis creis.

Et vt numerosæ oculorum affectiones Collyrijs sanantur, sic eorum est materia multiplex, quæ desumitur, vt tota reliquorum medicamentorum familia ex mineralibus, animalibus & plantis, ex quibus vel pulueres fiunt, vel aquæ destillantur, vel succi extrahuntur, vel excrementa sumuntur.

Cùm visus acuendus est, paratur Collyrium Oxydorcicum, ex his quæ oculorum caligini medentur, vt sunt fella animalium, aquæ chelidonij & euphrasie, vel aqua communitalis, vulgò dicta, quæ sic parata optima est.

Aqua communitalis.

℞. euphrasie m. iij. chelidonij, fœniculi, verbenæ, fileris mōtani an. m. ii. rutæ, melissæ an. m. i. caryophyllorum, macis, piperis lō. gi an. ʒ β. macerentur per noctem in æquis partibus aquæ rosarum albarum & vini albi, tum fiat destillatio lento igne. Aqua seruetur pro Collyriis.

Ad palpebrarum scabiem pruriginosam, commendatur Collyrium Bruni sic descriptum.

℞. vini albi, aquæ rosarum an. ℥ i. β. aloës hepaticæ subtiliter pulueratæ ℥i. fiat collyrium.

Roborantia & refrigerantia collyria ad hunc ritè parantur modū.

℞. aquarum plantaginis & rosarum rubrar. an. ℥ ii. albuminis ouorum ℥ β. misceantur, agitenturque simul, & fiat collyrium.

Oculorum dolori sedādo vtiliter adhibetur collyriū sic descriptū.

℞. aquarum portulacæ & plantaginis an. ℥i. β. mucaginis seminis citoniorum in aqua solani extractæ ℥i. fiat collyrium.

Ad desiccationem, roborationem, & refrigerationem, collyrium sic paratum, efficacissimum est.

℞. aquarum pilosellæ, rosarum & euphrasie an. ℥i. trochiscorum alb. Rhasis ℥ j. tuthiæ preparatæ ℥ β. fi. collyrium.

Collyrium Eleisir, vulgò dictum, roborat oculum, & vueæ prolapsum impedit. Sic uerò conficitur.

Collyrium
Eleisir.

℞. antimonij, hæmatites an. ℥ x. acaciæ ℥ β. aloës ℥i. terantur subtilissimè, & cum aqua corrigiolæ fiant, trochisci. Ex quibus vsus tempore dissoluatur vnus in aqua rosarum.

Aliud cognominatur de plumbo, quod vim habet sarcoticam & consolidatiuam, ad huncque modum conficitur.

℞. plumbi vsti, antimonij, tuthiæ lotæ, æris vsti, gummi Arabici, tragacanthi an. ℥i. opij. ℥ β. fiat omnium puluis, & cum aqua rosar. fiant trochisci, quorum singuli vsus tempore diluantur in liquore quodam idoneo.

Collyrium
Lanfranci.

Ad vlcera venerea commendatur Collyrium Lanfranci, apud quem tamen inuenisse, mihi illius opera excurrenti nondum contigit. Eius descriptio à recentioribus datur sic.

℞. vini albi lib. i. aquarum plantaginis & rosarum an. q. i. auri pigmenti ℥ii. viridis æris ℥i. aloës, myrrhæ an. ℥ij. terantur subtilissimè, & fiat collyrium.

De Lacte virginali. CAP. XII.

Lac virginalē
cur dicitur.



A c virginalē ex his est, quæ iuniorum adinuenit sedulitas, qui non parum apud vulgus gloriam captant, cum ex duobus succis vnicoloribus & aqueis simul mixtis, lacteam quamdam substantiam, albā, viscidam & lentam instar lactis, oculis subiiciunt. Sic enim multi ingenij sui specimen exhibentes, quasi miracula facere crediti sunt, & soli naturæ secreta rimari. Dicitur autem lac virginalē, partim à colore, quem habet lactis, partim à consistentia & viribus, quibus pollet maximis, ad vitia cutis delenda quæ virgineum faciei colorem immutant. Est verò multi-

plex huiusce topici medicamenti parandi modus, sed vsitatio hac formula describitur.

℞. lithargyri subtiliter puluerati ℥iij. aceti vini albi optimi lib. ℞. misceantur, agitentur, & sic tres horas relinquantur. Dein panno villoso ita filtrentur, vt liquor infusus in excipulum subiectum guttatim stillet. Tum aquæ sic filtratæ alia aqua vel pluuiialis, vel fontana, cui parum salis fuerit solutum commisceatur: Ex vtriusque enim concursu lac prodibit virginalē.

Lac virginalē qui fiat.

Est & hæc vsitata parandi methodus.

℞. aceti albi optimi lib. ℞. lithargyri auri tenuissimè triti ℥j. bulliant simul ad consumptionem tertiæ partis. Colaturæ adde parum olei tartari, & fac lac virginalē. Aliud sic adhuc fit.

℞. cerusæ ℥℞. lithargyri ℥j. trochiscorum de caphura ℥℞. aceti fortissimi lib. ℞. macerentur tres aut quatuor horas, agitentur, filtrentur. Liquori extracto admisceatur aqua florum fabarum, vel plantaginis, aut rosarum, cui salis parum fuerit dissolutum, & fiat lac virginalē.

Valet plurimùm faciei rubori, herpetibus & aspredinibus cutis.

De Aqua aluminosa. C A P. XIII.



ERVM affinitas aliam aquam exhibet, ad multa eximie virtutis, quæ ab alumine, quod habet probasi, aluminosa nuncupatur. Eius confectionem cum multi succi ingrediantur, quos recentes habere melius sit, quam asseruatos, vix antè & post æstatem, paratur, sed ferè circa finem Augusti, aut initium Septembris.

Tunc enim agrestæ succus copiosus est, & acidissimus, quia immaturus, propterea aquæ huic parandæ magis idoneus.

Aquæ aluminosæ facultas.

Extrinsècus vtiliter adhibetur ad inflammationes, herpetas, & alias plerasque cutis infectiones cohibendas, detergendasque. Admota quoque super lingua per febres acutas nigricante, illius non modò scabritiem delet, sed calorem temperat, & ad colorem naturalem reducit.

Eius descriptionem vsitatiorē & magis probatam hic exhibeo, cui peritus medicus alia facilè poterit adiungere, si cuiusdam affectionis particularis natura ac conditio ita suaserit. Formula autem parandi talis est.

℞. succorum plantaginis, portulacæ, agrestæ, aluminis rupei an. lib. j. albuminum ouorum n. xij. agitentur omnia simul baculo aut rudicula, & postea destillantur in alembico.

Aqua aluminosa magistralis

Sunt qui præstantiorem reddunt ad Pityriasis & alias affectiones cutis, succos solani & limonum commiscentes, vocantque aquam aluminosam magistralē.

De Frontali CAPVT XIII.



FRONTALIA ἀνακόλλημα Græcè dictum, medicamentum est, quod fronti impositum, capitis dolore laborantes iuuat. Datur quoque sæpè ad illius ardorem extinguendum, & conciliandum somnū, cum per febres, perpetuæ vigiliæ vires deiiciunt, sanguinem corrumpunt, & mentem exagitant. Tūc enim salutare est, topico refrigerante & hypnōtico, super osse coronali admoto, dolorem lenire, feruorem minuere, sanguinem temperare, & fumos sursum repentes cohibere. Ad oculos quoque lipientes, aut fluxione obseffos, ex Nicol. Myrepso, vtile est, frontalia adhibere, vt decet confecta. Sed cauendum, ne cerebro pituitoso humectantia, refrigerantiaque frontalia adhibeantur, præsertim hyeme, ac senibus, cum ne quidem ipsis æstate conueniant, nec aliis quibuscumque frigidis naturis. Iuuenibus verò & biliosis, & calido morbo, qui molestissimum capitis dolorem inuexit, laceffit, tempore quouis admota profunt.

Quibus
frontalia
benè vel
malè con-
ueniant.

At verò puellis, quorum ossa cranij adhuc hiant, nec verticem obserant firmiter, minimè tutus est frontalium vsus: Atque horum præsertim reformidandus, quæ vel acetum recipiunt cerebro inimicum, aut qualitatem habent narcoticam, aut valde refrigeratorem, aut calfactoriam, aut alio excessu eximiam.

Profunt quæ primis gradibus quatuor qualitatum intemperiem quamdam immutant, vapores compescunt, sensus benignè sopiūt, & cerebrum roborant.

Frontalium
formæ va-
riæ.

Omnia autem frontalia sunt plūs, minusvè humida, vel prorsus sicca; humida, polyphormia sunt, & variam inter se consistentiam habent: vel enim forma vnguenti parantur, vel litus, vel Opiatæ, vel ceratomalagmatis, vt cum herbis intritis oleagina quædam superadduntur, & ex mixtura conficitur frontale.

Sicca quoque non vniformia sunt, sed ex foliis & floribus plantarum integris, vel pulueratis, & duplici syndone intersutis parantur.

Familiare est etiam mulierculis, quod fit hoc modo.

℞. foliorum lactuæ & betonicę minutim incisorum, rosarum, an. m. j. madeant in cxyrhodino, & fiat frontale.

Capitis feruori mitigando, & somnum conciliando valebit quod sequitur.

℞. conseruæ nenupharis ʒ. vj. conseruæ rosarum ʒ. β. florum papauer. alb. p. ii. pistētur simul in mortario cum paucō vnguento populeone fiat frontale.



CATAPLASMA Græcis & Latinis dicitur, medicamentum quoddam molle, quod dolori sedando, repellendo, molliendo, laxando, calefaciendo, pus mouendo, vacuando & digerendo extrinsecus tantum applicatur. Consistentiam habet pultis, à qua sæpè nomen assumit: Sed propriè loquendo, puls alimentum dicitur, cataplasma medicamentum topicum, quod non modo ex melle, cui incocta essent, vel mixta medicamenta scopo accommodata, paratur, vt olim ab antiquis solebat, sed ex radicibus, herbis, farinis, oleo & butyro: Atque nunc sæpè à clinicis mulieribus ex lacte, mica panis, oleo, & vitellis ouorum vtiliter fit, ad mitigandum, leniendum & concoquendum. Sic verò paratum cataplasma, pultem qui vocarit, vt pultem ex farina hordei, mucagine seminis lini & vitellis ouorum, cum Fernelio cataplasma, nusquam aberrabit. Vtriusque enim eadem est consistentia, inter vnguentum scilicet & emplastrum media, & quasi ex materiæ amborum mixta, vtriusque eadem ratio conficiendi & vtendi.

Cataplasma
est pultis
quædam
species.

Fernelius existimat veteribus cataplasma & malagma, idem esse. Galenus tamen medicamenta solum, quæ partes præter naturam induratas emolliunt, iuxta antiquorum sententiam nominat. Itaut medicamentum malacticum, seu mollitium, & malagma, non discrepare, nec rem diuersam constituere credibile sit.

Fiunt ergo cataplasmata ex radicibus, foliis, cauliculis ad putrilaginem coctis, farinis, pinguedinibus & oleis. Stirpes siccae, si expectantur in puluerem reducuntur tenuissimum: Si virides coquuntur, dum contabescant, pinsuntur, cribro traiciuntur: traiectis adduntur mucagines, pinguia, aut oleagina & aliquando farinae, atque denuò coquuntur, dum pultis crassitiem acquirant.

Ad doloris sedationem, & duritiei mollitionem hoc cataplasma laudatur.

℞. radicum liliorum & altheæ an. ℥ij. maluarum, parietariæ, violarum an. m. ij. coquantur omnia ad putrilaginem, pistentur, cribro transmittantur: Cribraturæ adde farinae lini ℥ij. olei lilior. ℥ij. si. cataplasma.

Cataplasma
anodynum &
malacticum.

Valde quoque emollit & dolorem quamuis mitigat, quod paratur ex seminis lini farinam in hydrelæo, ad iustam consistentiam cocta.

Ad serosos humores eliciendos, poros cutis aperiendos, & flatum dissipationem, valet cataplasma hoc modo confectum.

℞. radicis bryoniæ lib. j. radic. ebul. & cyclaminis an. ℥ij. mercurialis m. ij. coquantur ad putrilaginem in aqua cum quarta parte vini albi, terantur & cribro cernantur. Cretis adde pulueris baccarum lauri ℥β. puluer. sem. fœniculi, cumini & florum chamæmeli an. ℥. ij.

farinæ lupinorū & & fœnugræci an. ℥j. olei Irini quan. suff. fiat cataplasma.

Cataplasma ex pane cibario, syncomistum vocant, ad omnia si Oribasio credimus vtile est. Omnibus enim propemodum, inquit, inflammationibus conuenit, cū aqua & oleo rosaceo paratū. Ad multa quoque vtile est, quod ex fermento & oleo conficitur. Duri- tiem enim maturat, contusiones sanat, humores delitescences ad cutim attrahit, digerit, resoluit.

Formulæ cataplasmatum variæ apud auctores sparsim leguntur quas hîc recensere, vt operosum; sic non satis vtile, cūm paucio- rum exempla sufficiant.

De Catapasmatis, empasmatis & diapasmatis.

CAPVT XVI.

Cataplasma
quid.



CATAPASMATAPropriè dicuntur pulueres odo- rati, ex pluribus compositi, quia d' fragrantiam & suauitatem vestibis insperguntur. Pulueres quoque sic dici possunt, qui partibus corporis, vt stomacho, post litum, ad illius robur adhibentur; quemadmodum & qui ex pluribus aromatis ad condimenta parantur, nec non ad vsus alios, veluti sunt pulueres sarcotici ad carnem vlceribus generandam. Catheretici, ad hyper- sarcosim absumendam, epulotici ad cicatricem inducendam. Sed quia eiusmodi pulueres iam supra attigimus, de his ne verbum qui- dem effluxisset, nisi cataplasmatidis & catapasmatis paronomasia eò nos rede- gisset.

Paul.
cap. 13.
lib. 7.

Empasma
quid.

Diapasma
quid.

Similis vocum affinitas de empasmatis & diapasmatis aliquid enū- tiare, & differentiam, quæ inter vtrumque & cataplasma datur, aperire, nobis occasionem obtulit. Empasmata sunt, inquit Oriba- sius, quæ vt immoderati sudores, aut alia per halitum digestio co- hibeatur, aut cutis extremitas scarificetur, aut pruritu tentetur, ad- hibentur. Diapasmata, quæ, ad suauem odorem cuti aut toti corpo- ri conciliandum, forma quacunque aut pulueris, aut vnguenti, aut aut litus accommodata sunt. Catapasmata sunt, quæ admodum su- periore capite descriptum, & ad vsus dictos conficiuntur.

cap. 31
lib. 10.

Empasmata autem inseruiunt, vel profusioni sudorum sistendæ, qui immoderatè fluunt, nec critici sunt, & vires exoluunt naturæ, vel hydropicis, ischiadicis & orthopnoicis. Quæ sudorum eruptione compescunt, parantur ex gypso, myrtho sicca læuigata, malicorio, rhoë Syriaco, sorbis siccis, tritis, galla, acacia & similibus astringen- tibus. Quæ hydropicos, ischiade laborantes, & recta solūm ceruice spirantes iuuant, fiunt ex arena, face vini vsta, nitro, sale, sulphure, synapi, nasturtio, pipere, pyrethro, & similibus acribus, ex quibus dropaces

dropaces & synapismi, quorum eadem est cum empasmatibus agendi ratione parantur.

De Smegmatis, ac variis pulueribus Topicis.

CAP. XVII.



AD ventriculi, Iecoris, aut alius visceris robur post litum ex oleo conueniente solet inspergi puluis, roboratiuæ virtutis, vel puluis myrthi, vel balaustiorum ad stomachum nimis hiantem aut patulum post inunctionem rosacei, aut cytonini: Tum siquidem ea vis topici requiritur, quæ ceteriora contingendo simul interiora subeat efficacissimè. At aliter praxis suadet in Smegmatis vfu, quæ vix nisi arida & sola adhibeatur cuti, vel ad ipsam detergendam, vel erugendam, vel roborandam, vel humores illucruentes cohibendos. Vnicum pro multis sit exemplum ad roborandam & detergendam cutim hoc Smegma.

℞. malicorij, balaustiorum, rosarum, myrthi, gallarum, baccarum lauri, furfuris macrian. ʒ β. salis tosti, aluminis rupei, pumicis, an. ʒ ij si. omnium puluis subtiliss. cuti inspergendus. Smegma roborans.

Capiti roborando cephalicum Smegma parari solet, cuius materialia vel excipiuntur bombace & intersuuntur duplici linteo pro cucufa vel insperguntur supremo capiti ac toti capillitio. Sic verò parabitur. Cucufa,

℞. maioranæ, Betonicæ, stoechad. calamenti, Lauendulæ, rosarum an m. i. calami aromati. rad. Ireos florent an. ʒ ii. florum saluiæ & anthos an. p. ii si. omnis puluis pro Smegmate. Smegma cephalicum

Sunt qui pulueres Smegmaticos liquore quodam excipiunt suaueolente, & orbiculos aut pilas fingunt ad fragrantiam, potius quàm medicinales vsus.

A medicis qui totam chirurgiam inuenerunt, artem fecerunt & docuerunt, alij pulueres multi dantur, & ad chirurgicos vsus efficacissimè celebrantur, cuiusmodi est, hic puluis admodum simplex & sarcoticus, seu Incarnatiuus, què rubeum nominant.

℞. thuris ʒ ii. sanguinis draconis ʒ i. si. puluis alius eiusdem virtutis, sed efficacior & magis compositus à Rhasi probatur, cuius descriptio talis perhibetur. Puluis rubeus.

℞. sanguinis draconis, aloës, thuris. rad. Ireos, sarcocollæ an. partes æquales & fac puluerem. Puluis rhasis.

Alius maximè compositus maximeque ad incarnanda vlcera, vulnèraq; quæ carnem amiserunt, à practicis solet in hunc modum parari.

℞. sang. draconis, bol. armen. an. ʒ β. mastiches, olibani, sarcocollæ an. ʒ iiii. aloës lotæ, aristolochiæ rotund. rad. Ireos an. ʒ i β. fiat omnium puluis ad vsum dictum. Puluis incarnatiuus.

Fiunt & pulueres symphylici seu collectici, vulgo agglutinatorij ad vulnera potissimum vnienda & eorum labra cōglutinanda hoc modo.

℞. Mastiches, aloës, sanguinis draconis, colophonie, rad. sym-

phiti, bo. armen. balauſtiorum an. ʒi. ita terantur omnia vt laui-
tur atque commiſceantur.

Notandum obiter eſt medicamentum agglutinatorium medium
eſſe inter ſarcoticum & epuloticum, nam ſarcoticum ſiccatur tantum
gradu 1, agglutinatorium 2. Epuloticum 3.

Pul. Epu-
loticus.

Pulueres
catheretici.

Ad vulnera, vlceraque terſa & impleta carne ſigillanda, ac cute
veſtienda conducunt pulueres epulotici, quorum viſ aſtrictoria vt
plurimum vnionem efficit, & cicatricē cuti inducit, vt qui ſequitur.
℥ testarū oſtreorum, & concharum marinarum vſtarum, an. ʒ β.
batituræ æris, ceruſæ an. ʒ ii. plumbi vſti ʒi. fiat omnium puluis re-
nuſſimus.

Celebrantur adhuc à medicis & chirurgis pulueres catheretici,
quorum alij debiliores ſunt, vt alumen vſtum ad leuem carnis ero-
ſionem, alij fortiores vt veſicatorij ac ſeptici ſeu putrefacientes, vt
puluis cantharidum, & ranunculi, alij validiſſimi, vt puluis ſublima-
ti, arſenici, pyrotici, qui & eſcharotici dicuntur. Quia verò de re-
bus chirurgicis ſperamus Deo duce fuſiſſimè ſcribere de remedijs
ad chirurgiam ſpectantibus nihil nunc amplius dicemus.

De Synapiſmis, ſeu Phænigmis. CAPVT XVIII.



YNAPISMVS ſpecies cataplaſmatis quædam eſſe
dicitur: vtriuſque enim conſiſtentia ſimilis eſt, ſed
vires multum diuerſæ, quòd in ſynapiſmo ferè ſint
vniuſmodi, & perpetuò calefaciētes; In cataplaſma-
te, multiplicis qualitatis, quæ efficit, vt ad calefa-
ciendum, refrigerandum, emolliendum laxandū, &
alios affectus ſupra dictos præſcribatur. In acutis autē morbis raro,
imò nunquam adhibetur ſynapiſmus, nec in tabidis & colliquatis,
inquit Oribas. Sed in lethargicis, in catoche, in perfrictione quæ æ-
grè caleſcat, atq; in ſtupidis, & ſegnioribus naturis, vt ſenſus partis he-
bes excitetur, facultas affulgeat, calor excitetur, humor diſcutiatur.

Synapiſmi
conficiendi
modus.

Cōficiendi ſynapiſmi modus ex Oribasio & Aëtio, eſt huiuſmodi.
Caricas in aqua tepida pridie macerare oportet, poſtridie vehemen-
ter expreſſas contundere, dein acerrimum ſynapi per ſe terere, cari-
carum cremorem inter terendum paulatim affundendo, quo faci-
lius teri poſſit, non tamen fiat aquoſum. Tum in maſſas leues re-
digito, alteram ex caricis, ex ſynapi alteram. Et cū vehementem
ſynapiſmum volueris, duas ſynapi partes vni caricarum addito; ſi
mediocrem, vtriuſque partes æquas; ſi imbecillam, tertiam tan-
tū ſynapi partem duabus caricarum.

Si ex aceto paratur ſynapiſmus, inefficacior eſt, ac imbecillior, quia
ſynapi virtutem diſcutit acetum.

Linteum autem excipi debet ſynapiſmus, vt parti adhibeatur, quā
ſepè intueri oportet, vtrum ex illius admotione ſatis ruboris cōtra-

cap. 13.

lib. 10.

ca. 181.

tet. 1.

ſerm. 3.

xerit Alij enim citius, alij serius eius sensum percipiunt. Propterea certum temporis spatium, quo in parte manere debet, definiri non potest. Quod si longo temporis spatio synapismus cuipiam parti ad- motus non agat, nec cutis colorem immutet, spongiis aqua calida imbutis fouenda est, vt facilius intro facultas illius queat subire. Vt enim synapismus ad cutim excrementa possit euocare, hanc si non vlcerare, saltem rubrificare debet: vnde & phœnigmus hoc est, ru- brificans medicamentum solet appellari.

Phœnig-
mus.

Post sufficientem synapismi vsum, in balneum ducendus est æ- ger, à quo pars rosaceo illinenda.

De Dropace & Picatione. CAPVT. XIX.



Dropax topicum quoddam medicamentum est, in- terdum emplastri modo durum, interdum vt malag- ma molle, prout postulat vsus. Est verò dropax alius simplex, qui tantum pice & oleo modico paratur, vo- caturque *πίκσις*, id est, plicatio, alius compositus, qui scilicet, præter oleum & picem multa calefacientia recipit, vt pi- per, pyrethrum, bitumen, sulphur viuum, salem, cinerem sarment- torum.

Act. c. Conuenit autem maximè diuturnis morbis, inquit Aëtius, & om-
180. ter. nino ante, & post synapismū adhibetur: Ante, vt corpus ad synapi
1. ser. 3. præparet: Post, vt reliquæ affectionis exscindantur. Simplex sic & fit, & adhibetur.

Pix arida cum modico oleo liquatur, deinde calida adhuc cuti illi- nitur, & præarsis locis agglutinatur, & priusquam perfectè frigescat auellitur. Ea rursus ad ignem calfacta agglutinatur: & similiter prius- quam frigescat, auellitur: atque hoc sæpè repetitur.

Plicatio
quomodo
fiat.

Vtilis est assiduè vomentibus, cœliacis affectionibus, cruditati- bus, & partibus alimentum non sentientibus.

cap. 30. Compositior dropax fit ex calefacientibus enumeratis, cum vide-
lib. 2. licet partem quandam perfrigeratam ad pristini caloris bonitatem reducere oportet, & cum exsiccandi est opus, inquit Oribas. addi- tur sal, sulphur viuum, cinis sarmentorum: Si aperire, euphorbium & lymnestis, quæ alio nomine adarce vocatur. Singula autem hæc trita pici liquefactæ insperguntur.

Oportet autem dropacem calidum adhibere, crassitudinem ha- bentem pro ratione virium ægri, pilis antè, vt dictum est, abrasis, in locis quibus adhibetur.

Act lo- Porro dropax confertim auulsus, spiritum remissum firmat, ad su-
codic. 10. perficiem reuocat, & propriorum operum commonefacit.

Nonnunquam & adhibetur psyllothri vice, ad euellendos pillos

capitis achoribus obsessi. Malignum enim foetidum ac contagiosum istud capitis vlcus, quod mulierculæ tineam, Arabes asaphari vocant non nisi euulsis, aut sæpius abrais capillis perfectè sanari potest.

De Psyllothis. CAP. XXI.



SYLLOTHRVM ad cosmetica medicamenta, quæ scilicet corporis cultui & ornatui inserviunt refertur nec vnguenti aut emplastri, aut alicuius specialis formæ genus est, sed depilatorium medicamen, quod forma qualibet adhibitum, hispidam partem, pilos ac lanuginem, perdendo, glabram reddit. Om-

ne autem psyllothrum propriè sumptum, cum erodentem & vstoriam habeat facultatem, non modo pilos attenuat, sed auellit, & ad tempus partem omnino denudat. Propterea non nisi magna cautione ac prudentia adhibendum est. Si enim cuti diutius immoretur, præsertim quod vstorium est, cutem ulcerat, pustillas excitat, & instar Pyrotici adurit, vel vt escharoticum erodit. Ex his quæ partes glabras tutò faciunt, vtilè est, inquit Oribasius, lixiuium stillatitium, itemque arsenicum, sandaracha, & calx viua. Aliquid autem eorum, quæ vehementer exulcerant, alicui imbecilliori miscendum est, cuiusmodi est psyllothrum sic à paulò Æginet. descriptum.

Psyllothrū.
Pauli.

℞. Asellorum domesticorum ℥ij. sandaracæ ℥β. calcis viuæ ℥j. aceti veteris, lixiuij ficulnei an. lib. β. coquito in olla ad consistentiam linimenti.

Notandum verò domesticos asellos animalcula esse, quæ sub vasis aquarijs stabulantur, & in globulos se conuoluunt, à Græcis *ovoi* à Latinis vulgò millepedæ; à Gallis Cloportes nominantur.

Vt pili cadant, nec denuò renascantur, Rondeletius hoc imperat psyllothrum.

℞. Auripigmenti, ouorum formicarum, gummi Arabician. ℥β. gummi hederæ ℥ij. cum sanguine vespertilionis, vel succo hiosciam, fiat linimentum exarte, cuius portio adhibeatur loco nudando, abrais prius capillis.

Ob insignem quam habet vim ad perdendos pilos vitis alba seu bryonia, ob Oribasio & Aëtio psyllothrum nominatur.

Efficacissimum est, & quod ad hunc modum paratur.

℞. calcis viuæ ℥ij. auripigmenti ℥β. lixiuij fortis q. sufficit. Coquantur donec immissa pluma depiletur, & fiat linimentum, quo partes pilosæ inungantur, & per horæ quadrantem sinatur, dein tergentur, tum locus aqua calida lauatur.

Psyllothrū
Turcarum.

In Turcarum dominio minerale quoddam Rusma illis dictum inuenitur, quod agendi præstantia omnibus psyllothis iurè debet

cap. 13.
lib. 10.

cap. 7.
lib. 4.
de loc.
affect.
cap. 52.
lib. 3.

anteponi; licet enim admodum sit temperatum, nec partem, cui adhibetur vret, pilos tamen celeriter & sine dolore perdit, & loca læuia, glabraque reddit, nullo remanente pilorum vestigio. Vt ad votum applicetur, debet in tenuissimum pollinem læuigari, & cum portione media calcis viuæ in aqua dilui. Hanc mixturam Turcicæ mulieres paulò ante balnei, aut hypocausti ingressum partibus ob- scænis & axillis adhibent, quas depilare & perpetuò glabras mane- re desiderant. Est autem rusina scorix ferri multum simile, sed le- uius, nigrius & quidpiã exustum referens, vt ex Bellonij obserua- tionibus narratur.

Rusina
quid.

cap. 33.
lib. 3.

De Vesicatorijs. CAPVT XXI.



AB effectu quem præstat parvulum quoddam medica- mentum externum, vesicas scilicet excitando, vesicato- rium nominatur. Est autem paulò vehemētius phænig- mo, seu synapismo, qui tantum superficiem cutis rubri- ficat, & imbecillius pyrotico, quod eam ipsam adurit. Admotum enim cuti, epidermidem attollendo pustulam excitat, qua rupta, serum effluit: vel paucū, si in corpore sicciore, ac parte superna ad- hibetur, vel multum, si in humidior, vt in hydropico, ac in parte decliui, vt in tibia. Rupta enim cute, aliquando fluctuantis in ab- domine & cruribus aque portio delabitur, & per vlcusculum, tan- quam fonticulum perenniter effluit, sed vlcus sæpè dysepuloticum relinquit.

Prodest verò ad Odontalgiam, ponè aurem dentis dolentis vesti- catorium ad mouere, vt aliquando ad pedium, in gonagra, podagra- que, sed pituitosis magis quam biliosis conferre creditur. Vidi ta- men herpetem vesicatorio admotoperfectè sanatum, qui nullis aliis præsiidiis cesserat. Marcellus laudat ad lichenem, & alios affectus cutis sanandos, si vulnere ex morsu ferarum inflicto, & bubonibus malignis applicetur vesicatorium: ex alto virus euocat; & facilitio- rem ac tutiorem curationem efficit. Rustici parare solent ex sola ra- dice ranunculi intrita & admota: Pharmacopæi ex cantharidibus pulueratis, pauco aceto & fermento mixtis: Optimum est quod ex earum puluere, pauco gummi elemi excepto conficitur. Sic quoque rectè fit.

Vesicato-
riorum vti-
litas.

Vesicato-
rium rusti-
corum.

cap. 19.
lib. de-
remed.

℞. euphorbij ℥ss. piperis gr. vj. cantharidum præparatū ℥ss. fiat omnium puluis, qui excipiatur pauco fermento veteri & aceto, fiat massa mollis, de qua exigua portio extendatur super panno se- riceo, & fiat vesicatorium.

De Pyroticis, seu cauterijs. CAPVT XXII.



ECTE scribitur ab Hippocrate, quæcunque non sanant medicamenta, ea ferrum sanat, quæ ferrum non sanat, ea sanat ignis; quæ ignis non sanat, ea incurabilia putanda. Sæpè enim morbi cuiusdam feritas tam sæua est, vt nullo sit medicamento locus, sed vel pars secanda, vel vrenda, vel vtroque modo curanda. Vritur sæpè ferro candente, sed cùm hocce remedium etiam fortissimorum terreat animos, medicorum sedulitas illius tanquam vicarium adinuenit, quod ab agendi vi & effectu, pyroticum nominatur. Ignis enim efficaciam præstat, quando ipsius ad-motione, caro viua demoritur, mortua absumitur, & pars sana perforatur, vt morbidæ excretionem suscipiat; morbidæ aperitur, vt proprium excrementum eructet. Sic abscessus cauterio diuiditur, vt pus extrâ profiliat, sic rumpitur vomica, sic pertunduntur bubones, vt quodque virus euomat.

Pyroticum
cur dictū.

Cauterium
ad herniā.

Ad humoris rheumatici resolutionem, vel diuersionem, in diuersis partibus corporis adhibetur pyroticum, modò in capite, modò in brachio vtroque, modò in tibia alterutra. Admouetur quoque ad curationem enterocèles super ea peritonei productione ampliore qua spermaticæ venæ feruntur ad testes, vt caro noua in locum deperditæ succenturietur, quæ viam intestino descendenti intercipiat, & sic in loco proprio, intestinum labi solitum contineatur.

Hac curandi methodo multi circulatores incautos euirant, dum vasa seminalia simul cum productione pyrotico identidem repetito adurunt.

Pyroticorū
materia.

Desumitur autem pyroticorum omnis materia ex adurentibus, seu causticis, quæ scilicet quartum caloris gradum superant veluti est calx viua, arsenicum, sublimatum, tartarum, auripigmentum, vitriolum, nitrum, & lixiuium forte, vt quod paratur ex cineribus sarmentorum.

Est verò multiplex pyrotica conficiendi modus, quisque enim sua, suoque modo parata seruat, quæ omnium præstantissima proficitur. Noui barbitonsorem omnium maximè ignarum, qui sublimatum tantùm admouebat, pauco vnguento ægyptiaco subactum, omniumque pyroticorum securissimum mordicus contendebat.

Marianus in sua Chirurgia plurimi facit cauterium quoddam ex Ioan Vigonio surreptum, quod sic describitur.

℥. Lixiuij lib. vj. saponis, vitrioli Romani an. ℥j. bulliant omnia simul in vase æneo ad aquæ consumptionem.

Quod in fundo remanebit, colligatur, atque ex eo fiant cauteria diuersæ magnitudinis pro arbitrio.

Apho-
ris. ult.
lib. 7.

Cardanus ex solo sapone & calce mixtis, tritis, & ad vnguenti consistentiam subactis, cauteria sua conficiebat; Nunc verò parantur ad ignem, & formam nanciscuntur solidiorem, & magis idoneam. Ut hoc modo.

℥. Calcis viux lib. i. salis nitri ℥j. infunde per diem integrum in lib. iij. lixiij ex cineribus vasorum vinariorum, vel herbarum calfacientium parati: Subinde baculo tota mixtura agitetur, postridiè coletur, ter, quatèrque, dum aqua clara euaserit, quæ æneo vase excepta coquatur ad ignem luculentum ad aquæ consumptionem, non tamen ad perfectam lentoris exsiccationem. Tum ex ea massa fiant cauteria multa multiplicisque magnitudinis, quæ in vase vitreo oris angusti diligenter operculato ad futuros vsus asseruentur.

Sic adhuc rectè ad hunc conficiuntur modum.

℥. Cineris sarmentorum lib. iiii. salis gemmei ℥iii. calcis viux lib. j. β. infunde per horas quatuor, aut quinque in lib. xv. aquæ pluuiæ omnia simul, ac sæpè agitando: Tum bulliant parùm; Atque cùm tota planè mixtura refrixerit, sexies. aut septies per linteum satis crassum coletur. Colatura limpidissima excipiatur ærea pelui, tamdiuque concoquatur, donec in ipsius fundo relinquatur petrea quædam materia, ex qua pyrotica variæ magnitudinis formentur.

Inter Parei farragines cauterium quoddam inuenitur, ridiculo nomine, sericeum, dictum, cuius vanam pollicitationem cùm effectus improbet, eius descriptionem subdicebo.

De Cucufa, vel potius pileolo medicamentofo.

CAPVT XXIII.



EGMEN illius capitis simplex industriosè factum, quo sanorum & ægrorum caput operitur, noctu cucufa nominatur, præsertim quæ ex oblongo fit linteamine, cuius extrema duo consuuntur, & altera parte, quæ patula esse debet, relicta, altera colligatur. At talis cucufa simplex, vix nisi suffitu medicamentofo esse potest, quod medicam materiam concipere nequeat.

Nam quæ duplici Syndone, bombace & pulueribus intersutis ad capitis formam artificiosissimè concinnari solet, pileus dicendus est: qui ob varia medicamenta, vt decet, quibus infarcitur, varijs affectibus capitis, maximè frigidis competit & præcauendis & curandis. Nam quibus cerebrum humidius est, sub Autumni finem & antequam hyemis rigiditas sæuiat, corpore repurgato, tutum est, medicamentofo pileo caput noctu potissimum obualare & velare. Non solum enim ipsum a frigore securiùs tuetur, sed halitu caphalico & suauitatem mētis roborat & animales spiritus, qui odore recreantur, reficit. Ad capitis à frigore custodiendū & robur sic parabitur.

℥. Baccharum lauri, & myrthi an. ʒ β. ligni rorismarini, rhodiæ radic. Ireos an. ʒij. ozimi, saluæ, lauendulæ, rosara. an. pij corticis arantiorum cinnamomi. an. ʒi. fi. omnium puluis, qui exceptus bō-bace, duplici lintheamine inuoluatur, interbasteretur, & in cucufæ aut hypopilei formam concinnetur; Atque eo noctu, diuque caput tegatur.

In capitis doloribus ab intemperie frigida natis, alij pulueres competunt efficacioris virtutis, quibus infarcta cucufa ex dupla syndone concinnata, & capiti adhibita valdè conducet: Calorem namque natium fouebit, intemperiem cerebri frigidiorē emendabit, & ad salubriorem valetudinis conditionem emendabit. Ad hos effectus plurimum valebit, quæ hoc modo instituitur.

℥. Ciperi, ireos, corticis citri an. ʒ β. benjoin Styracis calamit. an. ʒi β. cariophyllorū, pip. lōgi an. ʒi. maiora. stēchad. vtriusq; rorismar. p. ii. schœnāti. ʒii. fi. puluis. Excipiatur cotone, aut tomento laneo, tersuatur xyliño duplici & fiat cucufa vel potius hypopileum.

Semicucufæ.

Si cui magis dolitet pars capitis anterior vel posterior, dextra vel sinistra, ei pars ea cucufæ erit adhibenda, quæ maiorem specierum copiam admiserit. Inæqualiter enim sæpè dispergendus puluis, pro partium affectarum discursione; quæ dum omnes æquè diuexantur æqualem pulueris quātitatem poscunt sinion æque inæqualem, Ita ut nonnunquam Semicucufa tantum concinnanda hoc est, media sui parte tantum medicamentosa, cum media, ceu alterutra capitis pars rātum afficitur.

Puluis violeteus, vt & Cyprius vulgò dictus, qui suo vapore suauis, & cephalico facultatem animale soletur, cucufis offerciendis & conuenit & conducit. Cum humores tenuiores sunt & perenni fluore partes subiacentes lacessunt, compescendi pulueribus, ex quibus grauidatur Cucufa, stipticis & condensantibus, vt rosis, balauistiis, nucibus cupressi, cortice quercus, baccis myrthi, & similibus.

De Scuto medicamentofo. C A P. XXIV.



TOPICA medicamenta pro partium quibus adhibentur figura & magnitudine formantur, ac variegantur: magnis maiora debentur, minoribus minora: sæpè oblonga, vt quæ regioni lienis apponuntur, rotunda, vt quæ vmbilico; quadrata, quæ lumbis; triquetra & scuti forma, quæ ventriculo: ipsius enim inæquali figuræ aptius accommodatur hoc inæquale topicum, quod Scuti formam, ad gratiam magis quàm necessitatem emulatur.

Varijs autem modis, variasque ob intentiones medicum scutum instituitur. Vel enim ex pulueribus stomachicis lintheo duplo interfutis; vel ex emplastro, aut Cerato, aut malagmate quodam deside-

ratis

ratis viribus dotato formatur. Quod pulueres tantum stomacho benefacientes admittit, mulieribus quidem & viris animo minus masculis magis aridet, suas tamen ignauis vires promit. Quod verò ex cerato, vel emplastro super aluta extenso comparatur, proximè cum epigastrio superponatur, multò potētius, ac citius erigit ac efficit quicquid est efficere natū. Vtriusq; formulas dabo, vt hinc seligat vel medicus vel æger, utrū hic magis cupierit, aut ille magis probarit. Quod ex siccis eustomachicis desideratur hoc modo parandum.

℞. absynthij & menthæ vtriusq; flictorū an. ℥ii. macis, Caryophyllorū, cinnamomi an. ℥i. galangæ, piperis an. ℥ ss. fiat omnis puluis. Ex quo, gossipio & duplo linteo, fi. Scutum, quod euersum stomacho superponendum. Ex duobus linteis quod immediate carnem attingit, sericeum esse solet, aut lineum, sed semper textura rarum, exterius densum aut magis compactum ventriculum frigidiorē calefacit & roborat & coctionem iuuat.

Eadem præstant, atque efficacius, quæ ex Ceratis & Emplastris stomachicis lib. 5. antidotarij nostri descriptis, parantur. Conferunt enim Cardialgias per consensum ventriculi, ipsius supinitati per quā os superius laxius est & ferè inuertitur, nec arētē cibos amplectitur, apepsiæ, & imbecillitati, atque aliis pluribus symptomatis, quibus sæpè diuexatur. Sic verò facilè, & citò Scutum, dum occasio quædam vrget, habet.

℞. Cerati stomachici dis. Mes. aut. Emplastri de mastiche ℥i. extendatur super Corio, & fiat Scutum, regioni Stomachi adhibendum.

Ex emplastro Stomachico nostræ descriptionis fiunt Scuta, ad roborandum & calfaciendum ventriculum frigidiorē & imbecillū.

Fiunt & Scuta malagmatica efficacissimæ virtutis hoc modo.

℞. carnis citonior. condit, ℥ii. crustæ panis tostæ & vino generoso maceratæ ℥i. nucis mosch. ℥i. caryophyll. ℥ ss. piperis longi ℥i. pistetur simul cum oinomete, vel vino absynthite, & fi. malagma, quod extendatur super aluta, & fiat Scutum.

Ne ingrunos citius abeat parum olei mastichini, aut de Absynthio poterit addi. Opium est quod ex cydoniato fit trito cum pauco oleo nucis moschatæ & puluere rosarum. Abquot guttæ balsami orientalis, aut saltem Peruiiani, commodo multo permiscuntur. Exigua enim quantitate egregios præstant effectus.

Scutū acidū

Supinitas
ventriculi
quidScutum
emplasticū,Scutum
malagma-
ticum.

De Scuto. CAPVT XXV.



ENTRICVLI intemperiei frigide, ac imbecillitati multa medentur tam assumpta, quam admota. Assumuntur blanda purgantia & eustomachica, vt pilule ex aloë, & rheo, aromaticum rosatum, & pulueres digestiui, vulgò, dicti.

Admouentur calefacientia & roborantia, vt litus, fofus, de quibus supra, & scutum de quo nunc agendum.

Scutū cur
sic dictum
& cui parti
accommo-
datum.

Sic autem vocatur medicamentum quoddam ventriculo peculiare, quòd scuti formam habet, illiusque calorem suscitatur, robur adauget & coctionem iuuat admotum.

Concinnatur interdum ex emplastro quodam stomachico, super aluta extenso & admoto, & aliquando ea parte qua proximè carnem contingit, raro syndone inuoluto.

Sæpius tamen fit ex arida materia, quæ ventriculo confert roborando, crassiusculè trita, bombace excepta, & duplici linteo ad scuti formam confuta.

Materiam illam copiosissimā nobis suggerit calefacientium & roborantium vberriima seges, inter quæ ea potius teligenda, quæ speciali dote ventriculum respiciunt, vt nux moschata, macis, cariophylli, calamus aromaticus, schœnanthum, rosæ, menta, absynthium, & alia multa, quæ suauis odore spiritum recreant, & amico calore iuuant cōcoctionē. Sic autem parari potest, scutum viribus ad dictos vsus efficacissimum.

Scutum
roborans
& calefa-
ciens.

℞. cyperī, ligni aloës, calamiaromatici an. ʒi. schœnanti, cinnamomi, cariophyllorum, nucis moschatę an. ʒ. ʒ. macis ʒi. rosarum rubearum, maioranę, absynthij, mentę an ʒii. saluię ʒi. fiat omniū puluis, qui corone moschato exceptus & intersusus geminis linteis, in scuti formam concinnetur.

Minore sumptu confici poterit quod sic describitur.

℞. galangę, ireos, piperis, an. ʒ. baccarum lauri, cumini an. ʒ. ʒ. absynthij vtriusque, mentę, saluię & rorismarini an. m. ʒ. fiat omniū puluis, excipiatur carpto grossipio, & fiat scutum regioni ventriculi admouendum.

De Cucufa, & Semicucufa. CAP. XXVI.



CVM cerebrum sit velut magna glandula Hippocrati, & caput sit pituitæ sedes ac locus: Instar enim cucurbitulæ trahit, magna congeries humoris frigidi in toto capite solet asseruari, qui nisi medicamentis idoneis vacuetur, aut perennis illius generatio impediatur, ad membra subiecta, puta fauces, pulmones, thoracem, & reliquas partes inferiores delabitur. Multi tamen adeò medicamentavacuantia auersantur, aut tanta cerebri frigiditate laborant, vt etiam repurgati, sepè de capitis grauitate, ac catarrho conquerantur, maximè si crepusculo sese commiserint, aut subdiu caput pauculo tempore nudarint.

Cucufæ capiti sunt peculiares.

Post igitur vniuersalem purgationem, ad robur capitis, ad frigidam eius intemperiem, ad dolores inde genitos, ad destillationem sistendam, ex gossipio pulueribus cephalicis consperso, & duplici linteo interfuto, cucufa capiti apta ac conueniens, instar pileoli formatur.

Omnis porrò materia puluerum, ex quibus infarciuntur cucufæ, non ex stirpibus siccis tantùm pendet, sed ex mineralibus & animalibus quædam sæpè mutuantur, quæ multum adferunt, vt suauitatis, sic vtilitatis.

Suauis & vtilis est puluis ad cucufas capiti roborando aptandas, qui sic paratur.

℞. calami aromatici, schœnanthi, ireos an. ʒi. baccarum lauri ʒij. styracis, benioini an. ʒβ. cariophyllorum, cinnamomi an. ʒi. masticis ʒj. maioranæ, rorismarini an. ʒij. moschi ʒβ. fiat omnium puluis, qui excipiat bombace ad cucufam.

Puluis ad cucufas.

Quibus non licet propter rei familiaris angustiam, cucufas sic paratas gestare, minore sumptu conficiuntur, hoc modo.

℞. betonicæ, melissæ, saluiæ, stœchados vtriusque, rorismarini an. m. β. ligni lauri. ʒij. cumini ʒj. fiat omnis puluis ad cucufam concinnandam.

Is quoque puluis ad eosdem vsus tutò ac fœliciter capillis inspergitur.

In summa, vna est & eadem cucufæ & scuti parandi ratio; Sed illius forma, capiti adaptatur, huius stomacho: vtriusque facultas parti cui destinatur iuuandæ accommodanda: stomachica stomacho: Cephalica, capiti, cui astringentia quandoque miscemus, dum catarrhos sistere consilium est.

Et vt cucufa totum cranium inuoluit, sic semicucufa tantùm dimidium: vel cerrè puluis medicamento sus vni tantùm parti, quæ scilicet malè habet, adhibeatur, & cum bombace interbastetur, vt loquitur vulgus, ad semicucufam.



Cum minutula semina, ac etiam paulò maiora, magna ex parte integra & sicca, ex vsu sint medico, vixque per se sola partibus corporis possint adhiberi, ante illorum vsum sacculo includuntur, vel magno, vel paruo, pro partis cui adhibetur conditione. Ad auris tinnitum non nisi paruus admodum vsurpatur; Ad colicum dolorem & Tympanitem, magnus, vt qui sæpè totum abdomen operiat. Eius magnitudo qui regioni cordis adinuetur, proportionem quadam illi respondere debet, vt nec multò maior, aut minor concinnetur: Cuiusmodi sunt, qui ex cardiacis & alexiterijs pulueribus parantur, & tempore pestillenti super cordis regione, ad illius & facultatum tutelam, gestantur.

Fomenta
sicca.

Sunt autem vel sicci, vel humidi; Sicci alio nomine à veteribus, fomenta sicca vocantur, apud quos idem est vsus sacculorum & fottuum. Adinuentur multis corporis partibus, capiti, cordi, ventriculo, iecori, lieni & vtero, sub eadem forma, quadrata nempe, quæ tamen oblonga esse debet, instar linguæ bubulæ, dum lieni; vt scutiformis, dum ventriculo adhibetur.

Vt autem equabilis sit materiæ per omnes sacculi partes dispensatio, is transuersim filo acu traiecto, consueendus est. Qui cordi applicatur ferè sericeus est; qui reliquis partibus, lineus, aut cannabinus sed rara filorum serie contextus.

Ad refrigeratos artus, ad flatus dissipandos, ad humores euocandos & absorbendos, sacculi non nisi calentes adhibentur, veluti sunt, qui ex seminibus frixis, & vino aut aceto irrigatis fiunt, vt ad colicum dolorem, & Tympanitem hoc modo.

sacculus ad
Tympanitē
& colicum
dolorem.

℥. millij lib. ss. baccarum lauri contusarum ℥iij. sem. fœniculi, aneti, cumini. an. ℥j. salis communis ℥ij. ocymi, maiorani. an m. ss. torresiant omnia simul in sartagine, & calidiora recondantur, in sacculo, qui affectæ parti inducatur, quique refrigerens denuò calefiat & adinuetur; vel duo simul parentur, vt vicissim adinbeantur.

Ad cordis affectus eximie est virtutis sacculus hoc modo paratus.

℥. radicum angelicæ, ireos, enulæ campanæ, cyper, gentianæ, tormentillæ an. ℥j. trochiscorum de caphura, benioin, styracis calaminatæ an. ℥ij. aliptæ moschata, ligni aloës santali citri. an. ℥ss. macis, cariophyllorum, schœnanthi an. ℥i. granorum kermes, corticis citri siccæ an. ℥ii. fiat omnium puluis crassiusculus, qui exceptus sacculo sericeo regioni cordis adinbeatur.

Vix probantur sacculi sicci ad pleuritidem, etiam liquoris cuiusdam vapore madidi, præstiterit fotus humidus applicare de quibus supra.

Ad capitis & stomachi affectus, cucufæ, frontalia, & scutum imperantur, cum tamen lethargum, apoplexiam, Carum, aut sopitos sensus excitare consilium est, sacculi magis conuenient sic descripti.

℞. cyperi, galangæ, cariophyllorum, radic. angelicæ, baccarum lauri, cumini an. ʒij. saluiæ, maioranæ, betonicæ, stæchados vtriustque, lauendulæ an. m. j. fiat omnium puluis crassiusculus, excipiat duobus sacculis interbastatis ad caluarię frictionem. Sic enim magis conducit duos habere sacculos, maxime cum calidos ad mouere proponimus, vt dum vnus adhibetur, alter paulatim calefiat, & vicissimalter alteri succedat adhibendus.

De Dentrificijs. CAPVT. XXVIII.



DENTES permultis vitiis obnoxij: Eos enim nigredo deturpat, caries absumit, laxitas tremulos facit, dolor anxie laceffit. Nigredine præscribuntur dentifricia, laxitati astringentia, cariei detergentia roborantiaque, dolori mille remedia. Quisque enim expertum ad Odontalgiam se habere secretum profitetur. Sed accidit sæpè, vt quod semel profuit, postea irritum esse, & interdum obesse comperiatur.

Hip. poc. lib. 5. & 7 epid. Ægrius autem ferunt multæ mulieres, dentium nigredinem quàm dolorem, qui licet à plebecula, tanquam momenti nullius affectio despiciatur, filio tamen Metrodori maxillę marcor superuenit, exciderunt dentes molares & ipsa maxilla.

Historia.

Porro dentibus extergendis & dealbandis dentifricia à medicis præscribuntur, eaque forma multiplici, vt pulueris, opiata, linimenti, sed vñtatiõra forma pulueris dantur, vt.

℞. ossis sæpæ ʒj. coralli albi, cristalli an. ʒj. cornu cerui, ligni lentiscian. ʒii. fiat omnium puluis, quo fricentur dentes.

Parem habet vim dentibus dealbandis dentifricium hoc modo descriptum,

℞. scobis eboris, pumicis, cornu cerui an. ʒi. coralli ʒiii. margaritarum ʒi, cariophyllorum, cinnamomi, rosarum, rois marini an. ʒi. fiat omnium puluis pro dentifricio.

Varia dentifriciorum formulæ,

Forma opiata dentifricium sic imperari potest.

℞. dentium equorum vstorum, aluminis, coralli albi an. ʒi. ossis sæpiæ, pumicis an. ʒi. salis vsti ʒii. macis, cariophyllorum, lentiscii an. ʒß. fiat omnium puluis, & cum melle rosato, fiat opiata, qua mane fricentur dentes, & postea vino abluantur diluto.

Quibus magis arridebit dentifricium forma linimenti, sic parabitur.

℞. putaminum ouorum vstorum, cornu cerui, cristalli an. ʒi.

fantali citrini, lentiscian. ʒß. radicis ireos ʒj. moschi ʒß. fiat omnium puluis tenuissimus, & cum syrupi rosarum siccarum quantitate sufficiente fiat dentrificium liquidiusculum, quo manè dentes circumliniantur.

Sunt qui forma trochiscorum parant, quibus exsiccatis & induratis dentes sæpè fricando detergant, expoliunt, & candidiores reddunt.

De Odoramentis. CAP. XXIX.



ON abs re scipit Hippocrates, in medico præter cætera, cultum artificialem in vestitu & odoramentis suauibus requiri, quibus tanto solet æger delectari, quanto his offendi, quæ vel ingrata sunt, vel nimis fragrantia. Ea siquidem auersantur multi, quod caput vel repleant, vel molestè feriant, & cephalalgiam inferant: Contrà verò suauissimi halitus ex rebus odoratis prodeuntes, vterum, ventriculum, cor, & cerebrum multum recreant. Cuius rei rationem reddens Galenus, & proportionem constituens odoratus ad gustum, sic libris simplicium loquitur: Quæmadmodum sapes grati & familiares, iidem quoque & dulces sũt; de sym- ingrat, nec dulces, nec familiares: Sic odores familiares spiritui animal, iidem quoque grati & suaues sunt. Qui verò non familiares non suaues sunt, & malè olentes. Atqui vt dulcia temperata sunt, Galeno, sic odorata suauiamoderatum habent calorem, vt placet Scaligero.

*Initio
lib. de
medico.*

Sapores
dulces, gra-
ti.

Odores
qui grati.

*cap. 6.
lib. 1.
de sym-
pt.*

*caus.
cap. 21.
lib.*

4. de

*simpl.
med.*

facul.

cap. 10.

*lib. sim-
lib. 1. de*

caus.

plant.

cap. 10.

lib. de

instru.

odorat.

cap. 24.

lib. 8.

de hist.

animal.

Quæ cum ita sit, odores suaues grati erunt cerebro & partibus principibus. Quædam tamen odorata tertium caloris gradum attingunt, vt cinnamomum, cariophylli, calamus aromaticus, verum his non vtimur nisi parua quantitate, aut his admixtis quæ calorem illum contemperant: Odorata namque magna quantitate naribus obiecta, grauem odorem & cerebro noxium spirare solent, quæ minima quantitate recreant, quod vnitus odor, & grauis tempere- tura ære ambiente, aut rerum aliarum permixtione. At malè olentia quantumuis ære temperentur, non solùm qualitate sua, sed etiã substantia cerebro, & partibus neruosis aduersantur ex Galeno. Quod confirmat Aristoteles dum scribit mulieres ad odorem lucer- nae extinctæ abortire.

Malè olen-
tia ingrata
& facultati-
bus noxia,

Cum igitur suaui rerum odoratarum halitus sit consocialis spiribus, illorumque familiare pabulum, medicus non modò captabit gloriam apud vulgus si fuerit vnguentatus, sed etiam ipse aliis odoramenta præscribet, ad spirituum robur & custodiam sanitatis.

Ea verò vel forma pulueris, vel vnguenti, vel pomi, vel trochiscorum describuntur. Forma pulueris diapašina, vel odoramentum sic fiet suauissimum.

℞. Calami aromatici ℥iij. ireos florentiæ ℥ij. styracis, calamintæ, Puluis su-
benjoin an. ʒj rosarum ℥ij. cariophyllorum ʒß. moschi, ambra, an. uissimus.
℞ß. si omnium puluis, accuratè seruandus, ne vis eius exhalet.

A recentioribus celebratur puluis quidam, Cypreus vulgo dictus, Puluis Cy-
vt & violetus, cuius cum variæ descriptiones dentur, quisque pul- prius.
uerem odore suauissimo fragrantem, Cypreum, vel violeteum no-
minat. Cyprius quasi Cyperinus sic parari solet.

℞ Cyperi ʒvj. ra. Ireos florët. ʒß. Styracis calamitæ, bejnoin. an. ʒiij Puluis Cy-
Rosarum rub. ʒv. ambra grisea, moschi an ℞ß. si omnium puluis, prius.
simul miscendus.

Qui ab insula cypro in qua multa aromata nascuntur puluerem
hunc dici contendunt, ex illis ipsis solis suum puluerem parent.

Qui violeteus vulgò vocatur suauissimè fragrat, cùm sic paratur.

℞. Rad Ireos florent. calami aromatici an. ʒij. cariophyllorum,
Styrac. calamit. labdani coriãdri an. ʒj, Saxonis mochat, benjoin, Puluis vio-
maioranæ an. ʒjß. corticis citri sicc. ʒß. rosa. rubr. ʒß moschi boni, letæus.
g. xij. si. puluis.

Hic notet Lector, puluerem hunc, non à violis, quæ non ipsum
ingrediuntur, sicca namque fere sunt inodoræ sed ab halitu quem Violeteus
refert Iris, illis recentibus cognato, tale nomen mutuari. cur dictus

Eiusmodi pulueres odorati sericeis sacculis includi solent, quos
olidæ mulieres (bene namque olent quæ nihil olent) tetri halitus
quem effumant cohibendi aut corrigendi gratia inter mammas ge- Sacculi o-
stant. Nec defunt delicatuli iuuenes præsertim mulierosi, qui saccu- dorati.
lis istis odoratis delectentur. Omnibus verò odoraamenta conce-
duntur, quorum sanitas ad sui ipsius custodiam illa ipsa requirit.

Vnguenti forma faciliè parabitur odoramentum, si puluis supra
descriptus excipiat paucò oleo liquidambar & cera, vt consisten-
tiam acquirat idoneam. Vel sic

℞. Santali citrini, calami aromatici, schœnanthi, cinnamomi an.
ʒj. styracis calamintæ, benjoin, macis an. ʒß. ceræ ʒiij. ol. moschelini Vnguentū
q. suff. fiat vnguentum. Vel hoc modo. odoratum.

℞. Macis, cinnamomian. ʒß. benjoin ℥ij. zibethi, moschi, amber. an.
℞ß. caphuræ gr. v. cum oleo amygdalino si. litus.

Fit quoque ex aromatis selectis odorata massa, ex qua vel pomū,
vel trochisci formantur, quorum suauitas magni fit, vt.

℞. Corticis citri sicci, cinnamomi, ladani an. ʒj. styracis calamintæ
ʒij. macis, cariophyllorum, ligni aloës, ireos an. ʒß. caphuræ ℥i. Pomum
moschi, zibethi, ambra an. ʒß. cum muccagine gummi tragacanthi odoratum.
in aqua rosarum extracta, fiat massa, ex qua fiat pomum, vel orbi-
culi, aut pastilli cuiusvis figuræ.

A multa ambra zibetho moscho & aliis aromatis fit globulus cras-
sior & suauissimus spirans quem pomum ambra vocitant.

Pomum
ambra.

De Suffitu & auiculis cypris. CAPVT XXX.



V A V E S quidem odores, spiritus omnes exhilarant, sed multa suum non nisi vi ignis halitum communicant; Proinde prunis ignitis incēduntur aut ita certē calefiunt, vt quoquo versum odorem spargant, vt thus & benjoinum.

Cocula.

Cassolera.

Sic sua Thymiamata primi Dei cultores parabant, Sic suos suffitus medici ad sanitatem; sic suos Aulici ad voluptatem conficiunt. Non tamen in prunas semper materia suffituum iniicitur, sed cocula quadam, sic Pompeio dicta, ænea vel argentea, quam vulgus Cassoletam, nominat, excipitur, simul cum aqua rosarum, vel arantiorum; in eaque dum feruet tota mixtura, suppositis in eius media parte carbonibus accensis vapore suauis totam ædiculam implet.

Alchamor.

Quædam sponte suum odorem longè latèque diffundentia alieno calore non egent, vt rosæ, zibethum, moschus & alia quamplurima. Notet hic lector cassoletarum vsum tam nouum non esse, vt multi putant: Suffitus enim Arabum *Alchamor* sua lingua dictus similiter fiebat, & ob similes vsus.

Est igitur suffitus vel humidus, vel siccus, & vterque vel voluptatis, vel sanitatis. Humidus paratu facilis est, & familiaris mulierum splendidè viuentium, quæ dum ægrotant, vel saltem his diebus, quibus medicamenta purgantia sumunt, ex cortice arantiorum, citriorum, cariophyllorum, cinnamomo & aqua rosarum simul mixtis, & ignita Cassolera receptis, cubiculum sufficiunt.

Siccus à Pharmacopæis medicorum consilio frequentius paratur, non modo ad voluptatem, sed etiam ad vtilitatem.

Voluptatis suffitus dari solet his, qui delicijs & cultui corporis indulgentes, res paternas effusè diripiunt.

Suffitus ad
sanitatem.

Qui sanitatis est, his præscribitur, quibus spiritus reficiendi sunt, roborandum cerebrum, cor exhilarandum & à malignitate extrinsecus adueniente vindicandum.

Lues indica
suffitu non-
nunquam
curatur.

Confert etiam pulmonibus infarctu à crassa pituita liberandis, non tamen omnibus affectionibus circa thoracem consistentibus idoneus est: Sanguinem enim spuentibus aduersatur, inquit Aëtius, quum per eorum quæ sufficiuntur, vasa rursus aperiantur, neque his adhuc, qui siccum morbum circa thoracem habent; Verum Asthmaticis, Orthopnoicis, & quibus thorax copia crudorum infestatur, prodest, vt etiam lue venerea laborantibus, si ex medicamentis idoneis, quæ istius morbi virus, per frequentem saluationem abijciunt, vt decet paretur, atque corpore prius per vniuersalia remedia vacuato, vsurpetur. Ferè autem forma pulueris crassiusculi,

suffi-

suffimigium datur, vt ad roborandum & siccandum cerebrum, hoc modo.

℞. Styracis calamintæ, benjoin an. ʒj. β. gummi iuniperi, thuris an. ʒj. cariophyllorum, cinnamomi an. ʒij. foliorum lauri, saluæ ro-
rismarini, maioranæ, an. ʒβ. fiat omnium puluis crassiusculus, cuius portio prunis candentibus inspergatur, vt odoratum fumum expiret æger.

Suffitus
pro cere-
bro.

Ad sistendum humorem qui è cerebro ad pulmonem delabitur, ad hunc modum parabitur suffitus.

℞. Nucum cupressi, balauftiorum, ladanian. ʒj. rosarum ʒij. bac-
carum myrthi, mastiches, an. ʒ. i. β. fiat puluis pro suffimigio.

Suffitus pro
pulmone.

Cordi roborando & refarciendis spiritibus, suffitio confert ad hunc confecta modum.

℞. Calami aromatici, xyloaoës, scœnanthi, cinnamomi, an. ʒj. Styracis calamintæ benjoin an. ʒj. β. macis cariophyllorum an. ʒ. β. rosarum, maioranæ an. ʒij. aliptæ moschata ʒii. fiat omnium puluis ad suffitum.

Suffitus pro
corde.

Ex iisdem pulueribus cum carbone salicis, & liquore quodam idoneo aliquando conficitur massa, ex qua fiunt pastilli, vel tedæ, vel auiculæ, vulgò; Cypreæ dictæ, quæ citra flammam, ignem facile admittunt, & suauem fumum exhalant. Sic ritè possunt fieri.

℞. Benjoin ʒi, styracis calamintæ ʒii. ladanii ʒβ. aliptæ moschata ʒiii. cariophyllorum, scœnanthi, an. ʒii. ligni aloës ʒi, carbonis salicis ʒii. terantur omnia: puluis excipiatur gummi tragacantho aqua rosarum soluto, fiat velut pasta, ex qua formentur vel auicu-
læ, vel clauī aut candelæ aut orbiculi, cuiuslibet figuræ.

Auiculæ
Cypreæ.

Candelæ
odoratæ.

Ad ciendos menses vult Hippocrates, vt mulieres singulis quibusque diebus bis suffiatur, infundibuli fistula per quā fumus deducitur penitissimè in sinum pudoris intromissa. Eligenda verò quæ primo, aut ad summum secundo gradu calefaciunt, dein ad vehementiora transeundum, ea tamen cautione seruata, vt non valdè acria vsurpentur, ne caput grauetur, & vteri ceruix exulceretur, vt iussit Hippocrates.

Suffitus cœ-
fert men-
sibus mo-
uendis.

Fiunt verò suffimenta, vt vasa diducantur, & proximè vterus accurrat ad orificium, sicque sanguis extra facile prorumpat. Sed cum mensium cunctatio à duritie & siccitate vteri proficiscitur materia suffitus aliquo liquore excipienda est, quo possit vterus humescere, vt cera & oleo simplici, vel odorato, aut terebinthina, vel ladano, vel gummi tragacantho, vt fiant pastilli, qui vsus tempore in carbonēs ignitos iniiciantur, vel potius in cineres calidos, vt voluit Aristoteles in problematis, vt

℞. Radic. cyclaminis, asari, myrrhæ, bdellij, Ireos an. ʒ. j. styracis calamintæ, ʒ. iii. nigellæ romanæ ʒ. ii. cinnamomi, cariophyllorū. an.

fiat omniū puluis pro suffitu muliebrium; vel excipiatur terebintā veneta, & fiant pastilli ad eundem vsum.

Suffitus ad
vlcera.

Vlceribus quoque dyssepuloticis, quibus frustra tentata fuerunt alia remedia, & Indica lūi suffimenta sæpè feliciter vsurpantur, maximè vero quæ ex cinnabari fiunt, cui, vt hydrargiro, cuius est multum particeps, mira virtus inest, & alexiteria, ad veneri morbi virus, per salivationem excludendum. Illius namque fumus, toto exceptus corpore, per spiramenta cutis sese transfert in corpus internum, & humorem attenuando, impellendo ac disijciendo, tandem ad os deducit, & frequenti sputatione foras excludit. Sicque nō modò vlcera quæ pharyngem & internas oris partes occupant, perfectè delet, sed & dolores sedat & materiam, quæ tubercula & pustulas committebat optimè sanat. Sic autem parari debet ad huius mali curam suffitus.

Suffimenta
ad lue veneream.

℞. Benjoin, thuris libani an. ʒij. baccharum lauri, calami aromatici an. ʒj. cinnabari ʒx. fiat omnium puluis, qui excipiatur styrace liquida pro suffumigio, vel sic.

℞. Granorum iuniperi, thuris, mastiches, ladani an. ʒj/β. cinnabaris ʒj/β. terantur omnia, & ad vsum seruentur pro suffimento; hoc quoque modo rectè parabitur.

℞. Styracis calamintæ, benjoin, cariophyllorum, thuris masculi, ladani an. ʒj. myrrhæ ʒij. galliæ moschatæ ʒij. mastiches ʒj. cinnabaris ʒj/β, terantur omnia, & excipiantur terebinthina, vt coeant in massam, ex qua fiant pastilli pro suffumigio.

Eiusmodi autem suffitus non nisi summa prudentia sunt adhibendi, ne strangulationem, aut neruorum resolutionem, aut tremorem adferant. Cinnabaris enim vt & hydrargyrus, cū vix naturæ legibus coërceantur, non nisi à peritis & expertis medicis debēt exhiberi, vt nec tractari.

Vidi quemdam pedisequam regis à muliercula suffitum, qui ob recurrentium neruorum resolutionem, duos menses ante obitum, à maligno fumi halitu concitatum, *ἄγανδός* seu loquendi impotens miserè periit.

Alios obseruaui ab Empiricis & ignaris cinnabari indebitè parata, tractataque suffitos paralyticos euasisse, nec arte vlla post ad sanitatem redire potuisse.

Nolo plures historias eorum, qui à circulatoribus suffiti, scuis doloribus cruciati, ac tandem victi interierunt. Si quis enim misellus lue venerea infectus, vel guaiaci decocto, vel hydrargirato litu, vel cinnabaris suffitu tandem conualuit, idem eandem opem, quam ipse sensit in aliis vult experiri, vnde multi factores, fabri & etiam baiuli his remedijs Lutetiæ nuncistius morbi curam audacter pollicentur, & infelicitè suscipiunt.

Sic videor omnes remediorum formulas, tum in hoc, cum in tertio libro descripsisse. Si quæ alio nomine ab antiquis designantur, sub illis continentur, vel iam eorum tanquam inutilium exoleuit usus quod si quis nauseabundus has lucubrationes fastidiat, ac malo animo famæ nostræ insultet, det illi Deus meliorem; atque maleuolus cum sit & omnibus displiceat, illi forsan displicere, non nefas. Sequitur nunc, ut beneuolo artis Pharmaceuticę studioso Officinam extruamus.

FINIS LIBRI QVINTI.





IOANNIS
RENODÆI
MED. PARISIENS.
DE MATERIA MEDICA,
COMPOSITIONIBVS IN PHARMACO-
polio parandis & seruandis necessaria libri tres.

DE PLANTIS, LIBER PRIMVS.

P R Æ F A T I O.



VNIERSI compendium homo, viuentium perfectissimus, diuinum animal, & corporū omnium μετρίως naturæ lege, saeuissimis ac innumeris morbis, ἀπὸ τῶν ἐναντίων, καὶ τῶν μεταβολῶν ἐξωθεν lacessitur; Ex principiis enim generationis humanæ cōnascitur infausta quædam labes, ex qua morborum seges immensa sobolescit; nam seminalis hereditas, non ex omni parte beata, sed iniuriis permultis, quæ

Cap. 5.
lib. de
marco-
re.

ad interitum necessario fatalem iter parant, obnoxia. Ex qualita-
tum siquidem oppositarum quibus constat corpus, dissidio, ex pe-
renni, ac triplici ipsius effluuiο, excrementorum prouentu, prauo
rerum non naturalium vfu, animi pathematis, humidi primige-
nij iactura, & caloris extinctione natiui, qui virtutis est finitæ, at-
que vt agens physicum repatitur agendo, quotidie morimur. Sum-

Moriend i
necessitas.

mus tamen Opifex, optimus rerum & conditor & conseruator, hominem vt foueret, ac tueretur, totum repleuit terrarum orbem omni genere auxiliorum, ex quibus ille non modò victum & vestitum habet, sed adhuc auxilia multa, vt medicamenta saluberrima, quorum gratuito fauore, & virtute eximia suæ sanitati prospicit, & morbos futuros præpedit, vel iam factos fœlicissimè pellit.

Ex quibus
sumitur
materia
medica,

Auxilia illa sunt stirpes, mineralia, animantia, ex quibus medica materies sumitur, quam his tribus libris examinamus, non quidem totam: laboris enim esset immensi, & forsan inutilis, sed eam tantum, quæ singulas compositiones in nostra Officina, seu Antidotario descriptas ingreditur. Qui integram plantarum historiam desiderarit, præter eruditissimam Dioscoridis lectionem, Ruellij, Mathioli, Dodonci, Lobelij, Dalescampii & Clusij laboriosissimos commentarios poterit consulere. Qui de mineralibus & metallis prolixiorum textum postulat, adeat Georgium Agricola: qui animalium historiam, legat libros 9. Aristot. de animal. Conrad. Gesnerum & Edoard. Vuottonum, qui de ea materia doctissimè scripserunt. Quæ enim breuiter nunc & dilucidè sumus explicaturi, tū instituendo pharmacopœo, tū instruendo pharmacopolio sat esse putamus, cū ex his omnia medicamenta vſitatioꝛa & præstantiora tam in rem præsentem, quàm futuros vſus soleant parari.

Prioris li-
bri disposi-
tio.

In prima autem primi libri sectione multa simul congeſſi adeò vulgaria, vt non solum in pharmacopoliis, sed singulorum ciuium ædibus ex parte maxima reperiantur, quorum tamen vſus in medicina tam frequens est, & necessarius, vt sine illis, vix medicinam aliquis faciat, aut medicamenta quædam rectè paret, & fœliciter exhibeat. Quid enim in communi medicamentorum vſu vſitatus aqua, vino, aceto, saccharo, melle, manna & floribus cordialibus? Quid frequentiùs celebratur quatuor emollientibus, quinque capillaribus, quinque radicibus aperitiuis, quatuor seminibus frigidis, totidem calidis, tam maioribus, quàm minoribus? & aliis quibusdam in huius libri fronte descriptis.

Hæc igitur omnia in reliquorum classes minùs aptè referenda putavi, cū ex vſu sint quotidiano, & illorum portio in area, alia in vestibulo pharmacopoliorum proſtet, alia in cella vinaria, alia in popina, aut taberna posteriore conseruetur. In abaci verò capsulis anterioribus semina frigida, calidaque reponi solent, vt præſto sint perpetuò, eaque dum vſus postulat, mox pharmacopœus habeat præmanibus. Sic duximus equū, de stirpibus aliquot, aut earū partibus inter se qualitatibus valde oppositis, sectione simul eadem methodi- tamen agere.

Ab aqua autem auspicari viſum est, vt quæ sit non modò communissima, sed vtilissima, qua sine nec sumus, nec viuimus sani, aut ægroti conualeſcimus. Ex ea, tanquam vulgatissima, vt obiter dicam

Christus imbecillitatis nostræ memor, primum instituit sacramentū quo lauit nos à protoparentis crimine, aliāque multa miracula fecit, quæ qui tantū physicus est, minime capit. Qualitates verò naturales & eximias dum accuratè perquirat, dignoscit, experitur, in omnibus diuinum cogitur mirari Conditoris opificium.

Historia.

Arist.


cap. 2.

lib. 4.

de gen.

animal.

De Aqua. CAPVT. I.



QVA diuersa ratione & elemētū & alimētū dicta, non solū cōmune sobolis humanę solatium est, sed animā-
tium & vegetantium omnium subsidium, quo nullū
uiuens carere potest: Degunt enim animantia multa
absque ignis vſu, sine aqua nullum, & qua sola virgi-

Alia histo-
ria.

Cal.

Rhod.

cap. 23.

lib. 13.

nem Hispanam diu vitales auras traxisse viri grauissi-
mi produnt: Melancholicum quemdam vidit Albertus: qui septem
hebdomadas ab omni pabulo abstinuit solo aque hāstu diebus al-
ternis sumpto, recreatus. Animalia multa non solū ex aqua gene-
rantur & nutriuntur, sed & plantæ sine huius benigno appulsu nec
fruticant, nec florescunt, sed exuccæ & aridæ citò tabescunt, contra
lignum quod plantatum est secus decursus aquarum, ait Propheta,
fructum suum dabit in tempore opportuno: vnde forsan prodit He-
siodi opinio, aquam omnibus elementis antiquiorem asserentis: cui
assentitur Thales, eam rerum principium constituens vnicum: in
quorum sententiam descendit Empedocles, qui omnia ex aqua fie-
ri credidit, & Hippon quidam apud Arist. animam vocauit aquam,
vt Hippocrates principia vitæ aquam & ignem: sed per aquam, ille
semen; hic, humidum radicale intellexit.

Aqua &
ignis vitæ
principia.

Aqua porrò de qua nunc loquimur, vſibus humanis maximè ne-
cessaria, seu ad sitim extinguendam, seu ad alimenta & medicamen-
ta coquenda & paranda, elementata est, frigidæ nomine sæpius de-
signata. Eaque vel fontana, vel fluuiatilis, vel putealis aut pluuiæ &
cysternina: fontana, quia è terra funditur, dicta, vt salubrior præfer-
tur omnibus. Nonnullæ tamen improbantur, quod viscera terræ
eluentes, secūm alienas qualitates adferunt: nam pro locorum va-
rietate, per quæ transeunt, varium odorem, saporemque mutuan-
tur. Sic quædam visæ sunt, per loca sulphure plena traiectæ, adeo
calentes, vt non possint esse vſui. Aliæ ob anfractus aluminosos &
vitriolatos quos abluunt, tam acide sunt & ingratae, vt quiuis siti-
culosus auerſetur. In Germania trans Rhenum, maritimo tractu,
fons erat aquæ dulcis, qua bibita, dentes intra biennium decide-
rent.

Aqua fon-
tana me-
lior.

Lib. de

sensu

& sen-

sibil.

Pucenses
aquæ, me-
dicatæ.

In multis Galliæ regionibus alieni & insoliti insuauisque saporis
aquæ scaturiunt medicatæ, vt Pucenses, quas singulis annis, ægroti
innumeri adeunt, & redeunt fœliciter. Sed de his agere nostri nunc
non est instituti, sat est, si ostendero quibus qualitatibus debet infi-
gniri aqua potabilis, ac medicamentis in pharmacopolio conficien-
dis necessaria.

Cystrinae
aquae cur
insalubres.

Aqua opti-
ma quæ.

Ea autem, inquit Arist. in seipsa omnium saporū genera permista, vel materiam. quæ tanquam saporum seminarium sit, habere debet: vel, ut loquitur Galen. ἀπὸς, id est, insipida, seu omnis qualitatis expers esse debet, atque leuissima, sed non pondere, ut multi putant, nam aqua ex niue levis est, tamen insalubris, sed quæ tenuium sit partium, celeriterque caleseat, ut vult Hippocr. & cito refrigeretur, qualis fontana, aut fluuiatilis, modò pura sit, cuius defectu, pluuia ex Galen. sumatur, præsertim ad hydromelitis confectio-
nem. Cystrinas aquas schola Parisiens. iudicauit insalubriores: Sunt enim velut mortuæ, quæ ab aëre, à quo decidunt, à tectis quæ abluunt, à fouea, in qua consistunt, quam nonnulli cauedium quæ si cauum edium vocant, vitium quoddam contrahunt. Aëris enim inquinamenti, aut pestilentis, aliave putri qualitate infecti, vix non potest imber particeps fieri, qui lateres ædium proluens, quosdam sæpè feles mortuos, & alias sordes secum rapit, quibus facile inficitur, cum careat motu, qui velut aquæ anima est. Et licet cum multo sabulo stabuletur aqua in cisterna, illuc tamen cum fiat iugis aquæ impure delapsus, tandem sabulum sordescit inquinaturque: hinc aquæ postea è cisterna effluentis pessimus odor, sapor, vsus. Auget corruptelam pluuiæ conditio, quæ aëris lenitate referta citissime corrumpitur: Et per imbres, pisces multos deterius habere, ut Capitonem & Cestraum, seu mugilem viri grauissimi scripserunt: nam oculi eorum albescunt, & per id temporis macilenti capiuntur. Aqua igitur optima est fontana, aut fluuiatilis & putealis, modò non limosa, nec fœtida, sed insipida, quæ scilicet nullam habet saporis manifestam qualitatem, nec alienas qualitates permixtas, salis, nitri, sulphuris, bituminis, aluminis, aliorumque id genus.

Gal. ca.
15. lib.
1. &
cap. 2.
lib. 2.
de alim.

Lib de
ptis.
Galen.

Gal.
comm.
ad part.
10. li. 4.

De vino. CAP. II.



ET ERES olim Romani diis sacrificaturi perpetuò vinum offerebant hinc poëta: *Redduntur merito debita vina Ioui*. Nam dii vina dedere, inquit, Plato, ut pellant hominum curas & mentem lætitia diffundant, nam Bacchus & afflictis requiem mortalibus adfert: Natura siquidem è suo penu nihil quicquam largita est præstantius vino. Vulneribus enim curandis est præstantissimum balsamum, viribus reficiendis cardiacum eximium, nutriendo corpori alimentum optimum, quod nominis indicare videtur notatio, nam Græcè dicitur οἶνος, ἀπὸ τῆς ὀνίσεως, id est, iuuamine, iuxta illud Homericum, Iu-
uamen senties si biberis: lætificat enim cor hominis, mentem exhilarat, ætatem floridam facit, mœstitiā auferit, calorem natium fouet, viscera calefacit, coctionem iuuat, stomachum roborat ob-
structiones tollit, viam abigendis excrementis parat, vrinas mouet, somnum conciliat, venena frigida obtundit, spiritus resarcit, flatus dissipat, crassos humores attenuat, coquit, discutit: atque

epid.
Ouid.
In sym-
pos.

Luc. 12.

Vini utili-
tas.

ut

paucis cū Androcide sapientia claro dicam, vinum est sanguis terræ, lac senum ex vite, quali vita prodiens, vitam conseruans, aquam vitæ suppeditans, quā Chymici subinde Elixir vitæ nominant. Hæc omnia cū verissima agnouisset & expertus esset poeta Græcus, tam alacri animo vinum excoluit: nam Laudibus arguitur vino vinosus Homerus, vt nō modò rerum abstrusarum cognitionem adeptus est sed summam in scribendo facundiam consequutus: sæcundi enim calices quem non fecere disertum? Nam vt vulgò dici solet, vinum acuit ingeniū, & vina, ait poeta, parant animos; Ob id poeta Ennius nunquam se accingebat carminibus scribendis, nisi prius multo madidus mero. Æschilus quoq; nisi potus ad tragœdias nunquam exarandas profiluit, facetum est autem quod de Lampride narratur, qui cū vino ingurgitatus multa appolitè diceret & responderet, se thuri similem esse fatebatur, quod nisi calefactum suauem spirat odorem. In vino etenim facundia, in vino veritas, in vino alacritas: vetulam enim etiam nolentem saltare compellit, vt prouerbio fertur; nam vinum forte, ait sapiēs, quo abstinere olim apud Hebræos nefas erat, Persarumque fuit mos, vt postquam vino maduerant, de rebus maximis decernerent. Plato tamen, ait Galenus, neque permittebat in exercitu, vt vinum gustarent milites, neque serui, nec principes, neque hi qui de re aliqua essent consulturi, quod scilicet velut tyrannus animæ facultatibus imperet, excessuque sumptum vires eneruet, sanitatem destruat; vnde Hippoc. in vino morbus & sanitas, mentis temperantia & feritas, bellum & pax: iuxta illud, vinum alit lites, lites dissoluit easdē. Vinū ergo adiaphorum, ac indifferens est, & pro ratione boni vel mali vsus bonum vel malum, atq; vt sanis robur est, sic infirmis infirmitas, præsertim his qui à causa calida malè habent.

Porro vini multæ differentiæ numerantur, à colore, sapore, substantia, odore, virtute & loco, omnes sumptæ. A colore, quoddam dicitur album, rubrum, nigrum, flauescens, rubellum, pallidum: A sapore, dulce, austerum, acerbum, acre, insipidum: A substantia, crassum, tenue, sæculentum: Ab odore, suaue, fragrans, inodorum: A virtute vinosum, & aquosum polyphorum & olygophorum dictum: A loco Faleinum, Albanum, Græcum, de quibus antiquatis modicè bibendum ait Gal. caput enim omnia grauant, sed his omnibus caremus; nostratia tamen non minus sunt vinosa, vt Aurelianum, Burgundianum, Andinum, Ainum, & quæ in Lutetianis vinetis coluntur, vt Meudonianum, Ruellinum, Argentolianum; quæ omnia generosa sunt, indigentque Amphidione, qui primus aquam vino commiscuit. Vt verò in conuiuiis semper vinum præstantissimum expetitur: sic etiam in Pharmacopoliis, tum ad medicamenta, quæ per os sumuntur, paranda, vt theriacam & mithridarium tum ad ea quæ extrinsecus adhibentur, vt vnguenta multa & em-

Vinum qui-
lus interdi-
cebatur.

Vinum sa-
nis robur.

Qui primus
aquam vi-
no miscuit

Ale-
xand.
ab A-
lex.

cap. 6.
lib. 5.
de san-
tuend.

plastra. Ex illo quoque destillato, aqua quædam habetur, ardorem & flammam citò concipiens, & ad multos vsus celebrata, quæ Aquam vitæ nominant. In summa, nihil est in vino, quod non sit eximium, odor, sapor, spiritus, ex quibus non solum homo recreatur alitur, fouetur, sed etiam ex illo mortuo & in acetum mutato, necnon ex illius facibus, quas chymiatræ tartari nomine designant, & medicamenta & alia adiumenta multa mutuatur.

De Aceto. CAPVT III.



CETVM ^oξus Græcis dictum, est velut acre vinum, vel potius, vt multis placet, vinum mortuum. Ex vino enim vapido, proprijs spiritibus & insito calore destituto producitur: atque vt Omphacium eleganter vinum crescens, sic acetum vinum decrescens dicitur, nam inter vtrumque est vinum. Sed vtroque acetum tenuius, acutius & liquidius: ob id non concrevit, nec gelu contrahitur, præcipue quod fit è vino, quod præstantius est salubriusque: Nam quod è zitho putrescente in quibusdam regionibus parari solet, vt ingratum, sic minimè sanum, debetque à pharmacopolio ablegari, & cū absolutè acetum ponitur, semper id ipsum, quod ex vino laudabili, vetustate, aut artificio, non maleficio, seu malignæ cuiusdam rei mixtura, tale euasit, sumendum est, quod ob vires eximias trahitur, & in culinam ad acetaria & condimenta, & in pharmacopolium ad oxycrati, syrupi acetosi simplicis, oxymelitis, vnguenti Ægyptiaci & de lithargyro, æruginis & cerusæ præparationem.

Acetiqualitates.

Acetum autem omnē vim habet attenuandi, incidendi, discutienti simul & reprimendi, necnon refrigerandi, & aliquantum calefaciendi; Nam caloris in se quædam semina retinere, etiam agnouit Homerus: vnde mixtæ qualitatis esse Galen. scripsit, nam vt lac vniuersum non est homoiomeres & simile, neque vnde quaque sibi idem, sic nec acetum, quod multi calidum, alij frigidum nominant. At maiori parte frigidius, quàm calidius his liquidò, constat, qui verè eius facultatem expenderint: Atque longè ab illorum coniecturis recedendum, qui cauterii instar calidum putant: Nam sensu constat admotum valde acre, & principio refrigerare, sublatum tamen calorem quemdam relinquere, qui acrimoniæ ratione, & per accidens spatio temporis fit, tametsi non vbique, nec in omnibus corporibus.

Hinc colligitur acetum quidem frigidum esse, sed accidentarium habere calorem, vel vt loquitur Galenus, nec esse summè frigidum nec summè calidum, sed neutrius extremorum particeps. Multa enim ex pugnantium facultatum mixtura nascuntur, & pleraque ad sensum simplicia sunt, quæ ex pugnantis qualitatibus constant, & de his cū ambigitur, sint neutra necesse est, vt acetum, quod ingentem perdidit qualitatem, & alienam ex putredine adeptum est.

Cap.
10. lib.
2. comp.
med.
loc.

Cap. 19
lib. 1. de
simpl.
med.

Cap. 20
cinsd.
lib.

Cap. 11.
cinsd. l.

Cap. 23.
cinsd.
lib.

Cap. 2. lib. 4. simplic. Cuius sententiæ est Theophrastus & Aristoteles: Nam vinosæ vini partes dum in acetum transcunt, refrigerantur, & aqueum recrementum putrescens, adscititiâ caliditatem obtinet, velut cetera omnia quæ putrescunt: Fitque acetum quiddam ex contrariis facultatis partibus compositum, partim refrigerantibus, partim calidis, sicut vstorum lignorum cineres. Miras autem præbet acetum mortalibus vtilitates, sed multi frequentius eo quàm Pharmacopœi vtuntur.

De omphacio. CAPVT IV.



OMPHACIUM est vuae acerbæ ac nondum maturescentis, quæ Græcis Omphax, in officinis agrestia dicitur, non Solis calore in Rob mutatus: cuiusmodi erat olim Dioscoridis Omphacium: Nunc enim instar vini exprimitur in torculari, colatur, in dolis reponitur, & parum salis permiscetur. Ex

vuis autem magnitudinem, sed nondum maturitatem adeptis, vt fit progressus ad vini expectationem, sic ex vino regressus ad acetum, quod viribus omphacio in multis conuenit: vtrique enim vis inest refrigeratoria, sed in omphacio imbecillior, in aceto verò tantò est validior, quanto tenuior, cui & acrimonia quædam inest aliquantùm excalefaciens ex putridò calore orta. Proinde Aristoteles rectè scripsit acetum proprio vini calore frigidum esse, calidum aduentitio: Ista tamen caliditas satis esse non potest ad superandam aciditatem

Acetum calidum & frigidum

Cap. 12. li. 4. de simplic. med. te prouenientem frigiditatem. At verò omphacium ne minimum quidem habet caliditatis, nec ita tenue est, nec ita expedite meatus corporis permeat: Acidum quippe non modò est, sed acerbum: Ob id ad hypochondria ardentia præstantius est, quam acetum, quòd non tantam habeat violentiam, ac ferientem frigiditatem, nec eam mordaci admistam caliditati: Debent enim qui tali caloris excessu laborant, sine violentia mitigari, nec foris vllam admittere caliditatem aut acrimoniam mordacem. Hinc est quòd summè ardoribus Omphacium profit, inquit Gal. siue ori ventris impositum, siue aliis partibus quas refrigerare lubet.

Omphaciū quibus profit.

Frequentius autem per os sumitur, tam alimentis ad voluptatem, quàm medicamentis ad sanitatem mixtum. Eo enim alterata iuscula faucibus & palato gratissima sunt: Eo acidulata condimenta appetitum reuocant: Atque eius vsu iecoris feruor extinguatur, sanguinis estus temperatur, venter alimenta non auersatur: hæc autè omnia ritè præstat syrupus ex eo paratus, quem Officinæ de agresta, vocant.

Licet autem ex vua qualibet immatura omphacium possit haberi optimum, in Gallia tamen ex ea tantum sub finem æstatis, & ante vindemiarum tempus exprimitur, quam vitis alba promit, in hortis culta, cuius palmites longiores, crassioresque ad topiariorum pergulas & fornices deduci solent: quæque racemos profert oliuarū serè

magnitudine, succo multo turgidos, ex quibus vel etiam maturis cum vix bonum possit vinum haberi, ex hisdem nondum maturis optimum habetur omphacium: A cuius saporis affinitate, oleum ex oliuis immaturis expressum, acidulumque, Omphacinum dicitur.

De saccharo. CAPVT V.



SACCHARVM antiquioribus incognitum, nunc tam frequens est, vt ironia quadam, pharmacopola sine saccharo, vocetur, cuius Officina eo non luxuriat. Non à cœlo deciduum est, roris instar, nec ex plantarum folijs, alhazur si exceperis, de quo postea colligitur, vt putarunt hi, qui tantum nomine tenus

id ipsum vestigarunt, sed ex arundinacea planta, quæ non solum in India, sed in multis alijs Asiæ & Africæ locis, vberissime frutificat. Nunc in quibusdam Galliæ hortis prouenit, sed vix hyemis sæuitiam aufugit secuta.

Planta saccharifera.

Est igitur arundo planta hæc saccharifera, septem, octove pedes longa, crassissima, geniculata, folijs vtrinque multis, longis, angustis, striatis obuallata, fungosa, medullosa, & intus dulcissimi succi vbertate referta, qui vel inciso trunco, instar lacrymæ cuiusdam ex arbore stillat; vel medulla à cannis apertis, incisisque secreta, & ignis vi tamdiu elixa, donec totus liquor in saccharum, salis modo in fundo vasis concreuerit. Radices promit canna nostratis emulas, sed minus lignosas, magis succulentas & dulciores, à quibus germina quædam erumpunt, quæ auulsa & legitimo transplantata tempore, virent & adulescunt. Comosos flores gerit, vt arundines, inter quas numerari rectè, vel eius sola facies suadet.

Saccharum rubrum.

Succus ex ea tractus, vnica coctione imperfectè elaboratus, adhuc rubet, & saccharum rubrum nonnulli, alij spumam sacchari nominant. Quando coctione longiore & elaboratione magis defecatur, albicatque plurimum, saccharum absolute vocatur. Ex Madarenfi & Canariensi regione albissimum quoddam defertur, quod vt candore, sic dulcedine & suauitate alio quouis saccharo præfertur, quod Officinæ saccharum Madarense nuncupant. Sæpè tamen

Saccharum Madarense

quoddam minus album institores aduehant, illo non minus bonum. Multi enim, vt Madarense saccharum ementiantur, commune cum lixiuio quodam eluunt, excoquunt, & portionem nigriorem abstergunt; hocque pacto albissimum quidem reddunt, sed minus dulce, minus gratum, magis rancidum.

Saccharum qui albescat.

Ex saccharo communi Candum fit hoc modo: liquatur saccharum cum pauca aqua, & elixatur, vt crassus fiat syrupus, qui in ollam fistilem iniicitur, in qua bacilli lignei cancellatim, decussatimque

Saccharum candum.

aptrati fuerint. Reponitur olla super affere in loco calido, relinquiturque quindecim, aut viginti dies; Tum syrupus non concretus effunditur, & pauca aqua calida affunditur, ad eluendā syrupi pinguedinem, qua denuò effusa reponitur vas in loco calido, & die sequenti frangitur, inueniunturque bacilli saccharo cando, instar salis fossilis, aut crystalli colluscente onusti.

Est quoddam saccharum minus album, minusque crassum, partim *Castonada*, puluerarum, partim in grumos crassiores redactum, quod vulgus *Castonadam* & *Castonnadam* nominat, cuius non modò in popinis sed Officinis est frequens vsus.

Quod ex longinquis regionibus aduehitur, in metas turbinatas pyramidum amulas coactum, (vulgus panes sacchari vocat) vt cando minus coctum, minusque durum, sic minus calidum, magisque ad condimenta, obsonia & alimentorum sapes dulcorandos & suauiores reddendos admittitur: Acria siquidem lenit, acida retundit, austera palato gratiora efficit, & saporibus omnibus gratiam affert maiorem. Vnde non tantum *Seplasiarij*, sed *pistores* & *coci* saccharum frequenti habet in vsu: nam ad gulæ delicias, ferè nihil mensis apponitur, quod aliquid sacchari non receperit: Aqua enim, vinum, fructus, caro, pisces & reliqua edulia potulentaque si displiceant, saccharum permisceas, & venter postea nullus auersabitur.

Est autem saccharum omne calidum, sed moderatè, & linguæ scabritiei, *Vires*, pectoris asperitati, tussi & sputo mouendo conducit, sed detribus officit: eos enim nigros reddit, & mobiles, & rubigine inficit.

In *Ægypto* & certis *Galileæ* locis saccharum aliud pilulatum, ac globuli instar rotundum, *Alhasur* dictum, ex plantis colligitur, à vermiculo quodam scarabæi æmulo, qui se eo inuoluit, vt domum simul & pabulum habeat. In *Turchia* *Tigalia* dicitur, vbi & *Damasci* frequens est in vsu ad sedandam sitim. *Belon*. *Alhazun*, *Tigalia*, *Vires*.

a Gal.
c. 11. li.
de att.
vict.
rat.

De Melle, C A P. VI.



SCRIBIT *Athæneus* *Cyrinos* *Corficæ* incolas ideo longæuos esse, quoniam melle vtantur assidue. Et interrogatus *Democritus* quonam pacto sanus quis posset diu viuere? Si interiora, respondit, melle rigaris, oleo exteriora. Mel enim cum sit dulcissimum, succum gignit tenuissimum, & in senibus sanguinem optimum: in iuuenibus tamen & biliosis facile vertitur in bilem: nam quod in melle dulce est, ait *Actuarius*, in biliosum humorem mutetur necesse est.

Est verò facilis hæc mutatio, quia d calefacit & exsiccet ordine secundo, adiunctamque habet dulcedini acrimoniam. Præstantissimum siquidè est mel, quod hisce duobus excellit, hoc est, quod dul-

b Cap.
8. li. 2.
de fa-
cult. ra-
tur.
c Cap.
8 li. de
spir. a-
nim.
mot.

Mustum
quid.

cissimum est, simulque & acerrimum ex Galeno. Mustum verò ex vuis dulcibus expressum, & ad dimidias, tertiaeue coctum, licet melli dulcedine non cedat, vt aqua tamen obtusum est, nec sensum vellicat.

Historia
notanda.

Solum autem mel quasi compositionem in se habet, quia ex multarum herbarum succo, vel flore colligitur, & omnibus valetudinibus prodesse potest, maximè tamen senibus temperamento frigidis, & hyemis tempore. Nam vbi g calorem nactum fuerit, bilem procreat.

Hinc duorum concertationem irridet Galenus, quorum alter mel salubre, alter insalubre affirmabat, vterque ex illato sibi à mel le affectu cōiectans. Sed neuter intelligebat homines; non vnum ab initio temperamentum habuisse; neque si habuissent, immutabile ipsum ætatis decursu tueri potuissent. Alter enim erat senex & pituitosus, alter verò iuuenis & biliosus.

Mel quid.

Est verò i mel, succus roris cælestis ab apibus collectus. Nam cum omne alimentum vel ab animalibus, vel a plantis desumatur, mel ab vtroque est secretum. Oritur enim in plantarum folijs, aut floribus, neque est earum succus, neque fructus, neque pars, sed eiusdem cum rore generis, nec tamen assidue, nec copiosè, vt ille prouenit.

Ad illius autem bonitatem vel malignitatem aliquid accedit ex plantis ex quibus colligitur, vnde venenatum dicitur illud, quod in aconitis ex apibus excerpitur, vt m Heracliense; & amarum est, quod ex Ponto aduehitur, vbi absynthiorum prouentus luxuriat.

Debet autem mel colore pallidum esse; consistentia, neque crassum, neque valdè concretum, neque dilutum, sed vnitum omni ex parte. Optimum est, quod præter dulcedinem, thymi acrimoniam præ se fert, sed tamen odorem eius non reddit, ex Oribasio.

Porro vt mel longiore coctione amarescit, sic quoque asservatione, longiore; nam pater Galeni mel quoddam habuit ita amarum, ac si in Ponto natum foret, eo in tractu, vbi ex absynthio apes mel colligunt, id ipsum tamen & Atheniense & optimum fuisse dicebat. Verum temporis diuturnitate amarum euasisse. de melle fusiùs differere superuacaneū esset, cum de eo iam abundè in p institutionibus nostris loquuti fuerimus.

m Cap. 52. lib. 5. Paul. Aeg. n Cap. 62. lib. 2. collect. o Cap. 11. lib. 1. de antid. p. Cap. 3. lib. 3.

d Paul.
ca. 4. l.
1. Sy-
nopf. &
Oribas.
lib. 5.
collect.
e cap.
17. lib.
de an-
tidot.
f Cap.
177. li.
de sim-
plic.
Galen.
g Cap.
16. l. 4.
simplic.
h Cap.
5. lib. 1.
de a-
lim fac-
cul.
i Cap.
177. li.
de sim-
med.
κ Cap.
38. l. 3.
de alim.
fac.
l Cap.
62. l. 2.
collect.
Orib.

De Manna. CAPVT VII.



RÆSTANTISSIMVM naturæ donum & miræ diuinitatis plenum est manna, non modò, quæ præter naturæ leges, Israëlitis alendis è cœlo pluit, sed quæ nobis quotidie medicandis mellei, aut saccharei roris modo, è Iouis nubibus, super frondes exudat.

Non minus enim, vt illi suas olim grandines saccharreas, nunc nostrates agricolæ vulgarẽ & grannatâ mannâ mirantur dũ exultâtes canũt, Iuppiter melle pluit: hinc aëreomeli Arabicè, Te Aëreomeli. Tereniabin, & à sacris paginis mutuato nomine mânna dicitur cui solũ nomine tenus cõuenit mânna, vel potius mânna thuris, quæ velut polle thuris est, ex magnis fasciculis cõcussu elisis, proueniens: fragmẽta enim exigua & micæ congerũtur, colligunturq; pro mânna thuris. Est alia quædam manna Larigna dicta, ex effractis laricis ramis collecta Vtraque tamen licentiosè nimis mannæ nomen assumit. Nam manna propriè & secundum medicos vsurpata; de Man-hu enim seu Manna Hæbræorum non loquor, est velut ros cælestis, dulcis & gratus qui ex aëre sudoris instar exudans, sublucanis horis super frondes & ramos arborum, herbarumque delabitur, & breui gummi modo concreuit.

Manna Larigna.
Man-hu.
Manna quid.

Quæ ex frondibus colligitur, præstantior est, vocaturque vulgò manna de folio, vt pessima est, quæ de terra nominatur. Præstantissima verò censetur Calabrienfis, & maximè quæ ex Oenotriæ quodam loco defertur, in quem singulis æstatibus descendit, & ab omnibus excerpitur.

Manna de folio.
Manna Calabrienfis,

Brassauol. in exã. simpl. Hunc autem locum reges Neopolitani olim occluserunt, inquit Brassauolus, ne quis sine vectigali assumeret. Occluso loco, desit manna, nec descendit. Eo recluso & vectigali remoto, iterum descendere cœpit. Sed rursus clauso loco & recluso, & postea clauso cessauit, itaut, reges postea liberum locum reliquerint, & omnibus colligere permiserint. Idẽ scribitur de Tragafæo sale in Epyro, cui cũ vectigal injunxisset Lyfimachus, euauit: mox dempto, succreuit.

Historia.

Cap. 12 lib. 9. Rhod. Cal. Sed ne longius à proposito discedam, frequens est in Gallia quædam manna Briansonniensis dicta, quæ Calabrienfis inopia, medicum aliquando venit in vsum, licet multò minus idoneum.

Briansonniensis mânna.

Est alia quædam, mastichina dicta, rotunda, quæ è ramis & folijs arborum, ventorum impetu in terram delabitur, grandinis modo, nec à cœlo aut aëre decidit: Verùm impropriè manna vocatur, cùm veriùs sit lacryma, & veluti salua arborum concreta.

Manna mastichina.

Manna temperata est, aut paulò calidior, guttur, asperam arteriâ & thoracem lenit, aluũ blādè mouet & serofos humores purgat, Tereniabi.

maximè verò id præstat manna grannata, vt Calabria, non Terenianum, quod mannam quamdam, instar mellis liquidam esse Arabes scripserunt, quo nunc non vrimur, quia caremus.

De floribus cordialibus, & primum de violis.

CAPVT VIII.



VIOLA in Græcis dicta, in opacis, & asperis locis ad murorum basim, & hortorum margines nascitur, & aliquando in pratis. Viret toto anno: floret sæpè Febuario; sæpius Martio, vnde viola Martis dicitur, interdum quoque Autumno, si cultus adhibeatur, folia gerit hederæ non multùm dissimilia, sed minora, tenuioraque; cauliculus, vel potius pedunculus statim à radice prodit, cuius extremo flos ex ceruleo purpurascens irini odoris æmulus adnascitur. Semen minutum in rotundis folliculis extrema ferè æstate producit.

Est autem viola martia multiplex, ac colorum variorum, quædã enim alba est, alia violacea, alia inter vtrumque media. Datur & alia quæ surrectis & duriusculis cauliculis sese erigit, quibus flosculi purpurascens emergunt. Est & alia tricolor, in locis siccioribus nascens, foliis angustioribus longioribus, & laciniosis, caulibus quadratis tenellis, succulentis, brachiatis & reptantibus. Ab eius trino colore quidam ex recentioribus herbam trinitatis nominant: Alij violam flammeam, vulgus Gallorum minutam penseam.

Minuta pensea.

Aliæ quædam parvæ admodum stirpes violarum nomine donantur, quæ quòd nunquam vel rarissimè ad medicos adhibentur vsus, vt viola mariana & matronalis, omittuntur. Martia verò tota vsurpatur; nam flores quòd vim habeant cor exhilarandi medicamentis cardiacis ferè semper commiscentur: semen & folia, quòd malactica sint, enematum decoctionem & cataplasmatum confectio-
nem sæpius ingrediuntur. Floribus autem violarum vim inesse refrigerandi omnes asseuerant, acimonia tamen, quam in ore dum masticantur, relinquunt, cuiusdam caloris esse participes, denū-
riat: Sed quia fugax est iste calor; qui ab exuperante frigiditate vincitur, frigidos medici credunt.

Vires.

De Flore Buglossi. CAPVT IX.



BUGLOSSVM, à bubulæ linguæ figura, quam non ineptè refert, sic dictum, quod vi magna polleat ad hilaritatem inducendam ex Dioscor. & Plinio *εὐφροσύνη* nominatur folia gerit longa, lata, aspera, symphiti similia, sed angustiora, breuioraque, nec ita obscure virentia. Cauliculos gerit bicubitales, brachiatos, hispidos, flores stellatos, cæruleos, nitentes, quos semen consequitur oblongum, obscurum, medullosum. Radice fulcitur longa, crassa, exterius nigricante intus alba, succulenta, dulci. Nascitur tum in hortis, tum in sabulosis & campestribus locis.

Hortensis siue naturam, siue effigiem spectemus, nullæ sunt varietates, nisi in florum colore, qui in quodam albus, in alio purpureus, vt in quodam Italico, in vulgari cæruleus. Verùm sylvestris multæ diuersitates agnoscuntur, aliud enim perpetuò virens dicitur, quod nullo cœli statu marcescat, Aliud asperum & Echioïdes, cuius folia bullis prominulis, cum rigida sint admodum horrent, perperamque à nonnullis pro Anchusa sumitur, à cruore, quo radix eius inficit, sic nominata.

cap. 80. Buglossum calidæ & humidæ, vel potius mediæ est temperaturæ
lib. 6. vnde inter plantas exhilarantes numeratur, quod etiam Galenū ag-
simpl. nouisse certum est qui buglossum vino immersum lætitiæ & hilari-
med. tatis causam esse scripsit.

De Flore borraginis. CAPVT X.



BORRAGO cuius notissima, buglossum non parum foliis & viribus affinis est: vtriusque enim folia longa sunt ad bouinæ linguæ figuram accedentia, sed borrago eadem breuiora & latiora gerit, & adueniente hyemis rigore citò marcescit, ac commoritur, Buglossum verò stat vegetum nec segniter frigus perfert, præsertimque eius radix, vt & folia, quæ non longè à terra recedunt. Flores patulos edit cæruleos & interdum albos, atque ampliores quàm buglossum, in quorum medio velut centro, coronis quædam fusca, extremo acuminata quasi defixa est.

Nascitur in fundo quouis, sed altius viret in humidiorè & pingui. Floret tota Æstate, atque etiam autumnno, dum tardius seritur. Semen nigrum profert, in reliquis idem cum buglossum.

Vires.

Folia in iusculis sumpta peculiarem dant gratiam & aluum subducunt: atque in vinum coniecta, potantibus animi lætitiā & voluptatem adferre viri graues scripserunt, iuxta illud: *Ego borrago gaudia*


semper ago. Flores in acetarijs oculos & fauces recreant, & in medicamentis virtutem cardiacam augent.

Borrago
semper vi-
rens.

Huic valdè cognata est alia stirps frigoris patientissima, quæ modò buglossum, modò borrago semper virens nominatur: vtriusque enim effigiem & naturam præ se fert, & viribus hisdem pollere creditur. Nascitur in locis campestribus multis, & ab his qui simplicium varietate delectantur in hortis feritur, & colitur.

De communibus quatuor emollientibus, & primum, de Maluis.

CAP. XI.



QUATUOR sunt emollientes herbae communes, malua, althea, viola nigra, & acanthus, seu branca vrsina, quibus adhuc aliae quatuor minoris famae adiunguntur, mercurialis nempe, parietaria, sicla, vulgò beta & atriplex. Omnium siquidem vsus equè celebratur in decoctis enematum, & cataplasmatum emollientium parandis.

Malua.

Est autem malua, sic ob præcipuam molliendi vim dicta, vel hortensis, quæ cultu & mangonio aliquando arborefcit, & in altissimam assurgit proceritatem, vel sylvestris quæ cuique nota est: ubique enim folijs quàm plurimis luxuriat, crassiusculis, circinatis, angulosis. Flores tota æstate promit, ex purpureo pallidos: Radices pusillas, longas, lignosas, semen paruum, planum; ac orbiculatum.

Malvarum
differentia
multæ.

Multæ autem malvarum agnoscuntur differentia: Prima nomen generis retinet, quæ ubique viarum & arearum propè vrbes importuna sæpè germinat. Secunda, minus copiosa, pusilla magis, ramulis repit minoribus, propè rudera & inculta pagorum loca, flosculis purpureis albicantibus.

Arborefcēs
Althea.

Tertia dicitur arborefcens, quæ instar fruticis assurgit, senum & octonum cubitorum. Quarta à multiplici qua pollet facultate dicitur Althea, à latinis Bitmalua, & Ibisus: Maluacea enim habet folia, lenia, oblonga, incana, flores albidiores, & semina cæteris maluis sylvestribus similia.

Radices profert crassas, longas, rotundas, in multos furculos diuarricatas, ac plurima mucagine prægnantes. Thirsi eius surrecti folia proferunt, maluacea, oblonga, incana, & aliquantùm tomentacea, flores subalbidos & semē paruum, planum ac orbiculatum, vt ceteræ malvarum species. Calefacit gradu primo, facultatemque habet digerendi, laxandi & puscoquendi.

Alcea.

Quinta dicitur Alcea, quæ facie maluae prodit, ortu & cauliculis sed altius incisis: Ex radice prodeunt numerosa virgulta, sesquicubitalia, floribus rubellis ornata, quibus defluxis, semen emergit rotundum, compressum reliquarum malvarum modo.

Sexta vocatur transmarina rosacea, à floris rosei elegantia & similitudine. Cuilibet genti notissima est, cum in hortis sata & culta multos annos perduret, radice denuò primo Vere sese propagante.

Transmarina.

Ad maluarum familiã referuntur Ibisçi quædã species, videlicet althea arborea palustris, althea Theophrasti floribus luteis. Totidem adhuc althea alceæ inueniuntur differentia, vulgaris, exotica, & fruticosior, quæ est folio pentaphylli.

Altheæ varietates.

Malua omnis vim habet emolliendi, vnde nomen eiusque folia decocta, tritaque profunt sacris ignibus & ambustis. Valet & contra venena imposita, & dolores ab ictibus apum & vesparum excitatos leuat.

Vires.

De Acantho, seu branca vrsina. CAPVT XII.



CANTHI vox non solum ad spinosas plantas, vt carduos, sed alias multas hortenses nullis acuteis horridas refertur, vt ad cynaram, seu scholinum & ad brancam vrsinam, Officinis acanthum dictam, quam nonnulli marmorariam vocarunt, quod olim in columnarum epistillijs eius folia insculpta viderentur.

derentur.

Nascitur in hortis & locis humentibus, ait Dioscorides: folia promissa longa, lata, pingua, læuia, nigricantia, incisuris erucæ modo diuisa. Caulem bicubitalem edit, læuem, digiti crassitudine, à medio ad verticem ex interuallis exornatum foliolis quibusdam oblongis, velut nucamentis parum acuminatis, sed non spinosis, è quibus flos candicans erumpit. Semen illi oblongum est & luteum: caput thyrsi specie.

Subsunt radices mucosæ, longæ, rubentes, glutinosæ, quarum nullus aut rarus in medicina vsus, etsi vltis & luxatis illitæ prosint, potè moueant vrinam & tabidis conferant: folia enim tantum vsurpari solent ad enematum decocta, cui soli duntaxat vsui tota planta destinatur, & à Pharmacopœis seritur, & seruatur in hortis: Syluestre enim apud nos reperire, perrarum.

Brancam vrsinam nonnulli vocari contendunt, quod eius folia, pedes vrsæ anteriores referant. Inuenimus & Pæderotam & melam- phyllum nuncupari.

Pæderota.

De viola, quæ inter quatuor emollientes præcipuas numeratur abundè supra loquuti sumus.

De alijs emollientibus, & primum de Mercuriali.

CAP. XIII.

Linozostis.



ERCVRIALIS à Mercurio nomen habet, à quo inuenta perhibetur, vnde Græcis, ἐγμὴ βοτάνιον *sapè*, *sapius* tamen Linozostis vocatur. Eius duæ sunt differentiæ, prima dicitur mas: secūda fœmina, vtrique furculi, rotundi, læues, geniculis aliquot asperi, cubitales, brachiati, folia circa hos multa sunt, oblonga, mucronata, ambitu ferræ modo incisa, ozimi foliis affinia. Semina masculæ bina simul juncta, pediculis cohærentia, è foliorum sinu prodeunt, aparines ritu, fœminæ verò exiguæ spicæ erumpunt cum flosculis muscosis, racematim cohærentibus, quos tabescentes semen nullum consequitur.

Vites.

Æstate integra viret, Hyeme perit, Vere redit. Eius vires maximè se produnt & expetuntur ad aluum exonerandam, eiusque succo conficitur mel mercuriale dictum, ad sopitam vim expultricem ciendam, & aluum detergendam, eluendamque aptissimum.

Est & tertia mercurialis Cynocrambe dicta, seu mas syluestris, quæ passim secus vias, & in locis vdis nascitur, quæ quod mari multum affinis sit, placuit eius nomine, cum viris literatis insignire.

De parietaria. CAP. XIV.

ARIETARIÆ plantæ vulgaris & ancillis ipsis notissime multiplex appellatio effecit, vt quid ea ipsa esset, & quo nomine insignita legitimè, viri docti dubitarint: frequentius autem in arte pharmaceutica helxine nuncupatur, qua tamen voce planta gemina à Dioscoride describitur; Prima cognominatur Cissampelos estq; conuoluuli species, quæ nascitur in sepibus, vicinasque stirpes amplectitur: Altera in parietibus & maceriis, vnde parietaria, & herba muralis dicitur: vt etiam helxine quod vestibus hæreat, flosculos emittit herbidos, pallentes, muscosos, & folia admodum hirsuta, quæ quod detergendis vitreis calycibus aptissima sint, à nonnullis vitreola nuncupatur. A quibusdam quoque herbam venti nominari comperio, sed id nominis æquius sibi vindicat anemone, vt suo loco dicetur. Cum autem parietaria vulgaris sit notitiæ, longiori descriptione non eget. Non tamen omittendam, parietariam quamdam esse sterilem, quæ semen nullum exhibet, aliam fœcundam, quæ ferè abs radice ad furculi fastigium innumera granula profert.

Muralis
herba.

Vim habet refrigerandi & detergendi, & illitu condylomata, & inflammationes sanat. Cum oleo vel butyro frixa, & regioni renum admota nephritico dolori prodest, & meatus referando calculi exclusionem mouet & accelerat. Ob id rectè syrupi de althea confectionem, ex Fernelij statuto ingreditur.

De beta & attriplice. CAP. XV.



BETA vel rubra est, vulgò nigra dicta, vel candida, vel flauescens: Tot enim colorum varietates in his reperiuntur. Rubra adhuc est duplex, vna vulgaris, ab alijs, radice, folijs, colore minimè distincta, sed colore rātū, alia Romana, quæ magis nigricat, radicem crassissimam habens rapi modo, unde & beta-rapa, à multis satis propriè beta erythrorifos, à Fuschio rapum rubrum, sed impropriè nuncupatur. Beta-rapa.


Candida inter cibos magis recipitur. Eius tamen succus potius vsurpatur ad errhinā, sua enim facultate nitrosa pituitam è cerebro deducit: hinc colligitur betam non adeo fatuam seu insipidam esse, vt putauit Martialis, stomachum enim laceffit & grauat, parūque nutrit, vnde mensis tantum rusticorum & pauperum apponitur, nisi quis prima mēsa ad ciendam aluum illa velit vtī; maximè verò candida quæ vt potius ventrem, sic rubra vesicam proritat & exonerat. Optime igitur ad confectionem diacassia accedit.

Attriplex quoq; vulgò arrochia, Græcis ἀτρίπλεξ dicta, inter herbas emollientes oprimo iure numeratur. Inter enim olera vix datur vnū quod facilius & efficacius aluum subducatur. Attriplex.

Refrigerat enim primo recessu, humectat secundo, estque qualitatatis omnis expertus, hoc est, fatua & insipida, atque aquaticam & vliginosam habet naturam: Ob id citissimè subit inferiora, & aluum aperit. Vires.

De quinque capillaribus, & primum de vero capillo Veneris.

CAP. XVI.



QUINQUE affines herbæ capillares in Officinis appellātur. Capillus veneris verus, seu adiantū verū, adiantū cōmune aspleniū, seu scolopendriū, Ceterach vulgo dictum. Polythricum, seu trichomanes, & salvia vita, seu ruta muraria. Sunt qui epithymum & cuscutam verius capillares dici existimant, quòd crines & capillamenta melius referant, proinde non tam à forma, quàm facultate, qua pollent ad tingendos capillos & amissos resarciendos, quinque herbæ prius enumeratæ capillares dici videntur.

Capillus autem veneris verus nullibi frequentius inuenitur quā in tractu Narbonensi: Raro in reliquis Gallia partibus præsertim frigidioribus prouenit: & qui Lutetia anno præterito lætè virescebat in horto Lo. Gonerii pharmacopœi meritissimi, præ rigiditate hyemis anni 1608. periit.

Herbula est sine caule, flore, semine nascens in locis verrucosis, petrosis, vmbrosis, vdis & in fontium asperginibus. Pro caule cincinnos habet, plusculos, capillosos, fuscos, quibus adhærent paruula folia, ac tenella, coriandri foliis non multum dissimilia, vnde à Mesueo, coriandrum putei vocatur. Nomen autem adianti datum fuit, quod aqua perfusum, vt etiam cætera species. & *diuèrta*, hoc est minimè madeat, asserente Theophrasto: quod tamen asserendum non est de longiore maceratione: nam si diutius aquæ fuerit immersum, perinde ac aliæ plantæ madescit.

Adiantum in caliditate & frigiditate symmetrum est, ex Gal. verum desiccatur, extenuatur, digeritur, alopecias capillis vestit, strumas & abscessus discutit, lapides frangit epotum, & mirum in modum, thoracis, hepatis, renum & lienis affectibus opitulatur. Vires illius profuse à Mes. describuntur.

Cap. 13.
li. 7. de
hist.
plan-
tar.
Lib. 6.
de sim-
pl. med.
Cap. 20
de sim-
plic.

De adianto vulgari. CAPVT XVII.



PÆTER adiantum verum, quod absolutè dictum capillum veneris verum portendit, Theophrastus duas adhuc eiusdem nominis plantas humiles notat Adiantum videlicet album & nigrum: vtrique tamen ramuli nigro colore nitent: folia similia, crispa nempe, densa & punctulis rubiginosis altera parte conspersa, atque prorsus eadem vires: Sed cum alterum cauliculos, neruulosve proferat nigriores, & obscuro virore magis saturatos, nigrum vocatur. Misero egrorum damno halucinantur, qui pro vtroque dryopteridem vsurpant. Miraculo quidam nimis creduli tribuunt, quod aqua perfusum non madeat, vt dictum est, aut aquam ita respuat, vt siccum semper videatur: Sicque ab euentu nomen adianti detortum. Verum longior eius in aqua demersio, infusione contrarium docet: nonnulli putant sic iustius nominari, quod à pluuia descendente non citò madeat, pennarum anatum ritu: vel aquarum margines, ac puteorum parietes circumuestiens, aquam tamen quasi fugiens non attingat, perinde ac hirudines, quæ in hominum ædibus delectantur & nidificant, ab hominibus tamen contrectari & cicurari nusquam patiuntur.

Adiantum porro ex radice pusilla, filamentis pluribus compacta & nigra exiles surculos emittit, iunceos, rectos, sesquipalmm altos,

Cap. 13.
lib. 7.

& aliquando longiores, ex herbido nunc pallentes, nunc nigricantes; foliolis mollibus vtrique vestitos, filicis maris diuisura, situ & ritu sed multò tenuioribus & minoribus, altera facie magis, altera mirus viret tibus, & punctis aliquot maculatis. Locorum opacitate gaudet, perpetuò viret, folia non amittit, sed nec florem vllum, nec semen edit.

Vires adianti ad multa commendantur. Capillorum enim defluuium prohibet, vel eosdem fluxos reparat; Asthmaticis & suspensio-
sis prodest, menses mouet, strumas discutit, atque eosdem planè effectus præstat, quos capillus veneris verus.

De Polytricho. CAP. XVIII.



Tadianti nomine tres plantæ comprehenduntur, sic vnica sub triplici designatur. Trichomanes enim, polytrichum & callitrichum ex herbaria rei peritis, idem: Nam trichomanes Romanis dicitur capillaris, quò fluentem capillum expleat; Polytrichum, quò capillos multos ac densos efficiat; & callitrichum, quasi pulchricomum, quò eosdem pulchriores reddat.

Sunt qui pinulam adhuc, alij filiculam, nonnulli adiātū vocant. Nasclitur in parietibus & locis opacis, & vmbrosis, & iuxta specus ac fontium aspergines, vt adiantum. Radix ei pusilla, nigra, ex qua velut capillamenta, nitida, rigida, fusca, breuia erumpunt; vtrique folia paruula, optimo disposita ordine, & aduersos inter se pediculos habentia lentis magnitudine & effigie, sed tenuiora, & subter maculis ferrugineis signata.

Nec flores, nec semen gerit, vt adianta, quibus in facultatum conditione conuenit.

De Ceterach. CAP. XIX.



OTA Pharmacopolarum turba in hoc diu stetit errore Scolopendrium & hemionitidem, vulgo linguā ceruinā nihil inter se discriminis habere, & vnicā plantam esse: Sed medicorum vel nudis verbis, vel libris peritiores facti, nunc agnoscunt asplenium, seu splenium, vulgari ac barbara voce, Ceterach dictum verum scolopendrium esse, cuius folia paruula sunt, polypodij modo diuisa, subter flauescencia, hirsuta, angusta, corrugata, viridia, pediculo vix palmum longo & nigricante adhærescentia, aduersa serie disposita, ita tamen vt alia non directè aliis, vt in polytricho, sed aliorum interstitiis, vt in polypodio quodam opponantur.

In petris inuenitur, & opacis parietibus, atque quibusdam aliis

locis saxosis & vmbrosis. Nullo caule, sed pediculo tenui fulcitur, nullo flore coronatur, nullo semine grauidatur, frequēs est ac ferax in multis Gallia regionibus in quibus sponte prouenit, praesertim in locis vdis, necnon petreis ac soli expositis, magno rei medicamentariae commodo & vsu. Vix enim datur aliquis praeter naturam effectus cui medicando non profit, aut obfit.

Vires.

Vim habet eximiam ad lienem minuendum, calculos atterendos & pellendos, vrinam mouendam, singultum sedandum, & icterum sanandum.

De Salvia-vita. CAP. XX.

VIRIBVS & effigie proxima est capillaribus alia planta quae a similitudine foliorum rutae, cui perbellè conuenit, & a loco natali, in quo sponte & late viret, ruta muraria, in officinis Salvia-vita vocatur. Petras opacas, manantia saxa, aedificia vetusta & specus amat. Et velut saxa diuidens e medijs eorum incisuris erumpit, tenuibus, breuibus & iunceis surculis, & velut filamentis adianthi valde similibus, quibus foliola adhærescunt parua, crassa tamen, incisa, ex albido colore virentia, & ad ruram accedentia.

Tota planta vix palmum æquat, flore & semine vidua, perpetuoque viret, vnde frequens est eius vsus per hyemem, cum scilicet alię stirpes defunt, vel aridæ non satis conueniunt.

Vires.

Vim habet mearus referandi, obstructions liberandi, excrementa mouendi, humiditates serosas exsiccandi: Propterea iecoris, lienis & mezentery inarctibus expediendis conducit, menses & vrinam ciet, calculos pellit, hydropi medetur, & vitijs, quae intra sunt thoracem, opitulatur. Falluntur qui paronichiam esse putant.

De quibusdam alijs capillaribus, minus propriè dictis, & primum de Hemionitide. CAP. XXI.



VIRIVM efficacia quibus ad splenem minuendum pollet hemionitis, a Pharmacopolis vocatur nunc Asplenium, nunc Scolopendrium, vt ceterach quod ea in re ceteris omnibus medicamentis antecellit: Reueratamen hemionitis, Scolopendrium non est aut asplenium, seu ceterach vulgare, sed alia quaedam herba caulis, floris & seminis expers, & folijs tantum extra terram prodiens, vnde Phyllitis sepius, quasi foliosa herba dicitur. E radice enim multis capillamentis fibrosa & nigricante folia multa exeunt, crassa, rigida, longa, ceruorum lingue modo, hinc ceruina lingua multis dicta, supernè leuia, infernè multis lineis transversis ferru-

Phyllitis.

ferrugineis asperula. Gaza herbam mulam nominat.

Eius quædam species in rei herbariæ studiosorum hortis alitur, cuius folia in extremo multifida sunt & incurua; sed præter hæc nihil à vulgari dissenteum: A Clusiophyllitis laciniato folio vocatur. Herba mulla.

Multi est ad lienem vsus, cuius non modò obstructionem tollit, duritiem & tumorem minuit, sed etiam hepatis affectus multos fœliciter sanat. Vires.

Ad capillares referri potest herbula quædã insignis effigie, natura, conditione ac viribus. Rorida, seu ros solis nuncupatur, quæ in scrobibus ac locis vdis nascitur, atque fibrosa radice nixa quatuor aut quinque & sæpè plures aut pauciores furculos tenues emittit, admodum breues, aut certè raro palma longiores, rubellos, flosculis albidis coronatos, teretum seminum præuios. Ipsius foliola ab radice exurgunt, pediculis oblongis & incuruis fulta; concava, auriscalpio, aut paruulo cochleari admodum similia, subrubra, hirsuta, asperula, in ambitu curuata & hispida, in cavitare glabra, rore perpetuo, seu guttulis limpidis, etiam in mediis cœli squaloribus aspersa. Saporem exhibet cum aciditate & acrimonia quadam acerbum. Vim habet compescendi humores vndecumque fluentes: Ob id salسام pituitam, ne in pulmones irruat, impedit, & eorum vlceribus ar-cendis ac sanandis mirificè confert. Ros solis.

De Cuscuta, & Epithymo. CAP. XXII.



VSCUTA, seu cassitha herbosis fruticibus adnascitur, epithymi modo, nullaque radice nixa, sed velut ab alarum sinu prodiens, cirris, capillamentisve longissimis repit, inquit Mathiolus. Eius autè vberior esse solet prouentus in segete linaria, crebrisque volutionibus lini fastigia scandit, vnde podagram lini officinæ appellitant.

Fuschius non sine ratione credit Cassitham primùm radiculis niri, quæ tum arescunt, quando cirri, seu capillamenta plantam inuoluunt, à qua sugunt alimentum: Proinde temperamentum mutat & qualitatem, pro varia plantarum, quibus innascitur natura, putantque multi epithymum & cuscutam non differre, nisi quod hæc lino, illud thymo innascatur.

Mathiolus tamen refragatur, & effigiem vtriusque non parum dissimilem tradit necnō qualitates, etiam Galeni testimonio. Epithymum enim calefacit ordine tertio, & cassuta tantùm secundo, ita ut verissimile sit, epithymum suas vires à thymo, cuscutam à lino mutuari. Perperam igitur faciunt, qui podagram aliarum plantarum assumunt pro vero epithymo, aut cuscuta.

Vtrique nulla sunt folia, sed cirri tantùm, & velut tenues, ac subrubræ testudinum fides, quibus flores paruuli, quasi stellulæ al-bicantes dehiscunt, pusillo semine gravidati, quod syrupi de cichorio laxatiui rhabbarbaro ingreditur compositionem. K

Vires.

Vim habet abstergerendi & roborandi, Iecoris & lienis obstructions tollit, vrinam mouet, ictero succurrit, & affectibus ab humore bilioso & melancolico ortis prodest.

De quinque radicibus aperientibus, & primum, De Apio.

CAPVT XXIII.



ADICES aperientes multæ sunt, quarum quinque cæteris dignitate quadam præferuntur, ex quibus tres hortenses sunt, petroselini, asparagi, fœniculi; Aliæ agrestes, quæ scilicet in locis incultis nascuntur, apij & rusci.

Apium autem Latinis & ἄπιος Græcis multum inter se dissentiunt, vt & Persilium vulgo dictum & petroselinum verum. *cap. 177 lib. 4.*

Nam apios ex Dioscor. folio constat rutaceo, breui, caulibus ternis, aut quaternis, humi prostratis, radice exterius nigra, intus alba, pyri effigie, & corpusculumque, deque mouet, licet non ita vehementer. Atque aliquando Apios pro forma pyri, aliquando pro sapore satiuo, aut vix perceptibili sumitur.

Apium.

Apium verò sic vulgò dictum, seu Selinon, vel potius eleoselinum, vt Dioscorides nominat, apio satiuo, persilio, vulgò dicto, simile, sed grandius; Ad eademque efficax, sed propter ingratum saporem & odorem, inter olera minimè locum habet. *cap. 73 lib. 3.*

Apios.

Nascitur in locis, vt plurimum incultis, vdis, ac riguis, vnde Paludapium, non improprie nominatur, & apium rusticum.

Vires.

Calidum est secundo gradu, siccum tertio, menses, & vrinam mouet: flatus quoque discutit, & magis semen quam ipsa herba, valetque ad aranearum morsus, ait Plinius. Radix vero sæpissimè usurpatur ad diducendos meatus, & obstructions liberandas. folia comeduntur. *Gal. lib. 8. simpl.*

De Petroselino. CAPVT XXIV.



VOD veteres apium hortense, seu satium vocarunt, nos petroselinum nostras, ac vulgare persilium, hortis omnibus frequentissimum, & iusculis, ac cibis condendis familiarissimum vocamus, quod non nisi in hortis lætum ac copiosum viret, in quibus ad gratiam, quam cibariis admixtum concedit, sedulo feritur; & in locis tam calidis quam frigidis vberimè prouenit, modò pinguibus, adsitque iugis humor, cuius rigatu facile animetur; vnde nullum cælum & solum respuit modò cultum. Semen autem illius omnium tardissimè germinat; nimirum quadragesimo die à satù, & nonnunquam quinquagesimo.

Folia fert coriandro similia, crispata, radices longas & capillatas, esuigratissimas, medicinæ vtilissimas.

Vires.

Dantur vtiliter calculosis, ictericis, & iis mulieribus, quibus statim menses non procedunt, nec non his qui vrinæ difficultatibus laborant.

De Asparago. CAPVT XXV.



SPARAGI dicuntur sic, quòd in virgultis asperis nascantur. Eorum enim scapi asperi sunt, non læues, vel quia sua sponte sine satù profiliant; Ex arietis quippe tuis & defossis cornibus pròdire viri grauissimi scripserunt: Olerum tamen & aliarum plantarum recentissimi turiones, ac tenella germina priusquam in folia explicentur, ex veterum placitis asparagi nuncupantur.

Coriuda.

cap. 152
lib. 2.

Est verò asparagus vel sylvestris, corruda dictus, vel hortensis, seu satius; Et vterque vulgaris notitiæ, inquit Diosc. multis ramis & foliolis longis, tenuibus & numerosis se arrigit, quæ instar fœniculi in capillamenta abeunt.

Hoc olus siccitate lætatur, & rigationem auersatur frequentem, ingruente tamen Autumno, dum irrigantur, thyrsulos edunt teneriores & magis succulentos.

Subsunt radices rotundæ & numerosæ, quæ vim habent aperiendi, meatus diducendi, iecur & renes obstructionibus liberandi, felle Vires, suffusos sanandi, menses & vrinam mouendi.

De Fœniculo. CAPVT XXVI.



FœNICVLVM ad varios vsus totum celebratur: nam coma tenella acetariis mixta suauitatem addit; Semen cum fenna decoctum ab ea flatu & tormina excitari solita discutit, aliæque innumera vel per se, vel aliis commixtum, beneficia præstat; Radices obstructionibus expediendis vnicè commendantur.

Planta est ferulacei generis, hominis interdum proceritatem superans, caule geniculato, fungosa intus medulla, cortice exterius læui, & herbaceo, folio peucedani, tenui, longo, molli, capillaceo, grato odore, muscario rotundo, patulo, lato, subluteo, in orbem circinato, ex quo semen nudum, oblongum, ex pallido flauescens dependet: radice longa, crassa, alba, odorata.

Sunt verò duæ fœniculi species, prima Græcis dicitur marathrum, cuius adhuc duæ agnoscuntur differentiæ: vnum dulce est, in Italia frequentissimum: Alterum vulgare, cuius semen est acrius & minutius. Marathrū,

Secunda species dicitur erraticum, seu Hippomarathron à magnitudine sic appellatum, satiuo enim grandius ac procerius est, & in Mauritania nonnunquam duodecim cubitis assurgit, crassitudine quatuor palmorum, semine miliaceo, radice alba & odorata.

Fœniculum calefacit tantum gradu secundo aut in principio tertij.

Contra serpentum ictus in vino potum confert, menses & vrinas mouet, lac generat, suffusis medetur.

Vires.

Hippomarathrum verò ad omnia fœniculo efficacius: Potenter etenim menses pellit & vrinas, calculos eiicit, regium morbum purgat, & contra serpentum morsus nihil æquè conducit.

Elaphoboscum.

Elaphoboscum nonnulli inter fœniculorum genera recensent: quod ei fœniculaceus sit caulis, vt & muscarius, folia tamen valdè dissimilia, vt & color, odor, sapor, & facies. A quibusdam ocellus ceruæ, ab alijs Gratia Dei vocatur.

Ocellus.

De Rusco. CAP. XXVII.



Ruscus & Officinis Brusca videtur esse mirthacantha, seu rusca syluestris: Exurgit enim facie & folijs mirtheis, sed rigidioribus, durioribus, mucronatis & inodoris. Virgultis adhærescunt bacca prærubra, magnitudine cerasorum, quibus nuclei bini, ternive includuntur ossei, ac tritura vix puluerabiles.

Hypoglossum.

Huic affinis est alia planta, Hypoglossum & laurus Alexandrina dicta, sed folia gerit molliora, & maiora, è quorum media ac superna parte foliola, velut lingulae supernascuntur.

Vires.

In asperis & incultis locis rusca nascitur; eiusque radice decoctio menstrua ciet, calculos atterit & pellit, stranguriæ medetur & ictero.

De quatuor seminibus frigidis maioribus.

CAP. XXVIII.



QUATUOR semina frigida maiora, sunt semina cucurbitæ, cucumeris, melonum & citrulli; Sub quibus alij fructus multi oleracei comprehenduntur, ab antiquis nomine *oîus* designati. Est verò inter eos affinitas tanta, vt ferè sit indistincta & indeterminata cuiusque nomenclatura: Nam multi sub cucumeribus melones & pepones complectuntur; Sub cucurbitis citrullus & melopepones.

Cucurbitarum varietates.

Singulorum autem multæ sunt varietates, cultura præsertim & mangonio sic effictæ. Nam cucurbitarum differentia quatuor notantur, maior, minor, seu lagenaria, anguina, seu oblonga & indica, præter colocynthida, quæ cucurbita syluestris nuncupatur.

Cucumeres.

Cucumer verò aut syluestris est, & nuncupatur asininus, ex cuius succo conficitur elaterium, aut satiaus, cuius multæ quoque differentia comperiuntur: Alij enim longi sunt, recti & flauescetes, Alij breuiiores, virides & incurui; Nonnulli compressi, lati, rotundi, Alij clypeiformes, & vulgò pepones nominantur.

Melones.

Melones Galli sæpè vocant, quos Itali pepones, hoc est dulces

Dioscorides Melopepones, .i. mala dulcia & antiquorum nonnulli cucumeres domesticos: Sed vitata nominum confusione, præstat eos fructus è Sicya satiuâ prouenientes (sic enim vocatam plantam ex qua melones leguntur, obseruauimus) & instar mali citonij, aut pomorum redolentium fragrant melones, quasi fructus pomosos nominare, quorum, vt prædictorum multæ varietates notantur. Alij enim propter odoris & saporis suauitatem dicuntur Moschatellini, alij saccharini, Alij à solo & regione vbi nascuntur aliam habent denominationem.

Citrulli magnitudine dictos omnes fructus superant, locupletantque hortos rusticorum: Quorum etiam permultæ traduntur varietates tam in colore & figura, quam in magnitudine atque etiam sapore. Nonnulli enim breuiiores sunt, alij longiores. Aliqui plani, alij rotundi & velut sulcati. Alij ex rubro & viridi flauescerites, qui dulcedine cæteris præstant.

Citrulli.

Vt autem quatuor hæ plantæ effigie sunt valdè affines, sic & viribus, & semina ex illis collecta pro quatuor seminibus frigidis seruantur maioribus, quorum frequentissimus est in Medicina vsus.

Cucurbitæ & citrulli non nisi cocti comeduntur, melones crudi suauiores, vt & cucumeres oleo & sale conditi: Cocti tamen salubriores. Nonnullis regionibus præsertim calidis melones vt saccharum dulces proueniunt: vnde vulgus succrinos vocat, & nonnulli pepones. Omnes enim fructus maturi & dulces generali significato pepones multis dicuntur. Pepon tamen peculiaris ac diuersa est planta, Cucurbitæ modo scanforia, quippe quæ perticas vicinas aut sepimenta conscendat, ipsisque connectatur suis capreolis. Si tamen desint fulcra, quibus stet ac nitatur, humi repit. Eius multæ differentię agnoscuntur. Prior folia admodum ampla promit ac vitis ritu angulosa, flores flauos ad cōuoluulum accedentes: fructus crassos, oblongos, striatos, angulosos, flauescerites. Pro varietate autem plantæ, varij pepones tam in figura, quam in magnitudine, vt in melonibus & alijs stirpibus contingit, cernuntur. Nam alij crassi sunt, vt prædicti, alij minores, breuiiores nempe, magis plane, ac fere rotundi. Alij teretes quidem, sed parui ac globosi ac tuberculis aliquādo exasperati. Nonnulli quodam modo plani latique, & velut limbo circūuoluti, atque oris in partem infernam fungorum quorundam esculentorum ritu inflexis. Alij alia forma effigiati reperiuntur pro culture, seminis & regionis in qua crescunt diuersitate Omnes pepones vim habent refrigerandi syluestribus exceptis qui amari, & calidi iudicantur.

Pepones.

Peponum
varietas.

Vires.

De quatuor seminibus frigidis minorib. Et primū de Lactuca & eius semine.

CAPVT XXIX.



LACTUCA à lactei succi, quē fundit, dum abrum-
pitur vbertate, dicta, primas inter olera tenet: vt e-
nim gratissima est in acetariis & iusculis, sic in medi-
cis vñibus salutaris; Nam præter quod sanguinem
generat satis laudabilem, feruorem sanguinis & vis- cap. 40
cerum extinguit, somnum conciliat, & hecticis pro- li. 2. de
dest, ex Galeno, est que familiare medicamentum alimentosum, iu- alim.
uenibus & biliosis naturis tutissimum. & cap.

Toto anno feri potest, & si terram pinguem, probè subactam & 13. lib.
foli expositam nacta fuerit, lætè viret & in latum sese diffundit. Dum de ma-
adhuc tenella est, si euellatur, & alio fundo probè stercoreato plan- ras.
retur, pluribus foliis in globum conuolutis extuberat, & capitata
vulgo pomata euadit.

Lactuca
pomata.

Lactuca autem vt nullum olus præstantius, sic notius nullum, nec
frequentius, cuius tres præcipuæ varietates in hortis visuntur. Ru-
gosa & vulgaris non capitata, Sessilis, seu pomata ac capitata, &
Romana nigro semine, & scariolæ folio. Addunt nōnulli alias duas
Cecilianam & Cypriam, seu Græcam: Præter quas in locis incultis
alia nascitur, quæ a lacte & semine potius quàm effigie, lactuca di-
citur, à Galeno Thridacine. Nonnulli à colorum varietate varias
enumerant, albas, rubentes, nigras, purpureas.

Vires.

Omnis autem lactuca vt & semen eius refrigerat & somnum
conciliat. Eoque remedio sæliciter vsus est Galenus ad vigilias im-
moderatas, quæ illi acciderant ob studia longiora & rarò intermissa.

Semen verò quod inter refrigerantia minora sumitur, ad multa
vsurpatur: valet enim ad gonorrhœam virulentam, ad viinæ ardo-
rem, ad humectandum, refrigerandum, leniendum, sitim extinguen-
dam, & somnum conciliandum.

De Portulaca, eiusque semine.

CAPVT XXX.



PORTULACÆ semen etiam numeratur inter semina
refrigerantia minora. Est verò portulaca, vna ex hor-
tensibus, quæ omnium maximè in iusculis & acetariis
expetitur, sæpeque pauperum & diuitum mensas in-
choat, & apud multos aceto & sale condita ad hye-
mem integram seruatur.

Duo autem portulacæ discrimina traduntur: Est enim vna sylue-
stris, quæ passim in vinetis multis spōte nascitur: multisque furculis

in terram reptantibus, ex viridi rubentibus luxuriat. Altera domestica seu hortensis, quæ studiosissimè excolitur. Folia emittit ampliora, magis carnosæ & succulenta: surculos magis erectos & minus duros. Vtriusque effigies parum dissimilis, sed vires aliquantum variæ. Satiuam enim refrigerare omnes asserunt: syluestrem calefacere nonnulli contendunt.

Alterutrius folia tusa & clavis pedum adhibita securè medentur: *Vires.* Ignibus sacris etiam auxiliantur: Capitis dolores insolatu contractos, cum oleo rosaceo sedant. Commanducata dentes mobiles firmanant, oris & tonsillarum vlcera sanant.

Est & portulaca quædam marina & aquatica, sed istarum nulla medicamentorum compositiones in Officina nostra descriptas ingreditur.

De alijs seminibus frigidis minoribus, ac obiter de Cichoraceis.

CAP. XXXI.



Do alia semina frigida minora desumuntur ex cichoraceis, ad quæ stirpes multæ referuntur, vt Chondrilla, Hieracia, Sonchi, Scariolæ, lactucæ syluestres, & intybacea omnia: Sed cum absolutè cichorium ponitur, semper erraticum & sylvestre intelligendum est, cuius scilicet frequentior est in medicina vsus: estque genus ad alias intybaceorum, tam satiuorum, quàm syluestrium differentias.

Satiuum autem cichorium: seu intybum, Græcis, dici solet, *seris*, quia seritur, Cuius duæ sunt species, vnum latifolium, quod a nonnullis, Endiuia hortensis: Alterum, angustifolium, quod *Seris*, seu *Seriola*, & *Scariola*, & à Syluio intybus dicitur. Vtrūque intybola- *Intybum.* *Seris.* *Scariola.* chanum, quasi cichorium olus vocat Galenus, quòd inter olera tam *Endiuia* *hortensis.* ad alteranda iuscula, quàm acetaria conficienda reponatur.

Ad sylvestre refertur taraxacum, nonnullis cichorium luteum, aliis Dens leonis, & Hedipnois, quasi somnum concilians dictum. A Rondeletio Chondrilla Dioscoridis nuncupatur. A quibusdam caput monachi, ab aliis vrinaria quoque dicitur. *Intybola-* *chanum.* *Taraxacū* *Dens Leo-* *nis* *Hedipnois.*

Cicerbita, seu Sonchus, Gallicè *laiteron*, quòd eius sit lacteus succus, dicta, ex Endiuiarum familia est, passimque in locis cultis & incultis prouenit: Eiusque tres differentiæ à Dioscoride statuuntur, *Cicerbita.* Aspera, lævis, & arborescens. Prima rostrum porcinum à multis nuncupatur. Clusius agnouit quinque inter se discrepantes, duas vulgares, læuè & læuiorè, duas Austriacas læuè & læuiorè & Pannonicā. *Rostrum* *porci.*

Ad sylvestre quoque cichorium referuntur omnes Chondrillæ species, quas alij duas tantum, alij quatuor agnoscunt, præter zacintham, seu cichorium verrucarium & perdicium se uerdion, quod *Condrellæ*

nonnulli chondrillam marinam, alij bulbosam nominant. Sicque in vniuersum chondrillarum erunt sex varietates, quę magis viribus, quàm facieci choraceis respondent.

Quod si ex qualitatum affinitate conforme genus inferre liceat, hieracia inter cichoreacia, aut vt alij volunt, inter sonchos, cum quibus magnam habent similitudinem, reponere nihil vetat. Sunt verò hieraciorum varietates multę, nempè maius, latifolium, angustifolium præmorsa radice, longius radicatum, villosum, vimineū, scoparia quibusdam dictum, montanum, folio hedipnoidis, foliis & facie Chōdrillę, & Narbonense falcatum. De quibus consule recentiores reiherbariæ scriptores.

Cichorii
varia nomi-
na.

Cichorij autem varia nomina vt ad institutum redeam, cichoraceis obscuritatem attulerunt. Genus enim pro specie, Species pro genere, & vna species pro altera sæpè ponitur, & eodem nomine designatur. Nam cichorio sæpè hæc nomina dantur, Ambubeia, Pircris, Intybum, Seris, Endiuia, Seriola, Scariola, Intybolachanum: Atque omnes hieracij, Cicerbitæ, seu sonchi, chondrillæ & lactucæ syluestris species cichorij nomine sæpius donantur.

Lactuca syl-
uestris.

Lactuca syluestris partim affinis est cichoraceorum generi, folia enim scariolę hortensis gerit, & partim naturæ papauerum, cum opij odorem vtcunque eructet soporiferum & virosum.

Semina fri-
gida mino-
ra.

Semina autem cichorij syluestris & endiuia sumuntur pro seminibus frigidis minoribus, quorū qualitates appellatio satis indicat.

De seminibus quatuor calidis maioribus, Et primum de Aniso.

CAPVT XXXII.



SEMINA quatuor calida maiora desumuntur ex aniso, fœniculo, cumino & caruo. Quid sit fœniculum, supra diximus, quid anisum, ipse etiam mulierculæ dicere queunt, cum eius semine sæpius vtantur saccharo incrustato. Et quæ inter eas opere pistorio delectantur, panificij quoddam genus conficiunt (biscoctum nominant) cui semen anisi permiscant, quod odorem, saporemque conciliat pergratum. Idipsum multis adhuc condimentis adiiciunt ad gratiam maiorem. Oris enim halitum commendat, vrinam ciet, hydropicis prodest, & nullum ex oleraceis seminibus vetriculo magis amicum. Calefacit & siccatur ordine tertio ex Galeno, gustus tamen nondum percepit tantum caloris excessum. Latinis & Græcis anisum vocatur, estque nomen seminis & plantæ, quam a nonnullis anicetum vocari comperio.

Vires.

Anicetum.

Planta nec apio similis est, vt scribit Fuschius, nec etiam fœniculo, vtasseruit Ruellius, sed inter vtramque media: folia enim nec ita lata, vt apio, nec ita tenuia & capillacea, vt fœniculo. Sed cum

vulgaris

Cap 69
lib. 3.
Diosco.
lib. 5.
simpl.

vulgaris sit notitiæ, in describenda illius historia non diutiùs immorabor.

Non est tamen prætereundum illa semina calida & Pharmacopœis Carminatiua, hoc est, flatus discutientia, ut interpretantur, vocitari, etymo non satis noto, nisi forsan à verbo Græco *καταίλω*, i. discerpo, & in minutas partes diuido, vel potiùs a carmino, id est, pectore, unde apud Arabes *Carmos* ad capillos veneris refertur & carminare est pilos seu lanam pectere, idque non affatim, sed paulatim, perinde ac flatus sensim discutuntur. Non tamen mihi satis constat vera carminatiui vox & origo, licet usu iamdiu admissò cōprobetur. Nec eorum improbo iudicium, qui cuminatiua potius quàm carminatiua dici debere contendunt, quum nihil sit eorum quæ flatus discutiant, quod viribus eximijs cuminum æquet.

Carminatiua unde dicta.

Carmos.

De Cuminò. CAPVT XXXIII.



YMINVM, seu cuminum & seminis & plantæ cuiusdam fœniculo similis nomen est; Cuius duo genera perhibentur, vnum satium, ac domesticum, aliud sylvestre. Satium regium Hippocrati dictum, morbis mulierum multis ab eodem commendatissimum, à Dioscoride Æthiopicum, à quibusdam Ægyptium & Asiaticum nuncupatur.

Id ferè vnicaule, rarò cubitale, sæpè pedem tantummodo altum, interdumque humilius, frequentibus ramulis brachiatum: folia in tenues particulas secantur ad fœniculum accedentia, sed breuiora, minoraque: In virgularum fastigijs exeruntur umbellæ, primùm flosculis ornata, postea seminibus onusta, nudis, angustis & canaliculatis: Radix subest aliquantùm tenuis & odora, quæ seminibus maturis tabescit. Seritur & vberè prouenit in Hispania, Italia & quibusdam Galliæ regionibus calidis, modò semen in pingue solū ini-ciatur. Inter olera maximè fruticat, atque eò magis si cum probris & maledictis feratur, ut idiotæ putant, quos irridendos magis, quàm probandos puto.

Sylvestre cuminum gingidij folia profert, cauliculos exiles, scandicis seu pectinis venerei ritu: in cacumine capitula quina, aut sena rotunda, villosa, in quibus semen est acerosum.

Cuminum sylvestre.

Diosc. c. 69. l. 3. Est alterum satiuo valde simile, quod à floribus singulis cornicula promit in sublime exerta, in quibus semen est melanthio simile, ait Diosc. hocque videtur ea esse planta, quam Officinæ pedem alaudæ, *Consolida* & consolidam regiam dicunt. Est & quoddam Æthiopicum quod *regia*, Fuschius Carnabadium putat.

Cuminum calefacit & siccatur tertio recessu, attenuatur, digeritur, resolvitur: Sumptum & adhibitum flatu discutit, frigidos humores incidit; tumores pituitosos dissipat, venenis adversatur: contra colicum dolorem & Tympaniam prosperè usurpatur.

De Caro. CAP. XXXIII.



OTVS aromatariorum chorus Caron, siue Careū vno consensu Carui vocitat, Athenæus Pastinacam maiorem, cui viribus & vultu apprimè responderet. Caule assurgit cubitali, & sæpè altiore, quadrangulari, geniculis quibusdam intercepto, intus cauo, folijs pastinacæ agrestis, vel Dauci nigri, quem vulgus carottam nominat. Radix ei carnosa, gracilis tamen, oblonga, candida, interdum flavescentes, sapore pastinacæ. Semen fœniculi modo in surculorum summitatibus multum, subnigricans & angulosum. Ab Arabibus vocatur Cordumeni, quod pro Cardamomo usurpat Syluius, sed eum deceptum credunt Arabicæ linguæ peritiores.

Vites.

Caruum tertio quodam modo recessu calefacit & siccatur: vrinam mouet, menstrua pellit, flatu discutit, stomachum roborat, coctionem iuuat: vtiliter miscetur antidotis, & anisi vicem gerit. Eius radix cocta, pastinacæ modo manditur ex Dioscoride.

Cap.
66. l. 3.

De alijs quatuor seminibus calidis minoribus, Et primum, De Ammi.

CAP. XXXV.



MMI Cumino tam affine est, vt quod in Æthiopia nascitur, pro Cumino habeatur. Semen notum est; inquit Dioscorides, & minutulum, multoque minus cumino. Quod videtur indicare ipsius appellatio *ἀμμι* siquidem perpusillum & quasi arenaceum semen portendit, qua voce & tota planta designatur.

Duplici autem discrimine Ammi notatur, vnum dicitur Æthiopicum, quod maius est & vulgare, folijsque constat latioribus.

Alterum minus, tenuifolium, nec adeò frequens. Prius caule sese erigit herbaceo, rotundoque, surculis multis & exiguis; folio oblongo, angusto, pluribus incisuris in ambitu diuiso; muscario anethi proximo, paruulis floribus coronato, seminulis multis organum spirantibus, cum acrimonia amaricantibus referto.

Ammi minori culmus brevis est, multis ramulis diremptus, folia oblonga, capillacea, sursum versus magis attenuata: flores vt priori, paruuli, albidii, in umbellæ coacti: Semen oblongum, paruulum, & acre. A quibusdam pro Sifone usurpatur. Nam cum Sifon, seu

Sinon, secundum Diosc. semen sit exiguum, in Syria natum, apio simile, nigrum, feruens, oblongum, ac ammi paruo simile, pro eo si non sumi, certè substitui potest.

Ammi gustu acre & subamarum est: incidit, tenuat, calefacit, siccatur & digerit: Vrinam & menses mouet, inflationes & tormina discutit. Vires.

Creduntur mulieres faciliùs concipere si post coitum ammi, halitum odorentur.

De Amomo. CAP. XXXVI..



ON modò inter exoticas stirpes, sed prorsus incognitas, Amomum numeratur: Nullus enim antiquorum illius effigiem, aut accuratam descriptionem dedit; Et inter recentiores Clusius rei herbariæ studiosissimus & amomi perquirendi, dignoscendique auidissimus, triplicem quidem illius iconem exhibuit, sed vix probabili coniectura sciri potest, quamam illarum amomo verò respondeat: forsàn nulla. Prior ico, vt ipse scribit, est ramuli cuiusdam arboris, odore & suauitate ei affinis, quæ caryophyllos gerit, fructibus tamen & foliis rotundioribus & minoribus. Secunda furculos Tithymali parali non malè refert. Tertia ramum breuem, granis cardamomo vtcunque similibus racematim onustū refert. Verùm vt fatetur vir nobilis: difficile est statuere, quid sit verum amomum.

Ipsius quidem viribus à Dioscoride recensitis optimè respondet Amomum
Dioscori-
deum. minutulum quoddam semen & oblongum, aromaticum, gustu suaue & calefactorium, quod in Officinis seruatur, Amomum Creticum nuncupatum; Verùm ex quamam planta natum, non dicitur. Hoc vt & alia multa simplicia rara in Pharmacopolio Pasch. Bazoi- Amomum
Creticum. ni, viri pietate & doctrina probatissimi sæpè vidi & gustavi, maximè verò amomum vulgare, quod verum si minimè teneatur, illius tamen optimum est succedaneum, non Amomum Plinii, frigoris impatientissimum, quod Lutetia in vasis figulinis alitur, furculis re- Amomum
Plinij. ctis, copiosis, viridi cortice vestitis, foliis mirthæis, sed longioribus, floribus candidis, stellatis, quos sequuntur fructus alkekengi modò teretes, crassi, ex rubro flauescerentes, multo succo & semine turgidi. Galenus Amomo substituit acorum, licet illius nomenclatura, Cardamomo magis cognatum portendat.

Vim habet amomum calefaciendi, astringendi, & exiccandi. Vires. Eius decoctum iecori & renibus conuenit, atque eos iuuat quos scorpius percussit.

De Dauco. CAPVT XXXVII.



DAUCUS tres sub se nominis eiusdem plantas diferentes complectitur; Prima generis nomen retinēs, absolutē dicitur Daucus, qui de cretico intelligendus est, quique secundū Dioscoridem, foliis fœniculo similis est, caule dodrantali, umbella coriandri, flore albo, semine oblongo, vt cumini, lanugine quadam albescente hirsuto, suavis odoris in mandendo, cuius potissimū celebratur vsus in syrupo de Arthemisia: Aliis quoque medicamentis multis vtiliter permiscetur.

Daucus hic non in sola Creta fruticat, sed in multis aliis regionibus, vt in Germania & Italia; & qui nunc emitur Venetiis, solū nomine tenus Cretensis est, nam ex Alpibus & Genuensium tractu adfertur, nec tamen Cretico vlla in re cedit.

Secunda Dauci differentia apio similis est, sed acrimoniam quamdam habet, halitum maiorem, saporemque feruidiorem.

Tertia foliis est coriandri, floribus albis, coma & semine anethi, sed oblongiore & acri. Aliæ quædam stirpes Daucis affines, pro Daucis nonnunquam habentur: Sic Carotta à Theophrasto Daucus appellatur: Sic & pastinaca syluestris & Caucalis illius nomenclaturam sæpè mutantur.

Vires.

Dauci semen medicis vsibus frequentissimum calfacit, siccatur, aperit, incidit, vrinam & menstrua mouet, & flatus discutit.

De apio, cuius semen numeratur inter calida minora, superius egimus.

De eximiis aliquot floribus, ex quibus aqua & olea trahuntur efficacissima, & primum, De Rosis.

CAPVT XXXVIII.

*Rosarum
varietates.*



ROSA vix potest non esse omnibus nota, cum mirè sit ferox, & in dumetis, ac sæpibus spontè nascatur. Eius duo constituuntur genera, syluestris vna, quæ Cynorhodō, seu rosa canina vocatur, & altera hortensis, quæ absolutè rosa dicitur: Cuius multæ sunt differentię, rubra, alba, pallida, seu ex albo rufescens, incarnata, lutea, cærulea, quæ in multis Italiæ locis nascitur, & moschata, quæ omnium vltima, nēpe Autumno, floret. Ex eius florum infusione quinquies aut pluries iterata, si florum suppetat vbertas, parari potest cum saccharo Syrupus suaue flagrans & purgatorius, quo sine molestia liberaliter aluus ducitur, & humores aquei, simulque biliosi educuntur.

*Syrupus ro-
sæ mos-
chatarum*

Nunc in hortis multis alitur rosa suauissimè fragrans quæ rosa cinnamomea, vulgo rosa canella vocatur, vt & alia polyanthos, quæ à florum vbertate centumfloræ nomen habet.

Quæ lutea est, vel inodora, vel insuavis percipitur, & fere simplex. Quæ veluti pomum refert, pomata dicta, multiflora est, & grata raro tamen parula, præsertim in regionibus frigidis, in quibus marcescit citius quàm perfectè dehiscat.

Meminit & rosæ semper virentis Clusius, quæ etiam hyeme tota viret & viget. Eius odor suavis est, ad moschatam accedens, cui colore & effigie affinis est: flosculos enim gerit candidos & simplices, & sæpè tantum quinos, eam mihi nondum videre contigit.

Ex speciebus enumeratis mangonio & arte immutatis, multæ videntur aliæ varietates suboriri, sed trium maximè vsus in medicina expetitur, albarum, rubrarum, pallidarum. Ex albis aquæ destillantur; ex rubris, mel rosaceum, conserua, oleum & syrupus de roseis siccis paratur; ex pallidis Syrupus rosarum pallidarum.

Rosarum partes.

In rosis multæ partes distinguuntur, flos, vnguis, capillamenta, granula.

In rosis multæ partes distinguuntur, flos, vnguis, capillamēta, granula, flosculi, calix, semen, lanugo. Flosculos capillamentis appensos, Antheram malè nonnulli vocant, cūm Anthera non sit medicamentum simplex, sed compositum, & ad oris affectus vsurpatum, vt constat ex Actuario, Celso, Oribasio & Marcello.

Act. cap. 7. lib. 6. meth. med. Cels. cap. II. lib. 6. Rosæ autem non omnes eandem habent facultatem: laxant enim pallidæ, astringunt rubræ, roborant ambæ, vt & albæ communes & moschata: Nam suavis omnium odor partes eas, quæ principatū tenent, vt & spiritus omnes, maximè vitales & animales recreat & reficit.

Vires.

De Nymphaea. CAP. XXXIX.



NYMPHEA, quam à Nympha zelotypiæ stimulo erga Herculem mortua natam Poëtæ fabulantur, inter plantas aquarum alumnas maximè ad medicos vsus commendatur. Eius duæ in officinis agnoscuntur differentiæ, vna maior, quæ flores gerit candidos, Altera minor, quæ luteos. Vtraque nascitur in stagnantibus aquis & paludibus.

Maior folia fert ampla, orbiculata, herbacea, caules graciles, longos, laues & rotundos; flores candidos, lilio candore & magnitudine similes, in medio quid croceum continentes: radicem nigram, nodosam, longamque. A quibusdam lilium aquaticum vocatur, ab aliis nenuphar, a non nullis heraclea.

Minor è limoso & aquoso etiam fundo prodit, iunceis pediculis,

Vires.

trium sæpè cubitorum, quibus adnascitur flos luteus, ac nitens, rosæ similitudine, Radix subest alba, nodosa, aspera, subdulcis.

Nympha insigniter refrigerat, veneris insomnia compescit, semē immodicè fluens retinet, id ipsum extinguit potum & illitum, somnum conciliat, gonorrhæ multum prodest, & venerem in totum adimit, si diutiùs sumatur eius decoctum vel conferua, aut syrupus ex floribus paratus.

De Lilio. CAPVT XL.



LILIUM à Græcorum nonnullis Crinon, ab aliis qui ex Iunonis lacte natum credunt, Iunonia rosa dictum, in coronamentis rosæ proximum est: Illius enim candor eximius, odor suauissimus & elegantia formæ nobilitatem illustrant.

Planta est bulbosa, fœcundissima, quæ ex vna radice quinquagenos sæpè profert & alit bulbos. Simplici caule sæpiùs assurgit bicubitali, & interdum tricubitali comoso, foliis Satyrij, sed longioribus, foris striatis, ex herbaceo nitentibus, vt Coronæ Imperiali dictæ, quæ lilium quoddam est: flore calathi effigie, resupinis per ambitū labris; ex calycis fundo emicantibus aliquot apicibus & velut staminibus luteis, in extremitate tuberosis.

Flos ille patulus, latus & elegantissimus pedunculo tenui, lægidoque adhærescens, hic verò surculo crasso & rigido, foliis vndique cincto, qui circa finem æstatis marcescit, & adueniente Autumno radices eius denuò pullulascunt.

Sunt autem liliorum genera multa, nam præter candidum & commune, quod sic absolutè dicitur, aliud est candidum Byzantinum, à loco vbi nascitur, nonnihil discriminis mutuatum; aliud cruentum, quoddam luteum, aliud puniceum. Est & paruulum quoddam conuallium seu lilium vernum dictum. Est & magnum lilium Persicum, vulgò corona Imperialis, *Tusai* Barbaris nominatum. Quibus adiunguntur hæmerocallis Chalcedonica, Byzantina & martaga multa, de quibus omnibus agere nostri non est nunc instituti.

Vires.

Radix lilij cãdidi malactica est & anodyna, & vsus plurimi ad enematum decocta & cataplasmata emollientia, & pus mouentia conficienda. Ex floribus infusis paratur oleum ad eisdem vsus commẽdatum. Ex hisdem adhuc destillatis habetur aqua ad facies mulierum erugandas, & niueo candore illustrandas summè expetita.

De Croco. CAPVT XLI.



N ordinem florum eximiorum referimus plantam cuiusdam bulbosæ florem aureo cruore nitentem, quem medici Crocum, Galli Mauritanorū idioma sequuti *safra-num*, nominant. Est autem bulbosa stirps, viuax & carnosa, folio angusto & gramineo, flore hermodactyli pratensis, purpureo & cruore aureo nitentibus filamentis, odoris intensi cū quadam acutic. Iuxta fontes & semitas læte fruticat, gaudetque calcari & atteri pedibus, pereundoque, inquit, melius prouenit.

In Coryco tamen Ciliciæ monte omnium præstantissimus nascitur. Fragrantius enim spirat & colore plus aureo est. Vere viret, tota æstate sese in latum diducit, Autumno flores leguntur, qui non tantum in medicos & culinarios trahuntur vsus, sed alios quoque multos in quibus aureus color desideratur.

Est verò crocus vel domesticus, cuius Dioscorid. multas enumerat species, vel sylvestris, cuius Dodoneus adhuc plures describit, quas omnes breuitatis causa defero.

Calefacit ordine secundo, primo siccatur: eiusque moderatus vsus *Vires.* cerebro prodest, sensus vegetiores reddit, somnum & torporem excitat, cor recreando lætitiæ gignit, humores ad coctionem perducit, multisque commodis beat illum, qui eo ipso prudenter vti scit. Ex eo parat oleum M. f. quod emplastri confectionem de Ranis ingreditur. Ad alias quoque compositiones accedit, vt syrupum regis Saboris, & emplastr. Oxycroceum, quibus non modò colorem, sed etiam vires largitur eximias.





SECTIO SECVNDA

De Simplicibus purgantibus.

P R Æ F A T I O.



Aboluta libri huius prima sectione, in qua vulgaria quaedam simplicia quæ velut preparantia sunt, & passim in medicina facienda, medicamentisque componendis occurrunt, breuiter, perspicue tamen explicauimus; Secundam nunc aggredior, in qua multa cathartica, seu humores aluum subducendo purgantia describuntur, quæ aliquando vel per se sola exhibentur, vel aliis compositionibus in Officina nostra descriptis permiscuntur. Ea autem magna ex parte peregrina sunt, & à regionibus barbaris mutuata, quæ ob id non nisi arida, aut saccharo condita, ut siliquæ Cassiæ teneriores, ad nos deuehuntur. Eorum tamen ad nos aliquando semen delatum, & in solo pingui, aprico, & soli exposito satum, germinat. Sed ob hyemis rigiditatem planta hinc nata raro adolefcit, aut adulta sobolescit, & vix unquam primigeniam retinet naturam. Medicæ igitur ditiones augenda & felicius hominum sanitatis conseruanda gratia, ab Indis & Arabibus multa mutuamur simplicia, quibus præsentissima morbis infinitis auxilia adferimus: Non tamen est adeo nostra ingrata tellus, quin optima quoque purgantia liberali manu suggerat, ut ex hac sectione demonstramus.

De Rhabarbaro. CAPVT I.



ET ATIS præteritæ multi Rhaponticum & Rhabarbarum idem esse putarunt, nec centaurium maius & Rhaponticum inter se dissentire: Sicque de diuersis tribus plantis vnicam effecerunt. Rhabarbarum autem nostrum vulgare, non esse Rhaponticum, manifestè conuinciteius descriptio à Dioscoride tradita: ut neque etiam Rhaponticum ipsum esse Centaurium maius author ipse docet, qui diuersis capitibus de vtroque agit, diuersamque faciem & virtutem agnoscit.

Est verò Rhabarbarum vulgare sic dictum, quod sit insignis radix populi Barbari, seu Indici, vel prouinciæ cuiusdam Barbaræ dictæ, ut Troglotidycæ. Forsan & à Rha fluuio Ponti nomen habet, ut de

de Rhapontico probabili ratione scribitur. Sed cum rha peregrino idiomate radicem designet, antonomasia quadam rhabarbarum, seu Rha, quasi optima radix, ab Arabibus *Raued*, à Chinenſibus *Rauam*, apud quos frequentiffima eſt, optimaque ſapiùs ſine additione denotatur.

Maximè autem laudatur Rheum, quod ex Sinarum regione, vbi duntaxat vberriimè, ac ferè ſpontè prouenit, adfertur, in Indiam, in *ormus*, in Perſiam, Arabiam, & Alexandriam: ex quibus regionibus, dum ad nos poſtea aduehitur, Indicum, Arabicum, Antiochenum, Turchicum quoque nuncupatur.

Eſt verò rhabarbarum Hippolapathi rotundi ac noſtratis facie admodum ſimile. Radix eſt craſſiſſima, rotunda, colore exterius ſubnigro ac ruſeſcente, & interius ex rubro ſaueſcente, & ad nucis moſchatae colorem internum accedente: Et præterea cùm maceratur, vel maſtichatur croceo inficit colore.

Medicamentum eſt cholagogum, benignum, ac iecoris & ventriculi roboratiuum: Affèctui dyſenterico, cholericò & alijs ab hepatis imbecillitate natis conuenit, confertque plurimùm. Vt etiam renibus ſuo amarore detergendis: Inditio eſt ipſius inſtinctura, quæ illorum pelues & anfractus conſeſtim eluit, & lotium croceum reddit.

Vires.

De Caſſia. CAP. II.



RIPLEX Caſſiæ nomine ſtirps designatur, Caſſia odorata, quæ Theophrasto Cneoron, & forſan Virgilio lauendula dicitur, Caſſia lignea, ſeu canella, & Caſſia nigra, ſeu fiſtula, aut ſiliquoſa, quæ arbor procera eſt, inſtar iuglandis, folia habens ei valde ſimilia, ex pluribus compoſita. Ligni materies valde compacta, duraque eſt: cortex non valde craſſus & aliquantum ſaueſcens.

Fructus ſiliquæ ſunt, longe, rotundæ, nigræ, exterius lignoſæ, intus medulla multa, nigra & multis ſeminibus rotundis & planis, quæ à ſe inuicem membranis ligneis ac tranſuerſis diuiduntur, prægnantes.

Antiquiores hanc vel non norunt, vel ignauè neglexerunt. Arabes omnium primi, cùm illius ſalubrem uſum eſſent experti, valdè commendarunt.

Medulla caſſia plurimùm humectat, calorem immoderatum temperat, aluum lubricat, lenit, ſubducit, & clementer ſine torminibus fæces educit. Vtiliter datur pueris, ſenibus & grauidis.

Caſſis vires

De Tamarindis. CAPVT III.



AMAR Arabum est Idioma, quod daëtylum, seu palmulam notat, non quod arbor in qua fructus hic nascitur, palmula sit congener, cum valde sit illi dissimilis. sed quod vulgato nomini & improprie usurpato aliud aptius dare Barbari non curarunt, à quibus Tamarindi, hoc est, daëtyli Indiae vocantur.

Propter eorum aciditatem Græci Oxyphœnica, id est, acidas palmulas nominant, aliquando & daëtylos, sed minus rectè, quod nullum ex digitis satis eleganter referant, etiam inflexum. Sub ipsorum atræute pulpa continetur eiusdem tincturæ, fibris nervosis, & fuscis intertexta, quæ semina complectitur terna, quaternave, admodum angulosa & cassiæ ritu compressa.

Arbor in qua nascuntur Tamarindi procera est, iuglandis, aut fraxini modo dura, compacta, multis cincta ramis & foliis armata minutim incis, palmi magnitudine. Fructus hi virent immaturi, & acidi sunt; maturi subcineritij, eorumque tunc aciditas suauitate non caret.

Malè verò putat Mesue, Garciae iudicio, Tamarindos esse fructus palmæ sylvestris Indicæ, cum in tota India palmæ non reperiantur, sed ex Arabia in Indiam aduehantur: Excerpunturque ex arbore aspectu pulcherrima, ramis brachiata multis, foliis umbrata pluribus, speciosis, filicis cuiusdam fœminæ, Hispanis *Helecho*, dictæ, similibus floribus coronata pulchellis, odoratis, candicantibus: post quorum occasum fructus emergunt, initio virescentes, qui noctu sese folijs inuoluunt. frigoris vitandi causa, interdum verò explicantur: Illa tamen foliorum inflexio, singulis noctibus etiam per inopiam fructuum adesse solet, tuncque arboris rami folijs inuoluuntur.

In Malauar Tamarindi vocantur *puli*, in Guzarate *ambili*, in Canarin *chinha*, in aliis regionibus aliam sepè sumunt denominationem. Valent ad aluum blandè subducendam, humores adustos leniendos, contemperandos, promouendos: tertio recessu refrigerant, siccant secundo.

De Myrobalanis. CAPVT IV.



I nomina rebus potius iuxta, quàm vltra naturam ipsarum debeant imponi, hi fructus Syriaci, Arabice nulla ratione myrobalani, seu myrobalana, dicendi sunt, cùm nec glandium ideam referant, nec vnguenti aut odoramenti fragrantiam redoleant, vt nominis etymon pollicetur.

Quòd si Galenus & Dioscorides fructui cuiuspiam iuxta naturam eius myrobalani nomen dederunt, tantùm is à myrobalanis vulgaribus differt, quantùm res inodora à fragrante, aut à glandibus pruna.

Recepta tamen potius longo vsu, quàm ratione myrobalanorũ nomenclatura, dicimus eos omnes prunorum quẽdam genera esse, qui à tot diuersis arboribus excerpuntur, quot cognominibus distinguntur. Singulorum enim diuersa effigies & facultas illorum errorem demonstrant, qui in eadem arbore nasci, sed diuersis temporibus colligi contendunt.

Sunt verò quinque numero, flauì, Indici seu nigri, Bellerici, Cepuli, & Emblici, quorum magna pars in regno Cambayæ inuenitur, & ab incolis singulorum nomina Garcias ab horto deprompsit, & paucis arbores & fructus singulos delineauit.

Arare, inquit, seu myrobalanus citrinus rotundus est, & folia forbi profert: *Rezannuale* seu niger, aut Indicus, octogonus est, & folia salicis habet: *Gotim* seu Belleticus, foliis est lauri, sed pallidioribus & subcineritiis: *Aretica*, seu Cepuli myrobalani magni sunt & rotundi, oblongiores tamen, cùm perfectum incrementum nacti sũt: folia persicis similia habent: *Anuale*, hoc est, emblici, folia habent minutim incisa & palmum longa.

Arare.
Rezannuale.
Gotim.

Sunt arbores singulæ magnitudine pruni: omnes syluestres & sponte nascentes, & nuspiam domesticæ. Auicenna myrobalanos vocat *Delegi*; peculiariter verò flauos *azfar*; Indicos *asuat*; Bellericos, *heleragi*; cepulos, *quebulgi*; emblicos, *embelgi* vocant Arabes.

Anuale.

Vires.

Singuli myrobalani peculiare habent dotes: Nam citrini seu flauì cholagogi sunt: Indi seu nigri melancholiam ducunt & exhilarant: Cepuli & emblici phlegmagogi. Omnes autem clementer purgant astringendo & ventriculum, cor & iecur roborant.

De Aloë. CAPUT V.

Aloës des-
criptio.

ALOES nomine quædam herba percelebris, vt & succus eius medicis vsibus multum commendatus appellatur. Per os enim seu sumatur, seu adhibeatur exterius, salutare præstat effectus. Est verò aloë plânta vix, aut parum scillæ similis, vt quidam crediderunt, folia enim crassiora sunt, pinguiora, longiora, latiora, vtrinque aspera, crenata, retrouersum repanda, spinulis aliquot retusis aculeata, lento tenaciue succo turgida, foliorum sedimenti maioris modo: Caulem erigit pedalem: flores multos, candidos, & semen, vt asphodeli. Radix singularis ac crassa, cuiusdam pali in terram adacti effigie.

Copiosissima prouenit apud Indos, vnde succus eius defertur, vt etiam ex Arabia & multis aliis regionibus calidis.

Hæc sæpè biennium, & aliquando diutius pensilis in tabulatis, suo tenaci lentore viuit, incrementum capit, & noua folia promit; at solo demissa marcescit. Ob viuacem eius naturam (perpetuò enim viret) semperuiuum marinum à quibusdam vocatur: nisi tamen à frigore, cuius est impatientissima, studiosè conseruetur, citò tabescit.

Porro tota aloës planta, grauis est odoris, & saporis amarissimi, præsertimque succus eius, qui à quauis ipsius parte extractus bonus est, & in medicina facienda vsitatissimus.

Aloë cabal-
lina.

Eius autem concreti liquoris duæ differentię ad nos aduehuntur, vna arenosa & sordibus conspurcata, quæ veterinariis, seu equis medicandis dicata est, & Caballina vocatur; alia hepatis modo coacta, vnde hepatica, vel Succotrina, quasi succo-citrina, quod eius puluis citrinus sit, dicitur, aut, vt quidam volunt, Socotorina, quod ex Socotorina, vel Succutrina Persiæ insula deferatur præstantissima.

Aloë vis.

Laudatur ruffa, pinguis, nitida, friabilis, iecoris modo coacta, faciliè liquefscens: improbaturnigra, dura, arenosa & impura.

Aloë calida est ordine primo, sicca tertio. Admota densat, stringit, exsiccat, vulnera glutinat: sumpta aperit, meatus refferat, menses & hæmorrhoidas stimulat ac mouet, ventriculum roborat, aluum subducit, humores biliosos, ac pituitosos purgat, ventris tineas, ac lumbricos enecat & expellit, infarctus tollit, putredinem arcet, & cadauera diu absque corruptela conseruat.

De Senna. CAPVT VI.



T omnia Medicinæ præcepta statim in artem redacta non fuerunt; sic nec omnia medicamenta cognita, aut in vsum adhibita: nam prioris seculi medicis ignota fuit senna, Persis Abalzemer dicta, qua nullum medicamentum purgans frequentius, vſitatus, vtilius. Est verò ^{Abalzemer.} planta siliquosa è regionibus orientalibus ad nos primum aduecta, coluteæ admodum similis, cuius tamen folia ad mirthi maioris effigiem accedunt. Flores ex alarum sinu erumpunt lutei, tenuibus pediculis appensi, quibus succedunt folliculi oblongi, plani, compressi, incurui, seminibus paruis, fuscis, compressis, gygartis similibus, grauidati.

Radices eius medicis vſibus inutiles sunt, longæ ac tenues, idque plus, minus pro stirpis ætate, quæ cum sit frigoris impatiens, in plagis Septentrionalibus vix quadrimestre viuit, atque etiam in Italia raro vitra Autumnum perdurat.

Huius duę statuuntur differentię, vna dicitur syluestris, cuius folia minora sunt, rotundiora, ac minus vtilia, altera domestica, cuius ea ipsa maiora sunt, acutiora & meliora.

Non autem Senna adeo calefacit, vt plerique autumant, cum vix ^{Vires.} gradum caloris primum excedat, & circa finem secundi siccet, aut initio tertij. Purgat verò blādē pituitosos humores, vt crassos & melancholicos, simulque terget. digerit, & à cerebro, pulmone, liene, hepate, ventriculo & mesenterio lentos humores, nec non bilem vſtam expurgat. Proinde morbis dictarum partium ab eiusmodi succis proficiſcentibus medetur.

Datur & forma pulueris cum scilicet electarijs admiscetur vt electario Diabalsezer & catholiconi, & infusa ac decocta, vt cum ex ea syrupus de pomis fit purgatorius, vel apozemata quædam solutiua parantur. Quia verò flatus & tormina solet excitare, dum coquitur simul anisum, aut coriandrum, vel fœniculum ad discutiēdos flatus permiscetur.

De Radice mechoacan. CAP. VII.



X prouincia Mechoacan radix quædam eiusdē nominis, crassa, per taleolas secta & exsiccata, ad nos ab hinc paucis annis adferri cœpit. Radix, inquam, peregrina, purgatoria, ex pallido candicans, & valde crassa, ex qua rami multi, longi, imbecilli, qui nisi quodam nitantur fulcro, in terram sparguntur: Ad perticas verò accedentes scandunt, & multiplici eas nexu amplexantur, bryoniæ ritu: cui valde est vultu similis, sed viribus dissidens, nam bryonia acris est & calida multum, Mechoacan ferè insipida, nec

Bryonia.

vllius acrimoniæ particeps. Bryoniæ folia lata sunt quinquangularia, & ad vitium similitudinem diuisa, sed asperiora, hirsutiora & albiora: flores parui candidi, racemosi, & vuarum ritu congregati. Mechoacanæ verò folia ampla quidem sunt, sed tenuia, atro-virentia, & altera tantum parte mucronata, non vt bryoniæ angulosa: fructus multi, racematim cohærentes, coriandri magnitudine, autumno maturescentes. Deligenda radix albicans ac recens.

A nonnullis rhabarbarum album vocatur, ab aliis scammonium Americanum, in officinis radix mechoacana, quæ valde candida, aut nigra, aut cariota improbat.

Vires.

Calefacit tantum primo gradu, siccatur secundo. Pituitam ac serofos humores sine molestia purgat, nec partes vt reliqua purgantia debilitat, sed roborat. Cum vino melius quam cum alio liquore soluitur, daturque tutò senibus & pueris: tussi veteri, colico dolori & venereæ lui plurimum conuenit.

Ialappa.

Alia radix per telecolas secta, ex agris exoticis, exotico nomine Ialappa dicta, nò ita pridem aduecta est, Mechoacanæ viribus & effigie adeo similis, vt primo intuitu illam ipsam esse quiuisset nisi argutissimus credere potest. Vtraque enim humores pituitosos ducit; vtriusque eadem crassities, idea, & color: verum in Ialappa obscurior est, & in ea quædam veluti lineæ circulares conspiciuntur. In vsum nunc incipit venire, & à peritis fœliciter morbis quibusdam datur. Non leui coniectura Scammonij radicem esse multi contendunt.

De Agarico. CAPVT IX. VIII

Agaricum.

Resina.

Larigna.

Manna.

Laricea.

Larix



VNGI vel terreni sunt, boleti, & Căpiniones vulgò dicti proximè & affatim è terra exeutes, vel arborei, trūcis nēpe arborum adnati: vix enim vlla senescens arbor datur, cui non adnascatur fungus, vel rugosus & nigricās, vt in quercubus & iuglandibus, vel crassus, durus & albicās, vt in betula, vel albus, plenus, mollis & friabilis, vt agaricū quod præstātissimū ex Larice excerpitur. Hæc enim arbor triplici excremento nobilitatur, resina Larigna, quæ omnibus aliis humidior est, omnisque expers acrimoniæ, & malè pro terebinthina à quibusdā venditur, Manna quadam laxatiua, quæ ex effractis illius furculis colligitur, & agarico, trunco illius arboris iam antiquæ adnato.

Est verò Larix arbor conifera, eximie proceritatis, caudice assurgens recto, cortice crasso, in frequentes rimas dehiscente, foliis circa ramulos multis, ab vno tuberculo numerosis, simul cohærentibus, breuioribus, mollionibus & tenuioribus quam pini, nec aculeatis, sed retusis. Coni admodum parui sunt, cupressinis ferè similes.

Laudatur autem agaricum, quod ex Larice decerpitur, cuius est velut apostema: præstantissimum verò album, rarum, friabile, primo gustatu dulce, mox amarum & stypticum. A Democrito medicamentum familiæ vocatur.

Nascitur in Galacia & Cilicia, sed præstantissimum in Agaria Sarmatiæ regione, à qua nomen. Nunc habemus optimum ex Delphinatu Galliæ provincia, & multis Italiæ regionibus, in quibus Larices procerè ac copiosè proueniunt, quarum truncis agaricum adnascitur: vnde radicem esse minimè credendum est, vt apud Dioscoridem & Galenum, comperio. Vires.

Calefacit primo gradu, siccatur secundo: pituitam purgat, obstructa liberat, attenuat, tergit, flatum dissipat & omnibus morbis ab humoribus crassis, lentis & frigidis opitulatur.

De Polypodio. CAP. IX.



POLYPODIUM sic dicitur, quod eius radice prædeant nodi multi, & cirri polyporum piscium ritu. Vocatur & Dendropteris, seu arborum filix, quod arboribus increseat & aliquando lapidibus umbrosis, muscosis, & muris quibusdam humidioribus.

Herba est sine caule, flore, semine, radicèque tota constat, & foliis tantum filicis maris similibus, sed minoribus, parte auersa fuluis maculis conspersa. Radix illi longa & hirsuta est, minimi digiti crassitudine, per obliquum repens & multis quasi verrucis exasperata, intus porracea & virescens, vt pistacium. Sapor admodum dulcis est, subamarus, austerus & aliquantùm aromaticus, sed linguam ignauè feriens.

Neutiquam verò tertio recessu calefacere, vt asseruit Mesuè, sensus indicat, siccare secundo credibile est. Præterea humores crassos, lentos & viscidos terget, digerit & siccatur: bilem atram & pituitam lentam educit, etiam ab articulis, si largiore copia sumatur. Longissimam coctionem sustinet, & rarò solum datur, sed aliis cōmistum purgantibus, quæ illius purgatoriam vim, alioquin multum imbecillam augent. Sic ius galli veteris, aut decoctum betæ, vel maluæ illius vim summoperè iuuat. Admotum quoque quibusdam affectibus prodest, vt Dioscorides scribit. Vires.

De Carthamo. CAPVT X.



VT Carthami nomenclatura quid purgatorium, sic Cnici, quid spinosum dicit. Est enim Carthamus, planta & ventris subductoria & carduorum cognata, caule bicubitali & sæpè altiore assurgens, recto, duro, admodum lignoso & supernè ramoso. Oblonga ei folia sunt in medio & propè furculos lata, in fastigio acuminata, in ambitu aculeata.

E furculorum extremitatibus erumpunt capitula rotunda oliuæ magnitudine & sæpè maiora, multis squamulis spinosis obuallata, è quibus staminei ac crocei flores exeunt, adeò crocū referentes, vt non nisi a perspicacissimis discernantur. Hinc venia quadam plebecula digna, quæ crocū syluestrem appellat.

Cnicum.

Succedunt semina oblonga, læuia, alba, angulosa, splendentia, seminum floris Solis Peruuiani effigie, quorum cortex admodum durus, medulla candida, pinguis, subdulcis. Carthamus à Seplasiarijs sæpè crocus sylvestris, à medicis Cnicum sapius nominatur; cuius duo agnoscuntur genera, satium vnum, quod carthamus vulgaris est, alterum sylvestre, cuius adhuc duas Theophrastus differentias tradit, vnam recto caule, quo priscæ mulieres pro colu utebantur, & Ruellio attractilis est, & Carthamus sylvestris, alteram humiliorē, torosiorē, hirsutiorē, humi penè serpentem, quæ in officinis carduus benedictus est, de quo postea.

Cap. 4.
lib. 6.Cap.
155. li.
3.

Vires.

Semen Carthami inter medicamenta purgantia locum habet. Eius enim medulla phlegmagoga & per se sumpta, vel alijs mixta medicamentis humores frigidos & lentos expurgat, non verò calefacere tertio recessu sensus iudicat contra Galenum.

De Ebulo. CAP. XI.



Sambucus.

EVLVS adeo sâbucos, folijs, muscario, flore & fructu similis, vt magnitudine sola differre videantur: vnde Dioscorides vtrumque sambuci nomine indigitat, vnum, sambucum maiorem, seu arborem, alterum sambucum minorem, seu chamæactem nominans.

Sambucus in arborem assurgit sæpè proceram, virgis arundinum ritu cauis, medullosis, rotundis, primum viridibus, deinde cineritijs, lignosis & duris, folio iuglandis, sed graueolente & pluribus incisuris per ambitum serrato, floribus multis, parvulis, albis in vmbellam elegantem dispositis, quos baccae consequuntur sanguineo cruore turgentes: Sambucus sylvestriū prima germinat, & nouissima folijs nudatur.

Chamæacte verò seu ebulus herbosior est, & humilior, vt cuius caudex

caudex lignosus non est, nec perpetuus, sed quotannis tabescit & folijs commoritur. Vberrius fruticat in locis vdis, & pinguibus, præsertim incultis: folijs per intervalla binis, amplis ex pluribus compactis, per ambitum serratis: flosculis in umbella numerosis, candidis, odoratis, nec foetidis: postea fructibus, ut sambuci, parvis, rotundis, nigris, succo multo & granulis prægnantibus. Radices ei crassæ, longæ, carnosæ. Ex fructibus Autumno maturis secernuntur acinuli seu parva semina, & in officinis servantur.

Ebuli radices ut & seminula vini habent hydragogam, eamque validam & aperientem, ob id non tantum hydropi, sed alijs quoque morbis ab humore seroso natis utilem. Vires.

De Esula. CAP. XII.



INTER herbas lactarias Tithymalorum genera numerantur, quibus esulæ multum sunt congeneres, & veluti species. Omnes enim plantæ lactariæ sunt & molestè ac torminosè pituitam purgant. Esula tamen multorum rusticorum consuetum est & familiare rhabarbarum, cuius usu nonnulli sæpè conualescunt, & intereunt multi.

Dicitur verò Esula, vel ezula, Arabibus Alsebran, Dioscoridi peplus, in officinis esula rotunda, quod orbiculata constet coma. Nascitur in vinetis, sepium marginibus, & pluribus locis incultis. Alsebran.

Peplo seu esulæ cognata est alia planta, peplis & peplium à Dioscoride & à nonnullis plantago aquatica dicta, quæ vires habet easdem: potius tamen venit in usum peplus, seu esula, præsertim rotunda & minor; nam maior, quæ folijs & floribus est Tithymali, raro usurpatur.

Affines verò sunt plantæ vultu & viribus peplos, seu peplus, & peplis, seu peplium, ut vocat Hippoc. Succum etenim continent lacteum. folia habent portulacæ non multum dissimilanea, & molestè ventrem solvunt: Laudatur tamen a Galeno peplium quod flatus discutiat & *ἰσχυρότερον* esse dicit helleboro nigro, quod ambo unius modi sint seu scilicet consocialia in operando, hoc est, eodem tempore purgationem moueant, nec aliud protinus, aliud longo à propinationem intervallo ducet alium, & humores excludat. Dum enim alterum altero permixtum celerius, aut serius purgat, molestia naturæ duplex infertur; prior, dum quod prius inchoat & desinit, posterior, dum quod posterius utrumque facit. Sic *ἰσχυρότερα*, vocat Hippocrates, & non ea quæ eosdem humores trahere sunt nata. Ista leuiter ac obiter tantum attigimus; fusius & doctius hæc & similia Hippocratis oracula in nostris scholis agitari solent.

Nec prætereundum hic Dioscoridem tantum septem Tithyma-

Tithyma-
lorum spe-
cies 26.

lorum meminisse, quibus Esulam multi connumerant; præter quam tamen recentiores, vt Bauhinus, vir sane doctissimus 26. differentias agnorunt, quas sigillatim distinguere aut describere mei non est instituti. Redeo igitur ad Esulam.

Vires.

Esula calida est acris, vlceraans & cum violentia humorem pituitosum educens, Substantia enim tenui constat, ignea, acri, incidente, tenuante, fundente, aperiente & siccante. Præter pituitam & aquas trahit atram bilem etiam à iuncturis.

Castigatur illius feritas infusione in aceto facta, vt in Officina docuimus, vel cardiacorum & roborantium admistione. cap. 8.
lib. 2.

De Hermodactylis. CAP. XIII.



ERMODACTYLVS & ephemerum Colchicum bulbosæ sunt plantæ vultu affines, sed viribus dissimiles: nam ephemerum dicitur strangulatorium, quod vna die suffocatu interficiat, nec multum purgando aluum ducat; hermodactylus nullum assumentis periculum adferat, & pituitam ritè etiam à iuncturis expurget.

Ephemerum
nostras.

Est aliud ephemerum nostras, quod nonnulli bulbum agrestem & crocum pratensem nominant, cui folia terna aut quaterna sunt, oblonga, vt cumque lata, læuia, pingua: flores colore & forma croco similes, eodemque tempore, nempe Autumno exeuntes: radix bulbo similis. In pratis nascitur & locis humidioribus. Magno errore à quibusdam ignaris pro hermodactylo vsurpatur: Is enim exsiccatus flaccidus est, vietus & minimè purgatorius, nec perniciosus, vt colchicus, qui vnà strangulat. At verò hermodactylus officinarum peregrinus est, non flaccidus, vt nostras, sed durus, compactus, & qui leui contusione in farinaceum puluerem abit, sumptusque humorem è partibus remotis, vt iuncturis educit. Est ergo ephemerum quoddam lethale & strangulatorium, vt colchicum; aliud non strangulatorium, vt nostras, & tertium purgatorium, idque tutum, vt Syriacum, quod in pharmacopolijs hermodactyli nomen habet.

Hermoda-
ctylus offi-
cinarum.

Vires.

Hermodactylus calefacit, siccaturque initio secundi ordinis, cum humiditate tamen quadam excrementitia, flatulenta, nauseabunda, qua ventriculo aduersatur, maximè dum humores à medicamento commoti in illum confluent. Pituitam lentam, ac alios humores viscidos etiam ab articulis efficaciter trahit: Ob id chiragræ, podagræ & omnibus iuncturarum doloribus ab eodem humore natis conducit.

De Turpeto. CAP. XIV.



N VLLA est tam anceps & controuersa, atque ea De Tur-
 quæ de Turbith fertur enarratio: Mesuë lactariam, bith varia
 ferulaceamque herbam nominat: Serapio radicem opinio.
 Tripolij existimat, Actuarius modò pityusæ radicem
 esse putat, modò Alypum Dioscoridis, præsertim
 cum albicat. Nonnulli credunt esse radicem Tapsiæ,
 alij Scammonia Antiochenæ; sed Garcias ab horto plantam ab his Turpeti
 diuersam mordicus tenet: Nam planta est, inquit, radice neque ma-
 gna, neque longa, caule hederæ modo per terram extenso, digiti
 crassitie, & aliquando crassiore, duos palmos & aliquando plures
 longo. Folia gerit altheæ & etiam flores, eosque candidos, & non-
 nunquam rubentes, nec colorem ter in die mutantes, sicut tripoli-
 um, vt ridiculè multi crediderunt.

Non est verò totum Turbith gummosum, sed pars caulis tantum
 radici proxima, eaque vtilior: reliqua pars gracilior est, ac come-
 sior, quam vt esse possit vtilis.


Pituitam duntaxat purgat, non atram bilem, vt Alipum, quod à Herba ter-
 quibusdā herba terribilis vocatur: eius enim folia, flores, semina pur- ribilis.
 gationes terribiles commouent. Ob similem vim agendi, aut pau-
 lō mitiorem, fortassis turbith, quasi turbatorium dictum est, & A-
 rabibus Terbeth, qua voce phlegmagoga valentiora nominant.

Turbith igitur Garciae, nec radix est Alypi, nec Tripolij, nec Sca-
 monia, nec Tapsiæ, vt neque planta lactaria, aut ferulacea; nec si
 gūmōsa, optima, nec domestica, vt asserit Mesuë. Vt vt sit, nulla est
 officina, in qua Turbith optimum, & his notis insignitum, quas illi
 tribuit Mesuë, non inueniatur; cuius viribus & illud respondet,
 quod alijs lineis à Garcia depingitur, Arab. *caritamion* dictum.

Quid autem sit verum Turbith adhuc ambigitur. Laudatur quod Quodnam
 subalbum est, aut cineritium, fractu facile, ac recens, nam vetus im- turbith op-
 becillum est & viscera conturbans. timum.

Calidum est ordine tertio: purgat trahendo mediocriter: correctū Vires,
 pituitam crassam, lentam, & putrem à ventriculo, thorace & remo-
 tis partibus, etiam iuncturis educit.

De Scammonio. CAP. XV.



S CAMMONII nomine succus plantæ cuiusdam cō-
 cretus, & planta ipsa intelligitur, quibusdam tamen
 magis propriè hæc Scāmonia, ille Scāmonium dici vi-
 detur. Est verò planta lactaria, voluulosa, scanforia, le-
 uis, smilacis modo, cui folijs flore, facie, valdè similis
 est, sed radice nō parū dissimilis, quæ in smilace tenuis est, in Scāmo-
 nio crassa, prælonga, int⁹ cādida, odore grauis & multo succo pregnās,
 ex eaque tenues & viticulosi surculi prodeunt, qui vicinos frutices
 Scammonia planta.

conscendunt amplexantur & se implicant: folia ei lata & acuminata sunt instar arisari, sed minora: flores albi, concavi, calathi figura. Nasceitur vberius in pingui solo, præsertim in Antiochia & Syria.

Scammonie succus
quomodo
extrahendus.

Ex ipsius radice, Scammonium vulgò dictum, seu liquor colligitur pluribus modis; primò refecatur caput radice, dein cūtro excavatur, ut in spatium concameratum succus confluat, qui postea vasis idoneis excipitur. Secundò terra foditur iuxta radicem, ut concamerato sinu scrobs relinquatur, in quam, subiectis iuglandium folijs, profunditur succus, qui concretus extrahitur. Tertio, radix omnino euulsa inciditur, lac inde profluens siccatur, & in offas quasdam formatur, & servatur. Quarto ex folijs & caulibus trius succus extrahitur, siccatur, cogitur, & servatur; sed nigrum est, aut ex nigro virescens eductum hoc modo postremo Scammonium & omnium pessimum. Præstantissimum quod ex incisa radice superna exudat, & maximè quod ex Antiochia defertur, dein Armenium; Europæum omnino prauum.

Scammonium
Antioche-
num opti-
mum.

Quibusno-
tis signo-
catur Scam-
monium
optimum.
Vires

Scammonii
feritas.

Ut verò sit optimum, debet esse nitidum, splendidum, clarum gummi modo, subalbum, rarum, fungosum, tenuissimis fistulis spongiosum, citò liquefescens, tenerum, friabile, non valdè ponderosum, nec odoris tetri, licet non suavis, sed proprii, & taurino glutini simillimum. Ab his notis quod longè recedit, pessimum.

Scammonium omne valenter, cum labore atque molestia movet aluum: bilem flauam & serosos humores, tenues & acres purgat, & si paulò largiore copia sumatur, intestina abradit, viscera lædit, venarum ora aperit, erodit, sanguinem sæpè per inferiora ducit, dysenteriam excitat, cor, hepar, & reliqua viscera conturbat, & ventriculum subvertit. Calidum & siccum est tertio recessu.

Scammonii
correctio.

Illius effera vix castigatur admixta aloë: Melius vero si in malo citonio excavato, uti veteres docuerunt, clibano aut prunis decoquatur, pasta vndique circumlita, præsertim additis quibusdam seminibus, ut apij, fœniculi, dauci; vti tamen correctio sit ex solo citonio, vel succo rosarum.

Cur Dacry-
dium di-
ctum.

Castigatum, ut decet, Scammonium, Dacrydium, quasi lacrymula dicitur, & in Officinis, corrupto vocabulo diagredium. Nimis recens efferum est, antiquatum imbecillum & torminosum; movet enim, non promouet; Binum bonum.

De Elleboro. CAPVT XVI.



VERATRVM, seu Elleborus, aut Helleborus, vel albus, vel niger vulgò nominatur, neuter licet albicet, aut nigrescat, atque flores vterque proferat, colore non ita dispares. Albi duo discrimina notantur, vnus maior dicitur, & minor alter. Ille folia promit plantaginis, vel potius gentianæ similia, sed maiora, magis venosa & surrecta, & striata, & velut plicas habentia, ac lacte virentia. Caulis ei rectus & longus, plures spicas proferens, à quibus flosculi candidi emergunt. Radix caposa, crassa & subcandida, cui fibræ multæ con- crescent. Calefacit & siccatur tertio recessu: varios humores, sed maximè pituitosos cum molestia purgat; sæpèque vomitum ciendo vetriculum acerbissimè laceffit. Eius puluis naribus admotus sternutamentum mouet.

Minor Elleborus ac vulgaris maiorẽ interdum æquat & flores, vt hic fert spicatos, & ex atrorubentes: vterque dicitur verus ad Elleborines discrimen, quæ Elleborus humilis, & à recentioribus Epipactis vocitatur; cuius quatuor varietates à Clusio distinguuntur, partim Elleboro vero, partim Gentianæ vultu & effigie affines.

Omni- bus caulis rectus, vt plurimum pedalis, quem ambiunt folia recta, venosa, non multum patula & nervosa. Flores singulorum singulis notis discrepant colore, figura, magnitudine & vbertate.

Qualitates.

Primus pauciflorus est, ac fermè vnicum in cacumine florem gerens, ex purpureo nigricantem, & calceoli in modum eleganter coccinatum. Alter flores ostendit herbaceos; Alij candidos & spicatos. Horum qualitates medici negligunt. Qui verò verus albus dicitur, olim apud Græcos solemnis erat, & frequens purgatoria medicina qui per Elleborum simpliciter dictum semper album intelligerent, vt Arabes eodem absoluto nomine nigrum.

cap. 146
lib. 4. Est quoque duplex Elleborus niger, verus & falsus; atque vterque varias sub se differentias complexus. Verus is est, quem Dioscorides Melampodium appellat, quique folia fert oblonga, admodum mucronata, læuia, lauri modo dura, pluribus incisuris diuisa, ex viridi nigricantia. Flores edit circa solstitium hybernũ, ac natalem Christi patulos, vt Mespilus, sed compactiores, ex purpura, maximè dum marcescunt, albicantes, ac in mediis niuibz innoxie ac diutissimè vigentes, è quorum decidentium meditullio siliquæ breues enascuntur, exiguo semine prægnantes. Radix subest multifida, in fibras nempe, ceu radículas plures determinata. Planta est viuacissima, quæ in locis pluribus incultis, & in hortis oritur.

Huic veratro vero aliæ quinque species adnectuntur, quarum tres primò aspectu videntur affines, tantumque florum colore, qui om-

nibus non æquè rubet aut candicat, & foliorum idea, quæ non similiter scissa, acuta, longa & viridia discrepantes.

Quinta species omnium maximè pumila, atra, virens & herbaceo flore, cuius radicibus multi ruricolæ; suilli generis configunt aures, ad peculiare quosdam morbos præcauendos aut sanandos. Sexta species erit Elleboraster maximus, Sesamoides magnum Cordi, aut Consiligo Ruellij, multis pseudo Elleborus. Cùm tamen superioribus sit valdè similis, aptius veri quàm falsi Ellebori nomē retinebit.

Falsus Elleborus niger is dicitur, qui veris ac legitimis vultu plurimum dissentit, cuiusmodi sunt Epipactis & Consiligo Mathioli. Illa videtur esse Sanicula fœmina Fuschij, seu Astrantia nigra folio faniculæ potius, quàm Platani, & vt volunt multi Elleborus Theophrasti: hæc verò Dodonei bupthalmus est; Gesneri Sesamoides minus; Theophrasti, Elleborus niger ferulaceus; Cordi, Elleborus verus dictus, tamen vix assentior. Ferulaceus dicitur, quod caules erigat ferulaceis foliis indutos, & aureo flore, vt Anthemis, coronatos. Est & Alpina quædam Elleborine, faniculæ & Ellebori nigri effigie, quæ cum nothis Elleboris locum habet.

Miror autem antiquos tot plantas inter se adeo vultu discrepantes sub vno genere complexos: Sonchus etenim plantago & betonica facie magis inter se conueniunt, quàm Elleborus albus, niger verus, Astrantia & Consiligo. Si quid affinitatis habere comperiantur, id potius agendi, & radicum, quàm cæterarum partium effigiei tribuendum. Hinc venia dignus quidam vir doctus, qui peplium & peplim Elleboros esse dicebat, quibus nil nisi agendi tempore congruunt; permixta namque simul, pari spatio temporis aluum turbāt unde ἐμολοτροπία Hippocrati vocata. Maximè verò consocialia sunt veratro albo, cuius olim vsus antiquioribus Græcis blandiora cathartica, qui nondum erant experti, magis erat solemnis, quàm fœlix: Nam connulsionem ab Elleboro lethalem illos infasta sæpè experientia docuit. Alias adhuc stirpes Elleborino generi congeneres variis in locis reperiri non semel a censoribus herbariis audiui, quas cùm medicamentarios rei scriptores vel neglexerint, vel ad Elleboros minimè retulerint, ego non referam. Certum namque est, variarum vt terrarum, sic plantarum miram esse varietatem, & qui reperitur in exoticis regionibus Elleborus, non is omnino idem, ac nostras: nostrates namque stirpes, vel non alibi, vel non similes nisi ægrè nascuntur. In Guyneasolanū, vtcumque frequēs, sed granis rubris & floribus ab Europeo diuersis. Idem credendum de animalibus, quæ ibi cernuntur nostratibus planè dissidentanea magnitudine, plumis, colore, voce, vultu, moribus.

Et vt ad Elleboros redeam, qui niger & verus dicitur sex differentiis notatur. Vnus maximus est, Consiligo, & pes gryphi dictus; Alius parvus Scrophularis vulgò nominatus, & quatuor.

medij vultu & viribus cognati, ac ferè dimensione foliorum, & florum, qui aliis alij magis rubent aut albicant, vel citius, aut ferius eminent, colore distincti. Quas omnes differentias sæpè conspexi, & notavi Luteriæ in horto Claud. Gonerij rei herbariæ peritissimi.

Prima autem species Ellebori nigri veri hoc capite descripti pro omnibus alijs in vsum medicum venit, atque hic semper vsurpandus cùm absolute & simpliciter Ellebori vox designatur: latinis veratrum, Arabibus *cherbaten* nominatur.

Purgat humorem melancholicum: prodest infanientibus, maniacis, hypochondriacis, lienosis, epilepticis, elephanticis quartanarijs, & omnibus morbis quos atrabilis, vel humor melancholicus procreat. Periculosus autē sanis, pueris & imbecillioribus.

De Colocynthide. CAP. XVII.



COLOCYNTHIS cucurbita quædam sylvestris est sic Græcis & Latinis dicta Arabicus *Lanhdel*, ac plantarum nex, Persis fel terræ, ut quæ suo amarore reliquas stirpes superet, & sua vicinia veneni modo, inquit Mesuë, inficiat. Repit autem per terram cucurbitæ satiuæ ritu, & foliis multum similibus, amplis, lanuginosis, sarmentis longis, humi serpentibus, floribus ex luteo pallescentibus, cucumeri similibus, ex quibus nonnulli citò marcescunt, nec vllius fructus prodromi; alij poma suppeditant, rotunda mediocris pilæ forma, conglomerata, vehementer amara, fungosa, medulla intus candida, & seminibus cucumerinis similia, grauidata, primum colore herbaceo, & vbi ad perfectam magnitudinem & Autumnum peruenerunt pallida; semper verò amarissima & stirpibus insensissima, quæ non tantum ob eius viciniam intereunt, sed & terra vicina afficitur & quasi adusta videtur, Mesuë referente, qui de Colocynthide multa scribit, quæ tanquam parum momentanea minimè referenda putavi. De colocynthide literæ sacræ loquuntur, quam cum tempore famis collegisset & coxisset puer Elisæi prophetæ, pulmentum effecit adeo amarum, ut gustantes exclamarunt, mors in olla viri Dei. At ille farinam permiscens, pulmentum dedit gratum, nec quicquam amaritudinis habens.

Calefacit & siccatur ordine tertio: pituitam & alios humores crassos ab omnibus partibus etiam remotis, ut cerebro, neruis, musculis & articulis attrahit. Bilem quoque purgat, & summo opere colico dolori, apoplexiæ, vertigini, epilepsiæ astamati, & aliis affectibus multis, quibus clementiora medicamenta nihil profuerunt, sæpè medetur felicissime, qui plura volet legat Mesuem cap. 4. lib. 2. de simpl. medic. purgant.

Est alius cucumer sylvestris, seu erraticus, in Officinis modo asini-
Cucumer
asinus.

nus, modo anguinus dictus, foliis, furculis, floribus à superiore non multum discrepans, sed fructu longè alienus. Non enim poma, ut ille, rotunda profert spongiosa & alba, sed glandes oblongas è glauco virescentes, quæ magnitudinem adeptæ perfectam, digitorum leui contrectatu, leuiter, citòque subsiliunt.

Elatarium. Ex his succus elicitus & coactus elatarium est, de quo alibi.

De Mezereo & Chamelæa. CAP. XVIII.



SCITANTER nimis multi Mezereon, Thymelæan, Chamelæam & chameleonem nigrum confundunt. Thymelæa quidem & Chamelæa cognatæ sunt natura & effigie stirpes, dissident tamen inter se & ab vtraque Chameleon niger: Illæ enim frutices sunt & furculos edunt tenues, rigidos, li-

gneos, folia admodum parua ut mali granatæ: hic verò ex carduorum censu est, foliaquæ gerit scolymi, sed minora, tenuiora & spinosa, eiusque radici venenatam qualitatem tribuit Galenus.

Mezereon.

Est verò Mezereon planta quoque venenata, sic Arabibus, quasi viduifica, seu viduas faciens, aut vitam rapiens, aut leo terræ dicta, cuius stipes eleuatur super terram circiter cubitos duos, inquit Mesuë, & folia eius sunt similia foliis oliuæ, sed maiora, granaque profert myrthi similia.

Quænam autem sit hæc planta, ab his qui commentarios in Mesuem ediderunt, ignoratur: videtur tamen Chamelææ quædam esse species, atque ea potissimum, quæ Tricoccus, quæ scilicet tria grana simul cohærentia gerit, appellatur.

Nam ut in multis plantarum generibus, quædam amicæ satis & familiares nostræ sunt naturæ, aliæ perniciosæ, sic in Chamelæarum societate, quarum vna effera est & maligna cuiusdam qualitatis particeps, Mezereon, seu Almezerion nuncupata, alia melior & minus formidolosa, quæ tuto sæpè medicum venit in vsum.

*Chamelæa.
Oliuella.*

Dicitur verò Chamelæa, quasi parua olea, quod sit oleæ non multum dissimilis: Estque suffrutex furculosus, ramis tenuibus, & cubitalibus & sæpè longioribus, foliis oliuæ, sed minoribus, amaris, acris, mordacibusque, linguam ferientibus & vlcérantibus. Fructus ei paruus, rotundus, initio viridis, post rubens. Tota planta acris est & vrentis facultatis. Folia ex Dioscoride, pituitam, bilemque detrahunt, præsertim in catapotiiis sumpta: Sic enim vtilius v-
furpantur.

Vires.

De Thymelæa. CAPVT XIX.

THYMELÆA, nonnullis Cneorum & Cnestron Thymelæa.
malè dicta, frutex est, in quo nascitur coccum gni-
dium, ramos emittens speciosos, tenues, bicubita-
les, foliis chameleæ, sed angustioribus, & admo-
dum glutinosis, ac pinguibus: floribus in virgarum
summitatibus albidis & interdum rubentibus, pu-
sillis, frequentibus, quos consequuntur grana quædam parua, quæ
gnidia vocant, primùm viridia, dein ex flauo rubentia, rotunda, bac-
carum ritu, nucleis exterius nigris, intus albidis.

Thymelæa rota, & maximè folia & fructus vim habent acrem, Thymelææ
facultas.
calefactoriam & vrentem: quare cum aceto optimè præparantur.
Folia circa canem colligenda, in vmbra siccanda, in vsum seruan-
da: ea, vt & fructus pituitam purgant, aquos & serosos humores.

De Laureola. CAPVT XX.

IN syluis multis nascitur sponte sylvestris alia planta, Laureola;
tribus his nuper descriptis minus facie quàm facultate
cognata, quæ in multorum hortis alitur, & à foliorum
pulchritudine eupetalon, ab eorundem cum lauro si-
militudine laureola, & chamedaphne vocatur.

Nascitur in locis nemorosis, incultis, montosis & asperis, vt in
multis Galliæ locis opacis & vmbrosis.

Abs radice multos furculos profert: crassiusculos, obsequiosos,
crasso cortice vestitos: folia oblonga, lata, carnosæ, læuia, ex viridi
nigricantia, splendētia, laurinis similia, sed minora & molliora, &
plurima circa furculorum fastigia; flosculos, oblongos, cauos, è vi-
rore candicantes, sub foliis adnatos: fructus tandem seu baccas ni-
gras, nucleo duro prægnantes.

Laureago seu laureola pituitam ac serosos humores per inferiora
ducit: Ob id capitis dolori ab hisdem succis nato, hydropi & om- Vires.
nibus affectibus conducit, qui à seroso humore profiscuntur, non
temere tamen sumenda, nisi vt decet præparata, & à docto Medi-
co præscripta; efferam enim qualitatem habet, quæ viscera & par-
tes internas lædit.

De Ricino. CAP. XXI.



RICINVS sic dicitur à similitudine parui ac fœdi cuiusdam animalis, bouino generi infestissimi, quod illius semen refert. Cici quoque, croton, lupa, myrasola, Kerua, palma Christi, & Arabicè *Albemesuch* vocatur.

Herba est arborem figura & facie repræsentans; nam eius folia platani vel ficus æmula sunt, ampla, ac lata, diuisa, angulosa; caudicem ac ramos arundinum modo concauos: flores muscosos & pallentes: fructus capitulis triquetris & racematim coherentes & maculosos, exterius cortice aspero & echinato vestitos, medulla plenos candida & pingui, Ex qua tusa & torculari commissa oleum exprimitur, non tantum lucernis, sed aliis vñibus expetitur. Nam aluum purgare, & alui lumbricos enecare asseruit Dioscorides. Valet quoque scabiei, capitis vlceribus & vteri suffocationibus curandis.

Vires.

Ricinum calefacere & siccare secundo recessu, & vim purgatoriã habere certum est. Eius grana viginti, aut plus, minusvè, pro sumẽtis ætate & vigore, mundata, trita & pota, bilem & aquas per aluum deliciunt.

De brassica Marina. CAP. XXII.



BRASSICA Marina, Officinis Soldanella dicta, duas sub se plantas multum inter se differentes complectitur, quarum prior vulgari satis est similis effigie, sed perdifolia, & quotannis germinans, noua profert folia: vocatur Brassica multiflora & monospermos.

Alia multum dissimilis, quæ ex conuoluulorum familia creditur, ob vultum congenerem: eaque semen profert mucagineum, nigrum, duriusculum, angulosum, quod vim habet hydragogam, & sump-tum hydropicis multum adfert utilitatis, licet stomacho inimicum, Dioscor. Opportunè tamen datum & alijs mixtum quæ interanea roborant, sine violentia aquas ducit, vtiliterque admiscetur Hydri-gogo eximio à nobis descripto.

Vires.

Alia multa simplicia purgatoria facultate nobilitata tellus nostrã promit, vt frangulam & rhamnum, spinam cerui dictam, quæ huc congerere nolui, quod vel raro vsurpentur, vel nostras compositiones minimè.



SECTIO TERTIA

DE CALEFACIENTIBVS

EXOTICIS.

India medicamentis quàm medicis beatior, m'ltis miranda virtutis stirpes occultat, quas politioris vitæ & peritioris literaturæ medici mendicant, ut his fœlicius medeatur morbis, qui herbarum nostratum vires aspernantur. Ex diuersis autem eius Orientalis, Occidentalisve partibus diuersæ eruntur plantæ aromatica, cardiaca & calefacientes, Ex quibus eas tantum explicandas suscipio, quæ compositiones in Officina nostra descriptas ingrediuntur. Ab his autem quæ cum excessu calefaciunt, initium duco, dein quæ minus, postea quæ inter calefacientia & refrigerantia ita ambigunt, ut potius temperata & à quibusdam calefacientia, ab aliis refrigerantia dicuntur, paucis describo.

De Zinzibere. CAP. I.



INZIBER seu gingiber planta est à Barbaris mutuata, & sic nominata, iridi aquaticæ similis, sed foliis magis nigricantibus. Radix illius repit geniculatis internodiis, folia arundinacea proferens, quæ bis, terve in anno reuirescunt. Nascitur in multis Indiæ regionibus semine, aut radice satum. Optimum censetur quod ex Malauar defertur, vbi frequentissimum est, & cura multa colitur, alioquin minimè bonum.

Cum eruitur internodium radice in scrobe defosso, relinqui solet ad plantæ perennitatem; Terra namque opertum anno sequenti germinat, & radices alias, ac folia noua profert. Tenella radix in taleolas facta, cum aceto, oleo & sale in acetariis suauiter editur. Ad nos tamen non nisi sicca aduehitur, aut saccharo condita: nulla enim arte potest in nostro solo cicurari. Quid verò sit discriminis inter zinziber, zedoariam & zerumbet mox aperietur.

Calefacit zinziber ordine tertio. Coctionem iuuat, & ventriculū roborat imbecillum: Eius tamen vsus solito nunc est infrequē- Vires.
tior, nec ita condimentis admiscetur, ferèque tantum ad quorundam medicamentorum castigationem vsurpatur.

De Zerumbet. CAPVT II.



ZERUMBET, siue Zurumbet, zedoaria & zinziber plantæ sunt peregrinæ & cognatæ, sed vix cognitæ omnibus omnes. Nam ex Arabibus Serapio, ex auctoritate Ysaac, zerumbet zedoariam esse scribit: *Cap.* Deinde ex auctoritate sua asserit zerumbet radices *172. li.* esse rotundas, aristolochiæ similes, colore & sapore *de sim.* zinziberis. Et alibi scribit arborem esse magnam in montibus *pl.* Indarum Orientalium.

Auicenna lib. 2. ait Zerumbet esse lignum cypero simile. Nōnulli putant esse *Arnabo*, cuius meminit Paulus Ægin. falluntur tamen, *Cap.* nam *Arnabo* multorum opinione, arbor procera est, suauissimè fragrans, vel vt aliis placet, planta quædā nunc illo nomine incognita. *271. eiusd. lib.*

Zerumbet verò graminacea stirps est, quæ partim seritur in provincia *Malauar*, partim spontè prouenit in locis quibusdam syluosis huiusce regionis, ibique zinziber syluestre vocatur. Eius siquidem *Tract.* vultus, vt & radices cum zinzibere magnam habent affinitatem: In *2. cap.* zurumbet tamen omnia maiora, nam folia longiora sunt, & latiora *247. c.* & radices crassiores; quæ erutę conciduntur & siccantur, deinde in *3. li. 7.* Persiam & Arabiam deuehuntur, vnde post in Europam. *Gar-*

Zerumbet inopia, zedoaria rotunda poni recte potest, nam vtraque planta vt nominis, sic virtutis & forsan generis eiusdem non malè putatur, non secùs quàm cyperus longus & rotundus. *cias.*

Vires.

Commendatur plurimum zerumbet aduersus venena, & ad cor exhilarandum, atque ad partes interiores roborandas, & conseruandas.

De Zedoaria. CAPVT III.



ZEDOARIA, siue Zador, zeduar, geiduar & zaduræ, vulgaris officinarum zedoaria intelligenda est, quam Mesuë radicem rotundam esse scribit, quæque zinziberis faciem refert: Odorator tamen est, vtcumque amara, nec adeo, vt zinziber acris, & calida.

Deuehitur è Sinarum regione & ab extremis Indiæ finibus. Affinis est zerumbetho, sed vulgatior & notior: verùm vtraque planta Europeis integra ferè inuisa.

Vires.

Cypero zedoariam similem esse scripsit Auicennas, alij costo, de quo postea: Omnia verò aromatica, & viribus, quā vultu similia.

Calefacit, siccaturque zedoaria ordine secundo, flatus discutit, animalium venenatorum morsibus medetur, colicis doloribus opitulatur, alui tineas enecat, & antidotis optimè miscetur.

De Galanga. CAPVT IV.



ALANGÆ duæ agnoscuntur differentie, maior & minor: vtraque in eodem solo proueniens: Sed minor quæ odoratior est, lætius & vberius in Sinarum regione fruticat. Maior in *Iauar* & *Malabar*; Estque duorum cubitorum alta, & sæpè amplior, præsertim in pingui solo sata.

Folia ei longa sunt duorum ferè cubitorum, supernè multùm, infernè minus virentia. Caulis ex eorumdem inuolucris vestitur, vt in Orchidum generibus videtur: flos candidus & inodorus: semen paruum: radix iuxta caput crassa, bulbosa & arundinis modo nodosa. In reliquis partibus zinziberi admodùm similis, similiterque propagatur, radice nempe non semine; Sataque mirum in modum luxuriat, ac sobolescit: Iridi tamen videtur similior, non modo radice, sed foliis & facie.

Minor galanga palmos tantùm duos alta est, foliis myrtheis, radice nodosa & vltro sæpius nascens. Malè nonnulli calamum aromaticum & acorum cum Galanga confundunt. Chynenses & Malabarienses frequenter vtuntur galanga in cibis & medicamentis.

Vires.

Calefacit & siccatur ordine tertio: ventriculum roborat, colicos dolores sanat, flatus discutit & frigidis omnibus morbis succurrit. Seligenda verò minor, vt præstantior.

De Acoro. CAPVT V.



CORVS radix est odora, geniculata, iridi multùm similis, sed foliis longioribus & angustioribus, necnon caule tenuiore & longiore. Ipsius quoque radices tenuiores sunt, obliquè iuxta terræ superficiem proserpentes, foris & intus albicantes, & gustu acres cum quadam amaritudine.

Turpiter errant qui Galangam vtramque zinziber & acorum nõ discrepare contendunt; nec excusandi qui calamum aromaticum & acorum indistinctè vsurpant, & ambas stirpes vnicam esse credunt. Non parum enim inter se distant, vt ex singularum descriptione patet. Adde quod Europa tantùm acorum profert, nunquam aut raro & quasi inuita calamum aromaticum; India calamum aromaticum, nunquam, aut agrè acorum.

Reponitur acorus, ex mente Galeni, inter ea quæ tertio recessu calefaciunt & siccant.

De calamo aromatico. CAPVT VI.

CALAMVS aromaticus planta est Indica & arundinacea, cuius scilicet caulis instar calami aut tubi cauus est, assulatim fractu facilis, nam percussu citò in assulas diffilit.

Ab acoro non parum distat, nec similiter inter radices connumeratur, sed potius inter surculos ligneos, concauos, geniculatos, arundinis modo, intùs albidos, exteriùs fuluos, odore fragrantissimo, sapere cum acrimonia non exigua amaro, & in mandendo admodum glutinoso.

Ex India sola deuehitur, & pro eo radix quædam & rei alterius, quæ calami veri & aromatici, quem Hippoc. myrepficum, hoc est, vnguentarium ab odoris suauitate nominat, in Officinis multis venditur, quam rei herbariæ peritiores calamum Officinarum, nonnulli Cyperum Babylonicum nominant, qui nunc alitur, vt & alię plantæ rarissimæ in horto celeberrimæ scholæ Medicorum Parisiens. Ioan. Robini Regij Botanici industria & labore, antiquorum tamen calamus aromaticus & verus non est, sic enim acrior & calidior perhibetur, & folia habet strictiora, magis juncea, & admodum triangularis vulgaris latiora, & ferè Irina. Sed cùm facie & facultate alteri non parum sit affinis, pro exotico nostras, seu pro raro vulgaris rectè substituetur.

Viros.

Calefacit, & siccatur ordine secundo, leniter astringit, parum acer est, & partium quarundam tenuitate meatus aperit, menses mouet, spiritus recreat, & colorem iuuat natium.

De Costo. CAP. VII.

COSTVS planta peregrina est, à veteribus quidem celebrata, sed suis lineamentis non satis accuratè signata, ac descripta: vnde vera illius dignotio perfectè nondum recentioribus paruit. Omnes quidem vno ore radicem esse pronuntiant, sed ex quam stirpe, & an ex vnica tantùm, vel diuersis, nullus adhuc indubitanter asseruit.

Quod si antiquis fides non denegetur (vt certè in his potissimum, quæ probè norunt, celebrarunt, & longo comprobantur usu, non nisi denegabitur iniustè) tria costi genera agnoscemus, Arabicum, Indicum & Syriacum.

Arabicus candidus est, levis, & odoris suauitate cæteris præstans, recens, abundè plenus, densus, non cariosus.

Costus amarus & dulcis.

Indicus levis quidem, sed niger & amaricans. Syriacus flauescens, tuberosus, gustu acer, odoratus, ac suauiter fragrans. Arabes verò

tantum eius duo genera constituunt, amarum & dulce: Credit tamen Clusius genus costi duntaxat vnicum esse, nec nisi collatione quadam cum amariore, vel acriore costo dulcem nominari: quam saporis diuersitatem in plantis omnibus agnoscimus quotidie, quæ recentes dulciores sunt ac suauiores, vetustiores, teredinibus erosæ & corruptæ, acriores, amariore & insuauiores.

Costus autem vñbus medicis nunc receptus & vulgaris, radix est ferè zinziberis effigie, intus albida, lauis, parùm grauis, exterius è pallido flauescens, subamara suauissimè fragrans, ac sæpè tam odorata, maximè cum adhuc recens est, vt importunè caput feriat. Nascitur in multis Indiæ tractibus, vt in *Guzarate* & circa *Amadabar*, Malabar urbem istius regionis percelebrem, Græci & Latini Arabum nomenclaturam retinuerunt, omnesque, vno ore Cost, aut Gostum efferunt.

In Pharmacopolijs nonnulli pro costo radicem quamdam aromaticam plantæ nunc vulgaris vsurpant, quæ è *Seseleum* genere deprompta videtur: Ad *Æthiopicum* enim *Mathiolo* dictum proximè accedit, radice, folijs, caule, magnitudine, facie, viribus. A quibusdam pseudocostus, ab alijs Costus Belgarum, ab alijs Costus officinarum solet appellari. Qui hunc pro vero substituere verebitur, angelicam illi sumere licebit, aut enulam campanam.

Costus cum subamarus sit, modicè astringit; Et quia acer, calefacit insigniter, suaque odoris eximij gratia, cor & spiritus reficit & exhilarat. Vires.

De behen utroque. CAPVT VIII.

Rhas.
part.
135. De
nom.
Arab.
ca. 145.
li. 21.
Cap. 85
ira. 1.
lib. 2.
Tract.
2. li. de
med.
cord.



EN vel Been vox est Arabica, arborem quamdam in *Æthiopia* nascentem, & tamarisci similem designans, cuius granum dicitur *Abelban*, ex quo oleum manat *Muscillinum* dictum, Qua voce ipsa etiam planta insignitur: Nam Ben secundum *Rhasim* & Arabes *Muscillinum* dicitur. Quænam vero sit illa planta, dilucidius non explicat, vt nec etiam *Auicenna*, qui dum quærit, Quid est Ben? Respondet ipse, frusta lignea, aut radices esse contractas, ex siccitate habentes rugas, seu lineationes, ac duplici sub specie contentas, quarum vna alba est, altera rubra, vtraque calida & sicca in gradu secundo. Alibi tamen vtrumque Ben siccum primo recessu scripsit, & rubrum albo calidius esse: Contrarium tamen videmus in istis duabus radicibus, in officinis Ben nomine celebratis: Nam quæ albicat calidissima est, & acriter fauces & linguam ferit: Rubra id solummodo præstat languidè & ignauè.

Oleum
muscillinum.

Serapio plantam vtramque non clarius depingit: Ben, ait

species sunt duæ, & ambæ magnitudine radicis pastinacæ parvæ, & quædam tortuosæ. Deferuntur ab Armenia: Odor earum bonus: & ambæ viscidæ, calidæ, humidæ.

Cùm igitur Arabes antiqui de planta indigena solùm nomine tenuis conueniant, quid si nostrates in ea describenda, aut obmutescant, aut pauca quædam & probabilia tantùm enuntient? Nullis sanè Pharmacopolijs non cognitæ sunt duæ radices, quæ passim Behen nomine albi & rubri celebrantur: illa tamen dignotio penes tantùm superficiem est. nec dùm veram quis ipsius effigiem dedit.

Vires.

Ex Arabum autem sententia, Ben corroborat, corpus impinguat, semen auget, confert tremori & alia multa commoda præstat, quæ vix in nostro vulgari albo agnoscuntur. Ob id Syluius radicē Eryngij substituit, ego angelicam nostratem vel Hispanicam prætulerim, vt magis cardiacam, aut tormentillam.

Sunt qui Polemium opinentur Ben album esse, & bistortam, rubrum, sed leuiori coniectura, quam vt pluribus sit opus improbare.

Limonium quoque vulgus Pharmacopœorum ben nominat.

De *Secacachul*. CAP. IX.



SECACACHUL variè nominari ab Arabibus comperio, vt *lochachium*, *Lichimum*, *habe*, *alithimum*, apud quos illius semen, seu potius granum *Culcul* dicitur; & folium, inquiunt, est simile folio *Albena*, seu *Iulben*. Hæc siquidem vocabula apud Serapionem & authorem Pandectarum videntur confundi & pro *Secacachul* vsurpari. Secundum quos planta est breuicaulis, venosæ & nodosæ radicis, è cuius singulis geniculis folia emergunt balsami, Serapio dicit *basai*, similia.

Culcul.
Kilkil.

In illius summitate circa Veris initium flores erumpunt violacei, violis tamen maiores, nec similes, quorum occasum sequuntur grana nigra ciceris magnitudine, humiditate dulci satura, quæ grana *culcul* barbaragens nominat. Rhasis tamen suo idiomate *Kilkil* mavult appellare, cuius qualitates recenset lib. 23. calidumque & humidum secundo recessu tenet: Serapio in vtraque qualitate tantùm primo. Ambo autem plurimum valere ad rem veneream excitandam scribunt, Auget enim semen, erectionem veretri facit, & ad congressum pigros alacres reddit. Nascitur *Secacachul*, seu *Secacul* in locis vmbrosis, atque iuxta radices arborum.

Neque autem radices, neque grana *Secacul* ad nos deferuntur. Et cùm è planta prorsus exotica & herbarijs recentioribus incognita defuniantur, a formulis remediorum debent expungi. Absurdum enim est à Barbaris ea mendicare, quibus facilè carere possumus, vel forsan ipsi carent, cum illorum nullus adhuc *Secacul* accuratè descri-

descripserit, aut ad nos mitti curarit, vel saltem venale in suis emporiis perinde ac reliqua simplicia rariora ostenderit.

Cum rebus veneris inferuiat, quoties dicta planta opus erit, vel satyrium præscribendum, aut iam præscriptum augendum, aut pistacia, aut nuclei pinei, aut ornithoglossum, aut alia illius quæ ludibria mouent, substituenda.

De Cinnamomo. CAP. X.



VID sit Cinnamomum vix scitur ex antiquis, qui de eo multa somniant, Necdum ex recentioribus innotuisset, nisi illius natale solum peragrassent, ut Garcias ab horto, qui id ipsum vidit in multis Indiæ Orientalis regionibus, ut in Insula Zeilam ubi laudatissimum & vberimum prouenit, & in Malabar.

Insula.

Illius autem dignotioni magnam attulit obscuritatem multiplex, qua designatur, apud nos & barbaram gentem appellatio: Nam in Malayo *Cais Manis*, hoc est, dulce lignum vocatur: In Ormus, *Darchini*: Quo nomine etiam à Persis & Arabibus enuntiatur. Apud nos verò modo Cassia & Casia, modo canella, modo cynamomum, quasi Chynæ amomum, vel potius amomū ex Chyna delatum vocatur, unde tot diuersæ plantæ, quot nomenclaturæ sunt reputatæ.

Cais Manis

Darchini.
Cassia.

Cynamomum.

Re vera tamen si Garciae fides adhibenda, ut certè tanquam testi oculato & fidissimo narratori debetur, Cassia, cinnamomum & canella, vnum & idem sunt medicamentum; Nec cinnamomi genera plura sunt duobus, vnum, quod in Zeilam, alterum quod in Malabar & Iaoa nascitur. Pro bonitatis quidem gradu, quinque eius diuersitates ab authoribus recensentur, sed genere tantum duplici distinctæ.

Canella autem crassior, xylocassia est, seu cassia lignea durior & crassior, Arabibus, Persis & Indis *Salihacha* dicta. Quæ magis odorata est, fragrantior, & tenuior, cinnamomum est verum, quod lignū odoratum portendit, ex eodemque arbuto habetur atque canella, sed hæc ex trunco, cuius cortex crassissimus est, illud ex ramis excerpitur. Quod videtur innuere Theophrastus, dum cinnamomum in multas partes discerpit, quarum quæ radici propinquæ sunt, deteriores & minùs odoratæ, quæ in supremo sunt arbuto, odoratissimæ & præstantissimæ, quæ in medio mediæ.

Salihacha.

Displicet tamen Mathiolo hæc Theophrasti & aliorum opinio, qui Cassiam & Cinnamomum idem esse scripserunt, fatetur quidem Cassiam & canellam non differre, sed ab vtraque cinnamomum nō tantum distingui, sed nec inueniri; Et si inueniatur, non illius corticem, sed lignum solummodo odoratissimum, & in vsum venire medicum.

Bona tamen illius venia, cinnamomum nunc habemus præstantissimum, Nec differt à canella, seu cassia odorata, nisi quodam accidente, vt gradu bonitatis. Atque eo modo accipiendæ sunt cinnamomi varietates à Dioscoride enumeratæ: Estque eorum optima ratio, quiaasserunt canellam, seu xylocassiam esse crassissimum & extimum corticem, cinnamomum interiorem, tenuiorem, odoratiorem, præstantiorem, & ad vsus multò commodiorem.

Tempore Galeni cinnamomum adeo rarum erat, vt soli Imperatores haberent, & curiosè seruarent in scriniis, sed huius aromatis præstantia effecit, vt ad nos è regionibus peregrinis adueheretur copiosissimum & præstantissimum.

Arbor canella.

Est autem canellæ seu cinnamomi arbor syluestris, ac sponte nascens, magnitudine oleæ, ramis multis, ac rectis, foliis citri colore, lauri effigie, floribus candidis, fructu nigro & rotundo, oliuarum paruarum magnitudine.

Vires.

Eius eximia virtus in cortice est, excalfacit, concoquit, menses & partum accelerat, & mirè cor recreat, sed faucibus aduersatur.

Est altera canella Peruana, illi vultu similis, cuius odor, sapor & virtus non in cortice, vt in India Orientali, sed in fructu tantùm deprehenduntur, vt ex Nicol. Monardo refert Clusius.

cap. 25.
lib.
simpl.

De Nuce Moschata, maci & macere.

CAPVT XI.

Moschocaryon.



X India defertur eximia quædam nux aromatica, quæ ab odoris suauitate Moschocaryon, Moschocarydion, caryon aromaticum & nux myristica seu vnguentaria & moschata vocitatur. Excerptitur ex arbore peregrina pyri magnitudine, foliis perficæ, sed breuioribus roseo flore, odore peramæno.

Arbor nuxis moschatæ.

Arbor hæc veteribus præsertim Græcis fuit incognita. Nascitur in insula *Banda*, vbi *Palla*, & *Macis Bunapalla* nominatur: Eaque non longe distat ab insulis Molucis, in quibus etiam spontè prouenit.

Huius autem arboris fructus, propter odoris suauitatem, moschatus dictus, etiamsi moschem non oleat, duplici putamine vestitur, altero externo & crassissimo, quod per maturitatem dehiscit, vt in iuglandibus, altero tenuiore, quod nucleum, seu nucem proximè ambit, quodque rubescens, ac eleganti facie se dat in conspectum vbi cortex exterior dehiscit, & patulus remanet.

Macis.

Istud verò tenuius inuolucrum & rubrum macis est, quod etiam exsiccata nuce, dehiscit, & per calorem immutato tandem rubore, colorem quodammodo aureum acquirit. Est ergo macis, membrana tenuis ex rubro flauescens, quæ nucem aromaticam, seu moschatam contegit & amplectitur.

Porro macis & macer inter se discrepant, nam macis est inuolucrum nucis aromatit, ut dictum est; Macer vero ligni cuiusdam cortex crassius, flauescens, seu cum Plinio rubeus, ex Barbaria allatus gustu valde amarus & astringens. Quam autem Marcer arbor, hucusque nondum satis certo scivi; ipsius enim nec corticem, aut lignum, ut nec quidem folium mihi videre contigit, & qui de ea veteres sunt loquuti, natalitia, proceritatem, & ideam arboris subtere, paucisque tantum qualitates attigerunt. Ex nuperorum vero lectione illius historia fidelior ac certior habetur, ut qui vel Indicas regiones lustrarunt, vel ex ipsis aduehi curarunt.

Inter eos Christophorus à Costa Macerem accuratè descripsit: *Macer nascitur, inquit, in insula Sanctæ crucis regionis Malabar, regni Cochinchina vasta quædam arbor, vltimo maior, foliis longis, parum latis, exterius dilutè virentibus, interna parte obscurius. Nucleum pro fructu ac semine profert, cordis effigie, planum, flauum, sapidum, albidam membrana inuolutum, ac veluti quadam vesica, quæ foliis mediis supernascitur.* Macer quid.

Vestitur autem Macer cortice crasso, duro, scabro, aspero, foris cinereo colore, interiùs albicante, ob lacteum succum quo recens luxuriat, flauescens cum exaruit. Radices promit longas, latasque pro arboris magnitudine, quam Indi perhibent ab Angelis ostensam hominibus ad ipsorum sanitatem, quam quod refarciat vel feratur à Lusitanis arbor Sancta, & arbor Sancti Thomæ, à barbaris arbor Dysentericæ cui apprimè conuenit, vocitatur. Corticem enim radicem, vel trunci aut ramorum cum oxygala præbent, & mirabili successu quæuis alui profluuiâ, difficultates intestinorum & vomitus sanant. Arbor dysentericæ.

cap. 93. lib. 7. simpl. Hanc facultatem agnouit Gal. qui ubi macerem ex India transuehi scripserit, sua terrena, desiccante & valenter astringente virtute celiacis & dysentericis conducere tradit. Idem est Dioscoridis de illius qualitatibus Iudiciû, quas contra cruentas excretiones, dysenterias & alui fluxiones valere scribit: Ad hosque curandos affectus Incolæ Iapan, Bengala & Malabar, alijque barbari solo Maceris cortice vtuntur: quo cum careamus, & alia multa astringentia virtutis non inefficacioris habeamus, ad nos illum aduehi non curamus.

cap. 94. lib. 1. Hisdem regionibus alias arbores duas viribus similibus, imbecillioribus tamen, insignitas, sed multo minores, nasci tradunt, Coru Panate alteram vulgo nominant: utramque describere & expectare, vanum. Coru. Panate.

Nux moschata probatur recēs, gravis, pinguis, & quæ acu puncta succum mox redit oleosum, rupta vero vel incisa rhei colorē refert.

Eius vires, ut etiam macis, roborando ventriculo, & coctioni iuuandæ plurimum commendantur.

De Piperibus. CAPVT XII.



MULTÆ plantæ multum inter se dissimiles piperis nomine donantur, vt piper album, nigrum, longum, Calecutianum, seu Capsicum & piper aquaticum seu Persicaria. Nec defuerunt qui viticem seu agnucastum & Ribes nigrum piper agreste vocarunt: Sed cū absolutè piper ponitur, Garcias rogat Pharmacopœos, vt album tanquam præstantius seligant, nostrates tamen forsan albi penuria nigrum sumunt.

Planta autem quæ piper fert album, ab ea quæ nigrum, tam parum diffidet, vt eadem esse dicatur. Vtraque scanfilis est, atque adeo imbecillis & caduca, vt nisi fulcro quodam nitatur, ad terram illius sarmenta flexilia & lenta delabuntur, lupuli vel periclymeni modo. Propterea vel perticis fulcitur, vel seritur ad radices arboris, ad cuius fastigium sese conuoluendo scandit. Folia eius rara sunt, Assyriæ mali effigie, sed minora: radix pusilla: fructus parui, rotundi, & simul multi ac racematim cohærentes.

Vires.

Piper omne potenter calefacit, atque potentiùs album nigro, & odoratius. Sed vt planta rarissima est, sic rarissimus fructus. Est & piper quoddam caudatum, de quo suo loco.

Piper longum.

Planta verò quæ longum piper edit, non minùs effigie quàm qualitate ei quæ nigrum, conuenit, ferente Clusio, cōtra Garciam, qui stirpes valde dissidentes asseruit; Nam folia vtriusque magnitudine æqualia, hederacea nempe, sed neruosiore & pediculo breuiore subnixa. Huius plantæ fructus liliolos Coryli perbellè referunt; ex plantæ singulis internodiis prodeunt, atque ex opposita pediculi foliorum parte, vt in aliis piperibus: fructus illi ex multis granulis constant, eleganti serie secundum pediculi longitudinem congestis. Virides autem sunt, quia ante maturitatem collecti, nunc longiores, nunc breuiiores, aut crassiores, vt in aliis fructibus contingit, perfectum incrementum non assequutis.

Macropiperis vires.

Macropiper seu piper longum vehementer mordet, ait Dioscorid. & quia ante maturitatem decerptum est, subamarum relinquitur. Antidotis & Theriacis medicaminibus expetitur.

cap.
189. li.
2.

De Cariophyllis. CAPVT XIII.



CARIOPHYLLA, seu Cariophylli grana quædam sunt, seu fructus arboris exoticæ eiusdem nominis; quæ nascitur in Insulis Moluccis, lauri forma & magnitudine, folijs persicæ, vel magis salicis, aliquantum angustis; surculis multis, flore copioso, primùm albo, dein virescente, tã rufescente, qui vbi solis æstu induruit, nigricat, & rudimentum quoddam fructus, seu imperfe-

ctum fructum & exsiccatum refert, tanquam clauum, quatuor velut exertis apicibus in extremo exasperatum.

Fructus hic adhuc virens suauitate omnes alios superat: erumpit in extremis surculis, clauï modo, vnde vulgus clauum gyrofleum vocitat. Rectius enim clauï cuiusdam refert effigiem quam nucis aut nucifolij, vt recepta videretur notare nomenclatio. Nam Cariophyllum dicere, nucifolium dicere est.

Vires.

Calefacit & siccatur ultra secundum ordinem. Plurimus est eius ad esculenta condienda, & ad medicamina vsus.

Cordi & cerebro benefacit: Iecori & stomacho auxiliatur: oris fœtorem emendat, & halitum gratiorem reddit: coctionem iuuat: oculorum aufert caligines, & visum acuit, venerem stimulat & obstructions tollit.

De Cardamomis. CAP. XIII.



CARDAMVM, Cordumeni & Cardamomum stirpes sunt, nomine quidem parùm, sed re ipsa multùm dissidentes. Nam Cardamum seu cardamine nasturtium quoddam est, folio & semine calidissimum, & penè adurens, vt Synapi. Cordumeni non cardamomum est, vt putauit Syluius, seu carui Romanum.

Cardamomum peregrina planta est, amomo si non effigie, saltem facultate cognata, vt nominis affinitas prætedit, atque in India nascens: Cuius duo traduntur genera, maius vnum, quod Arabes *Cacola quebir*, & *Cacula quebir*, minus alterum, quod *hayl* seu *KaKolabil* & *Chairbua* appellant. Vtrumque ex planta cubitali, & siliquosa nascens, non ex arbore procera, vt quidam autumarunt.

Leguminosa verò est illa, & vbi adoleuit, siliquas multas profert, & singulæ siliquæ multa grana, *Cacolae* barbaris nominata, quibus *Hayl*. Grana paradisi, alia tamen huius nominis dignitate insignita circumferuntur, malageta à prouincia Melegueta, vnde aduehuntur dicta.

Sunt verò Malagethæ grana quædam angulosa, Cardamomo quoniam maiora, acriora, calidiora, ex rubro nigricantia, & in Malagueta tantum regione sponte ac vberrimè nascentia. Cardamomi verò genera minora sunt, magis cineritia, sapore & halitu gratiora, & siliqua minore conclusa, hæcque pro illis securiùs, quam illa pro his usurpantur, eosque excusatos vix volo, qui pro Cardamomo Meleghatam substituunt, aut idem statuunt.

Ruellius
deceptus.

Nec eos parùm deceptos comperio, qui pro Cardamomo Siliquastrum, seu Capsicum, vulgo piper Indicum agnoscunt, aut nigellam, ut Lacuna; quibus si addatur Cardamoma duo Garcie ab horto, atque adhuc alię quatuor species à Plinio recensitę, inter se multum, ut ex descriptione patet, dissidentes, octo tandem illorum differentię prodibunt, cum tamen vix duę satis innotescant. Dioscorides enim vnius tantum meminit. Et maxima Pharmacopœorū pars unicum quoque exhibet, & Meleghatham, quam minor & imperitior ipsorum pars Cardamomum alterum putat.

Cap.
12. lib.

3.

Cap. 5.
lib. 11.

Standum autem in iudicio Garcie contendo, qui duo tantum Cardamoma vidit, nouit, descripsit & præscripsit, maius nempe & minus majus quidem & mole & siliqua, ficus quæ sæpè crassitudinem & figuram referat, minus, quod vtraque ratione dicta, tale iudicetur, licet virtute maius, hoc est, efficacius, non satis propriè dicatur.

Cap.
24. l. 1.

Cardamomum
medium.

Iuniperi quidam medium constituunt, quod scilicet inter vtrumque medium nactum sit crassitudinem, quod tamen mihi nondum, nisi pictura, videre contigit, sed duo tantum ditioribus officinis satis frequentia, quorum eadem est forma, color vix varius, sed crassitudo, sapor, odor & qualitas varia, atque ut paucis concludam.

Cardamomum nunc notissimum est & vulgare, licet peregrinū, atque medicis vñbus vtrumque optatissimum: Sed minus, ut odoratius est, sic præstantius, & magis expetitur, maius, minus.

Vires.

Vtrumque cardamomum calefacit, partes quæ principatum tenent recreat, calorem natium roborat, flatus discutit, & coctionem iuuat.

De Cubebis. CAP. XV.

VISI sunt antiquiores Arabibus tantum tribuere, ut quicquid ex eorum ore vel properanter effluerit, pro certa lege debeat haberi. Sed non tam displicet in sermone barbaries, quam in re eorum dissidium, qui vix de stirpibus in proprijs nascentibus hortis conueniunt: Vnde minus mirum si de his quæ nullo cultu ruri nascuntur, dissentiant, ut in Cubebarum descriptione manifestum est, quas Auicenna Carpesium, Serapio myrtum syluestrem nominat, Indi verò ex istis nullam, sed aliam longè diuersam plantam, quæ cubebas profert, agnoscunt, quas eorum nonnulli *Cubab Sini*, alij *Cumuc* alij *quabeb* & *cubebe* nuncupant.

Planta autem ex qua colliguntur syluestris est, ac sponte nascens, imbecilla & fruticibus similis, aut piperis modo adhaerescens, foliis myrtheis, fructibus racematim congestis, sed singulis granis cohaerentibus pediculis longioribus,

Fructus hic in *Tana* & aliis regionibus in quibus prouenit, tanti fit, ut ab incolis decoquatur, antequam venalis detur institutoribus. Verentur enim ne alieno in solo satus radices agat & luxuriet.

Turpiter errant qui cubebas, viticis semen, aut rusci fructum esse contendunt, cum inter stirpes has omnes nihil sit cognationis & similitudinis. Aetnarius magis tolerandus, qui Auicennam sequutus combebas, sic enim loquitur, carpesium affirmat esse, nam aromatica & calefactoria est in ambobus qualitas; Verum effigies diuersa: Nam carpesia ex Galeno, festuca sunt tenues, surculis cinnamomi, facultate & odore similes vocati *Phu*, sed validiore, & nonnihil aromatico, quem gustus percipit. Quia tamen sunt tenuiora, viscerum obstructions expeditius tollunt, & urinam mouent, & calculum pellunt. Non tamen adeo tenuia sunt, ut cinnamomum. Carpesium.

Cubebae admodum rae sunt; ventriculum calefaciunt & roborant, hepar infarctu liberant, flatus discutiunt, intemperiem vteri frigidam emendant, & veneris sopitam vim excitant. Viros.

De Carpobalsamo, & ceteris balsami partibus.

CAPVT XVI.

BALSAMVM arbuscula est peregrina, olim in Iudaea, Aegypto & in valle Syriae, ac maximè in Hiericho nascens, aspectu non valde grata, colore cineracea, ramis tenuibus, foliis sampsuchi, quae quotannis Decembri labuntur, medio Vere repullulant; floribus ad paruum lasminum luteum accedentibus, quos paruum consequitur semen, aromaticum, flauescens, plenum, gustu mordax, & acre, atque modicè opobalsamum redolens, quod carpobalsamum nominatur. Carpobalsamum.

Planta haec ad radicem usque sarmentosa, cuius surculi tenues admodum sunt fului, odorati, frequentibus nodis asperati, balsamum nonnihil spirantes. Xylobalsamum.

Vbi adoleuerunt sarmenta praescinduntur, emunturque ab institutoribus, qui in aduenas regiones deferunt, quæstus magni gratia: vbique enim expetuntur, & magno semper vaneunt, ob insignes quibus pollent facultates: xylobalsamum Medici nominant. Opobalsamum.

Nonnunquam fruticis huius abscinduntur surculi, quibus appenduntur lagenulae cera oblitae, in quas guttatim oleosus eximiae fragrantiae liquor stillat. Sepius tamen incunte Autumno cultellis vitreis, aut osseis, vel eburneis truncus, aut rami crassiores vulnerantur, nam ægerrimè ferrum ferunt, è quorum scarificatu succus crassior oleo

perquam similis, & suauiter spirans emanat, qui Balsamelæon & Opobalsamum nominatur.

Inter olea quæuis & balsama omnia laudatissimum hoc est, præstantissimum, & toto orbe maximè celebratum, vt quod vires habeat abigendis morbis nulli medicamento secundas, siue interius assumatur, vt aliquando, siue exterius adhibeatur, vt sæpè fit, vel aliis commisceatur medicamentis.

Laudatur Syriacum, tenue & perspicuum, quale in vasis aqua plenifundum, delabi ac subsidere solet, quod omnibus balsamis legitimis commune est, atque ei maximè, quod ex horto celebri Turcarum Imperatoris habetur, in quo magna sedulitate paruula dicta arbor colitur & custoditur, ex qua nempe tres partes excerpuntur, ad multorum morborum expugnationem vtilis lignum, liquor, semē; xylobalsamum, opobalsamum, & carpobalsamum propriis & vñtatis vocibus Medici designant: quæ quòd rarissima sint, & in paucis regionibus latè prouenientia, à regibus tantum, vel solis magnatibus possidentur: Nam vulgare carpobalsamum legitimum nō est: tanquam viribus ignauum; ferè inodorum, vietum, rancidum, exoletum, nec suauiter spirans. Idem dicendum de ligno quod xylobalsamum nominant, nam sūrculi sunt lentisci, plerumque cariosi, aut ita vetusti, vt & insipidi sint, inodori & inefficaces.

His tribus medici succedanea analoga, prout materiæ medicæ concedit vbertas, adinuenerunt, vt carpobalsamo cubebas, xylobalsamo lentiscum recentem, opobalsamo oleum cariophyllorum & nucis moschatae, vt etiam lacrymam limpidissimam terebinthi instar olei tenuem. Nam terebinthina ipsa balsamum est, & omnium balsamorum artificialium veluti mater, cuius omnes partes optimè respondent vero & naturali balsamo.

Balsamum
Peruuianū.

Balsamum
de Tolu.

Alia nuuc duo Balsama incipiunt circumferri, vnum Peruuianū, quod ex nouo orbe aduehitur ex fructu quodam mediocris magnitudinis in Peru nascente elicatum, cuius meminit Clusius. Alterum à regione quadam Indica balsamum de Tolu vocatur. Stillat hoc ex arbore sauciata pumillis pinis simili. Vtrumque vires habet eximias, & in Syriaci locum poterit optimè substitui.

De Kermes. CAP. XVII.



SIRPES multæ in regionibus tantum meridionalibus, aliæ Septentrionalibus virent; Nonnullæ in his & illis viuaces sunt, & latè fructificāt, vt granū Kermes Mauritanis vocatum; Cuius vocis vsurpatio, plantam magis exoticam esse, & in Asia, Armenia, Cilicia, vt vult Dioscor. & in Arabia copiosiorē satis indicat. Ad duos enim vsus insignes dū accedit, eius Arabica nomē clatio retinetur, ad solennē videlicet confectionem Alkermes dictā, & ad pānos Kermesio colore, omnium optatissimo inficiendos.

Est

Est autem *kermes*, seu *kermis*, ut aliquando loquitur Serapio, nomen suffruticis, exilicium genere, & grani cuiusdam ei adnascens, quod *Coccus baphica*, seu granum infectorium vulgò nominatur.

Nascitur tum in dictis regionibus peregrinis, tum in multis Galloprovinciæ Arelatensis & Italiæ locis calidioribus, atque his maximè, quæ ad Mediterraneum mare vergunt, reponiturque inter aculeatas ilices. Multiplex enim agnoscitur ilicum varietas, Aliæ siquidem glandiferæ sunt, quæ in proceras arbores adolescunt, Aliæ coccigeræ perpetuò humiles; Quædam bacciferæ inter ambas mediæ ut *Aquifolia*, in Septentrionali solo frequens & viuax. Nonnulli tamen ab ilicum excludunt numero, licet duæ priores tantam non habeant inter se affinitatem, quanta posteriori cum illis intercedit similitudo.

Est ergo planta cui adnascitur *kermes*, pusilla quædam lex, plures sæpe surculos, præduros à radice proferens, folijs obtenebratos perpetuò virentibus, oblongis, in ambitu crenatis, densis, sinuosis, angulosis, spinosis, aculeatis, horridis: quæ ima sui parte, vere primo granum quoddam, tanquam ouum paruulum concipiunt, & supernè reflexis spinis obuallant: quod postea augescens, ex albido cinereum, tandem maturescens purpureum, ac perelegantem colorem acquirit. Totum enim granum id satur ac prægnans est sanguineo colore, qui post maturitatem perfectam diutius in membranula coact⁹ in vermiculos abit, vesicula tenui vacua penè relicta: qui ubi adoleuerint, nonnunquam fiunt alati, & volatu aufugiunt. Ante tamen ipsorum procreationem studiosè liquor dictus elici solet, ad syrupi de *kermes* apparatus, vel sericum tingendum antequam accedat ad nobilem huius nominis confectionem.

Impeditur dictorum animalculorum generatio, vel interitus citò citatur, sola aceri aspergine, qua exanimata cadauerula colliguntur, in massam miniatam coguntur, *Scoletium* dictam, *Plinius Cusculium* dicit, ad tincturam purpurei coloris, quem vulgus *Scarlatum* nominat.

Non est *Coccus*, seu granum illud *Kermes* fructus licis, sed potiùs excrementum & tanquam salua rubens & lucida in parua kisti conclusa quæ circa foliorum exortum nascitur, hæc enim lex pusilla non tantum coccigera, sed glandigera quoque est, in cuius nempè præsertim vetustæ furculis glandes quernis longiores & nigriores adnascuntur: Verùm tunc desinit coccum eructare, propterea eius præscinduntur furculi, ut ex nouorum regeneratione, noua fiat coccorum productio.

Kermes vim habet eximiam cor, & facultates omnes roborandi. Neruis quoque præcisis vtiliter adhibetur, ut & vulneribus, quibus coalescendis sua vi astrictoria prodest.

Vires.

De schœnantho. CAPVT XVIII.



CHŒNANTHVM quasi flos iunci, vel potius ob eius fragrantiam iuncus odoratus, ex Arabia, vbi magnus est eius prouentus, per fasciculos deferitur in alias regiones, in quib⁹ nulla arte potest cicurari.

Planta iuncea est, ac graminea, ex radice exigua, arida, duriuscula, nodosa, multos calamulos, præduros, sparsos, rotundos, plenos, non concauos, nitidos, pedem altos, & in summo graciles proferens: folia rigida, sesquipalmum longa, mucronata, pallida surculos gramineos amplexantur.

Eorum fastigia ornat gemina series flosculorum, ex pallido rubentium & papposorum. Nonnulli vocant paleam de *Mechæ*, Alij pastum Camelorum, quod eorum summitatibus vescantur & delectentur Aphricani cameli. Rarò cum floribus aduehitur, licet ab eis denominationem habeat.

Vires.

Schœnanthum moderatè & calefacit & astringit: Et quia tenuium quoque partium est, mediocriter digerit, & repellit: radix cæteris plantæ partibus astringentior; flos calidior vrinas & menstrua satis potenter promouens.

De folio, seu Malabathro. CAP. XIX.

Talamapatra.

Malabathrum.



X India folium quoddam eximium, Arabibus *Cat-degi Indi*, hoc est, folium Indum ad nos deferitur, quod illius incolæ *Tamalapatra*, Officinæ verò natiui nominis alteratione malabathrum vocitant. Est verò folium Indicum mali medicæ folio simile, colore ex pallido virescens, tribus per longitudinem excurrentibus costis, odoratum, ac cariophyllos aliquantùm spirans.

Non aquis innatat, nec in paludibus Indicis prouenit, neque sine radice est, vt Dioscorides putauit, sed ex arbore desumitur procera, procul ab aquis, & in aridis locis fruticante.

Virce.

Est autem malabathrum calidum gradu secundo, odoratum, vrinam mouet, halitum odoris commendat, vestes à tineis tuctur, & in alijs qualitatibus nardo conuenit, quæ illius penuria substitui potest.

De spica Indica, & nardis.

CAP. XX.



Vo scribit Dioscorides esse Nardi genera, vnum Indicum, alterum Syriacum, vtrumque eodem in mōte proueniens, sed altera parte, quæ ad Indos flectit, Indicum; altera, quæ ad Syrios, Syriacum. Adiungit tamen adhuc postea Celticum, quod in Liguriæ Alpibus nascitur, Salunca patrio nomine appellatum, & montanum, quod in Cilicia & Syria viret, *Thylacitis* & *Niris* aliquando dictum.

Celticæ nardi duas adhuc differentias agnoscit Lobellius, vnam gentianæ cruciatæ folijs, & radice valerianæ maioris, alteram hirculum dictam, cuius meminit Clusius, eam inter spicæ Celticæ fasciculos nactus. Ad illam refertur nardus montana, radice multum tuberosa & aromatica plu folijs, sed magis ex viridi nitentibus, quæ nunc in hortis Galliæ multis visitur.

Præter exoticam nardum & eius relatas species, spicæ quædam nostrates celebrantur, nardi nominibus insignitæ, vt lauendula maior alba, Gallico & vulgari idiomate, *aspic*, & à multis Pseudonardus nominata, ex qua oleum artificio chymico educitur, & cum additione literæ a, vulgò oleum de Aspica nominatur: vt etiam alia lauendula maior cærulea, seu Italica, Atque adhuc alia minor eiusdem coloris, odoris & faciei. Ad easdem si nominis etymon spectetur, Stœchas quæ Vere spicata est, potest referi.

Lauendula maior.

pseudonardus aspic.

Cum autem sine adiuncto spica, seu nardus effertur, de Indica semper intelligenda est, ex cuius radice exili spicatæ comæ nascuntur, & confertæ glomerationes, quasi per cirros, ac rotulos discriminatæ, è quarum spatijs medijs folia quædam iunceæ exurgunt.

Lib. 8.
simpl.

Spica nardi, hoc est, nardus Indica, docente Galeno, excalfacit primo gradu, & desiccatur secundo: Iecori & ventriculo prodest, vrinam mouet, stomachi morsus sanat, & mezenterij humiditates exiccatur. Omnium verò maximè Indica seu nigra nardus corporis affectibus sanandis confert.

Vires.

De Aspalatho. CAP. XXI.



IGNOTORVM sapiens est anceps disquisitio : Daris-
sahan, seu Aspalathus quem Trochisci Hedichroi ad-
mittunt, cum vix innotescat, vix auctores in illo des-
cribendo congruunt. Nonnulli fruticem pumilum esse
dicunt, alij arborem: Quidam album esse santalum tenent, alij ci-
trinum, alij agallochum, alij Rhodium lignum; quos tamen lapsos
verum est, si vera scripsit oculatus testis & fide dignissimus auctor
Prosper Alpinus, qui varias ac longinquas regiones lustrando, in
Creta, & alibi Aspalathum vidit, excerptit & probauit, Arbustum-
que narrat esse ramulis densis, spinis albis, durisque horridum, fo-
liis rutæ proximis, atque floribus aureis, raris, sparthi florum æmu-
lis, summè odoratis. Ego, inquit, eam plantam iucunditate eximia
odoris ex ipsius floribus vbi Cretæ loca aliquando diuersarer, ad na-
res elata cognoui.

Clus.

Ruel.

cap. 10.
lib. 4.Lignum
rhodium.

Nascitur quoque in Istro, Nisyræ, Syria & Rhodo insula, vnde
Rhodium lignum potius dictum quam à rosarum odore quo suauiter
flagrat: aliud quoddam lignum è nouo orbe delatum, crasso cor-
tice & hiulco, nodis & tuberibus multis inæquale, ponderis eximij,
& intus coloris variegati, venis quibusdam confusè ductis, nunc
flauescentibus, nunc ex obscuro rubris.

Rosaceum
lignum.Lignum
Rhodinū.

Huius ligni Scobs odoramentis inseruit, halitus enim suauitate
rosas non tantum æmulatur, sed vincit, vnde lignum Rhodium seu
rosaceum nuncupatum, vt Aspalathus lignum Rhodinum quod in Rhodio-
rū insula nascatur. Vocatur etiā à Dioscorid. Erysisceptrum, & fruticem
esse dicit furculosum, spinis horridum; Cuius duas agnoscit diffe-
rentias, optimum vnum & alterum deteriolem. Aspalathus, inquit,
optimus grauis est, cortice detracto rubescens, aut in purpuram
vergens, densus, odoratus, gustu amarus. Est alter deterior, candi-
dus, lignosus, & absque odore, quem pharmacopolæ solent exhibe-
re, priorem verò non dignoscunt, cuius tantum facultas à Dioscori-
de celebratur. Sunt qui adipsatheum, & Diaxydon vocant. P. Pena
rei herbariæ elegans scriptor, reprehensor acerrimus, lignum ro-
seum constituit tertiam speciem aspalathi, anceps tamen, num sit
species santali, aut Oliuastri Rhodiensis. Vim habet Aspalathus ca-
lesfaciendi cum astrictione.

cap. 19.
lib. 1.

Vires.

Ideo ad terra oris vlcera cum vino decoctus commendatur. Ad
genitalium nomas & vlcera sordida prodest. Aluum sistit illius de-
coctum, & sanguinis reiectionem potu cohibet; Angustias vrinæ
& inflationes discutit, atque cum mixta sit qualitatis, calefacit, re-
frigerat, & siccatur; Partibus namque dissimilibus constat, acris
& austeris.

De Agallocho. CAPVT XXII.



LIGNVM aloë, Xyloaloe, & Agallochum dicitur. Arbor est oleæ instar, interdum maior, non cute, vt scribit Dioscorides, sed cortice crasso vestita. Lignum eiusdem odoratum est, nigricans, cinereis venis discurrentibus, & velut punctis maculatum, poderosum, crassum, compactum, succulentum, igni adhibitum, & accensum (egrè autem flagrat) liquoris plurimum exudans.

Eius autem odor non per vniuersam ligni materiam diffusus percipitur, sed in medullis fragrantior est & vegetior: atque in sicciore, quàm in virescente, aut recens secto.

Rarissima est arbor, in India sola nascens, & maximè in his regionibus & promontoriis, in quibus T. gres & ferocissimæ belluæ vitant & commorantur; Vnde non nisi summo cum periculo arbor grandiuscula cædi potest, aut iunior euelli, & sine vitæ discrimine transportari. Hinc antiquioris ætatis simplicissima gens ineptè credidit, eam in solo terrestri paradiso nasci.

Eius plura genera recenset Serapio, quæ nec vidit ipse, neque novit: forsitan alia ligna odorata, quæ multa sunt, ad Agallochum refert. Sic quod in promontorio Comorin nascitur, odoratum, à quibusdam lignum aloës vocatur, cùm tamen non sit, inquit Garcias.

Cur agallo-
chum rarissi-
mum.

Vires.

Agallochum, seu lignum aloës, Auicennæ Agalugen dictum, calescit & siccatur ordine secundo, & ad cordis affectus plurimum valet.

De Santalis. CAPVT XXIII.



ARBORIS cuiusdam peregrinæ & proceræ iuglandis ritu lignum ad nos deferitur, quod in insula Tymor, ubi frequens est, Chandama: in Arabia Sandal; in Europa, Santalum vocatur: Cuius tria dignoscuntur genera, album, pallidum, vtrumque in insula dicta vberimè luxurians, & rubrum, quod alibi, nempe in insula Tanasarin prouenit, vt ex Garcia ab horto narratur, qui tantam affinitatem esse scribit inter arbores santalorum, vt vix pallida à candida queat discerni, nisi fortè ab ipsis incolis, qui eas arbores cædunt; casas mercatoribus vendunt. Facies enim vtriusque similis, folia eadem, admodum virentia, lentisci æmula, flores ex ceruleo nigricantes, fructus ceraforum magnitudine, primum virides, tum nigri, ferè insipidi & faciliè decedentes.

Pallida seu citrina santalorum arbor, in locis apricis lætior prouenit, odoratior & præstantior, eiusque lignum albo, album rubro

longè præstat. Rubrum verò inodorum est, berfilio valde simile, sed non dulce est, nec inficit vt brasiliū, nec ita durum ac ponderosum.

A paucis annis à vastissimo Indorum solo, præsertim à noua Hispania Lutetiā aduectum est lignum quoddam santalo citrino adeò simile vt primo intuitu vix queat discerni. Nostrates à peregrino tractu lignū indicū, medici ab effectu lignū nephriticum nominant, mira enim virtute pollet ad ciendam vrinam & expellendos minores calculos. Eius tantum solet dari infusum, seu aqua simplex in qua maduerit, quam subcæruleo vel potius opali inficit colore. Non impropriè quarta santali species credetur, donec verior nomenclatura designetur.

Vires autem eximias veteres santalis dedere: Cor enim & partes vitales exhilarant & roborant, ait Auicenna; Calidis morbis, vt febribus aduersantur, obstructions liberant, & hepar velde recreant.

De Sassafras. CAPVT XXIIII.



ASCITVR in Florida arbor quædam prægrandis, Indis *Paccame*, Hispanis *Sassafras* dicta, caudice procero, cortice cinereo, ac tenui vestito: ramis in cacumine expansis: foliis ficulneis, in tres angulos diremptis: radicibus nunc crassis, nunc tenuibus, pro arboris ætate, per summos terræ cespites expansis, aliquantum aromaticis, & fœniculum spirantibus.

Arbos hæc læta fruticat in locis maritimis & temperatis. Radix eius omnibus aliis partibus præfertur, præsertimque eius cortex, qui galidus & siccus est initio tertij ordinis.

Cæteræ eius partes gradu tantum secundo qualitatem vtramque sortiuntur. Præter qualitates istas elementares aliæ quædam peculiæ agnoscuntur ad multa per-vtiles & expetitæ. Sed ob raritatem circulatorios interdum buxi scobem & fœniculi semen simul terunt, & pro puluere Sassafras vendunt. Sat enim esse putant fallendæ plebeculæ, si pro vero Sassafras, quod fuluo colore & fœniculi odore commendatur, puluerem flauescentem & fœniculum exhalantem exhibeant.

Vires.

Decoctum Sassafras, inquit Clusius, commendatur in omnium morborum genere, præsertim in obstructions tollendis, partibus internis roborandis, morbis mulierum multis, & venereæ lûi curandæ.

De Guaiaco. CAP. XXV.



EDICAMENTA sex simplicia valde commendantur ad luis Indicæ curationem, Sassafras, guaiacum, sarsaparilla, Chyna, Mercurius & Cynabaris. De Sassafras capite superiore, de aliis postea. Guaiacum sic à *guaiacam* voce, Indis germana, dictum, Latinis sæpè Lignum sanctum, ex insulis occidentalibus *Boriquen, Cuenca, Nagrando, & Nicaragua* defertur.

Arbor est procera adiicis, aut fraxini magnitudinem & faciem multum accedens, ramosa, meditullio nigricante, ac præduro, cortice crasso & pingui, foliis exiguis, & duris: flore luteo, ac purgatorio, quem Indi condiunt & sumunt ad corpus purgandum.

Flores consequuntur fructus magnitudine castaneæ, ac forma duorum lupinorum simul iunctorum.

Est alia species Guaiaci minoris, præstantioris tamen, quod Palus sanctus & aliquando Lignum sanctum nominatur. Arbuscula est colore, viribus, magnitudine & vultu guaiaco non parum dissimilis. Nam materia ligni illius alba est & concolor, multumque fibrosa, sapor acrior, odor fragrantior, qualitates efficaciores. Sed quia ratio aduehitur, eius penuria, guaiacum vsurpatur, quod quidem vires habet easdem, sed infirmiores.

Guaiaci descriptio.

Palus sanctus.
Palma sancta.

Utrumque autem plurimum valet ad luis Indicæ curationem: Vires, nam calefacit, incidit, attenuat, meatus aperit, sudores mouet, putredinem arcet, & proprietate speciali virus venereum extinguit.

De Sarsaparilla. CAPUT XXVI.



EX insulis occiduis & maximè ex *Peru*, & prouincia *Honduras*, radix quædam prælonga & vniformis defertur, quæ nunc Sarsaparilla, nunc *salaparillia*, & *sarzapariglia* vocatur, quam Mathiolus & Dodonæus putant esse eandem cum Smilace nostrati. Dissident tamen inter se multum, nam smilacis asperæ radix nodosa est, & geniculata, graminis ritu, multoque breuior & mollior. Enodis verò est sarsaparillæ radix, nullis geniculis asperata, dura, fibrosa, rugosa, medullosa, & aliquando viginti pedes longa, atque viminis instar facile finditur. Cæteræ eius partes smilaci similes sunt, & simili modo frutices vicinos scandunt & amplexantur.

Sarsaparilla primis qualitatibus calefacit, sed moderatè calidis aperit & sudorem prolicit, tertiis venereum virus extinguit.

Sarsaparillæ vires.

Eius cremore vtuntur Indi ad venereæ luis, quæ illius vernacula & Endemialis est, curationem,

De Chynaradice. CAPVT XXVII.



Ec prætereunda est alia Indicæ luis antidotus, radix nempe quædam insignis quæ vt & tota planta à Chyna nomen apud nos habet: In solo verò patrio patrium nomen retinens, *lampatan* vocatur. Nascitur in Chinarum vastissima regione, Indiæ Orientalis Scythiæ contermina, nec in montibus & fundo sicciore, vt arbitrati sunt quidam, sed locis vdis, palustribus & aquosis, arundinum more, vt iuxta maris litus, & cuiusdam Lybiæ fluuij oras.

Radix ei crassa est & nodosa, vt arundinibus, dura & tuberosa, vt rubo, rubea & tortuosa, vt bistortæ. E radice tenues cauliculi erumpunt & imbecilli, folijs admodum raris cincti, qui licet humiles, vt rectius stent, fulcro indigent, quo nitantur.

Vulgaris nunc est ista radix, quam antiquior ætas aut non vidit, aut oscitanter prætermisit. Nunc verò lippis & tonsoribus notissima, neque datur tyrunculus vllus qui de Chyna radice non garriat, qua tanquam medicamento polychresto vtuntur Indi ad omnium morborum, atque eorum maximè, qui alia remedia illis consueta temnunt, curationem.

Vires.

Historia.

Valet autem plurimùm Chyna ad luis venereæ curationem. Vertigini quoque prodest, stomachi dolorem sanat, hydropi conuenit ex Cardano, colicis doloribus & affectionibus vteri prodest, obstructions tollit, meatus aperit, vrinam mouet, sudores elicit, conuulsioni & paralyfi confert, & articulorum dolores leuat. Carolus enim Imperator huius nominis quintus, ab aliis medicamentis nullum, à Chyna maximum leuamen, aduersus arthritidem, quæ sæpè eum male exercebat, percepit. Sunt qui tabidis prodesse contendunt, calidiorem tamen puto, quàm vt atrophiam tollere, intemperiem sicciorem emendare, & habitum optimum resarcire possit.

Garcias enim ob eius vsum in tantos ardores hepatis incidit, vt totum penè corpus inflammatione obsessum fuerit, Et re vera nunc rarior solito eius incipit esse vsus.

SECTIO QVARTA.

De Calefacientibus indigenis.

MULTA quoque calefacientes plantas habemus, quæ prægrinis in re nulla cedunt, de quibus scorsim in hac sectione disceptaturus, eas primum describam, quæ seu ultro ruri, seu in hortis nostris cultura proueniunt, cum excessu magno calefaciunt, dein eas attingam quæ remissæ suas vires calefaciendo exerunt, tandem quæ segniter sese dant in conspectum nec nisi à perspicacissimis earum qualitates accuratè dignoscuntur. De his igitur quæ ignea quadam qualitate insigniuntur prior erit sermo, ut

De Pyrethro. CAPVT I.

PYRETHRVM ab igneæ qualitatis impressione, quam radix eius mansa in gustatorio organo relinquit dictum vulgus pedem Alexandrinum, Latini à saluæ copia, quam in ore detenta elicit, herbam saluarem nominant.

Herba est cubitalis & sæpè altior, caulem & folia dauci sylvestris, aut carotæ vulgaris æmula gerens, multipliciter diuisa, sectaque in capillamenta tenuia, fœniculi modo florem pulchellum in furculorum summitatibus eructat, latum ac patulum & chrysanthemo, aut helenio forma similem, sed maiorem, medio orbe subluteum, foliolis eius ambitum circundantibus angustis, oblongis, parte superna albicantibus, prona aliquantum purpurascens. In medio eius orbe, atque inter stamina semen gignitur tenue, oblongum & odoratum.

Radix subest crassa, longa, è subruffo colore nigricans.

Nascitur in Italiæ & Hispaniæ locis multis: & in hortis Belgij satum Ptarmica. viret, adolescit, floret & sæpè semen perficit: vberius tamen & laticius in regionibus calidis, ut orientalibus prouenit, inter plantas tamen indigenas & Europeas retulimus, quòd in Septentrionalibus etiam copiosum alatur.

Alia planta suo acri odore sternutamentum mouens, ptarmica, seu sternutatoria, ob id dicta, in Officinis sæpè Pyrethrum Sylvestre vocatur, quòd suo sapore vellicante gustum Pyrethri modo feriat, & saliuam promoueat. Nascitur non modo in montosis & incultis locis, sed etiam in pratis & circa margines agrorum.

R.

Vires.

Radix pyrethri feruidissima est, & ad quartum caloris excessum ascendens. Pituitam in ore detenta prolicet copiosam: Proinde detritum dolori à causa frigida prodest, diuturno capitis dolori, apoplexiæ, morbo comitiali, neruorum resolutioni, atque omnibus affectibus, qui à pituita in capite congesta proficiuntur.

De synapi. CAPVT II.



SYNAPI vix alimentum est, nonnunquam medicamentum, sæpè condimentum: Dapibus enim viscidis & glutinosis præsertim hyeme conuenientissime admiscetur, vt earum lentor incidatur & corrigatur, ventriculusque roboretur: Nam quibus palatum torpescit, aut cibi ingruit fastidium, mirum in modum prodest id condimentum, sed quia acerrimum est, gustumque ferit importunè, non modo teritur cum aceto ad eius mitigandum feruorem, sed sæpè ad dulcedinem & suauitatem maiorem mustum commiscetur: Sicque gratissimum condimentum, vulgò Mustarda nominatum, quasi à musto & ardore paratum habetur, cui nobilitatem non parua inter condimenta multi tribuunt.

Est autem Synapi vel satium, vel agreste. Satium duplici agnoscitur discrimine; Prius folia rapo effigie similia gerit, sed paulò minora & multo asperiora; surculum teretem, hispidum, asperum bicubitalem & sæpè altiore, ramulis multis brachiatum, circa quos flosculi lutei, optima serie dispositi erumpunt, quibus siliquæ succedunt oblongæ, tenues & asperæ, in quibus semen paruum, rotundum, ex albo flauescens, gustu mordax & acre includitur.

Synapi domesticum alterum superiori adeo vultu est simile, vt solo seminis colore dissentire videatur, quod in priore velut luteum est, in hoc è nigro subruffum, folia tamen ad Erucam magis accedunt. Cætera omnia ferè eadem.

Vtrumque in agris, hortisque seritur, terramque diligit aratam, & maximè congestitiam: quamuis vbicumque nascatur, & nullo plerumque cultu germinet.

Syluestre vbique sponte nascitur in locis aridis, quandoque etiam humentibus, & iuxta margines & rudera. Reliquis minus est, folia que gerit minora, laciniosa, bursa pastoriæ non parum similia, sed acutiora: flosculos emittit luteos, quadrifolios: semen in siliquis postea dat, quod aliquando euariat, & interdum album, interdum ruffum conspicitur.

Synapi nomen dedit nobili medicamento, Synapismum vocant, cuius vsu s ad multa valdè celebratur, vt ad vetustos capitis dolores, comitiales affectus, vertigines, orthopnœam, tusses antiquas, destillationes, & arthriticos dolores.

Synapi calidum & siccum est quarto recessu: incidit, attenuat, ex- trahit, pituitam in ore detentam elicit: Tritum & naribus admo- tum sternutamentum mouet, fœminas hysterico pathemate suffo- catas excitat: Sed qui caliginosos habent oculos & imbecillos, eius vsum prorsus vitare debent.

De Thlaspi. CAP. III.



R E C T E quidem & appositè Synapi & Thlaspi ea- dem serie describuntur: Ambo enim si non effigie, saltem qualitatibus multum conueniunt, passim- que thlaspi, synapi rusticum vocatur. Sunt verò thlas- peos, seu thlaspidij, vt cum Dioscoride loqui- tur Plinius, multa genera, inter quæ tria præcipua notantur, maius vnum, minus aliud, & quoddam medium, ad quæ alia hoc nomine donata referuntur.

Primum vberrimè in agris cultis, incultisque prouenit, folijs la- Thlaspi pri-
tioribus, oblongis, parum crenatis, in acutum sensim desinentibus, mum.
ramulos è caule sesquipedali prodeuntes, ambientibus floribus pri-
mum albidis, sub æstatem sequentibus, pastoriæ bursæ parum dif-
fimilibus in duas glumas & tanquam valuulas subrotundas hianti-
bus, ex quibus semen nigricans, feruens, & acre, sapore synapi, aut
nasturtij emergit.

Secundum caulem similiter ramosum edit: pedem altum, folia mi- Thlaspi se-
nora, angusta, acuminata, in terram versa, flores albidos, semen par- cundum.
uum, acre & feruens, nasturtio cognatum.

Tertium & minus thlaspi, herbula est angustis folijs, digitum Thlaspi ter-
longis in terram se conuertentibus, in extremo parum incis, flos- tium.
culis albicantibus, caule tenui, ac ramoso, pedem alto; cui eleganti
serie valuulæ multæ, parue, planæ, breui pediculo nixæ, ac ligularum
seu lenticulæ effigiem exprimentes, adnascuntur, in quibus semen
coarctatur paruum, gustus acerrimi & synapi ac nasturtij modo, dum
manditur, os & linguam feriens.

Nascitur in locis incultis, saxosis, montosis, soli expositis, calidis,
siccis, vt in multis parietibus & tectis, vnde & Nasturtium tecto-
rium sæpè ab herbarijs vocatur, & aliquando synapi rusticum. Hu-
ius semen vsurpari solet in officinis ad Antidota, nec tamen er-
rabit qui eius defectu aliorum semina vsurpabit.

Multi multas adhuc alias stirpes semen feruens & acre ferentes
ad thlaspidia referunt, sed cum effigie multum dissideant, alij malunt ad
eas, quæ vultu magis sunt affines reducere. Thlaspi enim Crateuæ, Thlaspi Cra-
quod esse videtur viola latifolia, vulgò bolbonace, vt etiam Draba, teuæ.
quibusdam thlaspi dicta, nihil aut parum cum reliquis thlaspidijs
habet affinitatis.

Thlaspi vi-
res.

Thlaspi semen calidum & siccum est quarto recessu: Internos abscessus rumpit, menses ciet, fœtus enecat, Ischiadibus prodest: per sedem infusum sanguinolenta euacuat, & alia multa commoda pollicetur, dum ritè & opportunè vsurpatur. Admiscetur verò Antidotis quibusdam, vt theriacæ.

De Eruca. CAPVT IV.

Herba fa-
lax.



ERUCA, quam vulgus Roquetam, Græci Euzomon vocant, in hortis colitur condimentorum gratia; Acetariis enim vt iusculis commixta simul & suauiter, & vtiliter estur ab his quibus languet calor internus, ignauusque est libidinis stimulus: Venerem namque reuocat Eruca morantem, & tardos ad congressum maritos, celeres facit, vnde à poëtis herba falax vocitatur.

Proceritate cubitali assurgit, folio admodum longo & angusto, vtrinque profundis incisuris, sed raris laciniato, floribus pallescentibus, & aliquando luteis, ac quadrifoliis: Semine in siliquis napi modo, radice candida & dura. Nascitur aliquando sponte inter ruderæ, & in locis asperis & incultis.

Est alia erratica ac syluestris, quæ squalido solo, & secus vias & pomœria gignitur, foliis ad taraxacum accedentibus, sed tenuioribus, ac minoribus, floribus luteis & brassicæ æmulis, media æstate erumpentibus.

Erysimum quibusdam Irio, aliis tortela dictum, vultu & gustu syluestrem Erucam tam bene refert, vt ipsius nomine à multis donetur; Cum tamen Erysimum inter cerealia à Galeno reponatur, vix inter Erucas repono.

Est verò etiam Eruca cuiusdam insecti putidi, brassicis & oleribus aliis infestissimi nomen, quod Græcis *καυπη* vocatur, cuius multæ varietates in colore & magnitudine dignoscuntur, de quibus agere nunc nec volumus nec debemus, sed de his tantum simplicibus quæ compositiones pharmacopolio necessarias ingrediuntur.

Eruca vi-
res.

Eruca calefacit & siccatur ordine tertio: lienem extenuat, graue virus alarum tollit, moribus naris aranei medetur, venerem excitat, vrinas mouet, cicatrices nigras delet cum felle bubulo illita, & lentigines emaculat.

De Vrtica. CAP. V.



VRTICARVM duæ generales traduntur differentiæ, vna foliorum improba mordacitate, & furculorum lanugine quadam pungente lædit contrectantium manus vel aliam partem corporis nudam, altera innoxie, ac sine molestia contrectatur. Illa Græcis modò Acalyphe, quodd iniucundo sit tactu, modò Cnide, quod molestè pun- gat, vulgo vrtica alba & mortua, ac iners nuncupatur.

Vrentium porro vrticarum tres notantur varietates, nempe ma- iores duæ, & minor vna: Omnes verò syluestres & vbiq; fere spon- tè prouenientes. Sunt tamen qui specialius quasdam syluestres & fœminas vocant, alias verò mares, vt quæ reliquas proceritate su- perant.

Vrtica fœ-
parefmas.

Omniū prima Romanis dicitur mas, quæ teretes furculos emit- tit sesquicubitales, & aliquando longiores, canos & vacuos: folia la- ta, mucronata, fimbriata, ambitu serrata, vndiquaque aspera & mordaci lanugine obsita, quæ pustulas & vredinem etiam leui con- tactu excitant, & cutim rubefaciunt. Semen in paruis velut pilulis includitur, rotundis, hispidis, quæ è foliorum alis prodeunt.

Vrtica fœ-
mina.

Secunda, vrtica fœmina est, eaque non globulorum modo semē profert, sed tanquam vuas racemosas, longas, mercurialis fœminæ ritu, secundum furculos & alas exeuntes: Caulem erigit altio- rem, ramosioremque & folia latiora; omnia verò mordaci pube multum importuna.

Tertia omniū minima ramosissima, mordacissima & odore grauissima est, racematimque semen producit, sed non prædicto- rum modo: Nam è foliorum alis granula multa simul erumpunt, sed singula singulis pediculis breuibus è furculo natis prodeuntia vrticæ maris ritu. Tertia hæc vrtica Cania solet appellari, & omnibus mor- daciior percipitur.

Nascuntur vrticæ locis incultis & iuxta sepēs, dumos, & vetustos parietes: Nonnunquam & in hortis, & in solo pingui.

Vrticæ vi-
res.

Vrtica omnis siccatur insigniter, sed non item calefacit, nam licet ab vrendo dicatur, vredo tamen ab eius contactu excitata, non tam calori quàm illius lanugini aculeorum instar pungenti tribuenda: Nam trita aut decocta vrtica ignauè calida est. Orthopnoicis, men- sibus & vrinæ mouendis conducit: Semen verò venerem stimulat, & cicutæ veneno præsentissimum est Alexiterium. Valet etiam ad malignam hyosciami, fungorum, & argenti viui qualitatem, nec- non ad serpentum virulentarum bestiarum & morsus. Maris autem vrticæ semen ceteris præstantius creditur. Non est omittendum ad

dolorem & pustulas ab vrtica excitatas oleum plurimum conferre, ut & sambuci folia trita & apposita; Proprietate enim hanc affectionem tollunt.

Inter vrticas reponuntur totidem aliæ plantæ, quæ nunc lamia, nunc vrticæ mortuæ & inertes vocantur; Ad quas etiam refertur multorum iudicio, alia stirps, Romanis vrtica *labco* dicta, quam putant multi Agripalmam, seu Cardiacam esse, alij Galeopsim & Galeobdolon.

Lanium.

Vrticarum mortuarum prima cubitali proceritate assurgit, foliis vrticæ in ambitu ferratis, mollibus, aliquantum hispidis, nec mordacibus; floribus aliquando albis, aliquando purpurascensibus cassides referentibus.

Altera superiori valde similis, sed minus ramosa, flores edit multos hormini affines, sed purpureos ex furculorum geniculis verticulatim prodeuntes.

Syrupus de
lamio.

Tertia minor est, imbecillior, fœtidior & foliis rotundioribus: vix eius in facienda medicina celebratur usus. Ex aliarum autem floribus recentiores syrupum parant, quem vocant de Lamio ad vitiapulmonum & thoracis, quem tamen parum commendabilem effectus indicat.

De Iride. CAP. VI.



Floris variegato colore illius æmulo, qui arcus instar inopaca nube soli opposita pingitur, lilium quoddam Iris vocatur. Cuius viginti duas varietates sæpè distinxi, quas omnes nunc recensere nostrum commentariolum non finit.

Duæ autem præ ceteris species in usum veniunt medicum, nostras nempe, quæ flore est cæruleo & suavissimo odore, cuius radix potenter aquas educit, dein Tusca, seu Florentiana, cuius radix candida est, sed multò candidior flos, atque suavissimè vtrique fragrans: Ideoque reliquis omnibus præferri solet & debet, nisi cum ex alio serosos humores ducere consilium est.

Folia fert Iris omnis longa, instar gladij, vnde gladiolus sæpè dicta, radices nodosas, paucis exceptis, quæ easdem bulbosas habent, flores valdè patulos, lilioformes, sed foliolis magis reflexis, quorum, tria minora sunt, inter alas reliquorum trium sita, ac velut ansulas constituentia, quibus marcidis siliquæ se produnt duæ, tres ve, crassæ, triangulares, in quibus semina angulosa coarctantur.

Vires.

Iris cærulea, lilium cæleste multis dicta in Pharmacopoliis multum expetitur. Nam eius radix hydragoga est & hydropicis vtiliter datur. Ex floribus autem paratur oleum ad multa quoque commendatum. Florentiana verò omnibus præstat vim enim habet cephalicam, aromaticam, cardiacam, incidentem & aperientem.

In vniuersum omnes irides calefaciendi, extenuandique vim habent, torminibus medentur, menses pellunt, & magni, inquit Dioscorides, ad omnia vsus.

De Helenio. CAPVT VII.



H ELENIVM, siue Inula & Officinis Enula Campana, mox à radice folia promit, longa, lata, aspera, mucronata, numerosa, tenui lanugine hispida: Caudicem durum, tricubitalem & sæpè longiorem: flores aureos, stellatos, biophthalmi, aut Conizæ mediæ cinulos, qui in scappos abeunt, remanente semine carduino non multùm dissimili.

Radix ei magna est, crassa, longa, ex ruffo flauescens, odorata, ac suauiter spirans. Nascitur in locis pinguibus, & humentibus. In insula Helena laudatissimum, vbi lacrymis Helenæ natum poëtæ fabulantur, vnde nomen. Alij tradunt potius ab Helena satum fuisse, ad serpentum internecionem. Valet enim mirum in modum ad venena non modò, quæ corpus inficiunt humanum, sed & reliquorum animantium præsertim quadrupedum. Datum enim ouibus, cum vino aut aceto eas seruat, & sanat à peste quadam cui sunt obnoxia, quam vulgus Clauelatum vocat.

Pro radicibus behen vix cognitis, nonnulli credunt radices helenij sumi debere, quibus libenter assentior: Helenium enim si behenium non est, ei sanè optimum est substitutum.

Radix helenij manifestè calefacit, vrinam & menstrua mouet, cõmanducata dentes firmat, condita tussim emendat. Potum radice decoctum, conuulsis, orthopnoicis, pesti & serpentum moribus medetur.

Vires.

De Cypero. CAPVT VIII.



C YPERVS iuncus est triangulus, in riguis & palustribus locis emicans, cubitali & sæpè altiore proceritate, ab imo caudicans, fastigio niger. Folia promit longa, gracilia, arundinacea, dura, cultellata, paniculas in cacumine dependentes, inter quas semen occultatur. Subsunt radices rotundæ, nodosæ, longæ, sibi implicite, graminis modo serpentes, foris nigricantes, intus ex subluteo albicantes, odoræ, suaues, amaræ: hæ solæ inter plantæ partes magno sunt vsui, reliquæ ferè inutiles.

Excalfacit Cyperi radix citra mordacitatem: Proinde vlcera validius exsiccando, citius ad cicatricem perducit, & propter vim quãdam astrictoriam vlceribus oris valdè conuenit; vrinam quoque mouet, menses restitantes excitat, & ad calculum & aquam subtercutem vtilissimè bibitur.

Vires.

Cyperus
rotundus.

Est aliud cyperi genus, vultu illi simile, sed radice magis nodosa & rotunda, vnde cyperus rotundus nominatur.

Cyperus
Indicus.

Meminit & Cyperi Indici Dioscorides, zinziberis effigie, qui masticatus croceum succum reddit, gustu amarus sentitur & acer: illitu vim psyllothri habet.

De Angelica. CAP. IX.



IRVM est antiquos eam stirpem nobilem, quam propter raras dotes, Angelicā recentiores nomināt, nō nouisse, vel subticuisse, qua vix tota Europa nō promit fragrantiorē & suauiorē. Est verò planta bicubitalis & interdū altior, caule geniculato, striato, pallescente, cano & ferulaceo. Folia edit amplissima, hipposelini æmula, mollia, virescentia, ex pluribus cohærentia, serrata: flosculos albicantes in umbellis: semina subflaua, plana, lata, membranosa. Radix ei valde crassa & longa, plures in ramos aliquando dirempta, odoratissima, ac aroma suauissimum spirans, ex qua liquor sæpè oleosus exudat, pinguis, odoris eiusdem, quem & folia ipsa & furculi exhalant.

Angelica
minor.

Tres autem Angelicarum agnoscuntur differentiæ, duæ nempe hortenses, & vna sylvestris. Ex hortensibus, vna maior est, supra nempe descripta, quæ videtur esse laserpitij quædam species, alia minor, ei odore, facie, viribus, similis, ac sola magnitudine discrepans.

Angelica
sylvestris.

Ipsis cognata est alia sylvestris, radice, caule, folijs, umbellis, odore, flore, gustu multum similis; minus tamen suauiter spirat & sapit. Frigidis in locis delectatur, vdis & pratensibus. Ea videtur esse quæ à Dodoneo & Clusio Archangelica vocatur. Id tamen nominis si cuiuspiam stirpi conueniat, Angelicæ veræ melius conuenit.

Archange-
lica.


Vires.

Angelica calefacit & siccatur ordine secundo, aperit, attenuat, digerit, humores crassos incidit & discutit: venenis aduersatur, pestilentibus morbis conuenit, menses promouet, cor & facultates recreat.

De Libistico, seu Ligustico.

CAPUT X.

Libisticum



IMPLICITVM multorum affinis vultus in discernenda specie magnam adfert ambiguitatem. Quid enim sit Laserpitium, quid distinguatur à libistico, quid vtrumque ab angelica, Imperatoria & Smyrnio, vix ex doctorum lectione colligi potest. Quantum verò coniecturis & rationibus assequi valeo, Ligusticum Officinis Leuisticum, Planta est altitudine frutices multos æquans, caule

caule geniculato, intus concauo, foliis paludapio similibus, sed maioribus, laciniosis, ac velut in partes plures determinatis & incis, atque ex pallido viridantibus & nitentibus. Umbellis comatur, flosculis parvis ac subluteis, hinc inde micantibus, quorum senio semen oblongum, rotundum, striatum succedit, fœniculo proximum gustanti acre & aroma olens.

Diosc.c. Radix ei candida est, odorata, Panacis Heracleotici similis, unde *Panacea*.
51 lib. 3. & Panacea quibusdam dicta.

Falluntur qui Smyrnum, aut Hippofelinum vocant; Atque grauius errant, qui non modò Silphium, seu Laserpitium esse contendunt, sed succum ex eo eductum Belzoinum nominant: Ex arbore enim procera hoc aroma exilit: ex laserpitio, quod ferulacea planta est, succus Syrenaicus; Ex Libistico vel nullus educitur succus, vel eductus minimè seruatur. An Succus Syrenaicus, sit Afa dulcis, vel Belzoinum, suo dicetur loco.

Ligusticum in Liguria copiosum nascitur, ac in Apennino monte; Ibi que Panacea vocatur, quòd radice, caule & viribus Heracleoticum panaces referat. Quadruplici verò discrimine Panaces agnoscitur, Syrium, Heracleum, Chironium & Centaurium, quibusdam Pharnaceum dictum. Sed hæc relinquimus exactiùs discutienda his, qui vniuersam simplicium historiam describendam suscipiunt. Redeo ad propositum

Radicibus & seminibus ligustici vis inest calefactoria; Ob id coctionem inuat, ventriculum roborat, flatu dissipat, vrinam & mēstrua mouet, strangulatus vteri tollit, & serpentum moribus medetur.

De seseli. CAPVT XI.



DLANTÆ multæ effigie plurimùm dissidentes Seseleos nomine donantur, vt Massiliense, Æthiopicum herba, Æthiopicum frutex, Creticum siue Tordylium, Peloponense, Pratenſe & herbaceum, seu quod facie Cicutæ est. Massiliensi, cuius frequentior est vsus, caulis est ferulaceus, bicubitalis, geniculatus, durus: folia veluti fœniculi, sed ampliora, latiora, crassiora. flosculi in umbellis albicantes; semina oblonga, vt fœniculi, admodum acria, non tamen ingrata, quæ sæpè medicis vsibus inserviunt.

Æthiopicum frutex.

Æthiopico surculi lignosi sunt, rigidi, subrubei & cubitales; folia oblonga, mediocriter lata, leuia ex albo virentia: flosculi in umbellis flauescetes: semina oblonga vt Libistici.

Aliud Sefeli Æthiopicum herbaceum surculos ferulaceos habet, bicubitales, folia lata ex pluribus coherentia Paludapio similia, umbellâ flosculis albicantibus refertas, semen membranofum

Æthiopicum herba.

latum, planum, paleaceum, odoratum & gratum.

Pelopon-
nense.

Seseli Peloponnesi geniculatus ac feruaceus caulis est; folia lata variè dissecta; umbellæ patulæ; flosculi sublutei; semen latum, oblongum, planum: radix crassa, exterius subnigra, interius albida, acris & amara, & stomacho grauis.

Tardylum

Cretico surculus humilis est & obsequiosus, folia incisa & in margine crenata, flores parui in umbellis albi, semen paruum, latum, planum, odoratum & acre. In Pharmacopoliis rarò usurpatur.

Vires.

Omniū Seseleon semen calefacit & siccatur ordine secundo, urinam pellit, menses & foetum trahit, & urinam à renibus & vesica trahit, & educit: Massiliensis autem semen aliis præfertur.

De Gentiana. CAP. XII.



ENTIANA non immerito à Gentio Illyriorum rege nomen habet, & miris laudibus effertur: ast enim solenne pestifugum, putredinis exitium & veneniale xiterium. Folia gerit plantagini, aut potius elleboro albo similia, ex viridiali quantùm rubentia, venosa, pedem longa, sapore per quàm amara. Caulis ei cubitalis est, sæpè altior, è cuius singulis geniculis flores exeunt, verticillatim dispositi foliolis sex, angustis, stellæ radiantis instar explicati; quibus succedunt semina lata ac tenua, calycibus oblongis è quibus flosculi emerferunt inclusa.

Vires.

Vbique nascitur, sed delectatur magis in locis montosis, opacis tamen, atque præstantissima in Illyrico, vnde sibi regium inuentoris nomen arrogauit. Vfus eius in radice est præcipuus & à medicis magis laudatus.

Tanta vis inest Gentianæ, præsertim radici, vt non solùm homines, sed etiam bruta aduersus venena tueatur. Stomachum corroborat ex aqua pota, lambricos necat, putredinem arcet, virus pestilens domat, & venenatorum animalium ictibus securè medetur.

Cruciata
Gentianella.

A similitudine quædam aliæ plantæ Gentianæ vocantur, vt cruciata minor & Gentianella, sed quòd earum vires aut nihil, aut parùm ad veram Gentianam accedant, vix in Antidotorum veniunt compositionem.

De Tormentilla. CAP. XIII.

TORMENTILLA quòd tormentum, cruciatumve dentium leniat, dicta, à septena foliorum partitione. Septifolium, Græcis Heptaphylon nominatur. Nascitur in locis vmbrosis, nemorosis, ac opacis: Surculos edit complures, tenues, imbecillos, humi procumbentes: folia singulis internodiis septena inter se inæqualia: flosculos luteos: radicem crassam, tuberosam, breuem, foris nigricantem, intus rubentem, cuius magnus & eximius est ad morborum periculis curacionem vsus.

Radix tormentillæ moderatè calefacit, insigniter siccatur, tertio nempe recessu, mediocriter astringit, putredini mirum in modum reluctatur, sudores mouet, pelli, & morbis venenatis efficaciter succurrit.

De Pœonia. CAP. XIII.

PÆONIA herba est insignis nomine, flore, viribus, multos stolones edens, pedum sæpè duorum altitudine, in summitatibus flores pulcherrimos eructans, vel rubres, vel ex albo rubentes, multiplices, amplos, & rosarum æmulos, unde rosæ D. Mariæ quibusdam vocantur.

Eius multa sunt differentiæ: Prima dicitur mas, quæ folia iuglandis nucis similia, sed ambitu minora & crassiora obtinet, floresque gerit non valdè rubros.

Secunda Smyrni modo folia diuisa & superiore minora gerit, ex obscuro virentia, surculos breuiiores atque omnia minora.

Pœonia fœmina dicitur, cuius duæ, pro flosculorum numero dignoscuntur differentiæ, vna polyanthos est, & rosarum modo flores gerit multiplices, alia simplex quæ simplicibus tantum comatur. Vtraque ex obscuro latè rubet.

Tertia videtur quasi neutra, vel potius promiscua, quæ scilicet vtriusque Ideam gerit & effigiem, neque planè rubra, neque candida, sed veluti pallida est.

Quædam nunc in multorum hortis cernitur prorsus alba & pulcherrima: Omnium tamen elegantissima est multiflora, cuius scilicet flos non reliquarum more simplex, sed polyanthos, ac multiplex datur.

Pœonia alba.

Alias quasdam vidi foliorum scissura, magnitudine, colore, necnon florum varietate non parum dissimiles, quæ a loco & cultura tales euaserunt.

Omnes ruberosas radices habent & multifidas, quædam tamen magis glandulosas: caules oblongos, folia diuisa, flores valde patulos, in summo caule filiquas amygdalis similes, in quibus dehiscen-
tibus, multa grana, parua, prærubra, cocci colore splendentia, acinis granatorum conformia inueniuntur, & in medio quædam nigra, lucida, medullosa, sapore medicato, acri, subastringente, cum non-
nulla amaritudine. Hæc omnia breuiter describo, ne in maiorem opus accrescat molem. Multa autem superstitiosa de pœonijs narran-
tur, quæ tanquam literis indigna, lubens omitto.

Pœoniarū
vires.

Radices pœoniarum maximè laudantur ad neruorum & cerebri rbbur, ad epilepsiam arcendam, sanandamque, & totum caput ro-
borandum.

De Rubia. CAPVT XV.



RUBIA à rubedine Latinis & Erythrodanum Græcis dicta, ramulis à terra prodit quadrangulis, asperis, geniculatis: foliis angustis oblongis, subasperis, ac ordine circum genicula in stellæ modum digestis. Flores in ramulorum summitatibus parui ac dilutè lutei hiant, post quos semen paruum ac rotundum emergit, primùm viride, dein rubens, postea nigricans.

Radices prolixissimæ sunt, numerosæ, flexibus multis humi spar-
sæ, foris, intusque rubentes, quibus lanæ & coria inficiuntur: Offi-
cinis rubia tinctorum, vulgo garensa nominatur. Sponte nascitur in locis vmbrosis & opacis, omnesque regiones fere scatent ipsa radice gustu amara, & anchusæ modo rubicunda, pellibus tingendis & inficiendis velleribus commoda, ob id à nostris infectoribus ex-
petita.

Vires.

Rubiæ radix vrinam & menstrua mouet, icterum sanat: Semen potum ex aceto lienem absumit: radix imposita menses, secundas, & partum trahit, & lichenas ex aceto illita curat.

De Oinone. CAPVT XVI.



NONIS, vel potius Oinone sic dicitur à vini colore, quem illius flos repræsentat: A Barbaris arre-
sta & resta bouis, à Romanis remora aratri, quod inter arandum, radices illius longissimæ & fibrosæ, boues aratrumque remorentur: dicitur & Acutella, à duris & acutis spinis, quibus transeuntes, qui eâ attingunt, pungere solet. Planta notissima est, in medijs agris & sæpi⁹ iuxta eorū margines nascēs, & maximè in solo pingui & glutinoso, vīnaxque supra modū, nā cū fūdū letū iuenit sese multū propagat, singulis annis nouos surculos eructans, qui in terram vici-

nam vagantur modo cultam & pinguem. Surenulos emittit breues, rigidos, spinosos, quos folia rutæ admodum similia, sed maiora & molliora in ferti modum coronant. Capitula exerit circinata, folia parùm hirsuta, gratum halitum spirantia, florem pisi, sed minorem & vnicolorem & purpurascentem.

Radix excafactoria & extenuatoria est, urinam mouet, calculos comminuit & pellit, obstructions tollit, menstruum quoque *Vires.* sanguinem pellit & ictero prodest.

De Eryngio. CAP. XVII.



ERYNGIVM & corruptè Iringium vel marinum est, ad loca nempe mari vicina latè germinans, folijs latis, angulosis, spinis durioribus circumseptis; vel campestre seu vulgare, cuius plures dantur varietates: quoddam enim dicitur planum, aliud pumilum, & à regione quoddam dicitur Hispanicum, Pannonicum, Alpinum, præter alia quædam spuria.

Folia vulgaris in varias secantur particulas, acuminatas ac spinosas. Caulis cubitalis est, ac ramosus, in cuius summitatibus capitella in globum coacta, muricato spiculorum vallo, in stellæ modum radiantur. Ex mediis capitulorum spinis horridis exeunt flosculi cærulei & interdum flauescetes, radix crassa longaque est, exterius nigra, interius alba, succulenta, dulcis, odorata.

A capitulorum indefinito numero multi centum capita vocant, rustici carduum lepusculum, & carduum volutantem. Planta enim integra marcescēs, vi ventorum euellitur, & per medios agros dum volutatur, currentem lepusculum eminus diceres. Falluntur qui eryngium secacul esse credunt, vt ex Serapione liquet, qui de vtroque diuersis capitibus agit, & diuersam vtriusque tradit descriptionem. Dicitur verò eryngium Arabicè *Astaraticon*, non *secacul*, aut *seeKaKul*, vires tamen habere pares ex doctiorum lectione constat quam ob causam secacul nobis incogniti defectu eryngium vulgare substitui potest.

Radix eryngii vim habet calefaciendi, meatus diducendi, vrinas *Vires.* & menses mouendi, arenulas ex renibus & vesica pellendi, & veneris languores proritandi.

De Gramine vulgari. CAPVT XVIII.



VM gramen ambitu suo plantam vniuersam, quæ folia & ideam segetum profert, amplexetur, non ita mirum, si eius 46. differentia à rei herbariæ peritis quibuldam enumerentur: Istud tamen solum quod Canarium vocatur, medicatum est, & à pharmacopœis seligitur; Reliqua omnia terram operiunt, vt pecudes potius alant, quàm hominibus medeantur.

Est autem Canarium, seu caninum gramen agricolis vt maximè cognitum, sic infensum, qui manibus & rastris segetes eo repurgant, alioquin mirè cùm sit ferax, pabulum tritico, vicinisque plantis surripit: Proserpit enim radiculis pluribus, geniculatis, viuacibus, quæ ad se totam terræ pinguedinem attrahunt.

Folia ei dura sunt, vt arundinis paruulæ lata, tenuia & acuminata, vnde gramen acuminatum & dentem canis mulierculæ vocant.

Vires. Laudatur gramen ad renum, aliorumque viscerum farctus liberandos, tum & ad lumbricos intestinorum enecandos. Radix verò ea potius præstat, quàm reliquæ plantæ partes.

De Glycyrrhiza. CAPVT XIX.



Dulcedine radice, tota planta glycyrrhiza, hoc est, dulcis radix & à pharmacopolis liquiritia dicitur. Nonnulli *αλκήμη* appellant, quod in ore retenta sitim sedet atque arceat.

Radix est fruticosa, longa, numerosa, humi sparsa, ex qua caules assurgunt altitrium sæpè cubitorum, foliis lentiscinis, densis, pinguibus, glutinosi tactu, ac gummosi, fraxinellæ similibus, floribus, purpureis & interdum albicantibus.

Succus glycyrrhizæ. Mense Iulio & aliquando citius fert siliquas paruas cicerculæ magnitudine. Glycyrrhiza à Theophrast. Scythica dici videtur, quæ scilicet Scythæ contenti sola vndecim & duodecim dies sitim tolerant, Eandem pueri habent in delitiis frustatim sectam & aquæ demersam vitreis ampullis pro siti sedanda: mox enim vt aquam ex infusa glycyrrhiza flauescens ebiberunt, aliam in lagenulam affundunt, agitant, iterandæ potionis causa. Ex glycyrrhizæ radicibus succus expressus & in pastillos cōdensatus ad nos singulis annis ex Cappadocia & Hispania, vbi frequens est aduehitur.

Vires. In omnibus qualitatibus temperata dicitur, ad calorem tamē magis accedit: Asperitates lenit arteriæ & vesicæ scabræ, tussi cōuenit, expectoratū mouet, & ad pulmonum, & thoracis omnia vitia utilis.



YCLAMINIS varia, multaque nomenclatio: Barbaris enim Arthanita, Officinis panis porcinus, quibusdam Tuber terræ, aliis malum seu pomum terræ, nonnullis Cissophyllon dicitur.

Nascitur in locis vmbrosis sub arboribus, in vepribus & sylvis multis. Circa initium Autumni floret: folia habet hederæ, angulosa, ambitu leuiter serrata, ex viridi purpurascentia, in quibus & supra, infraque maculæ plures albicant.

Est altera Cyclaminis species, cui lata quidem folia sunt, sed ferè nihil angulosa, & quasi rotunda, nec nisi obscure maculata.

Tertia agnoscitur, radice minore, flore magis purpureo & odore suauiore: eaq; nonnulli putât esse quâ Plinius Chamecissô vocauit.

Verni Cyclaminis insignes duæ differentiæ notantur; vnum albo flore, Alterum rubro: Autumnalis verò multæ, vnum dicitur Italicum, hederæ helicis folio, illud Burgundianum folio orbiculato, quoddam Creticum & odoratum, quoddam & Romanum folijs asari congruum.

Superfunt adhuc aliæ varietates multæ, quarum maximæ parti familiare est folia habere prona parte, rubentia, supina, maculis albicantibus variegata. Infitum quoque cyclaminibus radices habere tuberosas, fibris fultas subatris, flores pediculo longo extrema sui parte flexo cohærentes, ac velut inuersos, vel pallidos aut candidos, vel rubros aut purpurascentes pro diuersa singulorum progenie ac ortus varietate. Audio & quosdam flore luteo obseruatos, mihi tamen inuisos. Singulas species minutiùs describere nimis esset operosû, & forsan inutile, quando ad pharmacariam artem medici vix tres aut quatuor, præter duas à Dioscoride descriptas adducant; quarum prior hederæ folia habet, purpurea, varia, in quibus infra, supraque maculæ quædam albicant, caule breui; floribus purpureis, rosæ ritu; radice crassa, lata, ac tuberosa rapi modo. Altera species Dioscorides Cissanthemon, aut Cyssophyllon dicta folijs quidem hederæ, sed minoribus notatur: caulibus geniculatis & crassis proximis stirpibus capreolorum modo se voluentibus: flore candido & odorato radice superuacua nec aliarum more crassa, tuberosa & circinata, & ad medicos vltus rarò commendata. Præferuntur enim radices magis opacæ, crassæ, & succulentæ at rotundæ, tenuibus, longioribus & macilentis.

Vires multas, insignesque Cyclamen obtinet: nam potenter incidit, aperit, menses mouet, foetus etiam mortuos expellit. Ictero prodest, calculos eiicit, contra steatomata efficax, maculas omnes emendat, venenis aduersatur, menstrua & foetus potu & oppositu trahit. Aiunt si prægnans mulier radicem Cyclaminis transgrediatur, abortû fieri. Sed leuis coniectura sepè minùs credulos fallit.

Alię adhuc dux à recentioribus traduntur, à superioribus foliorum forma & magnitudine, florum & colore & inuersione differentes. Præterea quædam Vere tantum florent, aliæ Autumno, nonnullæ medio inter vtrumque tempore, vt solstitio æstiuo, quæ suauiter fragrant.

De Scilla. CAP. XXI.



SCILLA quod capaceo generi cognata sit, & locis calidis, arenosis, mari propinquis delectetur, vel etiam sponte proueniat, capæ marina jamdiu cœpit appellari. Qui enim intus & in cute scillæ & capæ anatomiam fecit, vtriusque eadem interanea, eademque segmina nouit. Multum tamen dissimilia, folia, flores, semina.

Scillæ foliis marcescentibus caudex assurgit cubitalis, è cuius medio, flores albidī fragrantia similes, in spicam circa fastigium desinētes, pullulant: hos sequuntur siliquæ breues, triangulares ac compressæ, semine nigricante, plano, ac paleaceo grauidatæ.

Diutissimè autem culmus floridus perstat, pro triplici florum exortu. Primo enim tempore bulbo propiores, tempus multum visuntur expansi, deinde qui medium sertum occupant; Tandem qui extremum. Mirum verò est, caudicem & folia simul viuere & virescere non deprehendi: nam caule tantum inarescente, folia erumpunt; his tantum marcidis caudex assurgit, contra reliquarum stitipium naturam, quæ primùm folia emittunt, deinde caulem proferunt; in scilla caulis prior erumpit, quam vllum folium.

Scillævires.

Meliteriū
est vas in
in quo mel
fuit repōi-
tum.

Scilla calefacit ordine secundo, & admodum incidentem facultatē obtinet. Præstat verò assam, aut elixam sumere, ait Galenus; sic enim qualitas eius vehementior castigatur. Commendatur ad cerebri & neruorum frigidos affectus, vt decet, parata; quomodo eam repurgatam, minutim sectam & in meliterio reconditam, ac quadraginta dies insolatam præparauit Galenus pro puero epileptico.

De bulbis. CAP. XXII.



BULBUS vel coronarius est, vel medicamentarius, vel esculentus: inter coronarios recensentur narcissorum, lilionarcissorum, seu Tulipparum & hyacinthorum penè innumeræ varietates; Inter medicamentarios scilla, hermodactylus, Pancratium, bulbus vomitorius, inter esculentos, qui etiam ad medicos, eosque eximios trahuntur vsus sæpè, porrum, ascalonium, & hi qui antomasia quadam regij dicuntur, omnibus præstantiores, & ad venerem stimulantem utiles, quique veteribus in frequentissimo fuerunt ciborum vsu pro quibus nunc cæpis & Ascalonijs tantum vtimur, quæ veri nobis bulbi sunt, eosque pollicentur & præstant effectus, quos veterum bulbi, similiterque describuntur, adeo vt in antidotis dum bulbi semen expetitur, cæparum vel ascaloniorum, escallotas vulgus nominat, semen vsurpari potest.

Bulbus
quid.

Bulbus autem dicitur radix quædam sapius corticosa, brevis, rotunda, membranis pluribus tunicata, quarum exterior omnium maxima, extra terram sæpiùs frondescit, omnesque simul coeuntes, capillamenta multa, seu radículas tenues producunt, quæ succum è terra conuenientem alliciunt in totius bulbi nutrimentum.

Frondes ei cæparum ritu teretes, angustæ, inanes in mucronem desinentes: cauliculi dodrantes, in quorum fastigio flosculi emicant purpurascens, quibus deciduis semen succedit exterius nigrum, album interius.

Cap. 200. l. 2. Bulbi omnes acrimoniam habent, inquit Dioscorides, excalfaciunt, Vires. venerem stimulant, multum alimenti suppeditant, inflationem pariunt, ob id veretri tentiginem excitant. Sed copia eorum largior in cibo vitanda, quoniam neruos tentant. Præ omnibus autem bulbis, libenter crederem, Satyrium stimulantæ veneri conferre, alios ignauius, nec nisi quia flatuosi sunt, ipsius ludibriis inferuire.

De satyrio. CAP. XXIII.



ARadicum effigie, plantæ quædam testiculi dicuntur, ab effectu Satyria, quod pronos ad venerem reddant, Satyrorum ritu. Inter bulbosas radices numerantur, quarum, quæ vnico bulbo raditur, propriè satyrium, quæ duobus, Cynosorchis, seu testiculus canis, quæ tribus, triorchis nominatur: cuiusque verò multæ differentiæ statuuntur, à forma bulbi, foliorum numero, florum colore & serie disposita sumptæ: Omnes tamen viribus affines & veneris amicæ. Verùm præ cæteris commendatur id, cuius radix vnica est, rotunda, mali magnitudine, exterius fulua, intus candida, ac

multa carne turgida, gustanti dulcis, & ori non ingrata. Ex ea tria folia emergunt, vnde trifolium aliqui nominant, ad terram depressa, lilij figura & colore similia, sed minora. Caulem pedalem erigit, flores paruos & candidos: huius radices præ alijs sunt eligendæ ad condituram, & pro vero Satyrio credendæ.

Vires.

Satyria condita analeptica sunt, & vtiliter dantur tabidis, atque his qui res venereas frequenter exercent. Tanta enim vi radix satyrij ad congressus excitandos pollere creditur, vt sola manu detenta venerem stimulet. Vnde Græci plantas penè cunctas libidinem irritâtes, satyrij nomenclatione designant.

De Porris, CAPVT XXIV.



PORRVM studiosissimè seritur in hortis culinæ dicatis: Planta enim vesca magis est, quàm medica, vt olitores & coci satis agnoscunt. Eius tamen succus interdum pharmacarijs remedijs vsurpatur, vt pulueribus pilularum fœtidarum excipiendis, & interdum empireumati extinguendo, vel potius educendo; licet enim calidus sit, mira vi, impressum caloris vestigium ad se alliciens, aufert.

Est verò porrum vel hortense, vel agreste, atque vtrumque duûm generum: hortense prius, dicitur capitatû, alterum sectium; illud quod radice constat cæparum modo rotunda, hoc quod longiore & frequenter secetur. Ex syluestribus vnum dicitur Schœnoprasum, quod folia gerit tenuia junci ritu, alterum ampeloprasum, quod in vineis & alijs multis locis sponte nascitur.

Vnius nempe capitati meminit Dioscorides, cuius scilicet caput, vel verius radix in latum excrescit & sese dilatat, quod vt facerent antiqui tegulam, aut silicem superponebant, atque ita crassescere comperiebant. Alij multi traduntur modi, quibus incrementum porris conciliatur quasi prædigiousum, sed hæc omnia rei hortensis cultoribus & scriptoribus relinquenda.

Vires.

Porrum omne calefacit insigniter, resiccat, extenuat, aperit, incidit, resoluit, serpentum moribus & vstionibus auxiliatur.

Eius semen tritum & ex passo, aut vino albo bibitum, vrinæ difficultates soluit, & meatus vrinæ dicatos diducit. Nonnulli scribunt porrum comestum venerem stimulare, & ebrietatem discutere, frequens tamen eius esus tumultuosos somnos facit, visui officit, & bilem æruginosam gignit.

De Raphano & rapo, seu Buniade.

CAP. XXV.



MAGNA est affinitas inter raphanum, rapum & rapistrum: raphanus notior est, quam ut longa verborum serie explicari debeat, nam infima plebecula eo admodum delectatur, & sese cum pane & pauco sale sustinet, atque omnibus fere gentibus non parum in cibatu placere video. Triplici verò discrimine notatur, alius enim raphanus, & dicitur maior, vitibus valde inimicus, alius minor seu raphanus minor, aliquando radícula fatiua, tertius raphanus niger dicitur, quem nonnulli raphanidem syluestrem, hortulani Reforum vocitant.

Rapum a tumente figura, Bunias, à rotunda gonzylon, vel potius strongylum, vulgò napus dictum, ex radice valde crassa, carnosa, tuberosa. alba, vix capillata, folia edit oblonga, aspera, viridia, profundis incisuris vtrique dissecta: caules bicubitales & ramosos: flosculos luteos, quibus siliquæ succedunt, seminibus brassicæ similibus sed minoribus prægnantes, quæ ad Mithridatij confecturam accedunt, cuius vis ad venenatorum morborum expugnationem summo opere commendatur.

Susplicantur verò nonnulli buniadem à napo vulgari distare, illiusque non huius semen ingredi mithridatij compositionem; Alterutrius tamen defectu, hoc, vel illud substitui potest.

Tria porrò naporum seu raporum dantur discrimina, à figura radicum sumpta; Primum orbiculatum, seu turbinatum, & breue est; Secundum crassum & oblongum, tertium minus & vulgare, quod vulgus absolutè napum nominat.

A soli & cœli conditione, ut magnitudinem, sic bonitatem acquirunt napi: Qui in agro Cadomeni fruticant, tam suaues & grati sunt ut omnibus aliis præferantur.


Rapistrum sylvestre quoddam rapum esse videtur non bulbosum, quod passim in a ruis germinat, foliis latis virentibus, laciniatis, floribus luteis, cuius semen mulierculæ nauetam vocant.

Alia est eius differentia folijs erysimi, lampfana dicta, ut & tertia quedam Erucæ folia gerens & flores candidos: Omnia verò semina parua, nigra, rotunda, siliquis inclusa proferunt.

Raphani crudi tantum mensis apponuntur & esitantur, napi non nisi cocti, Omnibus inest calefaciendi, aperiendi & vrinas mouendi facultas.

Virg.

De Anemone. CAPVT XXVI.



Herba venti.

Vires.

SUPRA de calefacientibus tantum egimus, quorum radices magis celebrantur, paucis aliquot exceptis, propter exceedentem calorem in huius sectionis initio descriptis, quorum inutilis radicum qualitas perhibetur: nunc de his: quorum alia potius partes veniunt in usum differimus, initiumque ducemus ab anemone, deinde cetera persequemur. Dicitur autem anemone aliquando herba venti, quod eius flos non nisi vento flante sese diducat & aperiat. Poëtatam fabellæ ex Adonidis cruore natam asserunt, unde & flos Adonis quibusdam dicitur. Eius duæ generales differentia traduntur, hortensis vna & altera sylvestris; atque vtriusque, præsertim hortensis adhuc multæ varietates agnoscuntur, florum colore & multiplicitate tantum distinctæ: quædam enim florem habent candidum, alia rubrum, alia cæruleum, nonnullæ phœniceum, alia rubellum, alia violaceum, alia ex herbaceo cruentum: quæ omnes ob florum præstantiam & pulchritudinem coronis tantum dicantur: Sylvestres verò pauciores sunt, & ad medicos usus magis requisitæ, ut ad confectioem vnguenti Martiati des. Myrepsi, in quo sylvestris anemone, præsertim ea quæ vulgo herba venti, & pulsatilla vocatur, debet usurpari. Earum autem omnium varietates cum eleganter pictæ & descriptæ dentur à celebribus viris D.D. Dod. & Clus. in illis longius describendis non immorabor.

Nam cum 26. inter se dissidentes Lutetiæ in horto Ducis de Sully & alibi sæpè notauerim, accuratam singularum historiam depingere, lectorem onerare est.

Qualitatem omnes anemone acrem habent, aperientem, incidentem, detergentem & exsiccantem.

De Keiri. CAP. XXVII.



KEIRI Mauritana vox est, leucoion luteum designans, perpetuò virens & frigoris patientissimum, contra reliquorum leucoiorum naturam, quæ adueniente Hyemis rigiditate citò marcescunt, nec nisi nouo semine sato renascuntur; violas excipio pumilas, tam hortenses, quàm incultas, quæ quotannis repullulascunt; in hoc herbariorum distinctionem sequutus, qui de vocum natura parùm solliciti, leucoia à violis albis distinguunt, licet leucoion proferentes, albam violam enuntient.

Vt autem violarum multæ sunt differentia, ut supra ostendimus, sic & leucoiorum, inter quæ, quod luteum florē gerit, nēpe Keiri vsibus

maximè medicis commendatur. Vbiq̃ue ferè nascitur & in macerijis, muris ædificiorum, vetustis rudibus, alijsque saxosis & aridis locis. Seritur quoque & lætè viret in hortis iuxta muros ac parietes. Caulles ei ramosi sunt, multi, rigidi, tenues: folia oblonga, angusta, ex glauco virentia, alijs cuiusvis leucij folijs minora, rigidioraque, flores lutei, odorati, suaues, siliquæ oblongæ, tenues, in quibus semè paruum, planumque coarctatur.

Ex floribus per infusionem paratur oleum, humoribus resoluen-
dis, frigidis doloribus sedandis & nervis roborandis idoneum. Semè
3 ij. pondere ex vino datum, aut cum melle subditum, menstrua, fœ-
tus, lochia & secundas educit. Idem efficit infusus ex florum deco-
cto institutus.

Viret.

De Thymo. CAPVT XXVIII.



HYMVM omnibus notum, inquit Dioscor. planta parua est, surculosa, exilibus & angustis folijs, quā plurimis vestita capitulis, in fastigio flosculis albes-
cētibus refertis. Eius duo sunt genera, primū dicitur Cephaloton, stoechadi multū simile, alterum ab eo distat, quod durius sit, perpusilla habeat folia, & flores non in capi-
tulis, aut spicis, sed iuxta folia. Datur & aliud exoticum Peruvianū dictum, quod minus surculosum & foliosū est, sapore minus acre, odore magis suaue, in reliquis, alijs simile.

Thymum calefacit, siccaturque tertio gradu, incidit, attenuat, men-
ses mouet, fœtum trudit, viscera expurgat, & à pulmonibus educit:
Oculorum claritati multū prodesse creditur.

Vires.

Sæpius verò in genere condimentario reponitur; nam culinæ eo
quotidie & viridi & sicco vtuntur.

De Serpillo. CAPVT XXIX.



SERPILLI duo genera traduntur, vnum hortense, quod maius est, magisque succulentum, cultu & solo pingui gaudens, alterum agreste, quod locis pet-
trosis, squalidis, siccis, sterilibus, & aruorum mar-
ginibus & collibus delectatur. Vtrique fere thymi facies, odor & sapor, & à serpendo nomen: humi
namque serpunt ramuli & inibi radices figunt, vbi terram attingunt.
Vulgari ac syluestri exiles & tenues sunt viticuli, folijs exiguis; thy-
mi similibus induti, duri, lignosi, quorum nonnulli palmi altitudine
assurgunt; alij procumbentes in terram fibras capillatas, seu radi-
culas demittunt.

In summatib⁹ capitula rotūda habēt, è quib. flosculi prodeūt ex albo
ubētes & purpurei, quorū vt & plantę totius odor grauis & suaui.

Inuenitur & in multis locis aliud serpillum maius & agreste, cuius cauliculi non serpunt aliorum more, & in Officinis pulegium montanum vocatur.

Hortense serpillum propter gratum & suauem halitum inter coronarias stirpes locum habet. Surculos emittit longiores, & crassiores, folia item latiora & habitiora, & capita flosculis maioribus coronata.

Vires.

Serpillum acre & calidum est insigniter, menses & urinam mouet, tormina ventris sedat, lethargo conducit, contra venenatorum animalium morsus valet, atque serpentes, dum vritur, suo fumo repellit.

De Sampsucho & Maiorana. CAPVT XXX.

Sampsuchum.

Maiorana.



AMPSUCHVM Dioscoridis maiorana non est, cum sit herba ramosa, per terram repens, foliis calaminthæ tenuifoliæ, rotundis & hirsutis; maiorana namque minimè repit, sed furculis multis, rectis asurgit in altum, nec foliis constat rotundis, sed mucronatis; attamen Sampsuchi penuria vsurpari rectè potest: Est enim planta viribus & facie valdè affinis illi, cuius gratiofus odor saporque efficit, vt sedulo in hortis & vasis figulinis alatur, & cura maiore conseruetur: hinc forsan maioranæ nomen, vel à Maro, vt sentit Dodoneus, adeò vt maiorana & marū, seu hysobriū vt ex Dioscoridea eius descriptione colligit, sint vnica planta; sampsuchum & amaracum altera, ex Dioscorid. & Theophrasto: Amaracus tamen Galeno Parthenium est, ex Dodoneo, sic non suo, sed alieno lapsu nominatum, cum re vera amaracus sit sampsuchum.

Marum.
Hysobriū.

Eorum verò nusquam admittenda ratio est, qui ad mari familiam Clynopodium referunt, quod vulgus Gallorum *mastic* nominat, cū inter se non parum dissideant: Nam marum Dioscoridi, herba est furculosa, flore origani, foliis multo candidioribus, eique vulgo cognita, & Origanis dicta: Plinio verò exotica planta est, nec inter vernaculas numerata. Clynopodium quod nonnulli Cleonicon, alij zopyron nominant, vulgare est, & serpilli simile.

Porro maiorana vel frigoris impatiens est, vel patientissima: hæc hyemalis dicitur, & inter niues medias innoxie viret: illa æstiuæ & algidioris brumæ cuiusdam occurso perit.

Maioranæ
vires.

Calefaciendi vim habet manifestissimam, cephalicam & hystericam: atque menses subdita, vel pota accelerat.

De Pulegio. CAP. XXXI.




V L E G I I duæ sunt differentia, vnum dicitur mas seu satium, verum & latifolium, alterum sylvestre & angustifolium. Vero pulegio abundè caules exeunt multi, rotundi, sæpè procumbentes, in altum tamen sese attollentes, folia è singulis geniculis bina exeunt subrotunda: flores subcærulei, circu-

latim culmos iuxta foliorum exortum circumdant. Suauem pulegium odorem halat, maximè cùm floribus ornatur. Eius odorem aqua vase vitreo, vt decet, stillata, seruat. Vt pulegium verum parum distare videtur à secunda Calaminthæ differentia, sic sylvestre à serpillio. Nascitur optimum in locis aridis, saxosis & montibus, vnde pulegium montanum & regale, quod officinæ multæ Clynopodium esse dicunt. Pulegium recens incensum pulices necat, vnde fortassis nomen. Ad pulegia autem plantæ multæ odoratæ referuntur, in quibus designandis vix authores conueniunt.

Vires.

Pulegium calefacit ordine tertio, valenter exsiccatur, attenuatur, menses & secundas mouet, pectoris pituitam digerit, coctiones iuuat, cõuulsis auxilio est, contra serpentum ictus ex vino confert, lienosis admotum medetur, & podagricis & comitiali morbo affectis prodest.

De Polio. CAPVT XXXII.



O L I V M capitulo quodam paruo in corymbi speciem coacto, hirsuto, tomentaceo & albescente, capillitium hominis cani similitudine quadam effingit, vnde nomen. Assurgunt ei ab vna radice surculi numerosi, tenues, duri, lignosi, rotundi, sesquipalmum longi: folia oblonga sunt, crenata, rigidiuscula, chamædryos affinia, sed angustiora, in ambitu ferrata, in virgularum summitatibus flosculi albida lanugine pubescentes, simul plures in capitula coacti: semen paruum, nigrum, oblongum.

Tota planta incaua est, in locis squalidis & montosis lætius vires, vnde polium montanum in pharmacopoliis nuncupatur, cui etiam Teuthrio nomen est, secundum Dioscorid. Grauem odorem spirat, sed non iniucundum, & ad medicos vsus sæpè adducitur.

Est alterum non vsque adeo valens odore & viribus infirmius, cuius etiam surculi rigidi sunt & rotundi, folia breuiora & angustiora. Flosculi multi, simul congesti, lanugine tenui incanescetes.

Alia duo recenset adhuc Remb. Dodon. Pena verò quatuor quæ hic inuestiganda relinquo, qui vniuersalem stirpium historiam describendam susceperunt.

Polium calefacit ordine secundo, siccatur initio tertii, Hydropicis, Vires. ictericis, lienosis medetur: vrinas & mestrua mouet, substratū, suffitūve serpētes fugat; vulneribus ad cicatricē perducēdis opitulatur.

De Ozimo. CAP. XXXIII.



OZIMUM planta cum sit odoratissima, hoc præ ceteris nomen iure sibi vindicauit, ne post hac minus aptè Ocimum vocitetur, quod pabuli genus est, teste Varrone, ex varia segete adhuc virente, boum causa, fieri solitum. Ob eandem fragrantiam, vulgus etiam basilicum, quasi basilica, seu regia domo dignum appellat; Ocimum tamen non malè dici credunt multi cum Pompeio, à nascendi celeritate, nam tertio à satù die & interdum ocyùs erumpere solet, traduntque nonnulli nimis superstitiosè, aut potius ridiculè lætius provenire, si cum maledictis feratur. Verùm significantius per z. scribitur ab *ὄζω*, hoc est, oleo, quia tota planta suauem efflat odorem, Mirum est quod de ozymo scribit Plutarchus, cuius nempe surculi sicci, aut paleæ tenues à succino expelluntur; cuiusvis autem alterius segetis festucae aut paruulæ stipulæ attrahuntur. Holerius Medicus Parisiensis rem notatu dignissimam narrat, de quodam Italo, cui ex frequenti odoratu ozymi, quod basilicam herbam nominat, scorpio natus in cerebro vehementes & longos dolores, postea mortem attulit: Lybies tamen asseuerant, si quipiam eo die, quo ederit ozimum, feriatur à scorpione, non posse lædi.

Quatuor autem ozimi perhibentur differentiæ, tria nempe satiuæ & syluestre vnum, Acinos dictum. Ex satiuis duo latifolia sunt, & vnicum tenuifolium, quod basilicum minus dicitur.

Vulgare ac latifolium cubitali profilit altitudine; surculosum est, ramulis teretibus, folio mercurialis, sed minore: flosculi ei interdum candidi, nonnunquam purpurascens: semen nigrum & pusillum, quod in syrupo de arthemisia D. Fern. vsurpatur.

Ozimum manifestè calefacit, flatus dissoluit, vrinas mouet, mœrores, quos atra bilis inuehit, mulcet, tristes exhilarat, timidos animat. A Crylippo tamen improbatur, vt quod stomacho & oculorum sanitati officiat & insaniam inducat.

De Origano. CAP. XXXIV.



VATVOR sunt origani genera: primum & commune dicitur Heracleoticum, seu Cumila; secundum Onitis, tertium syluestre, quartum, Tragoticum, cuius adhuc duæ narrantur varietates, quas breuitati studens fusiùs describere non libuit.

Verum autem origanum folijs & virgultis est maiori maioranæ simile, in summitate gerens vmbellam, non circinatam, sed in paruis thyrsis, spicatis, hinc inde congestis, media æstate adolescit, atque

Historia.

Ozimi vires.

Cap. I.
Lib. I.
de morbis
inter.

ut facie, sic odore, ad maiora accedit: verum hyemis sanitiā tolerantiū subit, nam inter nives innoxie viret: Brassica multum aduersatur & serpentum generi: quare testudines cum illis dimicaturæ origano sese muniunt, & contra frigida venena maximè valet.

Omnia origana calefaciendi, siccandi, incidendi, attenuandi & vrinas mouendi vim habent: purgationes fœminarum cient; peripneumoniacis & tussientibus ex melle in eclegmate & sorbitione fœliciter dantur.

De Mentha. CAPVT XXXV.



MENTHA cuique nota sit, etiam Dioscoridis testimonio, nam viuacissima cum sit, vbique faciliè germinat, vix tamen species eius omnes exactè describuntur, & sæpius confusæ menta, mentastrum, sisymbrium & calamintha designantur. Sic verò distinguuntur.

Hediosmos seu mentha, vel hortensis est, seu domestica & vera, vel syluestris, seu notha mentastrum dicta. Mentæ veræ quatuor sunt species, prima caules habet quadrangulos, obscure rubentes, aliquantum pilosos, folia subrotunda, flosculos subrubros, circum cauliculos orbiculatim natos: Radix illius, ut reliquarum serpit, nouos subinde turiones germinans. Primamēthe species

Secunda radice, folijs, odore, magnitudine priorem æmulatur, sed color magis ex rubro nigricat, & flores in ramulorum fastigijs spicantur. 2. species.

Tertia folijs constat longioribus & flosculis spicatim insidentibus. Quarta quoque folijs est oblongis & acutis, sed floribus subpurpureis, geniculatim cauliculorum internodia instar primæ conuestientibus. 3. species.
Quarta.

Præter has à rei herbariæ peritissimis connumeratas, aliam adiungit Mathiolus, quæ a Goritiensibus Mentha Græca, a Val. Cordo Sarracenica, a quibusdam herba D. Mariæ, à nonnullis saluia Romana. ab alijs Lassulata, a plerisque, *herbe du coq* gallicè nominatur. Mentha
Græca.

Herba D.
Mariæ.
Lassulata.

Planta est in hortis passim nascens, folijs maioris saluiæ, aut betonicæ, ex viridi albicantibus & serratis, caulibus cubitalibus & sæpè longioribus, in quorum fastigijs flores exeunt corymbacei, colore melino, tanacetum modo huius sapor amarus est, odor ut mentharum grauis, non tamen ingratus.

Mentastri, seu menthæ syluestris duæ sunt etiam species; Prima vbivis secus mœnia & scrobes urbium scatet, folijs maioribus, rugosis, leuiter crenatis, floribus spicatis. Secunda pratensis est, quæ viret aquosis marginibus, folia gerens hispida, incana, subrotunda; flores, ut prior, spicatos, vtraque grauis, nec odore insuauis. Mentastrum,

Vires.

Mentha in re cibaria utilis est, peculiaremque gratiam tenella

habet in acetarijs, adultior autem ut prædura, sic ingrata est. Natura manifeste calida est & eximie stomachica: Proprietate enim ventriculi calorem auget, robur firmat, coctionem iuuat, flatus dissipat, & tormina sanat.

Sisymbriū.

Sion.

cardamine.

Tanta verò est Sisymbrij cum mentarum familia cognatio, ut cultu aut neglectu inuicem transmutentur: Officinæ balsamintam nominant, vulgus mentam crispam. Longe autem distat à Sio, seu Berula, ut & à Cardamine, seu Crescione, quem Sisymbrium aquaticum vocant: Nam verum Sisymbrium, serpillum sylvestre multis dictum, mentæ hortensis admodum simile est, sed odoratius & latiore folio, viresque medicas habet insignes.

Dios.
cap. 155
lib. 2.

De Calaminta. CAPVT XXXVI.



ALAMINTÆ tres sunt species, prima montibus familiaris, secunda pulegio cognata, tertia mentastro. Prior quòd locis squallidis, tuberosis, montosis fecundius luxuriat, montana dicitur, propter tamen eius elegantem faciem & gratiosum odorem, nunc in hortis cicurata seruatur, ut mentæ omnes

quibus & viribus & nomenclatura utcumque respondet; nam calaminta pulchram mentam portendit, atque nominis iste complexus illius nobilitatem signat; in Officinis calamentum montanum nominatur.

Secunda calamintæ species, folijs regali pulegio similis est, sed aliquanto maioribus, albidis, variegatis masculis, floribus ex cædido purpurantibus, virgas cubitales amicientibus. Gaudet in locis apri- cis & expositis soli. Reperitur, & in multis aruis post segetem demessam. Vocatur quoque interdum nepeta, Dioscoride referente: à quo nec improbat, nec probatur hæc nominis usurpatio.

Tertia mentastro similitudine respondet, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quàm superiores, sed viribus est inefficior. Dodoneus pro hac tertia calaminta, Cattariam herbam exhibet. Fuschius aliam in multis dissimilem, & reuera Dioscoridis lectio vix ullam Cattariæ lineam describit: iustè tamen ad calamintarum familiam referenda, ut quæ illis sit cognata & viribus herba præstans, antiquis forsan ignota. Cauliculos edit multos, quadratos, duriusculos, folia marrubij incana, singulis nodis bina, flores in extremo spicatos, mentæ aut mentastri modo. Dicitur cattaria, quòd valde à cattis expetatur, qui eius folia iucunde & quasi lasciuiendo cōtrectant, & auidè depascuntur. Vulgus pharmacopœorū nepetā vocitat.

Insigniter calefacit & attenuat, peculiari dote conceptum iuuat atque vterum reddit fecundiores.

Vires.

Omnis verò calaminta essentia est tenui, calida & sicca in

tertio quodammodo recessu: Tormina sedat, lumbricos & ascari-
das enecat, icterum sanat, menstrua ducit, sugillata tollit, asthma-
ticis medetur, strenuè humores digerit, ad omnia autem efficacior
montana.

De Absynthio. CAPVT XXVII.



ICET absynthium herba sit, Dioscoride referente,
vulgo nota, in eius recensendis speciebus ac descri-
bendis, vix duo consentiunt. Relictis autem breui-
tatis gratia, opinionum varietatibus, dicimus tres
esse absynthii differentias, absynthium vulgare, ab-
synthium Santonicum, & absynthium Seriphium.

Falluntur verò qui vulgare aliud à Romano & Pōtico existimant, Absynthiū
Romanū.
quique Santonicum appellant absynthium Romanum: vulgare
enim Romanum est, sic olim dictum, quod fuerit plebi Romanæ sa-
crum, & quia in agro Romano, antiquisve ruderibus passim inue-
niatur: Ponticum verò & à Ponto & à stypticitate, seu astri-
ctione.

At quod Santonicum, vel potius Xantonicum appellatur, à Xan- Xanctoni-
cum.
ctonum tractu, vbi plurimum nascitur, id nominis sortitur: hinc
eius semen à nonnullis immutata voce sanctum, cū sanctonicum
dicendum esset, appellatur. Tota planta absynthio vulgari similis
est, sed minor, minusque candicans, seminibus non adeo multis,
floribus exiguis.

Tertium absynthium Seriphium, seu marinum dictum, copiosum
nascitur in monte Tauro, iuxta Cappadociam. Herba est tenuis, ab-
rotoni parui similitudine, referta seminibus minutulis, subamara &
grauiter olens cum quadam calefactione: Totaque adeo simillima
abrotoni fœminę vulgaris hortorum, vt non facile sit, vtramuis ab
altera discernere.

Absynthium omne aromaticam, suauem admodum, acrem & a- Vires.
maram possidet qualitatem, ait Galenus: Attamen vulgare quod-
dam in hortis multis inuenitur, minimè amarum, sed dulce, soloque
sapore à Pontico distinguitur. Omnia verò stomacho conferunt
roborando, coctionem iuuant, & alui lumbricos tam sumpta quàm
admota enccant. De absynthiorum differentiis & qualitatibus vi-
dendus est Dioscorides, vt & Bauhinus medicus Basiliensis, qui li-
brum integrum edidit de absynthiis.

De Artemisia. CAPUT XXXVIII.

ARTEMISIÆ species plures sunt duabus, contra multorum opinionem; nam præter vulgares, latifoliam vnam & tenuifolias duas, marina quædam est, quæ ab vna radice lignosa, pluribus fruticat sarmentis, foliis imis & humi ferè stratis. Et Ruellio & Fuschio si credimus, vt certè de re hac credere nefas, matricaria & tenacetum artemisiæ sunt species.

Omnes autem artemisiæ sunt sylvestres, quarum prior latifolia est, laciniosa, ac per margines dissecta, caules habens rectos, rotundos, striatos, bicubitales & sæpius longiores, flosculos exiguos, absynthij æmulos. Nascitur secus vias, & mediis interdum in hortis.

Secunda tenuior est flore paruulo, candido & graueolente.

Tertia tenuifolia quoque in sepibus & iuxta ductus aquarum nascitur, cuius flores & folia contrita odorem maioranæ vtcunque referunt. Vsurpanda vulgaris ad confectionem syrupi, qui ab ea nomen habet.

Ab artemisia regis Mausoli vxore sic enuntiatur cùm olim Parthenis diceretur, hancque superstitiosi multi herbam D. Ioannis vocitant, qua sacris illi diebus lumbos cingunt.

Vires.

Calefacit ordine secundo, aperit, attenuat, menses, secundas & fœtus pellit, & affectibus vteri multis auxiliatur.

De Melissa, seu Melissophyllo. CAPUT XXXIX.

QUA dulcedine & voluptate feruntur catti ad cattariam herbam, de qua supra, eadem apes ad apiastrum, seu melissophyllum, quasi folium melleum, vel citraginem, ab odore citri, quem refert, sæpè dictum. Eius plures videntur esse differentiæ: nam præter sylvestrem, quæ improprie melissa dicitur à Fuschio, cùm Cymices redoleat, vulgaris maximè celebratur, deinde Hispanica. Tum & aliæ magis peregrinæ, quæ à Molucis insulis aduectæ, Molucæ dicuntur.

Melissa nostras cunctis notissima, furculis quadrangularibus assurgit, foliis latis, rugosis, subasperis, citrium malum olentibus, binis prominentibus iuxta internodia, è quibus prodeunt exigui calyces, cum flosculis candicantibus, succedente postea semine minuto nigricante.

Hispanica, effigie, odore, viribus ei valde similis est, folia tamen minora, nec ita rigida sunt, ac virentia

Melissæ Molucæ duæ sunt, prior læuis dicta, altera spinosa:

utraque culmos, ac folia edit multa, melissæ nostrati non parum at-
finia.

Calefacit melissa ordine secundo, siccatur primo: in infestationibus Vires.
valet adducendos menses, & in potu, ac illitu contra scorpionum, pha-
langiorum & canum morsus conducit. Caput roborat, memoriam
auget, & facultates animales recreat.

De Prasio.

CAPVT XL.



PRASSII, seu Marubij duo sunt genera, vnum album
aliudque nigrum, quod *Ballote* vocatur. Vtrumque abs
radice ramosum, altitudine sesquipedali, ac iuxta parie-
tes & agrorum margines nascens. Candidum quod ma-
gis est in usu, caules edit quadrangulares, tenui pube
hirsutos: folia per intervalla bina, subrotunda, rugosa, ambitu in-
cisa & lanuginosa: flosculi ex calycibus emergunt exiguis, qui verti-
cillatim furculorum genicula circundant. Omne marrubium in ru-
derato solo prope collapsas ædes delectatur. Nonnulli marrubia-
strum seu marrubium nigrum albo præferunt; ego album nigro
cum peritioribus viris prætulerim.

Calidum est ordine secundo, siccum tertio: Obstructiones tollit, Vires.
pulmones expurgat, menses ducit, rupis conuulsis & neruorum cō-
tractionibus confert, daturque ad serpentum morsus & pocula ve-
nenata.

De Betonica. CAP. XLI.



BETONICA planè syluestris est planta, loca amans
opaca, nequaquosa; propter tamen eius dotes eximias, Betonica.
in hortis culta adolescit. Foliis emergit oblongis, latis,
virentibus, subasperis, in ambitu ferè modò incisis. Cau-
liculi tenues sunt, quadrangulares, aliquantùm hirsuti, ac cubitales:
flores fert spicatos, rubentes & quibusdam in locis albidos. Græcis
dicitur *κέρπον* & *ψυχοτρόφον* Latinis betonica; quæ vox ad aliam plan- Vetonica.
tam detorqueri solet, quæ vetonica altilis & tunix, à quibusdam
flos armerius, à Germanis, flos superbus nominatur.

Præter betonicam vulgarem, alia quædam latifolia multis in locis
reperitur, quæ cultu magis delectatur, atque in hortis latius viret.

Betonica calida & sicca est secundo recessu: vim habet cephalicam Betonicae
vires.
& alexiteriam: Quare morbo comitiali, comati, & morbis venena-
tis prodest, maximè verò demorsis à cane rabido & serpentibus, &
si quis hanc præsumpserit, lethale venenum haustum nihil nocebit.

De Veronica. CAP. XLII.



VERONICA duplici agnoscitur discrimine, vna dicitur mas, altera fœmina, elatine multis dicta. Illa Paulo Æginetæ betonica dicta, furculis pedalibus, crebris, hirsutis per terram serpit, foliis oblongis betonice minoribus, serratis & non nihil ad Teucrium accedentibus, sed exigua lanugine pubescentibus, flosculis ordine digestis, purpurascentibus; semine paruo, rotundo, nigricante, in calycibus loculi formam referentibus contento: radice tenui huc illuc diuaticata.

Veronica fœmina, multis elatine, nonnullis veronica repens dicta, furculis pedalibus, tenellis, flexilibus, lanuginosis, multis, foliosis, ab exili radice serpit; foliis ad nummulariam vulgo dictam accedentibus, incanis, pilosis, floribus pusillis, albidis, antirrhini similibus; semine exiguo, rotundo, nigro, anagallidis finitimo. Plurima nascitur inter segetes & in veruactis, atque locis sabulosis.

Agnoscent nonnulli veronicam quamdam surrecticaulem, quæ rigidioribus furculis sese erigit, tenuibus ramosis & foliosis, atque superiori valde similis.

Exit & in pratis, inquit Dodoneus, ac humentibus locis alia quædam veronica, effigie & magnitudine ad fœminam multum accedens, cuius tamen folia minora sunt, nec pubescentia, sed læuia & virescentia: viticuli per terram repentes; flosculi cœrulei; semen in theculis conclusum, paruum & nigricans. Huius vt & superioris, vel nullus, vel rarus in medicina vsus.

Vires.

Veronicam calidam & siccam esse sensus indicat, astrictoriam quoque & vulnerariam experientia docuit. Confert scabiei & omnibus cutis vitiis, atque vlcera & vulnera optimè sanat. Peculiari autem virtute cancerosis vlceribus conuenit, si non perfectè sanandis, saltem mitigandis. Falsum est quod scribit Fuschius Regem Gallie Elephantie morbo correptum, huius herbæ adiumento sanatum. Nullus enim Galliarum Rex hac fœda lue, vt nec peste correptus fuit vnquam.

De Dictamno. CAP. XLIII.



DICTAMNO cauliculi cubitales aut paulo breuiiores, in alas quasdam diuisi assurgunt, in quorum summitatibus velut spicæ squammatim compactæ dependent, floribus ex eorumdem interstitiis exeuntibus. Folia ei sunt rotunda, sed altera parte acuminata, multa lanugine pubescentia, ac pulegio admodum similia; sed alatiore. Laudatur maximè quod in Creta nascitur, & maximè quod in Dictæ, illius regionis monte à quo nomen. Græcorum nonnulli Belocon, hoc est, telorum remedium & Belotocon, quod infixæ spicula excludat vocarunt. Ceruæ enim sagittis confixæ ad dictamnnum accurrunt, cuius contactu, quasi partu quodam spicula excluduntur. Inde quidam dorcidium quasi ceruarum nuncuparunt, quod ceruæ illius vim omnium primæ demonstrasse creduntur. Ostenderunt & id capræ eo pastæ & vulneratæ, cito telis decidentibus. Folia verò dictamni tomentosa sunt, & flores ex violaceo nigricantes.

Aliud quoddam in multis locis, præsertim maritimis quibusdam, ut in littore Barofluctuensi in Normania inuenitur, illi foliis valde simile, quod pseudodictamnnum appellatur, sed flores habet verticillatim furculos ambientes, & vires quàm legitimum inefficaciores.

Dictamnnum & secundùm quosdam diptamnnum in qualitatibus primis calidum & siccum est gradu tertio, in aliis ac peculiaribus, veterum testimonio tela extrahit, intro sumptum venenum extinguit, pesti prodest, menstrua, fœtus & secundas excludit, lienem minuit, & strangurias sanat.

Vires.

De Stoechade. CAP. XLIV.



NIQUE stœchas Arabica cognominatur, cum vbique terrarum æquè bona vireat & vigeat & in Creta, & in Belgia, & Normania, ubi innoxie inter niues viuit, & in Stoechadibus insulis, à quibus nomen, vel à fastigio spicato.

Eius tres differentiæ notæ fuerunt Dodoneo, prima communis est & vera; secunda Belgica, parùm priori dissimilis, tertia folio est ferrato, Præter quas alia datur, cuius coma aurei coloris est, Elio-chryso similis, & chrysocome, seu stœchas citrina nostras vocatur. Hæc cauliculos edit admodum breues & tenues, folia angusta, incana & hispida: flores luteos, splendentes, bullis exiguis similes. Nascitur in locis asperis & arenosis, eiusque tres differentias Pena distinguit, de quibus, is videndus.

Vera stœchas caules emittit à radice multos, cubitales, tenues,

lignosos: comam in summitatibus spicæ modo angulosam, folia oblonga, lata lauendulæ minoris ritu, & similiter incana, flosculos in spica foliacea paruos, caruleos, odoratos, suauē halitum spirātes.

Vires.

Stœchas manifestè calida est, amara, moderatè astringens, plurimùm cephalica. Caput enim & faculrates omnes, præsertim animales recreat, humores frigidos discutit, mentem exhilarat, & omnibus capitis affectibus ab intemperie frigida natis conducit, & omnia viscera, totumque corpus roborat.

De Salvia. C A P. XLV.



ALVIA aut domestica est, aut sylvestris: Domestica, bina, maior nempe & minor. Vtraque Eleliphacos dicta, licet maior hoc nomine sola à quibusdam donetur: minor sphacelos ab hisdem vocata, ab alijs tantùm sylvestris, quæ etiam Bosci salvia nuncupatur.

Est & alia Cretenfis, baccata, figura, odore, sapore, nostrati valdè similis, cuius Pena meminit.

Salvia ramosus est frutex, ait Dioscorid. virgas habens quadrangulas, incanas & folia cotoneæ mali effigie, sed angustiora, asperiora, ^{Cap.} crassiora & magis albicantia. Flores in summis ramulis eminent ^{41. l. 3.} falcati, hormino similes, carulei.

Vires.

Salvia quasi saluatrix, vim habet cephalicam, nerualem, calefacientem, siccantem, aperientem, mentes & vrinas cientem. Minor autem, vt præstantior seligenda ad syrupi de stœchade confectio- nem, ipsius tamen defectum maior facilè supplebit.

De Hormino. C A P. XLVI.



ORMINVM vel satium est, quod scilicet cultu, satum & solo pingui delectatur, vel agreste, quod spontè in pratis & locis macilentis nascitur. Vtrumque notissimum ab vna radice caules emittens interdum multos, cubitales, præsertim satium & sæpè altiores, angulosos, subhirsutos: folia, lata, mucronata, aspera marrubij similia: flores iuxta folia furculos verticillatim ambientes, ex purpureo ad caruleum vergentes, & interdum albicantes & in quibusdam prorsus albos, arque ex pyxidulis erumpentes, quæ hiantes per maturitatem, deorsum spectant: Semen his includitur paruum, oblongum & nigrum, in sylvestri rotundum & fuscū.

Hormium & Orualla tam affines sunt plantæ, vt inter vtramque grauissimi viri & rei herbariæ peritissimi nihil discriminis constituerint: distingui tamen debere certissimum est, vt inter recentiores Mathiolus notauit. Dicitur horminum à verbo ὁρμῆν, quod eo vtētes

in venerem ruant; à nonnullis Geminalis nuncupatur. Orualla verò vulgò dicitur Tota-bona, aliquando Gallithricum, nonnullis Galli centrum, alijs Sclarea, quibusdam Scarlea, cuius quatuor varietates tradit Dodon. quas hîc speciatim recensere nostri non est instituti.

Hormino manifestissima caliditas inest: Eius semen cum vino potum venerem stimulat, oculorum albugines aufert, aquæ conuenienti merfsum mucaginem quandam eructat, quæ mira vi multis oculorum affectibus prodest. Syluestre autem viribus maioribus pollet.

Vires.

De Scordio. CAP. XLVII.



CORDIUM sic ab allij odore quem refert, dicitur. Planta furculosa est, humi procumbens, folijs è singulis geniculis, binis, oblongis, chamædri similibus, sed maioribus, ambitu serratis, molliusculis, hirsutis, inalbicantibus. E furculorum alijs rubentes exeunt flosculi, floribus vrticæ inertis, seu lamij valde similes, sed minores. Non solum quod in Creta prouenit laudatur, sed etiam quod in alijs regionibus offenditur.

Gal. cap. 24. lib. de antid. Miraculo proximum est, quod de scordio viri grauissimi scribunt, corpora nempe quæ cruëto genere bellicæsa mansissent humi diutius insepulta, quæcumque supra scordium forte fortuna ceciderant, multò tardiùs alijs computruisse, partesque cadauerum quæ herbam attigerant, fuisse prorsus à putredine vindicatas. Ob quam rem sanè persuasum est, inquit Gal. omnibus tam reptilium venenis, quam noxijs medicaminibus quæ corpus putrescere faciunt scordium aduersari. Vberrimè prouenit in locis palustribus multis, secus scrobes, ac loca concaua & humentia: Reperitur quoque in montibus multis vliginosis & pinguioribus.

Vires.

Ibid.

Calefacit, siccatur, à putredine conseruat, venenis resistit, pesti curandæ conuenit, & morbis contagiosis pluribus.

Contra serpentum morsus & lethalia venena vtilissimè bibitur; Expurgatque viscera, & menses & vrinam mouet.

De Ruta. CAP. XLVIII.



RUTER graueolentes herbas ruta numeratur, seu domestica, cuius vna solùm differentia agnoscitur, omnibus perspicua, seu syluestris, cuius plures dantur. Est autem ruta suffrutex bicubitalis, ramosus, furculosus, foliosus & semper virens, flosculos gerens luteos, à quorum occasu capitulum emergit quadrangulare, tot septis & loculis, quot angulis diuisum, in quibus semen continetur, quod in syrapi de Stœchade venit compositionem.

Dicitur autem ruta Græcè *ῥύχων*, quod eius præsicco spiritu & calore genitale semen are scat, aut extinguatur; vires tamen alias insignes, easque multas habet, quæ eius vsum valdè commendant, eamque plurimi faciebat Mithridates, in suo peculiari Antidoto, quo se à quibuscunque venenis tuebatur.

Antidotus
Mithrida-
tis quibus
constabat.
Rutæ syl-
uestres
quot.

Constabat 20. foliis rutæ, ficubus duabus, iuglandibus siccis duabus simul tritis cum grano salis.

Syluestris verò rutæ duæ præcipuæ differentiæ dantur, vna foliis, odore, & effigie hortensi similis est, vocaturque montana, quod in montibus fruticare soleat. Est & alia, quæ cùm rarissima sit & variè nominata, multorum in ea designanda exercuit ingenium. Dioscorides cap. 53. lib. 3. videtur eam *moli* nominare: Capite tamen sequenti moly describens, eius folia graminea facit, & radicem bulbosam, quod rutæ male congruit, ineptèque Cappadoces id nominis illi dedere. Syri vocant *besafan*, Arabes *harmel* & *harmalam*, quod nomen in Officinis pluribus pro ruta vulgari sumitur, vt rectè quidam defectu veræ harmalæ, quæ est secunda species rutæ syluestris usurpari potest.

Besafan?
harmel &
harmala.

Harmel de-
scriptio.

Ista harmala abs radice multos edit cauliculos dodrantaes, folia angusta, tenuia & oblonga, florem album & quinque folium, semen in calycibus rutæ hortensis modo, sed triangulis. Grauem spirat odorem. Nascitur in Cappadocia & multis Hispaniæ tractibus incultis.

Vires,

Calida & sicca est tertio ordine: attenuat, incidit, humores crassos digerit, & semen extinguit.

De ruta capraria nihil nunc, cùm sic improprie nuncupetur. De ea forsan diceretur conuenientiore loco.

De Lithospermo. CAP. XLIX.



LITHOSPERMUM sic ab eius feminis duritie quasi petreum semen dictum, folia gerit oleæ similia, sed longiora, hispida, asperiuscula, è virore nigricantia, furculos rectos, tenues, ligneos, asperos & hirsutos: flores candidos ex foliorum alis prodeuntes, brevibus pediculis innixos.

Flores consequitur semen paruum, rotundum, durissimum ac splendens, præsertim lucente sole, unde forsan milium solis in officinis nuncupatum.

Eius duo sunt genera, vultu & viribus paria, sola magnitudine dissidentia, præter quæ & alia duo agnoscuntur illis affinia, quorum usus tanquam inutilis, aut non satis expertus negligitur.

Milium solis calefacit & siccatur ordine secundo, vrinas mouet, calculos atterit & expellit, obstructions tollit, meatus aperit, & stranguriæ auxiliatur. Vires.

De Saxifraga. CAPUT L.



MILTÆ plantæ, multumque diuersæ, à facultate quam habent atterendi calculos, saxifragæ nuncupantur: Sic betonica saxifraga Galeno dicitur: sic Dioscoridi quædam herba ferulacea, & epithymo similis; sic & pimpinellæ, & aliæ multæ stirpes lithontrypticæ, Saxifragæ vocantur, vt & aliæ quædam, quæ non tam ab atterendis & comminuendis, qui in renibus, aut vesica continentur, lapillis, quam ab exortu in petris sic dicuntur, vt Empetrum, seu Crista marina, quæ saxa quasi findens, ex eorum rimulis prodit, & viuax diu fruticat.

Vulgaris autem saxifraga pimpinellæ valde similis est, præsertim maior, cuius folia variè sunt discissa & ambitu serrata: caulis cubitalis & sæpe altior, angulosus, striatus: umbellæ candicantes & semen quale apij hortensis, acre & feruentis gustus.

Est & alia minor, à superiore vix nisi magnitudine dissidens. Pimpinellam sola hirsutie à saxifraga differre multi scribunt: illa enim pilosa est, hæc glabra.

Ad saxifragarum familiam referuntur aliæ duæ, quarum vna saxifraga dicitur, quæ florem album gerit, altera aurea, quæ aureum. Saxifraga alba. Aurea. Vires. Maioris saxifragæ semen seligi solet & debet ad Benedictæ laxatiuæ confectionem.

Calida & sicca est evidentissimè; attenuat, incidit, digerit, expurgat, obstructions aufert, menstrua ciet, quæ in thorace glutinosa sunt, educit, urinam ciet, calculos atterit & pellit.

De *Aristolochia*. CAPVT LI.

Malum terræ.



Aristolochiæ varietates.

ARISTOLOCHIA dicitur, quòd puerperis conueniat, & earum lochia ducat: A multis malum terræ, quòd fructū ferat veluti pomum: peculiariter tamen hæc nomenclatio rotundæ datur: nam aliarum fructus est turbinatio.

Porro quinque Aristolochiarum differentiæ narrantur, longa, rotunda, Clematidis seu sarmentitia, Saracenica & pistolochia, seu Polyrhizon, quæ omnes caule, frondibus & flore adeo similes sunt, vt vix nisi à perspicatissimo distingui valeant.

Multis in Galliæ locis nascuntur iuxta vineas, marginesque aruorum ac sepium, læto ac restibili solo. Longa copiosa viret ad Sequanæ ripas.

Dioscorides Aristolochias tres tantum agnouit, longam, rotundam, & clematitim: priorem masculam vocat, secundam fœminam: illa quibusdam dactylitis quoque dicitur: Vtrique vires eximias tribuit, non modò aduersus animalia venenata, sed etiam ad ossium squamas & spicula extrahenda.

Vires.

Rotunda, quæ ad hieræ Pacchii confectioem accedit, calefacit, siccaturque potenter: Ad venena, asthma, singultum & lienem prodest, & quæ à partu relinquuntur attrahit, vnde Aristolochiæ nomen: Remorantes enim puerperis secundas valenter ducit, & menses suppressos mouet.

De *Asaro*. CAPVT LII.

ASARVM à quibusdam vulgago, ab aliis Perpenſa & baccharis, sed malè dictum, in Officinis asarum cum Græcis & Latinis nominatur. Folia gerit colore & magnitudine hederacea, sed non acuminata, imo rotunda, vel magis oblonga, nec perfectum circulum constituentia, & auriculæ signaturam, vt loquuntur Spagyrici, referentia, quam cum iactaret Riuius Empyricus, ex eo quæ fuit Medicus Parisiëſis doctiſſimus, An asari folia morbis auricularum sanandis optima & determinata: Sed neque plantam, neque partis proprios affectus illum vnquam nouiſſe, ridicula ipſius reſponſio patefecit. Flores autem asari exigui ſunt, ſub ipſius foliis latitantes, purpuſcentes, hyoſciami citrini ſimiles, ſed minores, in quibus ſemen paruum, anguloſum & aliquantum aſperum continetur. Radices multæ ſunt, tenues & graciles, oblique diffuſæ, & ſibi inuicem implicatæ.

Vires.

Radices asari vim habent excaſfactoriam & exſiccantem, vt etiam folia, ſed imbecilliorẽ. Urinas & menses promouent, vomitum

excitant, & crassos, pituitososque succos expurgant. Valde profunt ad iecoris & lienis infarctus & scirrhosos tumores, vnde vino maceratæ vtiliter dantur iëtericis & aquis cutem subeuntibus.

De Pimpinella. CAP. LIII.



PIPINELLA, seu pimpinella à nonnullis inter saxifragas numerata, duplex est; vna hortensis quæ feritur & cultu delectatur; altera sylvestris, quæ in pratis & aliis locis pluribus incultis viret. Vtraque saxifragis in multis conuenit, non tantùm facie, sed facultatibus quoque. Nonnulli penonellam, alii bipennulam, alij Sanguisorbam & sanguinariam appellant. Sunt qui nomine compositissimo Dionysionymphadem nuncupant, quòd in vinum coniecta suauitatem quamdam satis gratam inter bibendum conciliet.

Celebrior est hortensis, quàm sylvestris vsus. Vtrique folia oblonga sunt ex pluribus ad vnum pediculum congesta, quorum singula subrotunda, per ambitum ferrata, aliquantùm hirsuta: caulis cubitalis est, & sæpè longior, quadrangularis, & nonnihil striatus, & ramosus: atque in singulorum cauliculorum summitatibus capitula erumpunt rotunda, foliolis oleraceis velut squamulis, simul & flosculis compacta, quæ nonnunquam ante flosculorum ortum & post occasum, fructum mori effigiant. Includuntur semina multa, angulosa, fusca.

Radix subest longa, sed non multùm crassa, & dura & inutilis.

Pimpinella calefacit siccaturque initio secundi recessus: peramica est partibus, quæ principatum tenent, cordi, hepati, & aliis visceribus: Sanguinem puriorem efficit, renes purgat, calculos & saburram eiicit, à cane rabido demorsis auxiliatur, & febribus malignis ac pestilentibus conducit.

De Chamædry. CAPVT LIV.



HAMÆDRYS nascitur in petrosis & asperis locis: Suffruticula est dodrantalis, folia gerens parua quernis simillima, vnde Chamædryos, seu querculæ nomen.

Vocatur & Trislagos, & aliquando Teucrium, malè tamen, propter effigiem Teucrio affinem. Huic nullas Dioscorides substituit species, multas tamen neoterici agnouerunt, quæ magna cognatione illi congruunt; Nam Fuschio duæ dicuntur mares, & totidem fœminæ, Dodoneo duæ repentes, & assurgentes totidem, quarum postrema tantùm illi dicitur sylvestris, cùm & omnes sint sylvestres.

Chamædryos calefacit & siccatur gradu tantùm secundo, viscera in- Vires.
Cap. farctu liberat, menses educit, aliisque vrentem multis beat commo-
12. l. 3. dis, de quibus videndus Dioscorid.

De Chamæpyti. CAP. LV.

RES veræ chamæpyteos differentias statuit Dioscorides, quibus adiungit tres alias spurias Dodon. Prior dicitur Aiuga, vel Abiga, ab abiete, propter pinus odorem.

Foliis est semperviui minoris, sed multò tenuioribus, pinguioribus, hirsutis & circum ramulos densis: flore tenui, ex luteo albicante. Vocatur & Iua arthritica, quod arthriticis doloribus sanandis conferat. Secunda cubitalibus est ramis, prætenuibus, incuruis, flore candido, semine nigro, paruulo. Tertia chamæpythis mas dicitur. Paruula est, foliis exilibus, candidantibus, hispida, cauliculo aspero, flosculis luteis, & semine iuxta alas. Omnes pinum redolent, nulla moschum, ut credunt nonnulli.

Vires.

Chamæpytis vim habet aperiendi, calefaciendi gradu secundo, siccandi tertio: morbo regio & vrinæ difficultatibus prodest, menstrua mouet, aduersus scorpionum ictus confert, nervos roborat, ischiadi & aliis doloribus arthriticis conducit.

De Parthenio. CAP. LVI.

ARTHENIUM diximus supra Artemisiam non esse, nunc esse matricariam fatemur, non cotulam fœtidam, ut à perito viro quodam assertum audio. Est verò parthenium, ut posuit Dioscorid. foliis coriandri tenuibus, variè incisis, ambitu crenatis; flore per circuitum albo, intus luteo, chamæmeliritu, odore viroso, amaro sapore. Radix quamplurimis fibris scinditur, tenuibus, duriusculis, totaque planta diluto colore viret, & cuius notissima.

Matricaria Officinis dicitur, quod mulieribus matricis suffocationibus obnoxiiis, & aliis ab ea ortis affectibus multis salubriter medeatur. Eius duæ dantur varietates, vnum simplici flore, quod vulgare est, alterum pleno, seu multiplici quod in hortis ob elegantiam alitur, & nisi in solo pingui feratur, & cultu foueatur in simplex degenerat. Aliud ab Alpibus ubi copiosum & sponte prouenit, nomen habet, Alpinum dictum, quod odore & facie priori multum respondet, minus tamen est, flores simplices perpetuò gerens, & umbellatim congestos.

Parthenium calefacit ordine tertio, secundo siccatur, aperit, incidit, expurgat, menses, secundas, fœtus mortuos potenter educit.

Vires.

Pro parthenio igitur matricaria sumenda est, non cotula fœtida, nec parietaria, nec mercurialis, quæ malè secundum quosdam hanc nomenclationem usurpant.

De Hyperico. CAPVT LVII.



YPERICVM vulgò perforata & millefora dicitur. Planta est furculosa, cubitalis altitudinis, folia gerens mirthinis equalia, sed tenuiora, molliora & magis flauescientia, ac innumeris poris & tanquam foraminibus peruia: flosculos luteos in furculorum summitatibus, ex quinis foliolis aureo nitore col-
luscantes gerens, staminibus exilibus in medio concoloribus, quibus tabescentibus erumpunt silique parua & oblonga, minutis grauidata seminibus, quæ confricata resinam olent. Hæc planta vix probabili ratione quibusdam fuga dæmonum vocatur.

Radix eius duriuscula est, multis fibris & capillamentis sulcata, flores & folia intrita succum quemdam cruentum exprimunt, & flores oleo macerati idipsum cruore sanguineo tingunt.

Confert Hypericum mensibus & vrinæ ciendis, & vulneribus optimè sanandis; Ischiadicis medetur, neruorum affectibus conuenit: calefacit, & siccatur, neruosum genus roborat, & vtiliter medicamentis vulneribus dicatis admiscetur. Vires.

Multi Ascyrum & Androsæmum cum hyperico cōfundunt, quòd sint plantæ congeneres, multum tamen inter se vultu dissident, suntque diuersæ stirpes.

De Androsæmo. CAPVT LVIII.



ANDROSÆMVM sic dicitur, quòd foliorum & granorum succus sanguinem humanum referat. Planta est fruticosa, ac ramosa, furculos multos, tenues, rubentes emittens, foliaque lata, mucronata, hederæ satis similia, sed tenuiora & lætiùs virentia, quæ trita vinoso succo manant, ait Diosc. complures alas habet in fastigio vtrinque expansas, pinnatasque: circa quas pusilli flores & lutei. Semen profert in calycibus paruis, velut papaueris nigri. Illius trita coma resinofum spirat odorem.

Spontè prouenit in multis Northmāniæ syluis & aliis locis incultis, eiusque folia mulierculæ colligunt, & pustulis quibuscumque, furunculis, & omnibus ferè cutaneis affectibus adhibent, frequentissimè optato & fœlici successu: Experientia enim norunt parti cuiuslibet admotum vel benefacere, vel nunquam obesse.

Androsæmum calefacit, siccatur, agglutinat, sanguinem compescit, ambusta sanat: ischiadicis prodest, vulneribus cohibendis, vlceribus carne implendis & ad perfectam curationem ducendis confert. Semen tritum & ʒ ij. pondere sumptum, biliosa alui excrementa per secessum ducit. Vires.

De Melanthio seu nigella. CAPVT LIX.



NTER Melantheriam & Melanthium non parum est discriminis; Nam melantheria minerale quoddam est Mysio congener, Melanthium verò seu Gith, & in officinis Nigella, stirps est, quæ fruticis instar assurgit, ramulis tenuibus, folijs coriandri ritu minutim incisis, floribus in virgarum fastigio candidulis, interpositis pluribus cirrhis, & staminibus, tanquam virentibus capillis, quibus capitula succedunt quadrangularia, supernè corniculis prominentibus & reflexis armata, membraneis septies distincta, ac nigro semine, anguloso, acri, odorato grauidata.

Est aliud melanthium satium, à semine citrino, citrinum dictum, priori, si semen exceperis, prorsus simile.

Totidem sunt & sylvestria melanthia, quæ inter segetes nascuntur, satius valdè similia; Præter quæ aliud Pseudomelanthium est, quod inter cerealium numeratur.

Prior melanthij species in officinis Nigella Romana vocatur, licet Romæ pauca sit: in hortis verò Germaniæ multis, multa.

Vires,

Potenter calefacit, siccaturque, lumbricos interimit, menses mouet, orthopnoicos iuuat, flatum dissipat, & morbis ab utero multis opitulatur ac benefacit.

De Hyssopo. CAP. LX.



HYSSOPVS nulli non cognita, inquit Dioscorid. herba *Cap. 26. l. 3.* est fruticosa, pedali longitudine, folijs satyriæ, aut thymi, sed longioribus, latioribusque: floribus cæruleis, thirso spicæ modo vestientibus, radice longa, dura, lignosa.

Est verò duum generum, montana vna, quæ sponte fruticat in locis aridis, altera hortensis, quæ seritur & colitur culinæ gratia, quibusdam namque esculentis gratissima est, & iuscula, si modus adsit, delectabili saporis & odoris suauitate commendatur.

Vires.

Utraque desiccatur & calefacit ordine tertio, minus tamen hortensis agresti, & ea præsertim, quæ flores albos gerit, quæ in multis Angliæ & Galliæ locis prouenit, adhuc minus calida, siccaque existimatur. Eius facultates pluribus perstringit Dioscorid. lib. tertio, ut etiam Galen. & Mesue. Omnes autem fatentur, plurimum tussi diuturnæ, *Lib. 8. simpl.* suspiriosis, destillationibus, & Orthopnoicis auxiliari.

De Geranio. CAPVT LXI.



DIOSCORIDES duo tantum geranii genera facit, Mathiolus tria, tertium ex Plinio mutuatus, Fuschius, sex, Dodoneus octo, præter alia à Fuschio descripta, quæ paucis attingit.

Primum furculos emittit à radice subrubentes, admodum lanuginosos: folia anemones, diuisuris pluribus longioribusque secta, flores rubellos, quibus decidentibus emergunt in virgularum summitatibus capitula, quæ gruum, aut ciconiarum rostella, acus longitudine, vtrumque referunt, vnde recentiores modo rostrum gruis, modo ciconiæ, modo acum pastoris nominant.

Alterum furculis paruis, pilosisque, sesquipedem longis, folijsque maluaceis, sed candidioribus prodit, floribus purpureis, In summitatibus, capitellis gruum instar, rostella tenuia educuntibus. In errore versantur, qui amomum esse dicunt.

Tertium furculos erigit, pedales, geniculatos, incanos, hispidos, odore ingratos, folia Chærephylo finitima; flores rubellos, capitula ciconiarum modo rostrata.

Tota planta euidentissimè rubet, vnde Ruberta olim vocata: nunc Rubertiana, & aliquando Robertiana, & herba Roberti nūcupatur.

Quartum folia quoque laciniata, rubentia, & flores purpureos gerit, capitulaque rostrata, vt superiora.

Quintum batrachoides dicitur, quòd folia ranunculo similia pro-
mat, flores magis patulos, subcæruleos, rostella alijs affinia. Hoc duplici agnoscitur discrimine, vnum maius, quod cæruleos flores, alterum minus quod rubellos eructat.

Sextum ramulos pandit tenues, lanuginosos, folia tenuia, in lacinias diuisa, flores in summitatibus purpureos, quibus rostella prædictis similia succedunt.

Est & geranium tuberosum, sic dictum, à radice crassa, nodosa, tuberosa. Multis luxuriat furculis rotundis, folijs ad anemones effigiem accedentibus, in multas lacinias diuisis, floribus in cauliculorum fastigio rubris, patulis, pulchris, paruulis rosis similibus.

Præter hæc adhuc alia numerantur, vt montanum quoddam, vt Scandix, seu pecten veneris, pes columbinus: Atque aliud percelebre, quod ab odore moschi, quem apprimè refert, geranium moschatum nominatur. Quod in multis Normaniæ locis præsertim maritimis lætè viret & suauiter olet. A nonnullis herba camphorata dicitur sed malè quandoquidem camphorata ad chamæpythim accedit, & chamæpeuce videtur esse. Attamē arbrotonū camphoratam à nonnullis dici comperio, nam cāphoræ halitū vtrūque spirat.

Herba Roberti.

Geranium moschatū.

Defectu Camphoratæ sumendum est geranium moschatum ad vnguenti martiati confectionem: Si vtrumque defierit, prima geranii species sumenda, quæ vbique reperitur.

Omnia gerania virtutem non fortiuntur eandem. Moschatum calefactoriam vim habet nerualem, discussoriam: Rubertianum deterforiam quoque & vlceribus accommodatam.

De Doronico, & Damafonio. CAPVT LXII.



DORONICI Mesueo, Actuarius Carnabadium est, nobis Doronicum Romanum vulgare, forsan Paulo Mamiras, Mathiolo ineptè Aconitum Pardalianche: Qui vt suam de eo opinionem fulciret, in cane periculum fecit, quem illius esu miserè periisse profitetur. Ego præter grauissimorum virorum auctoritatem, experientiam adhuc oppono: Illius namque multam cani quantitatem dedi, quam innoxie & auidè esitauit: Singulis quoque diebus tantùm abest, vt periculosè, imò fœlicissimè datur, & in decoctis, & electarijs cordialibus, vt de Gemmis: Et clarissimus vir Contr. Gesnerus refert, se doronici radices, melle conditas, sæpè ingessisse, atque harum contritarum aliquando dragmas duas ex aqua hausisse, & ægrotis sæpè illam radicem, & per se, & aliquando mistam medicamentis vtilissimè consuluisse.

Et licet Mathiolo detur, quod non, Doronicum canes interficere, non propterea sequitur, hominibus esse lethale: Differt enim natura à natura, alimentum ab alimento, inquit Hippocrates: Aloë enecat vulpem, non hominem; Nux vomica feles & aues multas, nobis est salutaris medicina. *lib. de flatib.*

Non est igitur improbandum Doronicum tanquam venenum, quod aliqui laudant, si non tanquam aroma, certè vt alexiterium: Qua forsan vsurpatione videtur à Mesueo institutum in Electario de Gemmis; ei siquidem inest theriacalitas, inquit Auicenna. *Tréta.*

Est autem Doronicum planta admodum pusilla, cui teneri sunt caules, folia mollia, oblonga, vt plantaginis, ex viridi vtrumque flauescencia, hirsuta, pilosellæ, ritu, & ambitu rotundo, nonnihil laciniato & parum acuminato: Radices exiguæ, rotundæ, orbiculatæ, in extremo sensim in angustum adductæ, quæ scorpionis corpus & caudam non malè referunt: color albidus: Sapor dulco-amarus & parum astringentior: flores in summo latei, & radiati buphthalmi ritu. *de med. cord.*

Nonnulli tres tantùm Doronici agnoscunt varietates, ferè sola magnitudine discrepantes. Clusius septem enumerat, inter quas Damafonion, Alisma aliis dictum, comprehendere non malè videtur; Optimaque ratione credunt authores classici radicem Damafonij pro

radice Doronici vulgaris sumendam esse in confectione electarij de gemmis, & aliis compositionibus cardiacis : Nam ad venena vel
cap. 69. inflicta, vel ingesta commendatur radix Damasonij à Dioscorid.
lib. 3. proin melius dictis coniectionibus permiscetur, quam Doronicum de cuius viribus alij dubitant, alij non tanta pollicentur.

Est autem Damasonium effigie Doronico non parum simile, folia gerens plantaginis, sed angustiora, laciniosa, & in terram conuexa: caule tenui, simplici, cubito altiore : flore ex albido pallescente: radicibus tenuibus, acribus, odoratis, & ad venenata conferentibus.

Doronicum accedit proximè ad tertium caloris & siccitatis gradum, vteri flatus discutit, cordis palpitationi prodest, venenosis & pestilentibus morbis confert & serpentum morsibus.

Vires.

De Carduo benedicto. CAP. LXIII.



TRACTYLIDIS, quæ Cnici syluestris species quædam est, duæ sunt differentiae : prior quod recta assurgat recticaulis dicitur; Secunda quod surculis aliquantum humi stratis procumbat, straticaulis, & vsitatiore & conuenienti nomine, Carduus benedictus dicitur. Planta est omnibus cognita, cuius caules teretes sunt, obsequiosi, brachiati, humi accumbentes : folia vtrinque laciniata, subspinosa : in singulorum surculorum fastigiis capitula, spinosis foliis, aculeisque pungentibus stipata, ac muricata, vnde Acanacia dicta, molli lanugine & semine oblongo, fusco, velut pilis barbato, turgida. Flos ex luteo pallescit; Radix pro ramorum & foliorum numerosa mole parua, albida & in fibras diuisa.

Carduus benedictus ob insignem amarorem calefacit, cor & partes vitales roborat, sudorem mouet, venenis resistit, pestilentibus morbis confert, renum ac laterum dolores mitigat, lumbricos ventris interimit, & contra serpentum morsus valet.

Vires.

De Cardiobotano, seu Cardiaca. CAP. LXIV.



MYRERSVS ad Martiati vnguenti confectionem ponit Cardiobotanum, Nic. præpositus Cardūcellum quid verò sit vtrumque facile non est diuinare: Nonnulli pro Carducello chamæleonem album, non aculeatum; pro Cardiobotano, carduum benedictum sumunt; Alij Cardiacam, seu Agripalmam.

Dicitur verò Cardiaca ab effectu; Ad cordis enim affectus conuenire creditur: Mirum tamen, quomodo tanta halitus insuauitate, cor lætificet, quod suaueolentibus vnicè delectatur. Est autem cardiaca, seu agripalma (sic enim sepè nominatur) plâta cubitalis, rarò enim bre-

uior est, altior sæpè quadrangulos caules proferentes, duros, crassosque ex nigro rubentes: folia lata, obscurè virentia, ad vrticam accedentia, laciniosa, profundisque incisuris diuisa: flores paruos ex purpureo candicantes, verticillatim surculos ambientes, & ex calyculis exeuntes. Nascitur locis incultis, lapidosis, asperis. Nonnulli melissam esse dicunt: Alij Syderitidem Herculanam.

Vires.

Calida & sicca est ordine secundo: Abstergit, expurgat, ventris lumbricos interimit, obstructions tollit, conuulsis prodest, & cordis affectibus medetur; minimè tamen cardiacam esse fœtor illius portendit.

De Chameleone Nigro. CAPVT LXV.



CARDVORVM penè innumeræ sunt varietates, ad quas refertur Chameleon vterque, albus videlicet, nigerque. Albus ferè sine caule est, & è mediis foliis per terram stratis, latis, longis, cynaræ finitimis, caput echinatum promit. A multis non sine ratione pro Carducello sumitur.

Niger verò Vernilago & Carduus niger Romanis dictus, caulibus assurgit crassioribus, altioribus, foliis longis, latisque, vtrinque profundis sectionibus diuisis. In summitatibus erumpunt velut glomeruli multi, in vmbellam coacti, flosculis pluribus micantes. Radix valde crassa est, exterius nigra, interius flauescens, gustu valde acris.

Vires.

Radix chameleonis nigri malignæ cuiusdam qualitatis est participes, nec vnquam sumitur intra corpus; Exterius verò sæpè & tuto adhibetur, præsertim aliis mixta medicamentis, vt in Emplastro Tonforis videre est. Aliorum enim simplicium concursu, retunditur illius feritas, & quibusdam postea affectibus effectus salutare pollicentur, vt Ischiadi & pluribus cutis infectionibus.

De Cynara. CAPVT LXVI.



CYNARIS est notitiæ Cynara, Scolymos Græcis dicta, cuius potissimum duæ constituuntur differentia: Altera enim sic dicitur simpliciter, seu Articaulis, Altera spinosa & Hispanica, quæ è genere carduorum est, inò vtraque ex eorum tribu deprompta, sed cultu & arte lætiorē faciem & saporem gratiosum adepta.

Cynaræ folia longa, lataque sunt, & incisuris profundioribus vtrinque laciniata, colore cineritio albicantia, vnde forsan Cynaræ nomen: Surculi bicubitales sunt, in summitatibus fructum foliis

Lib. 2.
de alim
facult.

triangulis, crassis, duris, medullosis, squammarum instar compactum, pini cono similem proferentes. Fructus hic tamdiu coctus, ut mollescat, esui gratus est, vulgò pomum articaulis vocatur: Non tamen adeò rebus venereis inseruit, ut plerique autumant. Parum enim materiæ genitalis, & flatulenti spiritus dat corpori, succi melancholici plurimum, Galenus. Flores ex tenuibus & innumeris staminibus conglomerati eleganter ex cæruleo purpurascunt, qui senescentes abeunt in pappos, remanentibus seminibus parvis, oblongis, ut carduorum. Cynaræ spinosæ vultum gerit Scolymos sylvestris, seu carduus coagulatorius. Caules tenelli Cynaræ (quam multi Articocum & Articocalum vocant) saccharo conditi esui grati, & in obsoniis celebrati.

Cynara Galeno edulium est pravi succi: Calefacit ordine secundo: biliosum & melancholicum succum generat, urinam mouet: Radix eius ex vino cocta & pota, graueolentiam alarum, & totius corporis per vesicam vna cum lotio pellit.

Vires.

De Phu, seu Valeriana. CAPUT LXVII.



Hu, quod nonnulli referente Dioscor. sylvestrem nardum appellant, Plinius Nardum Creticum, Valeriana est, quibusdam Marinella dicta, cuius quinque nascuntur & noscuntur varietates; Prima dicitur mas, Secunda foemina, Tertia parua. Quarta rubra, Quinta Græca.

Prior sola Dioscoridi nota, caulem promit cubitalem, & sæpè altiozem, geniculatum, concavum, interuallis rarioribus articulatum: folia ei oblonga, lata, læuia, virentia, sinuata Elaphobosci foliis admodum similia, bina è singulis furculorum geniculis exeuntia, flores pulchelli, parui, umbellatim in summis ramulis collecti, purpurantes, odori: Radix digitalis spissitudinis, transuersa fibris pluribus terræ summæ adhæret.

Vim habet calefactoriam & alexiteriam, vnde quibusdam Theriacaria, & herba benedicta dicitur, & antidotis miscetur. Urinam quoque & menstrua pellit.

Reliquarum Valerianarum descriptio, quarum nullus aut rarissimus est vsus, ex rei herbariæ scriptoribus petenda.

Vires.

De Fumaria. CAPVT LXVIII.

CAPNOS, seu fumaria, vel fumus terræ Latinis dicitur, quod succus eius oculis immissus, lacrymas quasi vellicando excitet, vt fumus. Herbula est notissima in aruis, hortisve nascens, coriandro aliquantum similis, fruticosa & prætenera. Flosculos edit plurimos, rubellos, & interdum albidos, atque altera parte, instar cristæ auiculæ Coridalis, quam alaudam cristatam, seu galeritam vocant, acuminatos. Eius duæ differentiæ traduntur, prima & vulgaris inter segetes, & in locis apricosis fruticat, alia vix nisi in hortis inuenitur bulbosa, subcineritia, floribus interdum albis, interdum luteis, aut alio colore variegatis.

Vires.

Fumaria omnis acris est, & amaræ facultatis, biliosam vrinam mouet, sanatque iecoris obstructionem & imbecillitatem.

Eius verò succus in oculos instillatus mirificè oculorum caliginem summouet, & visum acuit.

Vulgaris in frequenti est vsu, à qua duo syrups nomen habent, vnus de fumaria minor, alter maior dicitur, hic perpetuò paratus seruatur in Officina Pasch. Bazoini Pharmacopœi doctissimi.

De Euphrasia. CAPVT LXIX.

EUPHRASIA à nonnullis ophthalmica & ocularis herba dicta, pumilla planta est, vix pedem alta, cauliculos è radice tenui & fibroso graciles & nigricantes proferens folia parua, serrata ad chamædryn accedentia: flosculos albos minutis punctis maculatos. Nascitur ruri in locis macilentis, siccis, frigosis, incultis, secus vias & agrorum margines modò non umbrosas. Circa Autumni initium floret, tuncque colligitur & seruatur, vel aqua ex ea recenti destillatur optima ad oculos, quibus præ alijs valde conuenit, vnde Germanis solamen oculorum dicitur, quibusdam Euphrosyne, quòd animum exhilaret, quem ob effectum, eadem etiam nomenclatione designatur buglossum.

Vires.

Calefacit leniter, desiccatur potenter, oculis confert insigniter: Sumpta enim & adhibita caliginem aufert, morbisque omnibus oculorum pituitosis prodest. Vinum cui multa euphrasia vindemiarum tempore maceratum fuerit, mira efficacitate iuuat oculos, & eorum affectus expugnat.

De Centaurio minore. CAP. LXX.



CENTAVRII duo traduntur discrimina, vnum dicitur maius, quod rhaponticum non est, vt diximus supra, alterum minus, quæ vultu & viribus multum inter se dissident, nam maius caules erigit bicubitalis, folia oblonga, ex multis coherentia, in margine crenata, in virgarum fastigijs capitula turbinata. Iacæ modo squamis herbidis inducta, ex quibus flores erumpunt flammei, cærulei & elegantes. Istud non magnifit in re medicamentaria, licet dignitate quadam veteres modo Centaurium, modo ex his nonnulli Panaces dixerint.

Minus verò frequentius vsurpatur, & à virium quibus pollet dignitate ad febrium halosim, seu expugnationem Febrifugum sæpè vocitatur: Aliquando ab insigni eius amarore fel terræ, aliquando & Limnison nuncupatur.

Planta parua est, cauliculo assurgens pedem tantum alto, anguloso, folijs induto exiguis Hyperici similibus, per interualla binis, floribus in summitate coronato paruulis, purpureis, interdum explicatis ante exortum, & post occasum Solis reclusis: Succedunt silique perbreues, in quibus grana minutula coarctantur. Nascitur vltro locis incultis, herbosis, macilentis, aëri libero expositis. Inuenitur in multis locis cum flore luteo, interdum albo: Vidi qui comam media sui parte purpuream, altera albam gereret.

Centaurium minus potenter calefacit, vlcera antiqua expurgat, *Viros.* & ad cicatricem ducit. Eius decoctum hepatis obstructions tollit, & lienem induratum iuuat: Succus in passio vsurpatus menses & foetum educit, cum melle oculis illitus caliginem tollit.

De Rhapontico. CAP. LXXI.



RHAPONTICVM Rhabarbarum non est, neque etiā centaurium maius, vt multa inter has stirpes affinitate decepti crediderunt: Nam Rhaponticum peregrina radix est, in his quæ supra Bosphorum Thraciū ac Pontum Euxinum sunt, regionibus proueniens raphani maioris crassitudine, subnigra, ac rufescēs, centaurio magno similis, fractu facilis, intus colore ex atro subrubescēte & ferrugineo, sapore subamaro, astringitorio, acrimoniæ omnis experte, odore ferè nullo.

In multis Gallia hortis, eorum maximè, qui raris simplicibus perquirendis, emendis & studiose alendis operam sedulam nauant,

nunc Rhaponticum latè virens inuenitur, quod antiquorum Rhapontico tam bene conuenit, vt ipsissimum esse & autopfia efficit, & ratio suadet vt credamus.

Optima Rhapontici radix ea dicitur, quæ cariem non sensit, & commanducata, cum remissa adstrictione in ore lentescit, coloremque reddit ex pallido rufescentem, & ad croceum vergentem, qualem quotidie videmus in Pharmacopolijs Lutetianis. Nunc enim valdè rara non est, & à cunctis pene seplasiarijs agnoscitur.

Vires.

Valet ad stomachi imbecillitatem, ad lienosos, hepaticos, coxendicum dolores, ad conuulsa, rupta, febrium circuitus, venenatorum animalium morsus, & vtilissimè Antidotis admiscetur.

De Ven. CAPVT LXXII.



EV, siue vt alij volunt Meum, duplex est, vnum laudatissimum, quod in Macedonia reperitur, sed copiosum in Athamante, vnde Athamanticum dictum. Alterum magis vulgare, quod in multis Gallia & Italiae regionibus viret, quod herbarij nunc anethum sylvestre, nunc fœniculum tortuosum vocant. Vtrique folia tenuia sunt, angusta, capillacea, furculi graciles cubitales, in quorum summitatibus prodeunt vmbellæ cum flosculis candidis, quos semina consequuntur angulosa, oblonga, cumino maiora, odorata, cum crimoniam quadam amaricantia. Subsunt radices admodum tenues & odoratæ.

Vires.

Meum calefacit ad ordinem tertium, siccatur ad secundum: incidit, attenuat, expurgat, obstructions aufert, urinam & menstrua cit, inflationes stomachi discutit, iecoris infarctus tollit, & vitia renum emendat.

De Anetho. CAPVT LXXIII.



NETHV M & medici, & mulieres commendatissimum habent: Hæ enim sedulo Iunio mense, quo scilicet tempore suis flosculis comatur, & suauissimè fragrat, excerpunt vel secant, siccant, seruant, & simul cum vestibis recondunt, ad iucundum illis odorem conciliandum. Medici verò simul & semine vtuntur ad multa vtilissimo, vt dicitur.

Assurgit autem anethum bicubitali proceritate, surculis rotundis, genicularis, folijs tenuissimè dissectis, & veluti capillaribus: flosculis in muscario luteis: Semine dein plano, admodum tenui, ac foliato, ex flauo pallefcere: radice dura ac fibrosa. In hortis seritur & semel

semel solum sæpè quotannis ex deciduo semine renouiscit. Grauis utique est anethi halitus, sed tamen iucundus ac suauis.

Excalfacit & siccatur ordine secundo, atque intro sumptum vrinam cit, tormina ac inflationes sedat, singultum lenit, lac euocat, & eius copi. maugetur, incidit, attenuat, & humores ad coctionem perducit. Vires.

De Petroselino Macedonico. CAP. LXXIV.



PETROSELINUM aut vulgare est, ac nostris in hortis frequens, Medicis apium hortense, vulgò Persilium dictum, quod ut gratissimum olus, in culinis celebratur, ut prima lectione notauimus, vel Macedonicum, quod non prorsus simili modo à rei herbariæ scriptoribus depingitur. Lobellius enim ferè domestico simile contendit, caule, foliis, umbellis, seminibus, sed in locis præruptis & saxosis gignitur, unde Petrapij & petroselini nomen, adeo ut vnum sit nostras & hortense, aliud verò sylvestre & Macedonicum. Fuschius verò folia dat ei pimpinellæ, & semina ammi, eaque odorata, acria & aroma olentia perhibet. Hoc non tantum ex Dioscoride rescivit, sed vidit & expertus est: Cum enim semen petroselini, quod pro Macedonico seruabat, terræ mandasset, plantam habuit & foliis pimpinellæ respondentem, & semen his conditionibus absolutum, quas ei tribuit Dioscorides.

In Macedonia copiosum & laudatissimum nascitur; maximè verò in locis saxosis & asperis. Lætè virens in horto Claud. Gouerij Pharmacopæi Paris. alitur, ut & aliæ multæ stirpes raræ & pretiosæ.

Calefacit & siccatur insigniter, vrinam mouet, menstrua ducit, colico dolori prodest, tormina sedat: laterum quoque, renum & vesicæ doloribus sumptum medetur, flatus discutit, attenuat, incidit, vtilissimè Antidotis admiscetur. Vires.

De Coriandro. CAP. LXXV.



CORIANDRUM herba sit virosum & tetrum odorem spirans, hortense planè est, & studiosè seritur & colitur: Eius enim grana dum resiccantur halitum grauem & ingratum deponunt, & suauiter olent. Surculus ei admodum tenuis, teres, cubitalis & ramosus: folia primo exortu adianti similia, laciniosa, in tenues ac variè incisa; nam eorum pars cauliculo proprior minùs; remotior, magis secatur: flosculi candidi sunt in umbellis laxis: Semen nudum, rotundum, firmum, nonnihil striatum, ac inane, quod primum viret, dein arescens ex luteo albicat: Radix brevis, dura, ac fibrosa: foliorum teter ac putidus odor, & cimices redolens.

Semen aceto solet præparari ad qualitatis cuiusdam inimicæ castigationem, quam tamen sola desiccatione amittit, & innoxie sine præparatione sumitur.

Vires.

Coriandrum seu Coriannon aut Corion ex Dioscorid. vim habet refrigeratorem & cum pane aut polenta, Erysipelatis, herpetibus & inflammationibus medetur, à quo tamen optima ratione dissentit Galenus, probatque calidum esse, nec valere, ad Erysipelas exactum, seu exquisitum, sed tantum œdematodes. Nam calefacit moderate, resiccat manifestè, atque astrictiōis nonnihil obtinet.

De Capparibus. CAPVT LXXVI.



APPARIS in multis regionibus sponte nascitur, nullo aut exiguo cultu, atque vberiore proventu in locis siccis & agris desertis, citra rusticorum opem. Frutex senticosus est, humilis, spinis aduncis hamatus, cuius ramuli aculeis horrentes orbiculariter per terram sternuntur: Folia circinata veluti mali cotoneæ, è quorum alis pediculi erumpunt longi, umbones seu capitula rotunda proferentes, quibus dehiscentibus, flores candidi panduntur, quibus succedunt fructus oblongi, acinoso semine pleni.

Illa florum rudimenta, seu capitula priusquam sese explicent, & adhuc nodosa solent euelli, muria condiri, & in Pharmacopoliis seruari pro capparibus, quæ minores maioribus creduntur præstantiores. Conditura redduntur suauiores & salubriores ad medicum usum & esum. Radix quoque præscinditur, Cortex separatur, siccat, servatur. Parum autem alimonie Cappares vescentibus promittunt, quòd partium tenuitate polleant, & medicinæ potius quàm cibo nascantur; A Muria tamen quemdam mutuuntur saporem stomacho pergratum, qui fastidientes sæpius inuitat ad epulas, & languentem appetitum reuocat.

Vires.

Capparis (& fructum & radicem intelligo) excalfacit, extergit, purgat, incidit, digerit, lienem roborat, iuuat, minuit, obstructa tollit, & morbis à splenis infarctu & imbecillitate originem ducentibus conducit.

De Periclymēno. CAPVT LXXVII.



PERICLYMENON Romanis volucrum maius dicitur, aliquando Caprifolium, à Scribonio largò Mater syluæ & matrifylua; à nonnullis Liliū inter spinas. Frutex est surculosus, lignosus, scanforius, & sese vicinis arboribus conuoluens ac circumligans, & ad summa earum fastigia sæpè surculis obsequiosis ascendens. Folia profert ex longis interuallis & singulis geniculis bina, oblonga, læuia, mollia, ex albo virentia, prona parte albiora: flores candidos & aliquando flauescētes, in longitudinem porrectos, fistulosos, in extremo hiulcos, simul multos ac velut in ferto congestos, & suauiter olentes, apicibus aliquotè medio exeuntibus. Fructus partim rubens, rotundus, racematim cohærescens, in quo semen duriusculum; radix crassa & lignosa; cuius nullus est in medicina vsus.

Nascitur in syluis & dumetis, & arbusta tam arctè sæpè amplexatur, vt suæ circunuolutionis impressum illis relinquat vestigium.

Ex periclymenis, quosdam frutices amplexando suos gyros ab Oriente ad Occidentem, aliud ab Occidente ad Orientem ducit, idque semper & locorum vbique.

Periclymenum euidentissimè calefacit, siccaturque, lienem minuit, orthopnoicis confert, vrinam mouet, singultum arcet, partus celeritatem facit, calculos pellit, faciei lentigines delet, & longo vsu sterilitatem, & viris & mulieribus adfert. Vires.

Xylostron Periclymeno vultu quidem simile est, sed nullis, vt hoc ipsum eget adminiculis, vt fulciatur, sed per se subsistit.

De Genista. CAP. LXXVIII.




GENISTAM ipsæ etiam ancillæ agnoscunt, quam colligunt & colligant ad scopas. Nascitur in locis incultis, macris & aridis, præsertim nostras, quæ syluestris est, nam Hispanica, non nisi apud nos hortensis, atque vix fruticans, syluestri similis, sed virgultis, foliolis & floribus maioribus.

Hispanicæ flores grauius spirant, virgulta suauius, syluestris contra flores suauiores, virgulta admodum tetra.

Est quædam humilis genista, seu genistella dicta, cuius cauliculi hac illac, in membranas alas, pro folijs extenduntur, à medicis autem negligitur, nec vllus eius celebratur vsus. Genista floret initio Veris, tuncque flores nondum perfectè explicati, & aceto & sale cōditi, seruantur ad Hyemem pro acetarijs capparum more.

Calefacit & siccatur ad recessum vsque secundum: flores potissimū commendantur ad lienis, & iecoris infarctus expediendos. Semen tritum & potum ad zij. aut zij. s. cum aquæ mulsæ ℥iij. aluum turbat & subducit, vesicamque aperit, & stranguriæ medetur. Vires.

De Sabina. CAP. LXXIX.



ABINÆ duæ traduntur differentiæ, vna baccifera, altera fructus omnis expers: Vtraque vix procera, iunipero valdè similis, & perpetuò virens. Quæ baccis non grauidatur, graueolentior est, rigidior, & brevis, spinulis asperior, coma perpetuo virente, odore molesto, sapore feruido & acro: Hæc pumila semper ferè est, in latitudinem sese diffundens, nonnunquam tamen in altum assurgit dum eius rami caulem circundantes præscinduntur.

Altera minus horrida est, nullis pungentibus spinis aculeata, & tamarisci admodum similis, odorem minus tetrum spirans, quam superior, baccas edens subpuniceas ac resinosas. Hæc rarò in regionibus frigidis delectatur, in multis vero calidis, vt in Galloprovincia sponte, & copiosa nascitur.

Præter dictas, alia arborescens amygdali ritu ac magnitudine à Belonio visa est, in Creta & Mysia, cui credere malo, quam inibi peregrinari.

Vires.

Sabina tertio gradu calefacit, siccatque, sanguinem per vrinas ducit, menstrua suppressa mouet: Cum vino sumpta, vel adhibita fœtum excutit vel viuentem, vel mortuum.

De Rosemarino. CAP. LXXX.

Rosmarinum ferulaceum.



VABVS plantis multùm diuersis nomen Libanotis, quam Rorem marinum dicunt, à Dioscoride datum est: Prior ab eodem vocatur libanotis fœcunda frugiferaque, cuius folia fœniculi similia sunt, humi sparsa, iucundè olentia: caulis cubitalis, aut altior, concavus, umbellis capitatus, ex quibus semen habetur oblongum, & acre, Canchrys dictum. Tres huius differentiæ perhibentur, prior enumerata; Secunda illi valde similis, excepto semine, quod latum est, vt Spondyli, nec mordax, nec acre; Tertia nec florem, nec semen profert.

Est aliud rosmarinum coronarium dictum, ferulaceo superius descripto multùm dissimile: Est enim frutex lignosus, caules habens multos, tenues, longos, folijs angustis, crebris, duriusculis, subtus albicantibus, superna parte viridibus conuestitos, ac floribus hinc inde multis, ex cæruleo candescentibus coronatos. Odor vtcumque grauis non tamen ingratus, vt qui caput ac cerebrum & nervos roboraret. Passim in hortis plantatur, & in calidioribus Galliaë regionibus spontè prouenit. Bis floret quotannis Vere & Autumno.

Vires.

Cap.
87. l. 3

Ex calfaſtoria qualitate prædictum eſt. Iſtero fœliciter medetur, ſi eius decoctio ante exercitationem bibatur; dein exercitatus balneũ ingrediatur, & merum potet, neruorum reſolutioni prodeſt, ſtuporis & morbis omnibus cerebri à frigidis humoribus natis, ſed faucibus eſt inimicum, vt & cinnamomum.

De Agno caſto, ſeu vitice. CAP. LXX XI.

*Dioſ.
cap. 36.
lib. 1.*



N multis calidis regionibus, ac fluminum ripis, & aſperis locis, vt torrentium alueis, arbuſcula quædam naſcitur odora, Agnus caſtus, ſeu Lygos, & vitex dicta, folijs cannabinis, ſed in ambitu non ſerratis, oblongis, acuminatis, & vnico pediculo cohærentibus Ramos promit longos, lentos, fractu pertinaces: flores ſubpurpureos, verticillatim, ac ſpicato ordine ſurculorum faſtigia circundantes: Semen rotundum Cardamomo minori ſimile. Dicitur agnus caſtus, quòd ad caſtitem conferat, folijs & floribus ſumptis & ſubſtratis.

Vires.

Calefacit & ſiccatur inſigniter, & flatu omnium maximè diſcutit, venenatis iſtibus & lienofis auxiliatur, menſes ciet, ſeminis motum cohibet, nocturnas veneris imaginationes, vt ſemen rutę compescit, ob id matronæ in Theſmophorijs Athenienſium, caſtitem cuſtodientes huius folijs toros ſibi ſternebant.

De Fraxino & Ornithogloſſo. CAP. LXX XII.



FRAXINVS arbor eſt procera, melia & Milea Græcis dicta, non modò ad ſupelleſtilium ligneorum fabricam, ſed rem medicam vtiliſſima & aptiſſima, ex cuius cortice, ligno, fructu multa percipiuntur commoda. Aſurgit autem caudice multum craſſo & alto, cortice inuoluta, tenui & leui, folijs oblongis, velut ex multis conſtantibus, & vno pediculo adhærentibus, glycyrrhizæ, aut iuglandis modo.

Absque prægreſſis floribus conſpiciuis, ſiliquæ ſimul multæ & colligatæ ex vno pediculo, à ramis teneris prodeunt, quæ quod auium linguam referant, aut medulla intus concluſa veluti ligulam exprimat, linguæ auium, Ornithogloſſa Græcis dicta nominantur.

Tanta verò antipathia à veteribus traditur inter ſerpentes, & hanc arborem eſſe, vt malint ipſi in ignem proſilire, quàm frondes aut ramos perreptare, ſi hiſdem & igne circudentur: potius enim lignum quàm ignem auſugiant.

Fraxini folia vt etiam cortex moderatè calefaciunt, efficaciter ſiccant, ſemen verò quod Ornithogloſſum, & aliquando orneogloſſum nominant, calidum & ſiccum eſt reſeſſu ſecundo. Quod ſi tanta ſit huius arboris cõtra ſerpentes facultas, vt etiã ſola ipſius vmbra

Vires.

baigantur, multo potentiores aduersus venena præstabunt effectus folia, aut succus, aut aliæ partes arboris dum assumuntur, vel adhibentur. Ob id sceleriter vsurpantur ad eorum affectuum curationem, qui malignæ cuiusdā qualitatis sunt participes, vtiliterque antidotis admiscuntur. Semen autem valde commendatur ad stimulos veneris excitandos: medetur & iecoris, lienisque doloribus ex causa frigida cum vino.

De Visco querno. CAPVT LXXXIII.



Is c i tria sunt genera, vnum Plinio, Scribonio & Hefychio venenum est, quod ex chameleone nigro, appetente Canis ortu, interdum collacrymare traditur, ab ipsis Ixia nominatum; alterum malacticū est, a uibus inuiscandis & captandis dicatum, quod ex corticibus aquifoliæ elixatis, in fimo sepultis, putrefactis, tritis & aqua lotis, ad corticum separationem paratur, remanente tantum viscilagine.

Tertium est veluti planta plantæ adnata, quam scilicet non sua seminat arbor, inquit Virgil. Et quæ, cum in terra non seratur, aut 6. *Ae-*
fata nusquam virescat, in aliena planta latè nascitur & fruticat, per- *neid.*
petua fronde ac semper virente. Nascitur autem non in arbore singula, sed in quamplurimis, hisque dissimilibus, vt in quercubus, pomis, piris & domesticis, & syluestribus, salicibus, oxyacantha, populo, & aliis multis.

Excedit verò rarissimè cubitalititudinem, sed in latitudinem sese diffundit, ramis multis, breuibus, geniculatis, lignosis, dilutè virentibus; foliis oblongis, latiusculis, striatis, ex viridi nonnihil flauescens: Baccæ eius geniculis adnascuntur, rotundæ, albæ, splendidæ, quibus hyeme turdi, merulæ, palumbi, & aliæ aues vescuntur: Radices nullæ, nisi arboris viscigeræ fibræ ac rami pro radicibus habeantur. Anile & fabulosum est, quod asserunt nonnulli; viscum nempe non nasci, nisi à semine per auis alicuius, vt turdi aut similis ventrem, prius reddito.

Æquè ridiculum, quod Athenæus scribit, Si *οὐράς*, id est, vinago seu columba syluestris visci semen comederit; super quacumque arbore aluum exonerarit, viscum nasci: Nascitur enim non ex semine, non ex animalis stercore, sed veluti ex sudore arboris illius, cuius trunco adhærescit. Præstantissimum autem & laudatissimum, quod ex quercu habetur.

Vires.

Calefacit cum acrimonia & amaritudine: Ex eorum tamen est genere, quæ non protinus admota calefaciunt, sed quæ tempus requirunt. Discutit, emollit, attrahit: Tubercula, parotidas, cæterosque abscessus cum resina & pari cera mixtum maturat, & morbo comitiali efficacissimè prodest.

De Populo. CAPVT LXXXIII.



POPULVS arbor triplici discrimine notatur; vna dicitur alba, quibusdam farfarius, alia nigra; tertia Lybica vulgò tremula: Hæc locis vdis & siccis æquè viret, aliæ rigui tantùm delectantur. Prior caudicem habet crassum, procerum, læui & albicante cortice indutum, folia lata, incisa, angulosa, supernè læuia & virentia, infernè albicantia, lanuginosa, tussilagini similia, proluxo pediculo adhaerentia, tremula.

Nigra citiùs in altitudinem sese erigit, caudice crasso, læui, albicante: folio rotundo, oblongo, supernè acuto, hederaceo, pediculo longo & tenui appenso. Nilos profert longos, ac veluti racemum, cui acinuli hærent piperis rotundi modo, qui vbi maturuere decidunt, antequam sæpè in pappos dehiscant.

Prima huius germina foliorum futurorum rudimenta, oblonga & acuta, pingue quiddam oleosum, ac resinofum habent, digitis adhærescens & subflauum: A Pharmacopæis oculi populi vocitantur, quos Veris initio excerpunt, tundunt, & cum axungia suilla ad mensem Iunium in figulino vase recondunt, ad vnguenti populei confectiorem. Ex foliis eius apes lachrymam quamdam colligunt, ex qua propolidem conficiunt.

Lybica, seu tremula, aut montana populus à nigra vultu vix variat, sed folia gerit duriora, minora, in ambitu profundius serrata, pediculis longioribus cohærentia: Ob id ad motum ventorum flatu citiora, & mutuo inter se collisu crepitantia. A quibusdam Cercis putatur: hæc tamen secundum Theophrastum videtur ea esse, quæ apud nos arbor Iudæ vocitatur.

Gemmæ autem populi nigræ (sic enim rectiùs, quàm oculi nominantur) tantùm in re pharmacaria vsurpantur, facultatè que calefacientem & siccantem habent, & partium tenuitate incidentem ac mollientem: Folia vim eandem sortiuntur, sed imbecilliorum: Cum aceto trita & illita podagricis doloribus vtiliter medentur.

Vires.

An ex populo defluat lacryma in Padum amnem, & coëat in succinum, vt plerique Dioscoridem sequuti putant, postea aptiùs suo dicetur loco.



SECTIO QUINTA.

De Simplicibus refrigerantibus.



Medicamenta non omnibus in regionibus nascuntur optima sed alia in calidis, alia in frigidis uberius & latius; Nam hic segetes, illic veniunt feliciter vna. Quæ ad meridiem & æstuosum calis aspectum vergit regio, calida simplicia, quæ ad septentrionem frigida & præstantiora fecundius alit. Quod si materiei medicamentariæ studiosius incuberent hi Medici, qui Asiam, Africam, & peregrinas regiones incolunt, ad suam & suorum incolumitatem fidelius tuendam, multas è nostro solo stirpes, quas non habent, viribus eximiis præditas efflagitarent, quarum nonnullis & suavius ad alendum, & alijs feliciter, ad medicandum uterentur. Multas siquidem habemus, quæ nec in Ægypto, nec in Chyna, aut alibi sub Polo Antartico virent, aut arte vlla queunt cicurari. Quavis enim calis facies, in quouis solo, plantam quamlibet animare, latam, viuacem & fecundam reddere minimè potest. Europa autem præter calefacientia multa, infinita penè refrigerantia producit; Inter quæ ea tantum hic enarro, quæ ad compositiones in nostra officina traditas accedunt. In quorum descriptione, de his primum quæ summè refrigerant, loquor, tum de his, quæ mitius, postremo de his quæ inter refrigerantia & calefacientia ambigunt.

De Mandragora. CAPVT I.



*Vetusque vetularum esse credidi insomnia, quæ de mandragora narrantur, de quibus plebeculam audiui sæpè garrientem. Ex quorumdam tamen veterum tabernis illam et figmenta deprompta esse comperio, qui nimium creduli forsitan quæ ab imperitis audire literis mandarunt: Nam Græcorum nonnulli, quod illius radicem, tanquam philtum quoddam ad amatoria conducere arbitrarentur, Circeam nominarunt. Pythagoras quod hominis truncum, & artus utcumque repræsentaret, eiusque radices sæpius geminæ quasi crura duo & clunes ostentarent, Anthropomorphon nominauit; Ad cuius nominis allusionem accedit mandragora, iuxta Septentrionalium idioma, apud quos *Man* hominem notat, & *Drachen*,*

Draghen, quasi gerens hominis figuram. Anilia tamen fictitia que sunt hæc omnia, quibus vafri circulatores incautos sæpè decipiunt, dum radículas quasdam bifidas circumferunt, in quibus faciem humanam sculptam & artus discriminatos agnoscere facile est; De hisque mira & incredibilia narrant, vt ab idiotis nummos extorqueant.

A quibusdam vocatur malus canina, ab aliis pomus terrestris, eò quòd poma ferat rotunda, lutea, vitellis ouorum induratorum similia, odorata quidem, sed virofa.

Eius autem duæ traduntur differentiæ; vna dicitur mas seu candida, *μωπιον* Græci vocant, nonnulli Arsen, alij Hypoplomon, quæ ingentibus foliis, betæ similibus, latis, & læuibus viret.

Morion

Hypoplo-

mon.

Fœmina verò nigra dicta, folia pandit angustiora, lactucæ minoræ, aliquantum hirsuta, humi procumbentia.

Poma producit mari similia, sed minora, sorbi effigie, ex luto pallescentia. Radices habet sapius binas, aliquando ternas inter se conuolutas & intortas, exterius nigras, intus albas, carnosas, longas & crassas.

Mandragora nulla patienter fert solis æstus, & lætiùs fruticat in locis vmbrosis & apricis; vnde mandragora forsan dicta, vt viri quidam docti putant, quòd in mandris & specubus fata delectetur.

Vires.

Dioscoridis tempore colligebatur radicis succus, qui insolatu concretus multo erat in vsu: Nunc radicibus & foliis vtimur quidem, sed rarissimè, atque in his solùm affectibus, qui alia blandiora stupefacientia temnunt.

Ex pomis paratur oleum per infusionem, vt in Officina demonstrauimus, quod prudenter adhibitum dolores quosuis tollit, & blandè somnum conciliat.

Rarissimè autem mandragora per os sumitur; atque his qui vrendi vel secandi sunt, ne dolores sentiant, aliud quoddam potius medicamentum opiatum, idoneis simplicibus castigatum datur, quo sine noxa sensus consopiantur. Vis enim mandragoræ non tantum impensè frigida est, sed etiam narcotica: Proinde non tutò nisi prudenter vsurpata, nam inter venena ab Aëtio numeratur.

Ca. 45.
C. 4.
serm. 1.

Mandragoræ quædã plâta cognata est, quæ mala fert ex cæculo purpurea, oui magnitudine, quæ mala insana nonnulli vocant; Alij Melongena, quidam poma amoris. Adnascuntur surculo pedem alto, vtrinque foliis solani similibus amictis, è cuius media parte, sursum versus, prodeunt flores albicantes, quibus mala succedunt, multa carne turgida, succulenta, granis paruis prægnantia. His vtuntur in acetariis nonnulli non sine magno sanitatis dispendio.

Mala insana
Melongena.



VLTA Solani perhibentur discrimina, primum Dioscoridi dicitur satium ac hortense, Theophrasto inter olera repositum: Nunc tamen nec estur, nec feritur, sed spontè etiam inuitis hortulanis secus vias germinat, adolescit, floret, & baccas gerit nigras, vnde Galli mo-

rellam nominant: Officinæ Solatrum, Græci Strychnon. Quædam

Lutetiæ nunc incipit videri quæ baccas rubras gerit.

Morella.

Planta est pedem alta, racemosa, foliis ozimi, sed maioribus nigricantibus baccis racematim coeuntibus, rotundis: primum viridibus: à maturitate nigris. Præcedunt flores purpurei, elegantes, ex quorum umbilico prodit apex luteus, speciosusque.

Vires.

Refrigerandi facultatem obtinet insignem: Ob id ignibus sacris conuenit, capitis dolori à causa calida prodest; æstuanti stomacho auxiliatur. Eius baccæ ad vnguentum Diapompholigos efficaciter accedit. Stillatitius liquor ad oculorum inflammationem & aliarum partium ardores vtiliter vsurpatur.

Solanum
Somniferum.

Vim quoq. stupefacientem cum obtineat, somno conciliando sæpè prodest.

Aliud quoddam Somniferum, seu Dormitorium nuncupatur, quod videlicet insigniter somnum conciliet. Ramosa planta est, fructu contumax, foliis multis, ac maiusculis aliquantum hirsutis, & ad effigiem cotoneæ mali accedentibus, subobscuris: radice exterius rubra, & vbi aruerit albicæte; flore ampliusculo, subrubro, nec aspectu valde grato, è cuius cauo fructus emergit rotundus, cerasæ magnitudine, qui præsentem vrentibus adfert interitum. Soporiferum quidem opio validius. Multis in locis agrestibus, & incultis lætè fruticat, & præsertim in rupibus à mari non longè distans, vnde botanici solanum marinum, Officinæ solatrum vocitant.

Solanum
furiosum.

Tertium solani genus manicum, seu furiosum & lethale, quibusdam Thryoron, aliis Perisson dictum, folia gerit erucæ similia, sed maiora ad acanthum accedentia promit, caules multos, proceros, speciosos; florem nigricantem, quem fructus consequitur racemosus, niger, rotundus, decem aut duodecim acinis prægnans. Id esse creditur, quod multi Dorycnion nominant. Sunt qui nihil discriminis esse inter Solanum somniferum & Furiosum, seu Manicum putarunt, quod tamen magnum rei herbariæ periti agnoscunt.

Solanum
lignosum.

Quartum quoddam genus est Strychnodendron, seu solanum lignosum, quibusdam amaradulcis, vel dulcamara, dictum, quod vitium ritu pergulas & sepes scandit, foliis & furculis smilaceis, sed durioribus & nigrioribus, floribus purpurascens & violaceis, ac inuersis. Ex quorum umbilico luteorum emicat apex. Succedunt baccæ parvæ, succulentæ & virosæ.

Ad solana multorum consensu iuste refertur alia planta, quibus-
 dam Vva lupina, aliis Aconitum pardalianches, nonnullis herba
 Paris dicta, quam Gesnerus Monococcon, Pena Solanum tetra-
 phyllon nominat. Verum his omnibus solanis, hortense si excepe-
 ris, aut nunquam, aut raro Medici vtuntur; nam eorum vsus mi-
 nimè tutus est. At mala ea medicina est, quæ maioris mali pericu-
 lum adfert.

Vua lupi-
na.Solanum
tetraphyl-
lum.

Alia adhuc stirps ob effigiei & virtutis cognationem inter solana
 refertur, quæ Stramonium, vel rectius Strychmonium, à quibus-
 dam Lycopersum, ab aliis *Metel*, à nonnullis hyosciamus Peruuia-
 nus & Baryococcalon dicitur: Cuius duo traduntur discrimina, v-
 num maius est, quod hominis proceritatem æquat & sæpè superat:
 Alterum minus bicubitale, aut paulo altius vel breuius. Vtriusque
 facies eadem & flores vtrumque gerit albos, maiusculos, smilacis
 æmulos & poma crassa, spinosa, echinata, in minore rotunda, in
 maiore acuminata, cui & folia & omnia maiora.

Stramonii.

Refertur etiamnum ad solana alia planta illis cognata, quam Of-
 ficinæ Solanum pomiferum, nonnulli Lycopersicum vocant. Ma-
 la enim gerit ex aureo crocea, quæ herbarii poma mirabilia, aut ea-
 ve nuncupant. Sunt qui & Amomum Plinij ad solana deducere
 tentant. Dispar tamen vultus, & natura refragatur.

Solanum
pomiferum.Poma mi-
rabilia.

De AlkeKengi. CAPVT III.



ECVNDVM Solani genus Dioscor. Halicacabus est,
 quem officinæ Mauritanorum vocem sequutæ, Al-
 kekengi vocant; ob cuius ad multa celeberrimos v-
 sus, seorsim de eo differere placuit. A vesicæ figura
 quam eius grana inuolucro quodam membraneo
 vestita referunt, Solanum vesicarium nuncupari so-
 let. In squalidis locis vt inter vineta latè nascitur, & vberime fru-
 ticat, cauliculos cubitales proferens, tenues, rotundos, subrubros,
 quasi geniculatos, folia solani, sed paulò maiora; flores subalbidos,
 quibus folliculi vesicarum instar succedunt, primùm herbacei, de-
 inde phœnicei, in quorum ventre, grana rotunda, cerasorum ma-
 gnitudine, effigie, & colore includuntur, carnosæ & seminibus pla-
 nis, teretibus, & subcandicantibus turgidula.

Fructus hi quibusvis vel etiam pueris notissimi sunt, qui hyema-
 lia cerasa eosdem vocitant, & sæpè magna quantitate & innoxie
 mandunt. Vrinæ mouendæ & saburræ à renibus & vesica deturban-
 dæ & foras protrudendæ mirum in modum conueniunt.

Vires.

De Hyosciamo. CAPVT IV.



HYOSCIAMVS à quibusdam herba suilla dicitur, quòd sues eius esu quasi conuellantur; ab alijs Altercum & Apollinaris herba, quia hyosciamo dementati, rixando & altercando se torqueant, & velut Apollinis æstro percellantur. Vidit Mathiolus pueros qui semen hyosciami comederant, à deo desipere, vt à cacodæmonibus elusos autumarent permulti.

Vires.

Sunt verò tres hyosciami vulgares; niger, albus, luteus. Nigro folia sunt hirsuta, longa, lataque, vt verbasco, laciniosa vt Acantho: caules cubitales & sæpè altiores, crassi, brachiati, ac ramosi, qui medio sui flores è fusco pallescentes promunt, quibus calyces succedunt ventricosi, oblongi, teretes, supernè aculeati, pyxidulis aut calathis paruulis similes, & præsepilolis discepti, in quibus continetur semen exiguum colore fuscum & obscurum. Radix albicat, crassa, erutu facilis, in alterum annum viuax, perquam utilis ad anodyna, & minus quam folia fœrens. Præter dictas hyosciami species, alias adhuc vidi florum signaturis quibusdam & maculis inter se pugnantes.

Vires.

Alij duo hyosciami rari sunt, nec nisi in hortis culti visuntur. Raro quoque ad medicos accedunt vsus: quotidie verò niger vsurpatur. Omnes refrigerant ad tertium ordinem, & vim habet narcoticam: Albus autem reliquis minus & refrigerat, & stuporem inducit.

De Papauere. CAP. V.



PAPAVERVM duo sunt in vniuersum genera, hortense vnum, & sylvestre alterum. Hortensis multæ varietates agnoscuntur, à florum colore, densitate & figura sumptæ. Quoddam dicitur simplex, aliud polyanthon, seu multiflorum, atque vtrumque vel album, vel purpureum, vel rubellum. Sylvestris quoque multa sunt discrimina, vt nigrum, rubrum, rhœas vulgò dictum, spumofum & corniculatum, Cuius adhuc quatuor differentiæ videntur, vnum commune est & luteum, alterum violaceum, & duo phœnicea.

Papauer sativum.

Sativum furculis vt plurimum bicubitalibus sese erigit, folijs oblongis, pallidis, per ambitum serratis, nullo pediculo adherentibus, floribus vel candidis, vel rubellis, vel alterius coloris pro stirpis varietate, capitibus rotundis, oblongis, in quorum cellulis semen includitur, vel nigrum, dum ex papauere nigro, vel album dum ex albo sobolescit.

Papauer Erraticum.

Erraticum seu rubrum, dicitur *μικρὸν ῥαγὶς* quasi fluidum, à flore celementer decidente. Folia gerit erucæ similia, incisa, aspera, flores rubros & semen rufum. Nascitur in aruis, potissimum inter segetes.

Spumeum Mathiolo ignotum, à quibūdam recentioribus pro Gratiola, ab alijs pro saponaria sumitur.

Spumeum.

Ceratites seu corniculatum folia habet subalbida, in ambitu erratici modo ferrata, flores luteos, fructum paruum, seu siliquam, ut cornu inflexum; corniculo fœnugræci similem.

Corniculatum.

Passim in hortis studiosè cultis & pinguibus ob florum elegantiam feri solent papauera polyanthæa, fimbriata, patula, rosea, variorum colorum.

Papauera polianthæa.

Omnibus autem inest refrigeratoria facultas, sed erratico cæteris maior; ita ut eo solo quis uti non possit innoxie, sicut satiuo ac hortensi. Omnibus quoque vis hypnotica, sed validior nigro, quod malignæ cuiusdam qualitatis est particeps, adeo ut, si quis immodicè eo utatur, veterno quodam, tanquam lethargicus detineatur.

Vires.

E papauere vulnerato, & aliquando sponte gummeus quidam liquor dimanat, quæ ῥατ' ἐξ ἡλίου, ὄπυον, & ὄπυον antiqui nominarunt, ad sensus stupefaciendos, somnum conciliandum, & immanitatem alicuius doloris placandam, vel certè fallendam utilissimum, quo solent Turcæ castra sequentes uti, ut ad pugnam sint alacriores, & tanquam ebrii ad pericula quæuis minus formidolosè sese præcipitent.

Opium.

De eius qualitatibus primis adhuc certatur, cum primæ notæ Medici qui de re medicamentaria scripserūt, asseuerent frigidum esse, ultra tertium gradum; cui tamen qualitati refragantur illius amator & acrimonia, quibus organa gustus feriuntur, ac vellicantur: quod occasionem dedit multis calidum esse confiteri.

Opij qualitates.

De Semperuiniis. CAPUT VI.



EDVM plebeculæ jombarda est, quasi Iouis barba, Aizoon Græcis, Semperuium Romanis dictum, quod semper vireat, & quasi sit frondibus æternum, patientissimum frigoris, nec vlla hyemis rigiditate marcescens.

Aizon maius.

Nascitur in locis aridis, Soli expositis, ut super muris & pauperum tectis, ac domorum subgrundijs, in quibus latè fruticat, frondibus crassis, carnosiss, mucronatis, cynaræ ritu succulentis & virentibus, circa radicem densioribus, caule interdum pedali, aliquando humiliore; sæpius altiore, frondibus squamatim dispositis vestito ad cacumen, ubi in alas diuiditur paucas flosculis herbaceis & subrubeis coronatas.

Sunt autem aizoi multa discrimina, ex quibus tria in vniuersum agnosco genera, maius, minus & medium. Ad maius, si nominis & effigiei habeamus rationem aloë ipsa non præter rationem potest referri: hanc enim ex illius sobole quasi natam vtriusque conditio

Aloë ad Aizoaspectat.

Aizoon
medium.

contendit. Ad medium, Crassula, seu Telepion Græcorum, quod officinæ fabam inuersam, vulgus Orpinum nominat, vt etiam militaris aizoides, sedum aquaticum dictum, videtur attinere.

Nam vtrumque peruiuax est, perpetuòque virens: & aizoo valde cognatum, estque medium inter semperuiuum maius & alia omnia mox describenda: atque rectius aizoon medium dicitur, quàm aliud quoddam hortense, teretifolium & esculentum, quod acetarijs admiscetur, nonnullis paruum, alijs medium sedum, vulgo *Triquema-dame*, nuncupatum, quod à radice paruula ramulos multos & graciles edit, foliolis onustos paruis, oblongis, rotundis, carnosiss, mucronatis, & flosculis luteis & stellatis.

Aizoon
tertium.
Illecebra.

Parua autem semperuiua plurima sunt: quorum minimum Illecebra est, Græcis *ἀνδραχὴν ἀγρία*, vulgò panis auium nuncupata, quam multi terriam sedi minoris differentiam constituunt. Pusilla ac pulchella planta est, ramulis multis repens: floribus aureis, stellatis. Muros & loca saxosa amplexatur: gustu calidissima est, & exulceras, vnde Germani piper murinum nominant.

Secunda aizoi parui differentia quibusdam Crassula minor, Italici *Granellosa*, Officinis vermicularis, & aliquando Cauda muris dicitur. Paruula quoque planta est, foliolis, rotundis, oblongis, carnosiss, instar vermium mucronatis, è totis ramis exilibus, breuibisque pendulis, flosculis pallidis, & interdum albidis, vnguenti martiati compositionem ingreditur. Hæc duo aizoa minora insigniter calefaciunt & exulcerant.

Aizoon
tertium.

Tertium est sedum quoddam maiusculum, æstiuum dictum, quod furculis aliquanto maioribus assurgit, folijs rotundis, carnosiss vt vermiculata: sed maioribus. Nuspiam semper viret, sed adueniente hyeme marcescit.

Aizoi va-
rietates.

Plures adhuc alia stirpes, folio sempiternæ, ac perpetuò virentes, & Semperuiuis vultu, viribusque cognatæ, ad eorum familiam iustè referuntur, vt Aizoon hematoides, Aizoö scorpioides, Sedum quoddam petreum montanum, ac pusillum, aliud quoddam magnum & arborescens, aliud quoddam magnum & arborescens, aliud & pusilliss, rigidissque furculis fruticis more assurgens.

Vires.

Aizoom maius refrigerat ordine tertio: Ob id ad erysipelata, herpetas & inflammationes quasuis valde conuenit. Ex minoribus quædam refrigerant quidem, sed excessu minore, alia efficaciter calefaciunt simul & exulcerant, vt vermicularis & illecebra.

De Cynoglosso. CAP. VII.



YNOGLOSSO folia sunt mollicca, lenia, oblonga, par-
calanugine pubescentia, ad tactum minimè aspera, ex
glauco virentia, effigie & mollicie linguæ canis æmula.

Surculi ei teretes sunt, incani, cubitales & sæpè lon-
giores, in alas diuisi, floribus puniceis ac purpurascenti-
bus coronari. Singulos flores consequuntur quaterna semina, parua
simul cohærentia, hirsuta & lapparum modo vestibis inhærentia.
Subest radix crassa symphiti magnitudine & colore, atque odore
penè soporifero, cuius laudatur vsus ad acres & tenues fluxiones:
Multum enim increassat & manifestè refrigerat, vnde ambustis vri-
liter à mulierculis adhibetur. Frigida & sicca creditur gradu secundo,
facultatemque habet cohibendi & increassandi: Ob id basim præstat
quibusdam catapotijs ab eo denominatis, quæ dantur efficaciter
omnibus morbis qui ab humoribus fluentibus proficiuntur.

De Plantagine. CAP. VIII.



PLANTAGO vel aquatica est, cuius tres agnoscun-
tur differentiæ raro ad medicos vsus ductæ, vel ter-
restris & communis, à planta absolutè plantago di-
cta, cuius frequens sanitati tuendæ & morbis profligandis vsurpatio. Eius duo à Dioscoride traduntur
discrimina, maior & minor. Maioris tres sunt varie-
tates, vulgaris, incana & rosea.

Vulgari, folia betacea sunt, crassa, lata, latèque virentia: caulis
angulosus, subruber, interdum cubitalis, sæpè breuior, in summo
spicatus, tenui semine ac copioso prægnans. Nascitur in vdis & la-
cunosis locis, & secus vias.

Rosea dicitur quod umbellam herbidam, patulam, foliolis per-
multis, rosæ modo, simul cohærentibus compactam gerat. In cate-
ris supradictæ prorsum similis est.

Minor plantago folijs viret angustioribus, minoribus, molliori-
bus & tenuioribus: cauliculo anguloso in terram inclinato, flosculis
pallètib, seminibus paruulis, surculorū summitatibus cōnatis. Vo-
catur in Officinis lanceolata & aliquando Lanceola, quod eius fo-
lia lanceæ cuiusdam ritu sint acuminata. A quinque fibris &
velut neruis quibus habet distincta & velut sulcata folia interdum
quinqueneruia nominatur: Vt etiam Septineruia, cū præter quin-
que fibras insignes aliquando paruulæ adhuc duæ quibusdam in fo-
lijs emicant. Nonnulli deprauatè ex quinqueneruia Centineruiam
effecerunt. Vocatur & Arnoglossum, quod folia agninae linguæ si-
militudinem referant. Speciatim tamen quibusdam sic tantum dici-
tur, quæ folia promit rotundiora & lanuginosa.

Quinque-
neruia.

Vires.

Plantago refrigerat & siccat ordine secundo, astringit, densat, cohibet, abstergit: Ob id ad herpetas, erysipelata, inflammationes, & omnes sanguinis eruptiones conducit, fluxiones sistit, dysenteria & omni alui fluori conuenit, putredinem arcet, & partes quascunque roborat.

De Centinodia. C A P. IX.



CENTINODIA à nodorum frequentia, vt aliquando Seminalis & polygonum à seminis multitudine dicta, nunc Corrigiola, nunc a cohibendo sanguine, Sanguinalis & sanguinaria, interdumque Proserpinaca, vel potius Serpinaca à serpeño nuncupatur. Herba est humilis, humi reptans, graminis ritu, ramis exilibus, copiosis, nodosis & geniculatis, foliis rutæ, sed longioribus, mollioribusque, sub quibus minutulum & multum semen turget; præuiis flosculis ex rubeo pallentibus. Nascitur sponte in locis incultis & semitis, pedibusque solet conculcari, nec imbecillius viret.

Vires.

Polygonum mas, sic enim ad alterius fœminini differentiam dicitur, vim habet refrigerandi, astringendi & spissandi eximiam; proinde, contra herpetas, ignem sacrum, & omnem inflammationem valet.

Succus eius per os sumptus, cuiuslibet partis profluuium & excreationem cruentam compescit: aluum impensius fluentem sistit.

Datur & fœliciter contra stomachi ardorem, & venenatorum animalium morsus.

Polygonū
fœmina.

Aliud Polygonum, seu centinodia fœmina dicitur, vno caule, arundini tenellæ, vel magis equiseti simili in locis aquosis assurgens, densis geniculis, quæ folia tenuia piceæ frondibus similia in orbem conuestiunt.

Polygonū
marinum.

Datur & marinum quoddam Officinis ignotum, & inusitatum.

Polygona
rum.

Sunt qui vocum affinitate decepti pro polygono polygonatum, & vicissim pro hoc, illud assumunt, sed dissimilis est multum vtriusque effigies. Nam polygonatum, seu Sigillum Salomonis, planta cubitalis est & sæpè altior, caule rigido, incuruo, radice crassa & nodosa.

De Symphyto. C A P. X.



SYMPHYTA tria magna sunt, Alum, seu vulgare & consolidida maior dictum, Tuberosum & maculosum. Totidem media, petræum, Bugula & prunella. Parua verò multa, vt Bellides omnes, Margaritæ, à plebecula nominatæ, quarum multæ traduntur varietates, coronamētis potius, quàm Officinis dicatæ.

Symphytum

Symphytum malus seu consolida maior, & à foliorum similitudine, auricula asini dictum, caulem edit bicubitalem, folia ampla, longa, lata, crassa, aspera, hispida, ad buglossi effigiem accedentia, sed latiora, obscuriora & mucronata. Ex furculorum alis prodeunt velut foliorum productiones, in quibus flores eleganti serie dispositi, intus cani, pallidi, aut subrubei adnascuntur, quos nigra sequuntur semina, verbasci similia: subiacent radices glutinosæ, exterius nigrae, intus candidæ, quarum est in medicina frequens usus.

Symphytum refrigerat, contrahit, astringit, densat; Enterocelas cohibet, ossibus fractis medetur, sanguinis sereatum & fluorem sistit, dysenteriae prodest, & vulneribus consolidandis adeo est efficax, ut simul cum carnibus si concoquatur, easdem conglutinet.

Vires.

Symphytum maculatum, quod passim pulmonaria nominatur, thyrsis, fronde, flore præcedenti simile; verum folia ei breviora, in quibus albicantes maculae conspicuae sunt plures. Nascitur in sylvis & locis opacis ac umbrosis. Creditur ad vitia pulmonum opem adferre.

Symphy-
tum ma-
culatum.

Symphytum petraeum, quod in petris & saxosis locis nascatur, dictum, ex parvis & tenuibus ramis sese erigit, organi similibus, foliis parvis, capitulis thymi, radice subrussa, longa, crassaque. Sunt qui putent hoc symphytum esse, sed cum lignosum sit & odoratum, & capitula habeat thymi similia, non parum à bugula differt, ut mox patebit.

Symphytū
petraeum.

Bugula medium quoddam symphytum est, de quo senior ætas multa & mira prædicant, adhucque plebecula sibi persuadet eum nec Medico, nec Chirurgo egere qui bugulam habuerit: Addunt & qui saniculam. Folia gerit crassa, oblonga, parum & mucronata, & in ambitu incisa, & subrubra, caules quadrangulos, modicè hirsutos, flores ceruleos à mediis furculis ad fastigium multos. A nonnullis Morandola, ab aliis Laurentina, ab aliis consolida media nuncupatur. Herba vulneraria est, commendaturque plurimè ad disrupta, fracta, cæsa, conuulsaque membra.

Bugula.

Prunella seu Brunella, ut volunt nonnulli; ex symphytorum tribu est, humilis quidem planta, furculis tenuibus, quadrangulis, hirsutis, humi procumbentibus, foliis latis, mucronatis, sed brevibus, parum hispidis, obscurè virentibus, viscidis & pinguibus. Flores ut betonicae spicatim in furculorum summitatibus erumpunt, è ceruleo obscurè purpurei. Ad eadem commendatur ad quæ bugula: maximè verò ad linguæ nigredinem, quæ per febres oritur delendam, si eius decocto os colluatur.

Prunella.

De Oxalide. CAPVT XI.



NTER rumicis seu lapathi genera à Dioscoride numeratur Oxalis, non quòd sit vtriusque sapor similis, qui in lapatho subdulcis est, & ferè insipidus, in oxalide, seu acetosa acidus, vnde nomen, quod ἐξὺ Græcè dictum, modo ad folia lapathi mucronata, modo ad oxalidis acidum saporem accommodatur.

Acetosa autem omnibus nota est, eaque duplici genere agnoscitur, vna sylvestris, omnium minima & acidissima, quæ multo luxu fabulosis locis, macilentis & sæpè inter segetes nascitur. A Belgis Acetosa veruecina, ab aliis Vineta cognominatur.

Altera maior est, quæ in locis humidioribus delectatur, vt in pratis & hortis multis: cuius dux statuuntur differentia, vna quæ semper hortensis est, & repens, ab aliis effigie valde dissimilis; folia namque habet rotunda & colorem ex subcineritio virescentem, saporem verò acidum, vt reliquæ oxalidis species, sed palato magis arridentem. Altera maioris acetosæ differentia omnibus nota est, de eaque vox acetosæ absolutè intelligenda est, ob sacros seu magnos effectus Herba sacra quibusdam dicta.

Oxytriphyl-
lum.

Oxalis in memoriam reuocat oxytriphyl-
lum, seu trifolium acetosum, mulierculis panis cuculi, Officinis pluribus *alleluya*, Fracastorio, Luyula dictum. Planta humilis est, in locis syluosis vere nouo nascens, cauliculis tenuibus breuibusque, in quorum summitatibus foliola tria insident, tenuia, pallidè virentia, sapore acida, grataque. Flores è breuibus pediculis prodeunt candidi, quinque foliolis coherentes. Pusilla hæc herba cor recreat, putredinem arcet, refrigerat, & aqua ex ea destillata febribus continuis & pestilentibus confert.

Vires.

De Oxylapatho. CAPVT XII.



Lapathum.

NE huic simplicium examini confusio obscuritatem pariat, discrimen constituetur inter Lapathum, Hippolapathum, Hydrolapathum, Oxylapathum & Lapathum sanguineum. Lapathum simpliciter dictum, seu rumex olus est culinis expetitur, coquis *Patientia*, herbariis parella vulgò dictum.

Hippola-
pathum.

Hippolapathum vel latifolium est, vel rotundifolium: vtrumque cultum & Rhabarbarum monachorum, & aliquando Pseudorha recentiorum nuncupatum.

Hydrolapa-
thum.

Hydrolapathum duum est generum, magnum & paruum: vtrumque præcedentibus simile, nec nisi palustribus & aquosis locis latè virescit & adolescit.

Oxylapathum in locis incultis vberrimè prouenit, radice longa, *Oxylapathum.*
 crassaque, intus flaua, seu crocea, furculo bicubitali, brachiato, fo-
 liis longis, latis, striatis, acuminatis, semine herbaceo lato, ex pe-
 diculis minutissimis dependente, & tenuibus membranis inuoluto,
 colore rufo.

Lapathum sanguineum seu maculatum, multi non satis confide- *Lapathum sanguineum.*
 ratè sanguinem draconis vocitant, vt docebinus postea fusiùs &
 commodiùs suo loco.

Ex lapathis quoque est oxalis de qua supra, vt etiam herba quæ- *Piper Hen-*
 dam, nescio qua ratione Piper henricus dicta, quam spinaceum o- *ricus.*
 lus syluestre puto.

De Hepatica, hepatorio, & Eupatorio, seu agrimonia.

CAP. XIII.



ERBARIÆ doctrinæ periti Hepaticam, Hepato-
 rium & Eupatorium ita distinguunt, vt Hepatica sit
 lichẽ; hepatoriũ, vulgare Eupatoriũ; verũ Eupatoriũ,
 agrimonia: hæc tria quod hepati roborando & sanā-
 do conueniant, Eupatoria sæpè & rectè dicuntur.

Hepatica.

Hepatica autem sæpè nominatur Lichen, quòd
 contra lichenas omnibus remediis anteponatur, vel quòd lapides
 lingat. Folio constat succulento & crasso, petris vdis & vmbrosis
 adherente, sub quo cauliculi, pediculorum forma, capitula stella-
 ta habentes exeunt. Abstergentem modice, refrigerantem, ac ro-
 borantem habet facultatem.

Hepatorium à radice fibrosa moderatæ magnitudinis, furculos *Hepatoriũ*
 promit bicubitales, ac ramosos, foliis conuestitos oblongis, canna-
 binis, per ambitum ferratis: flores paruulos, muscosos: dilutè ru-
 bentes, qui vbi vmbellam pulchellam coronant & contabue-
 runt, desinunt in pappos. Eupatorium verum seu Agrimonia herba *Eupatoriũ.*
 fruticosa est, Potentillæ valde similis, sed foliis magnis virentibus *agrimo-*
 vtrinque in partes pluribus diuisis, per ambitum ferratis & hirsutis: *nia.*
 Caule tenui, recto, cubitali, vel altiore, piloso, ex cuius partibus
 diuersis exeunt flosculi, parui, lutei, quos sequuntur femina ad-
 modum parua & altera parte asperula, qua vestibus lanceis facilè
 adhærescunt. Agrimonia ab Eupatore inuentore, Eupatorium no-
 minatur.

Vim habet attenuandi & expurgandi, & peculiari virtute iccori *Vires.*
 & aliis visceribus prodest.

Non omittendum est Mesuem pro Eupatorio aliam plantã cubi-
 talem valdè amaram, foliis centaurii minoris, sed in ambitu ferratis
 & asperis vsurpare, quæ à nonnullis herba Iulia à Græcis Ageratum *Ageratum.*
 nominatur.

De Primula veris, seu herba paralyfis. CAP. XIV.

V L G A R I S huius herbæ varia denominatio veram dignotionem obscurauit; nam primiueriam, seu primulam veris, herbam sancti Petri, herbam paralyticam & arthriticā phlomidem, brachulā cuculi, Tusculanā violam, betoncam albam, & verbasculā vocitari co mperio. Sed inanis esto nomenclaturæ peruestigatio, modò res intelligatur ipsa. Primula veris dicitur, quòd primo statim Vere vireat & floreat: cuius tres præcipuæ traduntur varietates, hortēsis, pratēsis, nemoralis. Hortensis vel simplex est, vel multiflora; atque vtraque vel flore herbaceo; vel ex luteo pallecente. Quæ virent in pratis & syluis, foliis quidem valde similes, sed non parum dispares floribus qui in illis crocei, parui & ferè inodori; in his pallentes, magis patuli & odori.

Primula Veris folia multa promit, rugosa, betonica similia, sed longiora, latiora, pallidiora, è quorum medio centro multi velut styli exeunt tenues & longi, in quorum summitatibus dehiscunt modo tres, quatuor aut quinque flores sublutei, pensiles, summis labris denticulati. Aliquando & vnicus tantum flos pedunculo exili adnascitur.

A florum diuersitate octo differentias obseruauit. Aliæ enim florem herbaceum, ac viridem & elegantissimum gerunt. aliæ album, atque etiam venustum: nonnullæ rubeum, aliæ aureum, aliæ subflauum. Præterea quædam tantum simplici flore coronantur, aliæ multiplici, aliæ ita prolifico, vt alter alteri adnatus videatur. Quæ simplicem ac luteolum florem gerit, copiosa ac sponte prouenit in multis infimæ Neustriæ locis, ac maximè in agro Vallonienfi, in quo aliæ stirpes multæ insignes latè proueniunt.

Vires.

Neruorum resolutioni, seu paralyfi confert, & articulorum dolori.

Radicis decoctum commendatur ad infarctus renū expediendos, saburram protrudendam, & calculos vesicæ expellendos.

De Brassica hortensi. CAPVT XV.



RASSICA seu caulis, Græcè dicta Crambe, adeo vulgaris est, vt superuacaneum videretur, longo verborum amplexu eam designare, cùm propter esum vbique gentium & locorum feratur, plantetur, colatur, eius tamen omnes varietates non omnibus in regionibus latè virent, sed quædam hanc, aliæ aliam tellurem postulant: vnde quædam Sabauda dicitur, quod Sabaudix tractu magis delectetur, quæ multum patula est, parùm occlusa, foris virens, intus alba, alia marina, quæ maritimis in locis sponte nascitur; alia cauliflora, ac Italica, quæ non nisi in Italia, vel ex semine ex eiusdem solo aduecta, prouenit; alia vulgaris, quæ apud omnes vberimè fruticat, alia caulorapa, quæ medio caule turbinata est, seu rapata, & quasi bulbosa.

Præterea à foliorum conglomeratione, explanatione, incisura, planitie, læuitate, asperitate, albedine, viriditate, rubedine, obscuritate & capite crispo, racemoso, lacinioso, vel sessili, caulium, seu brassicarum varietates multæ desumuntur, quæ olitoribus & coquis, quàm pharmacopœis potius relinquendæ, marinam si exceperimus, vt magis medicamentosam.

Crassum succum brassica gignit, ac melancholicum, & caput ebrioso modo tentare creditur, vnde forsan à Germanis tam auidè in cibos recipitur. Rubra speciali dote pectori conuenit & alijs in Eclegmate de caulibus solet præferri.

Vires.

De Psyllio. CAPVT XVI.



SYLLIVM herba pulicaris, ab eius semine effigie dictum, planta est parua inter veruacta & sabulosas scrobes nascens, folijs Coronopo non multùm dissimilibus, oblongis, angustis, hirsutis: Coma è medio caule incipit, capitulis hinc inde ex alis foliorum eminentibus, spicatis, & squamatim pimpinellæ globulorū ritu cohærentibus, è quibus flosculi pusilli, pallidi, lanuginosi prodeunt: quibus succedit semen paruum, nigricans ac splendens, quod aluum mollit & clementer subducit.

In secundo gradu refrigeratorium est, in humectando & siccando quodammodo symmetrum ex Galeno, Hanc vim refrigerandi in Psyllio etiam agnoverunt, & asseruerunt Dioscorides & Plinius: Vnde mirari subit Mesuei falsum de illius qualitatibus iudicium, qui semen eius scripserit, quarto recessu calidum, acre, vlceraans & venenotum. Hoc credo, ex aliorū relatu præcipitèter scripsit, vel ex codice mendoso excerpserit, vel forsan, quod verissimū scripserat, abs quodā

Vires.

immutatum fuit. Minor igitur & tutior illius qualitas & vsus, quam ex Mesuei lectione patet.

De Tussilagine. CAP. XVII.



TUSSILAGO Romanis dicitur, Græcis Bechion, à presentissima vtilitate, quam tussiculosis & anhelosis præstat. Pharmacopœorum vngula caballina est, sic nuncupata, quod eius folia vnguibus equorum sint vtcunque similia, inferiore & auersa parte tomentosa & albicantia, superiore & aduersa, viridia.

Caulis eius ita brevis est, vt vix palmum æquet, vnde sine caule nasci nonnulli crediderunt, ait Dioscorides. Flos luteus, radiatus, aureus, taraxaci æmulus, qui nondum egressis foliis, Februario & Martio erumpit, & cùm paucos dies perstiterit, dehiscit in pappos. Radix tenera est, candida, geniculata, quæ vda loca, & fluminum crepidines amat.

Vires illius potissimum commendantur ad tussim & Orthopnœā, *Diosc. cap. 109. l.* ait Plinius, atque etiam ad thoracis abscessus, quos illius fumus per arundinem haustus rumpere creditur.

Tota planta nonnunquam Romanis dicitur Farfarella. A quibusdam adhuc Filius ante patrem nuncupatur. *3. Gal. li. 6. sim.*

De Lupulo. CAPUT XVIII.



LUPULUS salictarius, nunc in Officinis Lupulus dictus, planta scansoria est, quæ sensim proserpens arborum vestigia petit.

Nascitur sponte in sepibus & pratorum marginibus, folia habens aspera, cucumeris, aut bryoniæ modo triangula, frutices intextentia: flores subalbidus, herbaceos, multis folliculis squamatim compactos & racematim pendulos, in quibus paruum semen continetur. Apud Belgas in magna est autoritate, nam hoc frugibus admisto suas vindemias parant, potum nempe illis, vt & Anglis familiarem, quem Cereuisiam, zithumque nominant. Vere inchoante turiones adhuc renelli coquuntur, edunturque asparagorum modo ex butyro, vel oleo & aceto.

Cereuisia.

Lupulus moderatè refrigerat, sanguinis ardores compescit, bilem vtcumque ducit, meatus diducit, obstructions liberat, urinam mouet, ictero medetur, pituitam & aquam in Intercute per aluum exigit, & stomachi inflammationes sedat.

De Bistorta. CAPVT XIX.

BISTORTA sic ab intortis & conuolutis radicibus dicta, à quibusdam pro dracunculo, ab aliis pro Limonio, à nonnullis, malè tamen, pro Behen Arabum sumitur. Tolerabiliùs à multis Britannica nominatur, cùm eius quædam species asseueretur, & solo radicũ colore ab ea distinguitur: secundum quosdam, vtriusque tamen facies, & vis dissimilis. Nam britannicæ folia promit admodùm breuia, & instar cochleæ caua, vnde britannica cochlea nuncupatur. Peculiari dote commendatur Britannica ad Stomacacen seu Scēletyrben, graue malum Germanis multis & quibusdam Septemtrionalibus familiare, in quo similis interdum contingit, quæ Cæsaris olim militibus accidit, qui cū trans Rhenum iter fecissent, fontem inuenere, cuius aquam cū bibissent, dentes eis intra biduum deciderent, compagesque in genibus soluerentur. Est autem reperta auxilio herba quæ vocatur Britannica. Plin.

Cap. 3. Porro bistorta ex radice nodosa, intorta, & rubescente, folia long.
lib. 25. ga promit, lata & acuminata, rumicis instar, venosa, supernè virentia, infernè ex cæsis colore albicantia: caules teretes, cubitales, aut paulo breuiiores, à medio ad summum per interualla minoribus foliis circumuestitos, spicatos, & flosculis purpurascentibus micantes, semen paruum, triangulum, acetosæ ritu.

Radix potissimum bistortæ in vsus medicos venit. Inodora est, Vires, refrigeratoria & astrictoria: partes interiores roborat, putredinem arceat, venenis resistit, & morbis pestilentibus medetur.

De Fragaria. CAP. XX.



FRAGARIA perpetua fronde anno toto viret, nullis caulibus nixa, sed pediculos tenues, lanuginososque abs radicibus emittens, quorum nonnulli folia tantum, alii flores albos, & quinquefolios, gerunt: Quasdam adhuc fibras promit humi repentes, quibus sobolescit; vbi enim terram attingunt, agunt radices & nouellam plantam ministrant: folia in vno pediculo terrena, lata, oblonga, in ambitu serrata, pentaphyllo finitima. A flosculorum occasu globulus herbaceus erumpit, qui sensim augefcens albicat, maturefcens rubet, & morum paruum exhibet, aliquando candidum, molle, medullosum, vinosum, humidum, gustu suaue, minutulis granis refertum, quod Fragum à fragaria, vulgo Fraiza nominatur.

Radix subest fibrosa, capillata & nigricans, cuius, vt & foliorum in medicina vix commendatur vsus, licet ad vnguenti marriati

confectionem accedat, vis enim tota plantæ commendabilis in fructu est, ut rosarum in floribus, malabathri in folijs, zinziberis in radicibus. Sponte nascitur in sylvis & locis umbrosis, lætius tamen viret in hortis, & fraga fert crassiora & suauiora.

Fraga refrigerant, sitim sedant, æstus ventriculi compescunt, parum nutriunt, fugacemque alimoniam corpori exhibent. Aqua ex his stillatitia maculas delet, faciem expurgat, eamque nitidiorem reddit.

Vires.

De Pentaphyllo. CAPUT XXI.



PENTAPHYLLON seu quinquifolium sic à numero foliorum dictum, plures è radice vnica furculos mittit sæpius pedales, festucaceos: flores in summitatibus luteos, fugaces, potentillæ similes: folia à singulis pediculis quina, rarò plura, oblonga, in ambitu crenata serræ modo. Tota planta subhirsuta est, inalbicans, radiceque nititur oblonga, exterius nigricante, subrubra interius. Spontè prouenit ruri iuxta margines aruorum.

Alterum quinquifolium datur folijs magis crenatis, superna parte virentibus, inferna candicantibus & lanuginosis. Tertium quoddam inuenit ur repens, cuius viticuli tenues sunt, imbecilli, folia læuia, virentia, flosculi lutei, radices fibrosæ & exiles. In locis stagnantibus nascitur aliud folijs & magnitudine primo valde simile, floribus ut plurimum geminis, obscurè rubentibus, quibus capitulum suboritur seminibus multis refertum.

Vires.

Pentaphyllum (cuius præcipuè radix vsurpatur) ad tonsillarum & asperæ arteriæ inflammationes confert: contra alui fluorem & dysenteriam vtiliter datur: Coxendicum & iuncturarum dolores in potu sanat, erysipelata & scabiem curat, strumas discutit, herpetas cohibet, œdemata reprimat. Radicis adhuc tenellæ succus aduersus venena prodest, & contra iecoris & pulmonum affectus valet.

De Spargula seu aparine. CAP. XXII.



APARINE furculos habet & folia, vel mollia, & Mollugo, vel aspera & asperugo, vel Spargula & Asperula dicitur. Tota enim planta scabritie quadam tenaci prætereuntium vestibus adhæret, unde etiam Græci Philanthron & Philadelphion nominat, Plinius Lappaginè, vulgus Grateronem.

Est autem Aparine planta iuxta sepes, scrobes & inter sentes nascens, vicinis fruticibus adhaerescere solita, furculis imbecillis

ob

obsequiosis, quadrangularibus, plures cubitos interdum longis: foliis angustis, stellæ ritu decussatis, ac orbiculatim ramulorum geniculis coherentibus, vt in rubia, cui non parum similis est: flos ei paruus, albus: semen durum, album, rotundum, concavum, umbilici forma, vnde Omphalocarpon quibusdam dicitur.

Aparine modicè extergit & desiccat: Succus totius plantæ haustus ex vino, phalangiorum & viperarum morsibus auxiliatur: Is infusus aurium doloribus medetur: folia trita, in fæce vini collecta strumas discutunt. Vires.

Spargulæ vel potius mollugini valdè simile est, alia planta, quæ à Gallion. lacte cui aliquando additur pro coagulo nominatur; idipsum enim citissimè coagulat.

De Scabiosa. CAP. XXIII.



SX veteribus vix scimus, quid sit Scabiosa, cum Stœbe Dioscoridis non sit, nec Pfora Aëtii. Est verò planta ob frequentiam & præstantes effectus notissima, folia gerens oblonga, lata, hirsuta, laciniata & incisa Erucae ritu. Radix illi admodum simplex & longa, caulem sæpius vnicum, sesquipedalem, interdumque longiorem promens, in cuius fastigio flos conspicitur, compluribus flosculis factus, quorum circumambientes maiores sunt, medii minores: Omnes cum staminibus connatis è casto colore inalbiant.

Est & altera paruula Scabiosa, minor dicta, vix palmum alta, quæ illi flore, foliis & colore optimè respondet. Tertia quædam est media magnitudinis, ouilla dicta, cuius folia latiora sunt, oblonga, hirsuta, ambitu crenata. Quarta datur, primæ non multùm dissimilis: caules gerit cubitales, foliosos, & flores discorum instar in surculorum summitatibus è cæruleo albicantes. Scabiosa minor.
Scabiosa ouilla.

Scabiosa scabiei mederi creditur, pulmonem purgat, tussi confert & aliis thoracis affectibus, necnon pestilentibus morbis, nonnulli frigidam putant, alii calidam, alii temperatam, nec vlla qualitate exuperantem. Vires.



GOSSIPIVM, siue Xylon, vulgò bombax dictum, planta cubitalis est, ramosa, brachiata, folijs vitis, sed minoribus, floribus luteis, in medio purpurascens, qui post se nucas relinquunt, aut potius mala paruula, aristolochiæ rotundæ magnitudine, quæ mature scientia sponte dehiscunt, exitumque parant liberum mollissimæ, albissimæque lanugini, intus conceptæ & editæ, vnâ cum semine, forma cubebæ copioso, medulla alba turgido, & exterius nigricante. Illa lanugo in multos vsus humanos trahitur, semen tantum in medicos, eosque multos. Nascitur Gossipium, Barbaris ac Arabibus Cotum nominatum, in Sicilia & multis Italiæ & Germaniæ locis vdis & Soli expositis.

Vires.

Semen cotonis seu Gossipij tussientibus, difficilè spirantibus, anhelosis & tabidis prodest, necnon alijs vitijs pluribus pulmonum hepatis & renum. Oleum ex eodem per expressionem tractum, pustulas & lentigines faciei delet.

De Hispidula, seu Æluropo, quæ vulgus Pedem cati nominat. CAP. XXV.



Similitudine pedum quorundam animalium, quam multæ stirpes referunt, denominationem mutuantur, vt Lagopus, Coronopus, Leontopodium, pes vituli, seu Aron, vngula caballina, æluropus, vulgò pes cati, qui à tomentosa lanugine, nunc Pilosella, nunc Gnaphalium, & sæpè Hispidula vocatur.

Planta est admodum paruula, in collibus ac locis siccis & Soli expositis nascens, ac viticulos tenues spargens, quibus fœcundè propagatur. Cauliculos emittit aliquando pedem longos, sæpius breuiorres, folia, admodum parua, flosculos suauè rubentes & interdum albidos, omnia lanuginosa, imò tota ferè planta extra terram lanugo tangenti & videnti est, maximè verò flores qui à tomento multo quo vestiuntur, pedem cati pilosum repræsentant, vnde nomen. Copiosam vidi in sylua Bierenfi, propè regium ac structura, omni que ornatu mirandum castellum Fontis-belaquæ, vnde Melodunum & Luteriam defertur.

Vires.

Inter moderatè refrigerantia & efficaciter astringentia atque agglutinantia reponitur, atque idcirco herba vulneraria perhibetur, cuius vsus maximè commendatur ad rupta, anastomoses vasorum, & pulmonum affectus, qui ob imbecillitatem, laxitatem nimiam, & continendi sanguinis impotentiam oriuntur.

Ex ea recentiores syrupum pararunt de pede cati illis dictum, cuius vsus ad vitia thoracis salubrem compererunt. Illius descriptionem in nostro Antidotario dedimus.

De Meliloto. CAP. XXVI.



TRIFOLIORVM multa sunt genera, ad quę refer-
tur tota melilotorum familia: Omnes enim tenuis
diuisuris folia habent seiuncta, hisdem in locis virēt,
& faciem penē eandem sortiuntur. Sunt verò tres
præcipuę meliloti varietates: prima vulgaris est, in-
ter segetes passim in Gallia nascens. Secunda mul-
tò rarior flosculos albos gerit, surculos, & folia priori similia. Tertia
omnium rarissima, quia peregrina, flores eructat purpurascens, in-
terdum cæreuleos & elegantes; In Syria prouenit copiosa.

Vulgaris, forsan Sertula Romanis dicta cauliculos hinc inde spargit
multos, pedales, teneros: folia tribus diuisuris determinata, trifolio,
aut potius fœnugræco similia, in ambitu aliquantulum fimbriata;
flores luteolos, vel melinos, pisorum effigie, acervatim velut in spi-
cā coactos, à quorum occasu perbreues erumpunt siliquę latiusculæ
& nigricantes, semine paruo pallidoque turgentes. A quibusdam
Trifolium odoratum, ab aliis corona regia, à nonnullis Serta & Ser-
tula campana vocatur.

Melilotus in qualitate refrigerante & calefaciente ambigere vi-
detur, sed astringendi quamdam facultatem obtinet. Omnes inflā-
mationes emollit, præcipuē vteri, sedis, in passō decocta & illita.
Peculiariter & contra meliceridas efficax: Succus eius cum passō in-
stillatus aurium dolores sedat: Cephalalgiam lenit, si cum aceto &
rosaceo adhibeatur.

Vires.

De Lino. CAP. XXVII.



LINVM equē de planta & semine intelligitur: Planta
suo cortice ad syndonum texturam, semen sua me-
dulla ad medicinam commendatur. Est verò planta
exilibus cauliculis, cubitalibus, foliis oblongis, acu-
tis, floribus cæreuleis & speciosis, post quorum celerem
occasum (breui enim decidunt) capitula parua sese produnt, semine
rufo, oblongo, læui, glabro, splendente grauidata. In Gallia escu-
lentum non est, ut neque his in regionibus, ubi lautē viuitur; Olim-
tulum, melli adiectum & frixum rusticis Asianis in frequenti cibo
fuit, quoquo tamen modo apparatus vix suaue est & salutare; Sto-
macho enim aduersatur: Ob id ad vestimenta & medicamenta,
non alimenta feritur.

cap. 123
lib. 2.

Easdem vires linum habet, quas & fœnum Græcum. Dioscor. dis-
cutit, emollitque intus & foris inflammationem. Eius decoctio ero-
sionibus vuluę & aluo ciendæ utilis. Oleum ex semine trito & tor-
culari expresso, lenit, emollit, lentigines aufert, varos & cutis vitia
emendat.

Vires.

De Fœnugræco. CAPVT XXVIII.



FŒNUM Græcum siliquosa planta est, ex vnico caule primùm emergens, dein multos in ramos, alafque brachiata, folia gerit trifolio pratensi non multùm dissimilia, sed rotundiora, minora & supernè magis virentia, infernè subcineritia: Flores exiguos & albicantes, sequuntur siliquæ longæ, incuruæ cornicularum ritu, in quibus semina angulosa, flauescencia, pisi parui magnitudine continentur. Fœnum Græcum in Officinis dictum, Hippocrati Epiceras, Theophrasto Buceras, Dioscoridi Tellis nominatur.

cap. 24.
lib. 2.

Vires. Farina fenugræci vim habet emolliendi & discutiendi: Cum aceto & nitro subacta lienem minuit: suo lentore lenit & calorem mitigat: cum oxymelite in pultem redacta podagricos dolores aufert. Fœnum Græcum inquit Galen. feruentes inflammationes irritat, quæ verò minus sunt calidæ & magis duræ, eas digerendo curat. Illius sapor & odor calefactoriam qualitatem denuntiant, licet in refrigerantium vel magis temperatorum seriem retulerimus.

De Ticeribus rubris. CAPVT XXIX.



LEGUMINA multa sunt, inter quæ primas tenent pisa & fabæ, quæ ad alimenta potius referuntur & cicera quæ ad medicamenta. Sunt verò cicerum, vt pisorum multæ differentia. Aliud enim dicitur cicer satium, aliud syluestre. Satiuum videtur idem esse cum Arietino, à Dioscoride, solùm nomine tenus descripto, cuius est magnus in Italia prouentus, vbi non tantùm ad Medicinam, sed mensam trahitur. Folia fert pisis affinia, sed minora, flores ex purpureo puniceos, siliquas rotundas, multis granis prægnantes. In quibusdam locis cicera planè alba sunt, quæ non raro esitantur, in alijs nigricant; sæpè ex fusco purpurascunt, cæteris præstantiora, & ad medicos vsus magis expetita.

Diosc.
ca. 126.
lib. 2.

Vires. Est aliud cicer syluestre, folijs parùm, sed semine multùm satiuo dissimile. Vtrumque renum vias aperit, menses ac partus expellit, lac auget, extergendi facultatem obtinet. Flatus gignit, & veretri tentiginem excitat.

De Orobo, *sive Eruo*. CAPVT XXX.

R V V M Græcis dicitur, quod in Officinis Orobus, quoddam nempe genus leguminis ciceri multum simile, in locis macilentis nascens, in quibus magis delectatur: nam in solo pingui satum, sæpè nimis luxurians corrumpitur. Eius duo traduntur discrimina, vnum candidum est, quod dulcedine præstat, estque minùs vulgare, alterum rufum, quod in omnibus Pharmacopolijs solet haberi. Vtrumque notum omnibus, Dioscoridis iudicio, multi tamen cicerculam agrestem, seu Eruiliam, frugibus infensissimam pro orobo negligentius assumunt: Illa enim verius sylvestris vicinæ quædam species esse videtur, quæ spontè, ac sine satu, inter segetes, etiam inuitis agricolis nascitur.

Orobus verò Domesticus magis seritur & colitur: Assurgit autem cubitali culmo, & interdum longiore, geniculato, incuruo, concauo, leniter striato: folijs & floribus ad cicera accedentibus. Surculis adnascuntur siliquæ teretes, granis protuberantes ternis, aut quaternis, nulla disiunctis membrana.

Desiccatur Eruum manifestissimè; Tam lentè verò calefacit, vt temperatum à multis credatur: Incidit, attenuat, extergit, obstru- Viret. ctiones tollit, resoluit, Vix vnquam per os sumitur: Sapissimè adhibetur exterius; Seminis enim illius farina in cataplasmatibus celebratur.

De Lupinis. CAPVT XXXI.



V P I N V S è fabarum genere videtur esse; Caulem enim edit vt faba, rectum & suapte natura stantem, sed rotundum, cauum & aliquantulum tomentosum. E radice ferè singulari & fibrosa caulis emergit cum ramis alterno situ dispositis, folijs Staphysagriæ emulis quinquefariam dissectis, floribus albicantibus, æstate ad Autumnum ter erumpentibus, quibus defluxis adolescunt, siliquæ fabaceis minores & magis planæ, quibus singulis, quina, senave grana intus continentur, rotunda, compressa, foris albida, intus sublutea, & perquam amara.

Lupinus editur coctus, diebus ante multis maceratione in aqua suam dimittens amaritudinem. Lumbricos enecat illitus, aut cum melle linctus, aut cum posca potus. Eius decoctum alphas, achoras, scabies, pforas & vlcera maligna curat, partim digerendo, partim extergendo, & citra mordacitatem siccando: strumas & parotidas in aceto cocti discutiunt, & cicatricibus colorem candidum reddunt. Propter amarorem vtcunque calefaciunt, non ineptè tamen in hac sectione describuntur.

De Hordeo. CAPVT XXXII.



ORDEVM vt pro cæteris cerealibus vtilissimum sic notissimum, cuius, si sationis tempus spectetur, duæ sunt differentiæ, vnum dicitur Autumnale: cuius stipula spica, granaque maiora sunt, aliud verum, quod omnibus sui partibus minus est. Spica vtriusque vtrinque vallatur aristis, folliculis multis, incluso grano, oblongo, rhomboide, meduloso.

Ad hordei familiam refertur vtraque Zea, quam Itali Speltam, nonnulli Speautram nominant, vt & Soucriston vulgo *Sourgeon* quasi succurrens genti dictum, nec non aliud segetis genus, quod multi Zeopyrum, alij hordeum nudum vocitant, quod in Cappadocia *cap. 2. de attē. diætā* provenit, vt asserit Galenus. Ad segetem adhuc alia multa multi cerealia reducunt, vt Olyram, typham, brisam, eteocrithon & ori *cap. 2. lib. de ptisan.* zam, quam hordeum, distichum, & galaticum nominant. Olim in India nascebatur hordeum in panis esu gratum & salutare, equis vero deleterium; Hoc enim oblatum equis Alexandri vt manderent, necabat eos primo, dein cum palea exhibitum desiit esse noxium. Aliud nascitur in Thracia ad Gedropolim, quod à iumentis etiam famelicis non attingitur. Cuius rei causam Theophrastus tribuit malo illius odori, licet ab homine non percipiatur. Quod à cortice nudatur exasticum & cantherinum à quibusdam nominatur.

Vires,

Hordeum autem vulgare refrigerat & exsiccat, habetque deterius quippiam, vnde panes hordeacei per aluum citissimè subducuntur, & exiguum corpori præbent alimentum. Quod verò habet flatulenti, ait Galenus, elixatione deponit, proinde in ptisana conficienda iubet Hippocrates, vt diutissimè concoquatur.

De Sumach, seu Rhoe. CAPVT XXXIII.



HVS fruticis & fructus nomen est, idem Græcis & Latinis, sed cum adiuncto culinaria, vel obsoniorum, quod olim in culinis esset in vsu frequenti, & in obsonijs potissimum pro sale vsurpata. Nunc vero medicamentaria tantum est, & à Mauritanis Sumach nominatur.

Arbuscula est in locis petrosis vberius nascens & fruticans, ad tres quatuorve, & interdum quinque cubitos adolescens, ramulis multis discriminata. Folia profert ex pluribus fraxini modo cohærentia, quorum medius neruus, siue costa aliquantum rubet, singula vero foliola in albicant oblonga, lataque & ambitu serrata. Flores

emittit Iulio mense candicantes, racematim Lillacis ritu congestos. Fructus Autumno parvus maturefcit, cum semine parum lato, lentis instar, exiguo, ac rubente. Vocatur etiam Rhus coriaria, quòd eius folia densandis corijs apprimè conueniat, vt & alia stirps Cotinus coriaria, ob id dicta, quæ inter Rhos differentias numeratur, sed eius in medicina vsus nullus.

Rhus culinaria, seu Sumach, cùm sit austeræ qualitatis, multùm astringit & desiccatur, conuenitque dysentericis & fluxionibus cohibendis, muliebres fluxus sistit, hæmorrhoides compescit. Huius siquidem folia & fructus insigniter astringunt, gradu tertio resiccant, refrigerant secundo.

De Myrto. CAP. XXXIIII.



MYRTUS vel syluestris est, quæ in multis regionibus calidis, ac locis incultis sponte frutescit, vel domestica, quæ cultura eget, cuius duæ agnoscuntur species, vna dicitur minor effigie buxi, sed folijs acutioribus, vt rusci, baccas nigras gerit, hederæ æmulas, ac vineo succo grauidatas, vnde nigra sapiùs myrtus dicta. Propter eius gratiosum odorem, faciemque perpetuò virentem valde commendatur, seduloque nutritur in hortis, & fictilibus, in vasis transplantata in multarum ædium fenestris ad delicias, & ornamentum custoditur, nec rarò prostat Pharmacopoliorum vestibulo.

Est altera minor, alba dicta, quod folijs latioribus est, longioribusque, vt mali punicæ, & colore minùs obscuro ac ex albo virescentè, vnde cognomen. Cultura nonnunquam in arboris mediocris altitudinem assurgit, vt nos in quibusdam hortis maritimis vidimus. Vtraque myrtus flores promit albos; suaueolentes, ex quibus arte debita aqua stillatitia elicitur suauissimè fragrans.

Circa myrti caudices adnatum quid verrucosum, inæquabile, ac concolor prominet, quod velut manus myrti ramos amplectitur, Myrtidanum à Dioscoride appellatum: Sed nullus nunc eius vsus, cùm ab institoribus nec ematur, nec adferatur, nec vaneat.

Est & alia syluestris ac paruula myrtus, quæ in locis syluosis, siccis, macilentis, aëri expositis delectatur, quæque baccas fert nigras, esculentas & suaues, quas multi vaccinia, quasi baccinia nominant; Alij alijs nominibus ad arbitrium fictis designant: In Normania, vulgus à colore nigro, qualis est Æthiopum, qui Mauri vocantur, moreta dictos fructus appellat.

Myrtus ex contrarijs substantijs constat, vincente frigido terreno: habet, & tenue quiddam calidum, ob id ex Galenò efficaciter desiccatur.

Fructus autem vt & folia vtiliter & assumuntur, & adhibentur,

Vireo.

Myrtidanum.

Myrtus syluatica.

Vaccinia nigra.

Cap.
156. li.
primi.

Vires.

& propter qualitatem astringentem, sanguinis excretiones sistunt, atque alios quosvis humores profluentes compescunt. Eorum decoctum ad laxatos artus, & ad ossa fracta atque ferruminationi repugnantia valdè prodest. Alia quoque multa commoda myrtus pollicetur, de quibus videndus Dioscorides. Cap. 156. l. 1.

De Millefolio. CAP. XXXV.



VLTAE stirpes à foliorum pluralitate & incisura multiplici millefoliorum nomen assumunt aliquando, vt Achyllea, Olyris, & Stratiotes aquaticus, semper uiuo similis, qui secundum Plinium in Aegypto tantum nascitur, vt etiam Stratiotes Chyliophyllum, & Myriophyllum, de quibus diuersis capitibus loquitur Dioscorides.

Chyliophyllum.

Stratioti chyliophyllo cauliculus brevis est, folia pennas iuuenum auicularum imitantia, breuitate & scabritie ad syluestre cuminum accedentia, flores umbella densa anethi modo fulciti, parui, candidi. Nascitur secus vias in locis aratro non procisis.

Vires.

Eximij est vsus, inquit Dioscorides, ad vlcera vetera, recentiaque, profluentem sanguinem & fistulas, vnde rustici Carpentariam, seu herbam fabri lignarii, qui vulgari idiomate, dicitur illis carpentarius appellant. A nonnullis militaris herba nuncupatur. Cap. 103. l. 3.

Myriophyllum.

Myriophyllo caulis vnicus est, tenellus, vnica è radice prodiens, innumeris foliis, tenuibus, capillaceis, fœniculo similibus, surculus flauescit varius, ac veluti ex industria sic delineatus. In pratis & locis vdis nascitur atque palustribus.

Vires.

Qualitatem habet astringentem, exsiccatoriam & vulnerariam: vulneribus enim adhibita optimè confert, ea ab inflammatione vindicando, desiccando & glutinando; vlceribus quoque prodest, & sanguinem vndecumque fluentem sistit.

De Tamarisco. CAP. XXXVI.



AMARIX, seu Tamariscus indignè fruticis nomine donatur à multis, cum sæpè in proceritatem assurgat notabilem, atque in crassitudinem tantam increseat, vt eius trunco & ramis calyces fiant, & alia vasa lienosis inferuentia: Et si Columellæ creditur è tamarisci trunco alvei excuantur, & aqua replètur, vt subinde sues bibant, sicque lienis incremento, quo sæpè & pessimè laborant sanentur.

Ramulos autem complures tamariscus emittit, & folia circa hoc frequentia, exilia, tenuia, rotunda, veluti quibusdam lineolis trans-

transuersis, ac obliquis, sine incisuris in superficie exasperata: flores muscosos, tomentosos, albidos, aut ex albedo purpurascens, quamplurimos, fastigia surculorum occupantes, ac in pappos demum euolantes. Subest radix lignosa, valde crassa pro arbusculi ætate.

Sunt autem Myricæ seu tamarisci duæ varietates, vna syluestris & infrugifera, seu sterilis, quæ in multis syluis nascitur, altera domestica, ei facie & viribus finitima, quæ semina quædam profert.

Abstergentis ac incidentis est facultatis, absque manifesta desiccatione: habet quoque astrictionem quamdam. Mirificè autem & speciali proprietate confert indurato, obstructo & imbecillo lieni, atque omnibus affectibus qui ab humore crasso & melancholico proficiuntur. Vires.



SECTIO SEXTA.

De Fructibus.



SIRPES easè quibus radices, culmi, ramuli, ligna, cortices, folia & flores Officinæ Pharmaceuticæ compositiones ingrediuntur. superioribus sectionibus accuratè descripsimus: Sequitur nunc, ut de fructibus tam esculentis, quam medicamentosis agamus, quibus Pharmacopolum rectè non carere potest. In eorum autem enarratione & examine fidei, eos primùm qui dignitate, suauitate, utilitate, magnitudine & usu communi ceteris præstant, explicabimus, cuiusmodi sunt Poma, sic dicta secundum Varronem, quòd potu, aqua nempe, dum inseruntur, indigeant, vel potius, quod ex his potus paretur suauissimus & saluberrimus: Vnde non sine ratione, pomorum inuentio, quæ Græci Mela vocant, Libero patri tribuitur, quod sic ex Theocritoliquet. Atque sinu medio Bacchus sua mala recondit.

De Pomis. CAPVT I.



POMORVM tam multæ sunt varietates, vt vix queant enumerari, imò nec dici: Nam cū tellus quæuis ipsa proferat, insitione miscellanea & maugonio variè immutantur: Arte enim agrestia cicurantur, acerba mitescunt, acida dulcescunt, pumila crassescunt, rubra flauescunt, aut alium colorem nanciscuntur.

Pomaceū. Et licèt vbiuis arbos pomigera, seu malus ferax sit, in Normania verò non modo fœcundior est, sed poma gerit præstantiora, esui gratiora, amiciorave, & saluberrimæ potioni conficiendæ, quam Pomaceum vocant, aptiora: Cuius, vt vini variæ differentiæ comperiuntur, sed quod ex pomis quibusdam Coccineis dictis, paratur, sapore suauitate & præstantia vix generoso vino cedit.

Sunt vero notissima cuilibet genti poma, quibus nec vlla mensa carere solet, nec officina, quæ eorum succis vtitur ad Confectionis Kermeticæ & Syrupi regis Saboris condituram, vt etiam ipsorummet carne, ad vnguenti pomati confecturam.

Generali autem pomorum nomenclatione fructus omnes opori comprehenduntur, herbaceo colore virentes, lignosi nihil exterius habentes, vt poma curtispindula, rambura, & similia. Contrà verò Acrodrya dicuntur, quæ putamen habent exterius lignosum, durumque, vt pistacia, nuces amygdalæ. Veniunt & pomorum nominatione mala cotonea, Armeniaca, Persica, & quamplures alij similes fructus.

Omnium verò præstantissima, suauissima & iucundè fragrantia, quæ vulgus Normanorum vocat gulorogeria, paradisiانا, passipomana, caluillea, rubeliana, renetea, curtispindula, & alia penè innumera, quæ ob salubritatem & suauitatem odoris, saporisque, habent hi in delicijs, etiam qui lautius viuunt.

Sydrum. Aliorum adhuc incredibilis apud Septentrionales datur varietas & vbertas; quæ quod sint, vel amara, vel acidiora, vel austera, vel dulcoacida, vel dulcoamara, in horreis post perfectum incrementum congeruntur, vt maturescant, deinde molis trusatilibus contunduntur, prælo committuntur, copiosus vt succus exprimatur, qui in doctis reconditus, diutissime & incorruptè seruatur pro potu Normannis familiari & salutari, quem à colore citri, citrum: & corruptè sydrum nominat.

Vires. Glycymela, hoc est, poma dulcia temperata sunt, acida frigidiora vt austera, amara calidiora. Omnia ferè aluum molliunt, sed maxime dulcia, humorem biliosum contemperant atque etiam melancholicum.

De Pyris. CAP. II.



PYRVS arbor à turbinata pyramidis instar effigie, sic dicta omnibus notissima est; Ea enim horti & vireta terrarum ubique luxuriant, fructus tamen ex eadem excerpti in Officinis ferè negliguntur, in mensis expectantur avidissimè: Pyra enim quædam adeò esui grata sunt, ut illis alia quævis edulia à multis postponantur.

Eorum autem in colore, sapore, magnitudine, & forma tot sunt varietates, ut enumerare nemo queat. Veteres quædam superba cognominarunt parua & ocysissima, quæ forte nostri hodie Moschatula, a gratioso sapore moschum referente nominant, quæ minima omnium sunt, quina, senave, sæpè plura, ab vno ortu prolaxis pediculis dependentia, quæ ferè omnium prima maturescunt.

Commendantur Lutetiæ & Rosea, à succo sic nuncupata, bicipitia, magnitudine satis conspicua, Callotia, Sertelia, Dagobertiana, Fusea, Bergamotia, Bonchristiana omnium gratissima, in agro Turo-nensi & Metensi laudatissima, ac penè in tota Gallia nunc frequen-tissima.

Laudantur & quædam à magnitudine; ut quæ libralia dicuntur, atque alia nonnulla crassiora, quæ primùm Rhodo aduecta sunt, unde Rhodensia nominata, qualia forsàn antiquis cucurbitana aut Pompeiana cognomine mammosa. Alia multa dantur his minora, carne firmisscula, quæ frequentius cocta quàm cruda manduntur, & hybernas mensas terminant.

Ex Pyris autem nunc in multis Galliæ locis potio paratur vini al- Pyraceum.
bi in colore, & calore sæpiùs æmula. In sapore non multùm varia, quam pyraceum nominant, quo non minùs, quàm mero ac vino generoso poti sese inebriant.

Exsiccantur ruri pyra in clibano, & seruantur ad quadragesimale tempus, seu Ictyophagiam: Aliquando coquuntur in defruto, sæpè cariophyllis configuntur, saccharo condiuntur, & seruatur pro bel-lariis, aut obsoniis.

Pyrorum genera, aut magis aut minus astringentia pro saporis as- Virēs
peritate aut dulcedine: decocta ut grata sic salubria, Cruda stomacho graua.

De Malo Citrio. CAP. III.



Limonium.

ITRIVM non tam dicitur Pomum medicum à Medo solo, quam à medicis dotibus, quibus pollet multis: Eius enim odor, cortex, caro, pulpa, succus, grana vires habent medicas, easque eximias. Ipsius autem tria potissimum traduntur discrimina, Primum limo, seu malum limonium dicitur, quod ob-

Citrium,

longa effigie turbinatur, & ex herbaceo colore viret, succoque turget acidior, acerbior, frigidior & cortice admodum tenui, nec

Poncerium,

ut aruntiorum amaro. Secundum vulgatius est Citrum, huic multum simile, sed colore magis luteo nitet, cortice crassiore, rugosiore & magis caperata, estque crassius, odoratius, medicatius, antidotis conuenientius. Quod ex eodem genere prægrande est, melonum modo, orbiculatum, cortice calloso, carnosum, pollicem interdum crasso, & superficie concolore, Poncerium, Citrionatum, pomum Assyrium, & pomum Adami vocitatur. Quæ omnia specierum vulgata nomina, à citro deflexa videntur, & affinem ut habent Ideam, sic quoque qualitates.

Limæ.

Ut ponceria magnitudine, sic Limæ paruitate omnia mala citria superant: vix enim mediocri ouum æquant, & multæ magnitudinem perfectam adeptæ, armeniaco malo minimè sunt crassiores. Harum nonnullæ oblongæ sunt, aliæ breues, ac rotundæ: Omnes suaueolentes, cortice tenui vestitæ, succo multo saturæ, sapore dulcoacidæ, ac palato gratissimæ. Vberes ac eximie in Italia, ac potissimum agro Lucensi proueniunt.

Citrus.

Arbores ex quibus colliguntur perpetuò virides sunt, lauri folio, non Cedri, licet sic visæ aut putatæ Theophrasto omnibusque horis pomiferæ, alijs namque nascentibus, alijs adultioribus, alijs maturiscentibus, alijs deciduis.

Vites.

Omnia citria refrigerant: putredinem arcent, cor recreant, & venenis obsistunt: Quod mirabili historia probat Athenæus de duobus reis, qui cum iussu regis Ægyptij aspidibus in prædam essent exponendi iuxta leges Ægyptias; in itinere singuli citrum à caupona quadam obuia, illorum vicem dolente oblatum comederunt, moxque ab istis serpentibus ferocissimis demorsi, nihil molestiæ senserunt: Quod admiratus Iudex, causamque quæritans, audiuit singulos singula citria in via esitasse. Postridie iussit vni dari, alteri denegari, ac denuò ad supplicium vtrumque deduci: Quo facto, qui comederat, nihil mali passus est, alter illato aspidis morsu, vndique liuidus factus confestim interiit.

Historia.

De Arantiis. CAP. IIII.



AVRENTIA, vulgò aurengia & aurea mala, ab aureo colore dicta, in arbore nascuntur, quæ parum à citria malo effigie distat. Idem enim color, odor, flos vt & folia, quorum tamen pars pedunculo proxima, non æqualis est, vt citriæ mali, sed veluti pinnata, & quasi gemina, dilutè virentia, odorata, & citriæ malo concoloria. Arbos ipsa parum procera est, ramosa multum, perpetua fronde virens, singulis mensibus atque etiam diebus pomifera, alijs nascentibus, alijs ruentibus, alijs maturefcentibus. Flores gerit toto anno albos, elegantes, suaueolentes, æstate fragrantiores, quorum nonnulli nodoso pediculo adhærescunt, & fœcundi sunt, alij steriles & enodes labuntur. Ex his aqua Naphæ vulgò dictæ stillatur, mira suauitate & fragrantia commendabilis, qua matronæ & delicatuli aulici vultum, & comam aspergunt, & manus abluunt.

Aqua Naphæ.

Ex Hispania, Italia, Gallo-prouincia magna aurantium vbertas in alias regiones defertur, quorum nonnulla dulcia sunt, & ingrata, vel certè gustui non satis amica, alia acida, iucunda, cardiaca & palato gratissima. Omnia verò rotunda, aureo colore nitentia, seu multum flauescencia, vnde mala aurea sæpius dicta.

Vires.

Quæ dulcia temperata, quæ acida refrigerantia, putredinem arcenia, venenis resistentia, cor roborantia: cortex verò acer & amarus, & calidus est, & propter odorem gratiosum intinctibus gratiosus & expetitus: Saccharo conditus oris commendat halitum.

De Granatis. CAP. V.



ARBOR punica, granata vulgò dicta, vt & fructus, malum granatum, à granorum quibus farctum est, innumera multitudine, vel forsan à regione Granata, vbi fruticat vberimè: Aëre calido delectatur, & solo minimè aquoso: folia gerit myrthea, & singulis annis caduca, florem puniceum, oblongum, aspectu iucundum, & effigiem calachi referentem; Balauustum vulgus nominat, licet id nominis, ad syluestrem Dioscoride iudice, potius queat deduci.

Duæ porrò sunt mali punicæ differentię, vna syluestris, quæ florem quidem gerit, sed infructuosum, quem scilicet pomum consequitur nullum; Altera domestica, cuius tres statuuntur species, vna quæ poma fert acida, altera quæ dulcia, tertia, quæ vinosa ac dulco-acida. Omnia ex rotundo sunt angulosa, crassa, granis innumeris, angulosis, succo multo immerfis prægnantia.

Cortex vocatur malicorium, cuius color ex viridi flavescit, instar vitrioli, cuius particeps perhibetur à Spagyricis, à nonnullis Sidio 1 nominatur. Flos oblongus, purpureus, pulcherrimus, veluti Cytinum referens, quem vnà cum flosculis ex eo erumpentibus Balau-
stium Plinius appellat.

Vires.

Qualitatem habet totum granatum astrictoriam & refrigerato-
riam: Sed præstantiores succus facultates habet, vt qui præter cæte-
ra, cor recreat, feruoribus stomachi auxiliatur, & cholera morbo
prodest. Dulcia tamen quæ apyrena vocantur aliquando, stomacho
inutilia creduntur.

De malo Cotoneo. CAP. VI.



CITONIA mala ex arbore prodeunt, quam à M. Ca-
tone Cotoneam, quasi Catoneam nonnulli dixe-
runt & scripserunt; Ante tamen longè à Græcis Cy-
do, vnde primùm fuit aduecta, nomen habuit. Li-
bentius crederem nomen hoc asciiuisse, à cortice to-
mentoso, & ferè bombacem, quem vulgus cottonem
vocat, referente; Tenui enim lanugine tanquam Cotone poma di-
cta videntur induta.

Est autem humilis arbor ex qua excerpuntur, sæpiusque tantùm in-
star fruticis assurgens: Cortice induitur asperulo, hinc inde hiulco,
& quasdam veluti squamas producente: ramos emittit multos, bre-
ues, tortuosos, cineritios: folia subrotunda, mucronata, supernè vi-
ridia, infernè albicantia, mollia, lanuginosa: flores albos, nonnihil
purpurascens: quinquefolios: fructus crassos, aureo colore fla-
uescentes, tomentosos, odoratos, halitu quibusdam iucundo, alijs
ingrato fragrant. Sapor omnibus idem, interior caro lutea; succus
austerus; Semen vt reliquis pomis membranis inclusum: & tan-
quam in capsulis reconditum.

Vbivis ferax est cotonea malus, sed maximè in regionibus calidis,
atque locis cultis & hortorum sepimentis, in quibus pomis pluri-
bus, aureis, melinis, fæta cernitur. Eorum quædam rotundiora sunt,
breuiora, minora, rotundiora, & pomorum vulgarium figuram ma-
gis referentia absolutè Cotonea dicta; Alia maiora, crassiora, lon-
giora, turbinata & pyris similia, vulgus Coignacea vocat, quæ cete-
ris bonitate postponuntur.

Quædam insuper candidiora, alia struthea, omnia tamen magis
lutea & ferè aurea, vnde & Chrysomela dicuntur. Quotquot au-
tem, tenui lanugine pubescunt, & odore fragranti quibusdam fe-
riunt caput.

Ex his parantur medicamēta multa Eustomachica, vt Myua, Citonia-
tū, Syrupi, quorū in mēsis tam sanorū quàm ægrorū frequēs est vsus.

Crudorum porro citoniorum vix vllus est esus; Cocta palato gratiora & naturæ amiora: ventriculum enim roborant, vomitum sedant, alui fluores reprimunt, Dysentericis & Cœliacis conferunt, & his qui vel sanguinem spuunt, vel fluorem mensium aut hemorrhoidum immoderatiorem perpetiuntur.

De Mespilis. CAP. VII.



MESPILVM pomum quoddam rotundum, primum viride, durum & nonnihil hispidum, dein rufum, ac molle dum maturuit, Trigranum quibusdam dictum, Galeno Tricocum, quasi triossum, quod tria intus grana quasi lapidea, aut ossicula seminis loco contineat, aliquando tamen quatuor, & sæpè quinque reperiuntur pro numero vnguicularum ex margine umbilici multum patuli exeuntium. Ante maturitatem tam acerbus est fructus hic, ut à quopiam deglutiri non queat; Maturum & gratum, & vltima mensa salutare.

Arbor ex qua decerpitur Nessierus vulgò dicta, duplici differentia notatur, vna syluestris est, spinosa, in sylvis, dumetis & viuis sepibus sponte nascens, quæ poma gerit parua, oblonga, per initia acerbissima, post maturitatem parum grata, Aronia Dioscor. vocat, Altera domestica cultu & insitione talis. Poma quæ profert crassiora, magis plena, vtcunque compressa, rotunda, altera parte sæpè hiulca. Vtraque tortuosa, rigida: hæc tamen spinis minus horret, Setania Dioscoridi, Satanea Theophrasto dicta.

Mali vulgaris assurgit magnitudine, ramis in gyrum comosis, & nonnihil aculeatis: folijs promissis, latiusculis; floribus albis, quinquefolijs, quibus poma succedunt mespila dicta, magnitudine mediocria: umbilico lato, quinque vnguiculis foliosis discreto: carne albida, austeraque, quæ dum maturescit, rufescit, dulcescit.

Mespila immatura acerba multum sunt & astrictoria, eorum Vires. tamen pulvis ex Ant. Musa, lapillos in renibus comminuit & excludit. Maximè verò id præstare creduntur eorum ossicula trita & assumpta. Ad fluorem alui cohibendum, & partes roborandas commendantur.

De Sorbis. CAPVT VIII.



ORBA parua poma sunt, qualitate mespilis affinia, forma & magnitudine multum dissimilia; vtraque enim initio viridia, dura, acerba, esui inepta; Per maturitatem rufa, mollia, palato non ingrata, & succo vinoso turgidula.

Sunt verò secundum Plinium quatuor sorborum discrimina, quædam vulgatiore & pyrorum instar turbinata, quæ Cornas rustici nominant, alia rotundiora malorum modo, quædam oliuarum ritu oblonga. Alia torminosa dicta. Dioscorides Pyroformium seu vulgarium tantum meminit, quæ scilicet ex sorbo seu Cormiero vulgari Autumno decerpuntur.

Est autem Sorbus arbor prægrandis, caudice recto, cortice læui, colore cineritio, folijs ex pluribus compactis, lateribus pediculi prolixioris coherentibus, fraxini, vel potius Orni æmulis, floribus candidis, minutis racematim congestis, quibus caducis fructus succedunt turbinati, primum virides, dein flauescentes, atque perfectè maturi, rufi, & molles. Quæ fructus oliuarum effigie profert, Torminalis, atque etiam Ornus sorbi syluestres creduntur.

Vires.

Vniuersum Sorborum genus acerbum est & astrictorium: ob id Dysenteria, & fluxionibus omnibus sistendis conuenit. Vulgaria autem ex vsu sunt frequentiore; vomitiones reprimunt, sanguinis eruptiones compescunt, & partes roborant. Ex his maturis, torculari commissis & expressis, vinum quoddam pallidulum paratur, pyraceo vicinum, quo plebecula in regionibus multis vtitur.

De Cornis. CAPVT IX.



ORNA fructus sunt oblongi, phaseolorum magnitudine, non tamen plani, sed rotundi, rubelli, nucleo intus osseo, albido, duro prægnantes, sapore austero cum quadam aciditate. Colliguntur ex arbore non multum procera, scabro vestita cortice, folijs læuibus, latis, mucronatis, venosis, Euonymo similibus. Prima ferme omnium floret, fructus æstate virides gerit, Autumno cornos rubentes dat, montes & valles diligit, & sæpè citra culturam nascitur. Habetur tamen in hortis multis, ut sint promptius ad manum fructus pro facienda medicina.

Est alia cornus thelycronia Theophrasto, quasi fæminicornus dicta, quæ caudice fungoso sese effert, & baccas fert Autumno maturescentes, perquam acerbæ, multum insuaues & cunctis animantibus ingustabiles.

Nodos

Nodos autem cornus omnis omnes habet per interualla geminos & inuicem respondentes, vt in vite & vitice, corticem ex pallido flauescentem, maris autem lignum adeò solidum est, vt duritie cornibus fermè respondeat, eiusque baccae succo cruento, austero & aliquantum acido pręgnantes turgent.

Corna refrigerant, desiccant, astringunt: Ob id vtiliter contra alui profluvia, mensium & hæmorrhoidum immoderatiorem fluxum Vires. dantur.

De Prunis. CAP. X.



PRUNORVM varietates nec lubet, nec licet persequi, cùm liceat aptius ex rei rustice & hortensis scriptoribus, quam nostris commentariolis illorum differentias omnes perquirere, quę ferè sunt inexplicabiles ac innumerę, insitione, mangonio & arte sic redditę. Eorum enim (si colorem spectemus) alia colore perfunduntur herbaceo, alia albo, alia eburneo; quędam luteo, aut ex albo flauescente, aut purpureo: Alia nigro aut violaceo, alia variegato, alia rubeo.

Distinctio quoque eorum sumitur à magnitudine, figura, sapore & loco: quędam enim vel parua, aut magna, aut mediocria: Alia rotunda, ouata, oblonga: Nonnulla acida, dulcia, austera, vel dulco-acida vel alterius mixtę qualitatis. A loco commendantur Damascena, deinde Brignolensia, tum Rhemensia & Turonęa. In prædijs tamen nostris nunc habemus præstantissima & suauissima, quę vulgus Pardigonia vocat, vt & imperialia dicta, necnon Damascena rubella, nigra & violacea, & quę Datta nominant: quę omnia mensas etiam lauriores nobilitant, & officinas locupletant. Damascena valde carnosæ sunt, crassissima & pleno nucleo grauidata.

*Prunida
& tyla.*

Colliguntur ex pruno arbore omnibus notissima, quod passim vbique & sponte nascatur, præsertim sylvestris, quę licet admodum pumila sit, & fructus parum suaues ferat, cultu tamen & insitione plurimum immutatur: Nam in proceram arborem abit, & pruna quotannis dat suauissima colono. Sed longius in rei notissimę dilucidatione immorari nefas.

Vires.

Pruna Græcis Coccymela, Siculis Brabylla dicta, humectant, refrigerant, emolliunt & ventrem lubricant; Ex Damascenis præsertim nigris elicitor pulpa ad Diapruni confectionem. Siccantur in furno pruna ad Ictyophagiam & medicinam, & saccharo conduntur ad merendam.

De Malis Armeniacis. CAPVT XI.

ARME^NIA^CA mala ob odoris gratiam & saporis dulcedinem plurimum arrident, & magnatum lautiores mensas tam cruda, quam saccharo condita nobilitant: Eorum enim & in halitu gratioso, & gustu iucundo suauitas etiam saturos ad se inuitat & allicit. Quidam ad Persicorum, alij ad prunorum genera referunt, verum inter vtraque media videntur esse, effecitque Iuniorum sedulitas, ut pruna quædam habeamus, quæ nunc pruna bricoccia, quæ scilicet in sapore, forma, magnitudine, partim pruna, partim abricoccia referunt, nominentur. Ab antiquis autem mala armeniaca tantum vocabantur, postea Galenus præcoccia nominauit. Nunc verò recentiores paucis literis mutatis abricoccia dicunt.

Leguntur ex arbore magnitudinis moderatæ, pyro videlicet minore & Persica maiore, duriore, durabiliore. Caudicem emittit crassissimum, ramos multos, non ut Persica prolixos, sed breuiore & crassiores: folia lata & mucronata pyri modo: flores albidus, primo Vere erumpentes, ante foliorum exortum; fructus rotundos Persicis similes, colore foris & intus luteo, carne multa, succulenta, palato grata.

Abricoccia humida censentur ordine secundo, frigida primo, vel potius temperata, ut dulcia omnia. Aluum lubricam efficiunt, & cito corrumpuntur in corpore infirmo, maximè si immoderata quantitate ingerantur. Eorum autem nullus in Medicina celebratur usus.

Vires.

De Persicis. CAPVT XII.

PERSICA, seu Persea arbor est plurimis Galliarum regionibus notissima & frequentissima, qua scilicet omnia penè vineta consita sunt. In mediocrem proceritatem assurgit, ramos emittens longos, fragiles, folijs raris, salignis ferè similibus, ambitu ferratis, gustu amaris & aroma vtcunque redolentibus, indutos: flores amygdalini finitimos, sed dilutè purpurascens.

Arborem hanc, inquit Dioscorides, prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translataque in Ægyptum, mutata natura innocuam, & in cibos receptam: Quod confirmatur etiam à Galeno lib. 146. de caus. symptom. & à Columella. Eorum tamen opinioni refragatur Mathiolus, sed coniecturis adeò leuibus, ut tantorum virorum authoritatem infirmare non queat, nedum improbare. Cap. 1. lib. 3.

Idem narrat Nicol. Monardus de Yuca planta Indica, quæ in solo vastissimo solo proueniens salubris est, in Insula verò Sancti Domini, aut alijs Insulis nata, periculosa. Ex illius radice panis *Cacani* Indis dictus conficitur suavis & sanus quo barbari læti lautèque suo more viuunt.

Poma autem profert abundè, albida pube obducta, sublutea, succulenta carne turgidula, & velut cruore quodam foris & intus variegata, aliquando prorsus lutea. Corticis externus color internam carnis tincturam ostendit, rubellus rubellam, luteus luteam, variegatus variegatam.

Cap. 19
lib. 2.
de aliment.
facult. Poma hæc rotunda quidem sunt, sed quæ altera parte parùm depressa cuiusdam rimæ figuram ostendant. Succus eorum Galeni iudicio prauus est, ut etiã caro, quia facilè corrumpitur: propterea syrupus, ex succo paratus, quibusdam vñtatissimus, nullo encomio commendandus, sed negligendus.

Mala Persica frigida & humida perhibentur recessu secundo, succumque exhibent citò corruptibilem, & pessimè mensa vltima sumuntur: ante alios cibos sumpta, minus mala.

Eorum nuclei calidi & sicci sunt, aperiunt, incidunt, extergunt, aduersus iecoris & lienis infarctus conferunt.

Folia amara sunt, calefacientia, incidentia & viscerum obstructions tollentiã, aluum subducentia, & bilem mouentia.

Ex floribus paratur syrupus hydragogus, & vermibus enecandis conuenientissimus.

Vires;

De Cerasis. CAPVT XIII.



ERASORVM multæ sunt varietates, alia enim sunt syluestria, eaque parua, longipendula, primũ viridia, dein rubra, & vbi maturuerint, nigra, Gallicis Merisia dicta, quasi amara; Alia domestica, multò crassiora, quorum alia rubra, alia nigra, alia alba, quædam alborubea. Omnium minima, præcoccissima, ingratiissima sunt merisia, quibusdam syluestria Cerasa dicta, quorum nonnulla planè rubra, alia nigerrima. Hæc sequuntur alia maiora, fugacia, dulcissima, tenerima, & adeò post maturitatem mollia, ut gestatum non tolerant, Guignea vulgo dicta, inter quæ alia nigerrima, & crassa, turbinatiore pomi figura, Actia veteribus & Iuliana nuncupata, alia obscurè, alia dilutè rubra.

In dulcedine principatum obtinent Duracina, quibusdam Pliniana, Francis Bigarella dicta, omnium durissima etiam matura, dulcissima, palato iucundissima, ut quæ adhuc formam cordis, vel parui cuiusdam scroti veruecini referunt. In salubritate reliqua superant Aproniana, quæ valdè rubra sunt, acidula & esui valdè grata.

Quædam adhuc suauiter & salubriter eduntur perfectè matura, crassissima, rotunda, obscurè rubentia, Agriota non inata. Sunt quædam acidula, alia austerâ, illa amarena, hæc Merona cognominan-

tur. Omnia cerasa, bigarellis exceptis, succo multo prægnantia videmus, inter quæ, nigra aut obscure rubra, tenera sunt, & suo cruore contrectantium manus inficiunt.

Vires.

Cerasa corporis succum laudabilem suppeditant: stomacho æstuanticonducunt, ventrem subducunt, febricitantibus vtilia sunt, humorem biliosum contemperant, & iecoris infarctus tollunt, quædam tamen hos effectus insigniùs pollicentur.

De Moris. CAPVT XIII.



DVÆ sunt Mori species, vna dicitur nigra, quæ fructus nigros, altera alba, quæ albos profert: vtraque procera est, radicibus flauis, caudicibus crassis, corticibus scabris, ac frondibus alni, longis, latis, iuxta margines serratis, quibus bombyces vescuntur. Præstantissimum verò sericum nent, cum albæ Mori folijs aluntur, vt quæ illis sint gratiora, & materiam suppeditent fericeis filis ducendis largiorem & aptiorem.

Fructus mori nigræ, quos Mora Celsi vulgus Pharmacopœorum vocat, suaues sunt, & sæpè mensis apponuntur, eorumque succo & Syrupus, & Rob conficitur, huius tamen vsus ferè nunc exoleuit.

Qui verò in albo moro nascitur fructus, quasi fatuè dulcis est, admodum ingratus, & ad alendum ineptus, itavt arboris præstantia, non tam ex fructu, quàm frondibus perquirenda, quibus dicti vermes educati sericeum vellus præstantissimum suggerunt.

Porro domesticarum arborum nouissima morus germinat, vt mēse Maio, cum scilicet hyemis planè desijt rigiditas: fructus fert Iulio & Augusto, oblongos, è granis compactos, moris in rubo nascentibus finitimos, sed longiores, crassiores, maiores, initio virides, per maturitatem purpurascens, postremò nigricantes, rubente succo prægnantes.

Vires.

Mora immatura refrigerant, & siccant ordine propemodum tertio, & valenter astringunt, atque ad oris & faucium inflammationes conducunt, ait Dioscorides. Matura verò humectant ac parum refrigerant: aduersus sitim valent, appetentiam prostratam reuocant, ventriculo non aduersantur: parcissimè autem corpus nutriunt.

Cap.
181. l. i.

De Moris Syluestribus & Idæis. CAPVT XV.



RUBUS vel syluestris est, spinis horridus *Cedrus* Græcè dictus & corruptè, batinus, vel domesticus & veluti cicuratus, qui quod in Ida monte fecundius luxuriat, Idæus nominatur: Cuius ut illius duæ agnoscuntur differentia, vnus fructu rubro, alter albescente, sed vtriusque syluestris fructus primùm virescit, dein rubet, tandem nigricat.

In dumetis, agrorum marginibus & locis incultis feracissimo prouentu, & agricolis importuno nascitur rubus surculis prolixioribus, lentis, obsequiosis, virescentibus, nonnunquam quadrangulis maximè antiquioribus, intus medullosis, foris aculeis minacibus, spinosis, folijs ex pluribus coherantibus, per ambitum incisus, supernè virescentibus, infernè candicantibus, asperis & secundum costarum longitudinem spinosis: floribus albis in surculorum summitatibus digestis, quos fructus sequuntur, officinis Mora bati, & batina dicti.


Rubus Idæus per se consistit, rectaque assurgit ad hominis inter-
dum proceritatem, surculis medullosis exterius paruulis spinis, non
multum horrentibus, exasperatis, folijs, & floribus syluestri similibus,
nec non fructibus, sed vel rubeis, vel pallidis, acinosis, esui atque ol-
factui pergratis. Nostrates Fræbœsias nominant, ab odoris, ut arbi-
tror, fragrantia, quam mandendo ore repræsentant, & illud præ cæte-
ris vinum laudatur, quod frambœsiam olere dicitur.

Rubus
Idæus.

Vires.

Mora syluestria vim habent astringentem & domesticis vicinam: manducata enim oris & tonsillarum inflammationes reprimunt, & fluores alui cohibent. Idæa similes quoque facultates possident, sed infirmiores, & ad esum quàm vsum medicum aptiores.

De Sebesten, seu Myxis. CAPVT XVI.



SEBESTEN, seu Myxa, vel myxaria sunt fructus in Syria & Ægypto nascentes, ex arbore eiusdem nominis satis procera, pruno valdè simili, Cortex caudici albicat, ramis virescit, qui folijs induuntur subrotundis, ac firmis & amplis; flores albidi racematim, aut potius in umbellis laxioribus coherant: quibus caducis suboriuntur fructus paruis prunis similes, qui maturitatem adepti ex atro virescunt, intusque nucleum durum, & quasi osseum, ac triangularem continent.

Myxa seu sebesten, ut officinæ loquuntur, matura leguntur, infolantur, & in rugas passularum, aut prunorum modo contracta seruantur. In Italia olim rarissima erant, & peregrina. nunc vberissimo prouentu in illius hortis nascuntur.

Ventrem molliunt, ut pruna, danturque vtiliter febrientibus, tussientibus, & linguæ asperitati: vrinae item difficultati & ardoribus: Sitim quoque contemperant in linctu, aut alio quouis modo sumpta, & ventris tinea enecant & pellunt.

Vires.

De Iuiubis. CAPVT XVII.



IUIBÆ, zizipha & zinzipha Græcis dictæ nascuntur in Syria, & nunc in multis Italiæ & Narbonensis agri locis nascuntur, ex arbore pusilla rhamni non multum dissimili, surculis præduris, spinosis, foliosis, floribus muscosis. Caudex ei contortus est, ac rimosus: rami tenues, longi, obsequiosi, duri tamen & virgultarum genistæ ritu protensi: folia duriuscula, oblonga, Clematidis æmula, ex interuallis longioribus alterno ordine disposita: Iuxta quæ muscosi ac palliduli flores parui emicant: post quorum occasum accedunt bacce oblonge, cerasorum magnitudine, carnosæ, tenellæ, cortice tamen membranoso, ac duro vestitæ, quas Galenus Serica vocat.

Fructus hi luteoli sunt, vel ex luteo purpurascentes, oliuarum mediocrium figura & magnitudine, dulces, carne multa, venosa, & nucleo paruo, foris rufo turgiduli, qui maturitatem adepti, leguntur, siccantur, in rugas contrahuntur, & seruantur. Albæ Iuiubæ in Syria, & maximè circa Iordanem fluium copiosa inueniuntur.

De eorum qualitatibus & salubritate non inter Græcos & Arabes omnes constat: Galenus enim stomacho inutiles esse, imbecillimè nutrire, & difficilè concoqui scripsit: Arabes verò ad vsus varios accommodant & commendant: In quos licèt paulò acerbius insultet Fuschius, contendatque iuiubarum vsum inutilem esse, ab Actuario tamen Græco Nic. Alexandrino, & à Dogmaticis omnibus, atque his qui certa experientia salutare norunt earum effectus celebrantur.

Vires.

Valent plurimùm ad tussim, difficultatem spirandi, arteriæ asperitatem, humores concoquendos & expuendos, & ad vitia pulmonis & thoracis multa. Renibus quoque profunt, ardori vrinæ & vesicæ dolori.

De Ficibus. CAPVT XVIII.



FICUS vbique locorum viret, sed in frigidis vel sterilescit, vel grossus inutiles gerit, ac paruos & insuaues fructus, qui nunquam maturescunt: in calidis vberimè, bisque fruticat, verna fœtura & Autumnali. Arbor est moderatæ magnitudinis, non omnino recto caudice assurgens, nec cortice læui, sed asperiusculo, præsertim, cùm adoleuit. Lignum ei album est, molle, medullosum, album: folia ampla in quinque partes disteminata, & totidem angulis conspicua, aspera, dura, obscurè vi-

ridantia : fructus sine prævio flore , aut prægressis Iulis , iuxta foliorum exortum erumpunt , initio paruuli , tempore maiores , forma turbinata, colore primùm virides , dein vel albescentes , vel subrubentes pro peculiari natura: Nam vt ficus aliæ alijs præcociores sint & suauiores, sic vel albidiores vel magis rubescentes, aut nigricantes Omnes verò molles sunt, medullosæ , granulis innumeris grauidentæ. Ex his immaturis, foliorum pediculis & cortice tenello vulneratis , lacteus quiddam succus effluit acer & amarus.

Præter dictam altera est pumila ficus , illi si proceritatem exceperis, simillima, quæ in locis apricis, & soli expositis, atque interdum in regionibus Septentrionalibus fouetur.

Ficus pumila.

His adhuc effigie respondet quædam sylvestris, infœcunda , & vix ad vsus quosdam medicos commendabiles expetita.

Ficus sylvestris.

Est & ficus Indica, quam nōnulli Opuntiam Plinij putant, quæ sine caudice, & ramis adolescit, totaque planta nil nisi folia; verum quos habeat in medicina vsus nondum licuit experiri.

Ficus indica planta-folia est.

Ficus omnium laudatissimæ Massilienses, quæ dactylorum inopia substitui possunt: mediocriter calefaciunt & nutriunt, & aluum molliunt, sed sanguinem valdè laudabilem non gignunt: Attenuant, leniunt, concoquunt, maturant, asperæ arteriæ, pulmonibus, renibus, vesicæ conueniunt. Ficus resiccata Carica dicitur, Græcis ἰχας, qua voce etiam apios Mathiolo designatur. Frondes nostras ficus hæmorrhoidibus ciendis prosunt, si podex his confricetur. Ex ficubus, ruta & nucibus fit Mithridatis antidotus tantoperè decantata, cuius compositionem dedimus in rutæ historia. Aliæ quamplures ficuum vtilitates narrantur, quas breuitatis gratia subiteo, in his enim recensendis multus est Dioscorides.

Vires.

cap. 18 ;
184. l. 1.

De Dactylis. CAPVT XIX.



DACTYLI sunt fructus Palmæ in Ægypto, Creta & Iudæa nascentes, qui vbi maturuerint, à Dioscoride, & Galeno Phœnicobalani vocantur. Valde probantur è Iudæa allati, magni, flauescētes, parum rugosi, molliusculi, pleni tamē carne multa, intus subdura, ad nucleū cādicāte, ad corticē rubescente, sapore

vinoso, & qui concussi nihil, aut parum sonant: Deteriores sunt flacidi, duri, excarnes.

Est autem non parua, Galeno iudice, in palmulis differentia; Aliæ namque air siccæ sunt, & astringentes, vt Ægyptiæ; aliæ molles, humidæ, dulces, vt quæ Caryotæ nuncupantur. Hæ autem præstantissimæ nascuntur in Syria, Palæstina & Hierechunte, & multis Orientis populis quibus cibos, potusque suppeditant.

Palmæ truncus crassus, teres & altissimus, exterius densis, gradatisque pollicibus scaber & salebrosus, quorum inæqualitate

lib. 2.
de ali.
facult.

regionū Orientaliū rustici faciliē sine alio adiutu, ad cacumen arboris scandunt: folia arundinacea, longa, latiuscula, acuminata, simul ab vno exortu secundū rami longitudinem multa. Fructus in summitate gerit multos, quasi racemati, sed pediculis longioribus coherentes; Quorum genera quā plurima traduntur, sed maximē commendantur Mustei ac succo multo, pingui, vinoso pragnantes, cuiusmodi sunt qui in Iudæa nascuntur, necnon in Hierichunte, Syriæ Palestinæ oppido. Iudicio Galeni omnium dulcissimi, colore, rufi, aut lutei, neque amplitudine, neque exilitate insignes: Mali virides, exucci & insuaues.

Vires.

De Palmæ & eius fructus qualitate sic censet Galenus, Phœnix, *lib. 8.* inquit, arbor, palma dicta, astrictoriæ facultatis omnibus sui partibus est particeps: Nam ramorum succus austerus, ex aquea substantia, tepida, terrea & frigida constans.

At fructus præsertim dulcis non paucam obtinet caliditatem, stomacho & thoraci profunt, nutrimentum laudabile suggerunt, & sunt gentibus multis pro cibo.

De oliuis. CAP. XX.



LIVAS & pinguem earum succum, quem Oleum nominant, ad remescariam pertinere nemo nescit: magnatum enim mensas oliuæ ad appetitum excitandum opulentant; oleum verò non tantū ad acetaria conficienda, pisces frigendos, aliaque edulia multa paranda, sed etiam ad vnguentorum & emplastrorum confectiones vsurpatur.

Sunt autem oliuæ fructus arboris, magnitudinis moderate, quam Oliuerum Galli, Oleam Latini nominant, quæ caudice interdum prægrandi assurgit, maximē satiua; nam sylvestris semper humilior est, ramis multis in latum diffusis, folijs oblongis, parū latis, duris, ex pallido viridantibus, salicis æmulis: floribus albis, racemosis, quos bacca, seu fructus consequuntur, oliuæ nempe oblongæ, multa carne & pingui succo turgidæ, nucleo intus duro, initio virentes, postea nigricantes. Ab ardore fructus, à fructu succi denominatio efficit, vt oliua ex olea, & ex oliuis oleum dicatur.

Gaudet arbor ipsa in locis siccis & argillosis, atque regionibus calidis, vt Hispania, Italia & Gallo-prouincia; feruidum enim squallidumque tractum & statum cæli libenter amplectitur; In Septentrionalibus agris vix virescit, aut sterilescit, aut cito tabescit.

Oliuas nigrescere incipientes & maturas Græci *συνεπτας*, Galli druppas appellant: Sale ac muria conditæ *ἀλμαδες* & *κολυμβάδες* illis dicuntur. Ex maturis oleum simpliciter dictum, quod & sapore & odore multum suauē est, ex immaturis, omphacium elicitur.

Hæc

Hæc autem vberius tractanda rei rusticæ scriptoribus cōmittuntur.

Oliuæ immaturæ vim habent astrictoriam, Maturæ qualitatem Vires. temperatam: Conditæ delectabili suauitate palatum recreant, & appetitum excitant, humentem nimis ventriculum resiccant & roborant, sed parum nutriunt, nec sanguinem laudabilem gignunt. De oleo & eius qualitatibus alibi fusiùs egimus.

De vuis acerbis & Passulis. CAP. XXI.



ITIS nomen multis stirpibus inditum, viniferis tantum propriè congruit, viburnum enim, sigillum Beatae Mariæ, & aliæ similes plantæ, quæ in altum surrectæ, alias vt stent, amplexantur, falso id nominis sibi vendicant. Propriè siquidem vitis dicitur, quæ vinifera est, eaque domestica, cuius multas sūt varietates, tum à sapore, magnitudine, colore, tum, à soli & cœli conditione sumptæ.

Generali acceptione, vitis quidem omnis vel alba, vel nigra dicitur: Cùm tamen aliæ quædam inueniantur variegatæ, seu coloris mixti, quæ nec albæ, nec nigre, sed potius subrubræ, aut flauescentes comperiantur. Racemos, aut vinum ex his expressum intelligo, quod nec absolutè album, aut rubrum, aut nigrum est, sed colore mixtum; cuiusmodi sunt vina multa, quæ licet alba vocitentur, magis tamen flaua sunt aut rufa, aut gylua, aut obicura, pro vuarum expressarum varietate, aut vario colore.

Porro vt omnes racemi maturi dulces sunt, sic immaturi agrestes, acerbi & insuaues, vnde ex vua qualibet immatura, expressa que omphacium haberi potest, sed ex ea potissimum petitur, qua etiam matura, vinum expressum acidum est, & minus suaue, cuius videlicet palmites crassiores longioresve sunt, & ad topiariorum pergulas & fornices deduci solent, vualque acerbas & racemos crassiores proferunt, ex quibus tuis succus exprimitur, tum ad omphacium, tum ad syrupum de agresta conficiendum, qui propterea, Syrupus de Agresta nominatur.

Passulæ autem sunt fructus maturi vitis viniferæ, sic dictæ, quod aridæ & rugosæ sint, & vim caloris exsiccantis experte, vnde & passæ sepiùs nominantur. A dulcedine quoque quam calore adipiscuntur, id nominis sortiri queunt, vt vinum passum, seu *γλυκὺ*, id est, dulce. Sunt enim vuæ passæ omnes ardore Solis siccate, dulces. Nostrates quæ in clibano siccantur dulcoacidæ sunt.

Sunt verò passarum quæ tum ad popinam, tum ad pharmaciam trahuntur, tres differentia, maiores seu Damascenæ, minores, seu Corinthiæ, & mediæ seu nostrates.

Omnes verò calidæ sunt primo gradu, seu temperatæ, admodum tamē astrictoriæ si cum acinis edantur; Sic enim dysentericis prosunt. Vua autem acerbæ seu agrestæ refrigerant & astringunt.

Vires.

Damascenæ *Zibeben* Arabibus dictæ, ad nos aduehuntur carnosissimæ & suaves quæ alendo corpori profunt, & sputum coquendo simul & mouendo pulmones ac totum pectus recreant.

De Ribes. CAPVT XXII.



RIBES seu Ribesium fruticosa stirps est, nullis planè spinis horrida, multos ramos parùm surrectos, sed tortuosos & inflexos emittens, ac frondes vitis æmulas, sed minores & fructus vix modo congestos, paruulos, rotundos, rubentes, sapore acidos.

Grossula, siue grossella rubra vulgus nominat, Mauritanii Riben: à quibus Officinæ suum Ribes fecerunt.

Huius fruticis duæ tantùm à rei botanicæ scriptoribus traduntur differentiæ, alter fructu rubro, propter virium præstantiam commendatus: alter nigro, qui vix in vsum medicum recipitur, sed topiarium; induit enim eleganter hortorum areas. Tertius reperitur fructum qui profert album & gratum, quem in horto Ioan. Gonerij sæpè vidi. Recentiorum nonnulli Ribesium nominant Crespinum, & vix Crispæ alteram esse speciem contendunt; Sicque illius fructus grossula rubra, huius alba nuncupant: Effigie tamen, colore, sapore, magnitudine non parum inter se distinguuntur.

Nam vna crispa spinosus est frutex, multis ramulis, tenuibus, albicantibus & aculeatis luxurians: folijs latis, crenatis, ambitu incis, & flosculis ex herbaceo albidis, fructibus non racematim congestis, sed baccarum modo pediculis oblongis coherentibus; initio viridibus, dein albicantibus, & cum exactè maturuerint, flauescen-
tibus succini ritu. Vicem vix acerbæ gerunt ante maturitatem in iusculis & condimentis.

Vires.

Ribes refrigerat, siccatur, moderatè stringit & roborat: febrium æstus extinguit, bilem reprimat, feruidum sanguinem temperat, sitim temperat, putredinem arcet, febribus malignis confert, ventriculi subuersioni & dysentericis affectibus à causa calida natis. Eius succo syrupus paratur ad hæc omnia efficacissimus, & vñtatissimus.

De Berberis. CAPVT XXIII.



BERBERIS horridus est spinis frutex, sepimentis idoneus, surrectus, virgis præduris, quinque, aut sex cubitorum, quæ aliquando arborescunt. Earumque cortex læuis est, ac subalbicans, vt radicum flauescens, igni materies lutea: folia numerosa sunt, rigida, acuta, oblonga, dura, dilutè virentia, ambitu crenata, & nonnulli flosculi ex pediculis oblongis coherent lutei, muscosi & emicantes: fructus parui, oblongi, rubri, racematim coherentes. Vocatur

hæc planta, vt etiam fructus spina acida, siue Oxyacantha. In Officinis Berberis, nomine deducto ab Amyrberis Auicennæ, vt sentit Dodoneus, qui hunc fructum Oxyacantham vocat, non oxyacanthum, qui spinæ acutæ, seu Burgespinæ aut albæ spinæ fructus est, rubrus, dulcis & rotundus. Vulgus senellam vocat, vt Berberim, Spintinetam. Falluntur qui corticem bugiæ, radicis herbariæ corticem esse credunt.

Berberis refrigerat, & siccatur moderatè, validius astringit, fluores sanguinis, & aliorum humorum cohibet, calorem viscerum mitigat, vomitum sedat, & viscera recreat. Vires:

De Auellanis. CAP. XXIIII.



VcVLIS nihil notius ipsis, quas Græci λεπτοκάρυα, quasi nuces exiguas nominant, Pharmacopœi Auellanas, olim Abellinas, forsan ab Abellino Campaniæ oppido, vbi earum prouentus est vberrimus. Nonnulli Ponticas nuncupant, quoniam è Ponto in regiones alias venerint: Alij Prænestinas dicunt, quod

Prænestini his abundant, & aliorum ciborum defectu famem diu tolerarint.

Sunt autem vel vrbanae ac cultæ, vel syluestres: Ex domesticis quibus hortorum pergula ornantur, aliæ sunt oblongæ, & abdita latet, in calycibus longis, callosis, herbaceis, in extremo fimbriatis; Aliæ rotunditate insignes, & calycem exterioriorem, breuiorem, & magis patulum habentes. Inter longiores, quæ membrana rubente obuehlantur, sunt præstantiores. Syluestres parue admodum sunt, minus gratæ, & in sepibus, dumetis & syluis passim nascuntur.

Omnes verò colliguntur ex arbore pumila, quam Corylum nominant, cuius rami præsertim iuniores recti sunt, ferè enodes & obsequiosi: folia lata, acuminata, ambitu serræ modo incisa: Cortex tenuis: radix crassissima. Vt fructus, sic frutex notissimus. Vires:

Auellanæ ad Eclegmatis de Pineis confectionem accedunt: Saccharo interdum incrustantur, vt bellariorum vices impleant, & suauius edantur, difficile tamen concoquuntur, propter terrestrem & solidam qua constant substantiam. Bechicam quamdam vim obtinent, ob dulcissimum earum saporem, & rectè medicamentis thoraci dicatis admiscuntur.

De Pistaciis. CAP. XXV.



ISTACIA nuculae sunt ex arbore terebintho simili, quarum exterius ac primum tegumentum tenue admodum est ac virescens: Secundum nucamenti ritu lignosum, fragile tamen & albicans: Nucleus inclusus, vt cunque viret: Sapor amarodulcis, ac iucundus. Illa in

Italiam ex Syria Vitellium primum intulisse, & in Hispaniam Flaccum Pompeium equitem Romanum Plinius auctor est.

Arbor ex qua promanat, hucusque exotica fuit, sed recentiorum sedulitate nunc cicurata, in plagis Septemtrionalibus multis fruticat, sed fructus perfectionem & maturitatem rarò aut nunquam assequuntur. In officinis fistici solent appellari. Posidonius Bistacia, nonnulli Phistacia nominant.

Vires. Calidi & humidi sunt, seu temperati, & optimi succi. Phthisicis ac tabidis valdè conueniunt: materiam in pulmonibus contentam coquunt & expurgant, viscera infarctu liberant, semen & veneris stimulos augent, nephriticis auxiliantur.

De Amygdalis. CAP. XXVI.



MYGDALVS non adeò videtur similis Persicæ, vt scribitur, nam frondosior est, procerior, vita diuturnior & cortice constat crassiore, duriore, atque folijs angustioribus, longioribusque, ambitu crenatis. Rarò in Aquilonio tractu floret, rarius fructum parturit, flores tamen algoris patientissimi sunt, nam ante finem hyemis explicati, innoxie brumam & gelu tolerant, & amygdalas Autumno copiosas largiuntur, quas nonnulli Græcas nuces & Thasias cognominarunt.

Ex his quædam amaræ sunt, quæ calidiores & minus esculentæ, Alię dulces & culinæ, & Officinæ delectabiles. Ambæ in arbore simili nascuntur. Ex omnibus oleum exprimitur: Ex amaris, amarum, quod aurium affectibus conferre putatur. Ex dulcibus dulce, quod temperatum est & naturæ amicissimum. Datur siquidem fœliciter omni ætati & sexui: Atque ipsis infantulis tussientibus familiare & securissimum est medicamentum: humores in thoracem delapsos optimè coquit, & ad expectorationem ducit.

Historia. De amygdalis amaris duo memoranda traduntur, earum nempe esu vulpes interfici, & ebrietatem arceri: Cuius rei narrat historiam Plutarchus, Fuit, inquit, apud Drusum Tyberij Cæsaris filium, medicus quidam amaras amygdalas comestari solitus, qui sic omnes potando superabat, nec temulentia tentabatur.

Dulces verò quia suaues bellariorum vices multis modis implent, nam decorticate mensis apponuntur, aut adhuc tenellæ, adultiores & resiccatae, aut saccharo incrustatae & conditæ & integræ, vel ex histritis saccharo & aqua rosarum panes dulciarij fiunt, quos vulgus Macharones nominat. Amygdalatū quoque paratur forma potus lactei, puerperis familiarissimum.

Vires. Amygdalę amarę calidę sunt, & deterforię: dulces calidę, vel potius temperatę, ori gratę, & alimoniam corpori conferentes.

De Nucibus. CAPVT XXVII.



Vx Iuglans, quasi Iouis glans aut iuuās dicitur: Illius enim truncum fabri lignarii queritant, corticem insectores, fructum pueri, ad lulum & esum, pharmacopœi ad medicum vsum, quem etiam nouit Mithridates, qui ex nucibus antidotum, paucis additis, conficiebat suum, vt etiam Galenus, qui ex earumdem succo suum parabat Diacaryon, seu Dianucum, addito mellis tanto, quanto ad suauitatem opus esse videbatur: quo medicamento ipse sanauit hortulanum ab vna, tonsillis, ac glandibus ferè suffocatum, vt testatum reliquit lib. 6. compos. med. local.

cap. 2.

Est verò nux arbor prægrandis, folijs neruosis, fraxini modo coherentibus, & facie similibus, sed maioribus. In agris, secus vias pingui ac restibili solo lætè proficit, atque etiam in hortis, sed quia sua vicinia & halitu segetes & stirpes proximas malè afficit, & quasi inficit, secus agrorum semitas plantatur, iuxta illud poëtæ:

Me sata ne lædam, nam sata lædere dicor.

Imus in extremo margine fundus habet.

Nux plan.
tis inimica.

Circa solstitium æstiuum nuces virides & adhuc tenellæ à cortice externo purgantur, & tandiu in aqua subinde mutata infunduntur, vt amaritudinem deponant. Dein coquuntur vt mollescant, postea cinnamomo, aut cariophyllis configuntur, & saccharo coquuntur, & seruantur ad ventriculum imbecillum roborandum & coctionem iuuandam.

Siccæ nuces calefaciunt & siccant, ex hisque tuis & expressis oleum elicitur, quod vim habet calefaciendi, digerendi, resoluendi, & nervos roborandi, & flatus dissoluendi: Ob id vtiliter clysmis ad cholicum dolorem, à flatu & frigidis humoribus natum præscriptis, admiscetur.

Vires.

De Nucibus pineis. CAPVT XXVIII.



INVS Picea, Abies, Cedrus & Larix arbores sunt præcellæ, coniferæ, resinifluæ, & inter se vultu non multum dissimiles: Earum tamen alię exoticę sunt, nec facile in nostro solo & cælo cicurantur, vt Cedrus Palæstina ac Libania: Alię nostrates quidem sunt, sed syluestres perpetuò, nec nisi ad spectaculū in hortis habentur, nec cultu delectantur, vt abies, Picea, agrestes pini. Vera autem pinus magis urbana est, ac mansueta, quæ vbi crasso caudice ascenderit, circumquaque ramos edit multos, folijs tenuibus & longis, in extremo aculeatis vestitos & comosos.

Fructus, conis dicuntur, vulgò poma pini, ex multis velut squamis, cynaræ ritu, crassis, duris, lignosis, capitatis compacti, in quorum

sinibus, ac veluti toris includuntur nuclei, oblongi, rotundi, tenui membrana nigricante inuoluti, dulces, qui modo pini nuces, modò *Galen.* Coccali & sæpius pinei nominantur.

Vires.

Nucleus hic temperatus, ad calorem tamen magis accedens, vnde rebus venereis inferuire creditur: semen enim & lac auget, multū alit, exasperata lenit, tussi veteri prodest, nec non phtificis ac tabescentibus.

Præter pinum veram, aliæ sunt multæ syluestres, vt Picea, tres maritimæ & aliæ quædam, quæ inter rupes & loca prærupta ac montosa sponte nascuntur. Omnes autem quemadmodum & abies & larix, quæ illis affines sunt, lacrymosæ cernuntur, & sponte, vel ilato vulnere succose effundunt, aut liquidiores, aut spissiores, albiores vel nigriores: de quibus sectione sequente differemus.

De Nucibus Cupressi. CAP. XXIX.



CUPRESSVS sempiterna fronde viret, caudice procero, tereti, crasso, surrecto, summitate fastigiata, atque in orbem coacta; folio pini, sed carnosiore, breuiore, obtusiore, amaro, ramis compluribus, foliosis in angustum cohibitis, odore grauib, tactu asperis, neutiquam pun-

gentibus.

Pro fructu conos, seu nuces effigiem coni referentes exhibet, quibus fatiscentibus, & vetustate, vel calore dehiscentibus, semen paruum intus conclusum, vel sponte, aut læui attactu delabatur. Materia ligni solida, flauescens, fantali æmula, odorata, ad supellectilium ligneorum fabricam maximè idonea.

Huius autem arboris duæ traduntur differentiæ; vna mas dicitur, altera fœmina: vtraque comæ perpetuæ ac semper virentis. Illa fecunda est, terque in anno galbulos, seu nuces promit, Ianuario, Maio, Septembri, vultuque veluti morosa est, fructibus torua, odore grauis, nec vmbra delectabilis. Altera quæ fœmina dicitur sterilis est, nec galbulos nec semen proferens, & ramos in latum magis diffundit: cætera mari vix dissimilia: nam idem vtriusque color, odor, sapor, virtus & vultus. Solet cupressus hyemem salua perferre, Luetiæ tamen euasit nulla per rigiditatem hyemis anni 1608.

In Creta Insula, referente Theophrasto, lare & sponte etiam sine semine prouenit, vt etiam in Idæis montibus, Leucisque vocatis, in quorum summis iugis, quibus nix nonnunquam deest, Cupressum comperiri affirmant, quamuis alibi non nascatur, nisi teporem inuenit. E Cupresso resina quædam larignæ consistentia similis exudat, acerrima sapore, cuius rarissimus est vsus.

Vires.

Tota cupressus vim habet calefacientem, exsiccantem & astringentem, sed eius maximè folia, germina, nuces & semina vsurpantur. Conferunt laxis partibus roborandis, dysentericis & cœliacis affectibus cohibendis, & humoribus sistendis.

Cap. 2.

lib. 2.

& lib.

3.

Theophrast.

cap. 1.

lib. 4.

De Fructibus seu baccis Lauri. CAP. XXX.



LAURUS Δάφν Græcis dicta, Apollini consecrata, cuius scilicet ramo vulso in diuinationis signum sese coronauit, frutex est perpetua fronde, semperque vi-
rente, in iustam arboris proceritatem caput erigens, ramis multis, crassis, cortice virescente indutis, folijs oblongis, latis, mucronatis, duris, viridibus, sua-
uem odorem spirantibus; floribus albidis secundum ramulorum du-
ctum erumpentibus; quibus marcescentibus succedunt fructus, seu
baccæ, ouali figura, seu oblongæ, nigricantes, solidiore nucleo
gravidatæ, aroma olentes, cum quadam acrimonia amaricantes.

Vberimè germinat & proficit in tota Gallia, in Normania enim iuxta mare quasdam vidi quæ mediocris quercus magnitudinem æ-
quarent. Latiùs tamen & vberius nascitur in Italia & locis calidio-
ribus; hyemem enim rigidiorē, qualem Septemtrionales perpeti
solent, non innoxie tolerat, nam rami & folia gelu percussa sæpius
commoriuntur: his tamen abscissis postea ex radice viuacissima no-
ui furculi, seu stolones denuo erumpunt. Hæc autem arborem non
solum solam à fulmine tutam esse, sed etiam ædes, in quibus rami
illius adsunt nunquam à cœli fulminibus tangi multi scripsere: Id-
circo Tyberius Cæsar cælo coruscante & tonitru fragore perterri-
rus lauro coronabatur.

*Diosco.
ca. 108.
lib. 1.* Baccæ lauri insigniter calefaciunt, siccant, attenuant, flatus dis- Vires.
cutiunt. Ad medicamenta autem adhibentur, quæ neruorum lassitu-
dines reficiunt, Acopa vocant, & ad vnguenta quæ calefaciunt
& resoluunt. Oleum ex his expressum, aut decoctione elicitedum, sca-
biem, psorā & multas cutis fœditates delet ac sanat, saggilata &
ecchymoses aufert, & humores effusos discutit.

De granis Iuniperi. CAPVT XXXI.



IUNIPERVS lignosus est frutex, spinosus, ramosus, me-
diocris arboris magnitudinem sæpius æquans, cortice
membranoso, sæpius disrumpente indutus, odor, bac-
cas ferens primò virides, & per maturitatē nigras, psorū
magnitudine. Materia ligni flauescit, santali citrini modo: foliola an-
gusta, acuminataq; spinas potius, quā frōdes referētia. Nascitur spō-
te in locis aridis & incultis, ibiq; latiùs fruticat, præsertim mōtosis &
squalidis: nā in planis nasci recusat. Sola inter arbores fructus suos in
biēniū prorogat, qui etiam ātiquati & in arbore relictī citius marces-
cūt, quā spōte decidāt. Cedro valde similis est Iuniper⁹, & à quibusdā
malè oxycedr⁹ nominatur; licet enim Iunipero & Oxycedro, præser-
tim phœniceæ caudex sit tortuosus, foliola acuta, viridia sēper, bacce
paruæ & rotundæ, multū tamē inter vtrumque est discriminis; nam

Oxycedrus vtraque exotica planta est, cuius baccae fulvae sunt, odoratae & suaves, & ligni materia rubescens. Sponte nascitur in Asia, ut Iuniperus in Gallia.

Belonius agnouit iuniperum quamdam maiorem quam in mediocribus arboris altitudinem saepe assurgit; baccasque gerit auellandarum magnitudinem ut plurimum superantes, & gallas saepius aequantes: nostras tamen cum minimè sit inefficacior & forsitan praestantior in medicis vsibus tantum celebratur.

Risagalum.

Ex Iunipero manat gummi quoddam resinosum Sandarax Serapioni, Latinis vernix dictum, cuius loco nonnulli vocum affinitate decepti, Sandaracham Graecorum, quae auripigmenti species est, periculosè substituunt, ea enim Sandaracha exitiale venenum est: nam cum Arsenicum triplici discrimine notetur, croceum seu auripigmentum, Risagalum quibusdam dictum, rubrum, seu Sandaracha, & album seu vulgare; atque vnum quodque deleteriū, Sandaracha auripigmentum rubeum est & exitiosum, nec tutò pro vernice, seu gummi Iunipero vsurpatur, ne postea minus cautos decipiat vocum affinitas, apud quos interdum Sandarax & Sandaracha pro re eadem periculosè sumuntur. Legitur & Sandaracha apud Plinium pro re multum dissimili, pro cibo videlicet apum, quo dum fauos

cap. 7.
lib. II.

Vires.

Baccae Iuniperi calefaciunt, stomacho profunt, vrinam mouent, crassos & viscidos humores expurgant; contra inflationes, tormina, serpentum ictus, tussim & pectoris vitia vtiliter dantur, & antidotis convenientissimè admiscuntur.

De Gallis. CAP. XXXII.



GALLAE velut pilulae quaedam salebrosae, ac spiritui fructus, qui praeter legitimos glandiferis arboribus, noctu ferè erumpunt. Sole de Geminis exeunte; quo feruidiore existente, tabescunt, nec iustam magnitudinem adipiscuntur. In Bohemia & Hispania nascuntur, vberes, in quercubus multis, quarum truncis & ramis etiam tenuibus, absque pediculis, ut plurimum adnatae cohaerescunt.

Gallarum genera multa traduntur, inter quas duae potissimum & ad medicamenta quaedam paranda, & ad coria densanda accommodantur, vna Omphacitis dicta, quae parua est, rugosa, nodosa, solida, nullo foramine peruia, altera plana, levis, flauescens, interna parte laxior & maior, & perforata ex cuius videlicet foramine quoddam exijt insectum, seu musca, aut vermiculus, ut contingere solet, aut aliud simile animaculum.

Ex quercubus semper Hemeris & Robur præstantiores semper gallas eructant. Hemericis autem ea esse quercus creditur, quam nonnulli mydion nominant, cui caudex in orbem comatur, contorquetur, & multis ramorum alis confurgens glandes præter gallas gerit non insuaves.

Robur Latinis quercus, Theophrasto *σπῆς* dicta, gallarum feracissima est, quarum vbertatem æstate, præter glandes suppeditat, necnō alias pilulas exiguas folijs mediis sine pediculo adhærescentes, vt in nostratibus quercubus videmus. In summa quercus non tantūm glandes & ramos germanos promit, sed adulterina multa, viscum, gallas, poma, fungos, & multos alios pseudofructus.

Galla refrigerant ad recessum vsque secundum, resiccant ad tertium, & potenter astringunt: partes laxiores contrahunt, imbecillas roborant, fluxiones cohibent, atque efficaciter ad astringēda aut sic-
canda quæ opus sunt, vsurpantur, inquit Dioscorides.



SECTIO SEPTIMA.

De Gummis.



Nihil tam vulgare, tamque controuersum & anceps, atque gummorum, resinatum & lacrymarum, quæ ex plantis colliguntur, vera d. gnotio & inter se distinctio: vix enim aliquis datur elasticus author, qui singula in artem redegerit, & de omnibus appositè disseruerit. Vnus Syluius ordinem meditatus meliorem, gummi multa tāquam in fasciculum congerens, simul de Electro & ambaro, (ambram griseam Officina nuncupant) egit, & Galbanum, Hammoniacum, Sagapenum & Scammonium inter liquores numerauit. VVeckerus promiscuè de gummis, resinis, succis concretis & liquoribus disseruit. Rei herbaria authores modo de illis pro varia resinifera, aut gummiifera stirpis describenda natura, velut per transennam tantum verba fecere: Nos verò in Pharmacopæorum gratiam, hanc singula noscendi methodum instituiamus, & qui gummi à resinis, & hæ ab illis & liquoribus vulgò dictis, dissideant, ostendimus.

De Succis, seu plantarum humoribus. CAPVT I.



T cornua ceruis, & comæ atque pili multis animalibus quotannis decidunt, Sic folia, Iuli, flores & fructus plantis, quibus non modò sua caro est, neruus, os, vena, & suus velut sanguis, & humor in plantæ singulas partes alendas destinatus, sed & sua sunt velut mēstrua, perindè ac mulieribus, quæ certis temporum circuitibus super veniunt, vt lacrymę vitibus, gummi Ceraso, amygdalo & aliis arboribus permultis, resinæ, Lentisco, piceę, Larici, aliis alius liquor illis quantitate molestus. Vt enim sanguis animalibus turget & vrget, sic plantis humor, seu succus, cui seu sponte, seu arte detur exitus, ad ipsarum semper leuamen profluit & incolumitatem.

Sanguis
plantarum
varius.

Sanguis autem stirpium succus proprius est, qui in ficibus est, vt *lib. 1. de plant.* lac, ait Arist. In vite velut humor, in quibusdam similis est picis li-
quidæ, in aliis velut oleum, in nonnullis, vt gummi. Et quædam, inquit idem philosophus, succum habent, vt resinam, myrrham, & thus, & thymiana. Præterea nonnullæ venas habent & ventrem & partes, vt in animali similes, licet animalia non sint contra Anaxagoram.

Anonymos
plantarum
humor.

Humor autem ille plantarum, quo deficiente, deficere incipiunt ipsæ, & exsiccatò tabescunt, communi nomine caret, sed vocabulo magis vsitato, ait Theophrastus, succus appellatur, quem alij lacrymam, alij liquorem, alij humorem dicunt, qui in singulis variam coctionem subiens, variam spissitudinem & colorem acquirit.

Theoph
cap. 3.
lib. 1. de
hist.
plant.

Hinc inter stirpium humores, si consistentiam spectemus, alij tenues & aquosi, alij crassi & lenti, alij callosiores: alij densari faciliè possunt, alij nequeunt, Theophrast. Si verò saporem & qualitatem, alij vinosi sunt, seu vitis, pomi, mori, myrthi; alij pingues, vt Oleæ, lauri, nucis, amygdali; alij lenti & resinosi, velut abieris, pini, laricis: alij dulces, vt ficus, palmæ iuiubarum: alij acres, vt origani, piperis, sinapi: alij amari vt absynthii, fellis terræ, colocynthidis. *cap. 17. lib. 6. de caus. plant.*

Tres autem generales dantur succi differentię; aut enim pinguis est, vt oleum, aut tenuis vt vinum, aut crassus & mucagineus, vt radicis altheæ, & similium viscidorum succus.

Quid Gummi, & qui differat à Resinis & aliis liquoribus concretis. CAPVT II.



QUAMVIS succi plantarum, cū plurimi sint, facile comprehendendi non possint, ex Oribasio, singulos tamen ad sua genera qui reduxerit, de his certam doctrinam constituere valebit.

Χίλος autem seu succus propriè is humor est, quo plantæ nutriuntur, quique non sponte, sed præcedente tritura & expressione, aut alia præparatione elicitur, estque semper tenuior, nisi calore exsiccatus induretur, vt in Rob & succis inspissatis contingit.

Liquor verò crassior est, & interdum sponte, sed vulnere sæpius illato delabitur, & lacrymatim profluit, vnde lacryma ferè semper nominatur. Is si oleaginosus fuerit, & liquidus specialiore nomenclatura *ῥήμα* dicitur: Si terrestrior, admodum aqueus & concretus in truncis arborum, gummi: quæ mediam inter gummi & resinas possident naturam, suntque partim terrestria, & aquea, partim oleagina & pingua, Gummirefinæ nobis dicuntur.

Est autem gummi, vt exotico nomine, *κόμμι*, vt Græco vtat, lacryma coagulata concretaque in truncis arborum ipsam producentium, cuius aquea magis est substantia, vt oleaginosa: Proinde gummi aqueis promptius miscentur, Oleaginosi ægerrimè: Resina contra, quæ & flammam facile concipit, gummi verò in igni crepitat, licet enim calidum stillando procedat, vbi tamen aerem cōtingerit, coagulatur, & aquæ simile est, inquit Arist. vnde ad prunas ardentes iniectum fragorem edit.

Cū autem multa sint eius genera, ex generis arboribus proceduntia, quædam enim coagulantur, quomodo lapides & conchæ, ait Arist. alia sunt molliuscula: quædam pellucida, aureo colore flauescētia, alia obscuriora, pallidiora: nonnulla ex arboribus peregrinis, alia ex nostratibus profluentia, de eo primū agam, quod ē spina Acacia, prouenit, & simpliciter Gummi dicitur.

De Gummi Arabico. CAP. III.



GUMMI nomen ab Arabibus depromptum est, absolute dum ponitur, id ipsum est intelligendum, quod Officinæ priuilegio quoddam Arabicum, Galenus Thebaicum, nonnulli Babylonicum, alij Acanthinum nominant. Ex arbuscula quadam manat, quam Dioscorides Acaciam nominat, cuius duas species constituit, Prior recta assurgens virgulta profert lignosa, spinis exertis, & duris, hinc inde stipata, folia longa, quasi ex multis foliolis coherentibus composita. flores albos: siliquas breues, semen glabrum & splendens. Malè depictam eius iconem tradit Mathiolus.

Succus
quid.

Liquor.

Lacryma.

Resina.

Gummi.

Gummire-
finæ.

Gummi
quid.

Acacia
gūmifera.

Alter Acacia in Cappadocia & Ponto prouenit, ait Dioscor. prior minor, tenerior, humilior, folia habens rutæ, & virgulta quibusdam aculeis spinosa. Ex hac succus quidam educitur, qui arbusculæ nomen retinens, Acacia dicitur, sed ob eius raritatem substitui solet succus syluestris pruni, quam Dodon. Germanicam nominat. Ex illa gummi profluit Arabicum, quod laudatur vitri modo pellucidum, syncerum in vermiculorum speciem contractum, dein candidum: sordidum ac resinofum inutile.

Acacia succola.

Vires.

Vis eius ad spissandum & refrigerandum efficax, ocularibus medicamentis & arteriacis commodissimè miscetur: cutis meatus obstruit, & procidentes oculos reprimat. Vt optimè pulueretur, debet in mortario & pistillo calidis verberari.

De Gummi Tragacantho. CAP. IV.



TRAGACANTHVM est gummi pellucidum, album, subdulce, leue ac syncerum, quod à radice cuiusdam plantæ spinosæ vulnerata, nominis eiusdem manat. Ea radix summo cespite nititur, & humiles, rigidosque surculos emittit, in quibus minuta folia, multa & tenuia, quæ sub se spinas occulunt, albas, rectas & firmas. Arbuscula hæc Tragacantha Græcè, spina hirci latinè dicitur. Nascitur in Creta & multis Asiæ locis, lacrymamque non incisura, sed sponte profluere contra Dioscoridem, asseruit Theophrastus, hanc enim cedere, inquit, opus nequaquam est. Licet autem omnino peregrina sit, & à nostratibus herbarijs rarò visa, cicuratam tamen & satis latè virentem in horto Ioan. Gonerij, rei medicamentariæ peritissimi videmus. Illius verò coagulatus succus, seu gentilitio nomine, Tragacanthum & Officinis Dragacanthum dictum, ipsis etiam tyronibus notissimum est, quod non facile, ut obiter dicam, læuigatur, nisi pilis & pistillo calidis.

Caput
8. lib.
9. de
hist.
plant.

Vires.

Vsus eius commendatur ad oculorum medicamenta, scabritias arteriæ, rauedines, tussis, retusas voces, cæterasque defluxiones cum melle, aut saccharo in delinctu.

De Ammoniaco. CAP. V.



GUMMI Ammoniacum dicitur, quod stillat in arenis iuxta Iouis Ammonis oraculum. Ex qua autem stirpe non liquidò constat, nam Plinius ex arbore quam Metopion, Dioscorides & ex frutice, quem Agasyllim nominat, & ex ferulacea planta manare dicit: vix autem ferulaceum genus fruticum generi consentit.

Ferule porro lacrymam esse Galenus asseruit, ex qua vel syncerum gummi, densum, nullis sordibus conspurcatum, & minutis

6. Sim.

glebis coactum, vel impurum & inquinamentis quibusdam infectum colligitur. Illud Thrausma, hoc Phyrana Dioscoridi dicitur.

Cp. 98. lib. 3. Probatur quod nullis arenis, terra aut alijs rebus extraneis sordescit, in thuris masculi similitudinem effigiatur, odore castoreum vtrumque refert, & sapore amaricat. Ammoniacum, Officinis corrupte Armoniacum dictum facile aqua, aceto, vino albo, & aqueis dissoluitur.

Vim habet emolliendi adeo efficacem, vt iuncturarum topicos dissoluat, & alia tubercula discutiat, lienes induratos sanet, & potu datum obstructions etiam contumaces tollat, menses & urinam mouet, calculos trudit, & admotum charadas dissoluit.

Vires.

De Lacca & Cancamo. CAP. VI.



VIDE sit Lacca, quid Cancamum, an vtrumque sit idem vel alterum ab altero dissideat, & si dissideant, quid singula sint, ex authorum libris non planè constat, Serapio Paulus, & inter recentiores Mathiolus Laccam, Cancamum Dioscoridis esse firmiter credunt. Brasauolus, Garcias ab horto, & Clusius rem diuersam tenent. Qui veritatis perdiscendæ cupidi varios orbis tractus lustrarunt, Cancamum Dioscoridis non modo à Lacca varium, sed incognitum putant: nam cum ad suffimenta præsertim vsurpetur, aliaque multò fragrantiora & suauiora thymiamata habeamus, negligitur. Adde quòd, ex arbore peregrina, Arabica nempè profluere perhibeatur, nec à regionibus tam longinquis mercatores hanc ad nos deuehere lacrymam dignantur. Vt vt sit gummi quoddam est, sapore virosum, odore probatum, & valdè rarum. Lacca autem vtraque qualitate destituitur, frequens inuenitur, nec Chermes Arabum existit, neque ex sorbi, aut mespili, aut myrti ramis colligitur, vt nonnulli putant, neque myrrhæ, similis est, vt scripsit Auicennas, cui forsàn ignota fuit. Sed si vera loquitur Garcias ab horto, quædam veluti fauago est, & liquor in arboris vastæ ramis concretus, & formicarum alatarum suctu & ope coactus.

Hæc autem arbor in Arabia non nascitur, sed in India, & maximè in prouincia Pegu, vbi Lacca, Trec, vocatur, vt etiam in Bengala & Malabar vbi loc & lac, vnde Lacca dicitur. Hanc opinionem & ratione & enarratione multa tueri conatur Garcias, & ex Amato Lusitano efficere contendit Cancamum, id aroma esse, quod alio nomine *Anyme* vocat, cuius duo facit discrimina, vnum album, quod Dioscoridis Cancamum est, suadente Brissoto Medico Parisiensi, alterum subnigrum, quod est myrrha, seu potius Mynea, aut Amynea.

Sic rei cuiusdam obscuritas cogit ad vocum affinitatem confugere, perquirendæ veritatis gratia. Vt tamen liberè dicam, credo Any-me, seu amyneam, vt quidam loquuntur, myrrham & Cancamum

res planè diuerſas eſſe: Laccam autem Officinarum quadam uſurpatione Cancamum veterū incuriâ vocitari, qui vocularum aliquot e gente Barbara depromptarum ignari, quæ minus fideliter audiēre, crediderunt. Sicque longo uſu Laccam Cancamum nominantes, hanc veluti præſcriptionem & loquendi libertatem ætati poſteriori reliquerunt.

Sunt qui illorum ſententiam tuentur, dicuntque, tres Laccæ varietates aſſignari: Prîma eſt Cancamum Dioſcoridis, nulli ferè viſum: Secunda Lacca vulgaris: tertia factitia eſt, qua infectores vtuntur: cuius adhuc plures differentiæ notantur, quas breuitatis gratia omitto.

Vulgaris dura, pellucida & ruſa eſt, myrrhæ admodum ſimilis, ſurculos arboris exoticæ circulatim inuoluens, quam ſuctu à formicis Indis ex arbore elicitam, elaboratam & ramis cohibitam eſſe, vt aſſeruit Garcias vix, credibile eſt, ſed potius lacrymarum & reliquorū gummi modo, ſpōte exudaſſe & concreuiſſe. Nam cū animalia, ex Philoſopho laborēt & pugnent pro victu & coitu, quæ in Hyemem futura tota æſtate panem illis familiarem quæritant, aut panificium quoddam elaborandum ſuſcipiunt, non ramis arborum, aut loco acris & cœli iniurijs obuio exponunt, ſed in latibulis recondunt. Formicas autem Indicas Laccam fruſtra nec pro cibo congerere & cogere, ſed deferere, per pauci credunt. Quæ ad nos adfertur, bacillos arboris circumueſtit, eſtque dura & pellucida, & facilè aqueis diſſoluitur: hæcque trochiſcos de Carabe & Dialaccam ingreditur, non factitia, vt perperam ignari quidam putant.

Vires.

Non tantū ad medicos, ſed alios plures mechanicos uſus celebratur, vt ad ceram, quæ literis obſignandis inferuit, inficiendam & ad tincturas, quæ ligneis ſupelleſtilibus inficiendis dicantur, parandas, atque ad eos colores excipiendos, qui Laccæ commixti elegantius micant.

Cancamum & *Anymæ* adeo inter ſe conueniunt vt non ſpecie, ſed tantū bonitatis gradu differre multi contendunt. Vtrumque reſina eſt, ad ſuffimenta valde commendatum; Sed Cancamum vt purius & halitu ſuauius, præfertur, dum habetur; At tam rarum eſt, vt noſtrates vix viderint. *Anymæ* verò nunc frequens eſt multū, & à medicis Pariſienſibus ſubinde præſcribitur ad pileorum, & cucularum ſuffitum, aut aliorum involucrorum quæ capiti regendo & roborando dicantur.

De Sanguine Draconis. CAPUT VII.



ANGVINIS Draconis peruestigatio jamdiu multorum exercuit ingenium. Quidam enim Plinij erroneam opinionem sequuti, draconis animalis ab Elephantis collisi sanguinem esse crediderunt. Quem errorem non modo sequitur Solinus, sed Cinnabarin, sanguinem draconis officinarum tenet. Serapio scribit esse succum plantæ cuiusdā, illi *Sidrichis*, & *Egilos* dictæ quam herbarij nostrates quartam syderitis speciem existimant. Ignari quidam pharmacopei pro sanguine draconis, rem quamdam è terra synopica, rubia tinctorum & quibusdam alijs factitiam, in rotulas conuolutam, ab impostoribus emunt.

Braſauolus ineptè tria sanguinis draconis facit discrimina, primum ex pseudobolo factitium, secundum lacrymam cuiusdam arboris dicit, tertium gummi. Sed ut sanguis draconis adulteratus verus nō est, sic improprie duplex eius constituitur species, vna quæ lacryma, altera quæ gummi sit eiusdem arboris. Omne siquidē gummi, quod lacrymatim ex arbore stillat, generali significato lacryma dici potest. Aloysius Cadamust^o, patritius Venetus, sic melius originē illius expressit. Est, inquit, in insula, cui nomē Portus sanct^o, (è Canarijs vna est) Sanguis draconis, qui lacryma est arboris: nam statō anni tempore, arbores ferro sauciāt, quæ vbi incisæ sunt, anno sequente, gummi per incisiones emittunt. Id ahenis coctum, defæcatumque sanguis efficitur quem Draconis nominant.

Eius arbor fructum instar cerasi profert, mense Martio, gustu eximium, coloris veneti. Nic. Monardus huic opinioni videtur assentiri, & sanguinem Draconis, non alicuius animantis saniem, sed arboris lacrymam esse, sic asserit. Attulit, inquit, ante paucos dies, ex noui orbis continenti Episcopus Carthagenensis fructum arboris, ex qua manat lacryma illa, quam Sanguinem vocant.

Est autem hic fructus admirandus, nam sublata, qua integitur pelle, ilico dracūculus apparet tāto artificio à natura fabrefactus, ut à peritissimo aliquo artifice è marmore sculptus videatur, collo oblongo, ore hiantē, spina aculeis horrida, cauda oblōga, & pedibus cōspicius.

Ab eo fructu nomen arbor sumpsit & eius lacryma, quæ vulnere illato effluit. Et laudatissima ex Carthagine Peruana defertur.

Arbos illa procera est, cortice satis tenui, & facilis vulneratu, cuius nomē cum veteres ignorarēt, de sanguinis draconis natura & origine nihil certi tradiderunt. Clusius illam vidit & accuratè descripsit.

Sanguis igitur draconis & arboris cuiusdam exoticæ, & gummi in ipsius ramis concreti, duri, purpurei nomen est.

Vim habet collecticam & agglutinatoriam: Ob id vulneribus coalescendis conuenit, & partibus laxioribus & stringendis & roborandis. Ante vsum facile aqueis dissoluitur.

Vires.



ULTI ex veterum quorundam opinione Asam duplicē constituunt, dulcem seu odoratam, & foetidā: hanc *Altit* Arabum esse, illā Belzoinum officinarū: atque vtrūque ē *Lasere*, seu *Laserpitio* prouenire cōtēdūt. Verūm quid sit Asa dulcis, nondū cōpertū est: Et forsā tam est ignota

recētioribus quā vix perspecta veteribus foetida; cuius haud scio si meminerint. Nūc verō tā frequēs est in Pharmacopolijs, vt importunē tyronum nares feriat. In nascitur ferulaceę stirpi, vt *Beniuinum* arbori proceræ, cui *Asē* nomen nuspiam inditum inuenimus. Vt igitur singulorū diuersus odor, sapor, & origo, sic diuersa nomenclatio.

Est autem Asa foetida excrementum, seu gummi *Lasere*, seu *Laserpitij*, quod *Silphiō* *Dioscorides*, *Auicēnas* *Altit*, siue *Antit*, *Indi*, *An-*
inden, *Officinę* *Assam*, sed magis propriē *Asam*, quasi *laser*, ex quo de-

C. 4. 9. 4.
lib. 3.

Quid differat
Asa ab Assa.

promitur, nominant: nam *Laser* lacryma est, *Laserpitium* planta, ex qua elicitur *laser*, seu *Asa*, nō *Assa*, quæ secundū *Rhasim*, herba est quibusdā hisopos, alijs thymū dicta. *Laserpitium* verō ferulacea est

C. 2. 1. 9.
de hist.

Maspetum.

stirps, caule annuo, quem *Maspetum* vocitāt, folijs apio similibus, sed flauescētibus, semine lato, foliaceo, radice nigra, crassā, longa, ac interdum cubitali. Audacter quidem *Garcias* *Asam* lacrymam esse *Laserpitij* contendit, sed timidē ac ieunē nimis eius descriptionē exhibet; tātū enim de folijs breuiter loquitur, quę coryli similia credit.

plant.
Theoph.

Laserpitiū
cultura im-
patientissi-
mum.

Peculiare huius culta fugere loca: quamobrē si colatur, mitescatque solum, deuiat, atque omnino degenerat, vt potē natura cultura aspernans, inquit *Theophrastus*, ferocitatisque constant vernaculū.

Magydaris.

Singulas autem huius plantæ partes speciali nomenclatura designari comperio: Nam radicem nonnulli *Magydarem* vocant; Caulem, *Silphion*; folia *Maspetum*; semen, *folium*: Nam *folium* id, semen est, ait *Theophr.* *Magydarem* tamen à *laserpitio* differre annuit. Seu autem pars sit eiusdem, vel planta affinis, Asa *Laserpitij* lacryma est, seu gummi quoddam, quod vel è radice, vel è caule carpitur: Illud *Radicarium*; hoc *Scaparium* ex *Theophrasto* vocatur.

C. 3. 1. 6.
de hist.

Scaparium
Radicariū.

In Armenia, Media, Lybia, Syria nascitur; vnde aliquando succus vocatur *Lybicus*, interdum *Medicus* & *Syriacus*, olim *Cyrenaicus*, quod ex *Cyrenensium* agro copiosus & laudatissimus haberetur: sed is nunc planē defecit *Barbarorum* nequitia, qui odio quodam in *Cyrenenses* ducti, radices *Laserpitij* penē omnes eruerunt, vt ex *Strabone* docetur. Post *Cyrenaicum*, *Syriaco* magna authoritas datur, deinde *Medico*, qui nempe è Media deuehitur.

Traduntur autem asæ duæ varietates, vna pura, ac syncera & translucens, altera turbida & impura, cui nempe farina, aut furfur, & secundum quosdam *Sagapenum* permiscetur, cuius halitus apprimē refert, simulque virorem quemdam ac odorem ter-

Hinc

brasau. Hinc Germani diaboli sterco nominant. Vtraque odoratissima est, Tenfelsz
dreok
gravis tamen; nec in eorum facile descendit sententiam, qui priorem
Asam dulcem, ad foetide discrimen vocant; eius namque halitus non
nisi cum fastidio toleratur. Vnde mirari subit, quod scribit Garcias
ab horto, nullum medicamentum simplex per totam Indiam maiore
esse in usu, quam Asam foetidam, cum in medicamentis, tum in con-
diendis cibis. Eam autem solent Indi suis iusculis & oleribus com-
miscere, confricato primum ex ea lebetes, nec alio condimento vtun-
tur omnibus in cibis, ipsamque sumunt, vt appetitus deiecti fastidia
tollant. Verum si hoc fabula non sit, ex duobus alterum coniecto, aut
Asam foetidam in India non foetere, aut Indos aneum guttur, vt vul-
go fertur, habere. Adeo autem nobis est ingratus illius odor, sapor-
que, vt venia quadam dignum censemus Mattheum Syluaticum, qui
inter venena reposuerit. A Dioscoride tamen commendatur cibus,
aut sal permista.

Ase vires tot, tantasque agnouit Dioscorides, vt eas recensuerit ad Vires.
fastidium; recentiores efficacissimas quidem credunt, ad paucos ta-
men effectus, nec frequentissime vsurpant, nisi in vteri ascensu, aut
aberratione, & paucis quibusdam morbis muliebribus.

De Sagapeno. CAPVT IX.



SAGAPENVM, & Officinis Serapinum liquor est
concretus; qui in Media ex ferulaceæ stirpis radice
sauciata manauit. Eius autem plantæ descriptionem
subticuit Dioscorides, quod eam fortassis minis no-
uerit quam succum. Illam verò nondum videre, nec
illius historiam à probatis authoribus enarratam le-
gere mihi contingit. Exotica enim planta cum sit, vix cicuratur, aut
cicurata sterilis est, exucca, & marcida. Ideoque rātum ad nos eius
succus concretus aduehitur, & copiosissimus, & optimus. Laudatur
translucidus, foris colore fuluo, intus albido, gustu acri, odore graui,
substantia crassa.

Sagapenum calefacit ordine tertio, siccatur secundo: purgat pituitam Vires,
crassam, & alios humores lentos. Mesnei testimonio. Ignaua tamen
est multum illius purgatoria facultas, sed alias multo potentiores vi-
res habet. Potum enim aut suppositum menses euocat, foetum ene-
cat, dolori & præfocationi vteri prodest; Resoluit, attenuat, dissipat,
mouet, soluit.

De Galbano. CAPVT X.



ALBANVM quoque ferulæ Syriacæ in Amano monte
luxuriantis succus cōcretus, quem aliqui Metopium no-
minant. De ipsius autem plantæ dignotione nihil Dios-
corides scripto reliquit, vt qui gummeum illius succum,
magis quam plantam agnosceret. Vt verò cognatæ
sunt ferulæ, sic earum liquores & succi, non modo consistentia,

sed colore, odore, sapore, viribus, nam Galbanum aspectu Asana non malè refert, odore Opopanacem. Laudatur cartilaginosum, syncerum, ad similitudinem Ammoniæ, minimeque lignosum, & in quo nonnihil seminis ferulæ sit ammistum, odore graui, neque valdè humidum, neque squalidum. Aqua, aceto, vino facilè dilui potest vt omnia gummi.

Vires. Vim habet excafactoriam, extractoriam, & discussoriam. Menstrua & partus accelerat & appositu & suffitu. Aceto dilutum & pauco nitro mixtum, lentigines delet: furunculis quoque discutiendis prodest, strumis & iuncturarum nodis: aduersatur venenis & serpentes fugat.

De Opopanace. CAPVT XI.



POPANACEM succum esse Panacis, & nomen ipsum indicat, & Dioscorides prodidit: sed cum multa sint Panacis genera, ex quonam illorum profluat, non satis apertè liquet, ob variam eorum qui ea de re statuerunt, opinionem. Mesuè ex ferulaceo Panace manare scribit: Dioscorides ex Hera-
cleo, nonnulli ex Chironio.

Panaces syriacum.

Dodoneus ex peregrino quodam, vtpote Syriaco, quod foliis est amplis, ex alijs pluribus commissis, aliquantum asperis & hirsutis, longis, latisque. Caulis ei geniculatus, ferulaceus, tres aut quatuor cubitos altus, superna parte plures in ramulos dirēptus: flosculi ex amplis vmbellis exeūt lutei, quos sequitur semen latū, planū & subflauum: Radix albicans & longa, succulenta, & odorata. Ex vulnerato caule, maximè circa radicem æstate, gummeus succus sponte concreescens effluit, qui Plinij, multorūque aliorū iudicio Opoponax est, ad vsus plurimos commendatissimus, quod indicare videtur plantæ, ex qua eruitur nomenclatio, nam Panax seu Panaces dicitur, quod omnem morbum & dolorem abigat, vel omnibus remedia promittat: hinc multi Agyrtæ & pseudomedici, medicamenta quædam, sæpè morbis ipsis periculosiora, Panaceas nominant. Sic sæpè dum viueret Aulicos & nimis credulos fefellit medicus quidam, hominum mendacissimus, bibacissimus, vanissimus, salacissimus.

Vires. Opoponax inter gummi locum habet & aqueis facilè dissoluitur. Excafacit ordine tertio, siccatur secundo: Emollit, digerit, attenuat, flatus dissipat, lenit, expurgat. Probatum valdè amarus, internè albus, aut subfuluus, pinguis, tener, friabilis, statim liquefcens, odore graui. Niger ac mollis improbatur.

De Sarcocolla. CAPVT XII.

Plin. c.
9. lib.
12.



ARCOCOLLA cuiusdam arboris peregrinæ & gummi ab ipsa manantis nomen est. Nascitur in Perside fruticosa & spinosa, ramis nodosis & arbori expressis, ex quibus saueiatis & interdum spontè profluit lacryma thuris, pollini similis, colore sub-rufa, amara sapore.

Calefacit ordine secundo, siccatur minus: coquit, terget, carne implet & glutinat, vnde Sarcocollæ nomē: nam cruētis vulneribus, ac diuturnis vlceribus mirificè medetur. Ea quippe propria dote a for-
dibus mundat, carne noua replet & cicatrice obducit.

Arabes non tantum Sarcocollam ventrem subducere, sed humores crassos & glutinosos e partibus dissitis, vt articulorum cavitatis educere scriptitarunt. Ratio tamen id videtur denegare, nec effectus comprobare. Efficaciter autem vulnera conglutinat, ocu-

lorum fluxiones inhibet, & ex Galeno digerit, sed minus quam galbanū: lacte asinino quinque dies macerata in vase vitreo, quotidie lacte mutato mirificè prodest oculorū albugini, nubeculis & cicatricibus.

De Gummi Hedera. CAPVT XIII.

Lib. 4.
compos.
med.
part.



Maiores hederæ trunco vulnerato & interdum sponte lacryma quædam, seu gummeus succus exire ex flauo rubescens, odore grauis, sapore multum acer, quem gummi hederæ nominant. Est verò hedera arbor scanforia, quæ muros interdum vestit, interdum arbores vicinas quas suo multiplici complexu & virore interimit.

Sunt autem eius prima genera duo, vna maior, quæ in altitudinem sese erigit, altera minor, quæ viticulis tenuioribus & obsequiosis humi defixa repit, nec florem, aut fructum vllum profert.

Maiores triplici notatur varietate, quædam enim dicitur alba, quæ fructum gerit album, alia nigra, quæ nigrum; tertia Helix, quæ nulum, & à nonnullis pro minore hedera sumitur.

Alba nonnunquam Corymbos, seu fructus, aliquando folia alba exhibet, & inter media folia emittit velut brachia, seu capreolos, quibus tam arctè complectitur arbores, vt totum humorem sugendo enecet, inopia enim succi marcescentes facile emoriuntur, vel tam pertinaciter parietibus hæret, vt vix possit se-
iungi. Nam tot initia & radicum rudimenta effert, quot brachia, quibus muris obrepit, & ita viuax permanet, vt pluribus locis inter-
cisa, non tabescat.

Nigra & magis vulgaris, quam Dionysiam vocant, ait Dioscorides, vbique per parietes & macerias reptat, & arbores etiam proceras radicosis velut digitis amplectitur: folia promit angulosa, in principio ferè triangula, dein magis rotunda, dura & perpetuo virore nitentia: flores exiles, baccas primum her-

baceas, mox nigras, oblongis pediculis quasi racematim adherentes. Cetera ad genus hederaceum spectantia notiora sunt, quam ut longiore discursu & explicatione indigeant.

Hedera omnis calida est, raròque medicis inseruit vñbus, folia si exceperis, quæ fonticulis, ex pyrotico relictis, Sparadrapì loco nonnunquam adhibentur, ut ichores & serosos humores ad partem alluciant. Eius gummi lentes interimit, insigniter calefaciendo, sensum adustionis imprimit, & pilos destruendo caput nudat. Illitu enim est psyloptron efficax.

SECTIO OCTAVA.

DE RESINIS.

SECTIIONEM de Resinis specialem constituimus ut certius cognoscantur & fidelius distinguantur à gummis, & posthac simul ambo antiquata iam pridem inscitia minimè confundantur. Turpe enim est in re vulgari adeo oscitanter errare, & liquores plantarum concretos & aqueos quales sunt gummi, cum pinguibus & oleaginosi, quales resinae sunt congerere, & indiscriminatim usurpare. Ut enim diuersa est illorum inter se natura & origo, nam ex plantis ferulaceis nonnunquam educuntur gummi, non resina, sed ex arboribus ex parte magna proceris, sic quoque qualitas & agendi virtus. De resinis ergo instat ut agamus.

Quid resina, & eius varietas. CAP. I.

RESINA πῆμα Græcis dicta, lacryma, seu liquor est, pinguis ac oleaginosus sponte sæpius ex arbore, & interdum ea vulnerata defluens. Qui nullo vulnere profilit αὐτόπῆτος, & à quibusdam προτόπῆτος dicitur.

Omnis resina cum partium tenuitate substantiam habet oleosam; Ob id in oleosis, ut pote cognatis promptè solubilem atque in eo à gūmi dissidentē, quod cū aquea magis substantia constet, aqueis expeditiùs & accuratiùs permiscetur, ut dictum est supra. Sunt autem resinarum, si consistentiam spectemus, duæ generales differentiae, vna dicitur liquida, Græcis ὑγρὰ, hoc est humida, seu fluxilis, ut Terebinthina, alia durior & siccior, quam σπυκτὴν, id est, frictam, seu tostam subinde vocitant, cuiusmodi est Colophonia, sic dicta, quod ex Colophone olim aduehebatur, quæ omnium siccissima, flauissimaque; in puluerem tamen redacta alba est.

Resina li-
quida.

Frieta.

Colopho-
nia.

Hæc præ cæteris nuncupatur *ρουνή* & aliquando *συρομένη* quasi confusa, quod ex multis simul congestis in massam induruerit. Con-
tingit enim sæpè ut primiflua resina, negligentius collecta arenas, si-
lices, lignosas quisquillas, aut alias sordes contrahat & retineat, à
quibus ut repurgetur, igni liquatur, extranea reiiciuntur, & purior
redditur, sicque durior & siccior.

Resina sic-
ca.

ξηρά

ρουνή π. τούτων.

Vires

Vires.

Lib. 3. *ρουνή π. τούτων* quasi germinatio picea, à Galeno nuncupatur.

de com. med. gener. Quæ venalis prostat in Officinis dura, flavescent & friabilis, con-
fusa quædam est resina, ex abiete nempe, Strobilina & Pityina con-
stans, fumum quæ reddit, dum accenditur, thuris æmulum.

Cap. 1. Strobiline passim meminit Galenus, quam alij ex Pinu, alij ex Pi-
cea, alij ex pineis nucibus, quas strobilos vocant, manare dicunt.

Lib. 2. Hæc resinarum calidissima est Terebinthina ambabus qualitatibus
comp. med. omnium moderatissima, Omnes siquidem resinæ calefaciunt &
exsiccant, sed hæ magis, illæ minus.

Cap. 1. Omnium siccissima est, quam nonnulli frictam, alij Colophoniam
gener. vocat, ut & omnis quæ igne purgatur, & in frictam mutatur ex Galē.

Lib. 7. Abietina utraque qualitate media est inter calidissimam & siccis-
comp. med. simam, quæ malè à quibusdam dicitur Colophonia, nam liquida diu
durat, parùm siccatur, & nascitur admodum modica, ob id pretiosior.

gener. Omnibus resinis præfertur Terebinthina, deinde Lentiscina, quæ
etiam gummi-resina est; tum quæ de Abiete colligitur; postea quæ de
Pinu & Picea.

Usus resinarum multus est, non tantum in arte Pharmacaria, sed
in rebus alijs pluribus. Emolliunt, calfaciunt, digerunt, & commo-
dissimè emplastris & vnguentis ad vlcera & vulnerum curatio-
nem dicatis, admiscuntur.

De Pinu autem & arboribus coniferis supra differuimus Sectione
de fructibus.

De Pice. CAPUT II.



Æc frequentèr occurrunt in resinarum enarratio-
ne & dilucidatione vocabula, Pix, Teda, Pissa, Pa-
impissa, Zopissa, Pissaphaltos, & pix naualis, nec
I quid per ea designetur omnibus in promptu est. Pix
dicitur resinæ combustæ fluxus: sic tamen melius, Teda quid.
pinguis est & resinofus liquor ex accensa teda colli-
quatus & eductus.

Est verò Teda non arboris genus, ut falsò putauit Plinius, sed
morbus arboris, Pini videlicet, per senectutem nimia pinguitudine
veluti strangulatæ. Vbertas enim resinofæ materiæ, qua totum pini
lignum refertur, illi interitus est, & ferè tota in Tedam abit, quæ
artificiosa sedulitate accensa, picem fundit, quam Pissam Græci no-
minant.

Pissa.

- Palimpissa** Palimpissa quasi iterata pix, ac secundo cocta dicitur, quando scilicet è liquida coctione & elaboratione crassescit, purgatur, atque durior & siccior euadit, *ἐν πῶτι* quoque, id est, sicca pix dicitur.
- Zopissa.** Zopissa est pix à nauibus maritimis derafa, quæ propter falsuginem quamdam ab aqua maris cōtractam, omni pice ad exsicccandum & discutiendum est efficacior. A nonnullis Apochyma nominatur.
- Pix naualis.** Pix naualis propriè in pharmacopolijs dicitur à nauibus picadis, nō jamdiu picatis, vt zopissa. Et quū absolutè pix naualis ponitur illa sumenda, vt hæc dum zopissæ designatio notatur. *Diosc. ca. 99. lib. 1.*
- Pissaphaltū.** Pissaphaltum est bitumen Pici commixtum, quod ad mortuorum conditurā olim vsurpabatur. Dioscoridi tamen nō videtur mixtura artificiosè parata, sed naturaliter talis: Nascitur, inquit, in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quod pissaphaltum nuncupatur. Sed de eo postea fusiùs agemus commodiore loco. *sest. ult. c. de Mumijs*
- Qui differat pix & resina.** Differt autem pix à resina, quod illa per ignem transierit, hæc spontè effluerit: vtraque arborum earundem soboles, verū pix est veluti resina cocta & ignis adiutu educta.
- Picis faciēdi modus.** In Pice autē educēda sic ferè proceditur, vt in carbonis faciēdi modo. In loco lapidib. aut lateribus artificiosè strato, tedē in hastulas cōcissæ aggerūtur: Superponūtur rami abietum & piccarum: Omnia ita cōteguntur terra, aut luto, aut alia materia non vstibili, vt ne rimula quidem circumquaque pateat, sed in vertice tantū, aut alia parte magis idonea foramen relinquatur, per quod ignis immitti & flāma primū emitti queat: accensis tedis, omnia arctissime occludēda, ne flamma erumpat, & picis expectatio pereat. Quod si rimula quēdamhiarit, & flammam aut funum admiserit, terra aut luto obstruenda.
- Pix cur nigra.** Tum assulæ tedæ vi ignis æstuentes copiosum liquorem exprimūt in canales affabrè constructos, per quos & ipse deducitur in scrobes ac vasa idonea, fluenti pici excipiendæ dicata. Nigredinem autem acquirit à fumo & calore, vnde Pix nigra solet esse; nam quæ flaua est resina potius dicenda.
- Pix liquida.** Quæ primū exstillat, fluxilior est, humidiorq; & Pix liquida Officinis, Cedria Plinio, Pisselæon Diosc. dicitur, quod maximè tale euadit, separato, qui supernatat pici, sicuti lacti serū, aquoso humore. Separatur verò dū Pix coquitur, velleribus mundis supra halitū eius expansis, & cū eo præmaduerint expressis. Verius tamen pisselæon medicamentum ex oleo & pice compositum; quā simplex dicitur.
- Quæ secunda fluit, crassior, sicciorque. Quæ vltima, crassissima & durissima, & ad exsicccandum efficacissima.
- Ad liquidam refertur alia quædam grauis odoris, quam Seplassarij nunc oleum Cadinum quod cado contineatur, nunc Takinum vocitant, cuius vsus ad pecudum genus transfertur. Gallorum vulgus Arabum idioma retinens quodran, & corruptè quoitran, & aliquādo goitran, Belonius cedriam nominat.

Cū pix vniuersa vel liquida, vel siccior, vtraque syncera, lauis Vires.
& splendens laudatur. Illa emollit, digerit, dolorem lenit, coquit, pus
mouet, scabros vngues extricat, impetigines emēdat, & duritias vul-
uæ & sedis discutit. Siccior hæc omnia præstat, sed imbecillius; po-
tentiùs vero siccatur, & coalescendis vulneribus magis conuenit.

De Terebinthina. CAP. III.



ERA Terebinthina ex Terebinthino, seu Termītho;
vt Græci dicūt, habetur. Est enī liquor pinguis ex eius
trūco & ramis defluēs. Optima est clara, perlucida, al-
ba, acris & odorata: quæ prædictis dotibus subflauescit
nō improbanda. Laudatur quæ ex Chio Insula defertur,
Chia ob id nūcupata quæ odore & gustu ceteris atrecellit, & plus Te-
rebinthi refert. Post hæc Lybica probatur, etiā Andromachi testimo-
nio; dein Pōtica. Minus celebratur Cypria, Syriaca, Iudaica, Arabica.

Est autem Terebinthus arbor contorta, fruticosa, ac mediocri ma-
gnitudine, caudice crasso, ramis multis, oblongis, folijs fraxini modo
longis, ex multis ad vnam costam coherentibus, sed crassioribus &
pinguioribus, quorum singula laurinis similia cernuntur: flores ad-
modum parui sunt muscoli & purpurascētes: fructus exigui bac-
carum ritu racematim coherentes, rotundi, oblongi, duri, pingues ac
resinosi, & manus contrectantium inficientes.

Fert præterea veluti quamdam siliquam oblongam, instar corni-
culi incuruam, in qua vermiculi similes culicibus reperiuntur. Ali-
quando etiam humor quidam, vt in vlnerum vesiculis continetur.
Materia ligni lenta, nec valde dura est, radices validæ in profundo.

Terebinthorum quædam mascula dicitur, quæ sterilis est; alia fœ- Terebinth.
mina, quæ fructus gent. Hæc adhuc pro fructus vario colore duplici mas.
differentia signatur, vna cui fructus lentis magnitudine rubet; altera
cui & grandior & pallidus est, & suauius fragrat.

Nascitur copiosa in regionib. calidis, atque his potissimū leta viret,
à quibus eius liquor nomē & laudē assumit, vt in insula Chio, in Cy-
pro, Syria & circa Idam & Macedoniam. Sunt qui perhibent ad nos
deuehi terebinthinam durā, siccamque, sic ignis ope cōcretam, quæ
pro resina vēditur: vix tamen suspicor nōnullos adeo esse mentis in-
opes, vt terebinthinā coquēdo deteriorem & viliorem reddant, & è
lōginquis regionibus adferāt. Terebinthina enim qualiscūque fue-
rit, sēper pluris emitur, quā ea ipsa resina, industria qualibet cōcreta.

E larice quædā resina humidissima habetur, quæ terebinthine quod
l. 2. cōp. sit valde similis, pro ea sēpē ab institoribus exhibetur & venditur ig-
med. gē. norantibus eas discernere, inquit Gal. Sed Larigna odore, gustu, &
cap. 4. facultate, quā terebinthina acrior, atque tenuioribus partibus &
c. 5. l. 3. maiori discutiendi virtute prædita est.

cōp. med. Ex resinis omnibus, principatus debetur terebinthinæ, post eam
gener. lentiscinæ secundum Dioscoridem; tum ei quæ de Picea educitur &

Terebinth.
Larigna.

abiere : post quas Pineæ, strobilinaque numeratur. Galenus tamen lentiscinam terebinthinæ præfert.

Vires.

Terebinthina resinarum mitissima est, vulnerum familiare Balsamum: moderatè calfacit, mollit, expurgat, discutit, renes purgat, vrinam mouet, atque optimum est in multiplices vsus accommodatum præsidium. Quibus polleat viribus eximijs, norunt satis, qui virulentia gonorrhœa laborarunt.

De Thure. CAPVT IV.



Hv s arbusculæ cuiusdam in Arabia nascentis lacryma est resinosa, quæ ab incolis vernacula lingua modò *Conder*, modò *Louan* appellatur. Eius duo traduntur genera, vnum dicitur Olibanum, seu thus masculinum, quod ex albo flauescit, limpidumque, pellucidum, pingue, ac siccum est, & resinæ Cedriæ puritatem, atque succini nitorem æmulatur. Forsâ Olibanum dicitur præposito & adnexo articulo græco, o, cùm satis esset thus libanum enuntiare, quod è monte Libano deferatur.

Alterum dicitur fœmininum, quod resinosum magis est, ac molle, & citò ardens, quodque bonitate masculo cedit. Vtrumque ex plâta manat, vix dum cognita, nisi de paucis notis, quia arbor est peregrina, Arabiæ indigena, pusilla, fo ijs lentiscinis: Cuius duæ traduntur differentiæ, vna dicitur montana, quæ tantum in montibus confragosis & asperis fruticat, optimumque thus profert. Altera in locis tantum planis viret lætiùs, Ex qua copiosum quidem thus promanat, sed multò minùs bonum. Vtrumque faciliè oleaginosius diluitur.

Thuris cortex crassus est, pinguis, odoratus, læuis, minimè scaber & sine membranis. Vis ei eadem, quæ thuri, sed calidior, astringentiorque, & crassiorum est partium quam thus.

Manna
thuris.

Vires.

Mannam thuris vocant, micæ ipsius concussu elisas, quod dum conuehitur euenit, vt alibi demonstrauimus. Intus & foris thus usurpatur, & aduersus morbos multos magnæ est vtilitatis. Vires siquidem habet penè innumeras, quas recensere longum nimis foret. In primis qualitatibus calefacit ordine secundo, siccatur tertio, & puris mouendi facultatem habet, sed non valde efficacem.

Manna thuris vim habet magis astringentem à portione thuris, quam habet admixtam, in eoque differt à thure, quod & minus astringit & coquit.



BENI VINVM Officinis Belzoinū dictum, nec Laserpitij, seu Cirenaici succi, nec myrrhē species est, vt nōnulli cōtēdūt, nec Angelicę vulgō dictæ aut Imperatoriæ succus resinofus, vt inuere videtur Ruellius, Laser enī seu Asa ex Syria, & Cyrene, & India in alias regiones; Benjuinū in Indiā ex alijs regionib. vt *Samatra* & *Sian* aduehitur, nasciturq; nō in ferulacea stirpe, sed in arbore præcella, cuius caudex crassus & durus est, multis ramis brachiatus, ordine pulcherrimo dispositis, & in latum extēsis: folia oblonga, citri æmula, mucronata, at non vsque adeò virentia, sed auersa parte candicantia. Ligni materia dura est, odorataque.

Spontē sēpē nascitur in multis syluis, tum Malacę, tum aliarum regionum, quas ob Tygridum frequētiā sēpē periculosum est adire.

In quibus hæc animalia ferocissima rarius visuntur, vulnerantur arbores, quæ huius odoratissime resinæ copiam effundunt, quam Chinenfes *Cominhan*, Arabes *Louani doy*, Guzaratæ & Decan incolæ *Ydo* vo-

Garcias
Cap. 5. cant.
lib. 1.

Tria autem notantur Benjuini discrimina, vnū dicitur amygdaloides, quod maculas candidas amygdalarum delibratarū instar refert, quod maximè ab institoribus expetitur. Alia duo admodū nigra sūt, quorum alterum parūm fragrat, & vilioris est pretij; alterum suauissimè spirat, & è nouellis arboribus exudat; à Samatræ incolis *Benini de Boninas* nuncupatur. Omnium censetur optimum, pellucidum, globulis candidis refertum, thuris æmulum, & suauissimè spirans.

Benjuinum cor, spiritus, & facultates omnes roborat & thymiamat. Virentis, antidotis & medicamentis ornatui dicatis vtiliter permiscetur. Oleaginosus autem perinde ac resinæ aliæ facile dissoluitur.

De Euphorbio. CAPVT VI.



AEUPHORBIO Iubæ Regis Mauritaniæ Medico, Euphorbiū primū nōmē accepit, & hucusque seruauit. Est autem Euphorbium Dioscoridi, arbor ferulæ speciem gerens, acerrimo succo prægnans, cuius eximium feruorem expauescentes incolæ, ouillas pelles arbori circumligant, & eminūs cōtho ramos eius vulnerant: E plaga tūm copiosus succus in pelles defluit, qui postea concretus colligitur.

Dodoneo verò non arbor, sed herba potius est, folijs oblongis, crassis & virentibus, in rotunda figura angulosis, multis albicantibus spinis, ordine duplici armatis, ex quibus fauciatis liquor acerrimus, mordacissimus, facilēque concrescens effluit. Est enim, vt scripsit Galenus, causticæ & exulcerantis facultatis, & vsque adeò calefacit, extenuatque, vt in hoc cætera liquorum cōcretorum genera superet.

Ob tam vehementem acrimoniam & summam tenuitatem non nisi magna cum molestia pulueratur, cuius rei gnari Pharmacopolæ

rusticis quibusdam, ac conditionis infimæ viris terendum committunt, monentque vt à pila, in qua teritur, vultum auertant: nunquam tamen ab eius feritate intacti redeunt; nam eius polline & vapore sursum elato tam importunè feriuntur nares & cerebrum, vt sternutatio, acrimonia, calor, dolor confestim ac simul ingruant. Euphorbij planta primùm videtur herba, sed quæ ætate arborefcit.

Vires.

Præter calorem eximium & acrimoniam insignem, purgandi quâdam facultatem habet, qua non tantum pituitam, sed aquam ducit: per se tamen nunquam datur per os, nec cum alijs nisi rarò & parua quantitate.

*De Lacryma Oleæ Æthiopica, improprie Gummi
Elemi dicta. CAPVT VII.*



DIGNIS illa lacryma concreta, Officinis Gummi Elemi dicta, gummi nō est, sed resina, vt quæ in igne facilè flammam concipiat, & oleaginosus diluatur. Scammonio vtcunque similis est, ait Dioscorid. sed ca. 142. lib. 1. magis flauescens, aut potius subrufa, minutis stillicidijs mammosa, nec linguam vellicans, aut gustum mordicans, vt scribit idem author; vnde forsan de alia lacryma loquitur, quam de hac vulgari, quam gummi Elemi Pharmacopæorum vulgus nominat, gustuque iners est, nec acrimonia notabili os & palatum ferit. Ex olea Æthiopica stillat, & vbi in glebas concreuerit, ad nos deuehitur.

Vires.

Calefacit, emollit, digerit, resoluit, coquit, ad suppuratū ducit, dolorem sedat, & vnguētis atque emplastris vtilissimè multis permiscetur.

Similem ferè lacrymam Oleæ nostrates & Oleastri eructant, sed parciolem & minùs commendatam: Ad oculorum tamen hebetudines & albugines valet illitu; & si sumatur menses cit, & partus extrahit; sed sumendam non censeo, si inter venena scribatur, vt scribit Dioscorides.

Tacamahaca.

Gummi Elemi vulgari, seu lacrymæ Æthiopice admodū simile est quoddam resinæ genus, ex noua Hispania delatum, quod Indi vernacula lingua *Tacamahaca* nominant, apud quos vsus est plurimi ad tumores frigidos coquendos, digerendos, resoluendos & dolores sedandos, huius vires pluribus recenset Nic. Monard. lib. de simplicib. ex orbe nouo delatis.

Caranna.

Ad Tacamahacam accedit alia resina, pinguis, oleaginosa & tenax, Indis *Caranna* dicta, qui ea vtuntur in tumoribus, & omnis generis doloribus. Verùm cum resinas omnes persequi non statuerimus, sed eas tantum, quæ in Antidotario nostro vsurpantur, huic sectioni finem imponemus.

SECTIO NONA.

De Gummi-resinis.



Oncreti liquores seu ex stirpibus ferulaceis, seu ex fruticibus, vel arboribus excelsis manarint, modò aqueis promptè diluantur, nominantur à Galeno speciali nomine gummi; ut qui eandem originem sortiti, oleis & pinguibus facilem admittunt dissolutionem, in resinarum ordinem reponuntur. Qui autem inter utraque ambigunt, & æquè aqueis & oleaginosi dilui patiuntur, Gummi-resinæ à nobis dicuntur, cuiusmodi sunt Mastiche, Caphura, & Styrax ut quædam alia, quæ nonnulli gummi, alij resinas appelliant. Ab his pauca quædam deflectunt, quæ quòd accuratè cum oleis, aut aqueis dilui non queant, Anomala gummi-resinæ à nob. vocantur, de quibus in calce huius sectionis breuiter differimus

De Mastiche. CAP. I.



e. l. l. 9. de hist. plant. **M**ASTICHE gūmi-resina est omniū optima, è Lentisco exudans. Præstantior censetur, quæ in insula Chio prouenit, odorata, candida, splendens, friabilis, adulta & retorrída. Deterior virescens & nigra, Ægyptia dicta, aut Pontica, & bituminis similis. Mastichem adhuc spinam Ixinam reddere Theophrastus author est, sed Lentiscinam quauis alia (si quæ detur) præstantiorem artis medicæ proceres statuunt.

Est autem Lentiscus mastichem eructans, arbor admodum proce- Lentiscus
ra, *σχινος* Græcis dicta, ex cuius radice multi stolones coryli modo, concresecunt, ramis lentis & flexilibus brachiati. Folia ab vno pediculo ferè octona cohærent, folijs glycyrrhizæ non multum dissimilia, sed duriora: flores muscoli plurimi, pediculis longis adhærent; quibus bacca succedunt Erui magnitudine, initio virides, & vbi maturuerint nigræ, substantia quadam pingui & nucleo intus nigro & duro turgidæ.

Præter folia, flores & fructus lentisco adnascuntur, velut vtriculi intorti, corniculorum ritu, in quibus initio liquor continetur, ex quo infecta quædam culicibus similia, velut in vlmi vesicis nascuntur.

Ex eius ligno dentiscalpia fiunt optima, quibus non modò repurgantur dentes, sed roborantur gingiua, constringuntur & ori suauitas

conciliatur. Ob vires eius eximias non malè substituitur pro Xylō balsamo.

Ægrè lentisci fruticant Lutetiæ, duas tamen vidi in horto Ioan. Gonerij rei herbariæ studiosissimi, sed quæ sæuitiam hyemis ægrè perferunt.

Vires.

Mastiche ad multa commendatur, sed maximè ad stomachi & ventriculi affectus: nam sumpta, vel admota, dolores illius sedat, nauseam & cibi fastidium tollit, retinendi potentiam roborat, & coctionem iuuat. Prodest & hæmoptoicis in linctu cum syrupo conueniente, vt etiam veteri tussi: commanducata oris halitum emēdat, & pituitam è cerebro blandè attrahit. Vt optimè pulueretur, debet & solet parum aquæ commisceri. Dissoluitur autem facilè & aqueis & oleaginosi.

De Caphura. CAPVT II.



APHURA nec bituminis genus est, nec medulla nec medicamentum compositum, vt nimis oscitanter nonnulli crediderunt, sed Gummi-resina quædam pellucida, Dioscoridi & Græcis veteribus incognita, ex arbore peregrina manans, quam Garcias ab horto iuglandi nuci similem dicit, sed folijs magis candicantibus: Ligni materia cinerei est coloris, & interdum nigrioris, nec leuis, aut fungosa multum, sed mediocriter densa & solida.

Procera est hæc arbor, ramos quaquauersum fundens, & aspectu perpulchra; quæ non lacrymas vberius exudat cælo coruscante, aut cerebro tonitru crepitante, quàm placido ac sereno, vt inscienter putarunt multi.

Effluit autem ista lacryma per arboris rimas reliquorum gummi ritu, syncera, ac candida, nec coctione ad conciliandum candorem egens. Si namque puluerem, sordes, aut lapidum vel ligni fragmenta simul habuerit admista, id fit eorum qui colligunt oscitantia & errore. Seligenda autem cristalli modo splendens, syncera, odora.

Caphura
de Burneo

Præcipuæ verò duæ eius agnoscuntur differentiæ, prima dicitur Caphura de Burneo, quæ præstantissima est, & apud nos nunquam, aut rarò defertur. Altera cognomen habet à Chyna, vnde solet aduehi, nuncque in Pharmacopolijs seruatur. Magnus est enim vsus in his regionibus in quibus prouenit, adeo vt inter cibos interdum admittatur. Meminit Auic. cap. 133. tract. 2. lib. 2. caphuræ maximè vt Auerroës, quæ innascitur & colligitur, quæ halosanthi quoddam genus est, quod caphuralem exhalat odorem.

Vires.

Calidam multi asseruerunt, non modò manifestè, sed ad tertium vsque recessum: alij frigidam mordicus tenent, neque desunt his, nec illis rationes, quas breuitatis ergò subticemus, dicimusque morbis calidis & frigidis multis prodesse. Est enim mistæ qualitatis &

odore, ac spirituum tenuitate videtur afficere caloris modo: Reliquis qualitatibus tanquam frigida laceffit.

Crediderunt multi Caphuram, *Caput & Caphur* Arabibus dictam, Officinis Camphoram, veneris stimulos arcere, & coceptum impedire, soloque halitu viros ad congressum reddere, vnde versus, Caphura per nares castrat odore mares. fecit huius rei periculum non nimis credulus Scaliger, primæ notæ philosophus: omnia falsa deprehendit. Caphura facile pauca addita aqua pulueratur, & aqueis & oleaginosi ac pinguibus optimè dissolvitur, accuratiùs tamen his quàm illis dissolui contingit.

De Styrace. CAPUT III.

STYRAX Syriacæ cuiusdam arboris gummeus resinofusque est succus, concretus, aridus: nullus huius nominis liquidus, humidus, fluxilis, vt imperitè multorum inhæsit animis, qui & liquidum & siccum storacem non modo constituerunt, sed ex eadem arbore vtrumque manare profitentur. Sed revera arbor Styraciflua lacrymam tantum exstillat coagulabilem, quæ scilicet mox tota concrevit in molem densam, pinguem & resinofam, nullaque eius portio in liquorem fluxilem abit, vt iam pridem falsa, vetusque Arabum increbuit opinio: quam qui sectantur, vtrumque affinitate decepti, Styracem pro Staete & hanc pro liquida Styrace nimis oscitanter vsurpant. Vtriusque enim vt diuersa consistentia, odor, sapor, qualitas, sic origo & natura: nam Staete est pinguitudo myrrhæ recentis, cum pauca aqua tusa & expressa, atque in vnguenti liquidioris formam redacta: aut si mauis, pinguis est myrrhæ flos, vel eiusdem recentis tusa & expressa præpingue serum, vel tortium ius machinis quibusdam e ductum.

Staete quid

Melior iudicatur Staete; quæ nullam olei mitionem admiserit. qualitatem enim myrrhæ non modo calefactoriam habet, sed eius exigua portio virium quoque est compos plurimarum, ait Dioscorides.

Diosc. cap. 72. lib. I. Storax verò, vt cum seplasiarjis loquar, vel potius Styrax, quia stiriati ex arbore extillat, vbi ex arbore profilit, mox concrevit in glebâ densam, solidâ, resinofâ, aliquot grumis albicantem, suauissimè fragrantem. Laudatissimus Calamita, quod in calamis è Pamphylia ferebatur, nuncupatus, pinguis, lentus, fragmentis albicantibus, odore perseveranti. Improbatur fursurosus cano situ obductus, inodorus. Optimus quoque ex Cypro, Sidone, & Pisidia ad nos aduehitur: Nunc autem Calamis aduehi desit.

Ex arbore malo cotoneæ simili manat, cuius tamen folia minora sunt, minusque rigida, & auersa parte cana: flos albidus Arantia magnitudine, non odore: baccæ admodum parvæ ternis vngulis exceptæ, ac pediculis longis hærentes surculis adnascuntur. Eius autem arboris concretus liquor plurimum laudatur, qui præter dotes

superius dictas, diutissime in sua odoris suauitate permanet.

Qui vero melligenus liquor passim in officinis Styraçis liquidi nomine reperitur, nec myrrhæ primiflua, ac sincera lacryma est, perquam odorata, Staçta dicta, quæ ob eximias dotes pro opobalsamo substituitur, vt nec alia arte quauis expressa & aquæ permista, si modo pinguedo queat aquæ permisceri, & in vnguentum coire, ac diutissime seruari, vt scribitur, sed vnguentoleum quoddam seu liquor inter oleum & vnguentum medius, pinguis, nigricans & fortis, ac ne dicam, fœtidi, seu tetri odoris, qui cum ferè displiceat & ignoretur, paucique sit vsus, vel non, vel pauca quantitate seruatur.

Scribunt autem nonnulli Styraçem liquidum à corticibus styraçis in oleo diu maceratis, & fortiter expressis educi. Alij probabili coniectura imaginaria tamen, ex ramis eiusdem arboris vetustioris, ac moribundæ hastulis & ramis ad ignem admotis, resinofum quemdam succum, vt ex teda picem extrahi, qui oleo permixtus pro styraçe liquida tenetur, cuius quidem halitus licet insuaui, quadam sui parte Styraçinus percipitur, ipsiusque portio facibus cereis permixta, odorem dum accenduntur, expirat gratiorem, vt vt sit, vix credo ipsam esse Styraçem liquidam antiquorum fragrantissimam, & viribus eximijs commendatam. Nam liquida vulgaris vix est calamitæ fax, attamen rubra liquidæ fax perhibetur, cum tamen sit multo purior & fragrantior.

Styraz ru-
bra.

Cum autem frequenter olfecissem balsamum Chynense, eiusque fragrantiam cum liquido Styraçe contulissem, non præter rationem credidi, ex arbore simili vtrumque comparari: verum ex lacryma illud non coacta, hunc vero arte multa, labore, plantæ partium admixtione, & forsan ignis adiutu coire, ac velut in mellaginem fœtidofuauem abire.

Ex Strabone vero colligitur, Styraçem liquidum colligi ex arbore *Lib. 1.* in monte Tauro frequēti, non magna rectaque, in cuius trunco vermis edacissimi genus, inquit, innascitur, qui lignum ad corticem exest, atque inter erodendum velut scrobs, vt ex ferra ad arboris radicem delabitur & congregatur, Tum super eam liquor heterogeneus ex arbore laesa defluens, ipsius portio facile coagulabilis cito concrescit, estque succino similis & seorsim colligitur: Alia portio pinguior cum scrobe, furfuribus & terrosa substantia permiscetur, liquidiorque manet, & pro Styraçe liquido tenetur, estque puro odoratior, viribus tamen impar. Coagulatur & in arboris trunco antequam descendat firmior quædam portio succi, quam legitimum Styraçem & purum esse, qui ex dictaminis ratione tenent, non errant, liquidum vero esse quid partim naturale, partim casu vt scrobe & sordibus alteratur, vt Strabo cēset, vel arte, vt odoratis pinguibus admixtis adulteratum, vt multi credunt, nec illis habeo quod opponam, nisi quod multi credunt Styraçem liquidum esse velut Amur-

cam, seu facem quorundam balsamorum, vt Peruani, Chynensis, Armaca
Toluani, & similium, quæ ex Arabia Felici C opo-viridi, & Indiae ^{balsamorum}
locis pluribus aduehuntur, quæ illic sunt vt apud nos Terebinthina.
Et sane præter fortem liquidi Styracis odorem, ex ipso spirat adhuc
quidam halitus Balsamorum more nares feriens.

Dodoneus non sine rationis examine putauit Styracem liquidum Dodonei
esse Styracis arboris resinam liquidiorē nec coagulabilē, cui myr- ^{opinio-}
rha permista fuit. Sæpè namque cōtingit, vt ex eadem arbore resina
quædam liquidior, alia compactior exudet. Auicenna cap. 623, tract.
2. lib. 2. ait Storacem alium esse, syncerum & suauem, ac pretiosum,
qui sponte effluit, alium impurum & nigrum, qui ex decocto corti-
cis arboris Storacinæ habetur, & Storax liquidus est, quibusdam
Arabibus mel lubne dictus, vt prior, ac naturalis miha, qui scilicet
sponte effluit.



APPENDIX.

De Anomalis Gummi-Resinis.



DISCEDUNT à legibus statutis quidam liquores concreti, qui
licet mediam inter gummi & resinas naturam sortiti, nec tamē fa-
cile & expedite aqueis vt illa, nec perfectè oleaginosi, vt hæc dis-
solvuntur, sed vel subsidunt, vel grumescunt, vel nexum & commix-
tionem auersantur, cuiusmodi sunt Bdellium & myrrha.

De Myrrha & Staete. CAPVT IIII.



MYRRA Græcis Smyrna dicta, concretus est gum-
meus succus cuiusdam arboris, quæ in multis Arabiæ
regionibus & montosis & planis, vt circa Sabe, Adra-
myta, Citibana & Mamali nascitur. Est autem arbor
hæc myrrhisflua, mediocri magnitudine, caudice du-
ro, contortoque iuxta terram, cortice læui ad portu-
lacam accedente, folio aculeato, vlmeo simili. Dioscorides Ægyp-
tiæ spinæ non dissimilem facit, alij Terebintho, Diodorus Lentisco
æquat, Sic tamen vt spinosior sit, & humilior: Nam quinis cubitis
raro est altior.

Nascitur sæpè & lætè in locis sabulosis & arescētibus, atque vt plu-
rimum incultis, vberius tamen, & lætius viret ac fruticat in culto so-
lo. Incidi solet à radice ad ramos adhuc satis conspicuos, Et ex illato

vulnere extillat myrrha: sed ante corticem ferro solutum, spontè & sine plaga, sed veluti cutis hiantibus poris, quasi saliuam quamdam exudat, & stillatitium rorem, quem Staeten nominant, quam imperitè multi styracem liquidum dicunt, vtrumque ex eadem arbore manare mentientes. Verum ex arboribus diuersis effluere, & Styracem liquidum verum dari nullum, aut si detur, Staeten nō esse nupèr fusissimè demonstrauius.

Staete tri-
plex.

Sed ne remaneat crudior hæc res, vt in priore additione, in qua materiam ipsam masticare, diuque ruminare non licuit, dicimus Staeten, seu myrrham, (vtriusque enim est eadem origo & ratio, non soli aut cœli, sed temporis quo colligitur, collectionis modi, & apparatus) triplici discrimine notari.

Staete vn-
guinaria.

Vel enim est primiflua, ac sponte & guttatim exudans lachryma, simpliciter Staete, id est, gutta dicitur, cui nulla præfertur, ait Mathiol. vel ipsius recentis est pinguitudo, cum aqua pauca tusa, & organo expressa, atque in vnguenti formam redacta, vt Dioscor. scribit, quæ rectè Staete vnguentaria, male vero styrax liquida nuncupatur. Vel lacryma est cuiusdam arboris Arabicæ, ex cuius vulnribus & plagis affluit, & myrrha simpliciter, vel cum adiuncto Myrrha Staete vocitatur. Duæ autem priores ita raræ sunt, vt apud nos vix videantur, maximè vero quæ vnguenti consistentiam nacta est, cuius minima portio virium est compos multarum, ait Dioscor.

Myrrha
Staete.

Redeo igitur ad myrrham & arbusculam è qua manat, quæ prorsus exotica est ac peregrina, scabra, spinosa, folijs asperis & aculeatis, sapore Iuniperi: in eodemque solo & cælo, vbi thus nascitur, delectatur & abundè fruticat. Ex eius vulnere lacryma coagulata, ipsiusmet nomine donatur; laudaturque fragilis, lævis, vndique concolor, minutis glebis, amara, acris, odorata, & quæ contracta venas vnguium modo candidas & læues ostendit.

Myrrha
Troglody-
tica.

Quæ ex satiuua arbore colligitur, semper præfertur ei quæ ex syluestri: Sed omnibus antefertur, quæ à loco vnde conuehitur, nomē trahens Troglodytica nuncupatur: quæ colore subviridis est, splendens ac mordax.

Quædam adhuc dicitur Pediasimos, alia Gabi: vtraque quoque bona & copiosam Staetem emittens: Duæ sunt aliæ malæ, Cauclais quæ nigra & retorrída est, & Ergasima, omnium deterrima, macra & cano situ obducta. Est & quædam Mynæa dicta, pessima.

Vires.

Tanta est myrrhæ cum bdellio affinitas, vt multi non differre contenderint: Malè tamē, vt mox videbimus. Operosa est, nec accurata vtriusque cum in oleis, tum in aqueis dissolutio.

Myrrha calefacit & siccatur gradu secundo, vuluam præclusam aperit, menses cit, & partus celeriter extrahit, commanducata graues oris halitus emendat.

Staete

Stacte mira suauitate & efficacia commendabilis, substituique potest pro opobalsamo; verum hoc illa rarior est. Stomachum & partes præcipuas roborat, putredinem arcet, spiritus recreat, morbis ab utero & cerebro multis conducit.

De Bdellio. CAPVT V.

Plin. c.
9. l. 12.



N Baëtris arbor quædam est nigra, magnitudine oleæ, folio roboris, fructu Caprifici, nec insuauis, ex qua manat lacryma, quam nonnulli *Brochon*, alij *Malthram*, alij *Maldacon*, & officinæ Bdellium nominant.

Id probatur gustu amarum, translucidum cum frangitur, pingue cum fricatur & incenditur, odoratum, facile liquefens, simile ceræ, vel taurino glutini, mollescens, sordibus exutum. Galenus laudat Scythicum, Plinius Baëtryanum, Dioscorides Saracenicum, quod scilicet è Saraca felicitis Arabiæ ciuitate deuehitur.

Est & quoddam Indicum, sordidum, nigrum, in offas conuolutum omnium pessimum, quod *Adrobolon* nuncupatur. Laudatur quod in Media nascitur, Parthicum medicamentariæ materiei scriptores nominant.

Porro ex quamam stirpe Bdellium habeatur, non satis inter viros graues & probatos constat; Alij enim exudare dicunt ex arbore ei valde simili, quæ myrrham profert; Alij ex multum dissimili. De hac autem doctorum tam ancipiti opinione non habeo, quod satis audacter possim asserere: forsan habetur vtrumque ex plantis parum dissimilibus, sed alterum ex agresti, alterum ex fatiua depromptum, Perinde ac varia pomorum, pyrorum, & prunorum, in facie, colore, sapore discrimina ex arboribus parum dissimilaneis excerpuntur. Vt ut sit, Bdellium Officinarum minimè rarum est, & his conditionibus insignitum, quas illi veteres dederunt.

Licet autem Bdellium diutissimè in quodam liquore maceretur, aut in pila ductum vix in minimas partes aut totum dissoluatur, attamen dum ab industrioso artifice in mortario calido, cum pistillo quoque calido teritur super-affluendo parum vini aut alius liquoris optimè diluitur.

Calefacit, emollit, resoluit: Duritias & tumores gutturosos & Vires. hernias humidas discutit: Vuluæ spiracula laxat appositu & suffitu: Menses, fœtus & humiditates omnes extrahit, calculos potu comminuit, & pellit vrinam; Atque vtiliter malagmatis inseritur, quæ contra duritates & neruorum nodos profunt.



SECTIO DECIMA.

De alijs stirpium humoribus, seu succis.



*R*antarum sanguis is humor est, qui vstatiore nomenclatura, ait Theophrastus, succus dicitur, quo deficiente, deficiunt ipsæ, luxuriante & latius virent, & vegetius adolescunt. Is autem pro plantarum varietate, ex quibus habetur, varius est: in quibusdā enim crassus, lentus, viscidus, fulvus, rufus, friabilis, gummeus. In alijs pinguis, oleosus, odoratus, resinosis: In quibusdā melleus, lacteus, vinosus, salsuginosus, ut supra iam monuimus. De succis gummeis & resinosis, ac pinguibus suprasatis: instat nunc, ut de alijs quibusdā magis terrestribus & macris differamus.

De Opio. CAPVT I.



Meconiū.

Opium.
Opii varie-
tates.

Carcaz.

Opium cu-
ius qualita-
tis.

*R*AP AVER aut fatium est, aut sylvestre; Atque species vtriusque plures, ut supra docuimus. Ex singulis fatiis contulis expressus succus & concretus, Meconium dicitur. Ex nigri tantum capitulis, aut vulneratis, aut sponte effluens lacryma, seu succus, dignitate quadam omēs Græcis, Opium Latinis dicitur. Eius variæ differentię agnoscuntur, pro regionum, in quibus colligitur varietate. Quod Thebaicum est, & ex Cairo aduehi solitum, albicat, & præstantissimum est. Ex Syria, Alexandria, & alijs regionibus allatum, nigrum, & minus bonum. Ex albo quoque papauere vulnerato, optimum haberi opium recentiores asseuerant. Quod ex Cambaia adfertur, ex prægrandi papauere Carcaz inibi dicto, manat. Cuius scilicet capita singula oui struthiocameli magnitudinem equant: vnde minimè mirum, si ex his cultello læsis succi dimanet vbertas.

De opij qualitatibus non vnus est omnium consensus, Dioscorides & alij plerique non modò frigidum, sed quarto recessu esse tale scripserunt. Mathiolus illis opponit odorem & acrimoniam. Ego mistæ qualitatibus existimo, sed caliditatem leuiorem ac fugacem, frigiditatem validiorem ac contumacem.

Præter qualitates elementares alias habet, quæ ipsum commendat, si opportunè & iusta dosi exhibeatur; Et improbant, si indebitè detur: Tremorem enim & paralytim non tantum inducit, sed ad somnum perpetuum, hoc est, interitum ducit.

Bene paratum & datum, benè prodest: vigilijs namque perpētuis medetur, somnum conciliando, dolorum immanitatem sedat & fallit sensum magis hebetem reddendo.

Magnus est eius vsus per vniuersam Mauritaniam & Asiam, vbi *Amficium* & *Oficum*, quasi opium dicitur, ad animi, quod valde mirum, & corporis erigendas vires & facultates exhilarandas: Siquidem ipsius esui adeò assueuerunt, vt si prorsus abstineant, vitæ discrimen incurrunt, ac sæpè moriuntur.

Eo solent vti Turcæ castra sequentes, vt ad pugnam sint alacriores: & tanquam ebrij vel amentes, ad pericula quæuis minùs formidolosè sese præcipitent.

Putarunt nonnulli venerem quoque excitare: Ratio tamen id negat, & experientia docuit libidinis æstrum potius arcere, atque ignauos carnis reddere motus.

De Elaterio. CAP. II.



ELATERIVM inter medicamenta mochlica & turbatorio motu corpus agitantia numeratur, quo licet violento est olim vsus Hippocrates. Nunc verò eius ferè desijt vsus, nisi in paucis regionibus Italiae, in quibus aliquando vsurpatur, ad earum forsan ægitudinum curationem, quibus benigniora parum profuerunt remedia.

Seet. 2.
lib. de
loc. in
homin.
Seet. 2.
lib. de
int. af-
fect.

Cap. 14
lib. 9.
de hist.
plant.

Est autem Elaterium fructus cucumeris agrestis inspissatus, qui secundum Theophrastum mirabili virtute ducentis annis seruari potest. Omnium medicamentorum inquit, diuturnissimum est Elaterium, optimumque quod vetustissimum. Itaque medicus quidam vir haud insolens neque mendax, elaterium ducentorum annorum, mirabili proprietate seruare apud se retulit, eo à quodam munere donatus. Causa propter quam tam longo tempore seruari possit, humoris copia est; vnde ad Quinquagesimum annum vsque lucernis admotum, lumen extinguit. Modus extrahendi & inspissandi facilis est, quem qui non nouit ex Dioscoride noscat.

Elaterium
quid.

Est autem cucumer agrestis, quem anguinum & asininum appellant, satiuo valde similis, nisi quod folia minus angulosa sunt & magis incana, fructus verò multò minores, ex pallido virescentes, vt & tota planta, seminibus & sueco pleni, qui tacti protinus exiliunt, instar persicariae siliquosae, quam ob id *noli me tangere* vocitant.

lib. 8.
simpl.

Cucumeris agrestis & fructus ipsius succus, quem elaterium vocant, inquit Galen. ad medicationes accommodus est. Summè amarus, ordine secundo calidus, menses mouet, foetum interimit, & aluum turbando aquas ducit.

Vires.



LADANVM liquor est ex folijs Cisti in Cypro nascentis, cui Ledon nomen est, exudans. Is caprarum ope, si vera narrat Dioscorid. sic colligitur. Cum hirci & capre cisti frondes pascuntur, his pinguitudinē quādam verno tēpore innatam, barba tergunt excipiūtque, atque eam ipsā villosis cruribus adhærescentem reportant, quā postea depectētes incolæ, & colo traiicientes cogunt in offas, & ita servant, vocantque Ladanum, Officinæ Labdanum.

Hunc ladanum excipiendi modum, tanquam fabulosum nonnulli aspernantur, nec tamen alium faciliorem substituunt. Verū cū sit natura tenax & lentum, facileque sequatur ad contactum, vt viscum funiculis attractis, & alijs pluribus modis excerpi potest.

Laudatur maximè Cyprium, odoratum, subviride, facile mollescens, quod arenas & sordes non collegit, nec squalidum est. Arabicum vilius est, & minus bonum.

Vires.

Vim habet calefaciendi & molliendi: venarum orificia aperit, capillum fluentē conrinet, addito vino nigro, myrrha & oleo myrtino.

Ladanigeræ
Cisti descriptio.

Habetur non ex Cisso, hoc est, hedera, vt putauit Plinius, sed ex Cisto, quæ paruus est frutex, surculosus, lignosus, folia emittens longiora, nigricantia, tactu glutinosa, quæ pingue quoddam, & resinofum verè exudant, quod arte qualibet collectum, Ladanum dicitur. Flores exiguos, albicantes & paruis rosas similes gerit.

De Hypocistide. CAP. IV.

Cistus mas.



CÆTER Cistum Ledon, seu Ladanigeram, duæ traduntur aliæ varietates, vna mas dicitur, è cuius radicibus Hypocistis profilit, quarum veluti spurium est germen, punici mali cytinis simile. Quibusdam Lunodorum, alijs Robethron, Fuschio fungus nominatum. Eius succus extrahitur, vt acaciæ, & concretus asseruatur.

Altera Cistus fœmina dicitur: folia oblonga gerit, parum angusta: flores candidos & paruos, & semē in triquetro pericarpio pusillum; Ladanigeræ Cisto admodum similis est

Cistus fœmina.

Cistus mas paruus est frutex, maior thymo, folijs ozimi, sed rotundioribus, floribus rosaceis, qui fœminæ albæ sunt & minores: radice lignosa, ac durissima, è cuius fere medio Hypocistis velut infixapululat, vt viscum è quercus vel alterius arboris ramo.

Vires.

Rara admodū est Hypocistis, cuius loco vtimur acacia, quæ vires habet illi analogas, sed imbecilliores. Vim habet astringendi potentissimam; prodest dysentericis, coeliacis, & sanguinem vndeunque excernentibus. Siccatur quoque & roboratur, & ad fluxionum affectus omnes efficax est remedium.



VT lactis, sic vini substantia prorsus homogenea non est, sed varia: Illius enim portio quædam butirosa & leuior, alia caseosa & crassior ac grauior, quædam serosa, quæ medio modo se habet. Huius verò tenuis quoque portio flos vini dicitur, alia minus leuis, quæ medium dolium occupat, alia crassissima, quæ subsidet & dolio faciliè adhærescit, fæx vini dicta, quam recentiores Tartarum nominant, forsân quòd multorum Empiricorum sit Idolum, 4. Reg. vt Tarrac olim fuit Heuæorum: Magis tamen sic dictum puto quod cap. 17. infimum vasis locum teneat.

Licet autem tartarum sit fæx vini, multis tamen dotibus commendatur: Nam vt in corpore humano, humores aliqui, excrementa dicuntur benigna & vtilia, vt semen, lac, & humores multi certis partibus ad certos vsus inclusi, sic etiam vini fæx utilis est. Vinum enim, vt proverbio fertur, non consistit sine fæce, diutiusque cum eiusmodi excremento sine corruptela cõseruatur, vt ignis cum cineribus.

Tartarum
quid.

Ex eo manica incluso, in cella vinaria, aut alio vdo loco suspensa, oleosus educitur humor, quem oleum tartari vocant, quod è sacculo cannabino, & raro veluti per ephydrosim, & deliquium exudans, in subiectum vas guttatim delabitur, vt in nostra Officina demonstrauimus. Educitur quoque ad ascensum, sed opere magis laborioso & minus vtili. Recentiores cremorẽ tartari, vt vocant eliciunt, quem sæpè fœliciter a ʒi. ad ʒj. exhibent in iusculo aut alio liquore idoneo ad obstructions efficacissimè liberandas. Ordinaria tamen remedia prætulerim, nisi nimis ignaua euentus iudicauit.

Oleũ tartari

Ex vsto tartaro fit cinis ille Lutetiæ frequentissimus Grapolè Francisco Alexand. dictus, linteis dealbandis expetitus, quem Grauellatam vulgus nominat, qui etiam ad Pyroticorum confectionem, aliosque quosdam vsus laudatur. Tartarum enim in detergendo compar non habet, ait Cardanus; Ob id fordida ac duris nata locis, & carnis excrescentias purgat, ac viuam carnem ostendit.

Grapolè
Grauellata.

De Succo glycyrrhizæ. CAP. VI.



SUCCVS glycyrrhizæ ad multos vsus expetitur. Est enim Bechicum eximium, quod & per se vtiliter ad pulmonum & thoracis affectus sumitur, & alijs medicamentis commiscetur. Galenus eum præfert, qui è Creta delatus est. Lib. 7. composit. med. secund. loc.

Dicitur autem Græcis glycyrrhiza, Officinis liquiritia, Celso iuxta Græcum idioma dulcis radix, vulgo rigolitia, Batauis Dulce lignum. Saporem enim dulcissimum & gratissimum succus eius exhibet, qui sic educitur,

Radices glycyrrhizæ recentes & perhumidæ Iulio mense colliguntur, purgantur & teruntur: dein ex aqua coquantur, colantur, & exprimuntur. Expressus succus igni, vel sole siccatur & seruatur. Optimus qui dulcissimus, mollis, recens, purus, tenax & qui confractus splendet, quique nigerrimus est, & linguæ subditus, tandem totus liquefcit.

Laudari solet, qui ex Hispania defertur, vbi copiosissimus & optimus dicitur præparari; nullibi tamen melior & gratior reperitur, quam in Officina Dom. Larderij Pharmacopœi Parisiensis, qui non modo solennia quævis medicamenta magna dexteritate & solerti ingenio parat, sed etiam vulgaria & simpliciora non aspernatur, vt succum glycyrrhizæ, quem solo parandi artificio gustu suauem, & consistentia commendabilem reddit.

Est verò glycyrrhiza colore foris buxco, intus croceo, ligno lento, & fractu contumaci sapore dulci, quæ mansa sitim extinguit, vnde & ad ipsa dicta. Improbatur intus alba, vel nigra, exucca, vetus, fragilis raphani modo, & inter frangendum puluerem edens. Cætera de hac dicta sunt sectione quarta lib. I. de medica materia.

De Cera. CAPVT VII.



PIBVS mira est sagacitas, industria & sedulitas in colligenda & conficienda cera, quæ nullibi terrarum citra horum animalculorū opem & laborem habetur. Solæ enim apiculæ faciunt, quæ nullus hominum potest. Solæ inter insecta homini & alimenta, & medicamenta suo opificio suppeditant.

Tot verò tātæque sunt ceræ cōmoditates, vt vix possint recenseri, inquit Plin. Laudatur flaua, odorata, modicè pinguis, pura, coacta, & alienę omnis materię expers, mellis habitū, quadamtenus referens.

Secundum locum obtinet candida, quæ vel suapte natura, aliquādo talis est, vt Pontica, sed sæpius artificio, nempe lotionē vt Tyr. rhenica. Cateri colores sūt acquisititij, vt viridis ab ærugine, rubeus ab anchusa vel minio, niger ab atramento vel charta vsta, à quibus mistis vires mutat. Semper verò melior est recens & subflaua, quæ cera virginea nominatur.

Medium autem quodammodo tenet calefacientium, refrigerantium, humectantium & exsiccantium. Habet verò quiddam etiam essentiæ crassæ, atque emplasticæ. Quamobrem aliorum medicamentorum, tum calefacientium, tum refrigerantium materia est.

Cera Iodio
& dealba-
tio.

Cera omnis mollis, inquit Dios. calefacit, modicè explet corpora: datur in sorbitione dysentericis. Vt alba reddatur, liquatur primum ad ignem, deinde in aqua fontis pura demergitur, vbi permouetur, expurgaturque Galen. Alium modum, quo candidissima fit docet Dioscorides, apud quem videndus cap. 105. lib. 2.

Cap.

24. l. 22

Galen.

cap. 14.

lib. 1.

comp.

med.

gener.

Cap. 23

lib. 7.

simpl.

Cap. 14

lib. 1.

comp.

med.

gen.

Est autem apibus cera non modo pabulum, quo mellis penuria per hyemis longitudinem vescuntur, sed & materia ex qua in alvearibus fauos, in fauis loculamenta & veluti cubicula construunt, in quibus pernoctant, quiescunt & prolem concipiunt, atque mel ad victum hybernium conferunt. Tam miro autem artificio faui conditi sunt, ut in eorum structura Mathematicæ leges accuratè videantur observatæ; Ideoque ut ædificium quoddam eximium vix eadem ac omnino simili materia construitur, sic neque faui prorsus homogenei sunt. Constant enim cera, tanquam præcipua materia, & Commosis, Pissocero, & Propoli, quibus vinculis colligantur, formam manescunt tutiorem, & adhæsum alvearibus firmiorem. Commosis enim cerosa quædam est materia, viscida, ac gummea, unde nomen, & amara valde, quam apes ex plantarum lacrymis excerpunt, ex eoque primum fauorum rudimentum instituunt. Pissoceros est veluti cera admixta pici, quem partim ex floribus, partim ex arborum succis mutantur apes, & ex eo loculorum combinationes colligant. Propolis vero, quam Brasauolus imperitè ceram virginem putat, cerosa quædam est materia, crassa, flava, odore grauis, ac styracem referens, & mastiches modo ductilis, quæ in alveariorum foribus & spiraculis reperitur ubi apibus intrandi, exeundique patet iter. Plinius nec ceram esse, nec aliud quidquam cerosæ naturæ propolim esse contendit, fauorum tamen stabilimentum esse fateretur: Sicque commosim & propolim inter se non distare colligendum.

Commosis
quid.

Pissoceros.

Propolis
quid.

Propolis tamen nec fundamentum, nec partem fauorum constituit ut commosis, sed apum ædicularum rimis & foraminibus obstruendis, aduersus aëris, frigoris, & animalculorum iniurias tantum interuit. Hac enim tanquam pasta aut signino quodam alveariorum ima pars incrustatur, & scissuræ, si quæ sint, obturantur. Colligitur ex multis arboribus, sed potissimū è populo multo succo luxuriante, à qua veluti saluam quamdam apiculæ sugunt, congerunt, & opera tam industriosa conficiunt, ut abeat in propolim, quæ Galeno quasi ceræ dicitur cap. 2 13. lib. simpl.

Vires,

Raro est in usu, ob eius penuriam: ad multa tamen commendatur, vim siquidem epispaticam habet insignem, nec humores solum ex alto euocat, sed spicula attrahit, tumores resoluit, nervorum dolores mitigat, eorumque vulneribus confert. Calefacit in fine gradus secundum, aut principio tertij.

In exa.
simpl.

Gal. li.
8. simpl.

De Succis quibusdam aliis, alio loco aptius descriptis.

CAPVT VIII.



Succi seruantur consistentia, vel liquida, vt acetum, vinum, omphacium, vel solida, vt Aloë, Scammonium, vel media, vt Rob & sapæ, de quibus singulis suo ordine partim in Officina nostra, partim in libro primo materiæ medicæ differuimus.

Mihi autem cùm decies, imo bis tantum repetita minimè placeant, ad singulorum examen vix videbor denuò rediturus: libenter enim exoptassem hoc opusculum in molem minorem contractum fuisse.

De Aloë porro & Scammonio, cùm purgantia sint, sectione secunda huius libri de Materia medica satis superque disputauimus, in qua purgantium omnium simplicium naturam, & facultates accuratè descripsimus.

Succi fructuum in Rob, seu mellis consistentiam inspissati in sectione quinta explicatè enarrantur. De liquidis prior primi libri sectio copiose disserit.

Opopanax à succo Panacis nomen habet, cùm verius sit eiusdem gummeus liquor, qui vbi cōcreuit & aruit, colore foris est subflauo, intus candido & odore graui, læuis, pinguis, friabilis, & in aqua facile liquefcens.

Aliorum succorum, vt Glaucij & Lycij meminit Galenus, sed quia nunc eorum exoleuit vsus, in Pharmacopolijs aut raro aut nunquam inueniuntur.

DE MA-



D E
MATERIA MEDICA,
LIBER SECVNDVS.

De Mineralibus.

P R Æ F A T I O.



EDICAMENTORVM materia cùm multiplex sit & à plantis mineralibus, & animalibus desumatur, de ea primùm differuimus, quam stirpium vniuersa propago suggerit: Sequitur nunc vt mineralia perscrutemur, quæ fecundissimam quotidie nobis medicam materiam suppeditant, ex qua, melioris defectu, eximia nonnunquam medicamenta paramus, quibus morbos contumacissimos, & quialiorum præsidiorum vim eluserunt, oppugnamus, & expugnamus. Externos maximè dico, qui ferrum & ignem sapiùs expostulant. Ad interiorum quoque sanationem non tantùm conducunt, sed etiam ad partium quæ principatum tenent robur, & facultatum recreationem mineralia quædam dantur, vt terra lemnia, bolus orientalis, & lapilli pretiosi, de quibus ordine, dilucide, breuiterque hoc in secundo libro sermo nobis erit. Licet autem mineralia seu fossilia dicantur, quæ è terræ fodinis & visceribus eruuntur, vt terrarum, lapidum & metallorum genera multa, attamen eorum ampliore significato, ea quoque comprehenduntur, quæ sensus expertia è maris sinu, alueo & litore, & aquarum voragine leguntur, vt salis & bituminis genera multa, quorum censu Ambarum coarctatur. Omnia igitur mineralia non tantùm sunt terræ vel metalli quoddam genus, vt quidam ex Arist. colligunt, sed salis, bituminis & lapidū genera sub se cōplectuntur. De quib⁹ ac singulis libèter differerē. Verùm instituti mei ratio tantùm expostulat, vt de his breuiter agam, quæ medicaminum confectiones in Officina, seu Antidotario nostro descriptas ingrediuntur, Proinde mineralia tantùm præstantiora & vsitatiora ad examen adducam, quæ quod triplici potissimū discrimine dignoscantur, librū hunc in tres sectiones disponā. In priore de terrarum, in secundo de lapidum, in tertio de metallorum natura, & qualitatibus disputabo. LII

De Terra Lemnia. CAP. I.

LERRARVM medicarū præstantissima ea est, quam officinæ nunc ab insula Lemno, ex qua defertur, Lemniam, nunc à sigillo illi impresso terrā sigillatam vocant. Eius plures notantur differentiæ, sed præstantior olim erat ea, quam in placentulas efformatam, sigillo Dianæ, quod capram referebat, illius sacerdos obsignabat.

Vera autem Sphragis, seu sigillata Lemnia, ex Dioscoride & Galeno fuluo, seu ruffo est colore, sicut & collis in Lemno, ex quo eruitur, & in quo nec arbor, nec herba, aut alia stirps nisi egrè fruticat, nec saxum natum inuenitur, sed terra illiusmodi tantum visitur.

Constantinopolitamen eiusdem placentulæ cineritij coloris adferuntur, Turcarum Imperatoris sigillo, quod nullius animalis effigie sed varios tantum characteres refert, notatæ, quæ pro vera Lemnia habentur, emuntur & seruantur.

Nusquam verò caprinus sanguis ab incolis, qui eam in pastillos cogunt, aut ab institoribus, qui ab hisdem emunt, eidem permiscetur, ut grauissimi quidam viri existimarunt.

Isthæc terra adeo pinguis est, ut è seuo constare videatur, dum in ore contenta dentibus confringitur.

Vires.

Vim habet Antidoti contra pestem & morbos contagiosos, & malignæ qualitatatis participes. Magis tamen credo ceremonias & superstitiones vanas barbaræ seu Turcicæ gentis, quam virium præstantiam terram hæc nobilitare, quā si quibuscumque fas esset, ac sine fastu è fodinis eruere, magnā suæ celebritatis iacturā pati verissimile est.

Varietas characterum quibus notatur à magnatum varietate, qui ei sexta Augusti iuxta morem eruendæ & sigillandæ præfuerunt. Omnes autem characteres illi duas tantum Arabicas dictiones continet. Tin imachton, quæ terram sigillatam significant.

Tin imachton,

De Bolo Armena. CAPUT II.

ALIA quedā terra viribus eximia, ex Armenia Capadociæ finitima aduehitur, quam medici bolū Armenam & bolum Orientalem vocant. Temporibus Cap. 7. Galeni multum venit in vsum aduersus eam pestē, cuius meminit lib. 9. simpl. Liberum est autem, inquit, appellare, vel lapidem, ut is qui mihi primus donauit, vel terram ut ego, quandoquidem humidis rigari patitur.

Non solum verò ex Armenia, sed multis alijs regionibus defertur. Laudatur quæ calcis modo præoptissime in summū læuorem soluitur, pistillo adhibito; aut liquore quodam affuso, nec quidpiam areno.

sum habet admixtum, atque commanducata butyri modo liquefcere videtur, & in gustu manifestam relinquit astringentem.

Valde siccatur, astringit & roboratur: sanguinem fluentem sistit, catarrhum cohibet, dysentericis prodest & ulceribus oris.

Plurimum quoque valet ad pestem. Quotquot enim hoc medicamentum sumpsit, inquit Galenus, celeriter curati sunt. At quibus non profuit, interierunt omnes, cum nec aliquo alio iuuarentur remedio. Unde colligitur, his duntaxat auxilio non fuisse, qui erant incurabiles. Et ut liberè dicam, bolus Armena Lemnia non est inefficacior, facile què ut Turcarum peristromatis seu tapetis, sic ipsorum sphragide Lemnia carere possumus.

De aliis quibusdam terris minus usualibus. CAP. III.



ALIÆ multæ sunt terræ ad refrigerandum & meatus occludendos ab antiquis commendatæ, & olim in usu medendi frequentissimæ, quas tamen posterior ætas nunc adeo despicit, ut à Pharmacopolijs prorsus excludantur, paucis exceptis, quæ ob candorem, aut ruborem, aut alium colorem seu flauum, seu alium insignem commendantur, & ab insectoribus expetuntur & emuntur, ut Ocra, rubrica, terra Synopica, Creta & aliæ multæ.

Nonnullæ tamen vires habent medicas, easque eximias, ut terra Melitea. Melitea, sic à Melita insula, ex qua deportatur, dicta, quæ contra pestem utiliter datur. Contra venena quoque valere experientia comprobauit, unde multi pro terra Lemnia fœliciter usurpant.

Samia terræ species est in insula Samo effossa, cuius ex Dioscoride duæ species notantur; Prior dicitur ei Collyrium, quod, ut arbitror, in collyrijs oculorum misceatur. Altera Samius aster appellatur, quod in ipsa quædam micæ stellarum modò eniteant, estque crustacea, & cotis modo prædensa, quidpiam viscosum obtinens. Hæc vritur & abluatur, ut terra Eretria, & vim habet consimilem; ob id sanguinis reiectionem cohibet. Illa Collyriū dicta, mollis est, candida, friabilis, & ore contenta linguæ adhærescit. Vtraque refrigerat & fluxiones arcer.

Chia terra è Chio insula delata Samiæ vultu & viribus valde affinis est, candida nempe, mollis, refrigeratoria & astringentia. Contra ambusta optimum est remedium, ex Gal. faciem erugat, splendidam facit, & cicatrices delet.

Est alia Selinusia dicta quam Galenus laudat ad Phlegmones mammarum, testium & inguinum incipientes. Est verò colore, & consistentia, & viribus Chiæ finitima. Ambæ autem pulcherrimæ sunt ad ambusta remedia.

Cimoliæ adhuc meminit Dioscorides, cuius duo constituit genera,

Cimolia. vnam candidam dicit, alteram purpurascentem.

Optima censetur pinguis & frigida cū tangitur. Vtraque aceto diluta parotidas & tubercula discutit, inflammationes reprimi, & ambustis perbellè medetur.

Eretria.

Terra Eretria gleba est rubicunda, inquit Galenus, cuius est optima, quæ sine sabulo est, ac sine lapillis. Dioscorides duplicem Eretriam facit, vnam albam & cineritiam alteram; Nullam rubicundam. Quæ ad cinereum colorem vergit, si mollis fuerit, optima est. Eretria porro vrbs est in Eubæa propè Calchidem, in cuius agro dicta, hæc terra effoditur, vnde nomen. Vim habet astringentem, refrigerantem, leuiter mollientem, & caua explet, atque sanguinolenta conglutinat. Cap. 126. li. simpl.

Rubrica.

Rubra sic, quia rubet, dicta, vel Synopica est, ex Synope videlicet Cappadociæ vrbe delata, à qua nomen, vel fabrilis dicitur quòd ea sæpius vrantur fabri ad lineas ducendas, infectis in ea funiculis. Quædam rubrica dicitur maculata, alia vnicolor; quædam mollis, alia dura & spissa, alia pinguis, alia media. Omnes autem picturis sunt accommodatæ. Quia tamen siccant & astringunt medicis vsibus inferuire, & emplastris vulnerarijs, & siccantibus commisceri possunt.

Ochra.

Ochra species est terræ flauæ, quæ laudatur natione Attica, non lapidosa, friabilis, omninò lutea & læuissima. Vim habet astringendi, erodendi, collectiones discutiendi, & excrescentias reprimendi. Ex ea paratur medicamentum, inquit Aëtius, quod multum valet ad collisa & vibices.

Creta.

A Creta insula terra quædam nomen habet, quæ & Creta & Cretica nuncupatur, in multis tamen alijs regionibus passim & copiosa inuenitur. Eius multæ sunt differentiæ. Prima dicitur candida, quæ reliquas terras omnes albedine vincit, qua vtuntur artifices in lineis protrahendis. Est alia virescēs ad eosdem vsus celebrata. Theodosia solet appellari. Est alia nigra qua & fabri, & pictores, & sartores vtuntur. Omnes habent vim abstergendi, vnde ad vasa stannea, aut argentea sordida valent multum. Viridis plus habet acrimoniæ quàm alba, & nigra quàm vtraque, ob id magis absterforia. Galenus.

Pnigitis.

Inueniuntur adhuc apud Dioscoridem aliæ terræ, vt Pnigitis, melia & ampelitis, quarum etiam meminit Galenus, sed tam ignaua est illarum virtus, aut certè tam parum commendatos pollicentur effectus, vt vix à iunioribus commendentur, qui glandibus relictis non imprudenter malunt tritico vesci. Quæ igitur inutilia sunt, non vtiliter describenda puto.

Alana.

Lutetiæ subrubra quædam terra Alana, vulgo Tripolis dicta, circumfertur, sed quæ tantum vasis æneis tergendis inseruit, quibus aptè conuenit.

DE QVIBVS DAM FOSSILIBVS E MARI,
terraque erutis, quæ inter metalla, lapides & terras ambigunt.
Et primum.

De Chrysocolle, seu Borace. CAPVT IIII.



CHRYSOCOLLA, Officinis quæ Mauritanorum idioma barbarum sepè sequuntur, Borax dicta, in Armenia, Macedonia & Cypri fodinis aurarijs, argenteisve & interdum ærarijs inuenitur. Laudatissima cõsetur Armeniaca, porraceum quæ colorem refert, & saporem nitrosum, cum pauculo amarore. Laudationem putat Plinius, quæ in fodinis ærarijs habetur, ex limo quodam hybernis rigoribus cõcreto in pumicis duritiem: Huic proxima quæ in argentariis colligitur: Minus bona, quæ in aurarijs. In plumbariis inuenitur omni alia deterior. Ab Auicenna capistrum auri, à Diosc. & Galeno Chrysocolle, hoc est, auricollæ, seu gluten auri nuncupatur. A Plinio viride terræ, quod segetis lætè virentis habeat colorem; Minimè tamen ad tantam viriditatem accedit ea Chrysocolle quæ in Pharmacopoliis habetur.

Eius autem duæ differentiæ traduntur, vna natiua est, ex vena putri in fodinis metallicis in duritiem pumicis coalescens, quæ varium colorem nascitur pro metallorum natura, è quorum fodinis eruitur. Verum quæ viridis est, in arte medicamentaria cæteris præstat, ut flauescens auro ferruminando.

Est quædam factitia ex vrina pueri in ardentissimis caloribus solis in ærea pila ac pistillo æreo tandiu agitata, donec in mellis aut vnguenti consistentiam abierit, quod vlceribus sordidis, cadauerosis & curatu difficillimis, tum per se, tum aliis commistum medicamentis conducit, ex Galeno. Natiuam ac fossitiam tundit & abluit Dioscorides, donec pura, synceraque spectetur, dein siccatur & recondit ad vsus. Eam ipsam qui vrere voluerit, multo tenuiorem habebit.

Chrysocolle calefacit, excrescentem carnem cohibet & modicè Vires mordendo exest; Multis propterea vlceribus ad sanitatem perducendis confert, sed per os si sumatur, periculosa est.

De Vitriolo. CAP. V.



CALCHANTVM Græci vocant, quod Latini modò ab atro colore quo sutorum pelles inficiuntur, atramentum sutorium, modò à nitore vitri modo splendente, Vitriolum nominant.

Eius tria Dioscorides perhibet esse genera, natiua duo & factitium vnum. Prius ex natiuis in terræ cuniculis ac visceribus per se concretum reperitur. Alterum sub forma aquæ primum in quodam fodinarum lacu colligitur, quæ postea vase excepta citò concreuit in vitriolum.

Vitriolum
factitium qui
fit.

Factitium verò fit ex gleba quadam maculis pluribus ferri rubiginem & æruginem referentibus conspersa, aqua madefacta, transfusa, fermentata, solis arboribus cocta, ex qua vitrioleus humor elicitur, qui postea calore interdum solo solis, interdum ignis in calchantum abit. Plures alios idipsum faciendi modos docuit Plinius, *cap. 13. lib. 34.* ut etiam artis metallicæ periti, quos brevitatis gratia omitto.

Copparosa.

Inter factitia Romanum cæteris præstat, olim Cyprium, Germanicum deterius, diciturque vulgò Copparosa, seu infectorium, vel atramentum sutorium, quod ad pelles inficiendas corrugatores usurpant.

Natium quod ex montibus Cypri eruitur, Stalacticum, hoc est, stillatitium, & pectum, id est, concretum nominatur. Tam naturale igitur, quam factitium Cyprium nuncupatur, quod ex eius monte vel iam concretum eruatur, vel exudet aqua in idipsum cito concretescens, vel arte ex eiusdem terra eliciatur.

Est verò natium, seu fossile calciteos, misyos & soryos particeps, præsertim Cyprium, quod concrementum capescit ex aqua virescente, quæ ex ipsius monte continuo stillicidio delabitur in speluncam, abluirque calcitum, Misym & Soryn, sponteque coagulata fit Calchantum: Vnde facilis huius in illa transitus: Hæc enim tempore omnia inter se commeant, & Galenus Calchantum tractu temporis consenesceat in calcitum transire sæpè conspexit.

Præfertur autè ad medicos usus album & natium, quod metallicæ chymici ex suo sulphure & mercurio tanquam spermate prognatum perhibent, & sæpè ad omnes affectus sine discrimine præbent. *lib. 9. simpl.*

Acidalia
vitrioli.

Ex eo liquorem quemdam acidissimum eliciunt, acidum vitreoli sæpè vocitatur, cuius aliquot guttæ syrupo violato permixtæ, eundem rubellum & elegantem colore, & sapore efficiunt. Idem præstat oleum sulphuris; Et utrumque rosarum infusioni paucula quantitate commixtum, vel alterutrius tantum aliquot guttula ei ipsi dilutæ, liquorem totum efficiunt rubeum quam tincturam rosarum nominant.

Ol. sulphuris.

Tinctura
rosarum.

A calciti emplastrum quoddam Diacalciteos nomine in Pharmacopoliis paratur, quod Diapalma & emplastrum palmeum frequentius, nec melius appellatur: nec palmam enim, nec calcitum admittit, ob raritatem. Calcitis enim Misy, Sory, melanteria diphryges, & alia pleraque ab antiquis celebrata, nunc ferè inuisa, incognitaque iacent, unde pro calciti Calchantum ei finitimum, & in quam vetustate cōmeat ex Gal. substituitur. Rectè quoque substitui poterit in Misyos Soryos & melanteriæ locum: hæc enim omnia magnam inter se cognationem habent, & vires ferme similes, sed colorem ac consistentiam dissimilem.

Vires.

Calchantum natura dotibus eximiis locupletavit, quas artis medicæ procures agnoverunt & descripserunt. Dioscorides nempe Galenus, Actius, Paulus Aëgineta, & Oribasius. Calefacit, astringit, siccatur, latas ventris tineas necat, aduersus hausta fungorum venena pro-

dest, carnes humidas seruat, & serum absumendo contrahit, putredinē arcet, robur partibus intimis conciliat. Foris adhibitum astringit, expurgat vlcera, corrugat aluminis ei cognati modo, & aque Spadenſes Pucenſesque vitriolina qualitate refertæ, quaſi miraculo quodam affectus deploratos perfectè ſanant. Mutuantur autem aque dictæ vim illam inſignem à Calcantho, cuius energia omnes omnium partium helices, & ſinus peruadunt quod obeſt, euecunt, quod prodeſt, non ſedunt nec tangunt, quod laxius eſt, ſtringunt, quod ſtrictius laxant, craſſius incidunt, liquant, tenuāt, expellunt. Præter tamen commoditates tot inſignes ſua quoque habet incommoda; Cacoſtomachum enim eſt, acre, erodens & vomitorium, ob id multi monachi & mulierculæ ad februm circuitus quotidianos & quartanos donant incerto pondere, quandoque vino, quandoque roſacea, ſolutum, & ſepè vomitu vehementius citato febris ſoluitur. Sæpe quoque ſic datum ab imperitis medicamentum morbo ipſo magis formidoloſum.

Aquæ Spadenſes.

De Alumine. CAPVT VI.



ALUMEN eſt veluti maria terræ, ait Plinius, cuius tria Dioſcorides genera facit. Strongile ſeu rotundum, liquidum & ſciſſile. Priora duo nunc vel raro, vel nunquam viſuntur. Poſterius nempe ſciſſile à multis alumen plumeum vocatur: vtriuſque enim adeo eſt facies ſimilis, vt vix alterum ab altero diſtinguatur. Differunt tamen natura & qualitatibus. Nam ſciſſile vim habet aſtringendi manifeſtiſſimam, vriturque; Plumeum acre eſt, & à flamma tutum, inuiſtumque manet, videturque eſſe lapis Amiantus, qui ligni modo plurimis conſtat lineis intercuſantibus, nec igni comburitur, quē multi pro illo Amianto ſumunt, quod vnguentum Citrinum ingreditur.

Eſt aliud maximè vulgare & vſuale, glaciei, aut cryſtalli modo lucidum & ſpiſſum, ac durum, vnde alumen rupeum medicis dicitur; hocque ſemper ſolet vſurpari, cum alumen abſolutè dicitur. Huius elaborandi & faciendi modus & longus, & laborioſus eſt, quem accuratè Mathiolus deſcribit. Eſt quoddam nigrum in Cypro, cuius meminit Plinius.

Alumen
Rupeum.

Sunt qui rotundum alumen eſſe dicunt, quod nonnulli alio nomine Zucharinum vocant, ex crudo alumine rupeo, ouorum albo & roſacea aqua conſectum. Liquidum Mathiolus vidit, contrectauit, & guſtauit, nec quicquam vnquam magis aſtrictorium percepit.

Præter dicta quædam adhuc inueniuntur factitia, vt Catinum, ex cineribus plantæ kali, ſeu Sodæ vulgaris; vt Alumen Squamoſum, quod fit è lapide ſpeculari, inſtar vitri pellucido, quem malè nonnulli Talcum vocitant; Vt Alumen ſæcum, quod è vini ſæcibus vſtis

Catinum.
Squamoſum.

Al. ſæcū.

& albefectis paratur. Parandi modum describere duxi superfluum quod eiusmodi aluminum nullus nunc sit vsus.

Vires.

Omne alumen crassarum est partium, & multum stringit, vnde Stypterium, quasi stipticum dicitur: Mediocriter calefacit, expurgat, vlcera putrida emēdat, humida siccant, carnem supercrescentem absumit, pruritus tollit, scabiem sanat ad multa medicamenta vlceribus destinata vtiliter accedit. Est verò mistæ qualitatis, nam illius portio calefacit, & alia refrigerat, vt alibi docetur.

De Sale. CAP. VII.



Nihil communius, nihil frequentius & vtilius, sic nihil notius sale, sine quo belluæ quidem viuunt, nos verò nequiuimus. Eius autem multæ differentię dantur, vt marinus, fossilis, lacustris, fluuiatilis.

Marinus.
Fossilis.

Marinus communior est, præstantiorque, quo tota Gallia vtitur; fossilis, quem Officinæ salem gemmæ vocant, in fodi- nis lapidum modo exciditur, ac frangitur, & instar crysalli splen- dens eruitur, vnde gemmeus dictus. Hic in ignem coniectus, non ceterorum modo crepitat, sed vt ferrum ignescit.

Sal Indus.

Est & Sal Indus, quem Mesue ad pilularum de lapide lazuli confe- ctionem accedere facit. Sed cum desit gemmeum substituimus. Fal- luntur qui putant Mesuem salis Indi nomine saccharum tabarzet intelligere suum, aut nostrum candum, quum & Indi suum salem habeant, quem ex Oromeno monte glebis ingentibus effodiunt, cuius loco gemmeus valde conuenit, vt ad acuendam agarici, aut po- lypodij vim pigriorem.

Ammonia-
cus.

Sal ammoniacus, seu Armeniacus, vt nonnulli dicunt, non mag- no incommodo rarus est, vt qui sapore & colore sit ingratus, nec eximijs dotibus commēdatus. Sub arena in Cyrenaica regione con- crescit in laminas, exterius venis nigricantibus; colore ad alumen

Sal Alkali.

Schiston accedit, vt sal alkali ad catinum.

Lacustris.

Phrygius.

Flos salis.

Spuma salis

A Dioscoride laudatur sal lacustris, tum & Phrygius, nomine ta-
peus aut tritaus, aut gantaus. Nos nostrum præferimus.

Flos salis flumine Nilo defluens apud nos non visitur, nec expe-
titur, estque velut spuma fluminis huius, vt Spuma salis flos spumosi
maris, de quibus videndus Dioscorides.

Nitrum.

Aliud salis genus dicitur nitrum duplici signatū discrimine, prius
est nitrum Dioscoridis & antiquorum, leue, roseo colore, aut candi-
do in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum, quod ad nos
deuehi desijt. Alterum est vulgare, sal nitrum, seu litrum, aut salpe-
træ dictum, quod Pyrij huius pulueris confectionem ingreditur,
qui ad tormenta bellica in multis Galliæ vrbibus ex aquis nitrosis
paratur.

Litrum.

Cap.
126. li.

5.

Dum

Dum multa cōstione elaboratur aphronitrum eructat, seu spumam nitri, ab ea diuersam, cuius veteres meminerunt, quæ non arte educta, malè tamen salpetræ & nitrum confunduntur, cū inter vtrumque multum agnoscatur discriminis, fit puluis, dum vritur, tamen totus abit in auras cineremque relinquit nullum: Nitrum vero relinquit, plurimum nitet, vnde nomen, & in plano solo prouenit vt in Ægypto, & in Syria non longè à littore mediterranei maris Belon. sed natiua creditur, vt & lanugo quædam friabilis, alba & falsuginosa, quæ parietibus multis adnascitur, quæ flos nitri iudicatur. Nitri conficiendi modus cū ad Pharmacopœum minimè spectet, de eo nunc silebo.

Aphronitrum.

Nitrum vn. de dictum.

Flos nitri

Salis dotes magnæ quidem & multæ sunt, & vsibus humanis plurimū expetitæ. In arte tamen Pharmacaria non adeo necessariæ, vt multi putant, qui salem multorum mixtorum arte Spagyrica educentes, de eo mira & sæpè vana prædicant. Purgatoriam enim medicamentorum facultatem in sale consistere mordicus tenent, atque vbi eorum extractum quoddam habuerunt, salem se habere asseuerant. Insignem autem conseruandi vim habet: astringit, absterget, expurgat, discutit, reprimit, attenuat, & à putredine vindicat. Alius autem alio præstantior est. Aptior ad salituram est siccior. Nauseam prohibet, venena compescit, ad libidinem procliuiores reddit, hinc salaces quasi ex sale alacres ad venerē. Impetigines, psoras, vlcera putrida & morsus rabidi canis emendat; necrosi quam vulgus gangrenam nominat, resistit, ascarides & lumbricos enecat dentes à corruptela tuetur, eorumque dolorem sæpè sedat.

Vires.

Muria cū sit illius velut liquamen, eosdem affectus exhibet: Clysteribus vtiliter admiscetur ad pigriorem facultatem expultricem excitandam, qualis esse solet in Catoche, Lethargo & apoplexia detentis.

Muria.

De Bitumine. CAP. VIII.



Enomenclationis varietas lectorem dubium relinquit, bitumen moneo multifariam vocitari: Dicitur enim à quibusdam thus, gluten & vnguentū minerale; ab alijs adeps, pix, & cera terræ, à nōnullis myrrha, pinguedo, & axungia mineralis. Est enim velut terrea pinguedo aquis supernatans, quæ ad litus disiecta concrefcit, densatur ac dura, tenacissimaque redditur, & facillè flammam concipit. Quādiu autem innatat aquis molle est, vbi exemptum spissatur, fitque pice etiam sicca durius, sed adhibitum igni facillè liquatur. Ex succis enim subterraneis, resinosis & pinguibus cum materiam habeat igneæ naturæ participem, dum flagrat, aquis mediocriter affusis valētius accenditur, Siccis verò, vt stipulis, pulueribus superjectis magis languet, ac citius extinguatur. Ob naturam enim familiarem, spirituosam & tenacem quam habet cum igne, id illi euenit, quod calci, quæ aqua perfusa statim igitur & vehementer ardet.

Naphtha
quid.

Est autem liquidum omne bitumen, vel solidum ac densatum. Liquidum rursus vel syncerum & purum est, vt Naphtha, vel impurius & ignobilius, ac terrea & cœnosa portione scatens. Naphtha multis petroleum dicta, liquido namque bitumini omni nomen hoc tribui solet, pura, syncera, perspicua, albicans, flammaram attractrix & veluti rapax, non quidem oleum simpliciter est, sed magis oleosus spiritus, aut oleum minerale, petroleum Babylonicum, album multis dictum, Mesue oleum benedictum albicans, Syluio bituminis colamen album, ac veluti spiritus bituminis coactus in liquorem, & separatus à facibus crassis, quæ remaneant in bitumine concreto multæ, in Petroleo pauca, vt in illa multæ. Est namque Petroleum corpulentius Naphtha, nec tam velociter & eminus flammam rapit, sed intermedia tantum mora ardet, vel longiore, vel breuiore pro bitumine ignis latente vigore. Tanta siquidem Naphthæ cognatio est cum igne, vt protinus transfiliat in ipsum vndecumque visum.

Qui res accuratius ac distinctius rimantur, Naphtham dicunt Petroleum esse spirituale, ignis capacissimum, petroleum verò vulgare, materialius, ignauius, & magis oleosum; vnde Eleasphaltum aliqui vocant; diuiditurque in Myrasphaltum, axungiam bitumineam & maltham; quæ tantum tamen secundum magis & minus dissentire notantur. Naphtha siquidem est veluti spiritus bituminosus cælestis, Petroleum elementaris, Myrasphaltum crassum bituminis colamen, Axungia quod crassius est, Maltha quod crassissimum, tenacissimum & ceræ calefactæ modo molle, quo lapides in struendis ædificijs arctissime compinguntur. De his in medicina facienda, cum vix loquantur medici non plura dicam.

Solidi quoque bituminis varia discrimina dantur; vel enim syncerum ac purum; vel Heterogeneis corporibus mixtum & impurum. Deinde aliud est fusile, aliud liquabile nunquam. Syncerum multiplex videtur opasphaltus, ambra odorata, pix mineralis, halosanthos, spermaceti, & alia multa, de quibus suo loco. Inter bitumina solida numeratur à quibusdam ebur fossile & terrenum, quod tamen ebur non est, vt nec ossa terrea ossa dicam ampe-litis, lithanthrax, seu carbo terræ, obsidianus lapis, seu Gagates, ex quo globuli precarij & imagunculae sæpè fiunt, quibus videmus peregrinorum, qui loca sancta adierunt, pileos insigniter notari.

Non solum autem multarum regionum multæ terræ bituminosæ sunt, sed & lacus multi, inter quos maximè insignis & bituminosissimus est, qui in Iudæa ex Iordanis delapsu & interitu inflatur. Ob id Asphaltites dictus vocatur & mare mortuum, tum ob vastitatem, tum quia ipsius aqua ferè manet immota, non procellosa, grauis, sal-sa, crassa, fœtida, in qua nec plantæ, nec animalia nascuntur, nec in-iecta nutrit, nec in ipsius sinum admittit. Neque solum, inquit, dicitur, alueus istius pelagi, aut pelagus ipsum iræ Dei testimonium præbet, qui Sodomæ orum totam deleuit profapiam, sed & littus, & tota vi-

cinia, in quibus humanæ vitæ nil quicquam vtile crescit, aut vegetat.

Vt autem bitumen Iudaicum ac Sodomeum ad nos minimè defertur verum & natium, sed eius loco pissaphaltum, aut quid factitium ex petroleo, pice & alijs quibusdam, sic neque etiam naphtha: Cuius loco cognatum quoddam liquamen assumi potest, ex agro Mutinensi deciduum, quod Saxoleum, seu Petroleum, quasi oleum Saxoleum. è petra eductum nominant. Vtriusque enim eadem consistentia, color, virtus. Est verò Pissaphaltos, de quo supra, picis & bituminis Pissaphaltos. commixtio, vt nomen ipsum indicat, quam nonnulli pro Mumia Mumia. vsurpant, de qua postea. Vires.

Bitumen omne discutit, emollit, glutinat, ab inflammatione tueretur, proptolim vteri, & strangulationes, olfactu, suffitu & impositu emendat: sed rarò nisi adulterinum inuenitur.

Naphtha extenuat, incidit, digerit, penetrat, frigidos & crassos humores ex quauis parte corporis absunt: Nervorum resolutioni, tremori, & articulorum morbis à causa frigida medetur.

Inter bitumina recensetur adhuc quædam velut pinguitudo furosa, quæ à nonnullis sperma ceti, ab alijs ambra subalbida, à multis flos maris dicitur: colligitur enim in mari cuius est aliqua pinguis spuma, & tanquam flos innatans, & à quibusdam putatur esse *αἶλος ἀνθος*. Dioscoridis: Et sane cognata, seu homogenea videntur. Sperma ceti.

Halosanthos, Aphronitrum & Sperma ceti, nec materialiter, sed quibusdam accidentibus tantum, vt colore, consistentia & pinguedine inter se distantia. Nam halosanthos, seu *αἶλος ἀνθος* discretis vocibus, est maximè quædam pinguedo salsa, acris & subcrocea, innatans mari, & veluti quidam flos ipsius: seu pinguis est spuma nitri, vt loquitur Plinius, ac veluti res ex sale & pinguitudinis cremore constituta: Nam proprie Spuma nitri Aphronitrum, seu Aphrolitrum est, quod ab halosantho deficit pinguedinis defectu, Halosanthus quid. consistentia, colore & generationis loco: Est enim durius, magis friabile, & subpurpureū: Atque nō modo in fontibus, stagnis, aquis falsis, & nitrarijs, sed etiam in Nilo reperitur. Quod verò aliunde, quam in mare peruenit, consistentia lautum & pingue, odore ingratum, ac virus subolens, colore croceum, Halosanthos est Dioscoridis, ac veterum olim vberissimum, nunc minus frequens. Hodiernū vero siccius est, compactius, & colore ruffum, & multis in locis valde copiosum: Raro tamen colligitur, quod rarus sit ipsius vsus, ferèque neglectus.

Male autem veterum halosanthos pro Aphronitro, & hodiernū pro Spermate Ceti fuit à multis vsurpatum. Nam Sperma Ceti sic ex opinione falsa dictum, res bituminea est, non animalis, ceu Ceti genitura, ceu stercus vt nonnulli putarunt; sed res generis est sui, inquit Gesnerus, quæ reperitur in multis plagis, vbi nullæ visæ sunt vnquam balenæ, aut Physeteres aut Ceti portentosæ magnitudinis

Mirorque doctos quosdam viros tam leuiter putasse Cetum citra congressum semen profundere, aut congregiando extra veneris ianuam, aut si mauis barathrum eiaculari, aut eiectum in mediis procellis aut fluctibus concrefcere, hærere & aggregari. Multò probabilius est tanti monstri stercus esse, cum eius copia sit major, consistencia crassior, egerendi necessitas frequentior, & similis forsitan color. At hoc quoque absurdissimum. Nam balnearum aut Cetorum faces vix pingues esse queunt, ac veluti furfurosæ, vt Sperma ceti, vulgare: Atque quantæ qualescumque sint illæ, in mare vastum excretæ, tanquam puluis ante faciem venti, ita variè & longè, hac & illac disperguntur & protruduntur, inque partes tam minutulas & ferè inaspectabiles seiunguntur, vt postea congregari posse non credendum.

Sperma Ceti igitur sic falso putatum, nec semen aut stercus Ceti aut balenæ dicendum. Est enim pinguedo quædam maris concreta, & veluti pars pinguior halosanthi, nec in se quidquam habet ab animali mutuatum: vt nec halosanthos, quod efflorescentia maris & flos salis, & fauilla salis sæpè dicitur. Parum affinis est halosantho flos Asiæ petræ, est namque sal concretus super cautibus marinis, quas mare fluctuans aspergit, adueniente solis ardore, qui roridam illius alluionem exiccat, & in salis formam adducit.

Halofacus. Efflorescentia salis petræ, Halofacus, Halmiraga, & salpetræ tam
Halmiraga. sunt affinia, vt locorum in quibus proueniunt, solùm varietate distare videantur.

De sulphure. CAPVT IX.

SULPHUR vel natium est, ac fossile, apyron, seu viuum dictum, vel factitium. Illud ex quadam pingui terræ substantia sponte naturæ generatur, plurimum verò in Lipara & Melo, atque hisdem in locis, vbi factitij vena foditur. Laudatur nitedulæ modo splendens, pellucidum, nec lapidosum, exterius colore subcineritio, intus cum frangitur, subluteo, vocatur à multis genus piceum bituminis.

Multi montes magna sui parte sulphure constant, inter quos nonnulli, vt Ætna, perpetuis flammis coruscant.

Factitium ex pingui quadam gleba paratur, quæ in fodinis sulphureis eruitur. Modus conficiendi quibusdam rusticis eo in opere exercitatis & peritis relinquendus. Probatur virescens & præpingue.

Cum migne sulphur magnam habet cognationem, Statim enim prunis adhibitum accenditur: nec vnquam extinguitur, donec prorsus oleosa ac pinguis eius substantia igni assumpta fuerit.

Color non idem omni sulphuri: aliud enim viridius, aliud magis luteum, aut cinereum, aut pallidum, aut lucidum, Vnde plura duobus ei⁹ perhibentur esse genera. Nā Plinius quatuor enumerat, quorum nonnulla duriora sunt, alia pinguiora, alia citius flammam co-
cipiunt.

Est vero sulphur succus mineralis bituminosus, acrem & foetidum odorem, dum accenditur, exhalans, diuersisque partibus constans, vna volatili & inflammabili, quæ facile accenditur & comburitur altera terrenæ & crassiore, vtcūque calcanthosa, igne quæ nunquam accendi potest, vt per stibium metalla, si per sulphur examinantur, metallage destruit, licet ipsorum pater dicatur à Chymicis, maxime cum accedit illi spiritus metallicus, metallorum seminali virtute imbutus, cuius energia hydrargyrum coagulare fatentur. Verum hæc curiosis relinquo Chymicæ magistris.

Sulphur quid.

Sulphur pater metallorum,

Id autem sulphur vulgare non est, de quo chymici multa furilia, ridiculaque somniant, quod licet mixtum sit, mixtorum tamen esse principium asseuerat. Verum ea de re nunc non est differendi locus.

Ex sulphure pinguem quemdam liquorem educunt ad multa efficacissimum, sed qui tantum debeat à peritis tractari, ne plus obstat, quam profit. Paratur adhuc ex eo sublimato puluis ad vitia pulmonum commendatus, cuius interdum vim eximiam euentus indicat. Flores sulphuris dicuntur, de quibus postea in Chymiologico tractatu vt & de alijs, medicamentis ex sulphure extractis.

Ol sulphuris.

Ab eo quoque nomen assumit medicamentum apud Mesuem Diasulphur nominatum, cuius nullus aut rarus est vsus.


Diasulphur.

Sulfur calefacit, coquit, resoluit: Tussientibus & asthmaticis prodest, atque ouo sumptum, aut suffitum sputum mouet. Pruritus toto corpore erumpentem butyro vel axungia suilla mitigat & tollit, & terebinthinæ commixtum lichenas, scabros vngues, & psoriam curat.

Vires.

De Ambaro griseo. CAPVT X.

Perd.
de Lo-
pex.



AMBARVM vulgò griseum dictum, veteribus vix cognitum, nec Balenæ semen est, aut alterius ceti excrementum, nec quarumdam auium herbis odoriferis in Insula de Maldia educatarum stercus, quod maris allisionibus, alluionibusque è scopulis abraditur, vt quidam putauit; etiam fungi marini specie, è fundo, vbi nascitur, agitatione magis eruta, vt multi scripserunt Nec quicquam factitium ex ladano, xyloaloe, styrace & zibetho, t Fuschius credidit, sed verissime bituminis quoddam genus est, ex maris fontibus & alueis procellarum vi in littus eructatum, quod aëri expositum illico densatur, vt solent pleraque alia in mari orta quæ sub aquis adhuc tenella, molliaque sunt: Aqua verò eruta exsiccantur & indurantur, vt Electrum, seu succinum. Illius magnam vbertatem mare solet eructare, ad Maldiarum Insularum ripas, in quibus inuenitur & ad nos deferitur.

Forfan, vt narratur in ventre cuiusdam Balenæ quantitas ambrae multa reperta est, sed quam viua medijs in fluctibus attigerat & ingesserat: Nam absurdum est arbitrari illius excrementa, ac prauam

illuuiem ambram esse, cum ea etiam optima à quouis cete ac Physterere deuorata, statim bonitatem ac suauitatem amittat.

Quod subolfecit Simeon Serhi, qui ambram bituminis modo è fontibus quibuldam manare asseruit, pessimamque eam esse, quæ à piscibus deuoratur.

Garcias ab horto quamdam odoratæ terræ speciem esse annuere videtur, cum non solum fragmentum trium ferè millium pondo repertum sit, sed & insulæ ex puro ambaro visæ sint: hocque probabile astruit, cum terræ sint infinitæ varietates in colore & qualitatibus: Atque ea generali acceptione, cum bitumen possit etiam dici terræ species, non illius verissimilitudinem impugno. Et re vera nonnulli terram pretiosam nec improprie vocant.

Sic breuiter ambrae historiam refero: variam enim eorum qui de ea scripserunt sententiam discutere nec suscepi, nec breues nostræ perferre possunt annotationes.

Probatur ambarū quod odoratissimum est, à sordibus repurgatum, quodque acu perfossū multum succi pinguis reludat, ac cinerei non nigri est coloris. Improbatur enim nigrum & valde candidū.

Excalfacit, resoluit, cor, cerebrum & partes principes recreat, spiritus reficit, lipothymia medetur, vires erigit, mentem exhilarat, & palmo conducit.

De Ambarofuluo, seu Electro. CAPVT XI.



AMBRA Citrina ac dura vulgo dicta, variè à varijs appellatur, vt à Græcis Electrum, à Persis & Mauritanis Charabe, hoc est, rapiens paleas, vnde & harpax quoque multis dicitur, alijs Arabica ambra, germanis quibuldam glessum, i. vitrum, quod vitri modo splendet. A Romanis Succinum, quod ex succo bituminoso concreto, ac indurato proueniat: Non autem ex succo pineæ arboris, aut populi nigrae, ab Auichaur rumi, dictæ, vt multi scripserunt. Nullum enim reperitur his in locis in quibus resinosa, aut lacrymosa virent arbores. Lacryma namque quamvis indurata succinum non est, in fluuiumque delapsa, liquidior non concrefcit, concreta liquatur, aut saltem emollitur, nec in succini duritiem, nitorem ac naturam abire potest. Succinum etenim res minimè vegetalis aut plantalis est, vt nec animalis, sicut leuiter autumarunt si qui lyncis vrinam concrefcere ac in succinum mutari, aut ex Cetorum excrementis quidpiam suæ generationis mutuari crediderunt: lyncurius enim seu lapis balanita succinum non, est licet paleas aut quisquilias rapiat, vt multa gummi & resinæ. Nec Marbodeo assentior dum scribit, vertitur in lapidem qui stillat ab inguine lyncis; Nec lyncum oculis tā perspicacibus vt solida corpora quauis licet non diaphana permeet.

Succinum ergo bituminis sicci species erit, cuius duo tenentur discrimina: prius succinum absolute dictum, & Gagates quod succiuū nigrum vocatur. Succinum est bituminis species, & terræ mineris eruta & in mari, in quod sæpè ducitur ac profluit, depurata ac perfecta. Principium siquidem nonnunquam habet à terra, sæpius à mari perfectius absoluitur. Nam & inter vada in ipso pel. gilittore reperitur, ex succo pingui ac viscido terræ concreto & maris illuue ac spuma Electrino spiritu grauidata. Reperitur tamen & in superficie & in sinu terræ in mediterraneis lacubus, in rimis montium & in fodinis, vnde fossile succinum. Vbicunque namque reperitur materia idonea, radijs illustrata prolifici solis, facile id fit, quod fuit nata fieri.

Illa autem materia cū lenta sit, viscida, & pinguis, ante desiccationem & duritiem multa animalia, vt muscas, pulices, formicas, & similia animalcula, ac insecta inuiscat & includit, quæ illic commoriuntur, exsiccantur & simul cum succino indurantur.

Quod Belonium fefellit, rerum exoticarum alioquin indagatorem diligentissimum, qui Cārum urbem Ægypti celebrem perlustrans in ipsius emporio succinum vidit arborum corticibus agglutinatum, moxque gummi credidit esse, ex arbore, quam nouit, nec nominat, effluxum.

Cap. 72. lib. 2. Est verò Succinum propriè dictum vel candidum vel fuluum. Cādidum quòd leuius sit ac odoratius, optimum censetur. Optimum, quoque fuluum, quod pellucidum & attritu calfactum roris marini refert odorem & paleas allicit.

Gagates autem cuius oleum foetidissimum arte Spagyrica eductū vteri strangulationibus sæpè congruit, succinum nigrum & bitumen lapideum multis dictum, est bitumen nigrum, leue, assulosum, durum, ligni modo squalido odore dum vritur bitumineo. Sunt qui duritatem & nigrorem notantes Lithodæmonē vocarunt, alij Thracium, alij Obsidianum lapidem, nonnulli Lithanthracem, seu carbonem terræ. A gagate tamen Thracius lapis & terræ carbo longe distant, hic enim vix flammam concipit nisi folliis excitetur, nec accensus bituminis spirat odorem; gagates vero facile accenditur, fumum exhalat peratrum, & valdè bituminosum.

Thracius verò bituminosus quidem lapis, & bituminis modo aqua conflagrat & oleo extinguitur quod gagatæ nō accidit, estque ita rarus vt Gagata frequens. Vis ei molliendi & digerendi potens. A Gagata fluuio aut loco nomen habet..

Succinum pulueratum & liquore idoneo datum, ad album vteri fluorem, viscera roborāda, sanguinem fluentem cohibendum. Pro- Vires; fluuio seminis dragmæ vnius pondere ex ovo sorbili datum conuenit, vt & tabidis, intestinorum difficultatibus, hæmoptoicis & à lon-

De Corallio. CAPVT XII.



CORALLIVM ab effigie, duritie & natali loco, sapè, nec improprie Lithodendron, quasi lapid-arbor, & aliquādo frutex marinus dicitur; Nam vt ait Macer, hoc velut arbuti ramusculus esse videtur. In Tyrrheno siquidem & Siculo mari prouenit, & fruticis instar assurgit, ac ramos emittit. Hinc à nonnullis inter frutices, ab aliis inter lapides, à quibusdam inter bitumina reponitur. Verè tamen nihil istorum est, sed inter omnia ambigit, aut omnia aliquo modo idipsum est.

Triplici autem agnoscitur discrimine, vnum siquidè rubrum, aliud album, & tertium nigrum. Prius, vt aspectu iucūdius, sic melius, medicatus & ad armillas, aliaque ornamenta aptius. Album vt spongiosius, sic leuius, magisque refrigerans; nigrum rariùs visitur, minusque medicatum & expetitur. Proinde vix vnquam ad nos defertur ex insulis Maldiuus in quibus prouenit. Laudatissimum rubeum, quod semper vsurpatur, cū absolute Corallium ponitur. Aliud insuper datur, mixtum, intermixtis nempe coloribus intercurstantibus, estque minus bonum. Rubeum, vt cæteris præstet, debet esse colore floridum, vt alga odoratum, vt frutex ramosum, fractu facillimum, non scabrosum, nec concauum, aut lacunosum.

Omne autem corallium refrigerat, siccatur & astringit: mēstrua immodicè fluentia, & omnem sanguinis fluore cohibet; Vnde Dysentericis valde prodest: & in viris seminis profluuium, & mulieribus albos vteri fluores reprimat. Hæmoptoicis plurimū confert, Epilepticis, lienosis & Cardialgicis; nam cerebrum roborat, lienem minuit, cordi adfert hilaritatem. Ex eo Chymici parant oleum rubellum, ad sanguinis ex quauis parte reiectiones, & ad robur membris conciliandum vtilissimum, de quo alibi dictum est.

De Auripigmento. CAPVT XIII.



AURIPIGMENTVM, Arrhenicum, seu Arsenicum, Sandaracha, & Risagalum vix nisi nomine discrepant: omnia hisdem in fodinis eruta: omnia septica & summa caloris acrimonia principia vitæ dissoluentia, destruētia, depascētia. Et recentiorum nonnulli Arsenici nomine tria subintelligunt; Auripigmentum enim vocant Arsenicum croceum; Sandaracham, Arsenicum rubrum, Risagallum, Arsenicum album.

Auripigmentum & Sandaracha in hisdem metallis gignuntur, tantumque

eamque maiori & minori coctione distare videntur: Ob id eadem gleba ambo sapè mista videntur. Illius autem duo noscuntur discrimina, vnum aureo colore micat χρυσίζων Galeno dictum, crustosum, in squamas fissile, nulli materiei permixtum; Alterum pallefcens, glandis effigiem referens, & ad sandaracham proximè accedens.

Lit. I.
 & 9.
 comp.
 med.
 part.

Sandaracha non solùm natali solo, sed etiam natura tota Arsenico finitima est, & coctione tantum hæc videtur Arrhenicum superare. Id enim vitione transit in Sandaracham, vt Cerusa in Sandicem, quam Sandaracham pictoriam nominant. Meminit alterius Sandarachæ Plinius, quam ad ceraginosi mellis genus refert.

Cap. 7.
 lib. II.

Turpiter errant qui vocum affinitate decepti Sandaracem Arabū, hoc est, gummi Iuniperi, seu vernicem, sandaracham mineralem esse putant & vsurpant, vt alibi pro rei exigentia notauimus: Multum enim inter se dissentiunt Sandarax & Sandaracha, origine, natura, viribus: Alterum enim ex pallido flauet, leue est, & viribus naturæ amicis commendatur: Alterum rubet, ponderosum est & deleterium.

sect. 6.
 lib. I

De Risagalo pauci ac pauca loquuntur, vixque ex eorum monumentis, quid id sit, bene scitur. Bern. Dessennius Arsenicum factitium album & crystallinum dicit esse. Sed forsan in eius disquisitione & dignotione sese prudentiores gesserunt antiqui, quod adeo lethale venenum detegere noluerint. Risagalum scribit Syluius in hisdem fodinis in quibus arrhenicum inueniri, quod nonnulli auripigmentum putant.

Omne autem Arsenicum vim habet erodentem, malignam, partibus internis omnibus, humido radicali & calori primigenio inimicissimam: Ob id malo consilio Athanasia magnæ confectionem à Nic. Alexandr. descriptam ingreditur. Aliorum enim permixtione suam feritatem omnem minimè deponit. Medicamentis quidem externis aliquando commiscetur, sed exigua tantum quantitate, atque dum carnem erodere superfluam consilium est.

Aura enim arsenicalis, quæ in quodam sale consistit, vt loquuntur Chymiatræ, pessima, nec sua fixatione, & salis extractione ita deletur, vt securè possit intra corpus abire.

Vires.

De Minio. CAP. XIII.



INNABARIS Dioscoridis, quæ arboris cuiusdam in Africa nascentis succus est, qui pro sanguine Dracōnis vsurpatur, multum distat à Cinnabari recentiorum, quæ mineralis est, cuius duæ generales assignantur differentie, natua vna, & altera artificialis. Illa rursus duplici notatur discrimine; Alia enim ex multis argenti viui fodinis, vt quæ in

Hydria est, eruitur, videturque esse gleba purpurascens hydrargyro multo referta, ex qua sæpè sponte profilit: Alia in venis fodinarum argenti reperitur, estque minium secundum, de quo postea & mox dicetur.

Est & Cinnabaris artificialis ex sulphure & argento viuo simul igni coactis facta, quam Cynaprium Brasauolus vocat, ad distinctionem Cinnabaris nativæ, quam ex Dioscoride lacrymam arboris Africæ solummodo tenet.

Re vera tamen Cinnabaris Cynaprium & Minium præsertim apud recentiores, qui hæc omnia sedulo ad rationis examen adducunt, non discrepant: Et qui discrepare pertinaciùs contendunt, singulorum descriptionem accuratam exhibentes, omnia vnum esse concludunt. Nomenclationis enim varietas ita sæpè rem ipsam obscurat, ut aliquo modo venit excusandus ille, qui Cinnabarim, Cynaprium, milton, & Vermillionem, sic enim Galli loquuntur, diuersa putarit.

4. Cinnabaris varietates.

Sunt ergo cinnabaris quatuor discrimina, prior est cinnabaris Dioscoridea, quæ succus est arboris Africæ, cuius succus, ut etiam illa ipsa Draco vocatur. Secunda, mineralis est illa insigni rubore nitens, nec multum ponderosa, quæ in fodinis argenti viui reperitur: Ibique cum flammeo & rutilo colore splendet, Anthrax à fossoribus sæpè nominatur. Vtraque rara admodum est. Tertia ex sulphure & argento viuo factitia, ponderosa, lineis velut argenteis & rubris intermixta. Quarta in venis fodinarum argenti reperitur, seruaturque in officinis in forma pulueris eximio rubore nitentis, quæ alij cinnabarim, alij milton, alij minium vulgus officinarum Vermillionem, nonnulli Sandicem nominant. Qui minium vtrumque tam impurum, quam purissimum semper naturale contendunt, nullumque arte factum à cinnabari quæ & nativa & artificialis datur, discriminant.

Sandix.

Est verò Sandix Cerusa vsta, quæ ob eximiam rubedinem Serapio minium nuncupauit: cuius opinioni recentiores omnino refragantur.

Rectè autem puluis ille purpureus, quem Officinæ pro vermilionem seruant, à Plinio Minium secundum vocatur, quod in fodinis argenti reperitur, & artificiosa pluriesque repetita lotionem pulchriorem rubedinem nanciscitur, a se vult tota minij ad minium differentia, inquit Plin. ex sola lotionem & arte petenda est. Primum autem minium, seu cinnabaris mineralis ista lotionem non eget, & igne copiosum reddit hydrargyrum; Secundum seu vulgare, vermilio dictum in igne rubet quidem, sed ne tantillum argenti viui eructat, nec nisi raro medicis vñbus solet inferuire.

Cinnabaris multo quod sit referta mercurio vires eius habet: quod cum sit etiam lippis & tonsoribus notum, à multis circulatoribus ad

Cap. 7.
lib. 33.

luis Indicæ curationem sæpè vsurpatur, qui ex illa tam imprudenter
fussitus parant, vt multos statim in tremorem & paralyfim incidisse
alios interisse viderim.

De Hydrargyro. CAP. XV.



NTER magnifica Chymistarū Idola primas tenet
Mercurius, seu Hydrargyrus, quasi argentum aque,
vulgo argentum viuum, ob mobilitatem dictum,
quod & rerum principium, & sperma metallorum
illi vocitāt: Sed vtrumque æquè verum, hoc est, fal-
sissimum & ridiculum. Si quod enim habeant se-

men metalla, in seipsis habent, nec aliunde mutuātū; Nec mixta vn-
quam resolvuntur naturaliter in Mercurium, salem & sulphur, sed
tantū Vulcano Spagyricorum, vt in eos doctè disputauit Dom.
Riolanus Medic. Parisiens.

Hydrargy-
rus mon-
strum na-
turæ.

Est autem Mercurius, seu argentum viuum velut naturæ monstrū,
quod nullis videlicet naturæ legibus tenetur: Argento quouis est
candidius, aqua fluxilius, aceto meabilius, nunquam tamen made-
facit, sæpè refrigerat, sæpè calefacit, aliquando frigidos tantum af-
fectus, aliquando tantū calidos sanat, & cum frigidum percipia-
tur, calidos interdum affectus inducit, cum calidum, frigidos: Non-
nunquam parua quātitate nocet, nonnunquam magna prodest, fa-
cileque formam propriam amittit, facilè eam denuo quasi resur-
gendo resumit; Et quod mirum est, sæpè per os sumptum insigniter
prodest; foris adhibitum, tremorem, paralyfim, & alios affectus pra-
uos adducit.

Historiæ
notatu di-
gnissimæ.

Quosdam vidit Traianus, ante obitum litu hydragytrato inunctos,
in quorum secto cadauere hydrargyrus copiosus repertus est, in cra-
nio nempe, scapularum & brachiorum iuncturis.

Historia
alia.

Alium vidit, qui ter tantū hydragyrosim passus, multos humo-
res per vomitum exclusit, quibus multa hydrargyri quantitas erat
confusa.

Historia
alia.

Alia historia narratur de quodam Antonio Gallo, qui pluries hy-
dragytrato medicamine inunctus, nec saluationem, fluorem oris
vocant expertus, cum vrina hydragyrum minxit, quo nummus au-
reus adeo bellè dealbatus est, vt pro argenteo sumeretur.

Historia
alia;

Ciuem quemdam Parisinum oinopolam vidi, aureos solares, aut
alios ex auro nummos solo tactu dealbantem, vt pro totis aureis ha-
berentur. Tandem marcescēs obiit, hydragyro perperam a tonso-
ribus vsurpato.

Historia
alia.

Idem obseruatum in tremulo sene solo digitorum attractu mone-
ram auream dealbante, quod totam vitam degerat ad cynabarim
tractandam, præparandæque in hydræ fodinis hydragyro grauida-
tis. In comitatu Goritiæ in Sclauonia, habitus namque totus corpo-
ris, imo totum corpus penè erat hydragyratum.

Per os verò sumendum exhibet Brasauolus ad tineas ventris ene-
candas. Quasdam mulieres asserit Fracaſtorius hydrargyri ſingulas
ſumpſiſſe lib. i. ad perdendum fœtum, quæ ne tantillum moleſtiæ
perceperunt, nec votorum compotes extiterunt, fœtibus nempe
minimè excluſis.

Idem tamen author poſtquam eius uſum modò probarit, modò
improbarit, ingenuè fatetur ſe illius qualitates ignorare. Verum au-
dacter aſſerit luem veneream optimè curare.

Quis pri-
mus uſus
eſt mercu-
rio ad luem
veneream.

Omnia autem primus qui ad huius morbi ſanationem hydrar-
gyrum præſcripſit, fuit quidam Iacobus Carpenſis, quo tam fœlici-
ter uſus eſt, ut breui diſſimulatus euaserit. Eum recentiores ſunt ſequu-
ti, & remedijs tam externis quam internis permiſcent: Vtroque
enim modò prodeſſe deprehenditur, propter vim quamdam alexi-
teriam, qua virus venereum in Italico morbo deliteſcēs extinguitur.
Eſt enim ipſius Alexipharmacum, licet non ſatis tutum, niſi optimè
tractetur, debite calligetur, & opportunè detur. Multos enim vidi-
mus, qui ab imperitis per hydrargyroſim tractati, vel interierunt,
vel in deteriorem ſanitatis conditionem inciderunt. Tam fera enim
iſta bellua, vix ut vlla arte queat cicurari. Propterea excuſandus
Galen. qui in illius uſu meticuloſus fuit, nec ſit auſus facere peri-
culum, quandoquidem ediſcerat à Dioſcoride vim illi eſſe pernicia-
lem: Vnde plumbarij & aliorum metallorum, in quibus hydrargyri
portio quantulacunque continetur, fuſores facile in tremorem,
paralyſim, & neruorum corrugationem incidunt: Et ſoſſores qui
argentum viuum ex fodinis eruunt, quantumvis ruſtici ac robuſti
vix quadriennium in eo opere viuunt, ſed miſelli moriuntur. Eſt
enim quaſi indomitum medicamētum, cuius eſt anceps agendi vir-
tus & effectus, quod licet liquidum ſit, metalla tamen valide pon-
deroſa ei ſupernatant, ut aquæ lignum, auro excepto, quod fundum
petit. Habet enim volatiles ſpiritus plurimos à quibus exurgit aura
quædam arſenicalis, cerebro, neruis, & principibus membris ini-
miciffima.

Pernicioſa
vis hydrar-
gyro.

Refert Traianus lib. de lue venerea, quædā agrum, ter hydrargy-
roſim paſſum, abſque vlllo ſaliuationis & ventris per ſeceſſum metu,
vrinas tamen adeo hydrargyratas reddidiſſe, ut his aurea ſtirps at-
tactu manuum ſolo argentea comparuerit.

Hydrargyrus etenim adeo meabilis eſt, ut per ſolidam oſſium
compaginem exiliat. Et ſi vera narrat idem author fide ſane dignus
in quorūdā cadaueribus ſectis, non parua quantitas hydrargyri in-
uenta eſt intra cranium, ſub ſcapulis & in articulis. Et quod magis
mirum, quidam poſt litum brachiorum ex vnguento Mercuriato,
ter ſolum adhibito cū ſecederet, multa vomuit hydrargyro
commixta.

Eſt autem argentum viuum vel naturale, vel artificiale: Naturale

Cap.
59. lib.
9. ſimp.

ex multarum fodinarum, vt quæ sunt in Hydrio monte, glebis, guttatim, ac sponte stillat; Et aliquando ligone, aut aliis ferreis instrumentis mucronatis percussa quædam fodinarum vena, fonticuli instar profilit in subiectam humum.

Artificiale fit aut poti⁹ extrahitur ex Cinnabari, de qua capite superiori. Nec facile assentior Brasauolo, qui etiam ex marmore mercurium fieri ex Vitruuio scribit, nisi quoque dixerimus cum Chymistis ex rebus omnibus mixtis elici posse, perinde ac sulphur & salern.


De qualitatibus autem Hydrargyri adhuc certatur: Alij enim calidum, alij frigidum ab effectis contendunt, vt dictum est; Auienna, quem Palmarius Med. Paris. atque alij multi sequuntur frigidum & humidum asseuerant. Fracastorius, Tomitanus, atque plerique alij qui qualitatem erodentem illi tribuunt, calidum perhibent. Ego cum Traiano qualitatis mixtæ contendo, in eoque qualitates quasdam esse subtiles & calefacientes, alias crassiores & refrigerantes: sed præterea, multas adhuc alias dotes possidere. Incidit enim, attenuat, penetrat, liquat, resoluit, ventrem subducit, & quod mirum est, vi partim attractiua humores à superficie ad centrū, hoc est, ad ventriculum adducit & per secessum educit, partim impulsua à centro ad habitum impellit, & per saluationem propellit.

Hydrargiri
qualitates.

Ad effectum vtrumque datur in morbo Italico; Sæpeque datur ad saluationem, cuius loco superuenit alui fluor, vt aliquando ad vētris fluorem, cuius loco superuenit saluatio. Expellitque humores vt Toamenes lapis ferrum, & eosdem attrahit, vt magnes illud.

Hydrargi-
ro vis inest
attractiua
& impulsua.

In puluerem aliquando reducitur album & valde ponderosum, de quo alibi egimus, qui sine molestia aluum deturbat; visceribus tamen non parcat, quibus suæ & aquæ fortis dictæ, in quam immergitur, malignitatis impressum sæpè relinquit vestigium, vt in multis obseruaui, qui in agyrtæ cuiusdam manus sese commiserant.



SECTIO SECVNDA

De lapidibus pretiosis & medicatis.



Angulus terræ nullus est, qui homini non suggerat pabulum aut medicamentum, nullusque eiusdem sinus, in quo quidquam non lateat, humanis vñbus idoneum: atque non tantum Arabia fœlix, sed Barbara quævis regio ad nos plurima mittit, quibus & suauiter vescimur, & salubriter utimur. Ex India enim utraque, & regionibus exoticis multa quotidie & gemmarum ditissima vbertas & eximiarum stirpium ingens copia ad nos deuehitur. Vocantur autem gemmæ lapilli pretiosi, propter raritatem, elegantiam, ac pulchritudinem & vires insignes: nulli enim dubium est, quin sua sit gemmis diuinitus insita virtus, ait poeta: unde regum & principum coronas ornant, digitos illustrent, suppellectilia ditant, à fascino tuentur, morbis medentur, sanitatem conseruant, oculos recreant, mentem exhilarant, tristitiam pellunt. Non est autem, ut obiter dicam, omnino irridendus stultiloquus, ac manigraphus vir Fr. Rabelesius, qui suo ineptiarum libro, quæ vel ignari vel pseudocatholici, imò Athei doctrina multa refertum prædicant, molendinariam molam ex Pictorio Villigensi lapidum pretiosissimam enuntiavit, ut cuius vsus omnibus aliis præferendus sit: Sed præstat minimum relinquere, ut seria tractemus. Melius enim fuisset illi, & rei literaria, si natus fuisset nunquam, ut qui fax fuerit literatorum putidissima, omnis sordiciei parens, tetra Memphis & iniquum mundi recrementum.

De Smaragdo. CAPVT I.



OST Adamantem ferè sola duritie commèdatum, ipsius enim nullus est in medicina vsus, Smaragdus, Arabibus Zamarrue dictus, elegantissima viriditate, eximia dignitate, efficacissima virtute cæteris præfertur lapidibus pretiosis. Smaragdo enim nihil iucundius, nihilque gratius oculis obiicitur; Coloris siquidem lenitate fatigatos oculos reficit, quos aliorum fulgor sæpè laceffit.

Inueniuntur Smaragdi pluribus in locis, sed præstantissimi apud Cyclopes, seu Arimaspos, sic dictos, quod vnicum, eumque rotundum in media fronte habeant oculum. Arima enim apud eos vnum signat, spu verò oculus. Herodot.

Hi populi dicuntur assidue præliari cum Gryphis, ut liberiùs aurum & lapides pretiosos effodiant, quibus montes apud eos multi multum abundant, quos tamen frequentes habitant Gryphi alites ferocissime, & mira rabie sæuientes. Visos enim homines discerpunt, & veluti custodes peruigiles nati ad plectendum summam auaritiæ temeritatem, in obuios quosque crudelissimè rostro ruunt & unguibus.

Duodecim autem à Plinio Smaragdorū differentiæ traduntur, quorum Scythici ex lucido viridiores, elegantiores & præstantiores iudicantur: deinde Bactriani, qui nonnunquam in saxorum commissuris inueniuntur: Tertium locum tenent Niliaci, seu Ægyptii, qui in collibus & cauitibus circa Copto Oppidum Thebaidis eruntur. Reliqua genera in arariis metallis inueniuntur, de quibus videndus est Plinius.

cap. 6. Ferè tamen tres solummodo varietates, maioris & minoris ratione distinctas institores venditant. Parui enim ducunt Calchosmaragdos, obscuros, variegatos, non translucidos, atque eos omnes, qui vel Iaspidem, vel Beryllum, vel alios lapides habent admixtos.

Optimus est Smaragdus, unicolor, splendens, ac perlucidus, & qui iucundam ex liquido viriditatem oculis obicit.

Tam mira virtute pollet Smaragdus ut annulo inclusus à comitali Historiæ præseruare dicatur. Memoriam quoque roborat, castitatem amat & veneris ludibria tam auersatur, ut cum Rex Hungariæ uxorem ini- Vires, ret, Smaragdus annulo conclusus, qui tum digitum ornaret, in tres partes disruptus est. Eximiæ cum sint eius dotes, rectè Mesuei interpretæ, præter authoris mentem, in Electario de Gemmis, Smaragdum pro feruzegi, vel potiùs peruzegi, id est, Erano, seu Turchesa substituit. Nam Turchesa, seu Eranus nullius ferè est virtutis & vsus in medicina: Smaragdus verò plurimi, & suo eleganti colore & viribus multum commendatur, iuxta illud Marbodæi.

*Omne virens superat forma viridante Smaragdus,
Collo suspensus dirum fugat hemitritæum,
Et sanare potest ipsa ratione Caducos,
Fertur lasciuos etiam compescere motus.*

De Saphyro. CAP. II.



SAPHYRVS gemma est non pretiosissimi valoris, præsertim, qui ab aqueo colore, quem æmulatur, aqueus Saphyrus vulgo nominatur; sed qui magis splendet, colore cyaneo maximi solet estimari, de quo sic poetæ, *Saphyri species digitis aptissima regem*. Aqueus, seu ut lapidæ loquuntur, albus Saphyrus

tam bellè adamantem æmulatur, vt nonnullos interdum fecellerit. Vterque inuenitur in *Calecut*, sed præstantiores ex *Zeilan* & *Pegu* aduehantur.

Vires.

Saphyrorum virtutes nec tot, nec tales, quot qualesque recensentur à multis superstitiosis, atque describuntur in vulgatis lapidum libellis. Vana siquidem sunt & mere falsa, quæ de Saphyro Carminè Macer dedit hoc modo.

Ca. 5. l. 5.

*Quem, inquit, natura potens tanto ditauit honore,
Vt sacer & meritò gemmarum gemma vocetur.
Nam corpus vegetum conseruat, & integra membra,
Et qui portat eum, nequit vlla fraude noceri,
Inuidiam superat, nullo terrore mouetur.
Hic lapis, vt perhibent, educit carcere vinctos,
Obstruetaeque fores, & vincula tecta resoluit.*

Alia non persequor, ad fastidium vsque de Saphyro versibus conscripta, Poëtis enim cum liceat mentiri, vt ait quidam, ab his rei cuiusdam veritas & fida historia non expectanda. Fides autem his est adhibenda qui scribunt Saphyrum cor recreare, venereos appetitus compescere, hilares pacificosque reddere gestatum. Venenis in potu resistit, & intestinorum vlcerationibus: oculis quoque adhibitus eorum sordes expurgat.

Comm.
in Dät.
Poet.
Ital.
cant.
20. sui
purgat.

De Rubinis. CAPVT III.



VBINVS à flammeo colore *ἄνθραξ* hoc est carbunculus dictus, non noctu splendet nec in tenebris accensæ candelæ vicem gerit, vt idiotæ putant, sed eius nitor quasi flammeus præ cæteris lapidibus rubeis fulget, vnde Poëta.

*Ardentes gemmas superat carbunculus omnes,
Nam velut ignitus radies iacit vndique carbo,
Nominis vnde sui causam traxisse videtur.*

Ab igne igitur Carbunculi nomen habent, vnde Græcis non modò Anthraces dicuntur, sed etiam Pyropi, vel, vt aliis placet, Apyroti, quòd vix ignem sentiant, aut igni incalescant.

Eorum autem tot sunt varietates, vt vix possint peculiari nomine signari & inter se distingui, ait Plinius: præstantiores, elegantiores, flammeis radiis fulgentiores sunt Carchedonii, omniumque pretiosissimi; dein Æthiopici; tum Alabandici: Quarto Syrtites carbunculi laudantur, vt etiam Indi: Lithizontes omnium minimè boni & pulchri: sunt enim impuri & ferè marmorei: ob id obsecuri: quemadmodum & multi alii, vel fusci vel candicantes. Sunt qui Carchedonios à Carthagine, non à pulchritudine & valore dignitatem mutuari contendunt.

cap. 7.
lib. 37.

Quinque autem Carbunculorum, seu Rubinorum genera tantum solent institores venditare, vnum eximie rutilum & splendentem,

tem, quem absolutè Carbunculum vocant, alterum minus fulgidū, quem verum Rubinum dicunt: hic satis frequens est, ille verè rarissimus & ferè inuisus, nisi solis regibus.

Tertius dignitatis gradus ei tribuitur, quem Balæsum corruptè nominant, cum balauſtium, à mali punicæ flore, quem refert, dicere deberent. Post hunc laudatur Rubith quem subinde Spinellum appellant. Quinto loco Granati recensentur, de quibus capite sequenti.

Plerique tenent carbunculos vtriusque sexus esse, mares nempe qui excitatiùs fulgent, alios verò crassiùs nitentes & pinguioreſ fœminas.

Omnes rubini vim habent cardiacam & putredini, venenisque resistentem. Vires.

De Granatis. CAP. IV.



GRANATVS sic dicitur, quòd sitacino mali granati similis, estque species quædam Rubini à natura minus elaborati & quasi imperfecti. Rubeus quidem est, sed admodum obscurus, veluti si vmbra, aut nubecula quædam rubino offundatur, vnde Rubinum nigricantem nonnulli vocitant.

Eius duæ differentiæ agnoscuntur: alius enim est coloris viuacioris, flammam coruscantem cum quadam intermixta obscuritate æmulantis: alter obscurioris, qui minoris æstimatur. Vterque prouenit in Calecut, & quibusdam Hispaniæ locis.

Granatus suspensus, vel ebibitus tristiæ multum resistit, & cor recreat. Cum tamen igneæ sit naturæ cerebro nocet, sanguinem excitat, & ad iracundiam excitat. Vires.

De Sardiolapide. CAP. V.



ONIX, sardonix, & Sarda magnam inter se habent affinitatem. A Plinio tamen & aliis rectè distinguuntur. Nam Onix gemma est vnguem humanum referens, eaque polita & nitens. Onicem pulchrum habebat Polycrates, de quo vide Plinium. Onix.

Sarda non perlucida est, sed rubedine quadam diluta, ac carnis colorem repræsentans, vnde & Carnalina, non Cornalina cum quibusdam dicenda, nam cornu minimè similis est. Sarda.

Sardonix tanquam vtriusque particeps, huius & illius habet colorem, hoc est, veluti vnguem hominis carnibus impositum, & vtrumque translucentum refert. Sardonix.

Dicitur verò Sarda, quod Sardibus primùm fuerit inuenta. Lauda-

tissima plurimum rubet & perspicua cernitur. Minus probatur, cui obscurus, seu dilutus est rubor.

Gestata sarda recreat animum, somnia tristia cohibet, timorem pellit, à maleficijs gestantem seruat, hæmorrhagiam sistit, vtiliterque accedit ad confectionem Electarij de gemmis.

De Hyacintho. CAP. VI.



YACINTHVS gemma est, nō maximi valoris, eius enim copia nō modo è multis Indiæ locis, sed etiam ex Lusitania ad nos deuehitur. Electri ferè colorem refert, magis tamen ex flauo splendet, & quasi fulgur aureum emitit.

Hyacinthos quosdam rubeos esse, alios cæruleos aut venetos nonnulli scribunt, multi tamen granatos, aut Topasios, vel similes his lapillos potius, quàm veros hyacinthos putant. Inueniuntur hyacinthi variegati, ynicolores tamen meliores sunt ac pretiosiores, præsertim Bactriani, Arabici omnium pessimi.

Plinius sæpè inculcat hyacinthos citrinos esse, & quosdam venis quibusdam albis variegatos. Qui talis inuenitur Leucocrysos Græcis dicitur. Datur quoddam succinum flauissimum, syncerum, fulgidum, Græcorum idiomate Chryselectrū nominatum, quod ignari pro hyacintho vero sumunt.

Vires.

Suæ autem non desunt hyacinthis vires, frigida enim cū sint naturæ, corpora densant, somnum conciliant, cor roborant, à pestis contagio tuentur, animi alacritatem excitant, & à fulgoribus defendunt.

De Topazio. CAP. VII.



IGNIT & hunc Arabum gemmis ditissima tellus, ait Marbodeus, de Topazio loquens, qui in nebulosa quadam nominis huius in rubro mari insula primū reperi- tus est à prædonibus, qui in illam tempestate & procellis iniekti, ibique diutius sine victu commorantes ad herbas & radices confugerunt, quas effodientes simul Topazium eruerunt, sic à natali solo nuncupatum.

In alia quoque insula, cui nomen est Chitis, frequentes effodiuntur Topazii, pulchro splendore nitentes, & valdè expetiti.

Duo autem illorum tradunt esse discrimina; Prazoidem vocant vnum, siue Chrysoprasium, quem cum Chrysolita eundem esse multi contendunt; alterum Chrysopteron, sic ab alarum aurearum quibus micat, fulgore nuncupatum.

Chrysolitus, seu Chrysoprasius veterum, succi porrorum viriditatem ex aureo fulgentem eleganter refert, vnde nomen.

Porro Topazius inter lapides facilè limam admittit; Ceteræ gem-

ma cote aliisque faxis poliuntur. Est verò mirum, quod Topazius in aquam feruentem iniectus, non modò amplius bullire impedit, sed ipsius feruorem adeo temperat, & æstum obscurat, vt absque læsione nuda manus statim in illam ipsam immitti queat.

Hæmorrhagiam à quacunque parte sistit, iram sedat, tristitiam vel tollit, vel minuit, phrenitidem impedit, & animum oblectat.

De Lapide Lazuli. CAPVT VIII.



QUÆM Mesuë & Arabes reliqui lapidem Lazuli vocant, Græci *κυανον*, Latini Cyanum, & aliquãdo Cya-neum, lapidem stellantem, radiantem & ceruleum nominant. A Gallis prerogatiua quadam absolutè & sine adiuncto lapis vocatur. Interdum ab Auicenna & Serapione Armenus & Armeniacus dicitur.

Dissident tamen inter se Armenus & Lazulus, hic siquidem aureis stellulis & velut radijs micat cum cæruleo flauescens, ille maculis multis & viridibus, & ceruleis, & quibusdam subnigris distinguitur: vnde Itali *verdazuro*, quasi viride cæruleum appellant. Vtriusque tamen vires adeo affines sunt, vt alter alteri substitui possit: In hisdemque fodinis vterque ferè reperitur, & maximè in ærariis venis & argentariis: potius tamen Lazulus in aurariis, à quibus maculas & puncta aurea mutuatur quamplurima.

Vires.

Is verò vt pulcherrimus, sic & optimus, & multum expetitus, non modò ad mulierum armillas & alia ornamenta, sed etiam medicamenta.

Gestatus Lazulus confert visui & animum exhilarat. Præparatus & sumptus multa commoda pollicetur; nam tritus & lotus, vt decet, potenter & innoxie humorem melancholicum purgat. Vtusus & ablutus interiora recreat. Superstitiosum est nimis, quod de eo multi scripserunt, hominem quippe blandum, diuitem & benè fortunatum asserentes qui illum gestarint.

De Magnete, seu lapide Heraclio. CAP. IX.



NIL in orbe toto natura mirandum magis creauit Magnete, quem D. Aug. mirabilem ferri raptorem vocat: quem cum primum vidi, inquit, vehemèter exhorui: quippe cernebam à lapide ferreum annulum raptum atque suspensum, denique tanquam ferro quod rapuerat, vim suam dedisset; communem

que fecisset, idem annulus alteri admotus est, eumque suspendit, sic accessit & tertius & quartus, iamque sibi per mutua circulis nexis, non implicatorum intrinsecus, sed adhaerentium extrinsecus quasi catena pependerat annulorum. Eadem scribuntur à Plinio l. 34. suæ historiæ.

Eius autem trahendi ferri virtus primùm innotuit cuidam armeni-

rario, cuius calceis cū ferrei clauī essent confixi, is armenta sequens in monte Ida, ad quemdam locum venit vbi magnes copiosus latitabat, ex quo vix discessit, nisi clauis extractis, aut crepidis relictis & baculo altera parte ferrea cuspide armato.

*Nican-
der
Plin.*

Ille autem pastor vocabatur Magnes, a quo & lapis hic hucusque nomē retinuit. Dicitur & Heraclius, nō ab Heraclio inuētore, vt credidit Taisnieriū, sed ab Heraclia Lydiæ ciuitate, vbi laudatissimus gignitur. Syderiten adhuc alio nomine vocitant quōd ferrum allīciat, trahatque. Et aliquando lapidem nauticum, quōd nautis plurimum inferuiat.

Agnoscentur verō quinque eius differentiæ, prior dicitur *Æthiopicus*, Secundus *Magnesiacus*, ille ab *Æthiopia* regione, hic à *Magnesia* ciuitate defertur. Tertiū inuenitur in *Alexandria*: quartus in *Echio* *Bœotia*: quintus omnium pessimus in *Capo Verlychi* *Natolia*. Est enim leuis & spongiosus instar pumicis. *Æthiopici* omnibus præstantiores iudicantur: Atque omnes cuiuscunque generis sint eò meliores, quō magis cerulei. Laus quoque summa datur ponderosis & potenter ferrum trahentibus.

Adamas autem impedit ne ferrum trahatur à magnete, vt etiam allium eidem affrictum. Tam valida enim illius in trahendo ferro virtus non est, quin facilè possit eludi, obscurari, superari. Vnde ridiculum credo, quod scripsit Taisnieriū, quasdam naues clauis ferreis compactas, mare *Æthiopicum* oberrantes & tempestate ad promontoria agitatas in fundum à magnete attractas fuisse, aut saltem clauis magnetis virtute extractis in mille partes dissolutas. Hæc enim vetularum sunt insomnia viri docti calamo nimis indigna.

Attrahit autem magnes ferrum tanquam sibi simile, ad sui conseruationem & alimoniam: Ob id eius scobs solet in pyxidibus asseruari: Respicitque partem *Aquiloniam* tanquam matricem, vnde ad *Antarcticum* dirigi nautis dicitur.

Gignitur & in monte quodam *Æthiopiæ* lapis alius oppositæ virtutis, quem *Theamedem* nominant, qui nempe ferrum omne respuit, abigitque.

Sunt qui magnetem vstum pro *Hematite* vendunt, magnum tamen est inter vtrumque discrimen, vt ex singulorum descriptione pater.

Dioscor.

Gar-

cias ab horto.

Vires,

Magnes præter dotes enumeratas, quasdam adhuc medicas habet, vnde ad emplastrum diuinum & alia medicamenta accedit. Sūt qui putant magnetem per os parua quantitate sumptum adolescentiam conseruare: Ob id rex *Zeilan* fertur patinas ex magnete iussisse confici, in quibus cibus eius coquatur.

De aliis quibusdam gemmis in medicina variis usurpatis. CAP. X.

INFINITÆ, penè dixerim, alię traduntur gemmæ & aspectu perpulchræ ac elegantes, & viribus non remnendis insignitę, quarum quòd rarissimus sit usus, de singulis singula capita constituere non decreuimus: Sat enim est si nostro satisfaciens instituto, eas tantùm accuratè descripserim, quæ Officinæ à nobis instructæ confectiones ingrediuntur. Ne tamē Pharmacopœus gēmas adeò paucas esse existimet, hoc vnico capite velut in fasciculum & breuem epitomem alias plures simul contraham.

Inter eas autem frequenter occurrit Eranus, Turchesa Gallis; *Peruzza* Arabibus, Callais & Augites Plinio dicitur: cuius color ex cyaneo & viridi eleganter videtur confusè mixtus. Nascitur in India, præcipuè circa montem *Cokas*.

Iaspis viridis est lapis, aut magna sui parte viridi commixtus & elegans, cuius species omnes recensere nimis esset fastidiosum: nam, Iaspidis esse decem species, septemque feruntur, ait Macer. Vim habet insignem ad sanguinis fluorem sistendum.

Sumpsit Hæmatites græcum de sanguine nomen; Gestatu enim & sumptu sanguinem vndecunque fluentem cohibet. E Iaspidum genere creditur: Est enim lapis virescens, variegatus, & guttis cruentis conspersus.

Achates sic dicitur à fluuio Achate, in quo reperitur. Eius multadantur discrimina, sed vulgatiores ex obscuro candicat, venis quibusdam modo rubellis, modo nigellis intercurrentibus. Pyrrhus rex elegantissimum fertur habuisse, in quo nouem Musæ sola naturæ manuerant sculptæ. Visus est aliquando Achates, instar coralli rubeus, Corallochates ob id dictus.

Amethystus lapis est ex India delatus, colore purpureus, violaceo permixtus, leniter quasdam flammulas emittens. Eius quinque species perhibentur: Cōmunior violacei est coloris, refertque eius species quedam vini colorem aqua multa diluti. Ebrietatem quidem impedire, sed insomnia excitare dicitur.

Vt Adamas laudatur ex candido coruscans, Smaragdus viridis, Carbunculus flammeus ac rubeus, Saphyrus cæruleus, Chrysolitus aureus, Sic Opalus varius, cui ignis Carbunculi micat, Amethysti purpura fulgēs, Smaragdi mare virēs: atque cūcta pariter mixtura incredibili lucentia, nihilque inter gemmas pulchrius esse potest. A Plinio Pæderos vocatur. Nascitur in insula Zeilan, inque multis aliis Indiæ regionibus, in quibus *Argenon* nominatur. In Ægypto etiam inueniuntur quidam Senites nuncupati.

Est Opalus alius minus elegans & nitens, quem Pseudopalum & Oculū catti nominant. Vt verò opalo minus pulcher, sic minus expetitus. Forsā is est lapis qui ab Isidoro Ophthalmius nominatur.

- Pseudopalus.** Ex Opalorū genere est alius lapis, qui à Pardalis seu Pantherę animalis variegato colore Pãthera nominatur. Nã, Pantherã patet esse feram diuersicolorem, ait Macer. Tot autem virtutes quot colores habere creditur.
- Selenites.** Selenites quòd imaginem lunę referat, sic dicitur. Lapis est ex cãdido, melleoque fulgore nitens, qui ad incrementum aut decrementum Lunę & crescere & decrescere videtur. Eius quędam species pallidior, alia viridior deprehenditur.
- Girasola.** Girasola quibusdã lapis solaris, alijs Leucopetalos dicta, inter gemmas reponitur, quę ex candido nitent, & aureum fulgur emittunt.
- Dionysia.** Est quędam gemma non ignobilis Dionysia dicta, quę trita & sumpta vini saporem vtcunque refert, ebrietati resistit: Sic à poëta describitur: Nigra micat rubeis Dionysia confita guttis.
- Beryllus.** Beryllus gemma est alias multas eiusdem nominis sub se complectens, quarum alię maris viriditatem referunt, alię pallidiores, alię flauescences & ex aureo colore fulgentes, quę Chrysoprasi sæpe vocantur: alię olei colorem, alię alium, itaut nouem eius varietates enumerentur. Beryllus obscurè micat, ni forma sexangula poliatur.
- Nephriticus lapis.** A paucis annis ex Hispania noua delatus est lapis variegatus, ex viridi & lacteo permixtus, quē Nephriticū nominant. Is enim brachio alligatus mira proprietate calculos atterit & cum vrina propellit.
- Ætites.** Ætites est lapis veluti pręgnans, alio, cū quatitur, quasi sonante, Ab Aquila nomē habet, à quibus, vt multi ferūt, defertur, ad ouorū calorem temperandū ne nimis calefiant, dum incubantur. Alij aliter sentiunt, & sæpè falsa enūciāt. Vt vt sit, iste lapis creditur partum accelerare, si femoribus alligetur: retardare, si super stomacho, aut inter mammas gestetur. Eius quatuor differentiæ notantur, quas ex Plinio quis ediscere quit.
- Iudaicus lapis.** Lapis Iudaicus à natali solo nomen habet. Candidus est, forma elegantissima, glandis magnitudine, & lineis inter se equalibus, veluti torno factis distinguitur. Tritus, ac leuigatus & sumptus calculos in renibus & vesica comminuere dicitur.
- Chrysolāpis.** Chrysolampis interdū subpallida est ac fusca, noctu verò vt ignis splendet. In Æthiopia nascitur. Rarissimè tamē ad nos deuehitur. Alias penè innumeras recensent & Plinius, & qui de lapidibus lib. 10. lib. 37. brosin lucē ediderūt. Sed multa sæpe scripsere, quę nec norūt, nec viderunt vnquam; atque multos interdum lapides quadam affinitate coniunctos, pro eodem vsurpant, & sæpè eundem multis nominibus designatum, multiplicem constituunt. Infinitæ enim sunt lapidum nomenclaturæ, ait Plinius.
- Vniones.** Superfunt & alii lapides eximiæ virtutis & multū pretiosi, sed quia ex animalibus desumuntur cuiusmodi sunt vniones, seu margaritæ, lapis Bezaar & alij multi, de his in libro de medicamentis ex animalibus aut eorum partibus sumptis, agemus. Cap. 11. eiusd. libri.

*De Lapidibus quibusdam medicatis, nec pretiosis, & primum**De Marmore. CAPVT XI.*

ARMOR notissimum & durissimum lapidis genus est, cuius tot videntur discrimina, quot loca è quibus eruuntur. Omnium nobilissima hæc dicuntur, Pheugiticum, Parium, Zeblicum, Porphyrites & Ophites. Probantur vel improbantur omnia colore, nitore, perspicuitate, duritie. Quod vel viride est, vel pluribus coloribus variegatum, sic quoque durissimum, & pulcherrimum & præstantissimum habetur. Laudatur quoque plurimum eximiè candidum & solidum, hoc seligendum ad vnguenti citrini confectionem.

Pheugiticum marmor maximè nitet, imaginesque reddit. Eo constructum est à Nerone Fortunæ templum, quod intus adeo nitebat, vt etiam clausis foribus & fenestris perpetua claritas perciperetur.

Pheugiticum marmor.

Parium non vniusmodi est. Aliud enim candidissimum, quod in Italia frequentissimum est, aliud cinereum, quoddam viride, aliud ferreum. Hoc postremum tam durum est, vt ex eo nonnulli incudes faciant.

Parium.

Zeblicum in Misena inuenitur. Omnium mollissimum est, & aduersus venena prodesse creditum est. Si ita est, hac conditione ceteris marmorum generibus antecellit.

Zeblicum.

Porphyrites marmor rubeis vt plurimum maculis variegatur; ex Ægypto deferri solet, quod maculis candidis distinguitur, Leucosticton nominatur. Ex eo pilæ & molulæ fiunt optimæ & elegantes.


Porphyrites.

Ophites seu serpentinum marmor, partim viride est, partim alijs coloribus multis corij serpentum instar variegatum, vnde nomen. Maculæ frequentiores in vulgatori pallide sunt, cum alijs valdè dissimilibus.

Ophites.

Sunt & marmorum genera à viris & regionibus nobilitata, vt marmor nigrum Luculli, vt marmor Augusti, Tyberij; vt Ægyptium, Thebaicum, Ephesium, Lacedæmonium.

E marmorum generibus est Alabastrites, sic ab Alabastro vrbe Ægyptiæ dictum, plerumque album & perspicuum, quo & imagines sculpuntur, & vasa excipiendis & conseruandis vnguentis idonea fieri solent.

De Crystallo. CAPVT XII.

CRYSTALLVS non est aqua congelata, vt pleriq; existimant, sed lapis mineralis, albus, pellucidus, aquæ clarissime modo nitens. Ex humore aqueo & purissimo, nõ frigore, sed vt multi volunt, diuini cuiusdā caloris virtute concreto, ortum ducit. Neque etiam ex glacie fit. licèt ea id illi nomen dederit, & inter niues soleat inueniri, sed ex humore sui generis. Nam glacies igni excalfacta facilè liquefcit

Cryſtallus verò non niſi ignibus circumdata, aſſiduèque vento & flammis agitata liquatur.

Inter lapides autem & ſub terra cryſtallus concreta reperitur, etiam in regionibus æſtuoſiſſimis; in quibus humor cryſtallinus à cauſa vniuerſali dicta, cum potentia quadam terreſtri lapideſcit; non ſecus ac ſuccinum & corallium quæ primùm fuerunt humor, dein in lapideã ſoliditatem, non frigore, ſed materiæ aptitudi-
ne concreuerunt.

Vires.

Cryſtallus eligenda puriſſima, perlucidiffima ac eximiè nitens. Ex ea non tantùm calices, vaſa, armillæ, & alia pleraque elegantiffima fiunt opificia, ſed etiã medicamenta quædam parantur: Eius pulvis vnguenti Citrini compositionem ingreditur, ad dentiſſicia commendatur, & alia medicamenta ornatui inſeruienia.

De Gypſo. CAP. XIII.



Y P S V M cuique notiſſimum, præſertim Lutetiæ, cuius mœnia, ædes, palatia, magna ex parte gypſo camentatur: fodinæ ſiquidem illius ſuburbianæ totæ gypſatæ ſunt, nec ſilicem, aut alterius generis lapidem in earum cuniculis inuenire facile eſt.

Eſt vero gypſum lapis candidus, vtcunque nitens, in laminas facile ſciſſilis ædificijs & muris ſtruendis idoneus. Crudum gypſum vix ad ædium fabricas uſurpatur, ſed in furno coquitur donec tabeſcat, planè albefeſcat & in puluerem citius reducat, qui aqua dilutus mox lapideſcit. Antequam tamen induruerit, fidelia agitur, ſubigitur, duciturque, vt diutius reddatur molle, & ſequax ad alios lapides ſimul agglutinandos, & alia opera induſtriõe ſingenda. Preſtantiſſimum eſt recens coctum, nam diutiùs aſſeruatum humidius eſt, & aquæ immixtum non ita ſolidè lapideſcit.

Eius duo notantur discrimina, vulgatiùs vnum quod obſcurè nitet, alterum rariùs, quod in laminas ſinditur, ferè ſpecularis, lapidis aut talchi modo ſplendens, vnde multi talkum, impropriè tamen nominant. Eſt enim Talkum, magis & tenue, & ſquammoſum, & album, & lucidum. Sunt qui Selenitem vocitent. Agyrta nonnulli ex talcho arte deceptoria oleum parant ad vetulas fucandas, erugandasque, & ad faciei nigredinem dealbandam, ſicque imprudentes mulierculas, quæ deformitatem ægrè ferunt, vanis pollicitationibus quotidie fallunt, cautè, nec illicitè (conſentienti enim & volenti non fit iniuria neque dolus) in illarum crumenas manus iniicientes.

Vires.

Gypſum vim habet aſtringendi & obſtruendi, inquit Diſocorid. Sanguiniſque eruptiones & ſudores cohibet, Ob id vtiliter ad emplaſtrum contra rupturam accedit, & ad alia medicamenta externa, quæ ad meatuum laxitatem imperantur. Per os autem non ſumendum, quia ſtrangulationis modo interficit.

De Calce. CAPVT XIV.



ALX & gypsum duo sunt lapidm simul agglutinandorum in ædificiis diuitum construendis vincula, nam pauperum ædiculæ sola fere terra subacta, aut luto cæmentantur. Sed gypsum postquam semel aquam ebiberit, & coierit, eius est impatientissimū. Calx vero & aqua nutritur, & diutius, ac melius cōseruatur. Calcem cū dico, coctam intelligo, quæ alba multū est, facile puluerabilis & friabilis & aquæ affusione ignibilis.

Cruda verò lapis est durus, ponderosus, aqua quæ nec diluitur, nec incandescit, ob id non calx absolutè, sed lapis calcarius appellatur.

In quibus autem terris Calx reperitur, in his gypsum nullum: vt in quibus gypsum, in his nullus lapis calcarius effoditur: calx ea optima est, quæ superfusa maximos strepitus edit, & ignem concipit, eaque recens & admodum cinerea, nam vetus albior est, & infirmior, quæ scilicet aër ingressus est, & imminutus est ignis.

Fit quoque calx secundum Dioscorid. ex buccinorum marinarum, cochlearum & ostreorum testis, tamdiu igni combustis, vsquedū vehementer inalbuerint.

Ex calce viua & auripigmento eximium paratur psyllothrum, quo partes hispidae facile depilantur. Pyrotica quoque ex illa fiunt, paucis adhibitis, quæ partem cui admouentur inurunt & escharam relinquunt.

Pluries aqua pluuiali aut fontana calx elota vtiliter vnguentis per- Aqua cal-
miscetur, quibus vlcera cadauerosa curantur. Aquâ extincta, & bis cis.
terve lota, si denuo in aquam proiecta abluatur, ea posterior aqua valdè conuenit vlceribus pudendorum, & alijs aliarum partium phagedænicis, cadauerosis & curatu difficillimis. Pluries enim lota mordacitatem omnem exuit, & acris esse desinit, calefacit tamen & siccatur manifestissimè; proinde vlceribus confert exsiccandis, & ad cicatricem perducendis.

De Lapidibus Spongiarum. CAPVT XV.



SPONGIÆ proximam plantis, non animantibus, habent naturam: crescunt enim augenturque, sed nō sentiunt, cōtra multorum opinionem. Earum quasdam Dioscorides mares facit tenui fistula spissa, quarum duriores tragos nominant, alias fœminas, quæ contrarias dotes habent, Aristoteles quatuor varietates earum agnoscit; alię inquit, rarę quę amplissimæ sunt aliæ spissæ, quæ mollissimæ, aliæ tenuissimæ, quæ duriores, aliæ spississimæ & validissimæ, quas Achilleas nuncupant. Quæ summis saxis

nascuntur, duriores sunt, quæ in tranquillis tractibus maris, molliores.

Nobis autem tres Spongiarum differentiarum notissimæ; prima & vulgarissima & mollissima raras & patentissimas fistulas habet, magnitudine & forma hepar humanum referens. Secunda densior & minor, duriorque, ac fistulis minoribus peruia. Tertia densissima, valida, cinerea & Alcyonio similis. Omnis sponsia fungus marinus solet vocari.

Fungus
marinus.

In Spongijs autem lapides vel concrescunt, vel aliundè appulsi stabulantur, inquit Plinius. Vtrique satis noti sunt, in omnibus enim ferè spongijs inueniuntur. Seligendi vero qui his innascuntur, quibus vis ad frangendum calculum datur. Eam tamen non adeò validam Galenus putat, ut eum qui in vesica stabulatur, lapidem comminuere valeat.


Vires.

De Lateribus. CAPUT XVI.



NON ex gemmis solùm & lapidibus, sed etiam lateribus & fractis & antiquatis, atque etiam ex solea detrita, sæpèque ex luto medicus opem largitur ægrotis. Nihil enim est qualitatis expers, quæ qualiscunque fuerit à perito & probato medico opportunè usurpata prodesse potest.

Multa autem sunt, quæ recentia efficacissimas vires habent: inueterata verò exolescunt, & qualitatem amittunt, ut medicamenta vulgaria: alia vix nisi antiquata, medicata, ut lateres, qui de nouo cocti muris tantùm ac ædibus construendis inferuiunt: veteres medicis vsibus optatissimi & efficacissimi. Hoc ex Oleo de lateribus constat: quod ad morborum multorum curationem eximijs viribus pollet, ut in Officina nostra docuimus.



SECTIO TERTIA

De Metallis.



Etallum propriè dicitur Corpus fossile, durum, malleo ductile, & igni liquabile, sed quod liquatum in pristinam formam redit. Α μεταλλόω, id est, perscrutor, nomen habet, quod illud soleant fossores intra terræ venas scrutari: vel ἀπὸ τῆς μετὰ τὰ ἄλλα ἐκπεύουσας, quod aliud, post aliud metallum fodiendo inueniatur. Nam ubicunque una cuiusdam metalli vena detegitur, non procul inuenitur alia, ut in sterili solo & montibus multis.

Lib. 3. De eorum autem materia varii variè sentiunt; Aristoteles omnium mix-
Meteor. torum quæ intra terram sunt duplicem materiam constituit, halitum & va-
cap. pore, quorum mixtione in terræ visceribus fossibilia sunt, quæ scilicet effossæ
vult. terra similia sunt, nec liquefunt, ut metallica, quorum nonnulla plus conti-
nent humidi, & facile liquantur, ut plumbum & stannum: alia ducuntur
& liquantur quidem, sed difficilius ut ferrum. Mathiolus scribit esse substan-
tiam elementarem, quæ tanto perfectius metallum efficit, quanto magis in æ-
quali proportionem tum quantitatis, tum qualitatis impensè depurata est. Paucis
Exer. Scaliger dixit esse aquam terream, Spagyrici Mercurium, ut etiam sulphur,
20. quod ex Alberr. efficiunt, dum sic ait. Prima materia metallorum est humi-
dum, unctuosum, subtile, quod est incorporatum terrestri subtili fortiter com-
mixto, ita quod plurimum utriusque, non tantum cum plurimo utriusque, sed
etiam in plurimo utriusque. Sic ut aliquid scire videantur sua insomnia enū-
tiant. Tot autem metalla quot planetas esse perhibent, septem nempe, quorum
nomen & characteres ad designanda metalla mutuuntur: Illis aurum dicitur
Sol, argentum Luna, Plumbum Saturnus, Stannum Iuppiter, ferrum Mars, Cu-
prum Venus, argentum vivum Mercurius, quod tamen propriè metallum non
est: neque enim ducitur, neque liquatur, sed aliquo modo ut potentia tantum,
metallum dici potest.

At verò reprehendit Scaliger hanc metallorum cum planetis affinitatem
& nomenclationem, quam ridiculam ostendit, nec ex planetarum numero nu-
merum planetarum esse designandum. Non solum autem metalla planetis, sed
multa fossilia signis Zodiaci voce & characteribus respondere contendunt, ut
Asphaltum tauri, auripigmentum Geminis, salem ammoniacum Cancro, ar-
senicum rubrum Virgini, vitriolum romanum Libræ, sulphur Scorpionis, alu-

men rupeum Sagittario, alumen scissile Capricorno, salem nitrum Aquario: sicque sua arcana, ut loquuntur, inuolucris quibusdam enigmaticis obtegentes, tanquam deliri mille ineptias effutiunt, quas satius est irridere quam refellere; nunc enim ad nostrum institutum tantum spectat ut ea tantum metalla, aut metallis adnata describā, quæ ad nostram Officinam necessaria dicuntur, initio à metallorum Sole ducto, quem Aurum nominant.

De Auro. CAPVT I.



AURUM metallorum rex, omnium perfectissimum & temperatissimum, & veluti Solis tincturā in vultu gerens, summum in mortale genus habet imperium. Nam aurum omnes colunt, *Aurum lex sequitur & auro venalia rura.* Auro enim puro nihil potētius: *Diphilus.* illi parent, illo fiunt omnia: quo qui destituitur, vel tanquam Elephanticus ab hominum consortio seiungitur, vel tanquam mortuus inter viuos vagatur.

Adiaphoron tamen cū sit, & pro ratione vtentis vel bonum, vel malum, si quis eo malè vtatur malorum maximè malum est. Est enim dux scelerum, vitæ pestis, rerumque ruina, & propter aurum fiunt raptus, lites, homicidia, pugnae. Si verò quis eo bene vtatur, nō solum ad vitæ subsidia, sed etiam sanitatis tutelam, intrò sumptum valde prodesse creditur. Non de Chymistarum auro potabili, vel potius esculento, loquor, plebeculam, quod mendacijs & vanis expectationibus reficit, vel potius decipit. Demus enim licet liquorem quemdam flauescens, auri liquati emulum, arte chymicaparatū, is tamen nullius est insignis in medicina vsus, tantū abest, vt Elephantiasim, hydropem antiquatum & alios morbos deploratos sanare & senectutem tardare & iuuentutem conseruare vegetam ac floridam valeat, vt ipsi iactitant. Natura siquidem auri cū longissimè distet à nostra natura, neutiquam nostræ per illam licebit instaurari, ait Scaliger. Multa enim cum sint nostræ naturæ similia, *Exer.* dem reficiendę conuenientiora: estque absurdum dicere aurum ale- 272. re & substantiam nostri corporis reparare, atque in illam ipsam mutari, sic enim qui auro vesceretur, tandem fieret aurum.

Medici igitur aurum non destruunt, vt dissoluant, & bonitatem natiuam amittendo, alienam & inutilem & sæpè noxiam inducant. Sed melius vel in tenues bracteolas, vel scobem ac in indiuidua corpuscula comminuunt, vt ad partes facilius sese valeat insinuare.

His apparatus modis vtiliter accedit ad confectionem electarij de Gemmis & pulueris lætificantis Galeni, optimęque permiscetur medicamentis cor roborātibus. Solco ego scēliciter ditioribus puel- lis scēdis coloribus detentis, pro chalybe preparato limaturam auri, cum alijs quibusdam idoneis medicamentis in forma catapotiorum & aliquando tabellarum p̄scribere.

Auri medicatæ vires multæ quidem sunt, non tamen tot ac tantæ quantas Chymiatri prædicant. Laudantur potissimum ad melâcholicos & præter naturam tristes exhilarâdos, cuicumque sit vsui, illius ipsius dotes fusissimè recensui lib. 5. cap. de Diachryso.

De Argento. CAP. II.



ST quoque argentum & anima & sanguis mortalibus. Ab auro enim omnium metallorum est præstantissimum, quod nulla vetustate rubiginem contrahit, nec deterius euadit, sed semper nitidum, splendidum ac syncerum, quod facile ducitur & liquatur. Fit in terræ visceribus ex hydrargyro mundo & candido, & ex sulphure puro, claro, firmo & albo æqualiter simul cõtemperatis. Sicque candidum & fulgens redditur, propterea quod calor sulphuris bene mundati, vt liquuntur Chymistæ, dealbat & subtilius reddit, adeoque exsiccat, vt sonorum, durum & tinnillum euadat.

Ps. II. Solum autem inter metalla splendorem videtur emittere translucentum: Sua enim in fodina, quasi lux est in tenebris, veluti rudimẽta stellarũ referens: magis tamen multo splendet purum & igne examinatum & septies repurgatum, cui connexa sunt, quæ sic Psalmista cecinit, Eloquia Domini, eloquia munda, argentum igne purgatum. A Chymiatri Lunæ comparatur, cuius nomen mutuatur, sed non qualitates æmulatur. Olim, & temporibus Salomonis, pretij nullius erat vt habetur cap. 10. lib. 3. Reg.

Auro censetur frigidius, cuius tamen vires & dignitatem quadamtenus refert, secundum perfectionis & puritatis gradum obtinens. Sua naturali complexione frigidum & humidum est temperatè, unde membris spiritualibus auxiliari creditur. Multum quoque valet ad cordis palpitationem, ipsum namque roborat & hæmatosim adiuuat, efficitque laudabiliorem. Ex arte Spagyrica oleum educitur morbis cerebri pluribus commendatum. Dogmatici tamen, seu veri medici tantum solent in medicamentis eo vti, vel in scobem, vel in tenuissimas laminas redacto, perinde vt auro. Qui secus faciunt, in labore dolus.

De Stanno. CAP. III.



TANNVM aliud metalli genus est in fodinis cum argento inuentum, quod Plinius plumbum candidum vocat ad differentiam plumbi nigri quod velut argenti, stannique quoddam purgamentum in fornace remanet. Qui Ioui sacrum faciunt stannum, id ex hydrargyro, puro, claro, & ex sulphure crasso & immundo generari dicunt.

Sunt porrò multa plumbi & stanni inter se communia ; neutrum enim rubiginem contrahit, sed potius squalorem & sordiciem quādam plus tamen plumbum, quā stannum, neutrum quoque valdè sonorum est, nec valdè durum. Plumbo tamen durius est stannum, & magis tinnulum.

Est verò stannum vel simplex & purum, ac propè defæcatū vel impurum, & ex alijs metallis compositum, quod natura, vel artificio tale redditur, cuius multæ sunt differentiæ pro rerum mixtarum ratione & diuersa earumdem proportionem. Eius autem vires rerum ex quibus componitur, mixtioni respondent.

Multis verò vsibus humanis inseruit Stannum : verū ex eo rarissimè medicamenta parantur, sed vasa sæpissimè in quibus illa ipsa reponuntur & seruantur. Audio Chymicos oleum ex Stanno parare ad vulnere & vlcerum curationem commendata, sed alia prostant medicamina & paratu facilia & vtiliora, & ad id præstandum efficaciora.

De Plumbo & Molybdæna. CAP. IV.



Μολυβδος seu plumbum, secundum Chymistas & Saturno dicatur & Saturnus dicitur, atque ex ipsorum iudicio ex hydrargyro impuro & crasso, & sulphure modico & impuro generatur. Non solum autem in terræ latibulis inclusum, sed sub dio positum crescere perhibetur, atque ideo tectæ suæ grauitate labefactare existimatur, inquit Cardanus, qui eius quatuor facit discrimina, vulgare, album, quod multi stannum appellant, Bisemutum hucusque incognitum & quod è Stibio paratur.

Plinius agnouit tantū vulgare seu nigrum, & album. Nigro duplicem originem tribuit : aut ex sua, inquit, nascitur vena, nec quicquā aliud ex se parit, aut nascitur cum argento, mixtisque venis conflatur. Primus liquor qui in fornacibus fluit, album plumbum & stannum vocatur, secundus argentum ; quod remansit Galena dicitur, & Latine plumbago, ex qua plumbum elicitur, seu Molybdæna fossilis Mathiolo dicta, seu lapis ille suo iudicio metallicus, qui plumbum & argentum continens, se varia facie pro varijs terræ vaporibus, qui ad metallicos lapides feruntur : Alia quoque est factitia Molybdæna quæ in fornacibus reperitur, in quibus ad faciliorem auri & argenti liquationem, vena plumbi, seu Galena aut Molybdæna fossilis, vel eius defectu plumbum ipsum superadditur, atque ignis vi partim cum metallis subiectis coit, partim spumæ argenti modo fornacis folio cohæret, & in Molybdænam mutatur Lithargyro vix dissimilem, qui prout magis auri, vel argenti vel plumbi conditionem retulerit, Chrysis, vel argyritis vel molybditis Plinio dicitur. cap. 6. lib. 34.

Molybdæna igitur vel fossilis est ac natua, quæ Molibdoides, seu lapis plumbarius, plumbago, & Galena multis dicitur, alia arte comparata, seu factitia, Lithargyro affinis quæ ignis & fornacum ope datur, Molybditis Plinio dicta.

Cap.
lib.5.

Ex plumbi familia nascuntur ipsius recrementum, scoria & plumbago: quæ duo priora licet pro eadem re sumantur à Dioscorid. à plumbarijs tamen edisci, recrementum plumbi esse crassum illud excrementum, vtcumque fungosum, quod à plumbo dum liquescit secedit & abijcitur. Scoria vero non æquè excrementitia est, nec similiter fit, nec similis est coloris: fit enim quando liquatum plumbum extra fornaces in scrobiculum aut canalem delabitur, in idq; concretum & adhuc calens frigida superfunditur; tunc enim scoriæ exuit densam, fractu contumacem, ad luteum colorem, & vitri splendorem accedentem. Plumbago autem nō solum materia quæ reperitur in fodinis dicitur, sed & purissimum plumbum quod ignis vstione, inquit Mathiolus, cineris speciem induit, hæc tamen opinio non omnibus probatur.

Com. in
cap. 58
lib.5.

Extrahitur quoque è gleba quadam plumbaria è fodinis eruta, quam lapidem Molybdoidem nominant. Secretum autem & liquatum plumbum, adhucque calens aqua frigida perfunditur, quousque scoriæ quamdam exuat, quam recrementum plumbi nuncupant.

Lib.2.

Instit.

cap. de

vstion.

cap. de

tri-

tura.

Ad vsum autem medendi ex plumbo fiunt mortaria & pistilli, nec non turundæ fistulosæ canulatas dicunt, internis & profundis vlcibus dicatæ, quæ alijs quibusvis etiam aureis æquè sunt efficaces.

Paratur quoque pulvis è plumbo ad vlcerum exsiccationem commendatissimus, de quo mentionem alibi fecimus.

Est autem plumbum refrigeratoriæ facultatis, ait Galenus, Ipsūque Chironijs, quæ vocant, vlcibus & cancrōsis & putredinosis, tum ipsum per se, tum quibusdam alijs permistum cōuenit. Enotum verò vt etiam vstum vires habet commendatitias. Abluendi & vrēdi modum, & qualitates & effectus docet Dioscorid. Ex plumbi adhuc laminis cerusa fit, de qua mox agetur.

Vires.

De Ære. CAPVT V.



Es Veneri dicatum, ab insula Cyprio in qua laudabile & copiosum eruitur, Cuprum vulgò dictum, vel aurei coloris est, ob id à multis Aurichalcum dictum, vel ad rubedinem accedit, & absolutè æs dicitur: quod apud veteres magis fuit in vfu, quàm aurum, vel argentum, vel ferrum: Nam prima hominibus moneta fuit ex ære, vnde ærarium publicum, vnde æs alienum, & quæstor ærarius. Itemque bellatorum arma olim non ex ferro, sed ex ære fuerunt, vt etiam statuæ & templorum valuæ.

In Pharmacopolijs autem hæc passim occurrunt, Æs vstum, flos æris, squama æris & ærugo, sed quæ singula sint, omnes lectionis Pharmaceuticæ studiosi non certò dignoscunt. Æs vstum, inquit Dioscorid. fit è clavis solutarum nauium, fictili crudo compositis, susperfo sulphure cū sale pari. Omnib. vicissim inspersis, fictile circū-

lito creta singulari spiramēto, fornacib⁹ inditur, donec percoquatur.

Flos æris.

Astringit, exsiccat, reprimat, extenuat, attrahit, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit, vitia oculorum emendat. Dioscorid.

Flos æris
excussilis.

Flos æris fit, cūm fornacibus æs fusum in receptacula delabatur per colla fistularum ad ea pertinentium. Et antequam coëat in massam duram super ipsum adhuc ignitum aqua frigida infunditur: Tū siquidem repentino cōcretu ac densatione velut expuitur & erumpit flos antedictus. Vapor quoque concrefcens delabatur granulis milio proximis ac rubidis, quæ pro flore æris habētur: vterque multis flos æris excussilis dicitur, vt ærugo rasilis, cuius lectio sequenti capite datur.

Baritura æris.

Squama verò seu Baritura æris fit, dum id malleis percutitur; Præstantior est ea quæ ex quo clauis fiunt excutitur, Helitis propriè dicta, omnium deterrima quæ ex vili, promiscuoque ære, aut candido habetur. Astringit, extenuat, reprimat, erodit, nomas coërcet, & vlcera ad cicatricem perducit.

Vires.

De Æruginē. CAP. VI.



ERUGO viride æris vulgo dicta, non tantūm pictoribus inseruit, sed etiam medicis, qui eam multis medicamentis permiscunt, curandis vlceribus dicatis, cuiusmodi est medicamentum, Galeno Lite dictum, atque alia multa quæ ipse describit lib. 2. comp. med. gener. vt & vnguentum Aegyptiacum Mesuēi.

Est autem ærugo, non quidem æris flos, vt putarunt nonnulli, sed quædam veluti rasura viridis, quæ illius laminis aceti vapore madidis effloruit. Vnde rasilis flos æris dici solet.

Eius duæ traduntur à Dioscor. varietates, vna vulgaris simpliciter ærugo dicta, altera Scolecia, seu in vermiculorum speciem effigata. Eaque duplex, fossilis vna, & altera factitia. Vtraque autem rarissima; altera enim non quæritur aut quæsita non reperitur; altera non preparatur.

Æris præparandi
modus.

Vulgaris autem copiosa est, & venalis vbique reperitur, & multis preparatur modis, quorum vñtior est, qui sic fit.

In dolium aut aliud vas satis amplum acetum acerrimum infunditur, vas æneum & inuersum superponitur, præsertim concameratum: Si id planum fuerit, ita obstruatur, vt nullum habeat spiraculum: post decem dies exēpto operculo, insidens ei ærugo deradetur.

Hoc adhuc modo vñtatissimo habetur. Æris lamina vna aut altera in dolio acetum continente ita suspenditur, vt acetum non attingat, & elapsis postea diebus adnata ærugo deraditur. Quinetiam ex laminis hisdem aceto maceratis haberi potest ærugo.

Qualitatem

Qualitatem habet acrem, digerentem, attrahentem & liquantem carnem non modò teneram, sed etiam duram. Non tantùm verò gustum mordicat ærugo, sed ipsa etiam vlcera. Quod si eius pauculum cerato non pauco admiscueris, id quod ex ambobus erit mixtum citra morsum extergit. Falluntur autem multi in multis compositionibus, quibus non rectè sarcoticam, aut epuloticam facultatem ascribunt, vt pote, cum ipsa id præstare nequeant, verùm ea, quæ ex ipsis composita sunt. Galen.

De Ferro. CAP. VII.



FERRO vix quicquam communius, vixque aliquid & vtilius & nocentius. Neque enim ædícula aut stabulum, nec nauicula, neque quæ ad hominis vestitum & alimentum spectant, sine ferro fieri, aut haberi, aut parari queunt. Nullus siquidem labor suscipitur, nullum opus absoluitur sine ferri adiutu. Omnes enim artifices ferreo quodam instrumento, vt agant, opus habent. Omnia specialius nolo persequi, cùm satis etiam rusticis innotescant.

Ex eo autem non solùm vomer, ferra, securis, falx, forfex & acus, sed & enses, hastæ, iacula, sagittæ & bombardarum globi, quibus non tantùm ciuium ædes, sed ciuitates & propugnacula ruunt, homines enecantur & mille cædes perpetrantur. Quod agrè ferens Plinius, Ferro, inquit, vtimur, non cominùs solùm, sed etiam missili volucrique, nunc tormentis excusso, nunc balistis, nunc verò pennato: vt ocyus enim mors ad hominem perueniat, alitem illam facit, & pennas ferro tribuit.

Quid si vidisset Plinius Bombardas, seu tormenta bellica, quibus nunc non modo vrbium mœnia, sed montes & saxa ruunt, & dimouentur.

Ferrum autem tot malorum causa non est, sed humani fraudis ingenij sceleratissima, quæ pessimè ferro vtitur, quod ex se malum haudquaquam iudicandum. Ex eo enim abscessus seu vomica aperitur, sanguis putridus in venis educitur, Empyematis purulenta sanies extra thoracem elicitur, ossium fragmenta, aut aliæ res cerebro molestæ extra caluariam ducuntur, confecti carie dentes euelluntur, vlcerum cadauerosa caro tollitur, membrum putre ne in consortium totum trahat abscinditur. Quid plura? ferro vix vita, immo nullo modo carere potest, alioquin pro domibus speluncæ vnguibus effodiendæ, & belluarum more victitandum.

Ferrum ex se minimè malum.

Sunt autem ferri duo genera, vnum generis nomen retinens; absolutè ferrum dicitur, alterum quod magis defecatum, chalybem, & ab acie quam gladijs ex eo factis præbet, Acierum vulgus Gallo.

rum nominat. Illud rursus duplici discrimine agnoscitur, vnum enim est, quod & liquefcit & ducitur, ex quo nempe multa fiunt instrumenta rustica. Aliud quod liquefcit quidem, sed non ducitur, & facile frangitur, ex quo fiunt lebetes fusiles, & alia multa ad vsum culinarum. Post id operis, non inutile est, vt credit Scaliger, denuo enim funditur, vt etiam alterum, quod ipse scripsit tantum mollescere: vtrūque enim ignis vi ardentissimi liquari vidimus. Sūtque nonnulli Lutetiæ qui ferrearum ollarum fragmenta quæritant & emunt, quæ ad fornaces denuo liquanda conuehunt.

Chalybs.

Chalybs autem à multis dicitur ferrum accuratè defæcatum, multique ex eo illum efficere iactitant. A Chalybone oppido Assyriæ, vel quadam Ponti regione nomen habet. Laudatur omnium maximè Damascus, Gladij enim Damasceni etiam ferrum scindunt.

Ex chalybis scobe paratur puluis, quem Chymiatrī Crocum Martis vocitant. Verum scobs ferri vt decet apparatus, æquè valere comperitur. De vtroque in Officina disseruimus.

Vt autem ex ære sit ærugo, sic ex ferro ferrugo, quæ ipsius rubigo est, à qua velut in vindictam, quod sanguinem effundat humanum, eroditur & absumitur, & ferrum omne hominis cruore tinctum quam mox rubiginem contrahit.

Scoria ferri.

Eructat adhuc quoddam excrementum, quod modò scoriam, modò squamam, modò recrementum, modò sterCUS ferri nuncupant. Squama tamen seu batitura magis propriè dicitur, quæ è ferro dum malleis percutitur, excutitur, recrementum siue sterCUS quando tantum ignitur, expuitur.

Est verò ferrum & chalybs idem metallum; verum hic purior habetur: Est enim ferrum purius redditum: hinc magis refrigerat & siccatur: ferrum magis calfacit & aperit, quia sulphureis partibus instructum, quas amittit, dum in chalybem vertitur.

Vtriusque vires nonnulli ad fastidium vsque laudibus euehunt, *Cap. dedia-* quas tamen non tanti duco, nec quoque sperno. Quanti verò sint *stomo.* faciendæ, fusiùs lib. docuimus §. vbi vtriusque apparatus, & vsum dedimus. Nisi enim debite præparentur, infœliciter vsurpantur.

Rubiginem ferri curandis vlceribus conferre asseuerant, eaque Telephum Mysiorum Regem ab Achille sauciatur, sanatum scribunt: Ea enim vt & scoria stringit & siccatur; vnde emplastris quibusdam exsiccatoriæ facultatis permiscetur.

Vires.

Ferrum autem omne vim habet roborantem, atque ex eo aquæ quædam Normanæ, Forgenfes vocat, medicatas & eximias vires mutuantur. Ad lienis affectus commendatissimas. De ferri, chalybisque viribus satis superque diximus lib. §. instituit. nostrarum cap. de diastomo.

De Septimo metallo. CAP. VIII.



SEPTIMUM metallum nonnulli dicunt esse Mercurium, alij Electrum, neutrum tamen verè metallum est, nisi potentia tantum tale argentum viuum dixeris. Verius metallum dici videtur Stibium, alterum insigne Chymistarum Idolum, vnicum Empyricorum Catharticum, quo omne morbi genus expugnare iactitant, sed alijs aluum susque deque mouendo anxie perturbant, alios hypercatharsi semper molesta miserè lacerant, nonnullos interimunt, paucos sanitati restitunt.

Corn.
Gem-
malib.
de di-
uin.
nat.
chara-
cte.

Medicus Anglus ex Paracelsitico genere, alioqui in arte Chymica valde insignis, inquit Louanienſis Medicus, febre quadam detentus, vnà cum vxore, tum huic, tum sibi porrexit antimonium præparatum, vt vocant. Illa quidem celeriter in maniam fortissimam versa, vitam cum morte commutauit: Hic autem primo conquestus insomnia, vigiliasque continuas à deiectione non pauca ante septimum diem in delirium venit: A delirio statim factus est epilepticus: Ex epilepsia in coma Lethargicum incidit, cui quid apoplecticum misceretur. Eo sopore detentus triduum rursus ad insaniam rediit, horrendoque furore agitatus, non multò post expirauit, & à communi lecto communem vxori tumultum est ingressus.

Historia
memoran-
da.

A multis tamen tanto artificio præparatur antimonium, vt opportunè datum miros effectus producit. Ex eo enim fit eximium quoddam sudorificum, quod nulli cedit. Nec improbandus est omnino puluis ille, què Stibij florè appellitât, qui à peritis artificibus paratus & à doctis exhibitus, sæpe mirum in modum prodest. Huius parandi modum & exhibendi consuetudinem veri medici solent aspernari, quòd alia multò præstantiora habeant medicamenta, quibus morbis quibuslibet medentur securius.

De Cerusa. CAP. IX.



UT ferrum ferruginem, æs æruginem, sic plumbum plumbaginem quamdam eructat, quam alij cerusam, alij plumbi florem, alij ex Galeno psymnithion nominant.

Licet autem Cerusa aceti beneficio erumpat, sicut & ærugo, non tamen vt ea viridis est, sed albiſſima, vnde pictores, quibus inſeruit frequentissimè, album plumbi vocitant. Fit autem ad hunc vel similem modum.

Infunditur acetum acerrimum æstate in vrceum oris lati, aut aliud

fiatile vas idoneum: Superponitur Lamina plumbea: Ita operitur vas ut nihil expiret: vbi lamina fuerit resoluta, ut decimo die, & aliquando citius, aliquando tardius contingere solet, & deciderit crassamentum in fundum vasis, colligendum & siccandum; mox trusitili mola terendum, cribrandum, deinde in massam, aut pastillos cum paucis aceto cogendum & seruandum.

Fit adhuc ex scobe plumbi in acetum perquam acerrimum decem dies immersa & resoluta. Aliquando etiam ex laminis eiusdem infusis & derasis, iterumque maceratis & adhuc derasis. Atque hoc denuò repetito, donec laminæ sint resolutæ: Tum colligitur rasura, teritur, cribratur, cum aceto cogitur.

Albissimam autem cerusam non modò pictores exoptant, sed & mulieres ad faciem fucandam, eius tamen indebito vñu dentes nigrescunt, carie eroduntur, & oris foetura nascitur. Laudatissima est Rhodiaca, vel illi similis, quæ nunc Puteolis dicitur.

Torretur porro cerusa fictili nouo, prunis flagrantibus, & vñtione colorem rubrum acquirit, fitque non quidem Sandaracha, ut quidam malè putarunt, sed Sandix, quæ Minium quoddam artificiale est, de quo supra mentionem fecimus.

Antequam autem cerusa in emplastrorum, vñguentorum & Collyriorum veniat compositionem, debet præparari, hoc est, ablui, ut mediocriter desiccet & astringat, sine aliqua mordicatione, in liquore conueniente, ut aqua interdum simplici, sæpe rosacea hoc modo.

Cerusæ
præparatio.

Cerusæ quantitas idonea sumitur, in mortario lapideo cum pistillo ligneo teritur: dein aqua affunditur, agitur: tum quiescere permittitur: Vbi in pilæ fundo cerusa quieuerit, aqua abiicitur. Rursus alia affunditur, agitur, residere crassamentum finitur: aqua, ut antè, eiicitur, atque denuò noua immittitur: idque toties iteratur, donec aqua vltimò affusa & agitata, pura & clara, & fordinis omnis expers appareat.

His ritè peractis, cerusa super porphyrio læuiganda, siccanda, atque rursus terenda, cum aqua rosarum in pastillos fingenda, & ad futuros vsus reponenda. Sunt qui aceto terunt, & subigunt in massam: alij alio liquore intentioni accommodato.

Vires.

Cerusa refrigerat, siccatur, astringit, extenuat, explet, excrefcentia leniter reprimat, & ad cicatricem perducit. Per os autem non sumitur, nisi periculosè.

De Cadmia utraque, factitia & fossili. CAP. X.



CADMIA, Climia Arabibus dicta, vel fossilis est, ac natiua, quæ lapis Calaminaris, vel cadmia lapidosa, & æraria nuncupatur. Ea enim artifices vtuntur ad efficiendum æs luteum, quod Officinæ Aurichalcum & Orichalcum, vulgus Lethonem nominat, vel factitia, quæ fit in metallis, vbi æs, cuprum & argentum coquitur, Gal. cap. 44. lib. simp.

Natiua autem reperitur sæpius in metallorum fodinis, licet eorum sit expers. Subflauus est lapis, admodum durus, luteum, dum accenditur, colorem eructans. Non accensus autem bicolor apparet, videturque is esse lapis, quem Albertus Didachon, seu Dæmonis lapidem vocat. Aliquando in rimulis Cypri & torrentibus inuenitur lapis Calaminaris, qui quod vnicolor non sit, à quibusdam Iris gemma vocatur, de qua superius. Reuera tamen nec Iris, nec Didachos est.

Cadmia
fossilis.

Lapis cala-
minaris.

Cadmia verò factitia corpus est dense concretum ex Fuligine æris liquati in fornacibus, egesta flatu, & lateribus, camerisque fornacū inhærente. At si non terram, sed lapidem, inquit Galenus, nuncupare volueris, ex quo in fornacibus secernendo, partim fit æs, partim Cadmia, partim Diphryges, nihil sanè retulerit. Quin & ex Pyrite lapide in fornacibus vsto fit Cadmia.

Cap.
38. lib.
9. sim-
pl.

Sunt autem Cadmiæ factitiæ quinque varietates, prima dicitur Capnitis, quæ in ipso fornacum ore reperitur: Estque tenuissima, exusta & nimia tenuitate similis fauillæ. Secunda est Ostracitis, quæ magna ex parte nigra est, testaceamque faciem habet, & grauitatem maiorem: ob id in terram & infimam partem fornacis, seu in pavementum delabitur, omniumque sordidissima est, & spodos seu spodium Galeno dicitur, de quo mox plura dicemus. Tertia & quarta in media fornacis parte reperiuntur, Placitis nempe & Botrytis. Placitis, seu Placodes, quasi crustosa est, & segmentis quasi zonis quibusdam cincta, quæ minùs ponderosa est & lateribus fornacis adhærescit. Sub hac onichitis comprehenditur. Botrytis, hoc est, racemosa, modicè grauis est, facie & colore spodii, quæ fracta cinerulenta est, & æruginosa. In editiore fornacis parte, quam placodes coacta reperitur & colligitur.

Capnitis.

Ostracitis.

Spodos.

Placitis.

Quinta est velut æris liquati tenuior fuligo, quæ superiori parti fornacis adhærescit, de qua post fusius.

Omnis autem Cadmia in Cypri fornacibus optima & maximè vti ex eo lapide fit, quem dignitate quadam Cadmiam nominant. Fit quidem etiam in fornacibus argenti candidior, ac minus ponderosa, sed comparanda nunquam ærariæ.

Cadmia leniter desiccat, abstergit & vlcera humida, & putrescētia

adiuuat, & ad cicatricem ducit. In caliditatis autem & frigiditatis differentia, temperata dicitur Galeno, quòd neutrum insigniter efficiat.

De Spodio. CAP. XI.



Nihil tam frequenter inculcatur in pharmacopolijs, vel potius auditur, nihilque minus intelligitur, quàm Spodium, quòd omnes quotquot nouerim, pharmacopœi duplex constituent, vnum Græcorum, & Arabum aliud; atque vtrumque vt idem nomine, sic re & natura longè diuersum. Sed vt liberè dicam, Spodium nullum Arabicum, nisi fictitium, vt alibi docuimus, moxque docebitur.

Spodium Græcorum, quòd vnicum est, in æris fornacibus inuenitur, vbi Pompholix, cui congener est, ac consociale, fitque tum, cum fauillæ è metallo, dum coquitur, emicantes, sursum ascendunt, & propter grauitatem in terram, seu pauimentum delabuntur: Simul enim vt refrigerantur, sordibus commiscentur, Hinc concretus ex hisdem fauillis glomusculus, spurcitia quadam inquinatus, Spodiũ Græcorum dicitur, cuius tantũ est vsus ad externos affectus.

Spodium Auicennæ & reliquorum Arabum, si quòd sit, ex materia fit multũ dissimili, ex cannæ videlicet radicibus tantũ vstis: quibus tot ac tam eximias dotes tribuit Auicenna, vt mirari subit nimiam hominis credulitatem, aut in scribendo simplicitatem. A 917. *cr*
ratione siquidem alienum est, eiusmodi radicem vstam, sibi spodiũ *Cap.*
dictam, cor recreare, animi deliquio prodesse, siti, inflammationi 2. *lib. 2.*
stomachi, tremori, melancholiæ, & alijs affectibus multis ab eo enumeratis conferre.

Demus autem Arabicum hoc spodium hæc omnia recensita præstare, attamen non debet præscribi, quia nondum ad nos est delatũ. Eius verò loco nimis oscitanter pharmacopœi Ebur vstum substituant, Spodiumque imperitè nominant; cum potius sit Anispodium, velut id ipsum, quòd sit, frondibus ficulneis, myrtheis, & rebus alijs concrematis, de quibus plura dicit Dioscorides.

Vt verò crudum Ebur viribus & natura multũ dissidet à canis crudis, sic & illud vstum ab ipsis vstis. Crudum enim ebur præstantius est seipso concremato ac vsto.

Cum igitur Spodium Arabicum non habeatur, nec si haberetur, viribus ab Auicenna enumeratis nequaquam est insignitum, neque analogum datur illi antiballomenon, seu substitutum, ex remediorum formulis expungendum, cum verè vnicum tantũ sit Spodiũ, Græcorum nempe, quòd per os nec solet, nec debet assumi.

Est autem in Barbaræ linguę interpretes reiiciendus error, qui pro *Tabaxir* Arabum, seu *Trasir* Indorum spodium verterunt. Est

verò *Tabaxir* Persica vox secundum Garciam quæ lacteum humorem seu liquorem aut succū dulcem signat, à Barbaris *sacar mambu*, dictum. Gignitur in arundinibus vel potius arboribus adeò magnis ut ex earum trunco cymbas multas faciant, quæ singulæ inter duo internodia tantum excauatæ duos viros admittere queat, in quibus Indi vecti celeriter nauigant, & à Crocodilis tuti sunt.

Succus porro earum arborum admodum niger ac cinereus *Tabaxir* est, quem non solum ineptè *Spodium* dixerunt, sed & cineres earundem vstarum eodem nomine donarunt. Cum *Antispodium* fiat ex cineribus, secundum Dioscorid. possunt quidē cineres canna-
rum *Antispodium* dici, & *Spodij* Græcorum defectu substitui, nunquam autem per os sumi. Ergo cum *Tabaxir* non detur, ex quo iniquè *Spodium* quoddam fictitium detorserunt, & ridiculè *Ebur* pro illo vsserunt, vnicum tantum *Spodium*, Græcorum videlicet, admittendum; quod *Cadmia* factitiæ species est, ut etiam *Pompholix*, cuius nunc suspicitur inquisitio.

Antispodium.

De Pompholige. CAP. XII.



POMPHOLIX tenuissima & volatilis est fauilla, quæ dum æs in fornacibus perficitur, in altum euolat, & supernæ earum parti adhærescit. In principio cum fit, velut in bullas prodit, aut glomusculos vellerum similes coit, & farinæ modo contacta dispergitur. Est enim veluti candidus cinis, & usque adeo levis, ut in sublime facile feratur, & farinæ volatilis ritu superiori fornacum tecto hæreat. Ea dum propter leuitatem sursum effertur, alia propter grauitatem in pavementum recidit, quæ *Spodos* est, de quo supra, fiuntque simul ambo in eadem fornace, atque tantam habent inter se cognationem, ut vnius defectus, alterius vice poterit facile suppleri.

Pompholix à *Seplasiarijs* quibusdam vocatur *Nil*, & aliquando *nibili*, ab alijs *bullæ Cadmica*, à Mauritanis *Tuthia*; cuius duas nonnulli tradunt varietates, vna subpinguis est, quæ ad æris colorem vergit, altera magnopere candida & leuitatem summam nacta, minus laudata: nam optima creditur *Cypria*, inquit *Dioscorides*, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore cœni horrido.

Diosc.
lib. 5.
cap. 85.

Antequam autem in usum veniat solet præparari, hoc est ablui, hoc modo. *Pompholix* linteolo modicè raro excepta & ligata in vase aqua limpida, pluuiali aut fontana pleno huc illuc ducitur & tribulatur, ut eius utilior & tenuior pars in aquam effluat, impurior, & magis excrementosa atque inutilior in linteo remaneat. Residere permittitur, & aqua effunditur, atque alia denuò affusa, idem opus repetitur, donec in linteolo nihil utile maneat. Alij multi sunt

Tutix præparatio.

eius abluendæ modi, quos Dioscorides fusissimè describit.

Vires.

Pompholix medicamentorum propè omnium, quæ citra morsum *Gal. 9.*
desiccant, præstantissima: ob id ad vlcera cancrofa & alia maligna, *simpl.*
& oculorum fluxiones efficacissima.

De Lythargyro. CAP. XIII.



LYTHARGYRVS, seu Lythargyrium, est metallo-
rum se igni purgatorum velut spuma: vel est fæx
tenuior argenti à plumbagine repurgati, visfollium
excussa & expulsa. Licet autem eius materia mul-
tiplex sit, quam alij plumbum, alij argentum, alij
aurum, alij Galenam dicunt, à plumbo tamen ferè
solo suam ducit originem, quod argenti recrementis commixtum
& igni liquatum, ac excoctum tandem secernitur. Omnia enim
argenti recremèta facilè per ignem secernuntur, quæ si fuerint plu-
bea, vt esse solent, vel ærea coctione in lythargyrum vertuntur: qui
vbi refrigit nonnunquam aureus, nonnunquam argenteus apparet,
pro coctionis breuitate aut diuturnitate.

Qui aureum colorem ementitur, modò Chrystitis, modò Celau-
ritis nominatur, qui argenteum, Argyritis: Non quod tamen hic ar-
gentum contineat, aut ille aurum, sed quia alteruter vel magis, vel
minùs fuerit excoctus, vel plus ærei, vel argentei vaporis ab argento
detraçti, intra se receperit.

Fit enim potissimum lythargyrus in fornacibus, in quibus repur-
gatur argentum è plumbo argenti recrementis admisto: vnde po-
tius ab argento, quam auro, aut aliis metallis nomen habet, lythar-
gyrus enim quasi lapidem argenteum portendit.

Omnis ergo lythargyrus, argenti quædam est soboles, nec qui au-
ri modo flauet ab auro proficiscitur, vt putarunt nonnulli; licet ab
eo cognomen sortitum, lythargyrus auri dicatur. Gradus enim &
intensio caloris non modo colorem mutat, sed calorem sæpè inten-
dit, aut minuit, & nomen variat. Sic Diphryges, quasi bis coctum,
aut tostum dicitur, quod æris perfecti veluti fæx est subsidens, & imè
fornacum parti cohærens, tanquam vstorum in foco lignorū cinis.
Ablato ære visitur post aque frigidæ affusionem. Acre est, vt æs vstū
vehementer siccet, vlcera rebellia sanat. Duobus alijs adhuc modis
fit secundum Dioscoridem & Plinium.

Præter autem duas lythargyri differentias, quas Dioscorides pro
vnica tantum vsurpat, alias adhuc duas recenset, nempe molybdi-
tin, quæ fit in fornacibus ex arena, donec perfectè igni incan-
descat, & præterea alteram quæ fit ex plumbeis laminis, quæ omniū
est vsitatissima, quia frequentissima.

Omnibus autem præfertur Chrystitis, solet tamen à plumbo &
scoria

scoria repurgari, priusquam medicamento cuiusdam ingrediatur compositionem. Ex Dioscoride vritur & lauatur, vt Cadmia. Nunc verò tantùm tenuissimè laeuigatur in mortario, aqua desuper limpidissima affunditur & agitur. Dein in aliud vas conicitur. Tum alia affunditur & agitur, & vbi turbida fuerit, ad præcedentem adiungitur : Idque toties iteratur, donec plumbum & faeces in mortario subsidant, & omnis substantia tenuior cum aqua fuerit educta, quæ quiescere permittitur, vt in fundo remaneat lithargyrus solus ac syncerus, qui aqua prius effusa, colligendus & super marmore ita laeuigandus, vt nulla eius in lingua asperitas percipiatur.

Lithargyrus refrigerat, astringit, reprimit, occludit, caua explet, ex-terget, ad cicatricem ducit, & ad femorum interrigines valet.

Finis Libri secundi.





D E MATERIA MEDICA. LIBER TERTIVS.

*De Medicamentis ex animalibus integris, aut eorum
partibus sumptis.*

P R Æ F A T I O.



Animalia
animalibus
medentur.

ATVRA rerum mater optima nihil imperfectum, aut frustraneum vnquam agens, plantas animalium gratia, & animalia cum plantis in hominis fauorem ipsius produxit: Mansueta quidem propter ipsius alimoniam & aliam vtilitatem, fera, & si non omnia, illorum tamen plurima propter cibum, & alia adiumenta, vt medicamenta & indumenta. Propter victum alia alijs insidiantur, vt minoribus maiora, quæ quod a se grandioribus tuta non sint, solerter cauēt. Muscas enim venatur & vorat aranea, araneam lacerta, lacertam pauogallus, homo pauogallū, lupus hominē, lupum canis, canē interdū lupus. Omnia verò homini inserviunt, & vsum aliquē præstant. Nullū siquidē est adeò putidū insectū, ex quo quamdā sibi non vendicet vtilitatē. Sæpē autē ex imperfectis & intēperatis quæritat medicinā, ex perfectioribus & tēperatis alimentum & medicamentum, ex quibus nunc vngues assumit & cornua, nūc pilos & excrementa, nunc sanguinē, carnem & medullas, nunc coagulum, testes & ossa. Animalium porro quædam alijs medentur, vt visis formicæ, has siquidem illi ad famem explēdam non ingerūt; Alia malis ab eo inflictis, vt scorpiones vulneribus ab hisdem illatis; Alia alijs etiam sui generis, atque etiam sibiipsis, nam canis sauciatus plagam lambendo deterget, siccet, & ad cicatricē ducendo sanat, & mumia, sanguis & axungia hominis, homini sanando sæpē conducunt; Nam vt calor manus ad ventriculum admota familiaritate quadam eius robur firmat & coctionem iuuat, sic agungia

hominis, parti cui piam imbecillæ adhibita eam roborat, & vi discul-
foria excrementitios humores resoluit. Vix tamen, vt liberè di-
cam, ex humano cadauere medicam materiam soleo mutua-
ri cùm tota tellus infinitis alijs medicamentis scatcat, quæ viri-
bus eximijs nobilitantur, quasque præstat ad vsum medendi
vsurpare, quam ad hominis carnificinam confugiendo inefficacio-
res perquirere. ne tamen quid huic posteriori libro desit, in quo me-
dicamenta ex animalibus integris, vel eorum partibus sumpta def-
cibuntur. De sanguine humano, & Mumia breuiter aliquid pro-
feremus.

De Sanguine humano. CAP. I.



HYMISTÆ ex sanguine hominis oleum educunt, &
aquam stillatitiam, Dogmatici ferè tantùm vsurpant ad
emplastrum enterocelę dicatum. Cuius loco suillus re-
ctè consilio Galeni substitui potest, Sanguis suillus, in-
quit, ad sanguinẽ humanum maxime accedit, itaut quis-
quis humanum sanguinem alicui morbo vtilem esse ait, id in suillo
comprobet.

Est autem sanguis naturæ thesaurus, iecoris *ἀναλόρεως* primi organi
calore, ex puriore chyli portione, in maioribus venis genitus, per
quas tanquam per tubos ad singulas partes corporis alendas defer-
tur, in illisque quandiu continetur liquidus est, & ruber extra effu-
sus citissimè concrescit; Damarum tamẽ & ceruorum sanguis, quod
fibris careat, coitu firmo non concrescit, sed fluido, instar lactis, nam
sanguis omnis non concrescit, fibris adeptis, inquit Hippo-
crates.

Sanguis autem, cum totius corporis sit materia, ex Philosopho, in
homine qui regula est omnium viuentium, tenuis & syncerus est,
calidus & humidus, & succorum optimus. Non tamen simplex hu-
mor, sed pituitæ & vtriusque bilis est particeps: Ob id Hippocrates
quatuor humores materiam esse generãdo homini tradidit, ait Gal.
Sanguis igitur humor est ex temperata chyli parte, in hepate geni-
tus, substantia, & omnibus qualitatibus mediocris rubeus colore,
dulcis sapore, in venis & arterijs naturaliter contentus, vt in partes
omnes digeratur. Quemadmodum enim de vno fonte, & vna ori-
gine aqua riuus multis deducitur, alijque ab alijs ductus excipiunt,
quousque humor in omnes partes deueniat, sic natura sanguinem
per totum corpus censuit deriuandum, cùm is omnium materia sit.
Non est vero sanguis agrotorum, aut cuiuslibet intemperati viri
colligendus & seruandus in Officinis ad emplastri dicti cōfecturam,
sed è bene temperato & minimè morbofo homine, si fieri possit ha-
bendus, velut ex his, quibus iudicis statuto caput truncatur. Sic enim
venis simul & arteriis sectis, promiscuè sanguis arteriolus & veno-
sus colligitur qui statim grumescit.

De materia
corporis.

Sanguis
quid.

Neque tamen sanguis hic, neque alius animalis magni ducendus est ad emplastrorū astringentium confectiōem, quod is siccatus & asseruatus, vix quicquam naturæ bonitatis retineat, nec vllam qualitatem astrictoriam, aut aliam acquisititiam insignem assumat.

De Mumia. CAPVT II.



MUMIA Rhasi & Auicennæ vox Arabica est, Pissaphaltum indicans. Isaac Perficam esse dicit, quæ liquamen quoddam in sepulchris inuentum notat, in quibus hominum cadauera aromatis cōdita multos annos seruata fuere. Abs quodam dicta est Cereops, ratione mihi prorsus ignota, nisi forsan, ceræ quod habeat consistentiam: *Mum* enim Persis cera est: Olim tamen erat liquidior.

Cur Aegyptij corpora condiebant.

Reperiebatur tantū in regum & heroum Ægyptiorum sepulchris, qui quamdam futuræ resurrectionis cognitionem habentes, vt humanum corpus diutissimè sine corruptela seruarent, myrrha, cinnamomo, aloë, alijsque pluribus aromatis condiebant.

Multos autem post annos, cū per bella milites omnia deuastarent, sepulchra funditus euertentes, in quorundam feretris, liquorem quemdam mellaginis instar spissum, odoratum, nec insuauem inuenerunt: quem cū Ægyptij medici ac Philosophi, probabilissima ratione fulti, eximiis pollere viribus arbitrarentur, ad quorundam affectuum curationem valere crediderunt, & dederunt, nec eos fefellit euentus. Multos siquidem sanitati illius vsu restituerunt.

Qua propter hac experientia facti audaciores hanc condituram in aliorum præsertim magnatum sepulchris quæsierunt: quibus inuersis & exhaustis, sic enim sequebant in mortuos, tādē ad virorum infimæ sortis tumulos manus iniecerunt. In quibus licet multo deterius liquamen, cadauerosam nempe saniem inuenirent, eam ipsam tamen assumebant, Mumiam appellabant, & ægrotis dabant.

Sic ita huius inualuit vsus, vt multorum corpora seu peste, aut lue Indica, vel elephantiasi, aut pfora mortuorum, sale & alumine conspersa fuerunt, è quibus post aliquot menses, sanies putris decidens pro Mumia habita & emptā sit. Et quod mirum est, multi multorum in Arabiæ desertæ medijs arenis suffocatorum & exsiccatōrum cadauera Mumiam vocitant, & horrendum dictu, per os assumenda tradunt.

Inepta de Mumia quorundam opinio.

In eoque multi sunt adhuc errore, vt mumia tantum sit cadauerosa ac putris caro corporis cuiusdam corrupti. Meminique vidisse doctum quemdam virum, sed in re medicamentaria non satis versatum, qui cū in cœtu quodam clarissimorum virorum de Mumia sermo haberetur, qui nullam nunc veram haberi contenderent, dicerentque hanc ipsam, quæ nunc circumfertur, tabum quoddam es-

se, seu illiuiem fœtidam, potius quàm antiquorum Ægyptiorum regum, à multis annis conditorum in sepulcris liquamen, quod non modo suauiter fragrabat, sed eximiis pollebat viribus: Imò respondit ille, mumia corporum est exsiccatorum caro, nuperque vidi eam exsiccata adhuc costæ inherescentem.

Sic impia credulorum animis inhæsit opinio, qui ex hominis carnificina virus quoddam tetrum, olidumque colligentes, nefaria consuetudine à perditis viris introducta ægrotis exhibent. Tantùm enim abest, vt Ægyptiorum antiquorum habeamus mumiam, quæ Mumia antiquorum nunc nulla. paucissima fuit, breuique desit, cùm ne quidem Auicennæ mumia, quæ ex sanie humana pissaphalto mixta, constabat, nobis suppetat, sed tantùm expressus putridi cadaueris succus inspissatus, qui nunc magno mortalium damno, in Pharmacopoliis seruatur, quem periti ac prudentes viri nunquam ad medicum adducent vsum. Absurdum enim est dicere Mumiam eiusmodi his prodesse qui ex alto ceciderunt; Quin potiùs his obesse, atque aliis omnibus qui ea sint vsuri sit credibilius. Quibus enim veremur, ne ob casum, aut ictum sanguis grumescat, conducibilius est poscam, aut oxymel, aut aliud incidens medicamentum exhibere.

Cùm autem nulla Officinæ nostræ composita medicamenta axungiam humanam excipiant, de ea fusiùs nihil.

De sanguine Hirci. CAPVT III.



HIRCUS vel peregrinus est, ac cornutus, vt Æthiopicus, & Creticus, vel nostras seu nostra in regione natus, qui aliquando cornibus exultat, aliquando hisdem mutus est. Vtriusque sanguis, vt docuimus in Officina, apparatus plurimùm ad calculos atterendos valere creditur, estque basis eius eximiæ confectionis, quam Lithon tripticon vocauimus, ad cuius commentarium illius præparandi modum adiunximus.

Hircorum autem peregrinorum, vt obiter dicam, multæ sunt varietates, inter quos commendatur Persicus, *Pazan* lingua vernacula dictus, ex cuius ventre lapis Bezar, seu Bezoar, vt loquitur vulgus, cuius vsus commendatur plurimùm, eruitur, aduersus virulentorum animalium morsus, venena & morbos omnes malignos, vt postea fusiùs dicetur.

*Bello-
sius.*

Creticus sic à Creta insula, quæ vt Anglia, lupis caret, Gallis *bonc-estain* dictus, pilis breuib. & flauescens induitur, bina cornua, longaue gerens ad dorsum incurua: Tantæ agilitatis est animal, vt ex scopulo in scopulum desilire soleat, sex etiam passuum spatio distantem.

Hircus
Creticus.

Inter hircos seu capras syluestres numerantur Ibyces, rupicapra,

Oryges, Damæ, & Pygargi: hæc tamen animalia multum à se inuicem distant, & omnia ab hirco nostrate, qui solus inter animantia in rebus venereis socium patienter admittit: vnde qui non ægrè idem patitur, Cornutus, hircorum instar, per Sarcasum dicitur.

Strepsice-
ros.

Strepsiceros quibusdam hircus dicitur, verius tamen aries dicendus, cui duo sunt cornua, in gyrum canaliculata, vt vnicornu erecta, ad vsum medicum nusquam expetita.

Strepsiceros in memoriam reuocat monocerotem, quem in rerum natura dari multi dubitant, tam rarum enim est animal, vt vix viuere aliquis, qui id viderit. Dubium hinc nascitur, quod rarum sit, quod ignoretur illius natura, quod inter se dissentiant authores qui de illo scripserunt.

Datur tamen, etiam sacre pagine testimonio, eiusque cornu quotidie visitur, & à medicis aduersus venena, venenatosq; & malignos affectus præscribitur. Non minoris tamè, vt liberè loquar, facio cornua cerui, aut rhinocerotis, quàm monocerotis, de quo multi magis mira, quam vera prædicant. Quodnam autem sit animal, cuius naturæ, vbi degat, & quibus dotibus polleat illius cornu, postea pluribus explicabitur.

De sanguine Leporis. CAPUT IIII.



LEPORIS assatum sanguinem calculo comminuendo plurimum valere grauissimi viri scripserunt, & experientia comprobatur. Est autem lepus animal notissimum, timidissimum & velocissimum, cui soli pilos in ore, & sub pedibus Aristoteles annotauit. Sunt qui candidos vidisse scribunt; Tales tamen non esse, sed apparere certum est, nempe hyeme, dum niuibus, tanquam alba veste teguntur. His enim liquecentibus illi cito rufescunt.

Lepus cornutus.

Venatu cœpit vnum cornutum illustris heros D. de Vitri, cuius cornu Iacobo Anglorum regi dono obtulit. Fabulosum est, quod iamdiu plebeculæ mentibus inhæsit, leporibus scilicet, vtrumque sexum, tanquam hermaphroditis esse, & vim vtramque gignendi, concipiendi ac pariendi habere. Lepores in Europa notissimi, & frequentissimi. In Itacha insula nulli, & quod mirabilius est, si illati fuerint, citò moriuntur.

Non solum autem sanguis leporis, sed & lepus integer, olla fictili operculata impositus, & in clybano vstus calculos atterit, & expellit cum paucis vino albo aut aqua; vel decocto idoneo sumptus: Ob id rectè ad Lithon tripticon accedit.

Est & lepus marinus, sic dictus, quod in mari nascatur & terrestris referat effigiem, pulmonibus & grauidis inimicissimus, de quo videndus Rondeletius.

De Pinguedinibus, & primò, De Medulla Cerui. CAPVT V.

MEDULLA in quouis animali ossium est alimentum, calefacit, dolorem sedat, resoluit, emollitque scirrhus partium quarumvis, maximè ceruina, deinde vitulina. In alijs animalibus vel acrior & intemperatior. Ob id venatores studiosè ceruorū medullas eximūt & seruāt.

Est autem ceruus animal notissimum quod reliqua cornigera siue formæ pulchritudo, siue cornuum amplitudo, siue ramorum varietas spectetur, facile superat. Ceruæ tamen cornua natura dene-gauit, quæ mari primum oriuntur recta subularum instar, vnde subulones tum vocantur. Dein bifida, postea trifida, primisque men-sibus cute quasi vestita, & lanugine tenui ac molli hispida, sed vbi creuerint, & aëri ac soli fuerint exposita, aspera, dura, glabraque redduntur.

Subulones
quid &
vnde dicti.

Omnia animalia cornigera caua cornua habent, solus ceruus sola quæ quotannis decidunt, tuncque cerui tanquam inarmes sese oc-cultant interdiu, antequam noua renata sint. Illa priora cornicula æquè laudantur ad cor roborandum & venenatos affectus oppu-gnandos, atque cornu Monocerotis. In basi cordis cerui iam senioris quoddam os paruum, planum & angulosum reperitur, quod vena-tores crucem cerui vocitant. Quatuor enim apophysibus, seu angu-lis determinatur in modum crucis, vnde nomen. Medici practici os de corde cerui nuncupant, cuius vires eximias ad cor exhilarandum & facultates vitales erigendas, notarunt. Pu'ueris Diamoschi com-positionem ingreditur. In ceruis iunioribus non quæritur, quod cartilago tantum sit, vix dum in osseam cōpagem firmata: pars cor-num capiti proxima, crassissima & tuberosa antequam solidescat, & pilis exuatur, in taleolas secta, vino albo macerata, & alembico destillata, aquam exhibet valdè cardiacam & lypopsychiæ atque af-fectibus, qui malignitatem coniunctam habent, efficacissimam. Nolo subticere nobilem virum Briensem, mihi notissimum, ceruā venatu cepisse vnicornem. Media siquidem fronte subulonem gerebat longum, incuruum, asperum, Genitale cerui ad pleuritidem colicum dolorem, nec non ad dysenteriam plurimum valere expe-rientia comprobauit. In maiore oculorum cantho ceruorum anti-

Lacryma
cerui.

quorum concrescit liquor quidam gummi modo, lacrymam cerui vocitant, qui mira proprietate sudorem mouet copiosum, & vene-natam pestis, aliorumque malignorum affectuum qualitatem op-pugnat. Nec omittendum vrinam cerui achoras optimè sanare.

Euryceros & Platyceros ex ceruino sunt genere, sed eorū omniū naturam his describendam relinquo, qui absolutam animalium hi-storiam susceperunt.

De Seuo caprino. CAP. VI.



EDVLLA, seuum, adeps, & axungia valde cognata sunt, quæ in sanguine præditis animalibus tantum reperiuntur, sed non in omnibus omnia. Aliis enim alia tantum sunt, ut cornigeris, seuum, & adeps bisulcis quibusdam, adeps cunctis auiibus & quadrupedibus multis. Sic enim axungiam ab adipe distinguunt multi. Alij volunt *Cap. 5. lib. 2.*

axungiam esse veterem, ut salitam, quam Gallo-
rum vulgus, *vieil oing*, vocitare solet, ut recentem, *saign doux*, quæ *de part. anim.*

Adipis &
seui discrimen.

Differt autem seuum ab adipe, quod seuum usquequaque agile sit, & cum refrixit, concreascit: adeps liquidus sit, minimeque aptus indurari, ait Aristot. Locis etiam discrepant, quod adeps inter cutem, carnemque soleat consistere, seuum in omento, circa renes, ac in fine carnis semper est. *Cap. 17. Lib. 3. de hist. anim.*

Quorum autem sanguis corpulentior est, hæc seuum potius habent. Seuum enim terrenum est, ait Philosophus. Vnde fit, ut fibrosi sanguinis modo cogatur. Quamobrem, quæ non utrinque dentata, sed cornigera sunt, quia natura sunt arida & terrena, hæc seuum habent. Sed quæ cornuum expertia sunt, & utrinque dentata & multifida, hæc vice seui adipem habent, qui quod terrenam non habeat naturam minus cogitur. *Cap. 5. lib. 2. de part. anim.*

Seuum ergo cum adipe sit magis terrestre, potius sumitur ad vnguenti Citrini confectionem. Seligitur verò caprinum, seu hedinum, sed arietinum minus idoneum non duco. Caper autem seu hedus cum animal sit notissimum, de eo plura verba facere frustraneum.

De Axungia suis. CAPVT VII.



AXUNGIA sic ab axibus vngendis ad rotarum faciliorem circumactum dicta, multi est in medicina vsus: maximè verò suilla ad quorundam vnguentorum, ut rosati, & emplastrorum, ut Vigonij compositionem. Omnium est liquidissima, instarque olei sæpius effluit, magisque emollit, concoquit, & resoluit quàm oleum, habetque qualitatem lenientem & anodynam. Propterea humorum acrimoniæ mitigandæ, dolori sedando, inflammationi contemperandæ, & humoribus resoluendis vtiliter adhibetur, & cataplasmatibus ad eosdem effectus institutis per aptè permiscetur. Quæ ex animalibus calidioribus, ut leone, detrahatur, resoluentem vim habet maiorem. Nullum enim genus non est multum

in qualitatibus primis intemperatum: Ob id facile & cito pinguescit: Estque animal multiparum, quod ante exactum priorem ætatis annum venere stimulat, & congressum appetit exercetque. Rotundum habet repandum, collum breue & crassum, setis rigidis hispidum. Testes mari hærent retrò, nec longipenduli prominent, omnium ferè quadrupedum ritu. Dentes exerti & longi conspiciuntur, quibus fœmina caret, aut certè ei multo breuiiores, & vix extra os apparent. Vtrique cauda intorta, vt etiam apro, quem porcum syluestrem nominant.

Suilligen-
ris tēpeties

De Axungia vrsi. CAP. VIII.



VRSI axungia calidior & ficior est suilla, & vtraque qualitate inferior leonina, velutique inter ambas media. Non tantum ad alopecias & perniones commendatur per se, sed vnguentis resoluentibus mista qualitatem eorum reddit efficaciorē.

Est autem vrsus animal aspectu horridum & mugitu, nam vox illius iracunda & minax est, plenaque terroris rauco de gutture fertur. Os illi valdè patulum, dentes ferrati, nares hiulcæ, aures decurtatæ, totum corpus prolixioribus pilis hispidum, vt cauda tam brevis, vt vix queat agnosci.

Vrsus
quodnā
animal.

Vrsa veneris est appetentissima, maremque sæpius ad congressum sollicitat, supinaque initur mulierum more, & similibus, ac mutuis complexibus. Informem autem molem non parit, quam postea lambendo effigiat, vt plebecula hucusque credidit: quem errorem improbat Scaliger exercit. 15. contra Cardan.

De Axungia anseris. CAPUT IX.



NGRATI quid omnes habent axungia, quo ventriculum subuertunt: Anserina tamen suauitatem quamdam præ se fert, quæ eam commendat in rusticorum culinis, à quibus auidè expetitur. In Pharmacopolijs quoque celebratur ad medicinam, Nam & per se adhibetur meatui auditorio ad tinnitum, qui grauem auditum præcedere solet, atque pluribus alijs medicamentis externis resoluentibus commiscetur.

Est autem anser & carniuora, & frugiuora avis, quæ tum in aquis & palustribus locis, tum in solo sicciore versatur, amphibiumque volucre perhibetur, tam domesticum, quàm agreste ac ferum, quod sedem ac solum certis tēporib⁹ mutat, gregatimque volat, vt grues.

Anseres autem non minus solertem præbere custodiam, quàm canes superstitiosi credunt, quod semel, atque ex euentu Romanis profuerint, quos à somno profundiore clangore suo excitantes, ca-

De anseri-
bus super-
stitio Ro-
manorum.

capitolium seruarunt. Illi enim excitati quosdam ac paucos milites Gallos conspexere, qui scalis ad ipsius muros erectis conscendebat, in quos vi & violentia quamplurimi irruentes suum capitolium seruauerunt. Cuius beneficentiæ memores Romani per tempora multa sacros habuerunt anseres. Postea tamen deposita ac spreta illa superstitio inter sauiiores epulas anseres transtulerunt. Satis enim laudabilem corpori præstant alimoniam, & odorem dum assatur, & saporem dum estur, satis gratum & suauem exhibet. Ad anserinum genus referunt multi Onocrotalum & Olorem, seu cygnum, Sed de his coqui quam Pharmacopœi veriùs & vberius loquuntur.

De Axungia anatis. CAP. X.



NATIS axungia nec omittitur in arte medicamentaria, qua & per se vtimur in artuum dolore, neruorum frigida intemperie, & vnguentis quibusdam vt Resumptiuo, & emplastris multis permixta. Qualitatem enim habet emollientem, calefacientem, resoluentem, anodynâ.

E Palmipedum autem genere est Anas, quæ seu domestica, seu syluestris locis aridis & aquaticis, vt lacubus æquè viuit. Ex domesticis aliæ sunt omnino albæ, aliæ prorsus nigræ, quædam picarum ritu partim albæ, partim nigræ, aliæ subcineritiæ, cuiusmodi omnes sunt syluestres.

Anas tam agrestis, quam domestica semper fœmina maior est, & colore magis vario, præsertim circa alas & collum in quo plumulæ ex cæruleo viridi mixto nitent.

Caro anatum ferarum, seu syluestrium & pinguium vtcunque suaui est, licet dura, nec inutilem sanguinem gignit. Sed quæ in vrbibus versantur, carnem habent excrementosam & minus suauem. Aluntur enim spurcissimis ac fetidissimis edulijs, vt animalium interaneis, & sæpè bufonibus, quos nonnunquam integros vorant.

Anates autem Ponticas venenis educari multi credunt, vnde Mithridates earum sanguinem Antidotis aduersus venena institutis permiscebat. In fluuijs, lacubus & locis palustribus viuunt aliæ aues multæ inter anates numeratæ, vt Querquedula, Boscas & Colymbis, quæ non in parua cibariorum gloria habentur.

De axungia Gallinarum. CAPUT XI.

XVNGIA gallinarum mediæ est inter suillam & an-
teriam naturæ. Recens & salis experts affectibus vte-
ri prodest. Confert adhuc labiorum scissuris, aurium
doloribus, & pustulis erumpentibus in papillis.

Ea inueterata magis calefacit, dissipat ac resoluit.

Est autem gallina auis homini vtilissima: ob id fecundissima, quæ
non modo suas carnes edendas præbet, sed omni tempore foeturam
exhibet commodissimam. Sunt enim quæ quotidie vel oua pariunt,
vel incubant, vel pullos excludunt, qui vbi pipiones adhuc sunt, à
quibusuis etiam delicatulis expetuntur: Adultiores facti omnium
palato arrident. Castrati autem & saginati vt Cœnomani capones
etiam aulicorum mensas explent & ornant.

Est enim gallinaceum omne genus optimi succi & coctionis faci-
lis, omnibus naturis & temperamentis idoneum. Non multum verò
illorum sententiam probò, qui ius galli veteris potius, qui semper
macilentus est, quàm iunioris & pinguis exhibendum ægrois sta-
tuunt. Ego capi aut pinguis gallinæ iusculum prætulerim, & vbi ni-
trofa quædam qualitas desideratur, aliundè quærerem. Gallinacei e-
nim omnes ex carnes ferè & ex ucci sunt, præsertim veteres, quia
quicquid habuere succi laudabilis, veneri impenderunt.

Capones
Cœnoma-
ni.

Tres autem gallinarum differentiæ apud nos visuntur: quædam
magnitudine alias superant, quæ rostro & pedibus, vt plurimū sunt
luteis, & oua maiora pariunt, sed minus fecundæ sunt vt Londunen-
ses, quæ à Varrone Medicæ vocantur, quia è Media fuerint allatæ.

Aliæ paruæ, quibus crispæ sunt plumæ, quæ sæpius quàm annis sin-
gulis decidunt, ita ut nonnunquam implumes cernantur, hyemis ri-
giditatem egrè ferentes. Sunt & vulgares perpetuò plumis indutæ,
quarum aliæ proflus nigre sunt, quæ putantur meliores, aliæ albæ,
quæ deteriores, aliæ variegatæ, quæ mediæ.

Gallinæ
Medicæ.

Sunt qui stomachicis imperant tunicam interiorē securi ven-
triculi gallinarum ad augendam coquendi facultatem, quod lapillos
conficiat, nullo tamen successu sumitur. Illius enim temperies vi-
tiatur interitu & desiccatione, destruiturque vis coquendi. Multa si-
quidem viuus inesse comperimus, quæ mortuis non superesse cer-
tissimum est.

Præter Gallinas nostrates aliæ multæ sunt rusticæ, vt Attragen, Vidcoq vn-
gelinottam vocant, Fulica seu gallina aquatica, & Ascolacus, seu de dicta.
Rusticula, & gallina syluatica, Septentrionalibus *vidcoq*, vel potius
vnodcock, secundum Anglos dicta apud quos *vnod* est sylua, & apud
Germanos *vnad* idem: Et *cock*, gallinaceus.

Sunt quædam gallinæ peregrinæ, vt Indicæ, & Numidicæ, quas

Phasianos multi arbitrantur, & Meleagrides, à quarum variegato colore, herba quædam florem multis veluti punctis maculatum gerens, apud nos Meleagris dicitur.

De ouis.

Multarum autem avium color, ut variegatus est, sic & oua, è quibus illarum generatio pendet, variegata, ut meleagridum, perdicum, gallinarum Indicarum; Nostratum verò ac vulgare gallinarum oua alba sunt: sicut & anserum, anatum, columbarum.

Porro sæpissimè in re medicamentaria ouis utimur, nam vitellos in clysmis solvimus, vixque sine eorū adiutu terebinthinam diluimus. Ex hisdem induratis oleum extrahimus: atque ab ouo eximiū quoddam electarium habemus denominatum, cuius vires aduersus pestem mirum in modum commendantur.

Sæpius verò in cibatu ouis utimur: Habent enim quid robustum, & alunt, & inflant, inquit Hippocrat. Robustum quid habent, quia generatio est animalis: Alunt, quia hoc est pulli lac: Inflant, quia ex parua mole in multam diffunduntur.

Quæ autem tremula dicuntur, ad nutriendum sunt omnium præstantissima. Frixæ & in cineribus vstæ, malæ. Caterum gallinarum, phasianorum & perdicum omnibus sunt præstantiora.

Ouum vnā solū prauitatem admittit, inquit Galenus, quam adfert vetustas, quam facillè effugies, si recentibus utaris.

De Butyro. CAP. XII.



Butyrum
anneum.

Lactis parte magis terrena caseus contrescit, è pinguiore quam cremorem vocant, crebro agitato in oblongo vase, Lactuburiam dicunt, butyrum cogitur quod multæ nationes habent in deliciis, præsertim, quod suauitate palato plurimum arridet, ut Vāneum, quod in agro Parisiensi fit, & Normanicum, quod eius provinciæ præsertim Constantiensis incolæ sale condiūt, in vasa fictilia prælonga demittunt, & ad cæteros Gallos mittunt, quibus olei vicem explet: facit enim ut omnia fercula sapiant, & auidius comedantur.

Utiliter admiscetur Eclegmati de Pineis & medicamentis pluribus externis dum lenire, humectare, emollire, & dolorem sedare consilium est. Temperie enim cum sit calidum & oleosum, bubones & parotidas inuat. Humores in pectore latitantes litu & linctu coquit, & ventrem soluit. Maximè verò quod ex lacte fit vaccino, tum quod copiosius habeatur, tum quia præstantius, suauius, ac salubrius. Ex ouillo enim & caprino quibusdam in regionibus aliquando fit, sed quod in Gallia nec gustatur, nec visitur, nec probatur.

Est autem vaccinum, seu bubulum genus quatuor ætatis gradibus

lib. 2. de
dicta.

lib. 3. de
alim.

Gal. &
lib. de
Euchy.

li. II. de
simpl.

distinctum. Prior ætas est vitulorum: Secunda iuuenorum: Tertia bouum nouellorum: Quarta vetulorum, quæ ad extremum extenditur senium.

Quæ iam adulta, sterilis est, taura à bubulcis solet nominari. Quæ prægnans, horda, fordave dicitur. Horda
quid.

Pro regionibus autem & soli cælique conditione, boues corporis habitum, pilorum colorem, mores, & naturam habent. Asiatici enim aliam formam, Epyrotici aliam, Gallici aliam habent.

In bouum genere cornua gerunt tam mares, quam fœminæ. Apud Mysios tamen & circa paludem Mæotim boues sine cornibus viuunt. Et aliquando apud Indos nonnulli visuntur vnicornes, alij verò tricornes. Aonius bos vnicum tantum cornu gerit, in medio capite instar monocerotis. Boues sine
cornibus.

Sunt aliæ bouum, ac vaccarum varietates multæ, quas exactius discquirere nostri non est instituti. Sat est nunc si dixerò ex bubulo genere lac & butyrum haberi, quibus nonnunquam in Pharmacopoliis opus habemus. Lac enim non tantum nutrit, est enim dealbatus sanguis, sed pluribus affectionibus medetur vt dysenteria, phthisi, ac pulmonum vitiis, quibus asininum, post muliebrem maxime conuenit. Lac.

Homini autem tot, tantaque commoda bos suppeditat, vt vix possint numerari. Illius enim in labore & agricultura non tantum socius est, dum viuit, sed mactatus mensas opulentat, & alimoniam exhibet firmam & laudabilem.

Ad bubuli generis familiam spectant vri, bisontes, bubali, & tauri Æthiopici, quorum naturam illis describendam relinquo, qui perfectam animalium historiam explicandam susceperunt.

De Pulmone vulpis. CAP. XIII.



VLMO vulpis à Mesue commendatur ad vitia pulmonum, & ab eo quoddam Eclegma denominauit, quod phthisicis conducere asseruit. Vt liberè tamen dicam, tapor eius acer, & ingratus, & teter odor efficiunt, vt minus quam creditur, valere à doctioribus iudicetur.

Est autem vulpes animal astutum, caudam habens multum villosam, & genitale pene osseum, calculo atterendo & expellendo idoneum. Insidiatur gallinis & aliis auibus iuuenculis, nec non leporibus. Speluncam fodit altam, multos habentem anfractus & exitus procul inter se diffitos, vt facilius venatorum eludat conatus. Vulpes,

Illius caro temperie sicca est, & digerentis facultatis particeps. Vnde oleum in quo fuerit elixata, oleum vulpinum dictum, humores ad extimam corporis superficiem euocat, & discutit: Eaque ratione morbo articulari vtiliter datur. Vires.

Illius adeps liquatus & auri infusus, dolorem ipsius sedat.

De testiculis Castoris. CAPVT XLIII.



CASTOREVM Medici vocant fibri seu Castoris testes ad multos medicos vñs expetitos & aptos. Est autē Fiber, seu Castor animal amphibium, ex albo cinereū, indorsō nigricās quōd partim in aqua, partim terra viſſitat, & ex vtroq; loco pabulū venatur, lutrarum modo, quibus valde ſimile eſt, cauda excepta, quē caſtori glabra eſt, & lata, & piſcium modō squāmōſa; lutris longa, rotunda, hiſpida, ruſa & ad caſtaneam accedēſ, vt & totum corpus.

Circa fluuios Ponti Caſtores plurimi ſunt, necnon in Hiſpaniæ paludibus: verum ex eis caſtoreum, vt vocant, non eamdem habet cum Pontico Galatiæ vim.

Morſus
Caſtoris.

Eſt autem horrendi morſus Caſtor. Nam hominem dum mordet partem comprehenſam non deſerit, antequam fracta concrepare oſſa ſenſerit & audierit. Eius teſticuli potiffimum appetuntur in vſum medicum, quos non proprijs dentibus amputat a venatoribus coactus, vt fabula de ipſo narratur.

Porro ad medicamenta ſeligi debent teſtes conuexi, ex vno ortu dependentes, liquore intus ceroſo, odore graui, & viroſo, guſtu acri & amaro. Eſt verō Caſtoreum medicamentum & celebre, & multi vſus, inquit Galenus, adeo ut Archigenes de Caſtorei vſu totum conſcripſerit librum.

Vires.

Excalfacit autem manifeſtē, ſerpentum venenis medetur, menſes & partus ciet, lethargycis & veternoſis prodeſt, & neruorum affectibus.

De Excrementis animalium, Et primū De Moſcho. CAP. XV.



ANIMALIA quædam venatu coguntur, capiunturque propter eſum, vt cerui, lepores, apri; Alia propter medicinam, vt vipere; Alia propter odoraſta & voluptatem, vt Moſchus, & catus zibethicus. Fiber etiam & Sebellina, vt ex his medicamenta & veſtimenta ſiant, expetuntur.

Moſchus,
quid.

Eſt autem Moſchus, & excrementi, & animalis à quo idipſum habetur nomen. Animal verō exoticum eſt, idque Indicum, in regno Pegu, ac potiffimū in agro Tūbaſcorum admodum frequens, capræ non multū diſſimile, ac corpore prægrandi, Dorcadē moſchi, gazellā Indicam & capreolum moſchi nominant, ex cuius inferiore maxilla eque dentes vtrinque ſinguli porcorum inſtar exeruntur.

Huic cū veneris æſtro percellitur, furoris vehemētia vmbilici regio intumeſcit, ibique congeſto ſāguine multo & craſſo ſit apoſtema; Atq; tum ferum illud animal potum, cibūque auerſatur omnē, & humi ſeſe prouoluens, atque lapidibus & arborum truncis turgētem partem quadam voluptate confricans, diſrumpit, ac vomitam

aperit, ex qua sanies quædam excernitur, quæ verus est moschus omnium rerum odoratissimus & suauissimus, quique alias omnes moschi varietates, quæ nunc multæ circumferuntur, bonitate superat.

Illæ autem sanies super arborum truncis, aut saxis relicta, calore solis ac cæli bonitate coquitur, elaboratur, & virosus ipsius odor, si quis sit, dissipatur, fitque præstantissimus ille moschus, quo reges & magnates donantur & vtuntur. Qui verò passim venditur bonitate longè inferior est, & ab animalibus venatu captis carpitur. Capta enim fera venatores partem cum corio simul abscindunt, cruorem effluentem exprimunt, colligunt, exsiccant & seruant cum vtriculis aut pellibus eorundem animalium, quorum sæpè sanguis exsiccatus, pauculæ recrementi dicti portioni commixtus, pro puro moscho ab institoribus, seu adulteratoribus venditur.

Est quoddam genus mustellæ maioris, quæ quod martia sit & pugnax, gallinas enim etiam grandiores enecat, quibusdam Martes, alijs Maturella, vulgo Fouina dicitur, cuius excrementa moschum redolent, vt sæpè obseruavi.

Sunt & quædam plantæ & fructus, qui huius aromatis suauitatem naribus & palato referunt, vt geranium moschatum, herba moschata dictum, rosæ moschata & pyra moschatellina.

Sunt autem moschi vires eximie: Nam cor frigidum & tremu-
lum roborat, exhilaratque, & omnibus ipsius affectibus cõfert, nec non cerebrum recreat, & spiritus omnes reficit. Calefacit ordine secundo, siccatur tertio.

Moschi
Vires.

De Zibetho. CAP. XVI.



NIMALIA tria gratum odorem spirare perhibentur, Panthera, quam tamen brutis tantum, non hominibus suaueolentem multi credunt, Gazella, seu Capreolus moschi, & felis seu Catus Zibethi, qui Grecis recentioribus Zapetiō, vulgo Ciueta nominatur, de cuius natura veteres non satis inter se conueniunt. Animal ferum est, dentibus ferox, feli non ita tam simile vt multiscribunt: Maius enim est, sæpè vulpem excedens, caput, collum, pedes, atque alias partes habens illi valdè dissimiles. Os ei oblongum est, vt Meli, seu Taxo animali, corpus longum, maxillæ inferiùs albæ, vt etiam barbitium, pedes nigri, laterales ventris partes albicantes, dorsum ex obscuro cinereum, maculis nigris conspersum, cuius recrementum Zibethum dicitur, ob fragrantiam à ditioribus expetitur, ob vires insignes à medicis celebratum.

Zibethum ergo odoramentum est aliud à moscho diuersum, suauissimum, pingue, crassum ac nigricans, ex animali eiusdem nominis, cui est cati figura, vnde Catus zibethicus sæpius vocatur, desumptū illius enim strigmentum est, seu sudor circum testes, ac pudenda concrefcens, qui cochleari corneo, aut argenteo, aut alio quouis eradi solet.

Catus zibe-
thicus.

Indicum quidem animal est, sed nunc apud Europæos valde frequens & cicuratum. Quotidiè siquidem Lutetiæ in multorum ædibus visitur, & contrectatur. Vt verò maiorem dicti recrementi copiam suggerat, irritari solet, fatigari, & ad iracundiam cieri; Tunc enim genitalia multo sudore glutinoso madent, qui postea eraditur. De rasus primis diebus gravis est, mollesque nares ferit; sed postea concretus & aëri expositus, virus omne deponit, ac suauitatem acquirit gratissimam.

Vt odor illius Moscho affinis est, sic & qualitas. Maxime autem confert vteri stragulationibus si eius aliquot grana in umbilici cavitatem indantur.

Animalium stercorea propter foetorem & ingratum saporem auerfantur, & egri, & medici. Malunt enim ingenui viri alia perscrutari, contrectare & exhibere medicamenta, quam putidorum animantium excrementa; Muscerda tamen multum prodest cum vino albo ad calculum atterendum & excludendum, & stercus caninum probatur à Gal. ad anginam: humanum verò laudatur à multis ad suppurandum. Epilepsiæ autem quæ fit per partium infernarum consensum, & materiæ tenuis ad caput ascensum, nihil æquè prodest, atque pauonis, stercus. Verum de eiusmodi excrementis, cum medicamentorum nostrorum compositiones non ingrediantur, agere non instituimus.

De Ictyocolla. CAP. XVII.

Chrysocol-
la.

Sarcocolla.

Xylocolla.

Alkanna.



MULTA glutinis in Officinis Pharmacopœorum varietas inuenitur. Vnum minerale est, quod auro coniungendo ritè conuenit, & Chrysocolla dicitur. Aliud quod vulnera ac carnem glutinat, & oculorum fluxiones inhibet, atque arboris cuiusdam in Perside nascentis gummi est, quod Sarcocolla vocatur, de his duobus supra. Tertium quoddam est, ex corijs bubulis factitium, quod Taurocollam nominant, & à frequentiore, quem præstat, vñu, lignis videlicet arctissimè simul firmandis, xylocolla nonnullis dictum. Est & Ictyocolla, seu gluten ex vêtre cuiusdam piscis confectum: Cui quod vis insit opplere, siccare, atque etiam quadamtenus mollire, rectè miscetur emplastris glutinantibus, & alijs quæ lepras tollūt, & faciem erugant. Ab Arabibus *Alkanna* vocari solet,

Morua &
Molua.

Vt autem Taurocolla non tantum ex corio bubulo, sed ex omnium quadrupedum auribus pedibusque fit, sic & ictyocolla non tantum ex ventre vnus piscis; sed ex omnibus viscidis ac glutinosis fieri potest. Sæpius verò fit è quodam pisce, quem Rondeletius *Exossem*, alij moluam, alij moronam, quidam Moruam appellant, multum tamen inter se distant.

Est autem Exossis piscis cetaceus, cartilagineus, absque squamis, spinis, & ossibus, nisi paucissimis. Caput ei crassissimū est, latumque, os magnum, è cuius maxilla superiore molliusculæ & oblongæ apophyses deorsum pendulę emergunt. Carne est prædulci & glutinosa, proinde malè grata, nisi longe ante esum sale condidatur.

Non solūm verò ex corio, sed etiam intestinis, ventriculo, pinnis & cauda piscis Exossis Icthyocola conficitur ad hunc modum. Partes dictę in frustula tenuissima secantur, in nouo fictili ponuntur, aqua calidæ quantitas idonea affunditur, sic diem vnum, aut alterum macerantur: Tum lento igne coquantur, donec in cremorem, aut pultis consistentiam abeant. Postea ab igne semouentur antequam hæc confectura refrigerit à fictili eximenda, & in partes disiungenda, ne in massam tenacissimam concreascit. Nonnunquam exossis piscis internæ membranæ necnon intestina lota, extensa & siccata pro Icthyocola venduntur.

Parari quoque potest Icthyocola seu gluten piscis è Siluro, quē obvoracitatē, deformitatem & feritatem lycodæmonē nōnulli vocitant. Est enim piscis ferocissimus & maximè maleficus; vastissimo oris hiatu, ac dentibus multis acutissimis animalia quæq; ubique impetens, ita ut equos innatantes sæpe demergat: falluntur qui Sturionem esse credunt.

De Oesypo. CAP. XIX.



ESYPVS Officinis Isopus humida, est succidarum lanarum arte detracta & concreta pinguitudo, à qua emplastrum quoddam à Philagrio descriptum, Oesypatū vocatur: quod ad lienis dolorem, stomachi & hepatis duritiem & aliarum partium nodositates commendatur. Emollit enim Oesypus & explet, præsertim vlcera sedis ac vuluæ cum meliloto & butyro: sine excessu calefacit & dolorem lenit.

Conficiendæ autem Oesypi ratio hæc est: lanæ succidæ è collo, feminibus, & femoribus ouium sumuntur, aqua feruenti horas octo macerantur, commiscentur, & rudicula aut baculo agitantur: deinde feruefiūt, quousque in aquam deposuerint totam pinguitudinem.

Tum expressis & semotis lanis, aqua illa pinguis, ac sordida ex alto in aliud vas ita infunditur, vt multum spumescat: Spuma denuò accipitur, atque adhuc tamdiu agitur in aqua donec amplius nullam spumam emittat.

His ita peractis pinguedo collecta in aqua pura lauatur, & manibus agitur, donec œsypus admota linguę leuiter tantūm astringat, nec mordeat, & candida spectetur: Tum in fictuli vase reponitur. Ve-

rùm omnia sub feruido Sole fieri debent. Nonnulli addunt ad lotionem aquam marinam, sed dictus modus vſitator & melior iudicatur.

Ouillum autem genus nulli nationi non notiſſimum, homini infinita commoda ſuppeditat: illius enim lana tegitur, carne alitur, ſimo paſcua pingueſcunt & fœcundantur.

Aries vnde dictus.

Ouium iuniores pulli agni dicuntur; grandiores & integri, arietes, ab ara in qua olim immolabantur: Caſtrati, verueces, Italis *Caſtrones*.

Sic enim veruex ab ariete differt, vt cantherius ab equo, capus à gallo, caper ab hirco. Sæctarius veruex vocitari ſolet, quem agni ſequuntur.

Hæbitus arietis, quem Galli *Bellerium*, à bellando, vt credibile eſt, nominant commendatur, dum altus, ac procerus eſt, ventre promiſſo, cauda longiſſima, velleris denſi & candidi, fronte lata, cornibus intortis & patulis, ravis oculis, auribus amplis, pectore, ſcapulis, & clunibus amplis.

Arabia duo miranda arietum genera proferit; vnum caudam adeo longam gerit, vt non ſit tribus cubitis breuior: alterum cubitali latitudine eandem gerit. Cætera de pecuino genere cuique vulgaria.

De oſſibus medicatis, & primum de oſſe cordis cerui. CAP. XIX.



I animalium excrementa etiam fœtidiffima vim habent commendatitiam ad multos affectus curandos, vt ad anginam ſtercus caninum, quod faceti viri Album Græcum vocitant, multo magis partes illorum integrantes, vt alces vngula ad epileſiam, capræ ad eos qui noctu ſtragula permingunt, & oſſa multorum & piſcium & volatiliũ & quadrupedum.

Cranij humani facultas.

Os etiam hominis homini medicina eſt, nam cranium inſepultum vt decet apparatus & exhibitum morbum comitalem ſanat. Os de corde cerui, cornu rhinocerotis, dentes Elephantis, apri, & lucii multis morbis conducere experientia comprobauit.

Rem autem medicamentariam Ceruus multum adauget: Ei enim cornua ſuggerit, ſebum, adipem, medullam, lacrymam, priapum, & oſſiculum illud, quod ad baſim cordis inuenitur.

Eſt verò Ceruus animal nobiliſſimum, quod pulchritudine, celeritate, dignitate & vtilitate reliqua fere animalia ſuperat: vnde regibus ſolis, ac illius miniſtris eos inſectari ac venari fas eſt: Eorum caro lautiora etiam conuiuia ornat, & quæ menſis non congruunt, pharmacopœorum tabernas locupletant.

Maxime autem celebratur illud oſſiculum, quod ad baſim cordis ceruorum annoſorum habet adhæſum, quod à figura crucis, quâ

non male refert, venatores Crucem cerui nuncupant, plurimumque ad cordis affectus valere, non solum ipsi experientia ducti docuerunt, sed & medici præter experimentum ratione docti confirmarunt.

In ceruis iunioribus non os, sed cartilago tantum est.

In valde senibus concrefcit aliquando in vtroque oculorum cantho maiore lacryma quædam mira vi sudorem proliciens, & morbis venenatis conducens, vt ostendimus supra. Os autem de corde cerui ad Diamoschi confectiorem accedit, vt vim eius cardiacam iuuet, & reddat efficacior.

De Ebore. CAP. XX.



N quadrupedum genere maximum & homini obsequiosissimum est Elephas: Dominum enim non modo suum, sed & vocem agnoscit, iussa capit, obsequitur, peragit. Visus est qui domino iubenti responderit *hoo, hoo*, hoc est, volo, volo, vt Barbarorum idioma notat.

Elephas loquutus.

Alterum scripsisse viri fide digni asseruerunt. Ego, inquit Ælianus, recte & ordine in tabula quadam latinas literas vidi Elephantum scribere: veruntamen manus docentis subiiciebatur ad literarum figuram & lineamentum instituens animal: cumque Elephas scriberet, eius oculos immotos & deiectos esse perpexi, vt quemdam grammaticum dixisses.

Tritum est illud, ait Oppianus, Elephantos inter se loqui; verum non omnibus, sed solis domitoribus illorum colloquutionem notam esse.

Tam prope accedunt Elephantis ad hominis ingenium, vt nonnulli prudentiores iudicantur, quam in locis quibuldam homines. Varro.

Obsequiosi sunt, gloriæ cupidi, beneficiorum, & iniuriatum memores, atque retributionis & vindictæ cupidissimi.

Notum est illud Æliani: qui Elephantum, inquit, hordeum admetiendi procurationem habebat, partem hordei subtraxisset, & in eius locum lapidibus admixtis ac suppositis, ipsi tamē mensuram debitam ac solitam cumulatē seruasset, vt dominum vtriusque si quando vidisset, falleret: Elephas videns eum qui sibi debitum fraudabat, polentam coquere, promuscide sabulum collegit, & in ollā infudit, sicque solerter iniuriis iniurias sibi illatas ultus est.

Ei autem parui sunt oculi pro corporis magnitudine: proboscidem pro nare gerit, qua vtitur vt manu, ad quælibet contrectanda, & maximè ad esculenta, potulentaque assumenda, & in os ingerenda: linguam habet valde parvam: Dentes vtrinque quatuor, crassos & breues, alimentum atterit & molit: Duos præterea longissimos & cras-

siſſimos, quos verius cornua dixeris, qui certo tempore decidunt, & poſtea renaſcuntur.

Eorum autem materia Ebur eſt, vſibus humanis penè infinitis, ſed potiſſimùm medicis accommodum.

Atque idipſum eſt, quod magno errore pharmacopœorum vulgus vrit, vt pro Spodio Arabum fictitio ſumant.

Neque enim vſtum, neque crudum rectè pro Spodio ponitur. Viſ ſiquidem vſti perit: crudum verò nequaquam eſt ſpodio analogum. Nam propriè loquendo vnicum tantum eſt Spodium, Græcorum nempe, quod Pompholix nominatur.

Arabum verò quorūdam falſò creditum Spodiū eſt *Tabaxir*, quod cum ebore vſto conuenit, vt rhabbarum cum ſaccharo, ſed ea de re latiùs alibi diſſeruimus.

Ebur autem crudum facultates habet eximias, nam viſcera omnia roborat, moderatè refrigerat & aſtringit, ſtomachi dolores abigit, vomitum cohibet, vermes enecat, diuturnis obſtructionibus prodeſt, & huius potu mulieres ad concipiendum fœtum aptiſſimæ redduntur.

Sunt qui elephantis dentium flexuoſa proceritate decepti elephantes cornigeros audacter nimis pronuntiarunt. Reuera enim dentes non ſunt quæ à Pauſania & Varrone pro cornibus habentur. In cuius opinionis aſtruenda fide cum ſe parum acutos geſſiſſent, bona tamē illorum venia dixerim, futilia quædā commenti ſunt quibus ſophiſtas magis quā philoſophos agere videtur: neglectis igitur eorū ieiunis rationibuſcū Philoſtrato conſtāter affirmemus, multis animalibus cornua in vna mādibula enaſci, ſed quibuſdā, paucis tamē, in medio vultu vt Rhinoceroti, permultis in fronte vt monoceroti, cāphuri, piraffoixi: alijs in vertice vt bubalis, damis, ceruis aptalis: dentes verò ex vtraq; maxilla tātūm proueniūt & exoriūtur, aduertendū tamē eos ſolū ex inferiore maxilla naſci qui ſuo ſurrecto flexu & magnitudine cornu ideā referunt, quique aliquādo octo pedum longitudinē ſuperāt: fabuloſū enim non eſt quod in Indicis hitorijs legitur duos elephantis dentes pōdo trecenta vigintiquinque pependiſſe. Nō præter rem erit eadē loquendi libertate elephātis promuſcīdē à Plinio manum vocari, aliquādo dentes cornua: ab illis enim vſū & fūctionem, potius quā rem ipſam homines ſpectarunt.

De Cornu Monocerotis. CAPVT XXI.

Homo
cornutus.



I quæ animalia cornibus natura mutila voluit, aliquando cornuta viſa ſint, hæc inter raro contingentia reputantur. Sic pro mōſtro habitus eſt ruſticus quidam Cænomanus, cuius fronti cornu adnatum, craſſiſſimum, duos palmos longum, ad occiput incuruū Lutetiæ ann. Dom. 1600. vidimus. Sic & perrarum, immo nuſquam niſi forſan ſemel viſum alteri homini cornu in dorſo prominulum, cuius meminit Philipp.

cap. I.
tract. I.
de tumo-
rib.

Ingraffias.

Multa verò cornuta sūt præsertim mascula, quorū maxima pars bicornis est, vt bos, vrus, capra, alia tricornia sūt, vt boum genera quedam in India, ex Solino, quedam quadricornia, vt in arietibus multis obseruauī.

*Indon.
Roman.*

Nonnulla tantum vnicum cornu gerunt, idque in fronte media, vt Onager Indicus, vacca quedam in Zeila vrbe Æthiopix, Camphur animal amphibium in insulis Molucis frequens, vt aues quedam Æthiopica, ex Æliano, & pisces nonnulli, cuiusmodi est, Vletif in Indico mari frequentissimus.

Omnibus his dignitate antecellit, literis non modo humanioribus, sed diuinis tantoperè celebratum illud animal, quod Hebræi *Rem*, & *Reem*, Auicennas *Achercheden*, ex Arabibus nonnulli *Barkarā*, Græci monocerotem, Latini vnicornem, Iudi *Cartazonos*, Galli Licorniam nominant.

De hoc animali varia varij authores scribunt, alij enim dicunt esse procerum, nonnulli pumilum: Sunt qui asserunt esse perpetuò ferum & sylvestre, alij non tantum arte cicurari, sed etiam visis puellis mansuescere, & aliquando iuxta eas in somnum delabi, earumque amore & odore allici. Sunt & qui illarum cornu nigrum, alij rufum, alij album pronunciant.

*Varia de
Monocero
opinio*

*Solin.
Plin.*

Æliā.

Ex eorum autem opinione communi qui nouum orbem lustrarunt, Monoceros Elephanto humilior tenuiorque est, & magnitudinem equi tantum mediocris æquans, colore mustellino, seu subrufo, & secundum quosdam cinereo, capite cerui, collo non oblongo, nec oblonga iuba, sed admodum rara, & altera colli parte pendula, hircina barba, sed breuiore. Ungulas bifidas habet, tibiae non valde crassas, caudam apri modo.

In capitis summa & anteriore parte cornu gerit vnicum, rectum, crassum, velut in spiras intortum, quatuor, aut quinque pedes, aut plus, minusve pro ætatis ratione longum, solidum, ac durum, nullis squamulis asperum, nullis rimis hiulcum, exterius subrufum, interius velut eburneum, sed nullis lineolis undulatum, in ambitu tanquam crasso cortice linea circulari à reliqua parte dirempto obualatum, quem institores inepta, licet vsitata voce, Laridum vnicornis vocitant.

Cum igitur monoceros animal sit & rarum & ferum, nunquam cicurabile, nisi forsan cum adhuc pullus capitur, nec ei vt ceruis cornua quotannis decidant, non mirum si illius cornu rarum sit & pretiosum: vnum tamen longissimum & hominis proceritatem æquans tanquam thesaurus dirissimus seruatur in templo D. Dionysij iuxta Parisios, & multa segmina singuli pharmacopole Parisienses in Officinis seruāt, vt quoties vsus postulat, hoc insigni præsidio iuuentur.

*Laridum
cornu vni-
cornis.*

Laudatur autem plurimum aduersus venena, & ad partes nobiles

exhilarandas & roborandas. Proinde solet dari pesti, morbis contagiosis, & omnibus venenatis. Verum cum omnes ægroti æquè non valeant opibus, debet tantum diuitibus exhiberi; alijs fortunæ tenuioris cornu Rhinocerotis, ut etiam cerui præscribo, successu non minus fœlici.

De Lapide Bezaar. CAPUT XXII.



LAPIS Bezaar sic dicitur vel ab animali quodam Orientali ex quo habetur, quod Persica lingua *pasan* aliquando *bazar*, & Indica *bezar* nominatur, vel à facultate bezardica, hoc est, alexiteria & eximia, qua pollet aduersus venena: Et ea ratione lapis quidam metallicus & alexiterius, apud quosdam Arabes Bezaardicus dicitur, ut omnia virus expugnandi qualitate prædita ip-
Anicē.

Bezoaar.

Lapis autem Bezaardicus nunc vulgaris, & in vsu medico frequens, vulgo Bezoaar dictus, è fodinis metallicis non eruitur, sed è ventre ac partibus internis cuiusdã animalis eximitur, in Persia, Corasone, promontorio Comorim, & multis alijs Indiæ locis & montibus Chynæ finitimis, frequentissimi: quod qui viderunt, hircum credunt & nominant; inco'æ capram montanam: forma enim & magnitudine hircos Europeos refert, sed pilis brevioribus hispidos: magis quoque proceros N. Monardus asserit, atque ceruorum æquare proceritatem, & rectè Cerui-capram nominari opinatur, quod partim ceruorum, partim caprarum ideam gerat & naturam.

Cerui capra quid.

Ocyssimum & agile est animal è scopulo in scopulum facilè desiliens, ferocissimum, quod in venatores Indos irruens sæpè eos occidit, bisulcū, ungulas enim ut capra bifidas habet, tibias parum crassas, caudam prominulam ac breuem, corpus hispidum quidem, ut genus caprinum, sed brevipilum ex cinereo rufum, & ferè ceruinū, caput hircinum, binis armatum cornibus in obtusum mucronem desinentibus, ad dorsum multum incuruis, admodum nigris, crassiore & inferna parte cauis, tuberculis pluribus obsitis: duo vidi Couberti in castello Dom. De Vitri.

Lapis Bezoaar cuius generatur.

In huius autem animalis ventre dictus lapis generatur, cuius non modo varia est magnitudo, sed forma atque color: magnitudo quidem pro animalis natura & ætate; nam in seniore & maiore maiores lapides inveniuntur, in iuniore & minore minores. Omnes fere ovali figura cernuntur, sed alij alijs rotundiores sunt, alij magis quadrati.

Color vel obscurus ac nigricans, vel rufus aut magis pallidus pro animalium temperatura, quorum quæ lapides crassiores generant ac gerunt, minus agilia sunt, & ad cursum saltumque minus apta

& magis tristia viuunt, quod & venatores quasi primo intuitu agnoscunt. Forſan eiſmodi lapides illis animalibus inſenſi ſunt & contra naturam, vt hominibus calculi.

Corticatim autem generantur ex paruulo rudimento, quod ſæpe palea quedam eſt, aut puluis coagmentatus, cui nouus humor apponitur, adhæreſcit, agglutinatur, aſſimilatur, & in laminas multas craſſas, aut tenues ceparum modo, pro lapidis magnitudine & appellentiſ humoris appoſitione.

Puluis hic in centro contentus eiſdem eſt, imo maioris efficaciæ, quàm aliæ lapidis partes, ac laminæ, quæ ſingulæ tam internæ, quàm exteriores leues ſunt, expolitæ & ſplendentes: quod in adulteratiſ lapidibus non ita eſt, in quibus nunquam puluis interiùs inuenitur, vt in veriſ & natiuiſ.

Puluis be-
zaardicus
naturalis.

Ex bezaardiciſ lapidibus Perſici omnium præſtantiſſimi, dein Orientales, maximè verò qui ex animalibus eruuntur quæ in montibus Perſiæ degunt: nam quæ in campeſtribus & planiſ lociſ victitant, cum plantas bezaardicas & æquè ſalutares minimè depaſcantur, perinde ac ea quæ excella loca incolunt, minus efficaciſ lapideſ gignunt.

Omneſ multum commendantur aduerſus virulentorum animalium morſus. Nam eorum puluis ſumptuſ, vel admotuſ vulnera à ſcorpionibùſ, viperiſ, aut aliis ſerpentibùſ inſicta ſanat, atque hiſdē animalibùſ uiuiſ inſperſuſ, eadem torpida & minimè nocua reddit. Aiunt Cordubæ regem à ſumpto veneno quodam pernicioſiſſimo huiuſ lapidiſ uſu liberatum. Ob id nonnulli recte Bezaar ab Hebræiſ deducere videntur, apud quos Bel dominum notat, & Zaar venenum: vnde Bezaar, quaſi dominuſ veneni.

Viret.

Historia.

Eadem ratione morbiſ omnibùſ venenatiſ, & contagioſiſ multum prodeſt, vt peſti, morbilliſ, exanthematiſ, varioliſ & ſimilibùſ. Animi quoque deliquiſ, palmo, longiſ mœroribùſ, hystericis affectibùſ, & aliis pluribùſ maligniſ fœliciter medetur, de quibùſ vide N. Monard. Chriſtoph. à Coſta & Cluſium.

De Margaritiſ ac vnionibùſ. CAP. XXIII.



MARGARITÆ ex conchiſ quibuſdam, ſeu piſcibuſ Vnionibùſ
teſtaceiſ, oſtreorum valde ſimilibùſ, in Indico cur dicti.
mari victitantibuſ ſumuntur; quæ ſi paruæ fuerint,
Margaritarum nomen ſeruant: ſi craſſæ & ponde-
roſæ, vniones appellantur, quia ſcilicet ſinguli in
ſinguliſ conchiſ inueniantur, iuxta illud poëtæ: V-
nio dictuſ ob hoc, quod ab vna naſcitur vnus, nec duo vel plureſ
vnquam ſimul inueniantur.

Huic tamen opinioni refragatur Aelianuſ, & experientia docet in

eadem & sola concha multos sæpius vniones generari & reperiri pro pisciculi redundante excrementitio humore, puro & lucido à quo generantur. Vniones igitur latini vocant, non quod in vnica concha vnicus tantum reperiat, sed quod duo nunquam indiscreti in eadem inueniantur, inquit Rondeletius. Probantur candore, rotunditate, magnitudine, pondere & læuore, quales reginæ in torquibus gerere solent.

Generatio autem margaritarum est è conchis multis, sed præstantiores è quibusdam exoticis, quæ reperiuntur tum in mari Persico, quod in Oriente est, vnde & Orientales dicuntur, tum in Chynarum tractu, & multis Indiæ regionibus, in quibus concha margaritifera ab incolis *Berberi* vocatur, & à quibusdam Barbaris *Cheripo*, ab aliis *Canquo*, quod mater, seu vt vulgus loquitur, *Nacra perlarum* perhibetur.

Nacra perlarum.

Magna vero est illa concha, spissa, modicè caua, pectinum æmula: non vtrinque aurita, sed tantum altera parte, exterius minimè striata, sed plana & aliquantum flauescens, intus læuis, splendida & argentei coloris.

Lapides in multis partibus generantur.

In illius carne generatur margarita, vt in suilla grando, vel in vesica calculus, aut in alijs partibus lapilli. Vidi siquidem virum quemdam, qui lapidum quantitatem per secessum excreuit, quorum singuli castaneam aut glandem æquabant.

In illustri viri cadauere secto tres lapides in hepate reperi sunt. Vidit quemdam Fernelius qui è thorace multos lapillos margaritis similes cum sputo eduxit.

Sed ad propositum redeam, conchæ quas matres vnionum vocant, aëri expositæ hiant, vel ferro aperiuntur, atque intus vnà cum carne margaritæ reperiuntur, quæ re vera nec ossa sunt, nec partes eorum pisciculorum, sed quid illis adnatum, & veluti excrementum, ad testarum instar, quibus reguntur, concretum & splendens. Verum exterius scabrum est & impolitum, interius læuissimum & aspectu pulcherrimum, videturque esse vulgaris *Nacra perlarum*, seu mater margaritarum, quæ naturaliter nunquam, sed arte tantum perforantur.

Maiores sunt, quæ ex maioribus conchis, atque ex alto mari sumptis, eruuntur.

A mulieribus tam studiosè quærantur, vt nulla etiam mediocris fortunæ se satis ornatam credit, præsertim Lutetiæ, si è collo suspensas margaritas, *Perlas* vocant, non gestarit.


Earum verò vsus plurimum ad rem medicamentariam commendatur: vno enim cōsensu recentiores cum veteribus margaritas valde cordiales assueuerant, & ad cor exhilarandum imperant. Ex his arte Chymica solutis, liquor perlarum vt vocant, habetur, de quo Spagyrici multi multa, & sæpius ridicula prædicant & promittunt.

Noui

Novi Lutetia Chirurgulum empyricorum astutissimum, qui sex aureos postulabat quod hirudines duas agrote admouisset, quod cum mirarentur multi, maiorem, inquit, mercedem deberem efflagitare, quia mensem integrum illa duo animalcula liquore perlari cibavi.

Cap. 51 De margaritis & conchis in quibus generantur deque illarum natura, præstantia, duratione & viribus, doctam apud Rondeletium lectionem habes, lib. 1. de Testaceis.

De Umbilicis marinis. CAPVT XXIV.

Cap. 38
39.  MBILICVS marinus vel integer pisciculus est, cuius meminit Rondeletius libro secundo testaceorum, vel pars, & velut os, aut tegumentum alterius maioris. Prior turbinata ac parua quædam concha est, ita umbilico similis, ut nullus qui viderit eam, umbilicum non nominare potest.


Est aliud umbilicus, totus osseus, Bellericus & Belliculus marinus in Officinis dictus, qui vel testa vel os alterius putatur. Multis enim piscibus ossa quædam insunt, quæ vel ad spinarum, quibus vitam suam tuetur inflexione natura tribuit, vel ad corporis firmamentum & motum. Sic Sepia suo stabilitur osse, sic Raia dorsum ossiculis pluribus spinosis armatur, quæ leui coctura facile à toto corpore seiungitur, nec malè forma & magnitudine, spinam si exemeris, umbilicum marinum representant.

Bellericus
marinus.

Umbilicos ergo marinos in pharmacopolijs frequentissimos cum Bern. Dissennio suspicamur à marinis animalibus desumi, & in litoribus cum reliquis lapidibus sæpius inueniri, non tamen lapides similis cum hisdem generis esse. A quibusdam gemmæ marinæ dicuntur, non tamen vires habent adeo eximias, ut inter gemmas debeant reponi. Forma illorum notissima est, color in quibusdam albus, in alijs rubellus, frequentes vaneunt in celebribus totius Gallia ciuitatibus.

Gemmæ
marinæ.

De Dentalio. CAP. XXV.

 DENTALIUM concha parua quædam est, oblonga, candida, exterius asperula, intus læuissima, tubuli modo concava & altera parte canini dentis instar acuminata, unde Dentalij nomen. Testa enim dentis æmula, in quo vermis procreatur & viuit oblongus & tenuis pro conchæ concavo, qui foras interdum sese exerit hauriendæ aquæ & quæritandi victus causa. Nascitur cum suo tubulo & veluti fistula testacea in saxis marinis, & super concharum vetustarum tectis. Eandem habet virtutem ac umbilicus marinus & reliquorum pisciculorum conchæ, quæ Unguenti citrini æquè possunt ingredi compositionem.

Dentalij
nomē unde.

De Antalis. CAPVT XXVI.



LIVD quoddam testaceum marinum Antalium in pharmacopoliis dictum sequitur, cuius parùm frequens est in arte medicamentaria vsus, vnguentum Citreum si exceperimus.

Tubulus est testaceus, in mari prognatus, digitum minorem longus, foris striatus, intus lævis ac concavus, è cuius alueo eductus est pisciculus paris magnitudinis.

Solen.

Dactylus.

Videtur is esse paruulus piscis, què Athenæus Solenè nominauit: nam Solen ex concharum longarum genere est duplici constans testâ, læui, tenui, arundinis modo caua, & extremis duobus semper apertis. A Plinio dactylus, seu digitus vocatur, quod is digiti humani longitudinem, vel vnguis similitudinem, vt malunt nonnulli referat. Vt vt sit, Antalium quo officinæ vtuntur, satis est vulgare: & si defierit, non valde pretiosum & eximium medicamentū deest: cuius loco conchylia quæuis, vt pectines marini, buccina & conchæ omnes, præsertim albæ & striatæ, quas peregrini è mari illius Montis percelebris, qui diuo Michaeli sacer est, aduehunt, possunt substitui. Omnium enim vis æquè conuenit ad vnguenti dicti confecturam: Ad quam accedit & aliud, ne quidem verbo tenus satis notum, quod alii Amentum, alij Amiantum vocant. Adhuc enim certatur, post grauissimorum virorum disquisitionem, an Amentum sit Amiantus lapis ille, qui ex albo virescit, & à multis alumen scissile vocatur; A quo tamen non parùm distat.

Amentum.

Alumē scissum & Plumbeum qui differant.

Alumen enim scissum vim habet astringendi manifestissimam, & prunis iniectum vritur. Plumbeum verò acre est, & à flamma tutum, nec malè vocatur Amiantus, vel forsan Amentum, aut Amiantum, quod vnguentum citreum admittit. Hoc tamen certò asserere non ausim, cum Amenti vox barbara sit, à paucis, imo nullis, vt credo, intellecta, vt ex varia authorum, qui de Amento loquuti sunt opinione constat. Theophrastus enim nomen arboris putat; Matheus Syluaticus vitrum coctum: Manhus gypsum vsum; nonnulli sebū, seu axungiam vitri, alij talkum, seu lapidem specularem, qui re vera huic vnguento valde conuenit, vt etiam alumen plumbeum, quod non sine ratione pharmacopœi pro Amento, seu Amiantho vsurpant.

Blatta bizantia.

In Officinis quoque fit sæpe mentio de Blata bizantia, quæ conchylj operculum est, ei simul, inquit Dioscorides, quo purpura piscis integitur. Illa tamen similitudo tantum est penes substantiam & facultatem, non formam: Nam tegumentum purpuræ rotundum est, ex Rondeletio, Conchylj longum & strictum, quod in lacubus nariferis inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quod inibi con-

chylia nardo vescantur, diciturque Vnguis odoratus: halitum enim Vnguis o-
castorei quadantenus spirat. Eius autem historiam non fufius def-
cribo, quod nulla medicamentorum ingrediatur, quæ in nostra Of-
ficina congeruntur.

De Testudinibus. CAPVT XXVII.

Cap.
4. lib.
32. nat.
hist.



ESTVDINES vel aquaticæ sunt, quæ scilicet in ma-
ri, aut aqua dulci viuunt, vel amphibix, quæ partim
in terra, partim in aquis, aut locis palustribus ac lu-
tosiss. Vnde Plinius in genere eas omnes quaternario
numero complectens, vocat marinas, Emydas, terre-
stres & lutarias. Emydas interpretantur quæ in aqua
dulci viuunt.

Testudinũ
genera.

Est autem testudo animal caudatum, quadrupes, squamatum, in-
gratum visu, cuius testa forma ouali, longa, lata, intus concaua, exte-
rius instar scuti extuberans, sub qua collum, caput, pedes & caudam
modò recondit, modo foras, prout vult, exerit.

Sola inter squamata animalia renes & vesicam habet, ex Aristote-
le. Oua durioris testæ & bicoloria edit, eaque in scrobe effossa, for-
ma dolij reponit, atque cooperta, & complanata terra, postea incu-
bat, sicque fœtus excludit.

Testudines tantæ magnitudinis esse in Indico mari Solinus refert, Mira testu-
dinum ma-
gnitudo.
vt testis duabus superna parte iunctis, inferna diductis, Indorum
vulgus suas ædes constituat, in quibus numerosa familia non arctè
recipitur, & à quibusdam vsurpantur cymbarum loco, qui illis de-
uecti nauigant inter insulas rubri maris.

Apud Troglodytas cornigeræ sed minores inueniuntur: celeres ta-
men ad nauigandum: cornibus enim loco remorum vtitur.

Præter dictas quædam albæ circa mare rubrum visæ sunt.

Vires.

Sunt autem testudines & in re cibaria & medicamentaria vsus
magni: decoctum phtificis & extenuatis reficiendis valde conducit:
ob id vtiliter ad syrupi resumptiui confectionē accedit. Caro à mul-
tis suauissimè editur: animal tamen est adeò deforme capite, cauda,
pedibus, serpentes forma, colore, maculis referens, vt natura ipsa ip-
sum nobis infensum esse, & insalubre notare videtur. Quod etiam
fatentur hi apud quos in deliciis est: verum apparatus & condimen-
ta reddunt minus noxium, sine quibus innoxie vix ingeri posset quæ
in syluis testudo degit, aut alio sicciore loco bufonum colorem in-
cute refert nullis aut raro flauis punctis maculatur, tamque horridi
coloris & aspectus est, vt non mirum, si lepus, vt scribitur, animal
meticulosum illa conspecta confestim aufugiat, cum etiam mulie-
res multæ vix intrepidè illam conspiciant. Refert Ioannes Leo in
Lybiæ desertis testudines quasdam inueniri, quæ magnitudine do-
lium æquant.

lib. 9.
hist.
Æfri.

De Ranis. CAPVT XXVIII.



ANIS vtuntur integris Myropolæ ad emplastri Vigonij compositionem, quod author descripsit, ad gentis suæ morbi curationem. Probat earum decoctum Syluius ad dentium doloris sedationem, si eos colluatur. Valet earum cinis cum pice, secundum Dioscoridem, vel potiùs cum melle, secundum Plinium, ad explendas inanitates Alopeciarum. Vnguenta & emplastra quibus permiscuntur, siccandi, discutiendique vim habent, præse in in iuncturarum doloribus. Contra serpentum omnium venena pro antidoto sunt, inquit Dioscorides, si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusque earum itidem sorbeatur.

Ranarum
varietates.

Omnes autem Ranae esculentæ minimè sunt: earum enim multæ sunt varietates, nam quædam in aqua tantùm delectantur, maiorèque partem vitæ in illa transigunt, aliæ in solo arido: quædam amphibie, quæ eque in aqua & terra sicca degunt.

Ex aquaticis, nonnullæ in aqua palustri ac cœnosa viuunt, & perniciosæ sunt, ad bufonum enim naturam accedunt, aliæ in aqua limpida, vt fontium, & fluuiorum, quæ non insalubres sunt, & inter cibos referuntur.

Diopetes ra-
na.

Ex his quæ in aridis locis victum quæritant, aliæ inter arundines, aliæ in rubis, ac vepribus & frutetis viuunt: illæ calamitæ, quæ omnium minimæ sunt, hæ Rubetæ Latinis, Phrynoi Græcis dicuntur, quæ palustribus non sunt minus perniciosæ, vt etiam Dryophites, quæ quercus scandunt, & in his, & sub his degunt, quæ sunt viridissimæ, & Diopetes, quæ per tempestates & imbres tepidos ex aëre decidunt.

Gyrini
quænam
insecta.

Omnes autem hycem mutæ sunt, atque inter eas, vocales tantùm sunt aquaticæ, quæ circa hyemis finem, & veris initium solummodo coaxare incipiunt, quando scilicet in aquis putrentibus secus vias gyrini procreantur, quos male ranarum sperma, aut ranarum pullos nonnulli vocitant. *Arist.*

Hinc Chymiatri cuiusdam à multis irridetur medicina, qui aquam spermatis ranarum ad omnes oculorum, faciei, totiusque corporis phlegmonas imperat. Posset enim totius Gallie ranas venari, exenterare, vasa seminalia perquirere, secare, exhaustire, nec vnquam suæ campanæ fundum illarum spermate oblinire.

Gyrinos autem sponte ex limo terræ nasci, nec in ranas abire experientia docet, & doctissimus Rondeletius notum fecit, libro de palustribus. Scio quosdam peritos minimè nobis assentiri, mordiculis asserentes illam terræ mucaginofam illuuiem, seu gyrinorum pulliciem, quæ vernis imbribus in multis stagnantibus aquis repe-

ritur, esse sperma ranarum, ex quo gyrini, & ex his ranæ procreantur, quibus scilicet mox pedes figurantur, ut loquitur Plinius, cauda se findente in posteriores. A ratione tamen videtur alienum, ranas mares, si extra se semen effundant, in aquam eijcere, & seijciant tanta crassitie & copia ut ranas ipsas superet: Ex mille siquidem ranis vix posset spermatis libræ quadrans haberi; & quod notatu dignum in locis multis secus vias, in quibus vernus imber colligitur, immoraturque diutius, tanta sæpe istius pulliciei gyrinos proferentis reperitur vbertas, ut aqua citius desit, quam desit, ranis licet nullis inibi visis. Experientia enim compertum est vere limum istum & ex limo gyrinos sponte nasci. Nam & stirpes multæ, imò & insecta, penè dixerim innumera certis anni temporibus absque ullo semine & hominum opera in terra, & è terra procreantur, sic & in mari, & in aquis ex aqueis animalcula exurgunt infinita, quorum aut sexus discretio nulla, aut ad prolem frustranea perhibetur.

Plin. cap. 51. lib. 9. Sic illa quoque mucago punctis nigris maculata, quæ gyrinos profert à ranarum spermate nec rudimentum, nec fermentum, nec incrementum habere in multis locis obseruavi, in quibus ranæ nullæ visuntur, audiuntur, inueniuntur: Atque in permultis paludibus & stagnis, quæ ob innumeram ranarum propaginem & coactionem magnates odio habere non semel audiui, illa ranarum spermatis supposita conglomeratio, seu gyrinorum pullicies nulla aut pauca reperitur. Sæpe quidem obseruavi ranas in dicto bullato limo sese occultare, circuncirca natare, & quasi lasciuiare, sed semen eijcere, & ex eo gyrinos, & ex gyrinis ranas procreari dictamen rationis vetat. Nam si coeant ranæ ut vidimus sæpe, & superueniāt prioribus pedibus alas foeminæ, mare apprehendente posterioribus clunes, nonne ex hoc congressu grauidatæ foeminæ ponent ova, aut parient fœtus, aut vtriusque semina mixta in aquas eijcient.

Gyrinorum autem metamorphosis æquè facilis est atque lapidum Deucalionis in viros: Non longius siquidem hirudo quam gyrinus à rana distare videtur: & qui ranarum anatomen accuratè fecerunt, conspexerunt, considerarunt, gyrinum ranæ embryonem, aut ranam inchoatam, ni cæcutierit, inficiabitur. Ista enim ficta transmutatio vel momento fit, quod est absurdum, vel debito tempore, quo medium quid cerni potest, quod nec propriè gyrinus, nec rana est, sed gyrinorana.

Demus vero ex ranarum attritu ova gyrinifica fœcundari, certum tamen est multa loca, in quibus vernalis pluuia colligitur, ranis omnino vacua esse, quæ ista glutinosa pullicie multum abundant, ut notatum est, ex qua gyrinorum quidem, sed non ranarum progenies sobolescit.

Præterea quæ in vepribus & rubis degunt, quæ ex aere decidunt, ut literarum monumenta testantur, quæque resolutæ fuerunt in

limum, & rursus vernis aquis renascuntur, vt asserit Plinius, ex dicta mucagine nusquam propagantur: Hæc enim gyrinos tantum profert, quos in ranas facessere, cum diuersæ sint speciei, à ratione videtur alienum. His siquidem facile non assentior, qui istius transmutationis facilitatem bombycis in papilionem mutati exemplo portendunt: alæ enim bombyci, vt etiam formicæ partes sunt post-genitæ, vt crista gallinaceo, nec specie distat bombyx alatus à non alato; forma enim interior vtriusque eadem est, licet exterior a accidente tantum quodam dissentanea, à cuius aduentu conquiescit, quia finis est illius: Nam bombyx non ponit oua, sed papilio, seu bombyx alatus, ex cuius ouis licet primum oriantur bombyces, eorum tamen actus naturæ votis & intentioni non satisfacit antequam adoleuerint, aligeri sint, & in papiliones mutati: At ista mutatio naturalis est, consueta & ordinaria, gyrinorum verò in ranas metamorphosis, nec naturalis, nec visa, nec possibilis. Neque adhuc vrget exemplum aliud de tritici in lolium, aut mentem in mentastrum mutatione. Hoc enim accidit ratione soli & cæli, quæ vim habent plurimam ad accidentium externorum immutationem. Hæc si studiosorum animam non expleant, eorum libros perquirant, qui de aquaticis animantibus scripserunt.

Sunt vero ranæ omnes malignæ & esu perniciosæ, præter aquaticas, vt etiam quæ inter eas punctis pluribus nigris sunt maculatæ bufonum ritu, quorum naturæ sunt participes. Et qui esculentis sæpe vtuntur, ait fide dignus author, colore plumbeo inficiuntur, propterea non cibi, sed medicamenti ratione sumi debent: Reddunt enim corpus putrefactioni opportunum.

Ad emplastri autem Ioannis de Vigo confecturam, alij ranas palustres, alij rubetas adiiciunt. Ego amphibias prætulerim.

Rubetæ enim & quæ in vepribus, dumetis, locisque siccis degunt, venenatæ cum sint & acriores, qualitatem quamdam medicamento impertiunt, qua id ipsum cutim vellicat, & pustulas interdum excitat: aquaticæ verò inefficaciores. Quæ in aqua partim, & partim in solo victitant, vt mediæ sic eligendæ.

De Cancris. CAP. XXIX.



RUSTACEORVM piscium innumera penè est varietas, quorū alij longū habent corpus, vt Locustæ, Astaci, Squillæ, alij rotundum obtinent, vt Cancrorum omne genus, tam marinorum, qui quāplurimi agnoscuntur, quam fluuiatilium, qui multò pauciores & minores reperiuntur.

Vt Cancrorum marinorum alij sunt maiores, vt Mæx, dicti, & Paguri, alij minores, vt Pinnophilaces: sic fluuiatilium nonnulli ma-

gni sunt, cancris latipedibus marinis similes, sed maiores, aliiparui, Astaci dicti, quos vulgus cancras fluuiatiles vocat, & in cibis & in medicamentis vsurpat, vt ad hecticos Auicennæ consilio reficiendos, ad cane rabioso demorsos, & ad vnguenta quædam mundificatiua apparanda.

Cancrorum autem multiplex genus abundè describitur à Rondeletio lib. 18. de Piscibus, & libro particulari de fluuiatilibus, vt etiam à Mathiolo super Dioscoridem.

Sat enim est nobis de his in genere mentionem fecisse, & de quibusdam paulò vberiùs, qui nunquam ad medicos adhibentur vsus.

De Viperis. CAP. XXX.



VIPERARVM caro plurimum siccatur & digeritur, & moderatè calefacit. Vis eius ad cutem properat, & corporis excrementa ad eam propellit, atque virus si quod sit, oppugnat. Vnde ex illa, eo modo, quem in Officina docuimus, appparata fiunt trochisci Theriaci, & ex his percelebris illa confectio Theriaca ad venenatos affectus tantoperè commendata. Vnde & medicamenta theriaca dicuntur, quæ venenis ab animalium morfu intrò subeuntibus medentur; vel quibus noxa ab animalium venenatorum seu morfu, siue instratu, siue illitu aut suffitu illata curantur.

Vocantur etiam alexipharmaca, quòd ex veneno periculum arceant: Alij tamen hæc tantùm sic dici medicamenta, quæ veneno intro per os sumpto medentur, perhibent.

Dicuntur autem Theriaca ἀπὸ τῶν θηρίων, id est, à feris & venenatis animalibus, potius quàm à serpentum quadam specie certa, quànquàm vipera, in cuius genere mas nomine proprio, ἔκλις, fœmina ἑκιδνα vocatur, à Græcis aliquando θηρίον dicatur. Videtur enim omnium serpentum ac ferarum maximè insignis, & καλέσονται nomen hoc interdum sibi vendicat: Ob id Theriaca non tam sic dicitur, quod viperarum carnem recipiat, quàm quod ferarum morfui conueniat.

Est autem vipera longitudine cubitali, & sæpe prolixiore, colore subflauo, pluribus conspersa maculis rotundis. Mas Græcis dictus Echis, caput habet angustum, & acutum, collum crassius & reliquum corpus tenuius, quàm fœmina. Paulatim illi cauda gracilescit, aliarum serpentum ritu, non aceruatim, vt Echidna, seu fœminæ. Squamas habet ad extremum caudæ asperiores, quas ira percitus subrigit, non aliter quàm gallinaceis iratis plumæ inter pugnandum rigent.

Dentes canini duo illi, fœminæ plures, iuxta illum Nicandri à Gorrhæo traductum:

corrhæ.
120.

*Huic gemini apparent dentes in carne venenum,
Fundentes, verubus sed fœmina pluribus atrox.*

V v v iij

Huic adhuc meatus est in cauda, ventri propinquior, contra quam in fœmina, cui ille ad extrema caudæ propius accedit, incessus quoque mari alacrior.

Viperæ fœminæ.

Viperæ fœminæ subrufæ sunt, e'ata ceruice, oculis subrubentibus & lucentibus, inuerecundi atque feri intuitus. Caput habent latiusculum, caudam breuem & excarnem, & squamis durioribus asperam, nec paulatim gracilesceniem, sed simul & vniuersim, meatumque suum habent ad caudam propius accedentem, & ventrem prominulum, & incessum tardiozem.

Vipera cur dicta.

Dicitur Latinis Vipera, quod vi pariat, vel vt alij malunt, viuum pariat, contra serpentum aliorum morem, qui prius oua in lucem edunt. Vipera quidem ouum procreat piscium ouis simile, sed intra se tantum, tantumque viuos catulos parit membranis inuolutos.

Euenit autem aliquando vt posteriores quærentes exitum, & impatientes moræ diuturnioris, erodant matris vterum, & latera, sicque matricidæ prodeunt. Rarò tamen id contingit; vt nunquam accidisse certum est marem in coitu caput in os fœminæ inferere, illudque eam voluptatis dulcedine vehementius commotam truncare.

Cum cæteri serpentes terræ latibula hyeme subeant, viperæ tamen sese tantum sub saxis occultant, & senectutem exuunt aliorum reptilium more.

Ad confectionem autem Theriaces viperæ omnibus serpentibus præferuntur, quod minus alijs tabificam vim obtineant. Gal. cap. 10. lib.

Abscinduntur verò capita & caudæ, quod pessimum humorem, nempe virus in se contineant. Vipera enim inter feras omnes caput habet perniciosissimum. Certam vero mensuram & capitum & caudarum præscindere, ridiculum esse dicit Dioscorides. de Theriaca. Cap. 11. lib. de Theri.

Abijciuntur quoque interanea, spina dorsi, & venter.

Azurgiæ viperæ parandi modus.

Porro non solum in Italia reperiuntur viperæ ad dictæ solennis Opiatæ condituram aptissimæ, sed etiam in Gallia, vt in agro Pictauiensi, ex quo numerosæ Lutetiam aduehuntur. Ex quarum carne pastilli fiunt, & adeps ad emplastrum Vigonium seruatur. Eius extrahendi & parandi modus facilis est. Adeps primum cum tunicis sumitur, & aqua limpida ac frigida pluries lauatur, donec ipsa syncera remaneat. Dein, membranæ separantur. Tum adeps in duplici vase liquatur spatula lignea subinde agitando. Liquatus colo transmittitur in aquam frigidam, quæ postea abijcitur, & solus adeps seruatur, reponiturque in vase idoneo. Nonnulli denuò abluunt, vt totum virus eximatur.

Multi pinguedinem membranulis confusam in albo vino liquant, dein colant & seruant, quæ valde exigua quantitate à singulis habetur, hinc accusantur improbitatis nonnulli myropolæ, quod ommissa viperarum adipe emplastrum Vigonium conficiant.

Vix autem eorum opinioni assentior, qui credunt eos longam senectutem

necesse est agere, qui viperis vescuntur. Eorum enim caro pessimi est succi, valenterque digerit & siccatur, ita ut quidam, qui eam edere, vehementissima sunt siti cruciati, ac proinde illas *Dipsadas* cognominant. Sunt autem qui dicant, ait Galenus, demorsos à viperis, sanari non posse potando, sed dirumpi citius, quam siti liberari.

Cap. I. Elephantiasis porro vipers multum conducere, pluribus historiis *Historia*
lib. II. probat Galenus. Homo quidam, ait, in Asia Elephanticus, cui foedus *notanda*
simpl. erat aspectus, & odoratus grauis, primo quidem cum sodalibus versabatur & conuiuiebat: ubi vero ex consortio nonnulli inquinari capere, ipsæque iam foetore & horrenda forma detestandus esset, in tugurium quoddam iuxta fontem relegatus est, & illi quotidianum alimentum ministratum. Proxima æstate circa Canis ortum, cum vinum fragrans, melloribus allatum esset à famulo, qui urnam vinariam circa marginem agri dimiserat, ecce ubi bibendi tempus aduenisset, adolescens vinum in craterem fundens, una cum vino excidit vipera exanimata. Coloni autem perterriti aqua sitim sedarunt, & vinum Elephantico dedere, misericordia quadam ducti, ac rati expedire illi potius mori, quam viuere in ea miseria. At ille nouo quodam, prorsusque admirando euentu, ab ipso potu conualuit. Excidit enim tota cutis, non secus ac si locustis testam, qua conteguntur, abscideris.

Nec dissimile in Mysia Asiæ, non procul ab vrbe nostra accidit. *Alia historia.*
 Vir erat dirissimus & Elephanticus; hic ancillam suam formosam deperibat, contra, foedum hominem illa odio habebat, alijsque amatoribus clandestinè miscebatur. Cum autem æger spe salutis resarciendæ ad quosdam calidarum aquarum fontes, quibus locus vicinus squalidus erat & viperarum plenus ex illa una in vrceum vini irrepsit, quam cum suffocatam deprehendisset ancilla, gratum habens, quod fors in manum dederat, domino vinum illud propinat, atque ille ebibit. Cui eadem euenire atque præcedenti, & perfectè sanatus est.

Alias adhuc historias recenset Galenus, quibus probat vipers Elephantiasis curandæ multum conferre. Quomodo autem earum caro sit apparanda antequam accedat ad Theriacæ confectionem, in Officina docuimus.

De Scincis. CAP. XXXI.



AROrenum Scincorum optima est contra venena antidotus, & ad stimulandam in viris libidinem, iusto pigriorem efficacissima medicina: Tentiginem enim veretri facit, unde non immeritò Diasatyrus ingreditur confectionem.

Est autem Scincus animal paruum, quadrupes, squamis exiguis,

frequentibus & subluteis tectum, capite longo, vix colli crassitudinem superante, ventre quadantenus alato, cauda rotunda, lacertæ ritu, sed breuiore, & ad terram incurua, à capite ad eam cæsia discurrente linea.

Alumnus est aut Ægypti, aut Indiæ, aut rubri maris, inquit Dioscorides, quamuis etiam inueniatur in Lydia Mauritaniæ. Pro eo perperam nonnulli Salamandram aquaticam vsurparunt. A Plinio Crocodilus terrestris vocatur: Effigiem enim Crocodili Nili perbellè refert.

Inter vtrumque tamen nulla dimensionum proportio; Scincus enim semper est paruus, & rarò cubitalis, Crocodilus non modò ad quindecim, aut duodeuiginti cubita excrescit, sed non vllus ei significatur crescendi terminus, licet ab ouo non maiore, quàm anseris prodierit, vitamque habet terræ, amnique communem. Oculos habet suis, & visum in aqua hebetem, extra acerrimum.

Solum hoc animal, Psittacū si exceperis, maxillam supernam mouet. Linguam habet paruam maxillæ inferiori adhærentem, crura à latere adiuncta, pedes paruos pro corporis magnitudine, ungues robustos, cutem squammofam, crustaceam, & contra ictus omnes ferè innictam, in ventre satis mollem. Annos viuit 60. Totidem oua, totidem diebus pariunt, totidemque dies hæc fouent, vt excludant, & totidem in spina vertebrae habent. Totque adhuc dentes habere comprehenduntur, quot dies sine cibo in latibulis hyeme degunt: pleniorẽ Crocodili descriptionem ex Aristot. Plin. & recentioribus multis, qui Ægyptum & Orientales tractus lustrarunt, curiosus rerum scrutator habebit.

De scorpionibus. CAPVT XXXII.



BX Scorpionibus oleo infusis & extinctis fit oleum, quod ab hisdem cognominatum multos vsus in medicina præbet. Illitum enim, calculos in renibus & vesica atterit, pellit, & vrinam mouet: Demorsos à viperis, aut alijs serpentibus & feris venenatis sanat. Axillis & inguinibus si adhibeatur tempore pestis, ab ea vel præseruat, vel curat. Vulnus ab hisdem inflitum, non modo dictum oleum sanat, sed & ipsi triti & appositi idipsum ad perfectam sanitatem ducunt.

Est autem Scorpio animalculum terrestre, longam & nodosam caudam gerens, in cuius extremo, longo & obliquo armatur aculeo, tenui foramine peruiro, quo venenum pungendo effundit. Brachia habet & chelas bisulcis dentatas forcipibus: Semper cauda præsto est ad ictum, nulloque tempore deest feriendi occasione, feritque obliquo ictu.

Scorpio mas in ventre & chelis maculas gerit, eique virus perniciosius, fœminæ mitius: alij contrarium scribunt.

Scorpionum autem octo recensentur genera, primum albicat, nec lethiferum putatur; secundum ore rufescente, ex cuius ictu vehemens ardor sequitur & inexhausta sitis. Tertium nigricat, cuius ictus membrorum deprauat motum, & facit amentes & risus edit ineptos. Quartum ad viridem inclinat colorem, & plura habet in cauda internodia, nempe septem. Ab eo icti perpetuum & ingens frigus sentiunt, etiam feruentissima æstate. Quintum pallido ac liuido colore est, à quo qui percutitur, ei tumor inguinis superuenit. Sextum paruulo cancro marino simile est. Septimum chelas habet grandiores, & cancro paguro formam valdè similem. Octauum Melichloron, à melleo colore dictum, alas habet locustæ similes, & extremum nodum caudæ nigrum.

Scorpionū
multa ge-
nera.

Rari autem apud nos Scorpiones visuntur alati, in India & Africa frequentes & magni, & cum septem in cauda internodijs.

Si à colorum varietate Scorpionum varietatem sumamus, alij dicuntur flauj, alij rufi, alij cinerei, alij virides, alij ferruginei, alij vinosi, alij albi, alij fuliginis colore.

Scorpionum autem ictum fœminis periculosiorem esse, quàm viris cōpertum est, ~~etiam~~ in virginibus, quibus ferè semper lethalis est, nisi maturè succurratur. Et qui septem in cauda habent internodia longè sœuiiores iudicantur.

Scorpionū
ictus quib⁹
deterior.

Vermiculos ouorum specie procreant & incubant, ex hisque prolem suscipiunt, quam vbi perfecerunt, ab ea pelluntur, dicunturque Scorpiones à suis liberis interimi: Sed hæc de virosis istis animalculis, plusquàm res pharmaceuticæ postulant dicta videntur.

De Lumbricis. CAP. XXXIII.



NIMALIA multa parua ex vermibus, & vermes ex multis animalibus magnis generantur. Imo ex rebus omnibus alteratis & putrentibus fit horum animalculorum procreatio, intra lapides, ossa, ligna, fructus, caseum, carnes; videnturque omnia in vermes primùm abire, nam hominis propria caro à ver-

Arist. mibus absumitur, veluti vestimentum, quod comeditur à tineæ, *cap. 19.* vt loquitur Iob. Et licet quæ frigida sunt, putredini maximè resistant, ex niue tamen frigidissima vermes generantur, & visi sunt *lib. 5.* in salis horreo nōnulli aliquando procreati. In animalibus quoque *de hist. anim.* viuētib⁹ quotidie generantur, quorum scilicet corpus putridis humōrib⁹ scatet: Ibi enim vermium generatio, vbi putredo, quæ *Cap. 17.* illorum est mater. Viciū ē vena brachij secta, vnā cum sanguine vermem palmam longum profilire. In intestinis adhuc, & alijs multis *lib. 2.* *de hist. animal* humani corporis partibus generantur, necnon in ceruorum cap-

Historia.

Omnia autem insecta vermem generant, excepto quodam papilionum genere: vt qui ab insectis prodit, in aliud sæpe insectum dissimile accrescit, iuxta illud poetæ, & *fio volucris, qui modò vermis eram.*

Porro cùm latissimum sit vermium genus, de terrestribus nunc tantùm loquor, qui in medicos admittuntur vsus. Ex his enim albo vino lotis, apparatis, in oleo maceratis, ac vase duplici vt decet elixatis, habetur oleum, ad neruorum affectus commendatissimum.

Per os quoque sumuntur aliquando, ritè præparati, loti nempe, siccati, tenuissimè lauigati, & alijs quibusdam pulueribus admixti, ad fœdos virginum colores sanandos.

A multis intestina terræ vocantur: ab alijs vermes terreni, à quibusdam lumbrici terrestres, Corpus habent oblongum, rotundum, minimè osseum, & oculos nullos, vt neque aures. Ita ingrediuntur, vt præcedente parte priore, reliquum corpus ad eam contrahant, sicque è loco vno in aliam feruntur.

Procreantur è limo terræ & ab eadem caussa, atque cætera animalcula & insecta animantur. Oculis, auribus, pedibus, artibus destituuntur, suntque velut oblongæ & crassiores fibræ, nullam partium discriminationem obtinentes, præter internodia quædam & velut aponeuroses, quæ paulò ultra medium corpus conspiciuntur.

Hos pluuix vernaes, aut hybernae, nec glaciales, sed temperatiores eliciunt. In terra pedibus conculcata, nec liberè, nec vberè gignuntur: In pingui, nec trita frequentes inueniuntur. Hi triti & appositi præcisos neruos, vt etiam vulnera recentia conglutinant. In dispensarijs solenty sculi nominari.

De Cantharidibus. CAPVT XXXIV.

Cantharus
& cantharis
differunt.



CANTHARIDES tantùm nomine tenùs, cantharis seu scarabeis conueniunt: magnitudine enim, colore, & natura multùm inter se dissentiunt. In vsus enim medicos sæpe trahuntur cantharides, canthari nunquam. Illas siquidem probat Galenus ad psoras & lepras, & ad vetrica sæpe medici practici salubriter.

Sunt verò putida animalcula, quoniam ex tali materia constituta inquit Aristot. & in multis fruticibus, vt ligustro, & in arboribus proceris, vt fraxino numerosæ procreantur, aluntur, reperiuntur. Probantur & in frumento inuenta, versicolores, & quæ transversas in alis lineas habent, oblongo corpore.

Aptiores verò sunt, si in vas fictile, aut aliud idoneum iniiciantur, cuius os raro linteo subligatum deorsum vertitur, vt excepto halitu aceti quàm acerrimi feruentis æstu exanimentur, postea siccan-

tur, & in pyxidibus ligneis, aut vasis vitreis, fictilibusve reponuntur, & per biennium seruantur.

Cap. 22. lib. 5. sim- pl. Parua quantitate nonnunquam medicamentis permiscuntur, quæ *Historia.* vrinas mouent, etiam Galeni consilio, qui integras præscribit libro vndecimo simplic. Recentiores tamen alas & pedes abiiciunt. Cum nobilis matrona Lutetiæ febre continua renum esset, aliisque grauib. comitata symptomatis laboraret, & suæ sanitatis curam Dom. martino doctissimo & clarissimo medico Parisiensi, commisisset, quorundam suasu Riuerium aulicum medicum accersuit: hic mox ubi pulsum egræ contrectauit: si me, inquit, citius vocasset, dragmam vnā cantharidum regioni renis magis affecti adhibuissem, & statim conuallisset. Sicque discedens anxiam reliquit matronam, & medicum ordinarium, hominis malè sani humoribus, moribus, dictis & factis attonitum; qui tantum abest, ut tantam cantharidum cateruam, ut ne quidem vnā adhibuerit, & sanitati suam egram restituit. Nam cum cantharis siccissimum leuissimumque sit insectum, vix quidem granum vnum pendere credibile est. At verò sexaginta cantharidas, tot enim dragma pendet, reni ad mouere æstuanti, quid nisi carnisficium: hæc tamen obiter dicta sunt, non ut homini succenseam, sed ostendam cantharides vesicæ inimicissimas & renibus, & partibus hisdem inflammationem inducendo multum aduersari; pauca tamen quantitate medicamentis alijs mixtas nonnunquam prodesse.

De Formicis. CAP. XXXV.



Ecce formicis adhuc pharmacopœorum tabernæ destituuntur, è quibus oleum paratur ad receptos vtile, & que vsus commendatum. Partibus enim generationi dicatis iustò frigidioribus competit calefaciendis, & ad statum meliorem ac vegetiorem reducendis.

Insectorum autem laboriosissimum, officiosissimumque genus formicarum, quæ non interdiu solum, sed etiam noctibus plena luna laborem exerceant, & eadem semper semita ambulantes, cibaria ad cellas promptuarias deferunt, & in annum reconduunt. Animalia non venantur pusilla ut araneæ, sed reperta & mortua degustant, grana congerunt, & onera morfu gerunt.

Sunt verò formicæ vel alata, è quibus infusis oleum formicarum dictum paratur: vel impennes, quæ frequentiores in locis siccis & minus cultis reperiuntur, quibus vsu ægrotantes sanitatem quarunt.

Oleum formicarum.

Est in Indiæ quibusdam regionibus, in quibus aurum effoditur, quoddam formicarum genus, quod magnitudine vulpem æquat: Inuenio & quædam paruulas Hippomyrmeces, seu Equites dictas,

& alias quasdam Herculaneas; alias Solifugas & Solipugas, sed cum pharmacopœus nusquam his opus habeat, pluribus illarum historiam describere nolo.

De Serico. CAP. XXXVI.



A nūc gloria datur vestibus bombycinis, quæ olim byssinis, quibus primi seculi reges tantum induebantur, & in Euāgelio legimus diuitem quemdam bysso & purpura vestitum. Erat autem byssus tenuissimi lini genus proximum ab Asbeto dignitatem obtinens, ex quo subtilissimæ fiunt vestes, quæ mulieribus præcipuè olim in delicijs erant, inquit Plin. qui circa Elim Achaia nasci scripsit, Pollux verò in India & Ægypto. Pausanias in Græcia ex arbore populo haud dissimili, folijs verò salicis. Seu autem herba, seu arbor sit byssus, nobis est prorsus incognita planta, quæ non solum frondes, sed lanam quoque tenuissimam profert, quam Seres, Scythiæ Asiaticæ populi artis nendi peritissimi depectunt, & in fila exilia ducunt, ex quibus vestimenta ditioribus dicata conficiuntur, quæ à Seribus Serica dicuntur. Asbetum vocant vel lapidem quemdam ferrei coloris in Arcadiæ montibus nascentem, qui semel accensus extingui non potest, vel linum, aut stamen ex quo mappe texuntur, quæ flammam concipiunt quidem, sed non vruntur, cuiusmodi esse dicitur alumen plumeum, lapis Amiantus multis dictum.

*Cap. 1.
lib. 19.
hist.
nat.*

Apud nos autem nec eiusmodi stirpes byssigeræ, nec vestimenta ex earumdem lanugine contexta visuntur, sed tantum bombycina, quæ nunc, ut olim byssina Serica nuncupantur, & ad eisdem dignitatis non modò gradus, sed præterea medicos vsus multos commendantur. Nam apud pharmacopœos Arabum dogmata sequutos, adeò inualuit de bombycino stamine opinio, ut credant omnes bombycinum filum, sericum vocant, sanguinem purgare, virtutem vitalem roborare, cor recreare, spiritus illustrare, facultates omnes reficere, & spiritus omnibus opem ferre. Hæc sunt encomia bellissima, quibus Barbari excrementum insecti virosi nobilitarunt. Quia verò liberum est cuique philosophari, & de re qualibet proposita sententiam ferre, ingenuè dico me parui facere ad medicos vsus sericum bombycinum: Est enim siccum animalculi imperfecti excrementum, inodorum, exuccum, araneorum retibus, aut erucarum telis cognatum, homini sanando ineptissimum & inefficacissimum. Licet nunc grauidæ mulieres abortum reformidantes, clinicarum consilio, ex ovo sorbili ieiuno ventre sericum minutim concissum sumant.

Sericum
quid.

Forsan byssinum, quod ad bombycinum recentiores transtulerunt, vires quasdam habet non temnendas, sed cum nullibi reperia-

tur, aut ad nos minimè deferatur, de illo ne quidem per insomnium pharmacopolæ loquuntur. Miror autem multum, qua ratione ducti crudum sericum nonnunquam ægrotis exhibeant: Cocco quidē tinctum vires quasdam promit eximias, sed mutatas tantum, & ab infectione Kermes acceptas. Proinde mallem ego per se grana Baphica præscribere, quam eorum succum inficiendo serico frustra impendere. De hac autem re iudicent Apollinæ artis peritiores, qui non nisi quod ratione est stabilitum, pro lege habent.

Sunt verò Bombyces animalcula ex parvis seminibus rotundis & nigricantibus, quæ oua nominant, leui calore fota, animata & in minutos vermes primùm conformata, qui frondibus vtriusque mori, sed potissimum albæ contecti & educati, paulò post cùm adoleuerint, tenuissima nent stamina, seu fila sericea ex se emittunt, quibus ad luxum panni pretiosi contextuntur.

Bombyces
quæ ani-
malia.

Adhuc autem adultiores facti gignunt ex se cucullos & folicula, in quibus sese recondunt, ibique post aliquot dies in papiliones candidulos abeunt, qui inuicem pariunt semina, seu oua paruula, è quibus denuò vermes alij generis eiusdem nascuntur. Hæc autem cùm sint etiam pueris & mulieribus notissima, longiorem descriptionem minimè postulant.

Byssus autem, vt obiter dicam, duorum generum agnoscitur, terrenus & marinus. Terrenus in Elide Græciæ prouincia & in Iudea olim copiosus nascebatur, eratque lini species, splendorem auri referens, quod ex arbore quadam etiam haberi multi credunt ex veterum monumentis, qui linum id omnia quod netur, appellant. Marinus byssus dicitur, qui ex pinna quadam marina excerpitur, cui velut tenuissimi capilli connascuntur: vnde vulgò capilli Nacræ perlarum vocantur, laudanturque plurimum ad surditatem impediendam vel minuendam, si ad auditorium meatum adhibeantur & gestentur.

Felle multorum animalium, iecore & intestinis luporum, cerebellis passerum, testiculis gallorum & asellis qui sub vasis aquarijs delitescunt, ὄγροι Græcis dicti interdum medici vtuntur, sed hæc cùm descriptas in Officina nostra compositiones non ingrediantur, fusiùs describere nostri non est instituti. Sicque tribus libris Medicam materiam breuiter & perspicuè diuini numinis subsidio fulti perstrinximus, cui laus, honor, & gloria in omne æuum.

Finis Libri Tertij.



X x x iij



OFFICINA
PHARMACEVTICA,

DVABVS PARTIBVS DISTINCTA.

PRIOR DE MEDICAMENTIS
internis, altera de externis agit.

Quibus brevis præmittitur Isagoge.

Authore IOAN. RENODÆO, Med. Paris.



P R Æ F A T I O.



ORVM quę natura rerũ genitrix gibo terrę vel exposuit, vel visceribus inclusit, cū maior portio homini inferuiat alendo aut medicadō, nec semper liceat, nec quauis hora, dū rei necessitas exigit, illius penetralia subire, aut cis maria confestim exotica simplicia perquirere, iustis rationibus artis Medicę proceres statuerunt, vt in Pharmacopolijs ad futuros vsus selecta medicamenta, tanquam in penu quodam asseruarentur, perindē ac olim in Æsculapij templo eorūdem formulę à peritioribus magis probatę & expertę describebantur. Cū enim Medicina sit donū Dei, & medicamenta deorum manus, Officina Pharmaceutica, si non diuitijs, saltem dignitate gynecæo quouis est præstantior, in qua, quicquid totus complectitur orbis, quod sanitati tuendę, aut resarciendę cōferre potest, tanquam in sacra pyxide coarctatur. Nihil enim medicum ē pelagi sinu, aut abyssi profundo eruitur, nec ab aere quicquā


ad ima nutat delabiturque, quo non luxuriet Pharmacopolium. Ex eo siquidem tot medicamenta depromuntur, quibus humani corporis hostes morbi, causæ & symptomata dimicantur, expugnanturque, seu à Dietæ vitio exoriantur, seu extrinsecus adueniant; Idque vel à causa manifesta, vt intemperie & solutione continui, quibus febres nascuntur, phlegmone, pterygium, polypus, hepatitis, lienteria, enterocoele, œdema, scirrhus, & alij pene innumeri; vel à causa latente, vt pestis, Indica lues, Hydrophobia.

Porro non vt vbique terrarum, sic locorum Officina Pharmacopœorum, in qua nempe medicamenta præparantur, reponuntur & venduntur extrui rectè potest, sed certis in locis, vt meliùs asseruentur ipsa: alijs, vt citiùs, ac pluris vaneant, vtilius erigitur. Minimè tamen ferendi sunt auari Seplasiarij, qui lucro nimis inhiantes, domũ in vico sordibus conspurcato, infalubri, ac penè congestio sitam, modo emptoribus & singulis transeuntibus obuiam, seligunt, in qua medicamenta non conficiunt, sed inficiunt. Velut Botanopolæ multi, qui varia simplicia & adhuc viridia Lutetiæ vendunt in triuio maioris fori olitorij. Illic siquidem permulta simplicia vœnalia reperiuntur, sed quæ sæpe diu asseruata, inquinantur luto, vel putrēt ac contabescunt.

Hæc autem potissimũ in Officina Pharmacopœorum spectanda sunt, situs, instrumenta necessaria, quibus scilicet medicamenta parantur, vasa in quibus reponuntur, simplicia quibus constant, eorum facultates, & particularis ea medicamenta componendi modus, quæ ad futurarum ægritudinum præcautionem aut curationem asseruantur. In nostris verò institutionibus ea seligendi, parandi, vt & componendi præcepta generalia dedimus, remediorumque formulas omnes quæ in rem præsentem imperantur accuratè descripsimus, nec ad perfectum Pharmacopœum quicquam præter ea desideratur, quàm vt his præceptionibus rectè institutus & in cognitione simplicium, atque eorum maximè, quæ tribus libris de materia medica peruestigauimus, optimè versatus, medicamenta in Officinis asseruanda, vt & alia quauis solerter componat. Quod in hoc opere secundo, iuuante numine, exequi pollicemur, præmissis quibusdam, in hac Isagoge, quæ ad Pharmacopolatum Officinam spectare videntur.

De Domo & officina Pharmacopœi. CAP. I.

Hip li.
de ve-
ter.
med.



PRIMA omnium ætate fructus erant homini pro pane, aqua pro vino, & forsan idem alimentum, atque boui & equo. Sed cum illius nutritioni & sanitati fruges, & quæ ex terra sponte nascuntur, minus sufficerent, ex tritico macerato, à cortice purgato & trito primi patres panem confecerunt, vel

Auso-
nius.

potius pultem, qua etiam populum Romanum longo tempore vixisse certum est. Nauseante tamen stomacho super eiusmodi cibo, nec solo pane contenti, aues quoque cœperunt gustare, dein feras, piscesque venari. Sicque luxuriante paulatim cupedia, vitis cultum, & mille alia gulæ irritamenta adinuenerunt, cum olim communis pecori cibus, atque homini glans, inquit Aufonius, communis & utrique domus, arboris umbra.

Alex
ab A-
lex.ca.
24.

Isto siquidem quo priore, latebræ erant pro ædibus, tecta sylvarum pro tugurijs, rupes & loca verrucosa pro urbibus. Atque longo, postea, tempore, Dardani sub fimo sordidas ædes habuerunt, & Baleares in saxis concavis, ut adhuc hodie Indi multi suas ædes ex ostreorum vel testudinum testis construunt. Alij ex arundinibus, aut alijs palustribus herbis intertexunt.

Nunc verò, ut hominum mores politiores sunt, & victus lautior, sic singulorum domus dissimili multum materia, artificioque extruuntur. Sunt qui in medio flumine ædificant: alij in montium cacumine, nonnulli in sylua, alij ad maris litus, pro cuiusque arbitrio & voluptate.

Domus verò Pharmacopœi in nullo istorum loco extruenda, sed in vrbe potius, quam in oppido, in loco aëri exposito ac lucido, quam opaco & umbroso, & in vico emaculato, vel ex se nitido, quam sordibus inquinato.

Sit verò satis ampla, excelsaque, ut in horreo, seu parte illius superna, simplicia reponantur, quæ non nisi arido in loco fœliciter asseruantur: In inferiore, ut in cella vinaria, quæ locum vdem postulant, ut cassia & vinum.

Inter utramque multa cubicula sunt, vel saltem vnum, in quod Pharmacopœus sese recipiat. Subtus verò Officina amplissima, quadrata, & lucida, ita tamen, ut neque sol medicamenta nimis calefaciendo, liquando, vel siccando non noceat, neque ventus vehementius irruens molestus sit.

In ea duæ ianuæ debent extrui, antica vna, quæ foras pateat, ad vestibulum scilicet Officinæ, altera quæ det ingressum ad popinam & aulam proximam: In qua Pharmacopœus non modò epulabitur, sed prudens obseruabit per fenestellam in intermedio septo structâ,

quid in Officina agitur, quid datur, quid accipitur. Sic enim velut in excubijs positus aduertet in tyrones, ne vel in otio degant, aut minus accuratè fideliter exequantur, quibus dominus opus habet.

In alterutro culinæ angulo propè caminum, constituatur velut æstuarium, seu Hypocaustum, in quo saccharum, tragemata, & solidæ confectioes, ad tutiorem conseruationem reponantur. Et si loci permiserit amplitudo, proximè taberna quædam posterior extruatur, in qua recondantur multa semina, fructus, atque illa simplicia, quæ non nisi magna quantitate à Pharmacopœo solent emi, vt Oriza, pruna, amygdalæ, mel, semina quædam, radices, & ligna plurima.

In Officina verò medicamenta potissimum reponantur composita, vt & simplicia quædam, quæ vel rara sunt, & pretiosa, vel quæ non ita rara, sed ad frequentiore vsum expetita, vt Tamar-Indi, passulæ, glycyrrhiza, polypodium, senna.

Vt autem in Pharmacopolio medicamenta optimè disponantur, ab ima eius parte ad supernam asseres multi per classes eo ordine collocandi sunt, defixis ad parietes & septum medium, quo à popina dirimitur, mutulis, aut clauis ligneis, ferreisve, vt quædam eorum classis arculas suffulciat minores; alia maiores; quædam vasa fictilia; alia vitrea, alia stannea; alia pyxides. Ea tamen prudentia ac sedulitate, vt quæ sunt in vfu frequenti & in raro, non in classe eadem collocentur, sed illa in propinquiore, quæ scilicet ad manum sæpe debent esse, hæc in remotiore, quæ videlicet rarius veniunt ad medicos vsus.

Singulis verò vasis, vt & sacculis, ad trabes & tigilla suspensis, medicamentorum inclusorum nomina inscribantur, vt citius medicamentum exhibendum seligatur, neve alterum pro altero sumatur.

Quod si fenestræ domus vel solem versus non pateant, vel non sint capaces satis, vt vasa figulina quæ conseruas, vel lagenas quæ stillantias aquas continent insolandas admittant, in anteriore illius parte modo soli meridiano, vel vigenti exposita, aliouin in alia aliquot asseres ita disponendi, & firmandi, vt quicquid ex Officina vi solis ad superfluam & crudiore humiditatem aut resoluendam aut coquendam, aut empyreuma fugandum indiget, ibi ad debitum tempus reponatur.

De instrumentis Officinæ necessariis. CAPVT II.

Instrumenta
utilia.



NUMERA suppellex est Officinæ vel utilis tantum, vel prorsus necessaria. Utilis est, quæ rarò inferuit, vel quæ ad apparatus maiorem, ornatumve expetitur: Cuiusmodi sunt multa vasa argentea, quibus ignari quidam apud vulgus gloriam captant. Quod enim doctrina nequeunt, isto luxu externo comparare student, reprehendunturque ab Hippocra-

te, qui talem ornatum, ac curiosam suppellectilem odiosam & illiberalem vocat.

lib. de
med.

Necessaria est illa suppellex quæ inseruit medicamentis, vel reponendis, ut vasa multa terrea, vitrea, argentea, stannea, plumbea, cuprea, ænea, syrupis, sapis, eclegmatis, electuariis, pulueribus, oleis ceratis, vnguentis destinata, de quibus postea, vel parandis, ut pilæ, mortaria, pistilla lignea, lapidea, aut metallica, spatula, cacci, lebetes, pelues, patinæ, patellæ, frixoria, sartagine, lime, scalptra, cribra, colatoria, torcularia, manicæ, trutinæ, forfices, cultri, marmoreæ tabellæ; alembici multiplices, canales refrigeratorii serpentinii dicti, infundibula, & alia pleraque, quibus aut raro, aut semel tantum in anno Pharmacopœum uti contingit.

Suppelle.
ctilia Chy.
mica falla-
ciæ instru-
menta.

Præter hæc Chymicis aliquot peculiaria suppellectilia sunt, quæ facetus quidam non illepide fallaciæ quam Pharmacicæ potius instrumenta vocavit, hoc tamen de abusu, quam de usu dictum malo.

Multorum porro Pharmaceuticæ officinæ instrumentorum appellatio ac forma citius, quam usus specialis agnoscitur: Scalprum enim, limam, maleum, cultrum, quilibet facile dignoscit. His verò solum utitur Pharmacopœus vel ad dentes apri radendos, aut ebur vel guaiacum, in scobem attenuanda, atque ad ea omnia lauiganda, quæ attritu puluerari non possunt; Reliqui verò artifices ad opera suæ artis industriose peragenda, ut faber ferrarius ad claves effingendas, aurarius ad annulos, monilia aut argentea vasa elegantius formanda: Utuntur & omnes maleis, incudibus, forficibus, duas singulorum opus peculiare destinatis.

Cultrorum
varietas.

Cultri autem Officinæ necessarii non vniusmodi sunt, sed alij aliis maiores sunt, alij oblongi, alij breuiores, alij aliter formati. In frequentiore sunt usu oblongi & mucronati, quibus radices raduntur, ac purgantur, lignorum rami minutiores finduntur, & herbarum cauliculi scinduntur. Breuiores quidam sunt non acuminati, sed obtusi, & dorso seu parte aciei opposita valde crassi, quibus saccharum in frusta secatur. Alii breues quidem sunt, sed latissimi, figura lunari, ac his similes quibus coria sutores diuidunt, quibus semina quædam oleagina, & cortices conditæ, quæ pistillo in puluerem attenuari non queunt, minutissimè secantur.

Inseruiunt etiam glycyrrhizæ in paruula frusta diuidendæ, ut cōfused accedat ad tragetæ communis confectionem.

Est & alius culter omnibus longior, cuius mucro ita reflectitur, ut hamulum efficiat, qui alio hamo in tabula defixo inuncatus, mira vi ligna aut radices diuidit, dum altera manu illius manubrium premitur.

Non omnes autem hæc cultrorum differentię in omnibus Officinis habentur. In multis enim idem qui ceram diuidit, in culina panem secat, & sæpe napos radit. Vastrum enim ancillarum genus, id

sepe mali molitur Officinæ ministris, ut multa furentur ipsæ; vel maliciosè occultent. *De Mortariis & pistillis. CAP. III.*



NTER instrumenta Officinæ necessaria, nullum æquè desideratur, nec in usu adeo frequenti est, atque mortarium. Vix enim quicquam apparatus, aut apparatus in usum venit absque illius ope. Nam cum materia omnis medica, ex magna parte, sic velut rudis quædam ac indigesta moles, quæ rarò, imò nunquam talis exhibetur, qualis è sinu naturæ profiliit, multa in mortario tritura diuidenda est, ducenda, læuiganda, & cum aliis admiscendis subigenda.

Cum autem illa materia vniusmodi non sit, sed varia ac multiplex, varia quoque præparatione eget, non modò quæ sit sola manuum industria, sed etiam instrumentorum adiutu, in quibus non tantùm forma conueniens requiritur, & debita magnitudo, sed præterea idonea materies à qua medicamētum paratum nonnihil mutuatur. Idcirco Pilæ seu mortaria ex varia materia fieri consueuerunt, ut ex marmore, Achate, alabastro, aut alio lapide, ex stāno, plūbo, ferro, &c. in primis Cyprio, quod Cupreū vocatur, ex vitro, ebore, ut etiam ad ostentationem potiùs quàm necessitatem ex argento, vel auro.

Inter marmoris species numeratur Porphyrites, quo fieri debent Mortaria in quibus gemmæ, vel alia mineralia duriora teruntur: vulgare enim marmor quum minus durum sit, quibusdam gemmis terendo cedit quibus ex se nonnihil impertitur, si non noxium saltem superfluum. Fieri possent ex Basalte marmoris specie durissimi, & ferruginei coloris, sed raro ad nos deuehitur.

Sufficit verò vnum plumbeum, aut vitreum, ut etiam lapideum, sed ænea debent esse multa, vnum valde amplum, his terendis quæ vel duriora sunt, vel magna quantitate tundenda accommodatum, vnum minimum, moscho, ambræ, zibetho, bezahardico lapidi, & aromatis similibus læuigandis idoneum.

Inter utrūque multa sunt ac multiplicis magnitudinis, ut alia potioni tantùm, alia clysteribus dissoluendis, aut electariis magna quantitate parandis, inseruiant.

Totidem verò pistilla, quot mortaria & ex consimili materia solēt haberi. Plūbeo enim mortario plumbeum pistillum magis aptatur, vitreo vitreū, æneo æneum; ferreum tamen omnibus metallicis etiā conuenit, ut ligneū semper lapideis, ut & aliis in quibus herbæ recentes tundēdæ recipiuntur. Dū arida teruntur, mortariū papyro, vel corio simplici, vel interdum duplici tegendum, ne vel pulvis tenuior foras euolet, ac pereat, vel molestè nares tundentis feriat.

Ad multa terenda minutissimè tabula marmorea, seu lapis porphyrius vulgo dictus, mortarij vicem gerit, ut molula pistilli, quibus margaritæ & lapilli pretiosi tenuissimè læuigantur, superaffusa pauca rosarum aqua, aut alia, pro Medici scopo.

De spatulis & cochlearibus. CAPUT IV.



SPATULÆ & cochlearia sunt veluti secundæ Pharmacopœorum manus, quibus dum medicamenta in mortario terunt, vel patinis incoquunt, subinde versant, ut æquabilis fiat omnium partium pulueratio & coctio, atque ex ipsis medicamēta apparatus in vasis recondunt, & hisdem vsus tempore eximunt. Dicuntur Spatulæ quòd altera parte latissimæ sint, instar ossium Scapularum, quæ à barbaris spatulæ nominantur.

Est autem omnium spatularum figura fermè eadem, triquetra nempe, ac oblonga, sed materia diuersa. Quædam enim sunt ex argento, ut paruulæ, quibus uti solent Chirurgi multi, aliæ ex ligno, ut palmæ ramo, cuiusmodi ea est rudicula, qua emplastrum palmeum versatur, inter coquendum: Aliæ ex ferro, ut reliquæ fere omnes, vel magnæ vel minores, quibus Pharmacopœi medicamenta molliuscula, ut mel, oleum Hybernum, electaria liquida, & similes confectioes attingunt.

Spatularum materia varia.

Cochlearia ex ferro & Orichalco, ut plurimum cudentur ad Officinam, ex argento ad mensas. E ligno quoque cauuntur ad vsus rusticorum, & tenuioris census hominum, maximè in oppido degentium. Paruula adhuc fiunt ex ebore & cornu, ut quæ minutis speciebus, & quibusuis pulueribus inseruiunt assumendis, & ad trutinam committendis. Quædam præterea in multorum culinis magna & foraminulenta, quibus spumę detrahuntur. Lignea verò & argentea in Officinis sæpius expetuntur. Non item vitrea, quod facile frangantur, nec ferrea, quòd cito rubiginem, aut ærea æruginem contrahant, quibus tamen uti nihil vetat, modò Officinæ ministri sedulò caueant, ne sordida diutius asseruētur, sed statim, ubi inquinata fuere, diligenter abstergantur.

Cochlearium materia.

De Ahenis, & alijs quibusdam vasis metallicis. CAP. V.



AHENUM & cacabum multi pro eodem vsurpant, sed propriè ahenum vas est, ex ære ductum, profundum, operculatum, atque altera parte tantum ansam habens, qua manibus teneri solet, & pro arbitrio claudi vel aperiri. Inseruit ut plurimum aquæ elixandæ, quæ vel sola bibitur, vel vino permiscetur. Idiomate Gallico ac vulgari Coqmartum vocari solet.

Ahenum quid.

Ad eosdem vsus, diuites quibus tuendæ sanitatis, & sæpè vanitatis magna cura est, habent eiu modi formæ vasa argentea, ut aqua cocta minùs nidorulenta sit, nec vllò modo cuprum redoleat.

Patina.

Patina vas est aliud æneum, multo latius & amplius, in quo medicamenta simplicia coquuntur, composita parantur, fructus condiunt.

tur. Huic confixæ sunt velut aures duæ, seu anſæ, vtrinquē vna, vt igni adhiberi, & ab eo remoueri poſſit facilius. Super ferreo inſtrumento tripode, ad ignem apponitur, ſuppoſitis prunis ardentibus, vt incaleſcat, & contentus liquor ferueat.

Eiuſdem formæ aut parum abſimilis, ſed diuerſæ materiæ, ſcilicet figulinæ, vas aliud debet haberi, intus perpolitum, plumbatum, ac vt plurimum vitri viridis, aut Smaragdi modo nitens, ad eorum cocturam, quibus vaſa metallica alienam qualitatem, vt colorem vel ſaporem impertiri ſolent, vt hydromelitum generibus, ſyrupis acidis & acetosis, necnon quibuſdam vnguentis, vt Citreo & Ceratis, vt refrigeranti, Galenø adſcriptum:

Patella.

Patinæ vas aliud eſt affine, æneum & paruum, attamen patulum quod per diminutionem, patella dicitur: cui velut caudex longus, ſeu manubrium ferreum configitur, vt commodiùs imponatur igni, & alterutra manu, abſque noxa, ſeu uſtione teneatur.

In ea coqui ſolent medicamenta, quę parua quantitate deſiderantur, vt doſis vna vel duæ medicamentorum, vt paruum quoddam electarium tabulatum, vt Zulapium roſaceum, & ſimilia.

Sartago.

Sartago aliud patellæ genus eſt, valde patulum, ferreum, ac in longum appendice protenſa caudatum, quo in culina, carnes friguntur, in Pharmacopolio multa ſemina, vt coriandrum cum aceto, ad illius cuiuſdam qualitatis caſtigationem, vt millium cum vino, aut alio liquore parti cuiſiam admonendum.

Cacabus
lebes.

Cacabum Latini cum Græcis lebetem nominant, Barbari Caldarium, aliud quoddam vas æneum, quod crematræ vnco præhenſum ſupra focum pendet, vt quicquid in eius concauo retinetur ebulliat, & coquatur. Popinaria autem cùm ſint hæc dicta vaſa, vt & ollæ multæ figulinę, in his deſcribendis nolo diutiùs immorari, cùm ea facile dignoſcat Pharmacopœus, qui his ſæpiſſimè vtitur ad decocta ſimplicium paranda, & gelatinæ, ſyruporum, vnguentorum, aliarumque multarum confectionum præparationem.

De Torcularibus & prælis. CAPVT VI.



VA sunt & Pharmacopœis parua quędam torcularia, quibus in Officinis ſuccos & olea quaſi torquendo, exprimunt; Pręla tamen magis propriè dici videntur, vel quòd humore profluente præluentur, ſeu mafeſiant, vel materiã

Pręla vnde
dicta.

ex qua ſunt educendi ſucci validiſſimè premant. Fit verò prælum eiuiſmodi ex duabus breuibus trabiculis, magnitudine & forma ſimilibus, quarum ſingulæ foramina duo habent ita affabrè excava-
ta, vt intro ſint velut inſculpti circuli, in ſeipſos non recurrentes in-
ſtar ſpirarum, quibus introducuntur duæ cochleæ, quæ dum extror-
ſum vertuntur trabeculas adducunt, aperiuntque, cùm introrſum,
addu-

adducunt & claudunt, atque materiam interpositam premunt, & succum exprimunt, vel aqueum vel oleosum.

Proinde præla duo debent in Officinis haberi, vnum quod succis aqueis inferuiat exprimendis ex fructibus & virentibus herbis, alterum quod oleis ex oliuis, & alijs pinguibus.

Quæ autem exprimenda sunt antequam prælo subiiciantur vel coctione vel tritura paranda sunt Coctione, vt carnes, à quibus succus exprimendus est, qui solet ægrotis longo morbo attenuatis exhiberi: Titura, vt ligna quædam oleagina, fructus & semina multa. Ne verò diffluant aut dissiliant exprimenda, quodam sacco debent includi, aut forti panno inuolui, vt cannabino, aut setaceo, vt validior fiat compressus, & substantia tenuior à crassiore & succiore facilius, ac tota separetur. Sic oleum amygdalinum dulce, vel amarum educitur, Sic lentiscinum, balaninum, & quod è nucibus, vel nucleis Perficis, vel semine lini, aut ricini exprimitur, vt pluribus postea demonstrabimus.

Ius carniū

Quæ viscido succo ac mucagineo scatent, non nisi sacculo crinibus equinis contexto includenda, priusquam torculari premienda committantur. Alia si quidem inuolucra vel linea, vel cannabina eam præli vim vix perferre queunt, quæ lentis, ac crassioribus succis extorquendis requiritur.

De Cribris & Incerniculis. CAPVT VII.



AM vetus hæc increbuit apud Pharmacopœos consuetudo cribra vocitare ea instrumenta, quibus purior ac tenuior tritorum medicamento- rum portio à crassiore separatur. Licentiosa tamen nimis est, ac abusiva vocabuli enuntiatio, cum cribra vix Pharmacopœorum, sed rusticorum instrumenta sint ex pellibus, vt plurimum, arietinis, crebris foraminibus peruia, quibus

frumenta purgantur, vnde & frumentaria solita nuncupari.

Sunt & alia cribra, è crinibus equorum in telæ modum contexta, farinæ à fursibus secernendæ gratiâ, excogitata, farinaria ob id à pistoribus dicta, quibus nonnunquam vtuntur aromatarij, ad pulueres cernendos, & medullam prunorum vel cassiæ fistularis ab aci-

Subcerni-
cula.

nis repurgandam, atque ab ipsis Subcernicula setacea vocantur, & aliquando excussoria incernicula, quod inter manus agitata, pol- linem, seu puluerem tenuem excutiant. Fiunt interdum ex ligno, vt cortice tilliæ, in fibras tenues & longas discerpto, & cancellatim connexo, ad puluerum crassiusculè tritorum cribrationem.

Sunt autem communia multis dicta cribra & incernicula, sed aliud quoddam peculiare relinquitur, aromatarijs, industrioso magis contextum artificio, quod Tamisium vulgus Pharmacopolarum nominat. Fit verò interdum ex tela equina, sæpe ex lyndoræ, seu lin-

teo tenui, vel panno sericeo, & infernè, ac supernè operculo exempti, ex pelle arietina clauso, vt puluis superiore capsula exceptus arceatur, nec inter excutiendum euolet, sed per intermediam telam traijciatur, & sine vlla iactura descendat in inferiorem.

Ex his alia alijs minora sunt, pretiosis pulueribus cernendis magis idonea quæ manibus tantùm mollissimè versantur, vt sine violentia solus puluis tenuior descendat. Alia non nisi numerofo percussu in mensam aut abacum Pharmacarium succussantur.

Aliud quoque frequenti est in vfu, forma pyxidis lignæ grandiusculæ, in cuius medio tela quædam intenditur, per quam excepti pulueres supernè transmittuntur inferiùs, superposito cum pulueribus pondere quoddam stanneo, aut argenteo, vt id suo motu & grauitate, dum excusorium incerniculum vna tantùm manu in corpus aliquod solidum, vt abacum impellitur, puluerum traiectionem breuiorem reddat ac faciliorem.

Omnia porrò cribra & incernicula, dum siccis rebus cernendis inseruiunt, mouentur, versantur, impelluntur, agitantur; dum humidis, quiescunt, ac immota manent, sed iuuatur rerum cernendarum trajectio, cochleari, aut spatula: quo modo pulpa Tamar-Indorum, Cassiæ, aut prunorum trāsmittitur, vt & radices & herbæ ad putrilaginem coctæ ad cataplasmatum confecturam.

De Colatorijs. CAP. VIII.



EC carere quoque debet Officina colatorijs multis, setaceis, lineis, cannabinis, laneis & stamineis vocatis, quorum alia rara sunt, alia densa, alia inter ambo media, & quædam noua, alia pene detrita. Illa tamen frequentiore sunt in vfu, quod compressu validiore, totus succus rei colandæ, absque telæ crepatura traijciatur.

At verò pro diuersa succorum consistentia, modo hæc, modo illa sumuntur. Quæ ex se tenuia sunt, denso colo egent, vt quicquid inest sordium non transmeet, sed tantùm succi pars tenuior. Quæ crassa sunt ac lenta, vix nisi colo raro traijci possunt. Quæ media sunt, mediocris texturæ colatorium postulant.

Tria verò postulant crassa, & viscida vt probe colentur, vt humore ampliore diluantur, vt colo rariore, ac nouo traijciantur, & ante colaturam calefiant diutius: Sic enim illorum densitate magis rarefacta multo faciliùs transmeant. Et multa vix nisi calidissima percolantur; Alia facilè etiam frigida; Quædam tepida tantùm: Et nonnulla colatura tantùm egent vnica; quædam duabus, alia pluribus, vt perfectè clarescant. Prima quidem in colo raro; Secunda in denso, Tertia in magis compacto, vt fordes omnis transitu prohibeatur. Quæ consistentiam habent valde liquidam, etiam si bis, aut

ter colanda sint, eodem panno traduci queunt.

Inter colatoria numerantur lanea quædam cola oblonga, ac figura pyramidis vel potius cuculli formata, quæ caligas, vel Manicas Hippocratis appellât, quibus vinum hippocraticum vulgo dictum ter, quaterque colatur, donec clarum euaserit. Inferuiunt adhuc melicrato, gelatinis & decoctis pluribus percolandis, ut res quædam extranea, si quæ forsan admixta sit, per istam traiectionem separetur, ac liquor tantum syncerus remaneat, ut in nostris Institutionibus demonstrauius.

Caliga
Hippocratis.

Nec Pharmacopolio deerunt laneæ quædam fasciæ, oblongæ, ac pyramidales, quorum usus commendatur ad succos tenuiores à vase in vas, stillatim traijciendos, seu filtrandos, ut loquuntur. Sic enim aqua guttatim transfusa filtrata dicitur, sic lac virginale paratur. Sic & pro puella nobilissima, & ditissima quæ catharticum omne respuens solam aquam posceret, decoctum purgatorium filtrari iussi, cuius quum uncias circiter duas bibisset, blâdè & fœliciter purgata fuit.

De Fornacibus. CAPVT IX.



ORNACVM aliæ decoctionibus tantum inferuiunt, excipiuntque cacabos, patinas, athena, & alia vasa in quibus simplicia coquuntur, parantur, & componuntur; Aliæ destillationibus & cucurbitas, retortas, vesicas, ollas & alia vasa excipiunt, his accommodata destillationibus, quæ vel per ascensum, vel per descensum suscipiuntur.

Fornacum
usus multiplex.

Quæ decoquendis medicamentis inferuiunt, non sunt vniuersimodi: Aliæ enim portatiles sunt, rotundæ, ex ferro vel fuso, vel cuso factæ. Quæque ut infernè tribus validis pedibus innituntur, sic supernè tribus velut auriculis oblongatis, ac extra fornacis labra prominentibus, exasperantur, quibus vasa calefacienda superponuntur.

Fornax,
tripes, ac
metallica
vulgaris
officina.

Pars illarum suprema patula est, ac instar mortarij cuiusdam hians, in qua carbones immittuntur, supposita crate, aut trabeculis ferreis, quæ cineres delabi sinunt in inferiorem cameram, ex qua per ianuam altera eius parte structam, postea eximuntur. Aliæ ex argilla & lateribus extruuntur, ferè quadratæ, fixæ, ac immobiles, nec pedibus ullis fulcitæ, intus verò prioribus non multum dissimiles.

Quæ destillationibus inferuiunt, seu materiam, ex qua fiunt, seu formam spectemus, multifariam quoque extruuntur. Aliæ enim ex ferro, aliæ ex cupro, aliæ ex terra figulina, aliæ ex argilla vulgari, lateribus, & alijs rebus multis quæ structuram connectunt, & firmant. Præterea, aliæ rotundæ sunt, ut metallicæ, ansas vtrinque habentes ut circumferri possint; Aliæ quadrilateræ, pentagonæ, multiformes, fixæ ac immobiles, in quibus tria loculamenta extruuntur, infernum, supernum, medium.

Cineritium Infernum quod cineres excipiat, cineritium, & vſitato Chymicis
 ſeu conſte- nomine, conſterium appellatur, in quo ianua adaperitur, per quam
 rium quid accenſi carbones acris ingreſſu ventilantur, pabulum igni ſuppedita-
 tur, & cineres eximuntur. Media fornacis regio in qua ignis fouetur,
 craticula quadam à conſterio diuiſa, focus à recentioribus vocatur.
 In ea ſiquidem caloris fomes continetur, arceturque, vt ſupra poſi-
 tum vas caleſcat, in ſuperna nempe fornacis camera, quæ pro varia
 excipiendi vaſis magnitudine & figura variè formatur, iuxtaque eâ
 partem tubi fumarij, ſeu ventilia quædam conſtruuntur, per quæ
 fumus exit. Fornacis vſitatiffimæ deſcriptio tradita eſt in noſtris In-
 ſtitutionibus.

Cap.
31. li. 2.

**Fornaces
turræ.**

Vt autem varia, ſic elegans fornacum multarum quæ diſtillationi-
 bus dicatæ ſunt, conſtructio. Quædam enim ſunt turræ, teſtudinea-
 tæ & ſimplices, quæ vas tantum in vnicum ſuffulciunt, alię induſtrio-
 ſo multum artificio ſtructæ & multiplices, vt quæ quinque vel plu-
 ribus turriculis aſſurgunt, quarum ſingulæ ſuum, ac peculiare vas
 admittunt, vt vna vas aliquod aqua calida plenum ad deſtillatio-
 nem per balneum Mariæ, alia cinerem, alia arenam, alia aliam ma-
 teriam pro diuerſo operantis ſcopo. Tot verò fornacibus Pharma-
 copolium obruere, non æquum putamus, cum medicamentis po-
 tiùs, quam ſimilibus inſtrumentis præſtet impleri.

De Alembicis & Cucurbitis. CAPVT X.

**Alembici
multiplex
acceptio.**



ALEMBICI latior acceptio multa complectitur, cu-
 curbitas nempe, retortas, ollas vitreas & inſtru-
 mentum quoddam cupreum, ac tripes triplici inſtru-
 ctum camera, in quarum infima cineres excipiuntur,
 in media prunæ ardentes, in ſuperiore Boccia ad-
 mittitur, capitello operta roſtrato, coniforme & ali-
 quando rotundo cum refrigeratorio, inſtar parvæ cupæ efformato,
 vt copioſiorem aquæ quantitatem continere valeat, quæ dum pau-
 lo vehementius incaluit, per epiſtomium in eius parte decliui ſitum
 effunditur, & alia denuò frigida ſcilicet affunditur.

**Alembici
ſpecialior
uſurpatio.**

Anguſtior vero illius ſignificatio deſtillatorium tantum quoddam
 vas roſtratum, ac alteri iunctum vaſi, quod ſuperna parte fornacis
 admittitur, enuntiat. Cuiusmodi ſunt alembici vulgares plumbei,
 vel cuprei, ſtanno intus obducti, vel vitrei, aut ſigulini, coniformes
 ſeu in parte ſuperna acuminati, in inferiore lati, campanarum inſtar,
 unde & Campanæ ſubinde nominantur: nonnulli tamen capitati
 ſunt & rotundi, & ſæpe vaſe quodam refrigeratorio dicto obuallati,
 & modo capitella, modo pilei vocantur. Quia vt caput pileo regi-
 tur, ſic alembico conceptaculum, ſeu vaſ illud materiam deſtillan-
 dam continens, quod pro varia figura, variam appellationem forti-

Campanæ.

Capitella.

tur. Quoddam enim dicitur *Beccia*, aliud *Cucurbita*, aliud *Vesica*, *Matratium*, *olla*, *Matula*, alia aliter nominantur.

Campana igitur vel sola, vel conceptaculo inserta *alembicus* vocatur, cuius duæ præcipuæ differentiæ dantur; vnus enim rostratus est, qui scilicet ex se longum canalem instar promuscidis propendētem emittit, per quem vapores condensati delabuntur in subiectū vas seu excipulum; Alter hoc tubo caret, & cæcus nuncupatur, estque *Spagyricorum* proprius, à quibus vsurpatur ad sublimandum, vt rostratus ad destillandum, cuius prominens tubus sæpe adeo longus est, vt per medium dolium frigida plenum traiciatur, ad aquæ proleſtata, ac delabentis maiorem concretionem & contemperationem.

Alembicus rostratus.

Alembicus cæcus.

Serpentina.

In multis rostrum flexuosum est, instar serpentis à quo nomen habet, conuenitque maximè aquæ vini destillandæ, quæ vulgo aqua vitæ, & à Chymistis nonnullis *Elizir vitæ* nominatur.

Varia quoque est conceptaculorum magnitudo, vt & figura; quædam enim amplissima sunt & ventricosa, vt loquuntur, alia tam parua, vt nucem iuglandem mediocrem non excedant, quæ scilicet Chymicis operibus destinantur: alia mediocria, & quædam recta sunt, vt ampullæ, vesicæ, olle, matulæ, seu cucurbitæ maiores, seu cucurbitæ minores, seu separatoriæ, ac rectæ; Alia inflexa, vt *Retortæ* *Beccia quadam inflexa*, & quæ *Cornu-musæ* vocantur.

*Cornu-
Musæ.*

Rectis ea destillantur, quæ faciliè in altum subleuantur, vt radices, semina, folia, flores, aromata; Obliquis quæ difficiliùs attoluntur, vt resine, lacrymæ, pinguedines & gummi.

De Mensis & abaco Officina necessariis. CAPVT XI.



N VLLA est adeo tenuis suppellex, vel tam inops tugurium, in quo mensa quædam ad epulandum, aut aliud quippiam agendum non inueniatur. Non enim semper omnis mensa dapibus, sed alijs operibus multis inseruit, vt in Officina simplicibus excipiēdis, seligendis, cernendis, parandis, mensurandis, ordine disponendis antequam veniant in compositionem.

Proinde cum solennis ac magna quædam compositio paranda est, vt *Theriaca*, *Mithridatium*, *Aurea Alexandrina*, mensa quædam longior, non in loco communi, vt Officina, sed in cubiculo quodam idoneo præparanda, vt liberiùs singula simplicia *Pharmacopœus* seligat, accuratiùs ponderet, tutiùs custodiat, & exactiùs misceat ac componat.

*Abacus
supputato-
rius.*

Abacus verò nummularius vnus, aut alter in *Pharmacopolio* perpetuò maneat, ad multa valde necessarius. Superponuntur enim fere cuncta, quæ emuntur aut venduntur, mensurantur aut trutinantur.

tur, paruo mortario teruntur, aut fæficibus diuiduntur, vel integra exhibentur.

Forma eius quadrilatera est, in antica parte multas exemptiles capsulas habens, & velut loculamenta, in quibus pleraque semina includuntur, & ad rei exigentias asseruantur: In altera parte subselliū versus, cui solet Pharmacopœus insidere, aliquot arculas maiusculas, feris ferreis obfirmatas, in quibus medicamenta quædam pretiosa continentur.

In parte verò superna hiat rima quædam seu scissura, qua datur aditus in cistulam subiectam, in quam nummi ex labore quotidiano lucrati & accepti demittuntur.

Rastrum
suspensum
in Officinis
quid con-
ferat.

Supra abacum pendet instrumentum quoddam trabeculis confixum literæ T inuersæ, non multum dissimile, in cuius ima parte clau lignei, vel ferrei configuntur, in quibus lances diuersæ magnitudinis, forfices, spatulæ, & alia quædam instrumenta suspenduntur, quæ vt ad manum sæpe esse debent, sic cito oculis obiciuntur.

Præter mensas ligneas tabulæ quædam marmoreæ, vel Porphyreicæ in Officinis habentur, cum similis materiæ molulis, quibus margaritæ & lapilli pretiosi læuigantur, vt alibi notauimus.

lib. 2. c.
de tri-
tura.

Tabulæ
marmo-
reæ.

Ad suffulciendum maiores pilas, seu mortaria in Officina, rectum stat quoddam paruum velut statumen, aut truncus brevis, cui ad ornatum variæ imagines insculptæ sæpe visuntur.

Haberi quoque solet in Pharmacopolijs capsula quædam, seu arca admodum longa, lataque, sed profunda parum, in qua pyxides & arculæ multæ reconduntur, in quibus singula medicamenta, quæ compositionem quamdam parandam ingrediuntur, seorsim reponuntur, atque eo ordine disponuntur, quo medicamentum aliquod parandum præscriptum est, vel debite componendum.

De arculis, pyxidibus, & alijs Officina vasis.

CAPVT XII.



Lagenæ.

MINIA Pharmacopoliorum vasa medicamentis interuiunt vel parandis, de quibus abundè supra, vel reponendis, de quibus nunc agendum. Ea autem sunt Lagenæ, lecythi, ollæ, capruncula, vrceoli, arculæ & pyxides.

Lagenæ omnibus notæ, aut vitreæ sunt, aut fictiles, in quibus aquæ destillatæ reponuntur, quæ imum in Pharmacopolio locum solent occupare, quòd aquæ ipsius contentæ ceteris medicamentis grauiores sint, & maxima quantitate seruentur. Adueniente verò hyemis rigiditate, cum aquæ faciliè concrecant, vt à gelu tutæ sint lagenæ in cella vinaria reconduntur, donec frigoris sæuitia desierit.

Lecythi reponendis oleis dicantur, suntque nonnunquam figulini, sed frequentius & vtilius stannei, & operculo obducti, ut ad autum claudi valeant, & aperiri. In ipsis olea per infusionem parata conuenientissimè reponuntur & seruantur.

Lecythi.

Terebintina Veneta, oleum de Spica, Syrupus de kermes, vel capilli Veneris Mompeliensis, vel alia medicamenta fluxilia, quæ ad longinquam regionem mittuntur, cum vix tuto in vitreis vasis ob fragilitatem, nec commodè in fictilibus ob grauitatem deuehantur, in quibusdam lagenis oualis figuræ, imperfecte tamen, nam ima parte, & vtrinque planæ sunt, quæ ex laminis ferreis tenuibus, foliolis stanni obductis construuntur: Sic enim earum vectura faciliior & tutior est, ut quæ non multum graues sint, nec percussu aut compressu facile fragiles.

Ollæ.

Lagenæ
ferreæ albi.

Fiolæ.

Varia quoque vitreæ lagenulæ, fiolas vulgus nominat, magnitudinis variæ pernecessariæ sunt, in quibus medicamentorum doses, ægrotis exhibendæ ponuntur. Idcirco nonnullæ lib. β. capere debent aliæ ℥iij, alia, ℥iij aliæ iij, vel ij, tantum, vel etiam minus, ut cum vncia solum dimidia aque theriacalis, vel imperialis præscribitur.

Habendæ quoque figulinæ quedam parue, ad medicinas plebeijs, vel alijs nobilibus ruri commorantibus deferendas, quæ quod atramento sæpius inseruiant, atramentariæ vocari solent.

Atramentariæ.

Ollarum magnus est in Officiis numerus, quarum maior portio ex stanno est, nonnullæ ex terra figulina, & paucæ quædam ex plumbo. Inseruiunt vnguentis recondendis & secure conseruandis.

Capruncula fictilia sunt omnia, intus candore, læuoreque nitentia, altera tantum parte ansam, qua manu teneri queant, altera tubum habentia, quo liquorem admissum effundant. Os verò admodum supernè patulum habent, ut commodius ipse liquor affundatur. Multis coloribus variegatis diuersisque figuris exornantur, & syrupis reponendis, ac tuto conseruandis destinantur.

Capruncula.

Præter ista vasa, alia quædam admodum parua, vrceolorum instar, habentur, vitrea, ac fictilia, in quibus pulueres cordiales vulgo dicti custodiuntur, peculiaremque in Officina locum, ac artificio quodam magis exornatum tenent.

Vrceoli.

Sunt & alia parua quædam stannea, operculata, in quibus variæ pilularum massæ corio singulæ singulo inuolutæ reponuntur.

Vrceoli.

Lignea quoque vasa sunt quedam ad medicamentorum repositiones: ut Sportæ, arculæ, pyxides. Sportæ ex ramulis vimineis, vel iuncis contextæ, fructibus multis reponendis dicantur; fereque in tabernæ reconduntur posteriore, aut altero officinæ angulo. Cum tamen parua sunt ad huius contignationem sæpius suspenduntur.

Sportæ.

Arculæ quadrilateræ sunt, ex quinque tenuibus & breuibus afferculis præter operculum affabre iunctis constructæ, quibus reponuntur.

Arculæ.

Pyxides.

tur cortices, ligna, fungi, flores, tabellæ, ossa, cornua, vngues, & siccatæ partes animalium.

Pyxides rotundæ sunt, & profundæ, atque vel torno, vt olim, vel lato ac tenui aſſerculo in circulum adducto, vt nunc formam teretē aſſequutæ, in quibus succi ſicci, lacrymæ, gummi, mineralia & radices quædam exſiccata includuntur.

Arcularum & pyxidum pars illa anterior, quæ Officinæ veſtibulū ſpectat, variis imaginibus, vt cercopithecis, ſagittariis, anſeribus loricatis, & ſimilibus picturis exornatur, relicta tantum parte, in qua medicamenta intus contenta, literis vel aureis, vt ſæpe fit, vel quibuſlibet designantur.

Stirpes aridæ modò in arculis, modo in ſacculis incluſis adſervantur, vt & radices multæ præſertim tenues: nam craſſiores filo trahuntur, ac ſic ſuſpenſæ optimè aſcunt & cuſtodiuntur.

Sic videor omnium Officinæ ſuppellectilium deſcriptionem & uſum paucis dediffe, quæ ſi quis omnia ob fortunæ tenuitatem habere non queat, ſaltem magis neceſſaria habere debet.

De ſimplicibus vel integris, vel eorum partibus in Pharmacopoliæ ſeruandis. CAP. XIII.



DEFINIRI vix poteſt certus ſimplicium numerus, quibus Pharmacopola nonnunquam opus habet. Cùm enim omnia ſata, genitaque, vel verius quæcunque homo calcare, contrectareque poteſt, in illius ſubſidium dirigi poſſint, qui breui quodam catalogo totam complecti materiam medicam tentant, ſimile quid his aggrediuntur, qui vniuerſi vaſtitatem parua quadam tabella depingunt. Nicolaus quidem Præpoſitus, initio ſui antidotarij, pluribus capitibus ſimplicia multa recensuit, quibus munitus, vt cum eo loquar, Pharmacopœus eſſe debet, ſed qui ne proculdubio, centeſimam eorum quæ medicis uſibus inferuiunt partem attigerit. Nam tellus quæuis medicamentum quodvis non profert, ſed forſan illa quædam Nicolao nota, hæc alia, quæ nec ipſe vidit, nec eorum vnquam fecit periculum. Et quotidie, ex India, & regionibus aduenis aliquot ſimplicia aduehuntur noſtratibus inuiſa, & proſus incognita.

Vt ut ſit, oneroſum nimis videtur ac ſuperfluum omnia ſimplicia, quorum uſus celebratur recensere, & ſingulorum nomen & faciem deſcribere cùm primæ notæ Medici qui ea in re deſudarant, animum etiam tyronum non ita expleuere, quin eorum multi, multa vel oblita eſſe, vel ſuperflue dicta conſiteantur. Sed valeant iſti ſycophantæ, quibus ne quidem Iupiter placet, noſtrumque inſtitutum perſequamur, ac præcipua quædam ſimplicia, quæ in Officinis debent

hyssopus, calamentum, nepeta, marrubium, pulegium, satureia, thymus, origanum, anethum, ruta, lauendula, maiorana, ozimum, serpillum, horminum, scordium, chamæmelum, melilotus, centaurium minus, dictamnus, ceterac, cuscuta, cimbalaria, hypericum, cētinodia, betonica, melissa, rosmarinus, clematitis, veronica vtraque, verbenā, althea, petum, rapsus barbatus, saluia, stæchas, t mariscus, matricaria, polium, folia sennæ, laureolæ & lauri, adiantum verum, saluia vita & agimonium.

Pauci admodum flores seruantur, quòd eorum facultas vix perdet. Flores adseruandi. Maximè autem tres cordiales vulgò dicti, custodiuntur, vt etiam flores rosarum, granatorum, saluiæ, anthos, chamæmeli, meliloti, geneftæ, arantiorum, cedri, stæchados, keiri, iasmini, tunicis, betonica, hypericonis, nenupharis & croci.

Semina necessaria sunt, quatuor frigida maiora, & totidem minora, semen altheæ, atriplicis, raphani, berberis, plantaginis, citoniorum, psyllij, lini, fenugræci, cumini, anethi, anisi, feniculi, coriandri, agni casti, ameos, bardanæ, carthami, ebuli, ricini, petroselini, apij, rusci, asparaginis, milij solis, nigellæ, papaueris, ozimi, portulacæ, pastinacæ, dauci, angelicæ, synapi, nasturtij, thlaspi, sese' eos, leuistici, erucæ, grana alkekengi, lauri, hederæ, iuniperi, cubebe, cardamomum, & piperis omnes species. Seminaque debeant seruari.

Fructus quoque multi in Officinis habendi sunt, vt amygdalæ dulces & amaræ, auellanae, nuces, arantia, mala citria poma fragrantia, curtipendula, colocynthis, forbæ, corna, pruna, dactyli, mora omnia, ficus, mala granata, iuiubæ, gallæ, oliuæ cappares, nuces, cupressi, glandes, tamarindi myrobalani, persica, cerasa, passule, pistacia, sebesten, anacardi, poma mandragoræ & pini, & filiquæ cassiæ. Fructus in Officina, necellarij.

Cortices vel ex radicibus plantarum exuuntur, vt cortex capparis, vel ex trunco, vt cinnamomum, vel ex fructibus, vt arantijs, granatis, citrijs, & similibus. Paucae autem seruantur, quia facilè dum vsus postulat, ex fructibus, aut radicibus ipsis possunt haberi. Cortices quæ adseruandæ.

Gummi multa necessaria sunt, vt ammoniacum, galbanum, ferapinum, bdellium, opoponax, asa vtraque, resina, colophonia, tragacanthum, storax, gummi cedri, hederæ, cerasi, pruni, iuniperi, gummi elemi vulgò dictum Arabicū, mastix, lacca, myrrha, thus, vt & aliæ quædam lacrymæ, tã resinose, vt therebintina, laricea, abietina, quam gummosæ, vt bdellium, Cancamum, anime, Saranna & Tacamahaca. Gummi quæ seruanda.

Cæterum succi quidam seruantur, vel adhuc liquidi & lagenis excepti, superfuso oleo, vt succus limonum, Ribes, berberis, citoniorum, hypocystidis, eupatorii, absynthij vel siccati, vt glycyrrhizæ succus, vt Opium, Acatia, Elaterium, Aloe, Scammonium. Succi quidam seruandi.

Aquæ de-
stillatæ.

Adseruantur quoque plures aquæ destillatæ, quàm quæ à Nicolao recensentur; Dicit enim vix potest, quot, & quam variæ, tam simplices, quàm compositiæ, nunc in Officinis destillantur, non modo ex stirpibus, sed etiam ex animalibus vel integris, vel eorum partibus: De quibus sequenti capite paulò fusiùs agendum.

Quibus aquis esse debet officina munita. CAP. XIV.



ON tanta vis solet aquis destillatis concedi, quanta simplicium decoctis: verum hæc cum hyeme lateant, nec nisi iamdiu collecta ac sicca habeantur, prudenter medici iusserunt, vt ex ipsis adhuc virentibus & vigentibus arte destillatoria sanguis cum anima, hoc est, succus tenuior seu aqua cum facultate eliceretur.

Quæ sane solers inuentio, non parùm materiam pharmacariâ exornauit. Tam fœlices enim experientia dedit stillatitiarum aquarum effectus, vt non modo hyemali constitutione sint ex vsu frequenti, sed etiam estate in qua viuidarum stirpium magna suppetit vberitas. Siue enim zuparium præscribendum est, siue epithema, aut Colyrium, omnia ex aquis destillatis, magna sui parte depro-menda.

Inter eas autem quædam dicuntur cordiales, aliæ hepaticæ, aliæ spleniticæ, aliæ cephalicæ, aliæ nephriticæ, ac diureticæ, nonnullæ, quæ scilicet fucis inserviunt, Cosmeticæ: quædam opthalmicæ, aliæ communes, quæ partes singulas æquè respiciunt, seu refrigerent, seu calefaciant, vel aliam qualitatem impertiantur.

Aquæ cor-
diales.

Cordiales seu cardiacæ vulgares quatuor sunt, endiuia, cichorij, buglossi, borraginis: quib. adhuc octo magis sane cordiales adijcio, oxytriphylli nempe, cardui benedicti, acetosæ, succisæ, scabiosæ, calendulæ, vlmariæ & nenupharis. Addi poterit aqua Agripalmæ, quæ vulgo cardiaca dicitur, vt & rosacea.

Cardiacæ
aquæ.

Aquæ scordij, scorzonere, gentianæ, enulæ campanæ, angelicæ, tormentillæ, nucum viridium, ozimi, rute, iuniperi, hedere, citriorum & arantiorum non modò cardiacæ sunt, sed alexiteriæ: Pesti siquidem præcauendæ & curandæ conducunt.

Aquæ alex-
iteriæ.

Aquæ he-
paticæ.

hepaticæ sūt, aquæ cichorij, agrimonij, eupatorij, fumaris, lichenis agerati, sonchi, portulacæ, cicerbitæ, adianti & rosarum alb.

Spleniticæ.

Lieni conferunt præ ceteris aquæ tamarisci, scolopendrij, seu ceterach, hæmionitidis, lupuli, & florum genestæ, lilij cœnuallij, & pomorum redolentium.

Cephalicæ.

Cephalicæ, quod caput respiciant, dicuntur aquæ bethonicæ maioranæ, polij montani, calamenthi, saluiæ, melissæ, rorismarini, tiliæ, Iasmini, pæoniæ rosarum, saturciæ primulæ veris, narcissi, flœchados, rosarum, florum arantiorum, ozimi & cariophyllorum hortensium.

Nephriticæ & diureticæ quædam sunt, & haberi debent, vt parietaria, cucumeris, melonum, raphani, fenellorum, siliquarum, fabarum, argentinæ, asparagorum, ænonis, alkekangi, milij solis, ceparum, altheæ, maluarum, limonum & granorum iuniperi. Nephritica.

Seruandæ sunt adhuc nonnullæ Cosmeticæ, sic dictæ, quod ad curiosum quemdam ornatum vsurpentur vel compositæ & odoratissimæ, vt quæ Damascena vocatur, vel simplices vt ad rugas delendas, vel nitorem cuti conciliandum, vel furfures detergendos, vt aquæ florum fabarum, sambuci, liliorum, mellis, albuminū ouorum, carnis melonum, & florum altheæ. Cosmetica.

Ophthalmicæ quædam non omittendæ, vel compositissimæ, vt aqua communitatis, cuius descriptio circa Antidotarij finem habetur, vel simplices, vt Euphrasie, chelidonij, feniculi, rutæ, verbenæ, anagalidis, solani, plantaginis, rosarum. Ophthalmica.

Pectorales quædam dicuntur, vt prassij, scabiosæ, tussilaginis, papaueris erratici, vrticæ, adianti, bardanæ, cardui, hyssopi, liliorum, violarum, borraginis, & buglossi. Aqua Peti non modo pectoralis dicitur, sed quod mirè conferat Asthmati Asthmatica à multis vocatur. Pectorales.

Stomacho roborando quædam non parum conducunt, vt quæ ex Stomachicis absynthijs eliciuntur, ex omnibus menthæ speciebus, ex rosis rubris balauustijs recentibus, & ex his omnibus quæ cum manifesto calore stypticitatem quamdam obtinent. Stomachica.

Asseruandæ sunt adhuc aliæ multæ, quæ peculiari dote, multis affectibus sanandis congruunt, vt aqua primulæ veris arthritidi, aqua papaueris rhœadis pleuritidi, aqua portulacæ lumbricis necandis, aqua artemisie & matricariæ vtero aberranti, aqua ceparum sumpta morsui rabidi canis, aqua alliorum & succi nucum alterando febribus tertianis, aqua veronicæ cancro, aqua cicutæ ophthalmiæ feruidissimæ ac contumaci, aqua vlmariæ, mouendo sudori, aqua filicis totius adustionibus, aqua pæoniæ epilepsiæ, aqua centinodiæ, sistendo sanguini, aqua nymphæ conciliando somno, aqua saluiæ paralyti, aqua mespilorum & sorborum viridum dysentericiæ. Aquæ specificæ.

Præter dictas, Officina multas alias habebit, quæ vel calfaciendo, vel refrigerando vel alijs qualitatibus corpus immutando conferunt, vt aqua bursæ pastoris, equiseti, polygoni, prassij, spicæ vulgaris, semperuiuæ, talictri, ligustri, matrissyluæ, geranij, scrophulariæ, saxifragæ, horminiæ, chamæpitheos, sabinæ, abrotoni, tanacetii, fragarum, cerasorum, & aliorum fructuum, vel florum, foliorum, & radicum ex simplicibus sumptorum pro medicorum intentione. Atque vt paucis concludā ex mineralibus vix vnquam destillatione vulgari, ex animalibus aliquando, ex plantis sæpissimè pro medicis vsibus aquæ eliciuntur. Aquæ communis,

De Mineralibus & Metallis in Officina seruandis. CAP. XV.

EQUE errant qui à medicamentorum censu mineralia prorsus ablegant, & qui sola ad morborum omnium expugnationem vsurpant: Morbis enim vt omnibus, vix conferre, sic multis aliquando prodesse certum est; Nam ex mineralibus omne medicamentorum genus habemus, alterantium, roborantium, & catarthicorum. Alterat calx, lithargyrus, vitriolum: roborat hyacinthus, terra Lemnia, smaragdus: purgat lapis cyaneus, Stibium & Mercurius. Iphis quoque metallis vim inesse eximiam, præter virorum probatissimorum testimonia, effectus comprobat. Aurum enim in bracteolas redactum, & cum aliis idoneis medicamentis sumptum, multis affectibus medetur, præsertim melancholicis, atque his omnibus in quibus facultates roborandæ sunt ac spiritus exhilarandi, vnde scobs illius ditioribus nonnunquam exhibetur, vel cardiacæ confectioes, quæ eius bracteolas excipiunt, vt aurea Alexandrina, Confectio alkermes, & Electarium de gemmis.

Primum autem locum inter metalla tenet aurum, dein argentum, tum æs, stannum, plumbum & ferrum. Septimum addiderunt nonnulli, nempe mercurium, qui tamen potentia quam actu potius metallum est. Mineralia verò pene innumera sunt, vt terræ multæ species, inter quas Lemnia primas tenet, dein bolus orientalis, postea terra Erethria, Selinusia, Samia, Synopica, Ochra, & quæ ex pluribus fodinis ac terræ visceribus eruuntur, vt sales fossiles, gypsum, talchum, nisi fory, minium, calx, vitriolum, chrysocola, auripigmentum, alumen, sulphur, crystallus, stibium, & quæ vel metallis adnascuntur, vel ex fornacibus in quibus liquantur, colliguntur, vt flos gris, cadmia, cerusa, squamma gris, plumbago, pompholix, spodium, lithargyrus, diphriges.

Inter Mineralia quoque plurimam celebrantur lapides multi, tum ob vires eximias, tum ob pulchritudinem, pretiosi dicti, vt Saphyrus, Rubinus, carbunculus, smaragdus, hyacinthus, granatus, topasius, berillus, achates, sarda, carchedonius, hæmatites, laspis, selenites, magnes, pumex, alumen. Quibus adduntur ea quæ ex mari & aquis desumuntur, vt ambra odorata, sal marinus, alcyonium bitumen, corallium, succinum, gagates, antalium, dentalium, coralina, spongiæ, aliaque nonnulla, quæ quod medicam vim habeant imbecilliore, omittuntur.

De animalibus aut eorum partibus in Pharmacopoliis ser-
uandis. CAP. XVI.



ANIMALIA nos vel incolumes alunt, vel morbosos faciunt, vel utroque in statu inducunt, aut alio modo seu viuentia, seu interempta, in nostrum veniunt emolumentum, ut cum his integris, vel eorum partibus, aut excrementis, ad multorum morborum vimur curationem, aut corporis nutritum & virium instaurationem: Moschus enim & zibethum licet excrementa sint, cordi tamen & spiritibus roborandis mirum in modum conferunt.

Integra solent vsurpari insecta, ut cantharides, aselli, vermes, laceræ, formicæ, viperæ, scorpiones, ranæ, cancri, hirundines & quædam auiculæ.

Partes animalium multæ sunt Medicis viribus insignitæ, ut Os cranij humani insepulti, & de corde cerui, cerebella passerum & leporum: dentes apri lucij & Elephantis: cor ranarum, pulmo vulpis, iecur hirci, intestina lupi, testiculi castoris & gallorum, vesica suis, genitale cerui, cutis seu senectâ serpentis: Axungia humana, suilla, anseris, ouis, anatis, taxi, cuniculi, capræ, anguillæ, colubri; Medulla, ceruina, vitulina & hircina; Sanguis humanus, columbinus, hircinus: Lac omne, Et quæ ex lacte prodeunt, serum, caseus, butyrum: Oua gallinarum, perdicum, formicarum: mel, cera, propolis: Cornua ceruorum, damarum, monocerotis: ungulæ alces, capræ, bubali: testæ ostrearum, margaritæ ex ipsis desumptæ, & conchæ multorum piscium.

Excrementis adhuc sua virtus cum non desit, ea ipsa quoque in Pharmacopoliis haberi non dedecet, ut stercus caprinum, caninum, ciconiæ, pauonum, columbarum, Oesypum, Sericum, Moschum, zibethum, & pilos quorundam animalium.

Atque ut omnia in pauca contraham, omnia simplicia medicamenta Pharmacopolæ maximè necessaria sunt, quæ in tribus libris de materia medica à nobis describuntur.

De Medicamentis compositis in Officinis Pharmacopœorum seruandis. CAPVT XVII.



U^M ars Pharmaceutica hucusque in artem minimè redacta fuerit, nec medicamenta nisi paucissima certa methodo descripta, nec ordine optimo digesta, vix dum statui potuit, quanam compositiones in Pharmacopolijs parandæ, retinendæ & seruandæ.

Nicol. Præpositus medicamenta quidem multa describit, sed eorum partem quamdam ipsemet improbat, aliam non fideliter transcripsit, aliam, quidpiam immutando, deprauatam reliquit, adeout ex eius scriptis, quanam medicamenta recipi, vel reijci debeant, non satis facile sit coniectare.

Nic. Alexandrinus tantam medicaminum farraginem simul congeffit, vt Pharmacopœorum ingenia potiùs obruerit quàm iuuerit.

Actuarius quoque, Aëtius & Oribasius multa descripserunt, quæ quòd simplicibus vel incognitis, vel nimium raris constent, vel ineptè descripta comperiantur, vel nullis viribus eximijs commendata, negliguntur.

Inter recentiores Fernelius, Syluius & Rondeletius medicamenta à veteribus inuenta sedulò examinarunt, eorumque multa vt indebitè concinnata despexerunt, alia meliori iudicio inuenta, & viribus insigniora probarunt, commentariis illustrarunt, & commendarunt.

Ex omnibus quæ præstantiora à doctis viris, & probatiora à senioribus & expertis creduntur, selegi; Ex quibus eleganti ordine libris sex coactis, Officinam Pharmaceuticam extruxi, hoc est, Antidotarium edidi, in quo medicamentorum omne genus optimorum & probatissimorum describitur, alterantium, purgantium & roborantium. Quæ cum vel intrinsecus assumantur, vel adhibeantur extrinsecus: Illa sub forma syrupi, vel sapæ, vel conseruæ, vel Eclegmatis, si alterantia sint: vel Electarii liquidi, vel solidi, vel trochiscorum, vel pilularum, si purgatoria: vel pulueris aut cōfectionis opiata, aut pastillorum si roboratiua sint exhibentur: hæc verò olei tantùm forma, aut vnguenti, aut emplastri imperantur.

Quas omnes medicamentorum formulas distinctis libris, & sectionibus optima methodo descriptas exhibemus, in quibus omnia medicamenta continentur, quibus Pharmacopolia instructa esse debent ac munita. Pluribus non opus est, nec multo paucioribus ritè carebit, qui singulis humani corporis affectibus bene mederi cupit.



OFFICINÆ
PHARMACOPOEO.
RVM,
SEV ANTIDOTARII
LIBER PRIMVS.

DE MEDICAMENTIS ALTERANTIBVS
& preparantibus, in octo sectiones distinctus, quarum
prior selectos tantum Syrupos, & usu longo
probatos describit.

PRÆFATIO.



VAM sit in tradendis disciplinis necessaria methodus, cuique vel mediocriter erudito notum est: Certa namque ratio docendi, discēdique sine methodo nulla: hac duce quæuis artes firmitus stabiliuntur, optabilius earum theoremata leguntur, facilius discuntur. Ex multis verò qui Antidotaria scripserunt, vix duos reperiēs, qui eandem methodum sequantur in disponenda serie medicamentorum compositorum. Nicolaus quidam Prepositus aliis malè preponitur, qui ad alius Nicolai Alexandrini, à quo quæ sua vocat, a excerptisse dicitur, imitationem, alphabeticum ordinem sequutus est, primumque de medicamentis egit, quæ in principio dictionis habent literam A. Secundò, de his quæ incipiunt à litera B. Et sic de reliquis. Hocque pacto promiscuè de Antidotis, aceto scyllitico & Amylo loquutus. Inter recentiores Syluius, Fernelius & Ioubertus, rectum ordinem seruandum, certis legibus firmare & optima serie disponere tentarunt; In multis tamen multum à se inuicem dissentiunt, nec quem vnus sequitur ordinem, alij probare videntur. Is autem maximè probandus, quem medendi ratio præscribit. Series enim verborum & præceptionum docet, & quasi loquendo demonstrat.

Ni. præpositus à Nic. Alex. medicamenta transcripsit.

Hanc doctrinæ methodum hac in Officina tradimus, in qua cum ad omnium morborum expugnationem, omnia medicamenta tanquam in locupletissimo penu contineantur, ea non confusè descripsimus, sed quæ intus sumuntur, Officinæ parte prima extrinsecus adhibentur, altera congeſſimus. Prior autem pars in tres libros distribuitur, quorum primus, de medicamentis alterantibus & præparantibus agit: Secundus, de purgantibus: Tertius, de Cardiacis seu roborantibus. Singuli denuò in multas sectiones distinguuntur; ut & sectiones adhuc in capita plurima. In priorè autem agitur de Syrupis, atque primum de his, qui ex primis & vernis floribus parantur, Cuiusmodi est Syrupus Violatus, Syrupus de Tussilagine, & de floribus Persicorum.

Syrupus Violatus. CAP. I.

Re *Florum Violar. recent. ac mundatorum* *lib. ii.*
mac *erentur horis octo in lib. v. aquæ tepidæ in vase vi-*
treo stricti oris, & operculato: Postea colentur: Eidem
aquæ calfactæ tantumdem Violarum horis adhuc octo ma-
c *ceretur, & percolatur, Idque quinquies iteretur: Tum*
sumantur colaturæ clarificatæ & sacchari partes æqua-
les, & fiat Syrupus perfectè cœctus.

COMMENTARIUS.

Syrupum natura sola nullum unquam confecit, sed ex arte mixtionem, coctionem & consistentiam suam habet; Qui tamen ex foliis violis, aqua, & saccharo conficitur, simplex dicitur, ad discrimen magis compositi, qui præter hæc, semina citoniorum, maluatum, iniubas, sebesten & aquam cucurbitæ recipit, cuius author primus Mesue perhibetur, sed nullibi, quod sciam, sic confectus reperitur. Simplex verò in omnibus Pharmacopoliis inuenitur, sed non ubique, æquè simplex paratus. Aliquando enim è violarum succo & saccharo tantum, aliquando ex illis bis, ter, vel etiam pluries infusis & expressis conficitur. Multi siquidem novas violas septies infundunt & macerant, alii octies, & nonnulli novies; Sed Fernelius inutilem putat toties iteratam infusionem. Frustra, inquit syrupo violaceo conficiendo violarum macerationem novies renouant, cum tertia, aut quarta infusione nihilo inefficacior sit futurus syrupus.

Melior

Meliorem tamen existimo, qui ex pluribus infusionibus conficitur.

Nonnulli succum ex violis expressum, alij conseruam, syrupo coctione iam incrassato adiiciunt, vt magis violaceus reddatur. Alij malunt, ex puro violarum succo & saccharo albissimo parare; quidam saccharum coquunt ad Electarij consistentiam, quod postea decoquunt in syrupi crassitudinem supradicto violarum infuso, aut succo expresso.

Discrimen verò constituunt multi inter violatum & violaceum, vt violatus dicatur syrupus ille, qui ex floribus mundatis conficitur; Violaceus, qui ex integris & non mundatis, hicque minus quidem violatus est, sed magis solutius; Pars enim herbacea qualitatem habet emollientem, perinde ac folia. Sunt qui tantum sacchari libras quatuor ad infusionis, aut succi libras quinque adiiciunt, & coquunt in syrupum, sicque Lutetiæ parari solet.

Qui syrupum hunc voluerit habere maximè violatum, in breuiore aquæ calentis quantitate maiorem violatum vbertatem quater, aut quinquies maceret, & in colatura fortiter expressa triplum, aut paulo minus Sacchari ponat, atque vt decet lento igne coquat, syrupum habebit violeteo colore valde saturatum. Nihil enim æquè colorem perdit, atque vehemens ignis & prolixior infusio, exempli gratia, si in aquæ lib. i. tantum, violæ mundatæ quater infundantur & exprimantur, & in vltima colatura, quæ erit circiter ℥xv. addentur sacchari lib. iij. atque super cineres calidos totum coquatur, syrupus habebitur colore & sapore gratissimus, qui verustate nec rancescet nec decoquetur. Non debet autem minor violarum quantitas in parua atque in magna quantitate aquæ poni vt violatissimus habeatur.

Nonnulli sic colore & sapore pergratum efficiunt hunc syrupum: foliolorum violarum benè mundatorum ℥iiij. in mortario terunt; superfundunt sacchari ad electarij consistentiam cocti & adhuc feruentis lib. i. agitant omnia simul & permiscunt, die sequenti parum calefaciunt & per torcular, exprimunt, dein parum coquunt, & sic elegantem & gratum habent syrupum.

Quoquomodo paratus syrupus de violis, si guttulas aliquot acidi spiritus, vel vitrioli, aut sulphuris, ex violaceo rubellus, & veluti rubini aut granati coloris apparebit, quam tincturæ metamorphosim qui non norunt vix credunt, & qui vident inexperti mirantur.

Syrupus Violatus bilis acrimoniam frangit, calorem viscerum temperat, ventrem leniendo ac molliendo subducit, & vitijs thoracis confert. Præcipuo autem auxilio est pectoris, & lateris inflammationibus, & asperæ arteriæ scabritiei, & in febrium æstu, biliosis & acutis morbis, præcordiorum ardoribus, & siti sedandæ commendatur.

<i>.tussilaginis recentis</i>	<i>m. vi.</i>
<i>℞ Capilli Veneris veri</i>	<i>m. ij.</i>
<i>Hyssopi</i>	<i>m. i.</i>
<i>Glycyrrhizæ rasæ</i>	<i>℥ ij.</i>

Coquantur in lib. iiij. aquæ pluviæ vel fontis, ad quartæ partis consumptionē. Decoctio coletur & clarificetur; Cui adde sacchari albißimi lib. iij. fiat Syrupus perfectè coctus.

COMMENTARIUS.

Syrupus hic à Tussilagine, tanquam à basi nomen habet, cuius quantitas cæteris maior est. Illius auctor cùm incertus sit, variè præparari solet. Verùm optimam nunc descriptionem exhibemus, per quam simplicia quatuor præscripta in aquæ libris quatuor incoquenda diximus, quia longiorem coctionem non sustinent.

Syrupus de
tussilagine
simplex.

Qui primo vere syrupum hunc conficiunt, flores solummodò tussilaginis assumunt: Qui æstate, partes æquales foliorum viridum & florum siccorum adiiciunt. Sunt qui æstate media ex solo foliorum succo depurato & saccharo parare solent. Optimè quoque fit ex solo florū decocto & saccharo, diciturque Syrupus de Tussilagine simplex, & aliquando Syrupus florum Tussilaginis, seu vngulæ caballinæ, ad differentiam superioris magis compositi, qui præter cætera capillum veneris verum admittit, cuius penuria substituendum polythricum statuo.

Vulgarem huius syrupi descriptionem qui sequuntur, aquæ tantum lib. 4. ponunt, sed re vera artis componendi medicamenta magistri hanc aquæ quantitatem sufficere negant, ad legitimam huius syrupi clarificationem & apparatus. Proinde ad simplicium pondus definitum libr. vij. aquæ ponunt, dein parum coquant, ad lib. i. scilicet dissipationem: postea clarificant & elixant quousque decocti superficies admodum nigrescat. Tum per manicam hippocratis traijciunt, & lib. iii. sacchari albißimi permiscentes percoquant in syrupum, colore gratum & viribus optimum.

Syrupus de Tussilagine tussi confert, Orthopnææ, asthmati, trachææ arteriæ aspredini, sputo coquendo, mouendo, & expectorando. Debet verò sensim assumi lambendo instar eclegmatis, vt diutius hæreat œsophago, & aliquid deerret inter lingendum, per asperæ arteriæ amplitudinem.

Syrupus florum Persicorum. CAP. III.

lib.

Florum Persicorum recentium
 ℞ maceretur in lib. iii. aquæ tepidæ horas xii. Deinde bul-
 liat parum, & exprimatur. Tum par florum quantitas in-
 fundatur, & exprimatur; Idque quater, aut quinquies ite-
 retur, vel etiam sexies, si florum suppetat vbertas. Postre-
 mæ colaturæ ad lib. iii. adde sacchari lib. ii. ℞. fiat Syrupus,
 ut artis est.

COMMENTARIUS.

*Chri-
stophor.
Georg.* Syrupus vel ex fructibus, vel ex floribus Persicorum conficitur.
 Qui ex fructibus, raro est in usu, etiam teste commentatore in Me-
 sueni, & primo tantum vere paratur, ut ille incipiente Autumno,
 antequam scilicet Persica absolutè maturuerint. Tria vero syrupum
 hunc ex paucioribus infusionibus confici, ut quatuor aut quinque
 tantum suadent, florum nempe iactura, penuria & amaritudo. Iac-
 tura quidem, quæ arte quapiam reparari nequit: Euulsis enim
 floribus, noui eodem anno minimè renascuntur, & arbor infru-
 gifera manet. Penuria, quia non nisi sata viret, nec inculta
 dat poma colono, ut violæ & reliquæ plantæ agrestes. Ama-
 ritudo, quæ eò molestius toleratur, quò pluribus iteratis infusio-
 nibus conficitur.

Syrupus è floribus Persicorum paratus vim habet aquas & bilem Facultates.
 ducendi, vermes enecandi, & infarctu mesenterium liberandi,
 Non solum enim meatus diducit, sed humores incidit & educit.

Syrupus de Lupulo. CAP. IV.

<i>Succi depurati Lupuli</i>	<i>lib. iiii.</i>
<i>℞ Succi fumarie depurati</i>	<i>lib. ii.</i>
<i>Sacchari albiſſimi</i>	<i>lib. vi.</i>
<i>Coquantur ſimul ex arte & fiat Syrupus.</i>	

COMMENTARIUS.

Non eſt omnibus vna ſyrupi huius deſcriptio: Alij enim ex ſolo ſucco lupuli & ſaccharo conficiunt, Meſuei conſilio ſulti, qui capite de volubili, ſic præſcripſiſſe videtur. Alij fumarie ſuccum adii-
ciunt, quorum iudicio lubentius aſſentior. Sic enim vires nanciſci-
tur præſtantiores, ſed non ſtatim primo Vere aut hyemis fine, cum
ſcilicet Lupuli germina erumpere incipiunt parandus eſt, ſed expe-
ctanda paulo calidior cæli conſtitutio, quæ tenellam fumariam ex-
hibeat, cuius ſuccus deſideratur, alioquin parandus ſimplicior ex
ſolo lupuli ſucco depurato, & ſaccharo ad legitimam coctis ſpiſſi-
tudinem.

Verum cùm ſucci minimè acres, vel acidi difficilè clareſcant, prius
ad ignem parum ebulliendi, poſtea laneo collo pluris traijciendi,
tum cum pari portione ſacchari tabazeth ſeu albiſſimi & puriſſimi
ſiet ex arte ſyrupus colore pergratus. Decocta quæ ſic percolari nō
queunt, cum viſcida ſæpe ſint minus ſacchari ad decocti ſoliturum
pondus poſtulant, vt ritè clarificentur.

Syrupus de lupulo præcordiorum æſtus contemperat, humores
frigidos & craſſos attenuat, calidos ducit per aluum, & ictero, hy-
dropi, atque morbis omnibus ab oſtructione natis conducit.

Syrupus rosarum pallidarum. CAPVT V.

Rosarum pallidarum recentium lib. vi.
R Infunde horis octo, in vase vitreo strictioris, cum aqua tepida lib. xv. Deinde colentur. Tum par quantitas aliarum rosar. recentium in aqua calesacta pari quantitate maceretur, & rursus coletur: Idque iteretur nouies, Nonæ ac postremæ infusioni colatæ addatur æquum sacchari pondus, & fiat Syrupus secundum artem.

COMMENTARIUS.

Nonnulli minorem sacchari quantitatem adiiciunt, & diutius coquant, vt crassescat: Tuncque magis purgatorius est, sed minus palato gratus. Multi Mesuei consilium sequuti, infusionem primam, vel etiam bis iteratam seruant, vase strictioris, ac ritè operculato exceptam, sepe fusso oleo, & quadraginta dies insolatam. Mucharum rosarum vocant, vt mucharum violarum, earumdem infusionum, nec expressarum macerationem.

Ne quis autem nostri nos immemores putet, qui hoc priore libro, de medicamentis tantum alterantibus & præparantibus agere polliciti sumus, nunc verò ipsius adiungimus syrupum rosarum pallidarum verè purgatorium; Dicimus nos omnes syruos vsitatiores eadem serie & ordine quem temporis conditio præbet describere, non omissis, aut ad alium locum remissis purgantibus, qui re vera pauci sunt; Et qui inter eos purgant, id adeo præstant ignauè, vt verius præparatorij dicantur. Proindè non equum visum est, eosdem, vt & bechicos, ab alterantibus separare.

Nostri seculi seniores syrupi rosarum pallidarum simplicis præparationem & vsum docuerunt. Iuniores inuentis addere sepe gestientes sennæ & agarici commixtione nunc magis compositum in multis vrbibus efficiunt: Atque huius ℥ij. illius verò ℥iiii. pro quaque syrupi libra sumunt, in rosarum infuso macerant, & ex arte coquant in syrupum. Cuius vires sane commendantur. Eius enim ℥i. aut ℥i℥. in aqua, aut decocto idoneo diluta in rem præsentem, cito, & tuto dari potest puero, vel etiam grauidæ cui conuenit. Sunt & qui rhabarbarum adiiciunt, sicque syrupum habent Catholicum

Syrup.
rosarum pallid.
compositus.

omnes humores educentem : sed præstat vtendi tempore , vt fieri solet , vsurpare.

Syrupus
rosarū mo-
schatelinar.

Parari quoque potest syrupus rosarum moschatelinarum , qui nō modo halitus suauitate , sed agendi præstantia illum superat , qui ē vulgaribus vbique conficitur , modo illarum tanta suppetat vbertas ad infusionem totius , aut paulo minus iterandum , quoties in vsitatissimo ac vulgari ea solet iterari.

Vires,

Potenter ac sine molestia serosos , ac tenues , & biliosos humores purgat , omnique ætati , cui conuenit innoxie datur. Debiliores vires habebit qui paucioribus infusionibus ob florum inopiam parabitur. Quo tempore rosæ moscheline vberius florent & fragrantius spirant , vt sub finem æstatis , eo syrupus hic conficiendus.

Qualitates.

Syrupus rosarum pallidarum inter hydragoga medicamenta & alterantia numeratur : Humores enim calidiores contemperat , & serosos educit , non modò à regione prima corporis , sed partibus remotioribus , si maiori quantitate sumatur. Recens paratus vim habet purgandi maiorem , vetus imbecilliolem , daturque tutò pueris & senibus.

Syrupus de Hispidula , seu aluropo , vulgò de pede Cati.

CAP. VI.

*Summitatum floridarum & recent. aluropi lib. i.
℞ Infunde per noctem , aut diem integram in aqua ca-
lentis lib. viii. aut sufficienti quantitate : Deinde bull.
lento igne. Incolatura ad lib. iiii. adde sacchari lib. iiii. co-
quantur ex arte in syrupum.*

COMMENTARIUS.

A paucis annis syrupum hunc in vsum venisse certum est ; Recen-
tiores enim inuenerunt , & experientia multa audaciores facti com-
probarunt , primusque omnium Lutetiæ parauit Cl. Gonerius Phar-
macopœus insignis , & materiæ medicamentariæ peritissimus , qui
vbi plantam ex qua conficitur , ex agro Turonensi & Andegauensi
aduectam conspexit , eam in Parisiensi , ac vicino quæritans inuenit
copiosam , qua singulis annis suum conficit syrupum , alia aliunde
non mutuata. Variè autem solet appellari , videlicet hispidula , gna-
phalium , pilosella , cotonaria , aluropus , seu pes cati , & à quibus-
dam , sed improprie , lagopus , seu pes leporis , qui trifolii quedam
species perhibetur.

Accidit autem syrupum hunc multifariam preparari, quod nullus adhuc typis excudendum commiserit: Alii enim tantum plantę summitates, aut solam lanuginem in aqua macerant, alii flosculos & folia, quibus libenter assentior: Sic enim vim magis astringentem possidet, & sistendis fluxionibus conuenientior: Alii decocto parando adiiciunt glycyrrhizam, iuiubas, passulas, hordeum, & alia bechica; Sed vſitatior ea est descriptio, quam exhibemus, cui si libra dimidia sacchari rosacei permisceatur, aut eius par & penidiorum pōdus, qualitatem assequetur magis bechicam & cardiacam, & saporem gratiorem.

Pręparandi modus ita facilis est, vt minimę egeat alia dilucidatione quàm quę ex illius descriptione est conspicua satis. Si planta non nisi sicca habeatur, eius quantitas minor, aquę maior ponatur.

Qualitates.

Vis huius syrupi agnoscitur eximia ad multos pulmonis affectus, nam cum eluropus, seu hispidula planta sit vulneraria & astrictoria facultatis, non modò vulnera curat, & vlcera impedit, sed alia multa illorum vitia sanat. Maximę vero his conuenit, quibus à capite, ac aliis partibus sit fluxio in thoracem, & quibus pulmones pituitoso humore multo infarciuntur. Humoris enim irruentis impetum cohibet, fluxum coquit, partem affectam roborat, & expectorationem mouet.

Syrupus de papauere, simplex. Des. Mes.

CAPVT VII.

℞. Capitum papauer. albi & nigri magnitudine medicamentarium, ac recentium an. ℥Lx. hoc est, ℥vii. & ℥. Macerentur per diem naturalem in aquę pluuię lib. iij. donec tabescant. In colatura ad lib. i. ℥. adde sacchari & penidiarum an. ℥vi. seu lib. ℥. Coquantur in consistentiam syrupi.

COMMENTARIUS.

Syrupus hic à Mesue dicitur simplex, ad alterius magis compositi discrimen, cuius confectionem ingrediuntur multa lenientia, vt semina lactucę, maluę citoniorum, iuiubę, capillus veneris & glycyrrhiza; quibus si fuerit opus, in rem pręsentem consulit Fernelius, vt Syrupo simplici addatur violaceus, aut iuiubinus. Monet etiam vt minus adiiciatur papaueris nigri, quod eius non sit tutus vsus, albi

verò quantitas augeatur : Cui assentitur Ioubertus contra Rondeletium: Vultque vt nigri papaueris quadraginta tantum dragmā, albi octoginta ponantur, vt amborum requisita quantitas habeatur, sed proportionē diuersa.

Diacodiū
opiatum est.

Vulgus autem Pharmacopœorum hunc syrupum Diacodium nūcupat, sed imperitè, cūm Diacodium inter Opiatas reponatur, vt videbimus suo loco : Alterius tamen defectum ac vicem alterum facile supplet, cūm somnus tantūm est conciliandus.

Tandiu autem consilio Galeni capita papauerum post macerationem coquenda, vt non tertia, aut quarta, aut aliqua talis pars aquæ fiat reliqua, verūm vbi primūm in totum flaccida facta fuerint & marcida, ait Galenus: Nam cum succum ipsorum exprimere volumus, hoc vix assequimur, nisi ipsis flaccidis ac marcidis factis. Superuacaneum igitur coquere diutius. Aqua verò pluuiæ seligitur, qua deficiente, fontana quoque optima est, modò limpida, insipida, & omnis qualitatē expers. Ob eam rem, quæ per tubos plumbeos deriuatur, relinquenda, quod limus in ea contineatur : vnde quiaque eiusmodi faciem combibunt, dysenterici euadunt, ex Galeno. Lutetiæ tamen similium aquarum vsus frequens est, nec insalubris.

Cap. 2.
lib. 7.
comp.
med.
sec. loc.

Diacodiū
veterum:

Diacodium autem veterum, vt Critonis, Heræ, Damocratis, Sorani & Galeni, cūm forma opiatæ paretur, multumque displiceat; Saccharum enim non recipit, sed alia multa insuauia & forsan inutilia, nunc minimè paratur: Cuius loco nunc prostat in Officinis Syrupus ex decocto capitum papauerum & saccharo confectus, qui improprie à multis practicis Diacodium vocitatur.

Diacodiū
exoleuit.

Vires.

Penidia
Alphenicū.

Syrupus de papauere laudatur ad conciliandum somnum, biliosi humoris contemperationem, & tussim mitigandam. Penidiorum accessu, vim habet magis bechicam, ac lenientem. Penidia vocant Arabes Alphenicum ob albedinem. Est enim confectio albissima ex saccharo in decoctione hordei tandiu cocto, donec consistentiam ductilem acquirat; vt possit manibus trahi, duci, & variè in pastillos, vel bacillos intortos more chordarum effingi. Si parum mellis adijciatur, facilius parabitur, nec authoris primi scopo relutabitur.

Syrupus

Syrupus papaveris Erratici. CAPVT VIII.

*R. Infusionis florum papaveris erratici bis, aut ter
 iterata li. ii. sacchari albißimil j.ß. sacchari rosa-
 ti ℥iii. fiat Syrupus perfectè coctus vt artis est.*

COMMENTARIUS.

Non desunt qui pluribus infusionibus syrupum hunc parari debe-
 re contendunt, sed bina, aut trina ad summum sufficit. In soporife-
 ris enim medicamentis virium intensa qualitas non expetitur. Adde
 quod pluries iterata infusio syrupum colore & sapore reddit magis
 ingratum. Eadem verò proportio florum ad aquam in hoc syrupo
 solet asseruari, atque in rosaceo.

Si hæc infusio ter repetita & admodum viscida, in maiori aquæ
 quantitate facta fuerit melius clarificabitur, verum cum saccharo
 diutius elixanda, vt coeat in syrupum.

De Syrupo autē papaveris rhœadis antiquorū nemo loquutus est,
 sed recentiores hūc adinuenerūt aduersus pleuritidē, cuius principio
 valdè conuenit. Qualitatem enim habet astringentem, roboran-
 tem, bechicam & hypnoticam, impeditque ne humor è capite ad
 thoracem defluat. Quod vt facilius præstet, sacchari rosati portio
 communis adiicitur. Tuto datur ab ℥ß. ad ℥iß. & validioribus ad
 ℥ij. Maximè verò incipienti, aut non multum progressæ pleuritidi,
 ne noua fluxio suboriatur, vel saltem vt prior sistatur.

Qualitates.

Syrupus de lamio seu vitica mortua, flore albo.

CAPUT IX.

*R^x. Succorum lamij,
Centinodia,
Plantaginis,
germinum primorum salicis ana lib. ℞. cum saccharo fiat
ex arte syrupus.*

COMMENTARIUS.

Noua quidem placent, sed non omnibus omnia, ut nec antiqua: mihi cum probantur hæc & illa, modo rationibus firmata, nostrum contigit antidotarium multis antiquorum, simul & nuperorum medicaminibus locupletari. Si inter ea quædam quibusdam minus sapiant, his per me fas erit illos æmulari, qui conuiuio lautè instructo vocati, dapes tantum quasdam seligunt & forsan minus suaues, & salubres, quas magis sapidis præferunt.

Syrupus de Galio seu de lamio albo flore, aut si mauis de Centinodio, Parienim iure sic dici poterit, necnon de reliquis illius compositionem ingredientibus, à paucis annis in vsum factus, à paucis quod præscriberetur & pararetur, editione priore neglexeram: nonnulli tamen primæ notæ medici cum illius vires prædicare noverim in selectorum ordinem huc congerere non molestum putauim. Paratur ita facilè, ut vix faciliùs vnus. Colligenda sunt primo vere germina, è quibus eductus succus asseruandus ad reliquorum adulescentiam, quo tempore conficiendus erit syrupus.

Vires.

Laudarunt nonnulli ad compescendum è cerebro in pulmones pituitæ fluxum, cui coercendo non quidem ignauus est, sed frequentiùs vsurpans ad sistendos quosuis mulierum per vterina loca fluxores, ad dysenteriam & immoderatum sanguinis per sedes venas seu hæmorrhoidales euacuationem, ad hexaticum fluxum, atque etiam cohibendos omnes & partibus in partes alias humores. Syrupi astringentes ut mirtillorum citoniorum, rosarum siccarum & Alexandrinus eisdem effectus promittunt.

Syrupus de Nymphaea. CAP. X.

℞. Florum Nymphaeae alb. l. ij. Infunde horis sex, aut septem in aquae calidae lib. iij. Deinde bulliant parum. Colatura denuò adde parem florum recentium quantitatem, & par fiat maceratio & expressio: Idque ter repetatur. Colaturae clarificatae addatur æquum sacchari pondus, & fiat Syrupus secundum artem.

COMMENTARIUS.

Multi ex infusione vnica tantum syrupum hunc conficiunt, sed efficacior est, qui ex ea ter repetita paratur. Debet autem florum pars virescens ac herbacea, nec non flaua reiici, & albissima tantum retineri. Dicitur hic syrupus simplex ad differentiam alterius magis compositi, descriptione Francisci Pedemontani, qui raro habetur in usu, quoniam simplex paratu facilius sit, nec vires habeat imbecilliores: Adde quod compositionis descriptio à multis improbatur, à quibusdam immutatur, ab aliis simplicium, quibus constat, quantitas augetur, ab aliis imminuitur. Parandi ratio ex formula descriptionis satis nota.

Syrupus de Nymphaea insigniter refrigerat, veneris insom- Facultates.
nia cohibet, semen immodicè fluens retinet, somnum conciliat, viscerum æstus mitigat, sitim temperat, & febrium ardores compescit.

Rx Capilli veneris veri,
Adianti communis,
polytrichi,
ceterach,
salvia-vitæ, an. m. l.
glycyrrhizæ rææ & contusa ℥ ij.
Infunde duodecim horis in aquæ calidæ quantitate suf-
ficienti: Dein bulliant semel atque iterum. Colatura
clarificatæ ad lib. v. adde sacchari albiss. lib. iiij. fiat
Syrupus.

COMMENTARIUS.

Huius syrupi tradita descriptio vñtatissima est, cui iuiubas nonnul-
li adiungunt, alij passulas & glycyrrhizam. Sed nihil ex istis arridet Fer-
nelio, existimanti horum permissione syrupum magis ignauum red-
di ac imbecilliolem. Vtiliter tamen addi potest glycyrrhiza, quæ
præter dulcedinem, qualitates habet capillaribus affines. Nonnulli
tamen eam relinquunt, quod syrupum magis flauum reddat. Verum
pluris æstimanda qualitas ac virtus, quam color. Vnde Parisienses
Pharmacopœi syrupum huc accuratè iuxta simplicium definitorum
quantitatem & legitimum apparatus conficiunt, viribus medicatis
eximium. Qui secus faciunt paruum capillarium quantitatem per-
miscentes, & leuiter tantum macerantes, syrupum quidem perlu-
cidum, sed vt colore, sic virtute aqueum parant, quem ægrotis exhi-
bentes, & eos suo voto, & medicos scopo defraudant. Parabitur
ergo iuxta formulam descriptam, omnium optimam & apparatus
facillimam.

Qualitates. Præparantium syruporum hic omnium maximè est à vario & mul-
tiplici vsu commendatus. Ad partium enim quarumcumque & præ-
cipuè thoracis, iecoris, lienis, renum, vteri quosuis affectus oppugnā-
dos, & ad humores tenuandos & præparandos vtilissimus. Bilem nā-
que temperat & concoquit, pituitam incidit, succum melancholicum
ad expurgationem faciliorem reddit, & longo vsu sæpè ipse eosdem
humores per aluum blandè subducit, expectorationem quoque mo-
uet, & humores bronchijs pulmonum contētos incidit & coquit, &
per anacatharsim educit.

Syrupus Capilli veneris Monspeliensis.

CAPVT XII.

Capilli Veneris Veri recent. & parum incisi m. ii.
 ℞ Infunde duodecim horas, vel diem integrum, in
 aque calide sufficienti quantitate: Deinde bul-
 liant parum. Colaturæ clarificatæ ad lib. iiii. ad-
 de sacchari libr. iiii. fiat Syrupus, vt decet, co-
 ctus.

COMMENTARIUS.

Syrupus hic in ciuitate Monspeliensi, à qua cognomē, vsitatissimus est, frequentissimus, & compositione simplicissimus, vt qui tantum fiat ex leui decocto folius adianti veri clarificato & saccharo in consistentiam syrapi cocto.

Sic enim & colore, & sapore gratissimus est. Gratiam verò maiorem adhuc palato conciliat, qui simul aquam rosaceam admittit, quæ ab aulicis pharmacopœis interdum adiicitur, vt astutia quàm scientia magis principum & magnatum gratiam aucupentur, & in illorum crumenas digitos subtilius iniiciant.

Vires habet ei qui capillares omnes & glycyrrhizam excipit, affi-
 nes, sed imbecilliores: Segnius enim humores incidit, attenuat & meatus aperit. Omnium imbecillimè, cui aqua rosata miscetur, cuius scilicet facultas sub astrictoria incidenti & attenuanti reluctatur.

Vires.

*℞. Radicum apij,
fœniculi,
petroselini,
rusci,*

asparagi an. ℥iij.

*Coquantur in aquæ sufficienti quantitate. In colatura
ad lib. iij. adde sacchari tantundem, fiat Syrupus, ut
artis est.*

COMMENTARIUS.

Radices primùm à sordibus mundantur; dein abluuntur, in frustra secantur, à meditullio nerueo purgantur, contunduntur & coquantur. Debet autem multorum iudicio, coctio fieri in libris octo aquæ tandiu coctæ, ut quinque tantum supersint; Quibus colatis & clarificatis, sacchari libræ quatuor adiiciuntur. Quæ parâdi modum, & aquæ ad saccharum proportionem magis probo.

Nec defunt, qui acetum addant, ut eius vim incidentem augeant, sed usus tempore dilui potest in decocto idoneo, vel attenuante, vel magis, aut minus aperiante pro vario Medici scopo.

Paratur à quibusdam Syrupus ex duabus tantum radicibus, petroselini nempe & fœniculi: Sed cùm inefficacior sit, & reliquæ tres radices faciliè possint haberi, præstiterit cum quinque radicibus parare, nec opus erit alterum, qui duas tantum radices excipit, habere. Si quis tamen curiositatis quàm necessitatis magis studiosus, hunc quoque habere voluerit, conficiat ex radicibus petroselini & fœniculi an. ℥iij. coctis in aquæ sufficienti quantitate. Et colaturæ ad lib. ij. addatur sacchari par pondus, aut paulò minus, & fiat Syrupus secundum artem.

Syrupus de
duabus radi-
cibus.

Qualitates.

Syrupus de quinque radicibus humores crassos & glutinosos attenuat, incidit, meatus diducit, obstructions tollit, urinas pellit, menses mouet, arenulas eiicit, fœdis virginum coloribus & ictero prodest.

Syrupus de Althea. Des. Fernelij. CAPVT XIII.

R. Radicis altheæ	℥ii.
cicerum rubrorum	℥i.
radicum graminis,	
asparagi,	
glycyrrhizæ rasæ,	
passularum mundatar.	an. ℥ss.
comarum altheæ	
maluæ,	
helxines,	
pimpinellæ,	
plantaginis,	
adianti utriusque	an. m. l.
Sem. quatuor frigidior. maiorum & minor.	an. ℥iii.
Coquantur in lib. vi. aquæ, dum quatuor supersint, &	
cum lib. iii. ss. sacchari fi. syrup.	

COMMENTARIUS.

Plurimum Lutetiæ Syrupi de Althea celebratur usus, tum propter vires eius eximias, cum authoris dignitatem, cui posterior ætas ideo gratias referre debet, quod medicam artem mirum in modum illustrarit. Præter autem medicamenta multa, quibus Pharmacopœorū tabernas locupletauit, Syrupum habemus de Althea, Therapeutici omnibus Medicis v̄sitatissimum; Ad cuius præparationē, radices primū purgatæ & lotę diu concoquendæ, præter glycyrrhizam, quę longiore coctione amarescit: Dein herbę, postea Semina. Coctio verò faciendā in aqua ad eius partis tantū tertię dissipationem: longior enim viscidiorē decoctionem efficit: Proinde multi vel aquam augent, vel definitam in formula descripta parum coquunt, ut ad lib. i. tantum deperditionem, ante colaturā, deinde clarificant, & cum saccharo percoquunt in syrupum. Sic rectē quidem viscosi liquores tractantur, ex quibus optati syrupi conficiuntur. Simplicia autem, quibus constat, omnia in libro primo materię medicę dilucidē explicantur.

Laudatur Syrupus de Althea ad crassam, lentamque pituitam clementer expurgandam, obstructions tollendas, saburram renum impellendam, & ardorem vrinæ demulcendum.

Syrupus de Cichorio compositus Rheo D. Nic. Florent.

CAPUT XIV.

R. Radicum apij, {
 feniculi, { an. ℥ii.
 asparagorum, }
 hordei integri }
 cichorij erratici, }
 Intybi, latifolij, seu Endivia Sativa, }
 Intybi angustifolij, seu scariola, } an. m.ii.
 taraxaconis }
 Cicerbitæ, }
 lactuca vtriusque }
 hepaticæ } an. m.i.
 fumarie, }
 lupuli, }
 Capilli veneris veri, }
 adianticomunis, }
 polytrichi, } an. ℥vi.
 ceterachi, }
 glycyrrhizæ rasæ, }
 alkekengi, }
 semi. i. cuscutæ }
 Coquantur in aquæ lib. xii. aut quantitate suffi-
 cienti ad tertiæ partis consumptionem. In colatu-
 ra clarificata dilue sacchari optimi lib. vi. co-
 quantur in Syrupum. Cui perfectè, aut paulò plus
 cocto, adde ad singulas libr. Rhabarbari ℥ss. &
 nardi indicæ ℥iij. fiet syrupus.

COMMENTARIUS.

Nicolaus Præpositus quem tanquam ducem Pharmacopœorum
 turba sequitur, quantitatem Rhabarbari præscriptam octuplicat, &
 pro quaque libra syrupi, ponit uncias quatuor Rheï, adeo ut in
 quaque

quaque vncia fyrupi sint dragmæ duæ rhabarbari; hocque modo tenetur paratus Luteriæ in omnibus Officinis, vt in rem præsentem, absque mora possit exhiberi. Nonnulli solum quadruplicant, alij triplicant. Displicet tamen multis, vt Fernelio & Iouberto tanta Rhei quantitas, vt quæ nullius sit vtilitatis, sed dispendij plurimi, putantque vtilius esse rhabarbarum vtendi tempore, in decocto conueniente infundere, & syrupo permiscere, quod vis eius purgatoria coctione & asseruatione vanescat, vel plurimum imminuatur. Prudenter tamen faciunt, qui ex octuplicato rheo parant, qui sanè vires alias habet, licet imbecilliores, atque simplex, cui re exigente, noua adiicitur rhei expressio.

Syrupus è cichorio compositus rhabbaro alliotticus est, roboratius & purgatius: Præcordiorum namque æstum contemperat, bilis acrimoniam demulcet, venas aperit, obstructions auferit, hepæ roborat, stomachum & primam corporis regionem blandè purgat, humores calidos educit, necnon pituitolos, si largius sumatur, conuenitque morbis omnibus biliosis, atque omni ætati, sexui & tempori: Tutoque dari potest infanti bimo, atque etiam iuniori.

Facultates.

Qui paratur sine Rheo, vocatur simplex, licet prædicta simplicia recipiat omnia, præter rhabarbarum & spicam Indicam.

Syrupus de cichorio Simplex.

Paratur tamen alius multò simplicior ex solo cichorij succo depurato, & saccharo, ad legitimam coctis spissitudinem.

Vires.

Vterque valet æstuantibus stomacho & iecore, febricitantibus & viscerum incendio & obstructione laborantibus.

Syrupus de Endiuia simplex. CAPUT XV.

*Succi Endiuia depurati & clarificati lib. viii.
 ℞ Sacchari albiſſimi lib. v. miſce, & ex arte coque in con-
 ſiſtentiam Syrupi.*

COMMENTARIUS.

Quidam ex ſylueſtris cichorij ſucco & ſaccharo ſyrupum hunc cō-
 ficiunt, vt ſupra notatum eſt: Alij ex intybo, ſeu ex Endiuia malunt
 parare, quod magis refrigeret, & minorem amarorem præ ſe ferat,
 alioquin ambo viribus pares.

Cum autem intybus, ſeu intybum genus ſit ad omnes ſatui ci-
 chorij differentias, Endiuia nempe & Scariolam, Syrupus ex alter-
 utrius ſucco paratus, ſine discrimine, Syrupus de Endiuia, vel inty-
 bo ſimplex dici poteſt. Sunt & qui latiore ſignificato Syrupum de
 cichorio ſimplicem nominant. Tanta ſiquidem eſt inter cichorea-
 cea & intubacea non ſolum idea, ſed virium affinitas, vt alia pro
 aliis ſæpius uſurpentur, manifeſto vix errore.

Vires.

Eſt verò ſyrupus e ſucco Endiuia paratus, ad iecoris æſtus miti-
 gandos accommodatiſſimus, vt etiam ad februm ardoreſ extin-
 guendos, & bilem obtundendam efficaciffimus.

Syrupus de fumaria, ſimplex. CAP. XVI.

*Succi fumariae depurati & clarificati lib. ii. ℞.
 ℞ Sacchari tabarzet lib. ii.
 Coquantur ſimul in Syrupum, vt artis eſt.*

COMMENTARIUS.

Syrupi Capnitiſ, ſeu fumariae duæ traduntur deſcriptiones, vna di-
 citur maior, ſeu magis composita, quæ ex pluribus componitur,
 altera minor, quæ ſucco tantum fumariae conſtat & ſaccharo.
 Illa ſolet Lutetiæ dari tyronibus paranda ad ingenij ſpecimen,

quod paratu sit difficilis ; Paratusque syrupus ex his simplicibus, quæ eius descriptio præscribit , non parum displiceat odore, colore, sapore. Halitum enim & insuauem spirat, & nigricat, & malè sapit. Propterea nec tanquam medicamen alteratiuum præparandus est, quia ingratus & ignauus, nec tanquam purgatorium, quia inefficacissimus. Præstat igitur simplicem in Pharmacopoliis præparare: qui vt ritè paretur, in sole depurabitur fumarie succus, cui^{tio.} postea, vt decet, clarificato par zucchari pondus adiiciendum, si syrupi maior suauitas expetitur, aut paulo minùs, si minor. Sed cùm fumarie amaritudo valde sit ingrata, maiore copia sacchari dulcoranda.

Est autem fumaria planta vulgaris ac notissima, cuius duæ varietates agnoscuntur: vna hortensis est & bulbosa, quæ vix ad medicos^{Qualitate s.} vsus trahitur, altera æquè in aruis cultis, & in hortis viret, ex cuius succo syrupus hic parandus.

Valet plurimùm obstructionibus vtriusque Hypochondrij, bilimitificandæ, succo melancholico præparando, & febribus, quæ ab hepatis intemperie calida nascuntur, curandis.

Syrupus de fumaria maiori. D. Mes. CAPVT XVII.

*℞. Myrobalan. citreorum & cepulor. an. ʒxx.
 florum buglossi, vel borraginis,
 florum violarum,
 absynthij.
 cuscute, an. ʒi.
 glycyrrhizæ,
 rosarum, an. ʒss.
 epithimi,
 polipodij querni an. ʒvii.
 pruna n^o. centum.
 vuarum passarum mundat. lib. ss.
 tamar-Indorum,
 pulpæ cassiæ oriental. an. ʒii.
 Coquantur primùm coquenda in lib. x. aquæ ad septem libra-
 rum dissipationem. Colaturæ adde succi fumarie depurati,
 sacchari albi an. lib. iii. fiat syrupus ex arte.*

COMMENTARIUS.

Ni paratum vidissem in multis Officinis hunc syrupum libenter omissem, quòd sapore, colore, viribus ab aliis multum dissideat, & ineptè descriptus agnoscat: In eius enim descriptione nullus ordo componendi seruatur, vt qui incipiat à Myrobalanis, dein à floribus, mox à foliis plantarum, postea à radicibus; tum à fructibus.

Præparatio.

Vt verò compositio hæc ritè peragatur, incipi debet ab elixatione polipodij contusi, Cui mediocriter cocto, addenda sunt pruna, pasculæ, absynthium, epithimum, cuscuta, rosæ & glycyrrhiza: Deinde bulliant omnia simul ad librarum septem aquæ deperditionem, additis paulò antè floribus. Colaturæ addatur saccharum, & coquantur omnia ad consistentiam syrupi. Inter tamen coquendum admiscendæ erunt expressiones cassiæ, tharmar-Indorū & Myrobalanorū seorsim factæ, in tribus partibus distinctis succi fumarix, & sic fiet syrupus præter ceteras dotes purgatiuus.

Qualitates.

Blandè aluum subducit, meatus aperit, obstructions aufert, cutaneis affectibus tollendis confert, atque omnibus vitiis, qui ab humore falso vel vito proficiscuntur.

Syrupus de Cassia. CAPUT XVIII.

*R. Florum sennæ mundat. ℥iii.
 Infunde per horam vnā aut alteram super cineres calidos in aqua purissima, & in leui colatura ad lib. i. adde Sacchari albi simi. ℥xiiij.
 Coque ad consistentiam Electarij solidi, tum dilue medullæ Cassiæ infusæ & colatæ in aqua simplici ℥iiii.
 fiat secundum artem syrupus.*

COMMENTARIUS.

Multos audio quotidie purgatos syrupo de Cassia, quem à nullo descriptum aut paratum certus scio: verum imponunt pharmaco-peoli quidam ignari medicastulos agentes, qui vt eos cautè decipiant quos sine consilio purgare syrupum tantum de Cassia pollicentur & volunt, se exhibere asseuerant, cùm reuera decoctum sennæ cū

cassia diluta exhibeant, cui interdum nonnihil ex diagrediatis permiscetur. Hinc à paucis annis Luteriæ frequens inualuit syrupi de Cassia imaginarij tantum vsus. Et licet populus velit decipi, nolo tamen vt decipiatur, præsertim in his quæ ad res medicas spectant, in quibus sæpe bis peccare non contingit, ob id, singulos monitos cupio syrupum de Cassia hucusque nullibi paratum & seruatum, falluntque ægri qui potenter se purgatos credunt sola Cassia in syrupum adducta: cuius medulla cum ignaua sit ad aluum ducendā, ignauius erit multò illius infusum solum quoquomodo apparatus. Ne quis igitur postea syrupi de Cassia appellatione & vsu abutatur, ipsius descriptionem & apparatus damus: cuius vim purgatricem si quis augere voluerit, sennæ quantitatem augeat, sed cum blandum ac dulciarium esse debeat catharticulum, præstiterit forma à nobis data parare, nec quicquam addere vel detrahare. Ad apparatus si quis malit saccharum infra conditionem Electarij duricoquere, & infusionem Cassiæ in B. mar. euaporare ad aquæ humiditatis absorptionem illi quoque per me licebit.

Preparatio.

Syrupus hic blādè aluum ducit, ardores ventriculi & viscerum mitigat, primam corporis regionem sine molestia expurgat, urinæ difficultatem & acrimoniā tollit, partes thoracicas lenit & tussiculosis prodest, & pueris ac grauidis re exigente tutissime dari potest.

Vires.

Syrupus de succo Buglossi. CAPUT XIX.

*R. Succibuglossi depurati lib. vi.
Florumeiusdem lib. i.*

*bulliant parum: Deinde colentur, & clarificentur,
& cum sacchari libr. iij. coquantur in consistentiam
syrupi.*

COMMENTARIUS.

Cùm Syrupus hic viribus sit eximius, & paratu facillimus, minimè debet omitti. Vt ritè paretur tritum buglossum noctem vel etiam diem integram in vdo ac frigido loco dimittendum, deinde calefaciendum, tum exprimendum. Succus enim ipsius cùm viscidus sit, vix nisi hac arte educitur. Eductus relinquitur vt subsideat. Nonnulli flores buglossi cōtusos in eodem succo depurato parum incoquant, alij in aqua, & colaturam affundūt in succum & saccharum, & perfectè coquūt ad consistentiam syrupi. Sunt qui buglossi

tantum folia sumunt, alij radices, ego totum buglossum conuenire existimo.

Syrupus de succo borraginis. Eodem modo paratur syrupus de succo borraginis, eosdemque effectus pollicetur; Et qui alterum habebit, altero carere poterit.

Syrupus de Calendula. Ad hunc quoque modum conficitur Syrupus de succo calendulae, vel hortensis, quae aestate potissimum viget vel sylvestris, quae omnium mensium calendis, unde nomen, viret & floret. In usu frequentiore deberet esse cum vim habeat solarem, & valde cordialem principijs vitae & principi partium amicissimam.

Vires. Valde conuenit his qui longo mœrore confecti marcescunt, melancholia hypochondriaca laborantibus, lienosis, & palmo affectis.

Syrupus de succo acetosæ. D. M. CAPUT XX.

*℞. Succo acetosæ in sole depurati lib. iii.
Sacchari albißimi lib. ii.
Coquantur simul, & fiat syrupus vt artis est.*

COMMENTARIUS.

Simplicissimus est hic syrupus qui eodem modo, quo superior à multis conficitur: Ab alijs saccharum coquitur ad consistentiam electarij solidi, cui postea succus depuratus & colatus adijcitur: Deinde parum feruescit mixtura, vt syrupi consistentiam nanciscatur idoneam. Sepius tamen saccharo clarificato succus parum coctus, & residendo purgatus ac colatus permiscetur, & sine aqua coquantur in syrupum.

Hoc tamen posteriore modo paratus vires habere dicitur imbecilliores, atque saporem non ita gratum: & re vera melior est qui fit ex saccharo ad electarij solidi consistentiam cocto, in quod iniicitur, ac diluitur succus depuratus, vel filtratus, vt nonnulli volunt, & ad idoneum syrupi corpus super cineribus calidis reductus. Acida enim coctione non modo naturam acetositatis gratiam amittunt, sed ingratam quamdam acridinem acquirunt. Hoc autem parandi modo succi quantitas ante permixtionem cum vix definiri possit, ad libitum sumitur, hoc est, tantum quantum sufficit, vt dici solet.

Syrupus ex succo Oxalydis, seu acetosæ ex Mes. illius authore, febribus biliosis & pestilentibus saluber est, cordis & ventriculi calorem flammeum extinguit, & æstuantia viscera contemperat.

Syrupus acetatus simplex, seu Oxysaccharum. D. Mes.

CAPVT XXI.

*R. Sacchari purissimi lib. v.
Aqua fontana lib. iiii.*

Coquantur in vase fictili ad aquae dimidia consumptionem: Tunc adde aceti vini albi lib. ii. aut lib. iii. vel iiii. prout magis aut minus acidus desideratur syrupus, & percoque in consistentiam idoneam.

COMMENTARIUS.

Licet quouis tempore syrupus hic parari queat, cum tamen viribus precedenti sit affinis, hunc illi proximè subiunximus. Ab aceto & saccharo quibus constat Oxysaccharum dicitur. Ut ritè paretur, coqui debet in vase figulino, vel stanneo, aut lapideo, ut vult Mesue, non æneo, vel cupreo, ut imperitè quidam faciunt. Perperam quoq; nōnulli acetum distillatum sumunt, quod qualitatem perquam acerrimam ventriculo & nervis noxiā habet. Vulgare præstantius est, multoque accommodatius, cuius varias proportionēs author imperavit, ut pro vario Medici scopo syrupus parūm acer, aut acrior, aut acerrimus & valentissimus habeatur.

Conuenit humori feruenti refrigerando, crasso & viscido incidendo, attenuando & ad expulsionem apparando, putredini arcendē siti sedandæ, & inflammationi viscerum mitigandæ. Qualitates.

Aliud Oxysaccharum, seu syrupum acetatum simplicem N. Myrsus exhibet, cuius vsum valde probo. Sic vero describitur.

℞. aceti ℥ iiii. succi granatorum acidorum ℥ vii.

Sacchari lib. i. coquantur in consistentiam syrupi.

Syrupus alius acetatus simplex.

Paratur ut superior, & vterque vocatur simplex ad differentiam alterius magis compositi, cuius descriptio datur à Nic. Præposito; Sed cum raro vel potius nullo sit in vfu, eius enarrationem subicimus.

Multos habet vsus; Incidit enim humores crassos, mouet & impellit firmiter inhærentes, calidos temperat, æstum ventriculi & hepatis refrigerat, & humorum corruptelam emendat. His quoque conuenit, ut & alij syrupi acetati, in quibus vermes generantur, seu in intestinis, ut multis accidit, seu in venis, ut in quodam ciue Parisiensi, è cuius basilica secta vermis palmum longus me præsentē & videntē

Vires.

*lib. 3. de
mas.
med.
cap. 33.* exilijs, ut alibi notaui.

Succorum Endiuia,

℞ Apii, an. lib. ii.

Succorum lupuli,

buglossi,

borraginis an. lib. i.

bulliant parum, despumentur & depurentur. Colatura ad lib. iiii. adde sacchari lib. ii. ℞. fiat syrupus.

Sin autem compositum magis volueris, sic facito.

℞ succorum dictorum ritè depuratorum lib. iiii.

Incoco rosarum ℥ii.

glycyrrhizæ rasæ ℥℞.

seminum anisi,

foeniculi,

apii an. ℥iii.

spicæ nardi ℥ii.

Colatura clarificata adde aceti lib. ii.

Sacchari albi ssim. lib. ii. ℞. aut lib. iii.

Coquantur secundum artem vt fiat Syrupus.

COMMENTARIVS.

Vterque syrupus parari solet, sed simplicem prætermittere potest, qui compositum habebit, vt etiam syrupum acetatum compositum, cuius vicem facile supplebit. Dicitur autem Dynari, ab Arabibus, hoc est, diureticus, seu vrteres purgans: Non autem à denario, seu pecunia, vt multi putarunt. Nec fides est adhibenda Bern. Desseccio, qui hoc nomen scripserit inuentum ab inepto & auaro quodam Italo, qui voce Dynari stipem quamdam, seu nummum portendit.

Dicitur & Bizantinus, à Bizantio, siue Constantinopoli, vbi valde tuit vsualis, vel vbi primùm fuit inuentus, vel forsan quòd Mesne

Mesue à medico quodam Bizantino seu Constantinopolitano illius descriptionem habuerit,

Vires.

Syrupus Dynari qualitatem habet aperientem, incidentem & attenuantem. Confert obstructionibus hepatis, lienis, & mezenterij: Vtiliterque datur ictero curando, mensibus ciendis, & febribus sanandis, quæ è viscidorum humorum prouentu oriuntur.

Syrupus de moris compositus. CAPVT XXIII.

Succi mororum domesticorum non omnino maturorum lib. B.

Succi mororum rubi syluestris, mellis albi despumati an. lib. I.

Sapæ ℥iiii.

Coquantur, vt artis est, in syrupum.

COMMENTARIUS.

Vt Diacodij loco, quod olim Opiatæ forma parabatur, nunc syrupum de papauere simplicem habemus, sic pro Diamoro, Syrupum de moris: Ad cuius confectionem multi adiciunt succum fructus rubi Idæi fagarum: Sicque ex tribus mororum generibus faciunt. Alij vtrumque relinquunt atque Sapam. Fit autem succorum simul cum melle coctio ad consistentiam tantum syrupi, qui dilutior est Diamoro, seu Rob de moris, quod nunc vix paratum reperitur, sed eius loco syrupus mororum compositus capite superiore descriptus:

Multum quoque probarem syrupum de moris simplicem, ex eo-
rum nempe succo & saccharo paratum: Cui si portio aquæ rosaceæ
adiiceretur, & gratiorem, & ad multa efficacior, præsertim ad ro-
borandum, & fluxiones sistendas iudicarem,

Syrupus de moris simplex

Vires.

Syrupus de moris compositus valet contra depascentia oris vlcer-
ra: Ad dentium quoque & gingiuarum affectus, ad Columelam, seu
vulvæ relaxationem, & ad omnia oris vitia, & per se sumptus exco-
chleari, & dilutus in decocto conuenienti in formam gargaris-
matis.

Syrupus Ribes & Berberis. CAPUT XXIII.

R *Succi vel Ribes, vel Berberis lib. iiii.*
sacchari lib. ii. ℥.

Coquantur vt artis est in consistentiam syrupi.

COMMENTARIUS.

Gallorum vulgus hos fructus Grossula rubra nominat, quos Mauritani Riben, & officinæ Ribes vocitant. Fructus sunt parui, rotundi, rubri, succo multo & acinis quibusdam paruulis prægnantes, & racematim cohærentes; Ex quibus tuis, & prælo commissis exprimitur succus, cui optimè depurato & colato saccharum adicitur: Verùm minori quantitate quàm cæteris frigidioribus & humidioribus succis, tum quia Ribesius succus meliùs & diutiùs sine corruptela conseruatur, tum quòd maiore copia sacchari aciditas illius palato gratissima obtunditur, & magis hebescit vis syrupi.

Idem est iudicium de Berberis fructibus, quorum succus similiter extrahitur, & simili modo cum saccharo coquitur in syrupum. Fructum hunc vulgus Spini-vinetam nominat, officinæ Berberis, nomine forsan deducto ab Amyrberis Auicennæ, cui Dodonæus Oxyacanthæ nomen dedit.

Vires.

Syrupus Ribes & Berberis valde prosunt vomitibus biliosis, febribus æstuosis, cardialgiæ, siti vrgentiori, & ventris fluxionibus immodicis.

Syrupus de Agresta, seu de Omphacio. CAP. XXV.

*R^x Succi vuae acerbae per residuum depurati li. v.
 Sacchari albissimi lib. ii.
 Coquantur simul ex arte in consistentiam syrupi.*

COMMENTARIUS.

Parat Mesue ut Syrupum de succo citriorum: Proinde conficit ex Omphacio & Iulepo, hoc est, aqua & saccharo: Idque in vase figulino vel stanneo, minimè aeneo vel cupreo. Ad preparationem coquitur primùm omphacium ad tertias, cui saccharum postea additur, aqua tripla coctum & clarificatum; Dein mixtura feruefit in consistentiam syrupi. Quidam addunt, inquit Mesue, cariophyllos, sed præstat relinquere, & iuxta descriptionem datam parare. Non improbatore eorum consuetudo, qui priùs saccharum coquunt in electarij aut penidiorum consistentiam, cui succum postea addunt, & leuissima coctura efficiunt syrupum, qui ut fiat acidissimus, ex succo vuarum omnino immaturatum parandus: Et sane melior & gravior est qui hoc postremo modo paratur quo parandi omnes acetosi syrupi: Acida enim longa coctione admodum acria & ingrata euadunt.

Syrupus de Agresta cordi benefacit, vomitiones sistit, & ventris fluxiones biliosas, sitim sedat, æstus viscerum temperat, stomachum calidis humoribus laceffitum recreat, febribus biliosis conuenit: Et valet contra venena, ait Mesue.

Syrupus limonum, & granatorum. CAPVT XXVI.

*R^x Succi limonum, vel granatorum acidorum sole depurati, & sensim colo laneo sine expressione traiectione
 lib. v.
 Sacchari albissimi lib. iii.
 Lentè coquantur in vase fictili ad consistentiam syrupi.*

COMMENTARIUS.

Hi duo syrupi confunctim describuntur, quod vtriusque sit idem parandi modus, & par sacchari ad succum proportio, atque magna

Præpara-
tio varia.

virium affinitas. Nonnulli saccharum coquunt ad electarij solidi crassitiem, cui succum lymphidum affundunt, rudicula agitant, & leui coctura in syrupum reducunt; hæcque præparandi ratio, multum probatur, per quam scilicet succorum vis, igne non hebescit, sed integra retinetur. Alij succos elixant ad tertiæ partis consumptionem, deinde zulapium simplex affundunt, & denuò coquunt in syrupum.

Sunt & qui succum sumunt, & in duplo saccharo diluunt, parumque simul calefaciunt, ut aptius uniantur in syrupum. Qui sic paratur, consistentiam habet idoneam, optimèque seruatur, modò ex acidis succis conficiatur. Potest etiam sine igne, sed tantum in solatu confici, addita maiore sacchari quantitate: Facilis tamen est conficiendi præscripta methodus, quam permulti sequuntur, sed meliorem credo, per quam saccharum coquitur in Electarij soliditatem, quod postea decoquitur appulsu & commixtione succi tanti quanto est opus ad consistentiam mediam inter syrupum & iulepium, crassior enim facile candescit, ut loquuntur, seu sacchari candi modo creescit.

Eodem modo paratur syrupus Arantiorum, & aliorum multorum fructuum.

Vires.

Syrupus limonum febribus continuis & pestilentibus, ac contagiosis conuenit, ut & morbis omnibus, quos ingens ardor comitatur & humorum corruptela: Necnon Cardialgiæ, & aliis cordis affectibus. Syrupus verò granatorum cor quoque recreat, putredinem arcet, cholerae morbo ac vomituriensibus conuenit & fluoribus ventris.

Syrupus Citoniorum simplex.

CAPUT XXVII.

Succi citoniorum libr. x.

℞ Coque ad dimidias, & sine, ut duos dies resideant:

*Atque ubi claruerint, colato; Dein misce
Sacchari lib. iii.*

Percoque, ut artis est, in consistentiam syrupi.

COMMENTARIUS.

Variis est multum huius syrupi conficiendi modus. Nam alii vinum adiiciunt: alij acetum: alij simul & vinum, & aromata multa, licque compositissimum efficiunt.

Sunt qui simpliciorem malunt, & sæpius citra cocturam succos residendo & insolando purgant; deinde cum zuccharo clarificant, colant & percoquunt. Quidam in aqua saccharum diluunt, & probe concoquunt. Deinde succos commiscent, & rursus parum elixant in Syrupum. Alij, alio modo. Sed qui traditur à nobis, vſitatioꝛ eſt, paratu facilior & melior.

Syrupus citoniorum ventriculũ roborat, vomitum ſedat, alui fluores reſreſcit, dyſentericis & cœliacis cõfert, vt etiam his, qui vel ſanguinem ſpuunt, vel fluorem menſium, aut hemorrhoidum perpetiuntur immoderationem, atque deſtillationes à capite in thoracem, & partes inferas irruentes compeſcit. Vires,

Syrupus de Pomis, ſimplex. CAPVT XXVIII.

*R. Succipomorum dulcium,
Succipomorum acidorum an lib. v.
Coquantur ad medietatem, & reſidere permittantur,
vt clareſcant. Dein percolentur, & cum ſacchari lib.
iii. fiat ſyrupus ſecundum artem.*

COMMENTARIUS.

Ad huius ſyrupi confectionem nonnulli ſeligunt ſuccum pomorum redolentium, alij curtipendulorum, quibus facile aſſentior, Rondeletio refragante, qui infirma ratione improbat ſuccum curtipendiorum, quòd videlicet ſint carne dura. Laudatur quoque eorum ſuccus quæ vulgus paſſipoma, & paradifiſiana vocitat, vt etiam Reginetea.

Sunt qui in ſucco antè, vel etiam poſt depurationem, immergunt ſericum cocco baphica recenti tinctum, donec rubeat, & eius tincturæ vim accipiat, hocque modo ſit excellentior. Alij ſuccum citri commiſcent; Verùm qui in Pharmacopolijs eſt aſſeruandus, modo præſcripto parandus, iuxta Meſuei conſilium.

Poma autem ſeliguntur non modò fragrantia, ſeu redolentia, quæ propter ſuauiſſimam cor recreant, ſed etiam ſubacida, quæ propter acidulum & iucundum ſaporem, non modò iucundè ſumuntur, ſed partes ad cordis œconomiam attinentes exhilarant, putredinem arcent, & melancholicos humores continent.

Vires. Non mirum igitur, si syrupus è pomorum succo paratus plurimum commendetur ad atterendum, imminuendumvè succi melancholici prouentum, ad sudores mouendos, ad palpitationem cordis, ad illius tremorem & debilitatem, & si Mesueo creditur, ad syncopem, seu potius lypopsychiam. Quàm saluber igitur perpetuus pomacij vsus?

Syrupus regis Saboris. D. Mes. CAPVT XXIX.

*℞. Succipomorum redolentium lib. iii.
 Succorum depuratorum bugloss &
 borraginis an. lib. ii.
 folliculorum sennæ mundatorum ℥iiii.
 seminis anisi ℥ss.
 croci ℥ii.
 sacchari lib. iii.
 Percoque omnia ex arte, ut abeant in syrupum.*

COMMENTARIUS.

Nullum Pharmacopolium hoc syrupo eximio carere debet, ad cuius confectionem senna primùm parum trita maceretur per diem naturalem cum aniso in succis descriptis: Postea semel, aut bis feruefiat, & coletur. Expressio colata & clarificata coquatur in syrupum. Crocus autem panno lineo ligatus inter coquendum infri-
 cetur. Cognomen autem desumpsit hic syrupus à Sapore rege Medorum, ad cuius sanitatis conseruationem inuentus fuit & institutus.

Vires. Vitales spiritus recreat, mentem exhilarat, melancholicum humorem contemperat, & purgat, crassos & lentos humores attenuat, flatus discutit, ventrem blandè subducit, & sanguinem puriorem reddit.

Syrupus Myrturus Compositus. CAPVT XXX.

R Baccharum myrti ℥ii. ℞.
 Santali albi,
 rhois culinariae,
 balauftiorum,
 berberis
 rosarum rubearum an. ℥i. ℞.
 mespilorum lib. ℞.
 Contusa omnia coquantur in aquæ lib. viii. ad
 tertias. Expressioni adde succi cydoniorum &
 granatorum an. lib. ii.
 Sacchari lib. v. Ex arte coquantur in syrupum.

COMMENTARIUS.

Syrupus hic veterem retinet compositionem, in qua simul astringentia multa miscentur, ut baccharum myrti, quæ admodum raræ sunt, defectum suppleant, quarum si fecundissima daretur vbertas, præstaret ex earundem succo & saccharo tantum syrupum conficere. Valer. Cordus succum pomorum agrestium commiscet, Fernellius granatorum acidorum, cui malo assentiri.

Vt rectè paretur, saccharum in decocto percolato coquendum ad electarij solidi concretionem, deinde succi commiscendi, & ex arte conciliandi ut abeant in syrupum.

Syrupus Myrtinus ventriculum & viscera roborat, antiquatum Vires, alui fluorem compescit, sanguinis eruptionem retinet, & omnem humoris à capite ad partes inferas defluxum cohibet.

Syrupus de Mentha simplex, & compositus Des. Mes.
CAPVT XXXI.

R Succorum depuratorum menthæ,
granatorum dulcium &
granatorum acidorum an. lib. i.
Sacchari, aut mellis tantundem, fiat syrupus.

Compositus sic parabitur.

R succi cydoniorum dulcium,
succi cydoniorum muzorum, hoc est, acido-dulcium,
succum granatorum dulcium,
succum granatorum acidorum,
succum granatorum muzorum an. lib. i. ℞.
In his macera horis xxiii. menthæ siccæ lib. i. ℞.
rosarum rubearum ℥ ij.
coquantur ad medias. Colaturæ adde
sacchari lib. ij. fiat syrupus, Galliæ moschatæ ℥ ii. lin-
teoraro inclusis, aromatizatus.

COMMENTARIUS.

Paratur vterque syrupus cum melle aut saccharo, authoris consensu, sed magis placet & prodest, qui cum saccharo conficitur, cuius duplum Fernelius commiscet. Vsitatior tamen parandi modus in composito sacchari tantum libras duas admittit, iuxta Mesuei placitum, qui fructus acido-dulces & semimatuos suo idiomate, muzos vocat, hoc est, suaues; Tunc enim eorum sapor magis arridet. Qui compositum habebit, simplici carere poterit.


Ad hoc autem cum mentha sicca accedat, eius quantitas maior videtur: Satis enim est, si libra una aut uncia decem succis incoquantur, & his colatis tantundem sacchari, aut paulo minus adiiciatur. Multum namque displicebit, si iuxta formulam à Mesue datam conficiatur.

Optimè parabitur ex succo menthæ depurato & saccharo simul coctis ad Electarij solidi modum, postea acidi succi miscebuntur, & super cineres calidos aut igne lento ita ducentur & regantur ut fiat Syrupus.

Vires.

Syrupus de mentha ventriculorum roborat, cardialgiam impedit,
vomitus,

vomitum, singultum & alui fluorem compescit, maximè verò id præstat, qui maiore compositione paratur.



SECTIO SECUNDA,

De Syrupis, qui quouis tempore queunt parari.



Prima Sectione Syrupos, qui Vere, Æstate & Autumno parari solent, continua serie descripsimus; Nam cum finis cuius tempestatis anni sit principio sequentis congener, qui Syrupi in fine Veris conficiuntur, iidem & in principio quoque æstatis, ita ut sectionibus exactè distinctis, triginta priores Syrupos dirimere non lituerit: Eo tamen ordine singulorum descriptionem dedimus, quo simplicia, quibus constant, optima colliguntur, ut priore loco, Syrupos vernaes, qui scilicet ex primis floribus vernis, posteriore Autumnales, qui ex fructibus: medio, nempe æstate, qui ex floribus, radicibus, succis & decoctis parantur. In hac verò sectione eos, qui non solum hyeme, sed alio tempore confici possunt, & solent, exhibemus.

Syrupus Rosarum siccarum. D. Fernel. CAPUT I.

*Rosarum siccarum lib. I.
 R. infunde horis xxiiii.
 aqua tepide lib. iiii.
 In expresso dilue
 sacchari albißimi lib. ii.
 Coquantur ex arte in Syrupum.*

COMMENTARIUS.

Quisque ad libitum hunc syrupum conficit, nunc rosarum quantitatem augens, nunc minuens, & aliquando rosarum macerationem bis atque iterum renouans. Verùm nulla est formula præstantior hac Ferneliana, in qua debita proportio rosarum ad aquam, & vtriusque ad saccharum seruatur, atque hac sola maceratione confectus syrupus nihilo est inefficacior. Rosæ autem seligendæ sunt prærubræ,

Vires.

non albæ, aut pallidæ.

Syrupus rosarum siccarum ad omnem alui fluorem commendatur: Ad roborandasque partes internas, vlcera blandè detergenda, & agglutinanda, vomitum sedandum, & Rheumatismum cohibendum.

Syrupus Regius, siue Alexandrinus, olim Iulepus Rosatus. CAP. II.

*R. Aquæ rosarum odoratissimæ lib. iii.
Sacchari tabarz et lib. ii.
misce, & coque igne lento, vt fiat syrupus.*

COMMENTARIUS.

Qui huius syrupi perspicuitatem considerant, Iulepum cum Mesueo nuncupant: qui consistentiam, syrupum; qui suauitatem, syrupum Regium, aut Alexandrinum quasi Alexandro dignum. A Serapione Sacaniabin dictum. Eius enim vsus & reges, & delicatuli omnes minimè respuunt. Paratu facilis est, & quouis tempore parabilis, eoque nullum Pharmacopolium iustè carere potest, etiam si prioris seculi patres illum non nouerint, qui rhodostagma, seu aquam rosarum non eliciebant.

Alterius Iulepi Rosati descriptionem tradit Mesue, ex infusione rosarum parati: Sed hoc modo syrupi duo parantur, vnus rosarum pallidarum purgatorius dictus: Alter de rosis siccis: Neuter verò Iulepi nomen sibi vendicat.

Vires.

Syrupus Alexandrinus Cardiacus est, bechicus, roboratiuus, alteratiuus, & thoraci, ventriculo, hepati, siti, & omni calori prodest.

Syrupus de Absynthio. D. Mes. CAPUT III.

*R. Absynthij sicci lib. ℞.
Rosarum ℥ij.
nardi Indicæ ℥iij.
Vini albi & antiqui,
succu citoniorum an. lib. ij. ℞.
Macerentur simul per diem naturalem super cineres calidos. Deinde coquantur ad dimidias.
Colaturæ clarificatæ adde
mellis despumati lib. ii. fiat syrupus.*

COMMENTARIUS.

Abfynthium Ponticum feu Romanum debet affumi ficcatum, & cum rofis & nardo minutim incifa infundi in vino generoso, vt moschatelino in vase terreo, vitrato, super cineres calidos, per horas xxiiij. Tùm semel, aut bis tantùm feruescent. Postea addetur mel, vel potius, vt multi suadent, saccharum. Sunt qui duplicem habent, vnũ ex melle & absynthio vulgari Pontico: Alterum ex saccharo, & absynthio minore paratum.

Nonnulli parant syrupum Absynthiacum ex absynthij viridis libra dimidia cocta in aquæ libris tribus ad tertias. Colaturæ addunt vini albi, clari, antiqui & generosi, mellis albi & optimi an. lib. i. Et coquunt in syrupi consistentiam. Quocunque modo ex prædictis paretur, ingratus est plurimum; Ob id rectè multi quantitatem absynthij minuunt, & saccharum addunt: Nam quæ roborando ventriculo dantur, si valde ingrata sint, eum subuertunt, nec iuuant.

Syrupus de absynthio, dicitur roborare stomachum, iuuare concoctionem, excitare appetitum, flatus discutere, venas aperire, & vrinam mouere.

Vires.

Syrupus de stæchade. D. Fernel. CAPVT IV.

R̄. Florum stæchados ℥iiii.

Chymi,

calaminthes,

origani an. ℥i. ℞.

saluæ,

betonica,

florum roris marini an. ℥℞.

seminum rutæ,

pæoniæ,

fœniculi an. ℥iiii.

Coquantur in aquæ lib. x. ad dimidias.

In colatura adde sacchari &

mellis an lib. ii. fiat syrupus aromatizatus cinnamomi,

zingiberis, & calami odorati an. ℥ii. raro linteo illiga-

tis, & in syrupum appensis.

COMMENTARIUS.

Gemina syrupi huius descriptio à Mesue tradita ponit vtrumque piper, & pyrethrum: quæ quod calidiora sint Fernelius deleuit: Adiecit vero quædam cephalica, salutem nempe, bethonicam, præoniā, & rorem marinum, ut effectus ab authore propositos consequatur. Cognomen verò sumit hic syrupus à sua basi, videlicet à stœchade, cui cætera adiunguntur, ut vires nanciscatur magis cephalicas & insigniores. Permittit Syluius ut sine melle, & cum saccharo tantum delicatioribus conficiatur.

Vires.

Syrupus de stœchade cerebri multis affectibus cōfert, Mesuei testimonio; quibus minimè conferret, si iuxta ipsius descriptionem conficeretur: Nam stœchas, quæ pro basi ponitur, magis hepatica, aut splenica, quàm cephalica est: Ob id Fernelius multa cephalica adiecit, quorum ratione, syrupus iuxta illius descriptionem paratus, epilepsiæ, spasmo, tremori, & omnibus frigidis affectibus cerebri conuenit.

Syrupus de Glycyrrhiza. D. Mes.

CAPUT V.

℞. Glycyrrhizæ rasæ & parum contusæ ℥ii.

Radianti albi, vel eius penuria, polytrici ℥i.

hyssopi siccae ℥ss.

Macerentur simul per diem integrum in aquæ pluriæ lib. iiii. Tunc fiat decoctio ad consumptionem medieta-

tis. Colaturæ expressæ & clarificatæ adde

mellis optimi,

penidiorum.

sacchari an. ℥ viii.

aquæ rosarum ℥ vi.

Sic omnia coquantur, ut abeant in syrupum.

COMMENTARIUS.

Multi rectè glycyrrhizam siccam non diu elixant, quòd amarescat, sed tantùm in fine decoctionis ponunt. Colaturam cum penidiis, saccharo & melle clarificant, dein coquunt in syrupum, addita ante perfectam illius coctionem aqua rosarum; quam ideo nonnulli improbant, quòd syrupus ad anacatharsim instituatur, quam rosea propter astringentiam vim impedit. Quorum opinioni subscribens Ioubertus, aquam infusionis rosarum substituit, ut minus astringentem. Verùm aqua ideo commiscetur, ut syrupus hinc paratus, qualitatis magis astringentiæ sit particeps, & morborum principijs sumptus fluentes humores compescat, & fluxos concoquat.

Aquæ defectu infusum sumi potest, non minus astringentium.

Constat autem hic syrupus non modò medicamentis simplicibus, sed etiam compositis, nempe Penidiis, quæ sunt ex aqua hordei & saccharo, ea proportionem & arte coctis, ut massa quædam exurgat, admodum solida, & ita tractabilis, ut digitis non adhæreat, & in fila ducatur tenuiora, crassiora, breviora, aut longiora, & sæpiùs in-
 torta; Semper verò alba, unde Alphenici nomine designata, facilius autem parabitur, si parum mellis despumati commisceatur.

Syrupus de glycyrrhiza humores è cerebro fluentes sistit, fluxos coquit, tussi conuenit, & coctos humores ad expectorationem perducit.

Cōfectura
Penidio-
rum.

Vires.

Syrupus Iuiubarum. D. M. CAPVT VI.

Iuiubas n. lx.
 ℞ violarum,
 seminis maluæ an. ʒ. v.
 glycyrrhizæ rasæ & tussæ,
 capilli Veneris,
 hordei mundati an. ʒi.
 sem. citoniorum,
 papaueris albi,
 melonum,
 lactucæ
 gummi tragacanthi an. ʒiij.
 Coquantur in aquæ fontanæ lib. iiii.
 Colaturæ adde sacchari lib. ii. fiat syrupus.

COMMENTARIUS.

In hoc parando syrupo, primum coquitur hordeum mundatum: Cocto adduntur iuiubæ, dein glycyrrhiza; Postea capillus veneris, & semina melonis, lactuæ & papaueris. Tandem flores violarum. Tragacanthum quoque in fine ponitur, & post decoctum scilicet clarificatum, ne longiore coctura totum abeat in mucaginem, & syrupum efficiat nimis crassum ac viscosum.

Solet verò rectè cum seminibus maluæ, & citoniorum linteis includi, & cum decocto clarificato atque sacchari dicta quantitate secundum artem elixari in legitimam syrupi consistentiam, percocto syrupo nodulus amoveatur. Malè fit coctio ad medias secundum quosdam, nisi sacchari minuatur pondus.

Syrupus iuiubinus confert ad vocis raucedinem, tussim, pleuritidem, sputum coquendum, mouendum & educendum, estque medius inter violaceum & papaverinum, & fluxiones omnes cohibet, & fluxos humores lenit & coquit.

Syrupus de Hyssopo. D. M. CAPUT VII.

*R^x Hyssopi sicæ,
radicum apij,
foeniculi,
glycyrrhizæ an. ʒ x.
hordei mundati ʒ ʒ.
seminum maluæ,
citoniorum,
tragacanthi an. ʒ iiii.
capilli veneris ʒ vi.
iuiubas,
sebesten an. n. xxx.
passularum mundatarum ʒ iʒ.
ficuum siccarum,
dactylorum pinguium an. n. x.
Coquantur in aqua sufficiente. In colatura clarificata
adde penidiorum lib. ii. fiat syrupus.*

COMMENTARIUS.

Syrupus hic ab hyssopo basim & cognomen habet, in quo conficiendo Mesue illius author, non modo aquæ quantitatem non definit, sed nec quidem aquæ meminit. Debent verò eius assumi lib. viii. in quibus primùm horam circiter dimidiam hordeum coquetur: Deinde radices iniicientur incisæ, per quartam horæ partem elixandæ: Postea fructus omnes: mox semina & tragacanthum linteo raro inclusa. Postremo hyssopus mediocriter sicca, & capillus veneris verus, vel eius loco adiantum commune. Colatura coquendo ad libras tres redactæ, & clarificatæ addantur penidia sine amylo parata. Sunt qui malunt saccharum syncerum permiscere: nonnulli æquam sapæ & sacchari portionem. Præstat tamen iuxta Mesuei descriptionem & voluntatem conficere.

Sunt adhuc aliæ syrupi huius vel parum dissimilis descriptiones ab eodem authore exhibitæ, verùm hæc sola, quam transcripsimus, retinetur vt optima, & vñtatissima.

Syrupus de hyssopo confert plurimùm asthmati, tussi, pectoris doloribus à causâ frigida natis; valet quoque ad obstructions tollendas, menses ciendos, & saburram à renibus & vesica detergendam.

Facultate.

Syrupus de Artemisia. D. Fernelij.

CAPVT VIII.

R. Artemisiæ m. ii.

Radicum Iridis,

helenij,

rubia,

pæonia,

lybistici,

fœniculi an. ʒss.

pulegij,

origani,

Calamynthes,

nepetæ

melissophylli

sabina,

sampsuchi,

Contusa maceretur horis xxiii. in hydromelitis libr. viii.

Coquantur ad lib. v. Et cum sacchari lib. v. percoquantur in syrupum, conditum cynamomi ʒi. & spicæ ʒiii.

hyssopi,

prassij,

chamædryos,

chamæpityos,

hyperici,

parthenii

bethonica an. m. i.

seminum anisi

petroselini,

fœniculi,

oximi,

dauci,

ruta,

nigellæ, an ʒiii.

COMMENTARIUS.

Syrupus de Artemisia à Matthæo de Gradibus primùm descriptus, quòd simplicium farraginem perperam congestorum contineret, rectè fuit à Fernelio castigatus, qui supernuacanea & male conueniētia, aut parùm cognita subtrahens, vtilia tantùm reliquit, vt rectè notauit Plantius. Nam cùm frustra fiat per plura, quod bene fieri potest per pauciora: quid opus est, simul tot simplicia congerere, in quibus perquirendis & habendis, multùm temporis & nummorum abit: Nulli tamen pecuniæ, aut diuitiis parcendum, cùm de hominũ sanitate res est, sed ita, vt labor non sit in damno, ne crescat mortalis egestas. Magna sanè ac solennis quædam compositio, multis seculis recepta, longo vsu & ratione comprobata, nec mutanda, nec mutilanda; Sed quæ vix ratione probabili describitur, vel negligenda, vel castiganda. Sumitur autem huius syrupi denominatio ab Artemisia, quæ ipsius basis est. Parandi modus talis erit.

Radices primùm ireos, helenij, rubiæ, præoniæ, libistici, & faniculi macerabuntur aliquot horas super calidis cineribus in hydromelite, deinde parum coquantur: postea addantur artemisia, sabina, prassiũ, chamedrys, chamæpithys, bethonica & semina anisi, petroselinij, feniculi, ozimi, dauci, rutæ & nigellæ: quibus confuse mixtis, postquam parum bullierint, superaddentur pulegium, origanum, calamynthia, nepeta, melissa, sampsuchus & hyssopus. Tum omnia simul rursus parum elixata ab igne amoueantur, in aliud vas transfundentur; tepefacta exprimentur. Huic expressioni vt docet, facta & clarificata saccharum apponatur, & coctione ex arte facta, factus erit idoneus syrupus.

Sunt qui ad huius syrupi conseruandum odorem, vas in quo coquitur alio vase operiunt, ac subinde aperiunt, vt vapores inter coquendum sursum elatos, ac operculo inhærentes excutiant, ne in syrupum delabantur. Quod & rectè fieri potest in omni medicamentorum coctione, quorum odor retinendus.

Syrupus
de artemisia
simplicior.

Simplicior, & paratu facilior, nec inefficacior sic parari potest.

℞. radicum ænones, rubiæ tinctorum, graminis, rusci, an. ʒvi. seminum dauci & nigellæ Romanæ an. ʒi. artemisiæ, m. ii. Sabina, maioranæ, nepetæ, hyssopij an. m. ʒ. Coquantur in libr. v. aquæ ad medias. In colatura clarificata adde sacchari libr. i. ʒ. mellis Narbonensis optime despumati lib. ʒ. coquantur in syrupum.

Vires.

Syrupus de Artemisia suppressos, aut parcius fluentes menses potenter mouet, vteri strangulatus & subuersiones sedat.

R Carnis testudinum lib. ℞.

hordei mundati ℥iii.

carnis dactylorum ℥ii.

passul. damascenar.

glycyrrhizæ rasæ an. ℥i.

sebesten,

Iuiubas an. no. xii.

nucleorum pineorum,

pistaceorum an. ℥i℞.

seminum bombacis,

melonum,

cucumeris.

citruli an. ℥℞.

sem. l. Etuce, malue,

papaueris albi an. ℥ii.

Ungulæ cabalinæ,

pulmonariæ an. m. i.

florum violarum,

nenupharis an. ℥i.

Fiat decoctio, ut decet. In colatura clarificata ad lib. iiii. adde sacchari albiss. lib. ii. sacchari rosat. & diatragacanthi frigidi an. lib. ℞. fiat Syrupus perfectè coctus. Vel sic.

R Carnis testud. nem. lib. i.

violarum

nenuphar. an. ℥i.

sem. 4. frigid. m. & mi.

sem. malue.

sem. bombacis.

sem. cydoniorum.

sem. papauer. alb. an. ℥℞.

liquirit. ras.

tragac. alb.
 gum. arab. an. ℥i.
 hordei mundi q. i.
 passular. mund.
 malorum punic.
 pistaciorum
 iuiubarum
 carn. dactylorum ana. q. 5.
 penidiorum ℥ii.
 sacchari albiss. q. 5.
 fiat syrupus.

COMMENTARIUS.

Syrupi resumptiui generalis acceptio ad syropos omnes analepticos, seu restauratiuos extenditur, quibus solent medici practici carnem testudinum adhibere, ad illius, ut opinor, exemplum, cuius Ion. Tornamyraperhibetur author: apud quem legitur tractat. de febrib. qui tamen nunc à medicis imperatur, modis tot diuersis paratur, quot officinæ sunt in quibus habetur. Omnes siquidem eius, quotquot vidi, descriptiones, vidi autem multas; inter se discrepant, quarum nonnullæ nimis attenuantia, aliæ nimis viscida, aliæ inutilia admittunt, Aliæ iuxta formulam indebitè præscriptam vix parari queunt. Cap. de feb. he- tica.

Omnes verò testudines nemorales expetunt: quæ si dentur, deteriores sunt iudicandæ, ut inter ranas rubetæ, quod succum habeat acriorem, feruidiorem, minus alibilem, & habitui resarciendo ineptiorem. Proinde vulgares salubriores credo, ut quæ partim in terra, partim in aqua victitent, amphibiorum more.

Et si vera scripsit Rondelerius, non possunt testudines perpetuò aqua carere. Vnde per nemorales, terrestres, hoc est, quæ in loco minimè cœnoso & omnino palustri degunt, sed quæ partim in aqua limpida, partim in terra sicca victitant, intelligendæ sunt. Cap. 2. lib. de Am- phib.

Quasdam tamen vidi quæ tres annos in horto concluso vixerunt, alias, quæ perpetuò in libero & aridiore solo à fontibus & riuis longè dissito, quæ re vera ab aliis vultu & colore discriminantur. Sunt enim fere unicolores, nec maculis flauescentibus vilis variegatæ,

cruribus squamatis, vnguibus crassis, rectis, quibus inter gradiendum nituntur, & colore multum horrido, aspectuque cæteras superant.

Debent vero ritè præparari antequam accedant ad confectiorem syrupi. Ac primùm quidem abscisisco, cauda, & artubus, ferro idoneo testa diuidenda, aut separanda, vt caro tota habeatur, quæ ab omni sorde repurgata, & frustatim incisa, in aqua coquenda simul cum simplicibus enumeratis: idque eo ordine, vt citiùs, quæ cocturam longiorem postulant, seriùs, quæ leuiorem, admisceantur.

Sicque melius est omnia simul concoquere, quàm seorsim simplicia, dein carnem testudinum, vel hanc primùm, dein illa, vt quibusdam placere video. Colaturæ addatur saccharum vtrumque cum Penidiis.

Syrupus resumptius his confert qui à morbo chronico resurgunt, macie confectis, tabidis, pthysicis, & his qui praua quadam pulmonum diathesi laborant.

Syrupus exhilarans. D. Dom. Laurent. CAPVT X.

*R. Succorum bugloss. & borrag. lib. i. ss.
 Succipomorum redolentium lib. i.
 succi melissæ ʒss.
 granorum kermes. ʒiii.
 croci ʒss.
 pulueris diamargariti frigid. ʒss.
 diambre ʒiii.
 sacchari tabarzet lib. ii. fiat ex arte syrupus.*

COMMENTARIUS.

Huius syrupi descriptionem dat clarissimus vir Dom. D. Laurentius Gallorum & Nauarrorum regis medicus primarius, in quodam opere doctissimo, quod de visu conseruando, de morbis melancholicis, catharro & senio in lucem edidit. Illius autem authorem agnoscit affinem suum Dom. Castellatum Gallia quoque regis Archiatrum, à quo se habuisse confitetur. Sic verò debet confici.

In succis depuratis grana kermes noctem integram, super cineres

calidos infundentur: In forti expressione saccharum diluetur: Deinde coquentur omnia in syrupum: In cuius medio suspendetur nodulus, qui suo sinu pulveres, & crocum continebit. Dosis erit ad ℥i. ad ℥ii. Idque mane ieiuno stomacho, & vespere hora somni.

Cognominatur exhilarans, quia vim habet eximiam ad cor, & spiritus vitales exhilarandos, facultates erigendas, mœrorem abigendum, & qualitatem humoris melancholici malignam contemperandam.

Facultates.

Syrupus
Kermes.

Syrupus hic substitui poterit eius penuria, qui ex succo granorum kermes parari solet his in terris, in quibus ilex coccigera viret: Cuius quidem non sumus obliti, sed tantum parandi modum quod perfacilis sit, subticuimus, hisque reliquimus, quos eius percelebris succi fecunditate natura donauit.

Extant pene dixerim innumeræ aliorum syruporum apud auctores varias descriptiones, sed quæ eorum usus vel improbetur, vel non satis probetur, antidotarium hoc nostrum his onerari, & velut inquinari nolumus. Syrupus enim mannæ acidus, granatorum dulcium, pomorum persicorum, prunorum acidorum, cucurbitæ, pyrorum, vuarum purgatarum, de thymo, & alii adhuc multi à Mesue descripti prorsus exoleuerunt.

Audio quosdam syrupos de centauro minore, de hyperico, de hedera, de peto, de senellis, & alios quosdam nondum usu receptos edidisse, quos si probarit incluta schola Paris. & ego probabo. Negligitur syrup. poricatus Myrepsi. syrup. Diasereos Andernaci, syrup. de lilio, de acoro, de Rubea, de pulegio, de turbith, de vua, Columbinus, Macedonicus, de myrobalanis, atque plures alij, quos Iacobus de Manliis, Andernacus, Vvekerus, & quidam ex recentioribus describunt.

Syrupus de Corallio. CAP. XI.

℞. Corallij perrubri ℥iiii. succi berberis depurati lib. i. inclusa in matraccio ritè obturato diestres aut quatuor in arena, vel cineribus tepidis simul macera. Postea effunde liquorem, cui permisce sacchari ros. lib. ℞. coque in syrupum.

COMMENTARIUS.

Nova cuique genti, maximè Gallis in amiciendi ritu placent, novorum tamen vestimentorum, ut medicamentorum non idem encomium, cum illa exterius sint ornamento, hæc detrimento sæpe, præsertim cum optimis rationibus inuenta minime dicuntur: Cuiusmodi est syrupus qui improprie à Corallio nomen habet, cum in ipsius compositione, copia, sapore, viribus nequaquam præpolleat. Verum satis est multis, modò sit novus syrupus, ut exspectatur, ut celebretur. Hoc animi vitio laborantes Luteriæ quotidie decipi videmus, ubi erronei multi vel astu, vel fastu victitantes nouo vocem ac verborum susurro nimis credulos argento emungunt. Vidi nobilem omnia medicamenta despicientem præter syrupum de Corallio, quo se à graui morbo sanatum assererat: Eo tamen cum caruisset pharmacopæus syrupum Berberis tantum exhibuit, cui parum aciduli vitrioli cōmiscuit. Sic aliquando populum ignarum decipi, dum concupiscit, non agrè fero, in eorum præsertim usu, quæ vel affinia sunt, vel æquè bona. Vix siquidem plus facio syrupum de Corallio recentiorum, quàm de Ribes aut Berberis, præsertim cum astringere & interanea roborare est opus: Ad quos effectus consequendos vix egregius est ille qui à corallio in succo limonum instigante conficisolet. Efficaciorem existimo, qui depurato succo berberis, vel Ribes vel vtriusque paratur. Deteriorem credo qui tinctura corallij solo vitrioli liquore extracta cōficitur. Audio quosdam alios parandi modos iactare, qui cum è spagyricorum taberna prodeant, ab omnibus non admittuntur.

Varia syrupi de corallio præparationes.

Suadent nonnulli ad huius syrupi confectionem totam corallij tincturam educendam: Quod facile per iteratam eius infusionem consequuntur.

Syrupus de Corallio vim habet cardiacam, stypticam & roborantem, proin multum confert cholerae morbo, nauseanti ventriculo, affectibus omnibus ab alui nimia laxitate ortis, & mensstruis immodicè erumpentibus.

Vires.

Syrupus de Cinnamomo. CAPVT XIII.

*Cinnamomi odoratissimi parum contusi ℥iii.
 R. infunde tres dies in quantitate sufficienti aquæ tepidæ:
 Dein in Bal. m. distilla: tum sume huius aquæ stilla-
 tæ lib. i. sacchari ros. lib. ℥. igne lento fiat syrupus.*

COMMENTARIUS.

Syrupi de
 caryophyl-
 lis.

Eodem modo parari poterunt syrapi ex alijs aromatis, vel singulis
 scorsim, vel plurib⁹ simul mixtis: valde Cephalicus est qui fit ex caryo-
 phyllis in aqua rosarum infusis cum floribus anthos & saluia, addito
 saccharo cando ad syrapi consistentiam decocto. Valde quidem
 prodest omnibus affectionibus cerebri à frigida causa natis: Cardia-
 cus & alixiterius erit qui ex radice angelicæ, & quibusdam alijs addi-
 tis sic fit.

Syrupus
 Angelicæ.

R. radic. angelicæ veræ ℥i℥. radic. cōtra yerua ℥ii. calami aromatici
 macis an. ℥i. infunde per biduū in aquis cordialibus vt cardui, scor-
 dii, buglossi, scabiosæ & vlmariæ. In colaturâ tam facta ad lib. j. adde
 sacchari albissim. ℥viii. fiat ex arte syrupus. Conferet palmo syncopæ
 & omnibus cordis affectibus, qui febrim nullâ aut parum comitem
 habent.

Sedulus quisque Therapeuticus eodem modo ad varias egritudines
 syrapi concinnare poterit ex omnibus aromatis intusis maceratis,
 & si opus fuerit coctis, ex aquis quoque destillatis succis depuratis,
 & nonnunquam ex vinis. Vfus tamen nunc frequentior & suauior
 hippocratici vini vt olim oinomelitis quâ syrapi vinoli quauis arte
 parati, neque vero alterantes & roborantes syrapi nunc antiquo &
 nouo modo conficiuntur, sed & cathartici seu humores noxii à cor-
 pore secernentes & expurgantes. Cuiusmodi sunt solemnes quidam
 syrapi in diuitum ædibus potius quâ in pharmacopoliis asseruati ad
 peculiare quosdam affectus quibus obnoxij sunt præcauendos, aut
 expugnandos, & ad naturam ab ipsis conseruandam. Sic quosdam
 videmus melanagogos qui sennam & Elleborum acceperunt, alios
 hydragogos qui semem ebuli & ialapam: Alios phlegmago. qui agari-
 cum cartham. cnicum polypodium: quosdam cholagogos qui rhe-
 um admiserunt. Eos autem non nisi probo qui à probatis medicis
 imperantur.



SECTIO TERTIA,

De Syrupis Mellitis.



*S*uper sunt adhuc aliquot Syrupi, hac in sectione describendi, qui non saccharo, sed melle dulcorantur. Nec reliquorum more ex radicibus, foliorum, florum, seminum & fructuum decocto, sed solis succis lymphidis & aqueis parantur; Ad quos non incongruè refertur Hydromel illud magis melleum & coctum, quod vinosum nuncupatur. Sapore enim, viribus & consistentia est Syrupis valde finitimum.

Oxymel, seu Acetum mulsum. Secaniabin Arabibus dictum.

CAPUT I.

R. Mellis optimi lib. ii.

Aquæ fontanæ lib. iiii.

aceti Vini albi lib. i.

Coquantur simul in vase fictili ad consistentiam Syrupi liquidioris.

COMMENTARIUS.

Mel primùm in aqua coquitur & despumatur, dein acetum paulatim admiscetur, tum omnia simul coquantur, donec syrupi liquidioris consistentiam acquirant. Non videtur autem certò definita à Compositionis illius stratio.

^a cap. 101. li. 8. de simpl. med. ^b cap. 24. lib. 5. coll. veteribus aceti quantitas, nam cum mel calidum sit ex ^a Galeno, & in calidis naturis citò bileſcat, tantum aceti addendum est, ^b Oribasijs consilio, quantum satis sit, ut facultas in bilem conuertendi corrigatur: Sicque fiet Oxymeli, omni ætati & naturæ ad tuendam valetudinem vtilissimum. Est enim ut acidum, ut dulce, ut medium, debetque fieri variè pro ^c gustu ſumentis: Ita tamen ut non noceat,

Nam quod valdè acre est, intestina abradit, expectorationemque impedit;^d Sed quod mediocriter est acre, pulmonis, thoracisque affectionibus multo est vsui; Nam sputum educit, & facilem edit spirationem ex e Hippocrate: humores namque crassos incidit & attenuat, visceraque sine molestia expurgat, & ad victus attenuationem est accommodatissimum.

Varia igitur illius præparatio, variaque apud authores mellis ad acetum, & aceti ad aquam proportio. Licet enim aquosum, ut melius glaudetur, non tamen omnibus equè conuenit neque arridet.

h Oribasius vult, ut aceti vni parti duplum mellis addatur: & quæ quadruplum, hæcque ad tertiam vel quartam partem decoquantur. Quæ descriptio eadem est, cum ea, quam tradit Mesue: Cui assentitur k Serapio, qui alicubi oxymel parat ex æquis partibus mellis & aceti. Verùm hoc nimis est acetatum.

Inter vtrumque medium est, quod ex parte vna, & dimidia aceti ad duas mellis optimi fit, quod scilicet præter reliquas bonitatis notas, non multum aggerit spumæ: Nam mel omne quod multum spumescit, debet diutius concoqui & despumari: Sicque maior illius portio coquendo dissipatur. Tandiu autem coqui debet donec spumam amplius non efferat.

Augetur ergo vel minuitur aceti quantitas secundum voluntatem vrentis, cui magis conuenit, inquit Serapio, si ab eo magis expectatur, & ita debet fieri secundum omnem dispositionem, ait l Aui-cenna. Quod tamen in officinis seruatur, secundum Mesuei descriptionem parari solet, sed vsus tempore, magis aut acetatum, aut mulsum redditur, prout rei exigentia demonstrat.

Oxymel crassos & viscidos humores incidit, attenuat, & ad expurgationem apparat, & promiscuè calidis affectibus & frigidis confert, atque ad ea omnia valet, quæ supra diximus.

Oxymel scilliticum. CAPUT II.

*R. Mellis despumari lib. ii.
Aceti scillitici lib. ii.*

Coquantur simul in vase figulino ad consistentiam syrupi liquidioris.

COMMENTARIUS.

Marcellus medicus alio modo parat, aquam superaddendo; Accipit enim Scillæ lib. j. aquæ fontanæ lib. iiii. ſ. Coquit ad libram vnā & mediam: Sic diem integrum relinquit in olla rite obturata: Dein exprimit: Expressioni admiscet aceti tantumdem, mellis expunati lib. iiii. Rursus leuiter concoquit ad consistentiam syrupi.

Oxymel
Scilliticum
Marcelli.

Manardus quoque & Bern. Dessennius putant non posse fieri sine aqua, quorum opinioni quidam assentiuntur, aquæ duplum ad acetum miscentes, vt in simplici: verum ea non opus est, inquit Syluius, quum mel non nisi aqua despumatum & coctum sumatur, & acetum legitimè cum scylla præparatum. Sic vero fit acetum illud scyllites.

Segmentorum scillæ filo traiectorum & in vmbra siccatorum lib. vna sumitur: In aceti vini albi libris octo maceratur, mixtura calidioribus æstiuis per quadraginta dies in vase vel vitreo, vel fictili & vitrato oris angustî insolatur: deinde colatur: Tum abiectis scillæ segmentis transfusum acetum seruator: Cuius olim, quàm nunc frequentior vsus, ob saporis insuauitatem, & breuem durationem, vix enim quatuor menses sine corruptela potest conseruari.

Acetum
scilliticum
vt fiat.

Cap. II. Alij sunt multi ac varij eiusdem parandi modi, sed qui nunc à nobis traditur, vltior est, & descriptioni congruit, quam de illo tradidit Paul. Æg. lib. vii. de re Medica.

Varia adhuc oxymelitis scillitici dantur à variis authoribus descriptiones magis compositæ, cuiusmodi est oxymel scilliticum Democratis, Iuliani, & quod de radicibus cognominatur.

Hæ autem omnes oxymelitis scillitici magis compositi varietates negliguntur, nec vllibi paratæ reperiuntur: propterea neque à nobis describentur.

Oxymel scilliticum crassos humores incidit, obstructionem pulmonis ab humoribus valenter impactis tollit, epilepsiam, vertiginem, cephalalgiam & hemicraniam sanat.

Rx Radicum apii,

fœniculi,

petroselini,

rusci,

asparagiani. ℥ii.

fœniculi an. ℥i.

Coquantur omnia in libr. xii. aquæ ad eius medieta-

tem.

In colatura clarificata adde

mellis optimi lib. iiii. vel quod sufficit,

aceri vini albi lib. i.

Ex arte fiat liquidior Syrupus.

COMMENTARIUS.

Paratur vt oxymel scilliticum compositum, substituto aceto simplici ac vulgari pro scillitico. Nic. Præpositus quoddam oxymel compositum aromaticum parat, & aliud potenter diureticum ex Iacobo de partibus mutuatum: Illi aromata multa, huic radices graminis, ireos & raphani permiscet: Sed ea vtendi tempore, si sit opus, rectius poterunt admisceri, nec aliud compositius oxymel in officinis erit necesse seruare.

Quantitas autem mellis ab auctoribus non definitur, quod modò dulcius, modò acrius desideretur: si tamen iuxta illius quantitatem à nobis definitam paretur, medij erit inter dulcedinem & acridinem saporis.

Vires.

Oxymel compositum humores viscidos, lentos & pituitosos incidit, attenuat & abstergit: Obstructionibus hepar, lienem & viscera liberat, renum & vesicæ saburram pellit, & vrinam mouet.

Extant aliæ multæ non solum apud veteres, sed etiam recentiores compositorum Oxymelitum differentes formulæ, quæ tamen raro parari solent. Parata namque vidi neglecta & tamdiu in Officinis seruata, vt amissa priore virtute aliam noxiam, vt raucedinem contraxerint.

Si quis vero ditior ad effectum peculiarem abigendum opus habuerit Oxymelite compositissimo, facile erit describere & parare, his additis, quæ partes ægras respiciant, & ægritudines summoueant. Sic Asthmaticis tussientibus, Orthopnoicis & diuturnis affectibus thoracis Thoracicum Oxymel conferat, admixtis pectoralibus, incidentibus & bechicis. Sic catharticis, & quibus mesenterium & hypochondria multa illuue, crassa & cruda infarciuntur oxymel attenuans, & aluū subducēs auxiliabitur. Et qui lue venerea laborat, bene habebunt ex usu Oxymelitis Alexiterij, quod præter aquam, acetum, mel & cardiaca quædam scobem guaiaci, sarsam parillam & Sassafras admittet. Si quis adhuc propter saburram, grumos, aut vitidos humores in renibus aut vtericibus, & alijs partibus excernendo lotio dicatis libere non mingat, oxymel habeat diureticum & bibat, ex his confectū, quæ meatus vrinarios explicant, viscidos humores incidunt, atque totam illuuiem foras protendunt. Tot variorum Oxymelitem formulas describere superfluum & inutile duco.

Oxymel-
thoracicum.Oxymel
ad lue-
m veneream.

Hydromel vinosum, simplex. CAPUT IV.

R^x Mellis optimi lib. xii.
 aquæ pluriæ vel fluminatilis lib. xl.
 Coque simul donec ouum crudum injectum innatet.
 Tunc amoue, insola, & serua.

COMMENTARIUS.

Si cui hæc describendi & parandi forma displicuerit, liberum sit illi aquam decoquere ad tertiæ partis consumptionem, aut paulo plus, spumam accuratè inter coquendum abiciendo. Sic enim aquæ portione magis dissipabili vaneſcente, quod remanebit consistentiam habebit syrupo liquidiori affinem, saporem gustui suauem, coctionem conseruationi idoneam.

Ex melle autem medicamenta multa basim & appellationem mutantur, vt mulsa, hydromel tam aquosum, quam vincum, oxymel, aliaque multa mella medicata ex plantarum succis, vt Rhodomeli, seu mel rosatum, violatum, mercuriale, passulatum, Anthosatum Anacardinum.

Mulsa constat tantum aqua & melle, diuersa proportionem inter semistis. Diluissima verò quædam mulsa dicitur, quæ ex plurima aqua,

Mulsa.

& pauco melle paratur. Fit enim mulla, inquit Oribas. cum multum aque mellis admiscemus, deinde coqui nus tantisper, quoad spumare desinat. Tunc enim spumam tollere oportet: pituitosis tamen mellis quantitas, tum ad humoris peccantis alterationem, tum ad saporis gratiam. *Ca. 14. lib. 5. collect.*

Mulla quid
Oribas.
Mulla &
Melicratum
idem.

Fallitur Oribasius, qui mullam putat fieri debere ex vino & melle: Melicratum verò ex melle & aqua. Nihil enim est inter vtrumque discriminis, ex Galeno. Mesueo tamen Melicratum est Oinomel, cuius duas exhibet descriptiones: Priorem, quæ fit ex vino & melle: Alteram, cui præter hæc duo adiiciuntur aromata quædam, ut caryophylli, cinnamomum, spica aromatica, macis & similia: & à nonnullis, eodem referente & consentiente, Conditum nominatur. *Part. 12. Cap. 13. lib. 3. l. de vict. acut.*

Oinomel.

Illud autem potionis genus, quod ex melle & vino paratur, vocatur Oinomeli, quod aliquando fit ex duabus partibus vini veteris & una mellis. Aliquando ex partibus quinque, aut sex musti, & una mellis: & ubi deferbuit in dolia diffunditur. *Cap. 25. lib. 5. collect. Oribas.*

Apomeli.

Hydromel simplex ac vulgare eodem modo paratur, ut Melicratum, adeo ut nomine tantum, non re inter se dissideant. Placet tamen Galeno, ut Mulla ex aqua pluuiæ potius paretur, cum hydromel sæpius ex fluuiatili, & aliquando fontana.

Syrupus de
fauis mellis

Apomeli verò non multum dissimili modo paratur. Fit enim ex aqua non pluuiæ tantum, sed qualibet, inquit Galen. modò pura, & melle à fauis expresso, tandiu simul coctis, quoad spuma amplius non exurgat: Quæ cum primum emergit, eximenda: Sic enim acrimonia deponitur. Ab Antiquioribus vocatur Syrupus de fauis mellis. *Cap. 12. lib. 4. de finit. tuend.*

Apomelitis
optima des-
criptio.

Alia apomelitis præstantioris datur descriptio à Philagrion hoc modo: Fauis optimo melle pleni manib. fortiter exprimuntur, portioque una mellis expressi in quatuor partes aquæ purissimæ injicitur, simulque faui in aquam immersi lauantur, ut quicquid mellis est in eâ deponant. Tum aqua colatur: dein igne luculento coquitur, & probe despumatur. Postea ab igne remouetur, & cum refrigerit, quicquid fluitat, abicitur. Tum denuò coquitur & despumatur, idque ter reperitur. Tandem frige factum, & ab excrementis repurgatum hoc Apomeli in vas fictile, aut ligneum iniicitur.

Hydromel-
itis vinosi
vires.

Aquosum autem hydromel vix unquam in officinis seruatur, sed re exigente citissimè paratur. Vinosum verò sæpe medicorum consilio conficitur, & in multorum ciuium ædibus, tanquam nectar quoddam maluatico vino generosius asseruatur. Potenter enim frigidos humores coquit, expectoratum mouet, stomachum roborat, cruditatem impedit, coctionem iuuat, appetentiam excitat, flatu discutit, colicos dolores mitigat, urinam mouet, & frigidis naturis mirum in modum conuenit.

Solent Angli vinosum quoddam hydromel magis compositum pa-

rare, *Meteglin*, & *Metegla*, illis dictum, quod minorem mellis quantitatē recipit, sed aromata multa & fermentum admittit. Sic verò *Meteglia*. solet parari.

℞. Mellis optimi lib. x. aquæ limpidissimæ lib. lx. bulliant simul ad tertiæ partis consumptionem, spumam innatantem abiiciendo. Colatura refrigerata in dolium, aut aliud vas idoneum immittatur: Cui suspendantur vnciæ tres fermenti nodulo inclusi: Addantur cinnamomi, granorum paradyfi, piperis, zinziberis, caryophyllorum crassius contusorum an. ʒj. Reponitur vas dies quadraginta in loco soli exposito, vigentibus cælisqualoribus, deinde recondatur in cella vinaria ad vsus.

Hydromel
vinum
Anglorum.

Genus hoc potionis suauissimum est, quod biennium sæpè seruetur, & saporem, ac virtutem vini maluatici æmulatur.

Solent & Germani alia suo modo conficere suauissima & medicatissima, inter quæ hoc in Germano solo vsitatum selegimus, quod sic paratur.

℞. mell. optim. lib. v. aquæ puriss. lib. ʒo. bulliant vsque dum spuma detrahatur: Tum adde summitatum origani, hyssopi, artemisiæ, maioranæ, saluiæ, bethonicæ sacculo conclusorum an. m. ʒ. lupuli, m. ii. hordei p. ii. baccarum lauri crassè tritarum lib. ʒ. Includantur hæc alio sacculo paruo, & omnia in melicratum parandum conijciantur; quod postea coquendum semper despumando, si fuerit opus, donec ouum crudum innatet. Deinde auferantur sacculi: Rite trāscolerur decoctum mellitum, & refrigeratum in dolia idonea conijciatur; At que simul nodulus ad medium vsque vas suspendatur qui caryophyllorum, cynamomi, piperis an. ʒ. ii. continebit. Tandem accuratè vas obturabitur, & calido in loco per mensem, aut diutius, si videatur opportunum, seruabitur.

Hydromel
vinum
Germani.

Imbecillo ventriculo confert, calorem natium roborat, spiritus reficit, sensus viuificat, facultates excitat, cruditatem tollit, & partes nobiles confortat.

Vi res.



SECTIO QVARTA,

De Succis Mellitis.



*R*ex plantis vel infusis, vel earum succis & melle composita quaedam mellita servant Officina, quæ à consistentia & mellis, nonnulli syrupos melleos, nos à succis potius qui confecturam ingrediuntur, & à melle, succos melleos, aut mellitos vocamus. Siue enim succus platarum extractus melli adiungatur, siue ipsæ plantæ cum melle tabescant, earum semper succus melli admixtus manet, unde tota mixtura ritè succus mellitus nuncupatur.

Mel Rosatum, Latine, *Rhodomeli* Græcè.
Geleniabin, Arabice, CAP. I.

*R*osarum rubear. in umbra parum siccatarum lib. ii.
 mellis boni, nimis nec recentis, nec veteris lib. vi.
 Misce, & coque clementer, ac lento igne: In vase
 vitro, vel fictili vitatoreconde: In sola & serua.
 Et si volueris, percola, & sic serua.

COMMENTARIUS.

Non est vnus apud omnes mellis rosati parandi modus: & multi conficiendi modum à Mesue, & Nic. Præposito datum aspernati, nunc igne solo, nunc insolatu, nunc vtroque modo, nunc istorum nullo, sed sola maceratione contenti parant. Quidam rosas integras & solum exungatas in mel coniiciunt, alij non nisi tritas. Sunt qui succum tantum: Alij & succum eductum, & simul alias rosas. Vltimior præparatio fit iuxta modum à nobis traditum, quo rosæ aliquantum siccitæ in melle macerantur, dein parum elixantur: Postea soli exponuntur, & tertio quoque die mouentur, vt vndique incalescant. Dum hoc modo paratum, non colatur, mel ro-

fatum foliatum vocatur. Si calfactum linteo percoletur, vt ferè fit, saltem ante vsum, mel rosatum colatum nominant, & maximè quod ex tritis rosis & melle fit. Quod ex duabus partibus succi rosarum exungatarum, & vna mellis simul coctis ad quartæ partis assumptionem paratur, amota sedulò inter coquendum spuma, id mel medicatum Rhodostactum, seu mel rosatum colatum dicitur, omni alio liquidius.

Mel rosati
foliatum.

Rhodostac-
tum quid.

Mel rosatum fluxiones calidas cohibet, stomacho benefacit, deterget & roborat tam sumptum, quàm adhibitum.

Vires.

Mel Violatum.

C A P V T II.

*Rx Flor. Violarum recentium lib. i.
mellis optimi, mediæ ætatis lib. iii.
misce, & reconde in vase vitreo, aut fictili & vitra-
to, oris angusti. In sola, serua, & vsus tempore per-
cola.*

COMMENTARIUS.

Ad huius mellis preparationem, nonnulli violas terunt, alij integras, quod paruulæ sint admodum, melli calidiusculo, olla figulina, vitrata excepto, permiscunt: Tum quindecim dies ollam soli, & optimè quidem, exponunt, alternis diebus rudicula mixturam agitando: Deinde reponunt, & vtendi tempore parum aquæ permiscunt, parum elixant, probè percolant; sicque violatum mel tunc habent optimum. Alij alio modo. Verùm Mesuei testimonio rectè parari potest vt rosatum. Debent autem violæ assumi parumper siccata, vel saltem omni acquisita humiditate exhaustæ: Mel verò nec recēs nimis, nec nimis antiquatum.

Mel violatum commendatur ad effectus thoracis, ad leniendum, abstergendum, refrigerandum, roborandum: Ob id vtiliter clysteribus multis, & gargarismatis permiscetur, & vlceribus detergendis adhibetur.

Vires.

Mel Anthosatum. CAPUT III.

℞ *Florum rosmarini lib. i.*
mellis boni bene despumati lib. iiii.
misce in olla vitrea, aut vitrata, oris non valde
pauci: Infola & serua ad futuros vsus.

COMMENTARIUS.

Eodem modo paratur mel Anthosatum, vt violatum, rosatumvè. Nonnulli mel præferunt vetustissimum, ego ætate medium, quod nec dilutum nimis est, nec nimis crassum. Dicitur hoc mel anthosatum à libanctidis, seu rosmarini flore, qui dignitate quadam præ cæteris anthos dicitur.

Cum rosmarinus bis in anno floreat, Vere scilicet & Autumno, bis quoque mel anthosatum optimè confici potest, dictis nempe temporibus, quando flos illius recens est, & suauissimè fragrat; Siccus enim ferè inodorus est, & vix vllius vsus.

Vires.

Melanthosatum cephalicam vim habet & nerualem, vtiliterque miscetur clysmis ad Lethargum, Apoplexiam, & comatosos affectus perscriptis. Frigidæ intemperies partium calore suo corrigit, & flatus dissipat.

Mel Mercuriale. CAP. IV.

℞ *Succi mercurialis lib. iiii.*
mellis optimi lib. iiii.
misce, elixa, despuma, & fac veluti
Syrupum.

COMMENTARIUS

COMMENTARIUS.

Mel non omnes eadem quantitate mensurant, alij plus succi, minus mellis adicientes, alij contrà plus mellis, minus succi, & multi par vtriusque pondus commiscantes.

Nos mel præpollere iudicamus, cùm non ex foliis, aut floribus maceratis conditur, sed succo commixto, à quo satis efficax redditur, etiam si eius quantitas succum exuperet. Nonnunquam ex foliorum decocto tantùm paratur, non tamen mihi satis probatur hic conficiendi modus.

Æque verò parari potest ex succo mercurialis maris & fœminæ, vtraque enim vires habet affines, & huic melli conficiendo conuenientissimas.

Ad mercurialem marem refertur cynocrambe, seu brassica canina, cuius tamen succo non solet hoc mel confici. Debet verò à medio vere ad finem aëstatis parari; Tunc enim & plantæ sunt succulentiores, & earum qualitas vegetior & efficacior.

Vix autem aliis vsibus inseruit mel mercuriale quam clysteribus Vires. parandis, vt eorum vis sit magis abstersoria, & purgatoria.

Mel Passularum. CAPUT V.

℞. Passularum ex acinis purgatarum lib. ii.

Infunde xxiiii. horas in lib. vi. aquæ calentis:

Deinde coquantur ad medietatem.

Colatura fortiter expressa denuò coquatur ad consistentiam mellis.

Vel,

Colaturæ prædictæ lib. iii.

℞ mellis despumati lib. ii.

Misce, & coque ad crassitudinem syrupi.

COMMENTARIUS.

Duos parandi modos dedimus, vnum, cum; Alterum, sine melle. Sic enim interdum paratur, licèt Matheus de gradibus illius author primum descripserit absque mellis interuentu. Quocunque ex istis modo conficiatur, admodum palato gratum est, vimque bechicam.

habet : proinde eclegmatum quorundam a tē compositionem ingreditur, vt eclegmatis. De Pino apud Mesuem.

Alia quædam sunt mella medicata, vt Myrtinum, Scylliticum, Anacardinum, & quod ex Myrobalanis Emblicis paratur: quæ cum in medicina nullius aut rarissimi sint vsus, rarò parata reperiuntur.

Mellis A-
nacardini
varia præ-
paratio.

Anacardinum verò multas ob causas prætermisimus, primò quod Anacardia fructus sint exotici, qui rarissimè ad nos aduehantur. Secundò quia deleteria quadam qualitate prædita notantur, vel saltè excessu multo intemperata. Tertio propter multam in eo parando authorum ambiguitatem. Sunt enim qui anacardiorum tantum decoctum cum melle feruefaciunt, donec mellis spissitudinem acquirant: Alij eadem trita, in aceto dies septem macerant, deinde coquunt ad medias: Postea cum melle coquunt adhuc in syrupum. Alij tantum anacardia terunt & coquunt, donec aqua ex obscuro rubeat: Spumam innatantem colligunt, tanquam mellaginem, eamque seruant pro melle anacardino. Denique mel anacardinum parari nolo ob eius vires, si non noxias, certè parum vtilis, aut vix sanitati tuendæ vel resarciendæ conuenientes.



SECTIO QUINTA.

De Rob, seu Sapa, & alijs Robub.



*Lantarum succi ad futuros vsus conseruantur, vel admix-
tione rei alicuius, vt mellis aut sacchari, quo modo con-
fecti Syrupi seruantur, vel artificio quodam immutati,
cuiusmodi est Rob, id est, sapa, seu vinum coctum, vel
Robub, hoc est, succus plantæ cuiusvis alius, solis vel
ignis calore incrassatus. Rob verò simpliciter dictum anto-
nomasia quadam de Sapa, seu defruto coctione inspissato intelligendum, de alijs
cum additione plantæ, ex cuius fit succo, vt Rob berberis, Rob cornorum; &
similium.*

*Rx Vini recenter ex vuis albis, generosis & maturis
expressi lib. xii.*

*Coque igne luculento, donec libræ tantum quatuor
superfint: vel vt consistentiam mellis acquirant.*

Repone in vase idoneo, & serua.

COMMENTARIVS.

Trifariam Sapa fieri consuevit Nam mulierculę suo modo con-
ficiunt ex vuis quibuscumque, nigris & albis modo maturis, in lebetē
sine aqua coctis & expressis, & ad mellis consistentiam inspissatis;
Solentque vocare Resinatum, quasi racematum, ex racemis scili-
cet conditum.

Resinatum
plebeculæ.

Pharmacopœi suo quoque modo, sed præstantiore conficiunt; Vi-
num namque recens ex vuis albis, maturis, selectis expressum assu-
munt: ad duarum eius partium absorptionem percoquant: Ter-
tia quæ remanet, spissitudinem habet mellis, quæ Rob, seu sapa est
officinarum, in quibus tamen nunc rarò seruatur cum ferè illius de-
fierit vsus.

Coci quoque suam sapam habent, ex musto recenti ad crassitudi-
nem mellis cocto paratam, qua vtuntur ad embamata, seu intinctus.
Vtuntur adhuc sepe defruto, quod ex vino dulci fit, ad tertias tan-
tum elixato & despumato, vt liquidum adhuc maneat.

Defrutum
qui fiat:

cap. 6. Sapa potissimum commendatur ad morbos oris. Non modò enim
lib. 3. stypticitate quadam roborat, & materiæ fluentis motum inhibet,
sed etiam iam fluxum humorem abstergit, & digerit. De sapis fu-
sus egimus in Institutionibus nostris.

Rob. Ribes. CAPVT II.

Rx Succi Ribes lib. ix.

Coque igne lento ad partis tertię consumptionem:

*Deinde colo traice: Colaturam subsidere permitte,
donec clarescat: quæ postea lēro igni denuò coquatur
aut insolatur ad eam consistentiam, vt seruari possit.*

COMMENTARIUS.

Vocatur hæc Sapa, Ribes simplex, ad differentiam alterius magis compositæ, cui medium sacchari pondus additur: Sed frequentius & melius iuxta præscriptum modum conficitur.

Debet autem parari mense Iunio, quando scilicet ribesia omnino rubea sunt, matura, & succo multo prægnantia. Ex his enim tunc temporis tritis & expressis vbertas succi educitur.

Rob ribes multiplicis est qualitatis: Refrigerat enim, astringit, roborat & cor recreat: Proinde datur vtiliter calidæ intemperiei alterandæ, partium imbecillitati roborandæ, cordis moribus propugnandis, & vomituriensibus iuuandis. Sua enim clementi stypticitate & aciditate delectabili, quamcunque partem attingit, solatur. Eodem modo fit Rob de Berberis. Vel sic.

Rob Berberis. CAPUT III.

*℞. Succi berberis optimè colati lib. viii.
Coquantur igne lento ad consistentiam mellis:
Repone in vase vitreo, aut fictili & vitrato.*

COMMENTARIUS.

Eo rectè modo Rob berberis potest parari, quo Ribes: Nam ut affines sunt fructus, colore, magnitudine, viribus, sic affinis, aut similis ex utriusque succo, Rob conficiendi modus.

Vires.

Datur ad refrigerandum & astringendum. Sitim restinguit, tum à ventriculo calefacto, tum ab aliorum viscerum calida, & sicca intemperie ortam. Conuenit & cholæræ morbo, & hepatico fluxu laborantibus, dysentericis & alui frequenti proritatione diuexatis.

*R̄. Succi cornorum colati, & in Sole aut igne depu-
rati. lib. ix.*

Coque igne clementi ad librum sex dissipationem.

Quod remanebit, repone in vase idoneo & serua.

COMMENTARIUS.

Nonnulli portionem sacchari permiscent, efficiuntque Myuam, vulgo gelatinam, sed tanto inefficaciorem quantò suauiore, præstatque simplicem parare sapam, nec saccharo conditam, vt vires illius non refractæ, sed integræ maneant. Verùm cum multos syropos Vires. astringentes & refrigerantes habeamus, vt syrupum rosarum siccarum, citoniorum, myrtinum, Alexandrinum, vix vnquam ad Rob Cornorum confugimus, quod virtute astrictoria potissimum commendatur: Ob id præscribi solet ad fluorem quemlibet sistendum, dysenteriam, celiacum affectum, choleram morbum, & vomitum.

R̄. Succi citoniorum ex arte depurati lib. ix.

Coque ad durum partium absorptionem, vel quousque mellis consistentiam acquirant, & repone in vase figulino vitrato, aut vitreo.

COMMENTARIUS.

Vt probè succus depuretur, debet prius calefieri, dein residere, vt clarescat: Tum lentò igne coquendus: Sic enim spissitudinem idoneam comparabit.

Rob citoniorum astrictoriam qualitatem habet & roborantem; vnde ventrem sistit, liquidiorum compescit, stomachum roborat, Vires.

cholera morbo confert, hæmorrhagiam retinet, omnemque alium
florem.

Ex alijs fructibus multis olim veteres Robur sua parabant, quibus
frequentè utebantur, sed recentiores malunt ex hisdem Syru-
pos, vel Conseruas parare.



SECTIO SEXTA.

De Conseruis.



Condiuntur plantarum partes ad conseruationem &
usum faciliorem, suauioreque, unde Conserua
vulgo Officinis dicuntur, de quibus agere hac se-
ctione, methodo breui ac facili institumus. Qui
enim planta alicuius flores aut fructus optimè sac-
charo, aut melle, aut ut oque simul condire nouit,
is eadem arte aliarum stirpium fructus & flores
conficere valebit, paucis exceptis, quæ cocturam va-
lentiorem aut imbecilliolem postulant. Sed hoc tyrunculi etiam agnoscunt, &
pro rerum condiendarum natura vim ignis aut intendunt, aut remittunt, vel
breuiem dant vel longiorem.

Conserua Violarum.

CAPVT I.

Rj. *Florum Violarum recent. à parte herbosa purgato-
rum, & in mortario lapideo cum pistillo ligneo trito-
rum lib. i.*

Sacchari albissimi lib. ii.

*Terantur ac subigantur simul, & fiat massa mollis,
quæ vase fictili reposita, quindecim dies insoletur, &
seruetur.*

COMMENTARIUS.

Violas præcipit sicari Mesue, sed humiditatem earum nativam retinere optimum est: In ea enim potissimum virtus posita; quæ cum euanida sit, vix violæ à calicibus & herbosa parte purgari queunt, quin plurimum illa imminuatur: Ad conferuæ tamen confectionem flos tantum mundatus assumi solet, non tam ut vires habeat præstantiores, quàm ut colorem sæpè nanciscatur magis violaceum.

Debent autem violæ diutissimè teri, ut nulla asperitas in eis percipiatur: Dein saccharum duplum miscetur: Tum denuò simul contunduntur, ut massa quædam fiat mollis in vase idoneo seruanda. Mesue triplum saccharum commiscet, tuncque conferua palato quidem suavior redditur, sed inefficacior.

Conserua violarum bilis incendium mitigat, reliquorum humorum ardorem extinguit, sitim temperat, aluum subducit, fauces & asperam arteriam lenit & dilatat, & omnibus thoracis affectibus conuenit.

Conserua Tussilaginis. CAPVT II.

*R̄. Flosculorum Tussilaginis. 4. l.
Sacchari albissimi lib. i.
Ex arte fiat Conserua.*

COMMENTARIUS.

Cum frequens sit Syrupus de Tussilagine ex eadem raro Conserua paratur, nisi in valde populosis ciuitatibus, in quibus ægritudinum & ægrorum varietas ac multitudo; quibus, maximè diuitibus ut felicius succurratur, quicquam deesse non debet: Ob id primo verè curabunt pharmacopœi recentes Tussilaginis flores colligi, superfluam humiditatem, si quam per cælum vdim contraxerunt absumi, & ex his Conseruam consuetomore parari, idoneo vase reponi, & debito loco seruari. Ad præparationem multa est opus tritura, ut flosculi qui veluti filamenta quædam sunt, aut fibræ tenues ritè saccharo concorporentur.

Ad eandem valet ad quæ Syrupus de vngula caballina vulgò dictus.

Vires

Sapius tamen noctu vsurpatur; Syrupus verò & noctu & interdiu sæpè ex cochleari sensim lambendo & bacillo glycyrrhizæ nonnumquam ad tussim molestant, sputum coquendum, mouendum & promouendum.

Conserua Rosarum. CAPVT III.

R^z Rosarum rubrar. recent. nondum perfecte explicatarum & exunguatarum lib. i.

Tere cum pistillo ligneo in pila marmorea, donec læuigentur: Adde sacchari optimi lib. iii.

Tere denuò vt exactè misceantur: Repone in vase idoneo, & insola.

COMMENTARIUS.

Saccharum rosatum vocat Mesue, quod nos aptius Conseruam rosarum appellamus: Et rosas sine discrimine tam rubras, quàm albas in vmbra siccatas, cum triplo saccharo sumit, ex quibus suum saccharum rosatum, vt vocat, facit, quod postea tres menses soli exponit: Nos rosas tantùm prærubras, non siccatas, ac tritas cum triplo sacchari pondere miscemus. Sunt qui duplum tantùm permiscant, sicque confecturam insuauiorem quidem efficiunt, sed efficacior.

Saccharum
rosatum,
quid.

Saccharum autem rosatum vocamus nos saccharum aquæ rosaceæ pari mensura solutum & coctum ad consistentiam electarij solidi, de quo postea suo loco.

Conserua
rosarum
sicca.

Est verò conserua nostra rosarum non vniusmodi, sed altera liquidior & mollior, quæ fit modo præscripto, ex floribus recentibus, & saccharo tritis & mistis: Altera solidior, quæ fit ex puluere rosarum siccarum cum octuplo, aut decuplo saccharo, in aqua rosacea diluto, & ad electarij solidi consistentiam cocto, cui parum succi agrestæ, aut limonum commiscetur. Sic enim pasta prærubra efficitur, ex qua formantur velut Cylindri, vulgo morselli dicti, oblongi, vtroque in extremo tenuiores, in medio crassi. Commendatur quæ fit Agendici, quæ in Brya vrbs est insignis, Prouinsia vulgò nominata.

Vires.

Conserua rosarum cephalica & cardiaca est. Caput enim vt & reliqua viscera roborat, ipsorumque astum mitigat, & fluxiones sistit.

Farari.

Parari nunc solet adhuc. Conserua rosarum pallidarum, vt prior Conserua
mollis, & ad opiata consistentiam, atque parem sacchari ad rosas rosarum
disproportionem. Quæ sacchari copia minore constat, vires quidem pallidarum.
purgatorias habet efficaciores, sed non ita fœliciter absque rance-
dine conseruatur.

Datur forma boli his quibus serofus, ac frigidus humor exuperat, Vires.
eorumque ventriculus omnia potulenta, vel minima retinet, vel
prorius auerfatur.

Conserua Hispidula seu Æluropi.

CAP. IV.

*Rx. Flosculorum recentium ælurop. ℥. v.
Sacchari. lib. i.*

*Tere flores seorsim, ac diutissimè, dein saccha-
rum commisce, ac contunde vt artis est.*

COMMENTARIUS.

Galli nouarum rerum auidi nullius in verba magistri iurare, nec antiquorum placitis ita stare solent, vt iuniorum sedulitatem despi-
ciant. Norunt quidem multa prioris sæculi patres, vt tamen puer hu-
meris gigantis surrectus ea non tantum, sed remotiora ac plura vi-
det quam gigas: sic & ætas posterior multa contrectat, gustat, expe-
ritur, antiquis incognita, neglecta & experta numquam; vt inter
cætera conseruas æluropi, papaueris, rheadis, atque alia multa de
quibus postea suo loco.

Duplici autem differentia Conserua æluropi parata tenetur, vna li-
quidior & opiata consistentia, altera solidior ac in Cylindros, seu
morfellos efformata. Prior fit reliquarum molliuscularum ritu, pistis
nempe flosculis, & addito saccharo, vt decet, concorporato. Solida
vulgò conserua sicca dicta, fit ex staminibus seu flosculis hispidulæ Conserua
siccis & læuigatis, & cum decupla portione sacchari in decocto cla-
rificato totius plantæ ad Electarij duri consistentiam cocti subactis, sicca hispi-
& ex arte ductis in oblonga frustula instar conseruæ rosæ. Si plus ad-
datur sacchari erit grata magis, si minus, minus. dulæ.

Easdem vires habet atque syrupus ex hisdem floribus paratus, de
quo supra.

cap. 6.
sect. 1.
huius
lib.

Vires

Conserua Buglossi. CAPVT V.

Rx. Florum buglossi mundatorum lib. i.

Tere in mortario marmoreo cum pistillo ligneo:

Adde sacchari lib. ii.

Misce terendo, vt fiat massa molliuscula, quæ vase excepta idoneo insoleatur.

COMMENTARIUS.

Vix probatur eorum sententia, qui flores buglossi, quorum virtus superficialis est, & citò dissipabilis, parum exsiccare volunt ante triturationem & mixtionem: Recentes enim & suæ omnis naturæ humiditatis participes meliores sunt: humiditatem enim amittendo simul vires amittunt; Nam ex se humidiores non sunt, quàm vsus postulat; Adde quod per insolutum magis aquea, & excrementitia Conseruæ recentæ factæ portio facilè dissipatur. Si tamen rore cæli, aut imbribus aëris maduerint, tunc ante Cōseruæ confecturam debebunt parum in vmbra potius, quàm in sole exsiccare. Parum enim ex se Buglossi superflue humiditatis habent.

Vires.

Conserua Buglossi partes vitales exhilarat, præsertimque cor recreat, melancholicis apprimè conuenit, palmo laborantibus & tussiculosis.

Conserua Borriginis.

CAPVT VI.

Rx. Florum borraginis recent. & mundator. lib. ss.

Sacchari albißimi lib. i. ss.

Terantur in mortario lapideo, cum pistillo buxæo, aut ex alio ligno, & fiat Conserua.

COMMENTARIUS.

Terendi sunt primùm flores seorsim donec laeuigentur, dein saccharum; Tum rursus terendo miscentur, & fit massa molliuscula, quæ vase idoneo excepta insolatur; postea seruat. Arabibus dicitur zuccarum *alchihil*, hoc est, saccharum borraginatum, Medicis recentioribus Conserua florum borraginis.

Ad eosdem affectus datur ad quos Conserua buglossi. Vtraque enim cor & spiritus vitales recreat, melancholicis passionibus succurrit, atque peculiari dote menses mulieribus creditur mouere, ex Holerio.

Vires.

Conserua Calendulae. CAPVT VII.

R. Florum Calendulae aestate collectarum. lib. ℞.

Sacchari lib. i. ℞.

Ex arte fiat Conserua interreo vase conseruanda.

COMMENTARIUS.

Inter exhilarantes medicinas numerantur Conseruæ multæ, vt rosarum, Buglossi, borraginis, violarum, & rerum suauiter fragrantium, sed maximè his dotibus pollere ac cor recreare dicuntur, quæ sunt ex quibusdam floribus heliotropiis seu solaribus, sic nempe dictis, quod aureo colore micent, & solem versus semper patuli sint vt helianthos, vt flos herbæ solis vulgò dictæ, ex Peru sæculis postremis ad nos delatæ, vt calendula hortensis folia, quasi solsequa, seu solem sequens nominata, ex cuius floribus Cōserua parari solet. Debent verò colligi æstate, vel paulò antè, vel non multum post, cū scilicet vires eorum sunt præstantiores. Quæ inter vineta spontè ac singulis mensium calendis nasci solet, calendula ob id dicta pusillos flores habet & minus efficaces. Æstate tamen collecti hortensium defectum supplere poterunt.

Huius Conseruæ præparatio in debita consistit tritura, cōseruatio in vase fictili aut argento repositione & hebdomadam vnā, aut alteram insolatione.

Præparatio

Tristibus & melancholicis conuenit, palmo prodest ictero benefacit, insomnia formidolosa compescit, & vitales spiritus recreat.

Vires

Conserua florum Cichorij. CAPVT VIII.

*Rx. Florum Cichorij lib. i.
 Sacchari tabar^z et lib. iij.
 fiat solito more Conserua, solitis vasis reponenda
 solenter custodienda.*

COMMENTARIUS.

Cichoreacea omnia vsibus humanis tam fœliciter inferuiunt, vt vel tanquam olera cum delicijs ad culinam, vel tanquam medicamina cum optato successu, si dentur opportunè, ad pharmacariam artem trahantur. Syluestria sunt quæ medentur, hortensia & verè olera, quæ alunt. Ex omnibus autem florib. haberi cōserua potest: Sed inter illa, cum minùs culta magis medicamentosa dicatur, ex ea solet conserua parari, seu flores gerat caruleos quæ frequentior est, seu albos, quæ in multis agris incultis reperitur. Eam non improbo quæ simul ex syluestrium & hortensium concursu parabitur.

Vires.

Laudatur non modo in hepatis phlogosi, sed in omnium viscerum æstu feruidiore si ieiuno stomacho & ante pastus sumatur. Bilis generationem impedit, sitim minuit, iccoris caua obstructione liberat, renum incendium mitigat, & ictero à calida causa prodest.

Conserua Nymphæaris.

CAPVT IX.

*Rx. Florum nymphææ recentium, à parte herbosa purgatorum, & in vmbra diem vnum siccatorum.
 lib. B.
 Sacchari lib. i. B.
 Tere, & fac conseruam, quæ vase idoneo excepta insolatur & conseruetur.*

COMMENTARIUS.

Flores nenupharis quoddam crassiores sint & humidiores, parum debent areferi, deinde ita contundi, ut laeuigentur: Postea saccharum admiscetur, & cum floribus iam tuis teritur, subigitur, & incorporatur. Tum massa probe subacta in vase fictili reponitur. Seligendi verò sunt flores nymphaeae albae, quae multis lilium aquaticum dicitur, cuius non modò pars herbida ac virescens abijci debet, sed etiam flaua quae in medio flore continetur. Nymphaea lutea negligitur, & in hac conserua, & in syrupo superius descripto, quoddam alba sit praestantior, & ubique ferè reperiatur: Praeferenda verò quae in aqua minimè caenosa, sed limpida vires.

Conserua nenupharis praecordiorum aestum contemperat, sitim extinguit, cerebrum refrigerat, somnum conciliat, febricantibus confert.

Conserua Anthos.

CAPUT X.

*Rx. Florum roris marini recent. in mortario lapideo minutissimè tritorum lib. B.
Sacchari albißimi lib. I. B.
Probe terantur, subigantur, ac misceantur, & fiat
cōserua vase idoneo reponēda, insolāda & seruāda.*

COMMENTARIUS.

Anthos, seu flos roris marini, quod ex se sit admodum siccus, non est ante trituram soli exponendus, nec exsiccandus, maioremque sacchari quantitatem postulat, ut omnes flores solidiores & sicciores, non tam ad conseruationem, quàm ad suauitatem: Minus quoque insolari postulant.

Est verò Conserua anthos vsus in medicina plurimi, nam ob vim qua pollet, cephalicam & neruofam, cerebro roborando, & illius simul affectibus propugnandis conducit. Fœliciter verò datur epilepticis, apoplecticis, lethargicis, paralyticis, tremori & palmo obnoxiis.

℞. *Florum betonice recentium ac mundator. lib. 1.*
Sacchari albiſſimi lib. iij.
Contunde flores ſeorſim minuriſſimè: Adde poſtea
ſaccharum, & fiat Conſerua in vaſe idoneo reponē-
da, inſolanda, ſeruanda.

COMMENTARIUS.

Præparatio Vniuſmodi non eſt huius conſeruæ præparandæ ratio: Alij enim iuxta modum præſcriptum faciunt; alij ſaccharum coquunt in aqua betonice ad conſiſtentiam electarij ſolidi; deinde flores tritos miſcent; ſicque conſeruam efficiunt optimam, & ſapore & viribus laudabilem; vtroque autem modo confici poteſt.

Vires. Conſerua betonice tam ſumpta, quàm ad mota capiti robur conciliat, ventriculo benefacit, venena obtundit, & ad omnes affectus cerebri propugnandos commendatur.

Conſerua ſaluia, meliſſæ, ſtæchados. CAPVT XII.

℞. *Florum ſaluia, vel meliſſæ, vel ſtæchados lib. ſſ.*
Sacchari albiſſimi lib. i. ſſ.
Tere primùm flores tenuiſſimè: dein ſaccharum: Tum
omnia denuò ſimul tere, ac permisce, vt fiat paſta mol-
lis, quæ vaſe idoneo reposita inſoletur.


COMMENTARIUS.

Florum medicatorum vbertas efficit, vt ex eis Conſeruæ frequen- tiùs parètur: Stæchas quodd rariffima ſit: Meliſſa quodd paruulos val- dè flores promat, ex eis vel rarò, vel pauca conſerua paratur. ſaluia

verò cum frequens sit, & eximiis prædita viribus, etiam Salernitano elogio, ex ea Conserua fit ad vsus multos commendabilis. Speciali enim dote cerebrum & nervos roborando, tremori, stupori, paralyfi, & affectibus cerebri confert. Conserua saluæ sicca in quibusdam officinis habetur, palato grata, cerebro amica, paraliticis saluberrima, & his omnibus qui capite sunt frigidiore & humidiores. Quæ ex melissa conficitur, memoriam iuuat; quæ ex stachados flosculis, iecur obstructione liberat, & cerebrum recreat.

Quædam officinæ plures forsan Conseruas habent ex floribus conditas, sed multæ quoque pauciores. Si quis his non contentus, alias ex aliis floribus desiderarit, est illi liberum parare, vt Conseruâ Pæoniæ, tamarisci, primulæ veris, papaueris erratici, genestæ, alti cæ, narcissi moschati, florum tilia, tunicis & aliorum suauiter olentium. Vires.

Nonnulli conseruam florum maluæ parant, quam calculosis & vitij renum mirum in modum prodesse testantur: vim namque habet leniendi, ardorem mitigandi, meatus diducendi, & saburram à partibus excernendo lotio dicatis expellendi. Conserua florum maluæ.



SECTIO SEPTIMA.

De fructibus; & alijs plantarum partibus conditis.



RVCTVS condiendi non teruntur vt flores, sed vel integri cum paruuli sunt, vt Ribes, & Berberis, vel etiam masculi, vt cerasa; vel in frusta secti, vt citonia conduntur. Radices quoque tantum concisæ & purgata conficiuntur, præsertim tenellæ, & quæ celsura videscunt. De his autem omnibus condituris in hac sectione breuiter differemus.

℞. Cerasorum maturorum, ac selectorum & à pediculis
 purgatorum lib. ij.
 Sacchari albißimi lib. i.
 Coque igne primùm luculento, dein clementiore, spumam innatantem abijciendo, quousque fiat ex illorum succo & saccharo Syrupus optimè coctus.

COMMENTARIUS.

Cerasorum multæ sunt varietates, quorum ea tantùm seliguntur ad condituram, quæ rubra sunt, acido-ducia, succo multo turgidula, breuiori pediculo inhærentia, vt & ea quæ ex obscuro rubent, *agryota* vulgò dicta. Vt autem ritè condiantur, aqua pauca debet commisceri; sic enim saccharum liquatur facilius, & cerasa citius ac melius concoquuntur, quàm promptissimè verò ac igne flagrantiore coquenda, vt natium colorem, ruborem elegantissimum retineant.

Perfectè autem cocta iudicantur, cùm syrupi gutta in marmor effusa non diffluit: Tunc siquidem ab igne remouenda, & vbi parum refrixerint, in vasis idoneis reponenda & seruanda.

Ex Cerasis cum pauca aqua coctis, per cribrum traiectis, & pari aut paulo minore sacchari portione fit Gelatina sanis & ægris grata & salubris.

Cerasa condita propter suauitatem & salubritatem singulis ægrotis morbo quouis laborantibus, & quouis tempore solent exhiberi.

℞. Ribes, vel Berberis lib. j. ℞.
 Sacchari lib. i.
 aquæ parum.
 Coquantur ex arte, vt simul cum his coctis fiat Syrupus consistentiæ legitimæ.

COMMENTARIUS.

Ex horum fructuum succo calore Solis, vel ignis inspissato, fit sapa; ex eodem & saccharo simul ut decet coctis, syrupus. Vtriusque autem vires eximiae sunt, & medicatae, & aegrotis sanitati restituendis perutiles, ut supra monuimus. Sed & pro bellariis idem fructus non parum expetuntur: ob id integri condiuntur, ut etiam ad hyemem possint asseruari, & aegrotis quoque exhiberi, quibus non modo sapè arrident, sed & conducunt. Ad illorum condituram solet parum aquae permisceri, sed melius eius loco, succus alterutrius commiscebitur: Sic enim conditura acidior erit; ut & dulcior, si par sacchari & fructuum pondus, ut multi faciunt, adiungatur. Si pro aqua succus ponatur, color erit obscurior. Ex succo ribes & saccharo parari solet pasta quaedam ex nigro rubens quae in placentulas formatur, quae sanis pro bellariis, & agris pro dieta suavi datur.

Pyra condita. CAPUT III.

*Pyrorum moschatellinorum, decorticatorum,
 ℞. Sacchari albiſſimi an. lib. ij.
 aquae lib. i.
 Coque perfectè igne luculento, donec pyra
 fundant syrupum, consistencia legitimum.*

COMMENTARIUS.

Eodem modo alia pyra condiuntur, ut rufula quaedam suauissima, Rousseletti nomine notiora: ut & alia multa carne solidiore praedita. Nonnulli ut palato reddant amiciora, caryophyllis configunt: sic namque cum dulcedine aromaticum quemdam odorem, saporisque nanciscuntur delectabilem. Poma quod carnem habeant molliorem, quae coctura facile velut in pultem abit; integra non condiuntur, sed ex his in frusta sectis, & cum saccharo ex arte coctis fit pasta quaedam, quae in cylindros partita studiosè exsiccat & seruatur. Poma tamen quaedam firmiore carne praedita, non minus quam pyra, vel in duas aut plures, pro illorum magnitudine diuisa condiri & ficcari.

R̄. Nuces virides, & adhuc teneras n. l.

A cortice externo purga; Acu vel stylo utrinque perfora: Infunde nouem aut decem dies in aqua tepida, ea quotidie mutata: dein coque dum mollescant. Tum singulas terge linteo, & sicca: Caryophyllis, aut cinnamomo per bacillos secto confige: Postea cum pari sacchari pondere & aquæ sufficienti quantitate coque perfecte: Repone in vase idoneo, & seruato.

COMMENTARIUS.

Ægrè ferunt multi, quod nuces conditæ nigrescant, quem ingratum colorem vt impedian, Nuces primùm coctas, dein aromatis confixas in vase recondunt; superfundunt syrupum exactè coctum, adhucque calentem. Diebus sequentibus si syrupus recrudescat, denudò coquunt, & adhuc superfundunt: qui si rursus fluidior appareat, recoquunt, vt tandem in legitima remaneat consistentia. Sic enim conditæ nuces albidiores manent.

Vires.

Commendantur ad ventriculi imbecillitatem, flatuum dissipationem, colicum dolorem, & coctionem iuuandam.

Pruna condita.

CAPUT V.

*R̄. Prunorum nondum perfecte maturorum & depellatorum, Sacchari optimi an. lib. i.
aque limpidissimæ lib. ss.
Coquantur vt cerasa, eodemque modo seruentur.*

COMMENTARIUS.

Mira est vbique prunorum vbertas & varietas inter quæ multum expetuntur damascena, alba, rubra, nigra, violacea: magis verò Brignolensia & Pardigonia; sed omnium maximè Imperialia dicta, quæ omnia matura esui gratissima sunt.

Vt autem seruentur fructuum reliquorum more condiuntur; atque primum exterior eorum cortex detrahitur: & ubi singula decorticata fuerunt, è vestigio in aqua proijciuntur, ne flauescant, nigrescant. Sic enim omnia bene mūdata coquuntur, quousque syrupus ex eorum succo & saccharo commixto legitimæ cōficiatur cōsistentiæ.

Eodem modo mala persica & præcoccia condiuntur.

Cortices arantiorum, limonum & citriorum partim ob duritiem, partim ob insuauitatem ante condituram semel atque iterum maccantur in aqua tepida, in quam nonnulli prima vice nodulum cinerum iniiciunt: secunda, in aqua simplici, in qua tandem cum aqua li ad cortices pondere sacchari coquuntur, vt artis est, sicque probè conseruantur cum syrupo perfectè cocto.

Cortices
arantiorū,
limonum
& citriorū.

Quibus verò non nisi confecturæ siccæ, vt vocant, arrident, sic illis parabuntur. Cortices dicti dicto modo conditi sumendi sunt: syrupus quo exterius madent, vel linteo detergendus, vel aqua leuiter abluendus. Sic terfi & exsiccati cortices in aliud saccharum ad consistentiam electarij solidi coctum immergendi, & adhuc parum coquendi; dein amouendi, & Soli, vel loco calido, vt hypocausto exsiccandi; tum asseruandi. Verum hæc nimis curiosa condiendorum fructuum ars ad aromatarios, quàm pharmacopæos spectat magis.

Confectu-
ræ quæ fiât.

Cerasum
Cidoniātū.

Citonia condita.

CAPVT VI.

℞. Citonia decorticata, in quatuor aut sex partes diuisa
& à mēbranulis & seminibus purgata n. x. aut xij.
Sacchari pondus æquum.
Coquantur cum aqua sufficienti, vt artis est.

COMMENTARIVS.

Citonia propter soliditatem multam cocturam patiuntur: maiore propterea aquæ quantitate est opus. Tandiu verò coqui debent, nō modo vt mollescant, sed vt syrupus crassior euadat, in quo sunt asseruanda integra, non discerpta, aut in pultem redacta.

Alio modo citonia condiuntur, cocta nempe cum saccharo, & inter coquendum subinde agitata, vt formam crassiusculæ pultis acquirant; tunc enim ab igne remouenda, & in pixidibus ligneis, ac abietinis reponenda. Si par citoniorum & sacchari pondus commisceatur, Cidoniātum hinc factum suauius est, sed minùs astrictorium. Vocatur autem crassum Cidoniātum.

N. ij,



Aliud adhuc & magis rubellum & lucidum paratur, ex solo nempe decocto corticum & seminis citoniorum, cui additur sacchari æqualis portio, vel paulò minor, & coquitur supra consistentiam syrupi. Atque in piceas pixides infunditur & servatur. Si inter coquendum peluis cooperiatur, cidoniatum magis rubrum efficitur, quem colorem omni cidoniato expetitur ut habeant multi, succum citoniorum adiciunt, vulgus Cydoniatum clarum nominat: alij Aurelianense, quòd Aureliæ sit frequentissimum.

Myua cito-
niorum.

Gelatina ci-
toniorum.

Cidoniatũ
Lugdunẽ,
sc.

Paratur & Myua ex citoniis, sed modo parum dissimili: nam succus ex his raspatis elicitur; magma coquitur, & colatur: Colaturæ miscetur saccharum duplum: coquitur ad consistentiam electarij: Commiscetur succi pondus æquum ad saccharum, sicque fit Gelatina citoniorum, colore rubella, sapore grata, viribus commendata.

Vasii quidam seplasiarij lucro inhiantes, aut pharmacopolæ rarius ad tractandos ægros vocati, purgatorium quoddam cidoniatum conficiunt, Lugdunense vocant, cuius vncia dragmam dimidiam diagredi recipit: eius verò conditura vix arte vlla cōcinnatæ $\frac{3}{4}$ β. exhibentes dysenteriam multis inferunt lethalem. Nonnulli moschum, aut alia aromata commiscent, ut subtiliùs fallant.

FOLIORVM CONDITVRA.

Folia adianti condita. CAPVT VII.

Rx. *Adianti albi, selecti, & à stipulis exilibus mundati lib. i. Sacchari boni lib. ij.*
Tere seorsim foliola: tum saccharum: postea misce: denuò contunde, & habebis conseruam.

COMMENTARIVS.

Folia rarissimè condiuntur, cum vel ex his siccatis decocta & syrupi conficiantur illorum viribus dotata, vel etiam sicca seruentur, vix anno elapso priore exoleta: quædam tamen vires adeo habent euanas, ut sicca vix quicquam genuæ qualitatis retineant: Cuiusmodi est capillus veneris verus, seu Mompessulanus, qui propter eximias vires, ab his, quæ eo carent, regionibus expetitur, ad quas

defertur forma cōseruæ, modo præscripto paratæ, quo & alia quoque folia sicciora possunt condari; humidiora verò sic.

Folia tussilaginis condita. CAPVT VIII.

R̄. Succifoliorum tussilaginis lib. i.

Sacchari lib. ij.

Coque in consistentiam electarij, cui adhuc calidissimo, adde tussilaginem intritam, & fiat cōserua.

COMMENTARIVS.

In huius cōseruæ confectura tritorum foliorum quantitas non definitur, quam alij maiorem, alij minorem adiiciunt. Sat verò est tertiam, aut ad summum mediam illorum ad saccharum pondus permiscere. Debent autem cōseruæ sic paratę diutiùs insolari, & subinde rudicula moueri, vt quoquouersum calefiant, & aquea humiditas, quę magis in istis exuperat, dissipetur. Simili modo alię foliorum conditurę parantur.

Folia tussilaginis condita multum conferunt tussiculosis, pulmonicis, & quibus fit frequens delapsus humoris è cerebro ad thoracem & partes vitales. Vires.

CAVLIVM CONDITVRA.

Caules lactuæ conditi. CAPVT IX.

R̄. Caulium lactuæ crispæ à pellicula exteriorē purgatorum. lib. i.

Coquantur in aqua donec mollescant: deinde linteo exsiccentur. Postea sume pars sacchari pondus, & cum aqua sufficienti coque donec Syrupus aliquanto crassior euadat, & repone in vase idoneo.

Si forma sicciorē magis arideant, exterius tergeantur & siccentur: deinde cum saccharo ad electarij spissitudinem cocto parum feruefiant: Tandem amoveantur, & loco calido exsiccentur.

COMMENTARIUS.

Pauci admodum plantarum caules condiuntur, vel ob duritiē, vel insuauitatem, aut qualitates inutiles & negligendas. Qui crassitudine, dulcedine, teneritate & virium præstantia commendantur, possunt rectē condiri, vt caules lactucæ potissimum crispæ, vt caules cynaræ, seu atricaulis, quem vulgus artichocū nominat. Ex vtriusque enim caulibus aromatarij solent confecturas siccas modo supra descripto facere.

Caules lactucæ conditi demulcendæ siti sunt idonei, stomacho æstuanti profunt, & hepatis feruori.

Caules Cynaræ conditi. CAPUT X.

R̄. Caulium Cynaræ à pellicula externa & fibris durioribus purgatorum, lib. i.

Coquantur in aqua donec tenerescant: deinde linteo exiccentur. Tum cum sacchari pari pondere & aqua sufficienti denuò coquantur, donec syrupus fiat crassior. Repone confecturam in vase idoneo: quæ si forma siccior magis expetatur, eodem modo paratur, quo lactucarum cauliculi.

COMMENTARIUS.

Cynaræ caules sumi debent albidi, qui scilicet nondum extra terram eruperunt; plebecula cardas appellat, quæ tota hyeme frequenti sunt in vsu Lutetiæ, vbi Cynaræ vberrimè luxuriant, quibus nulla ratione multi vtuntur ad stimulos veneris proritandos. Parum enim materiæ genitalis & flatulenti spiritus corpori præstant: succi verò melancholici plurimum, ex Galeno.

Seligendi autem sunt caules cynaræ vulgaris, non Hispanicæ & spinosæ, quæ è genere carduorum est: Imo vtraque ex eorum sobole deprompta, sed illa cultu & arte lætiorē faciem, & saporem magis gratiosum sibi comparauit. Lib. 2.
dealim.
famlt.

Caules cynaræ conditi pro sanorum bellariis & comestationibus magis, quàm pro ægrorum dieta celebrantur.

RADICES CONDITÆ.

Radix pœonia condita. CAPVT XI.

R. Radicum pœoniæ lotarum & purgatarum lib. ij. bulliant in aqua donec mollescant. Percoctæ super linteum extendantur in umbra diem integrum, aut biduum, & humorem aqueum refundant: dein coque per sacchari pondus cum pauca portione huius decoctionis ad consistentiam electarij: Adde radices prædictas: & denuò parumper coqu.: Tum aufer ab igne, & repone in vase idoneo.

COMMENTARIUS.

Radicum aliæ non nisi Vere condiri debent, antequam scilicet illarum succus in thyrsos, ramos & frondes fuerit absumptus; aliæ cum primùm plantæ suis foliis exuuntur, nempe Autumno, quo tempore vis multarum stirpium confugit ad radices, tunc enim magis est percoctus humor, quàm alio tempore. Nonnullæ & Vere & æstate & Autumno rectè condiuntur, quæ scilicet perpetuò succulentæ sūt, licet caules nondum eruperint, vel adoleuerint, vel aruerint. Colligendæ sunt igitur eo tempore, quo vis earum est melior, ut radix Satyrij & Ireos Vere; radix pœoniæ Augusto mense, Syluij iudicio, vel potius Martio, Enulæ, Bryoniæ & peucedani Autumno, ut fu-

cap. 13. *lib. 1.* *instir.* *fius alibi docuimus.*
 Earum autem nonnullæ amaræ sunt, vel acres & insuaues, quæ ante condituram pluries in aqua macerandæ; aliæ satis grate, quæ ubi diem vnum in aqua tepida fuerint infusæ, in eadem, aut semel mutata concoquendæ, ut radices pœoniæ, quæ iuxta formulam præscriptam optimè condiuntur, vel aliam parum dissimilem, cum scilicet super eas coctas affunditur saccharum, instar electarij mollis coctū: quod ubi recruderit, denuò coquendum: idque toties repetendū, quoties crudefcere videbitur.

Radices pœoniæ conditæ vires magnas habent ad arcendam & curandam epilepsiam, si manè ieiuno stomacho & hora somni modicum sumatur.

Vires.

Radices eringiorum condita. CAPVT XII.

R. Radicum eringiorum frustatim incisarum, & intus
a parte lignosa purgatarum lib. i.
Coquantur in aqua ad mollitudinē: exiccētur in um-
bra suppositis linteis: Tum misceantur saccharo earū-
dē decoctione soluto, & ad electarij spissitudinem co-
cto: atque rursus parum cōcoquantur, vt aquea quæ-
dam humiditas dissipetur. Tandē in olla conueniente
reponātur, & seruētur. Sic radices Buglossi cōdiūtur.

COMMENTARIUS.

Radices Eryngiorum quod dulces sint, ante condituram semel tantum sunt macerandæ, & in eadem aqua coquendę donec mollescant: deinde cum saccharo condiendæ, vt dictum est. Addit Mesue aromata quædam, vt cinnamomum & zinziber, quibus configi suadet, & coquit cum portione mellis & sacchari, vel melle solo, sed triplo. Verum consuetior & melior parandi modus is est, quem exhibemus.

Passim autem occurrit in Arabum paginis secacul, quod hucusque pro eryngio desumptum est: illius tamen descriptio ab Auicenna & Serapione tradita aliam plantam, si non viribus, saltem vultu dissimilem ostendit, quæ in India colitur & conditur? Ad res venereas custoditur & datur, vt & nostrum Eryngium, quod à nonnullis sed malè, secacul nominatur, licet vires habeant affines: vtrumque enim calidum & humidum est in fine primi, vel initio secundi recessus, & veneris ludibria mouet.

Rectè igitur faciunt qui Syluij consilium sequuti, Secacul Indici penuria, eryngium nostras substituunt, vt posthac amplius stomachari desinant, qui egrius hanc ferunt substitutionem, donec ex Syria verum Secacul aduexerint.

Est autem eryngium ex aculeatarum stirpium genere; cuius tamen folia adhuc tenella, nec spinosa, nec rigida sunt, & in cibos recipiuntur. Lata verò sunt, ait Dioscorid. & extremo ambitu aspera gustui aromatica: & vbi adoleuerint, pluribus spinis horridis aculeantur: vt & capitula in fastigio rotunda, acutissimarum spinarum ambitu

ambitu circumuallata: Radix longa, exteriùs nigricans, intus alba, tenera, gustui dulcis ac grata. Eius autem historia fusiùs describitur lib. 1. de Materia Medica.

cap. 17.

lib. 4.

Radix eringij condita alit, semen auget, venerem stimulat, vrinam mouet, & saburram renum ac vesicæ pellit.

Radices symphiti conditæ.

CAPVT XIII.

R Radicum symphiti maioris per talleolas concisarũ,
lib. 1.

macera & coque sufficienter in aqua donec mollescant: Sic percoctæ, & diem vnum in umbra siccatae iniciantur in saccharum earũdem decocto solutũ, & ad crassitiem electuarij coctum: atque rursus parum coquantur, vsque dum aquea superfluitas absumatur tota. Sic apparatu saccharato conditæ in vase seruentur idoneo.

COMMENTARIUS.

Rectè quidem radices symphiti iuxta modum descriptum conduntur, vt & aliæ multæ, quæ coctura facilè mollescunt, malunt tamen multi easdem sic præparare ac condire. Radices primum lotas & mundatas coquunt; deinde tundunt, postea cribro transmittunt: tum excipiunt duplo saccharo ad electarij consistentiam cocto: tandem calefaciunt adhuc & recondunt pixidibus. Idem solet fieri de radicibus omnibus crassioribus: sic enim melius à suis fibris purgantur, & perfectius omni ex sui parte conficiuntur.

Valent plurimùm ad sanguinem vnde cumque fluentem, ad delapsam humorum cohibendum, & ad vulnera partium internarum agglutinanda.

Vires

R. Radicum enulæ campanæ lotarum, purgatarum, & infractarum lib. ij.

Infunde in aqua tepida per quatrimum, aqua quotidie mutata: dein coquantur, quousque tenerescant. Sic coctæ linteo duplicato excipiantur: in umbra exsiccentur: postea sumatur æquale sacchari pondus: cui ad consistentiam electarij cocto addantur radices prædictæ, & simul denuo parum concoquantur. Tum in vase reponantur.

COMMENTARIUS.

Radices Enulæ plus vel minus macerandæ, & aqua mutanda pro illarum insuauitate, quæ si bina, trinave maceratione possit emendari & amicior reddi, non diutius immergendæ, ne earum vis exoluatur, ac in aquam deponatur tota.

Quidam huius radices, vt & præoniæ aliarumque radicum insigni qualitate præditarum pulpam trahunt, & cum triplo saccharo ad Electarij soliditatem cocto ea arte commiscunt, vt Electarium nanciscantur præposito scopo idoneum: quod tamen per se non nisi quantitate parua vsurpatur, alijs verò medicamentis miscetur sæpè.

Vires.

Helenij seu enulæ radices conditæ stomachum roborant, cor recreant, flatus discutiunt, coctionem iuuant, aduersus venena prosunt, & morbos pestilentes ac virulentos.

Radices Satyrj conditæ. CAPVT XV.

R. Radicum Satyriorum lotorū & mundatorū, lib. i. Coquantur in aqua quousque tenerescant: dein in umbra siccantur, suppositis linteis. Exsiccatæ misceantur cum pari portione sacchari in earum decoctione clarificata ad electarij consistentiam cocti, & postea adhuc parum coquantur, vt humiditas aquea tota dissipetur.

COMMENTARIUS.

Debent integræ Satyrionis radices condiri : earum enim moles non impedit, quominus totam sacchari substantiam peruadat. Nulla aromata adiecimus, vt hecticis & febrientibus securius dentur. Vires habent Diasatyrio affines, sed imbecilliores, vt videbimus postea suo loco.

Vires.

Aliæ radices multæ eo modo, quo superiores condiuntur, quas breuitatis gratia omitto. Zimziber recens non habemus, sed ex *Bengala* Indiæ regione, vbi copiosissimum & laudatissimum prouenit, ad nos conditum aduehitur.



SECTIO OCTAVA.

De Eclegmatis in Officina seruandis.

INTER medicamenta preparantia Eclegmata meritò locum habent, quòd humores in thorace contentos ad expulsionem per Anacatharsim præparent, vt eosdem aliò impactos per secesum. Nam cum acidula sint, aut dulcia, illa incidunt lentos & viscidos succos tenacius inherentes, vt facilius à partibus separentur, & excernantur, hæc eosdem, atque alios concoquunt, & ad excludendum sputando reddunt aptiores. Si mixti saporis fueris, vt dulcoacidi, simul & attenuant & concoquunt. Eorum autem quæ veteres in Officinis asseruari iusserunt, vsus ferè exoleuit; atque nunc cum thoracis, aut asperæ arteriæ praua quadam affectio lohoch seu eclegma postulat, in rem præsentem ex rebus idoneis facile paratur, viribus præstans & sapore gratum, ita ut displicere nunc videantur veterum eclegmata, vt magis ingrata, nec magis utilia. Ne quid tamen nostræ desit Officina pauca quadam ac selectiora & paratu facilia damus, quorum vsus ad effectus particulares magis commendantur, vt.

*R̄. Succī scillæ,
mellis despumati an. lib. ij.
Coquantur simul secundum artem ad consistentiam
mellis.*

COMMENTARIUS.

Paratu facillimum est istud eclegma, quia simplicissimum, hisque solum constat quibus & mel scilliticum, sed diuerso modo ac præparatione & proportionem mellis ad scillam confectum. Nam in melle scillitico folia cum melle confusa in idoneo vase insolantur, & vsus tempore percolantur: in eclegmate succus tantum cum melle coquitur supra consistentiam syrupi.

Vires.

Lohoch de scilla crassos & viscidos humores partibus respiratoriis impactos potenter incidit, & ad expulsionem apparat; Asthmaticis valde congruit, difficile spirantibus, & quibus pituitæ viscidæ copia in pulmonibus, vel thoracis spatio continetur.

Eclegma de caulibus. D. Gord. CAPUT II.

*R̄. Succī caulium lib. i.
bulliat parū & despumetur. Dein adde Croci ℥ij. sacchari
mellis optimi an. lib. ℞.
coquantur ex arte ad consistentiam linctus.*

COMMENTARIUS.

Succus caulium hortensium primum educitur: eductus igne vel Sole depuratur: ei postea mel & saccharum adduntur, & perfectè coquantur; tum crocus tenuissimè pulueratus commiscetur, vel etiam ante perfectam eclegmatis cocturam, quam Gordonius illius author ad electarij spissitudinem ducit. Credibile tamen est, per electarium, linctum intelligere, qui Asthmati curando, cui præscribitur, magis conuenit. Solent verò folia caulium rubrorum aliis præferri,

cum de morbis thoracis sanandis, & de alio mouenda, res est.

Lohoch de caulibus valde confert asthmati, antiquæ tussi, sputo coquendo, mouendo, & excludendo.

Eclegma de pulmone vulpis D. Mes. CAPVT III.

*R. Pulmonis vulpis, vt decet, preparati & siccati,
Succi glycyrrhizæ,
atianti albi,
seminis feniculi,
anisi an. partes æquales.
Confice cum syrupo rosato, vel myrtino.*

COMMENTARIUS.

Conficiunt nonnulli cum hydrosaccharo simplici, alij cum saccharo in aqua pimpinellæ soluto & cocto, & qui magis roboratiuum postulant, cum Rob, seu succo inspissato myrti, vt suadet Mesuë. Nos cum syrupo rosato, seu Alexandrino, nunc dicto, conficimus: sic enim gratius est eo, quod cum Rob myrtino, vel hydrosaccharo paratur, & in qualitate roborante inter vtrumque medium.

Recte quoque parabitur cum syrupo myrti, cuius rob rarò seruetur, imò nullo in pharmacopolio paratum reperitur.

Pulmo autem vulpis tantum sanè, iuuenis, ac venatu captæ, si fieri possit, sumendus, aqua abluendus, secundum vasa quibus adhæret ac suspenditur, incidendus: ab hisdem vasis separandus: sanguis exprimendus: deinde vino albo modicè calido lauandus: tum ollæ imponendus, & in clybano parum calido exsiccandus & seruandus.

Vsus tempore eius portio tenuissimè læuigatur & miscetur cum liquore idoneo, vt in hoc eclegmate, cum syrupo dicto, vnà cum reliquis simplicibus pulueratis.

Lohoch de pulmone vulpis pro pthificis à Mesuë describitur. Sunt tamen qui malunt pulmonem tritum & iulepo rosato commixtum exhibere: alij aliorum animalium salubriorum, vt suis, arietis, vituli pulmones esitandos non sine ratione præferunt; quibus in pastu pthificus suauius & salubrius vti potest, ad vncias duas, pluresve. Sic enim pulmonibus magis, feliciusque consulet, quàm vnciam integram eclegmatis præscripti sumendo, in qua vix scriptulus pul-

Pulmonis
vulpis præ-
paratio.

Vires.

monis vulpini continetur. Hoc tamen in pharmacopolio haberi non nefas duco, cum multa bechica contineat, quibus feliciter tabidus uti potest.

Eclegma sanum & expertum. D. Mes. CAP. IV.

*R. Passularum mundatarum, feniculi,
caryocarum, hyssopi sicci,
dactylorum pinguium an. ℥ ij. calamynthæ,
iniubarum, radicis yreos,
sebesten, an. num. xxx. glycyrrhizæ,
seminis fœni græci ℥ v. cinnamomi an. ℥ β.
seminum lini, capilli veneris m. i.
anisi,
Coquantur omnia in lib. iiij. aquæ ad medias: adde colaturæ penidiorum lib. ij.
Coquantur denuò ad mellis crassitudinem. Tunc adde sequentia puluerata, nempe glycyrrhizæ mund.
pineorum mundat. ℥ v. gummi tragacanthæ
amygdalarum depellatarum, Arabici, an. ℥ ij. β.
amylī an. ℥. iij. yreos ℥ ij.
Exactè omnia misce, & fac eclegma.*

COMMENTARIUS.

*Amylum
quod fiat.*

Vt hic probè conficiatur linctus, radix yreos in taleolas secta, primum in aqua lymphida bulliat per octauam horæ partem; deinde semina misceantur: tum fructus & folia; postremò glycyrrhiza & cinnamomum. In colatura, ut decet, cum penidiis cocta, pulueres seorsum primum læuigati, dein confusè mixti coniiciantur, ut ex his simul vnitis omnibus, & pistillo ligneo agitata fiat eclegma, quod ab effectu sanum & expertum cognominatur. Continet enim fructus multos, semina, folia & quædam gummi, quæ illius facultates eximias commonstrant: quibus additur Amylum ad lentorem maiorem medicamento conciliandum.

Amylum autem ex multis cerealibus fieri potest, sed optimū, quod

Ex tritico quinquies aqua madefacto fit, quod ubi emolliri cœperit, inquit Dioscorid. sensim aqua effundenda sine agitatione, ne quod utile est, vnâ effluat. Vbi mollissimum fuerit, effusa aqua pedibus calcari ac confringi debet; dein alia aqua superfusa denuò calcari. Tum enatantes ibi furfures cribro excipiendi: reliquumque quallo, sportisque siccatum è vestigio nouis tegulis torreatur in Sole & feruetur. Sic namque sine mola conteritur, vnde nomen Amyli. Partes exasperatas lenit, oculorum fluxiones & sanguinis reiectiones cohibet.

Eclegma sanum & expertum valet ad tussim, rancedinem ab intemperie frigida contractam multum incidit, tenuat, tergetque, & humores præsertim frigidos concoquit. Amyly vires.

Eclegma de pineis. D. Mes. CAPVT V.

*℞. Nucleorum pineorum mundatorum ʒ xxx.
 amygdalarum dulcium,
 auellandarum assatarum,
 gummi tragacanthi,
 gummi Arabici,
 glycyrrhizæ razæ,
 succi glycyrrhizæ,
 amyli,
 adianti albi.
 radicis yreos an. ʒ iiij.
 canis dactylorum fuluorum ʒ xxxv.
 amygdalarum amararum ʒ iii.
 mellis passulati,
 butyri recentis,
 Sacchari albi an. ʒ iiij.
 mellis optimi quod sufficit, ex arte fiat eclegma.*

COMMENTARIUS.

Vt optimè paretur id eclegma, radices siccæ primùm sunt scorsim terendæ, postea adiantum, deinde fructus, tum gummi & amy-

lum. Quæ autem aptius incidi postulant, ut amygdalæ, & auellanæ, minutim cultello incidantur. Omnibus probè lauigatis additur rob. passularum, seu mel passulatum, dein butyrum; tandem mellis albissimi & optimi quantitas idonea, ut legitimæ fiat eclegma consistentiæ.

Erunt verò pinei primum terendi, simul & amygdalæ tam dulces quàm amaræ in mortario lapideo cum pauca aqua rosacea, ne rancidinem contrahant, dein mel addendum cum passulis, omnia autè colo traiecta alijs materialibus vnienda ad formandum modo dicto Eclegma dictum.

Vires.

Eclegma de pineis tussi conuenit antiquæ, asthmatis, sputo viscido, respirationis difficultati, vocis asperitati, humorum coctioni & expectorationi. Atque pulmonis & thoracis affectus, qui ab humorum copia vel noxia qualitate proficiscuntur, curat.





OFFICINÆ
PHARMACOPŒORVM
SEV ANTIDOTARII
LIBER SECVNDVS.

*De Medicamentis purgantibus selectissimis, & usu
longo probatis.*

P R Æ F A T I O.



COMPOSITORVM Catharticoꝝ innu-
mera penè est multitudo, multiplex forma,
multusque parandi modus. Ex his Selectio-
ra damus, præstantiora & probatiora: atque
ea vel forma electarij liquidi, aut solidi, cu-
iusmodi sunt Opiatæ ac hieræ, vel formapi-
lularum & Trochiscorum. Raro enim sub
forma pulueris aut potionis medicamenta
purgantia in Officinis seruantur. Addimus conficiendi modum &
rationem, necnon confectionis qualitatem. Relinquimus autem
multa à veteribus tradita, quorum nempe vsus nec salutaris
est, nec debita ratio compositionis obseruatur, vt quæ mul-
ta inutilia contineant, aliquando noxia & sepe incognita. Despici-
mus adhuc alia multa à recentioribus inuenta & iactata, qui vt
quamdam nominis gloriam captarèt, ea ipsa variè cognominarunt,
non solùm authorum titulo, sed effectu sæpè fictitio. Ea, inquam,
despiciamus, vel saltem relinquimus & selectiora, probatiora ac vti-
liora damus, atque in sectiones quatuor partimur: in quarum prio-
re de Electariis liquidis, in tertia de solidis, in quarta de Pilulis agi-

mus; secunda de his confectionibus amaris agit, quas medici Hieras nominant.

Diacassia D. N. Præpo.

CAPVT I.

*Rx. Foliorum & florum violarum,
maluæ,
betæ,
parietariæ,
absynthij romani an. m. ss.*

Coque in aquæ lib. iij. ad medias. In colatura adde mellis lib. i.

Coque denuò ad consistentiam electarij liquidi. Tum misce cassiæ mundatæ lib. i.

fiat Electarium in vase idoneo reponendũ & seruandũ.

COMMENTARIUS.

Composi-
tionis illu-
stratio.

Diacassia non ab omnibus pari parari modo solet: alij enim succos plantarum cum melle coquunt ad crassitudinem idoneam, deinde cassiam permiscunt: alij plantas ipsas elixant, & colaturæ diluunt cassiam & mel: tum rursus totam mixturam feruefaciunt ad consistentiam electarij mollis. Verum improba est ea conficiendi ratio, in qua tandiu cassia percoquitur. Optima est hæc, per quam fractæ cænæ ex quibus educta est medulla lauantur in decocto colato: dein mellis integra libra, (non quidem dimidia, parcior enim est, ut dupla, nimia) additur. Postea coquuntur ad spissitudinem legitimam, ut tandem adiecta cassiæ libra fiat Electarium.

Nonnulli loco mellis saccharum permiscunt; alij vtrumque: quidam mannam: alij fennam, alij alia: sicque varia ex medulla cassiæ electaria conficiunt, quibus minimè assentior: Sat enim est diacassiam iuxta præscriptum modum paratam pro enematis habere, & si quando per os cassiæ medulla sumenda, sit recens extrahenda, & simplex sumenda, aut ei commiscenda, quæ conuenient, & medici scopo respondebunt.

Debet autem seligi cassia Ægyptia seu Orientalis, quæ extrinsecus ex subrufo nigricat, intus pinguis est ac medullosa, & nigra, cuius vis commendatur ad calorem temperandum, aluum eluendam, & corpus blandè purgandum: Ob id securè datur pueris, senibus & grauidis: Sine enim molestia ventrem subducit: Creditur ta-

men flatu concitare; ob id multi illius medullam educunt ad vaporem decocti anisi, vel feniculi: alii parum cinnamomi permiscunt, & quibus intestina sunt debilia, aliquid granorum Berberis addit Gorraus.

Audio nouum genus Cassiæ ex Brasilia nunc aduchi, cuius medulla vncia dimidia magis aluum turbat, ac validius copiosiusque humores educit quàm vncia integra vulgaris ac Orientalis.

Cassia Brasili-
ana.

Diacassia medicamentum est benignum, ac clementer purgans, mezentery æstum mitigat, aluum blandè mouet, illius siccitatem humectat, & lubricando ac detergendo per secessum excrementa deponit.

Diacassiae
vires.

Electarium lenitium.

C A P V T II.

*Rx. Polypodij querni,
Sennæ mundatæ,
Passularum mundatarum an. ℥ij.
mercurialis m. i. ℞.
hordei,
adianthi,
violarum an. m. ℞.
iniubarum,
sebesten an. n. xx.
prunorum enucleatorum,
tamarindorum pinguium an. ℥vi.
glycyrrhizæ rasæ ℥℞.*

*Coquantur in aquæ sufficienti quantitate ad tertiæ
partis dissipationem. Colaturæ adde,
pulpæ cassiæ fistularis,
tamarindorum, &
prunorum,
Sacchari albissimi, &
violati. an. ℥vi.
Sennæ pulueratæ ℥iii. ℞. fiat Electarium.*

COMMENTARIUS.

Ad cuius Electuarij confectionem passulæ debent ab acinis repur-

gari: Si adiantum album, seu capillus veneris verus non suppetat, eius loco polytrichum substituatur: Conserua violarum, vel saccharum violatum commisceatur pro arbitrio: conserua tamen electariis minus idonea. Anisum vel fœniculum dulce, vel cinnamomi parum poterit adicere qui voluerit; hucusque tamen sine istorum villo paratum est hoc electarium: in quo qui sunt vli nullam à flatibus molestiam perpeffi sunt.

In parte decoctionis paratæ fructus ex quibus est educenda pulpa erunt iudicio multorum humectandi: in alia cum saccharo syrupus conficiendus, cui adhuc calenti pulpæ commiscebuntur & saccharum violatum: Tandem senna tenuissimè læuigata, cuius vnčia vna cum dimidia, vel tantum cum dragmis tribus, vt vult Nic. Præpositus, ponitur pro quaque libra compositionis, cuius Rhasis esse perhibetur author. Melius autem pulpa fructuum sententia quorundam absque humiditate extrinseca trahitur: Aduentitiam namque si contraxerit humiditatem, ea coctione est resoluenda, aut syrupus magis coquendus: vtrumque verò fieri nequit, sine virium iactura, prunorum tamen medula sine aduentitio succo educitur nunquam.

De quantitate sacchari non omnibus conuenit, quod illa multis parciore videatur æquo, ad congruam Electarij consistentiam & conseruationem. Propterea duplum illius adiiciunt, alij triplum: Sicque corpus nanciscitur magis idoneum, & rancedini minus obnoxium, sed vires retinet segniores; Quas vt efficaciores habeat, pareretur iuxta consuetam & antiquam descriptionem, sed ea solum quantitate, quæ paucis hebdomadibus, ad vsus medicos tota dissipetur. Præstat namque medicamentum habere recens & potens, quam vetus & ignauum.

Facultates.

Electarium lenitiuum sic ab effectu dictum, vim habet leniendi, molliendi & aluum subducendi. Humores obuios sine molestia ducit, præsertim pituitosos & melancholicos. Conuenit pleuritidi, & aliis thoracis affectibus.

Aliud quoddam à Medicis Florentinis describitur sub nomine electarij magistralis quod turpethum, zinziber & Scammonium recipit: quo rectè pharmacolium nostrum carebit.

Electuarium Catholicum. CAPVT III.

℞. Polypodij querni contusi lib. i.
 aquæ purissimæ lib. ix.
 Bulliant simul ad terciæ partis aquæ dissipationem.
 In duabus partibus colaturæ coquatur sacchari lib.
 viii. in syrupum: Cui adde pulpæ, cassiæ, &
 tamarindorum altera decocti parte madefactorum,
 foliorum sennæ benemundatæ an. ℥ viii.
 rhabarbari optimi,
 polypodij quercini,
 fœniculi dulcis,
 violarum, an. ℥ iiii.
 Seminum quatuor frigid. maiorum an. ℥ i.
 glycyrrhizæ rasæ,
 penidiorum,
 Sacchari candi an. ℥ ss. fiat electarium.

COMMENTARIUS.

Vt antidotus hæc vniuersalis optimè conficiatur, multa sunt seorsim terenda & apparanda, ac primum quidem polypodium, quod cum bis ponatur, bifariam præparatur. Prima vice tantum contunditur crassiusculè, secunda tenuissimè læuigatur. Quod contusum est, diutissimè coquitur in aquæ quantitate dicta vel sufficienti, & ex duabus partibus colaturæ & saccharo fit syrupus.

Composi-
tionis illu-
stratio.

Ex altera humectantur tamarindi, vt eorum pulpa faciliùs cernatur, necnon cassiæ Orientalis medulla.

Rhabarbarum per se teritur: senna, glycyrrhiza, fœniculum, violæ & per se, & simul teruntur commodè. Loco violarum duplum conferuæ illarum optimè misceri potest. Quatuor semina frigida maiora, excorticata scalpello minutim conciduntur: dein puluerantur penidia & saccharum: tum miscentur omnia ligneo pistillo, aut rudicula probè agitando, vt fiat electarium consistentiæ legitimæ.

Non modò autem varia est huius medicamenti solemnis composi-

Catholici
author in-
certus.

tio, sed varia de huius authore opinio: Syluius enim videtur illius inuentionem adscribere Galeno: Iouhertus Nicolao Myrepfico: Bauderonius Nicolao Salernitano: Adolphus Occon, Nic. Præposito: Valer. Cordus Nic. Alexandrino, apud quem extat illius descriptio, vsitatæ tamen valde dissimilis.

Qui autem certò non sciunt, cuius istorum iustè debeatur illius inuentio, Catholicum Nicolai sine expressi cognominis designatione vocitant. Monet ergo nomen authoris incertum & anceps.

Catholicū
curdīctum.

Appellatur autem medicamentum hoc, Catholicum, & diacatholicō, hoc est, vniuersale, vel quia humores vniuersos expurget, vel quia eosdem ex corporis vniuersitate trahat & educat, vel potius quod omni morbo profit, vel nulli datum oblit.

Catholicū
simplex.

Iuxta vero formulam à nobis datam paratum, vocatur Catholicum simplex, ad differentiam alterius magis compositi, quod duplum pondus rhabarbari & sennæ recipit; neutrum tamen in hoc ponitur in substantia, seu pulueratum, vt in præcedenti, quod Catholicum simplex vocatur, sed folia Orientalia incoquuntur, & rheū infūdatur, eiusque expressio miscetur: mixtura autem sic in formam electarij dicta vocatur Catholicum duplicatum.

Multi polypodio decoquendo anisum aut feniculum, alij coriandrum ad discutendos flatūs adiiciunt: Ad huius tamen effectus consecutionem, feniculi satis additur, nec est opus tot medicamenta simul in massam congerere. Loco anisi quod multi auersantur feniculum dulce substitui. Si quis malit coriandrum, vel vtriusque pondus æquum permiscere, non refragabor. Libenter adhuc ad gratiam maiorem, cinnamomum adlicerem; nec eos pigebit, qui commiscébunt. Cætera secundum veterem descriptionem relinquenda, quam cum primæ notæ Medici non modò probarint, sed alijs purgantibus multis pratulerint, illam peruertere, vt fecit Rōdeletius, credidi nefas.

Catholicū
pro clysteri-
bus.

Nonnulli Catholicum quoddam in Officinis seruant pro clysteribus, à communi tantum diuersum, quod Rhabarbarum minus electum, & antiquatum recipiat, & cum melle sacchari loco paretur.

Catholicū
valde pur-
gatorium.

Improbandum est illud valdè purgatorium cui pharmacopœorum nonnulli turpethum, colocynthida & hermodactylos adiiciunt.

Audio quosdam liquidiusculum catholiconem ex syrupo & pulparum, puluerumque infuso tantum paratum in Officinis seruare; sed cum illius vis sit multum imbecilla, nec authoris, quisquis ille fuerit, scopo, respondeat, rarissimè paratur, nec parandum arbitror.

Catholico-
nes Ferne-
lij.

Aliæ Catholici descriptiones traduntur à Fernelio, quarum prior inter cætera recipit calida quædam, vt helenium, hyssopum, zinziber, cinnamomum, nucem moschatam, & mel: altera inter purgantia turpethum admittit, agaricum & diacrydium. Quæ sane compo-

fitiones cùm non nisi à perito veniant artifice non improbantur, sed tanquam minus probatæ, nunquam, aut rarò in Officinis paratæ reperiuntur.

Pro vero igitur electario Catholico stet in pharmacopoliis perpetuò, quod iuxta veterum doctorum placita descripsimus.

Catholicum blandè ac clementer omnes humores purgat : conuenit febribus & aliis morbis acutis, maximè his qui à lienis & iecoris ^{Catholici vires.} praua quadam diathesi oriuntur.

Diaprunum, seu diadamasenum simplex D. Nic. Myr.

CAPUT IV.

*Rx. Pruna damascena recentia & matura N^o. centum.
Coquantur in aqua sufficienti, donec tabescant. Pulpa
per cribrum traiciatur, relictis corticibus & nucleis.*

In percolato iure incoque parum.

florum violarum ℥ i.

In colatura dissolue sacchari lib. ii.

*Coque in syrupum: Cui adde
pulpe prunorum prædictæ & per se inspissatæ lib. i.*

medulla cassiæ & tamarindorum an. ℥ i.

Tum permisce pulueres sequentes, nempe

Santalorum alborum,

Santalorum rubeorum,

Rhabarbari an. ℥ iii.

rosarum,

violarum,

Seminum portulacæ,

Scariolæ,

berberis,

Succi glycyrrhiæ,

tragacanthi, an. ℥ ii.

quatuor seminum frigid. maiorum an. ℥ i.

Ex arte fiat electarium.

COMMENTARIUS.

Huius electarij descripta formula præ se fert suum conficiendi modum, eumque optimum, licet paulò aliter conficiant nonnulli, pulpam non modò prunorum & tamarindorum, sed etiam cassiæ diluentes & elixantes cum syrupo ad consistentiam mellis, vel electarij liquidiusculi, cui postea pulveres addunt, vt simul cum expetita qualitate, crassiolem & legitimam consistentiam fortiatur.

De violarum autem quantitate, non inter omnes conuenit; alij enim vnciam tantum dimidiam ponunt, ex Nic. Myrepli decreto: alij sesquivnciam, seu vnciam vnā cum dimidia: nos medium inter vtrumque pondus, nempe vnciam ponimus, in decocto prunorum colato parum coquendam. Nonnulli præter intentionem authoris cinnamomum adiiciunt, sed auferendum putamus, lenienti & refrigeranti medicamento descripto minus idoneum.

De semine berberis possum idem iudicium ferre, non quòd me lateat vires habere roborantes, sed quibus faciliè diaprūnum carere possit, cū Rheum & rosas admittat multò magis roborantes: adde quod virtus illius lenitiua potius, quàm roboratiua desideratur.

Maximè autem spodium, vt vocant, expungendum duxi, tum quia Græcum noxium est, & Arabicum non datur, aut datum non conuenit, nec eius Antispodium, ebur scilicet vstum, quod nullam cum radicibus cannæ vstis quæ sunt spodium Auicennæ, affinitatem habet, vt abundè docuimus libro secundo de Materia Medica, vbi eius historiam accuratè descripsimus, tum quia faciliè possunt omitti, quæ minùs sunt vtilia, aut cognita, aut vulgaria.

Vires.

Diaprūnum simplex commendatur non modò ad febres continuas & alias intermittentes vehementiores, sed etiam ad morbos omnes calidos, & ad vitia pulmonum, thoracis, renum, vesicæ: & quouis tempore febrium acutarum tutò potest exhiberi; feruorem enim cōtemperando aluum blandè subducit.

Diaprūnum compositum, seu laxatiuum D. Nic. Myr.

CAPVT V.

*R̄. Diapruni simplicis præscripti lib. i.
Scammonij præparati ʒ ss.
misce, & fiat electarium.*

COM.

COMMENTARIUS.

Vtrumque diaprunum compositum est atq; laxatiuum, sed quod diacrydium non recipit, aluum pigrè subducendo, vix primam corporis regionem expurgat, diciturque simplex ad differentiam alterius diagrediati, quod potenter ventrem turbat, & ex vniuerso corpore humores deducit.

Singulis autem libris simplicis additur vncia dimidia tantum diacrydij, vt eiusdem scrupulus in electarij vncia contineatur. Malè verò Nic. Salernitanus diacrydij pondus auget, cuius dragmas septē singulis electarij libris permiscet: sic enim magis effera vis illius purgatoria redditur, nec tam tutus est illius vsus. Debet autem tenuissimè diacrydium lauigari, & electario adhuc calenti commisceri.

Diaprunum laxatiuum præter eas vires quas cum simplici communis habet, potenter ac sine molestia purgat, vtiliterque datur morbis renum & vesicæ, febribus, & aliis affectibus calidis. Facultates,

Diaphænicum seu Confectio de daëtylis D. Mes.

R. Daëtylorum nondum perfectè maturorum tribus diebus in aceto maceratorum ʒ. C.

penidiorum ʒl.

turbith optimi ʒ xxxv.

amygdalarum dulc. mundatarum ʒ xxx.

diacrydij ʒ xij.

zingiberis,

piperi longi,

foliorum rutæ siccorum,

cinnamomi,

macis,

ligni aloës,

feminum anisi,

fœniculi,

dauci,

galangæ an. ʒ. ij. ʒ.

*mellis despumati lib. ʒ. seu quantitatem sufficientem,
fiat electarium.*

COMMENTARIUS.

Composi-
tionis illu-
stratio.

Cum dactyli perfectam magnitudinem adepti, necdum maturi, sint aliquantum flauī, non est opus in formula præscripta *Kirron* addere, ut pharmacopœorum vulgus solet; quæ vox si à Græcis detorqueatur, colorem flauū, si à Barbaris, qui *Keeyron* scribunt, maturum signat, vel potius, ut credibile est, Chayrū oppidum, seu agrum, vnde dactyli optimi aduehuntur: & succus quam maximus est illorū prouentus. Quod innuere videtur Saladinus, nescio quis triebolaris scriptor, qui *Keirun* esse credit prouinciam Sarracenorum. Non siquidem est opus dactylos immaturos propter astrictionem quarere ad huius electarij præparationem, cum etiam maturi valdè conueniant, & satis habeant astrictionis ad Scammonij castigationem, ob quam immaturi à quibusdam desiderantur. Ego autem nec immaturos, nec maturos prorsus, sed velut medios expostulo, qui si desint, maturos probo, qui Arabibus vocantur *Keiron* & *Keron*.

Præparatio.

Debent verò antequam veniant in compositionem interna cute & nucleis offcīs repurgari, in frustra concidi, & in aceti parua quantitate, diem tantum, si molles sint, aut biduum, vel triduum: si duriores, in fictili vase macerari: deinde in pila marmorea teri: Tum cerniculo traici, & postea cum melle despumato parum elixari ad aceti dissipationem. Internam cutem voco, eam membranulam, quæ carnem intus vestiendo proximè nucleos ambit.

Sunt qui dactylos in hydromelite, alij in vino albo macerant, sed ad aromatum temperationem, & pituitæ viscidæ attenuationem, melius in aceto macerantur.

Penidia
hordeata
cur dicta.

Penidia expetuntur hordeata dicta, quod fiant ex saccharo, & aqua hordei ad crassitudinem idoneam coctis: quibus recte parum mellis additur.

Tenuissimè autem pulueranda turpethum, lignum aloës, galanga, zinziber, & alia simplicia, sed amygdalæ minutim cultello idoneo incidendæ, dein cum penidijs lauigandæ. Tum simul misti pulueres præter Scammonium, quod seorsim terendum, & postremò miscendum, non melli triplo, ut voluit Cordus, sed eius tantum libræ dimidiæ probè commisceantur.

De mellis
quantitate
opinionēs
variæ.

Hæc enim mellis quantitas sufficit; Cuius vicem quoque subeunt dactyli, penidia & amygdalæ, quorum omnium pondus est lib. i. $\frac{3}{4}$ ix. & $\frac{3}{4}$ iij. Reliquorum puluerum pondus est $\frac{3}{4}$ viii. & $\frac{3}{4}$ vi. Quæ omnia simul iuncta efficiunt lib. ii. β . Quibus si libra dimidia mellis despumati addatur, tota compositio erit lib. iii. seu $\frac{3}{4}$ xxxvi. Ita ut singulæ compositionis vnciæ excipiant Diagredij scriptulum vnum.

Hæc mellis quantitas forsā multis non videbitur iusta, nec pul-

ueribus excipiendis satis copiosa, nec electario ad iustam consistentiam perducendo legitima, cum Bauderonius artis pharmacariae peritissimus, mellis $\frac{3}{4}$ xiii. s. apponat; Bern. Dessennius lib. ij. Ioann. Costæ lib. ij. & $\frac{3}{4}$ viij. Rondeletius lib. vi. Verum cum dactyli, penidia, & amygdalæ mellis suppleant vicem, ut dictum est, quantitas eius à nobis definita, aut paulò vberior sat esse potest; Quæ quò magis augebitur, eò compositi virtus erit imbecillior.

Sunt qui dactylos tantum aceto maceratos ponderant, alij melius eosdem ante macerationem pondere à Mesue definito assument; Deinde infundunt, postea terunt & apparant eo quo diximus modo. Diaturbith. Ab illis tanquam à basi totum medicamentum nomen habet, quod nonnulli quoque Diaturbith nominant, quod inter purgantia quæ ipsius compositionem ingrediuntur, turbith maximè præpolleat, eiusque ratione medicamentum hoc phlegmagogum est.

Amigdalarum dulcium incisarum portio maior rectè cum alijs puluerandis puluerabitur; Sua enim vinctuositate impediunt, ne vis puluerum exhalet. Reliqua portio quoque, vel omnium puluerum exigua quædam pars cum Scammonio miscebitur, antequam ingrediatur compositionem: Sic enim exactius quàm per se solum permiscebitur. Ad mixturam verò feruidam nūquam accedat, diagredium, sed tepidam tantum, aut paulò calidiorē, ne grumescat, & ineptum reddat compositi corpus, ac male diffusam ipsius qualitatem.

Diaphœnicum, siue Confectio de Dactylis, ut à multis vocatur, cle- Vires. menter & tutò pituitam & bilem ducit, dolori ventriculi, colico affectui, & omnibus malis, ab humore crudo & pituitoso natis succurrit. Item & febribus complexis, diuturnis & pituitosis.

Qui hoc electarium habebit, facilè utroque Indo carere poterit.

Diapsylium, seu Electarium de Psyllo. D. M. CAP. VII.

Rx. Succorum depuratorum buglossi,
borraginis,

endiviæ &

apij an. lib. ii.

Succi fumarie defecati ℥ iii.

misce, & per diem

in his macera

foliorum Sennæ ℥ i.

anisi,

cuscutæ,

asari an. ℥ ℔.

adianti m. i.

spicæ nardi ℥ ij.

Semel & simul feruefiant omnia, Quibus adde
violarum ℥ iii.

epithymi ℥ ii.

Parum denuò bulliant: Postea colentur: Co-
laturæ ad lib. iiii. ℔. infunde xxiiij. horis.

Seminis psylli integri ℥ iii.

Agitetur subinde mixtura: Deinde coletur.
Huic adhuc colaturæ ad lib. iij. adde
Sacchari lib. ij. ℔.

Coque paulò supra consistentiam Syrupi, in
cuius adhuc calentis lib. iij. permisce

Diacrydii triti ℥ iii.

trochiscorum diarrhod.

de Antispodio, &

de Rhabarbaro an. ℥ i.

trochiscorum de berberis,

conseruæ violarum an. ℥ ℔. fiat Electarium.

COMMENTARIUS.

A multis quidem commendatur huius medicamenti materia si-

mul congesta, sed à paucis laudatur simplicium, quibus constat descripta proportio, & vix à duobus idem probatur cōficiendi modus. Alij enim quidpiam augent, alij detrahunt: Alij tantum pondus immutant. Nos autem in huius medicamenti examine & apparatu, nullius magistri verba pro certissima lege & oraculo habentes, fatemur quidem mentem authoris, quantum fieri potuit, sequutos esse: quædam tamen suadete rationis dictamine immutauisse. Nam pro succo buglossi sylvestris, succum buglossi hortensis, vel potius borraginis, vt præstantioris substituimus. Pro vncia dimidia Sennæ, quæ vix quicquam notabile pollicetur, integram posuimus. Pro tribus vnciis cum dimidia Scammonij præparati, vncias solùm tres admisimus, vt tantum admittantur eius singuli scriptuli in singulis vnciis compositionis. Sic enim satis validum & purgatorium iudicamus, nec diacrydium in malo cytonio iam coctum recoquendum putamus, ne vis eius aliquantum hebescat.

Adieci mus conferuam violarum, vt vim quamdam magis lenientem adipiscatur. Asari tantum vnciam dimidiam, seu dragmas quatuor, sic $\zeta \beta$. depictas posuimus; Mesue vncias quatuor: Sed credibile est, illius pondus bibliopolarum errore immutatum, qui pro ζ iij. sic ζ iij. depinxerunt. Adianti veri penuria, polytrichum substituendum est. Parandi modus ex formula descripta satis patet.

Si quis autem miretur, cur Mesue venenatam qualitatem psyllio dederit, quod tamen multa quantitate medicamentum hoc ingreditur, eique nomen tribuit! Respondeo, id illi forsan accidisse, atque aliis authoribus multis, hisque grauissimis quibus nonnunquam aliquid præcipitanter effluit, quod postea sapientiores ac doctiores facti castigant immutantque. Vt vt sit, in psyllio nulla deleteria qualitas agnoscitur, proinde rectè ad hoc electarium accedit, quod ad multos vsus commendatur.

Monendus autem nouus tyro, coctionem mucaginum cum saccharo admodum difficilem esse, vt quæ ægrè permisceantur, vel certe non ita perfectè, quin saccharea portio post elixationem magis subsidat, mucaginea magis efferatur. Tandiu verò simul coquenda, donec mucaginum quarta solum pars, aut paulo plus vel minus pro artificis dexteritate relinquatur.

Electarium de psyllio bilem non modò temperat, sed purgat, Facultates.
bribus acutis, vt & morbis omnibus calidis, & curatu difficilibus conuenit: vertigini & his capitis doloribus, qui à calidorum humorum vel ascensu, vel congestione nascuntur, confert, vt etiam iecori æstuanti, vel obstructo, & aliis affectibus ex eadem origine natis.

Benedicta laxativa. D. N. Salern. CAPUT VIII.

℞. Turpethi
 rad. esulæ præparatæ an. ℥ x.
 Dacrydij,
 hermodactylorum,
 rosarum an. ℥ v.
 Zinziberis,
 galangæ,
 cariophyllorum,
 cardamomi:
 amomi, vel eius defectu, acori
 piperis longi,
 macis,
 spicæ nardi,
 croci,
 seminum apij,
 carui,
 fœniculi,
 saxifragæ,
 milij solis,
 asparagorum,
 rusci,
 salis gemmei an. ℥ i.
 mellis despumati lib. i. & ℥ vii. ℞. fiat electarium.

COMMENTARIUS.

Esulæ præ-
 paratio.

Antequam Esulæ radix teratur & in usum veniat, ut decet, præparanda. Maceranda nempe viginti quatuor horas in aceto: Dein exsiccanda & pulueranda cum turpetho, nardo minutim secta, zinzibere, galanga minore & hermodactylis. His ex dimidio tritis aromata miscenda, & simul lauiganda. Seorsim verò sal, crocus, saccharum, & scammonium præparatum.

Pulverum autem pondus est 3. LII. Si inter pulveres sal, ut nonnulli volunt, numeretur; atque isti ponderi triplum mellis despumati, seu quantitas definita, aut quod sufficit commiscetur, ut consistentiæ legitimæ fiat confectio, quæ quoddam benignè aluum subducatur, Benedicta nominatur. Saccharum addunt nonnulli, sed contra mentem authoris.

Eorum autem rectè neglecta fuit opinio, qui Dacrydium minuendum vel subtrahendum iudicarunt, ne nimis cholagogum esset medicamentum. Nam cum tria in mixtione concurrant pituitam purgantia, scammonij definita quantitas appositè commixta est, tum ut lentam turpethi vim excitet, tum ut simul medicamentum cum pituita, nonnihil quoque biliosi succi ducat.

Non modò autem dictos humores à prima regione corporis, sed à renibus & partibus remotioribus expurgat, obstructions soluit, & quosvis humores viscidos expellit, & pituitam ab articulis deturbat. Facultates.

Benedicta dicitur, inquit Salernitanus, quòd ab omnibus à quibus sumitur, benedicta est.

Electarium, seu confectio Hamach. Des. Fernel. CAPUT IX.

R. Cortic. myrobal. citr. ʒ ij.
myrobal. Cepulorum,
myrobal. Indorum
violarum,
colocynthis,
polypo ij querni an. ʒ ss.

absynthij,
thymi an. ʒ ss.
fm. anisi,
æniculi,
rosarum rubr. an ʒ iii.

Tusa omnia macerentur per diem in lib. ij. seri lactis. Deinde coquantur ad lib. j. Ericentur manibus & exprimantur. Colaturæ addo

Succi fumarie,
pulpæ prunorum &
ruarum passar. an. lib. ss.

sacchari albi,
mellis desp. an. lib. i.

Coquantur ad consistentiam mellis, inspergendo sub finem.

agarici &
sennæ pulueratorum an. ʒ ii.
Rhabbari triti ʒ i ss.

Ephymii ℥i.

Diadacridij ℥ vi.

cinnamomi ℥ ℞.

Zinziberis ℥ii.

sem. fumarie

anisi,

spice nardi an. ℥i. fiat electarium.

COMMENTARIUS.

Rectè Fernelius Electarium hoc immutauit, castigauit, & seruata ipsius virtute, vel etiam in melius mutata, formam parandi faciliorem dedit. Nam, vt ait Plantius, frustra myrobalani geminantur in decocto primùm, deinde rursum triti, & impositi: Et præterea Rhabarbari cocti vis perit: Cassia & manna cum tamarindis coctæ corrumpuntur: Dacrydij quoque cocti vis exolefcit, nec alijs facile commiscetur. Sic autem in veteri descriptione à Mesue tradita, iubentur dicta medicamenta simplicia parari, & contra artis præcepta indebitè & confusè misceri. Quapropter huius electarij descriptionem ex Fernelio exhibemus multò meliorem, paratu faciliorem, & vsu fœliciolem, quam prudentes Pharmacopolæ parari curabunt & seruabunt in Officinis. Et licèt hoc versificatoris cuiusdam rhythmico monitu, *non eris illusus, teneas si quod tenet vsus*. Cum tamen vsus prauus est immutandus: Optima namque est, quæ ad melius fit mutatio.

Porro ad huius electarij confectionem Mesue requirit serum lactis caprilli, nec illius quantitatem definit. Verùm eius loco serum lactis asinini poterit assumi: quod etiam si defuerit, vaccinum commodè substituitur: in cuius libris duabus simplicia macerabuntur, & coquentur, in eisque vim suam deponent. In colatura dissoluentur pulpæ passularum, & prunorum, mel & saccharum, quibus addetur fumarie succus, omniaque lento igne coquentur supra consistentiam syrupi, addenturque reliqua iuxta formulam descriptam, paratu satis facilem.

Facultates. Si paulo minor feri quantitas videatur, ad periti artificis ita augenda, vt pulueres ritè macerentur.

Confectio hamech purgat bilem vtramque, & pituitam fœsam: propterea

propterea morbis ab hisdem natis confert, cancro, elephantiasi, mania, melancholia, impetigini, pfora, scabiei, & similibus affectibus cutis.

Barbitonfores solent omnes hoc electarium expostulare, ad purgandos quosuis venerea lue infectos, perinde ac si vna omnium esset temperies, & in omnibus vnus noxius humor. Inter illos verò qui gloriosè magis exultant, medicorum eloquio prudentiores & doctiores facti, materiam in hoc morbo peccantem, pro varia singulorum natura variam agnoscunt.

Cùm autem antiqua compositio ineptissimè descripta soleat pro specimine dari tyronibus, qui magisterij titulo honestari desiderant, atque his maximè qui suis se magistris magis sedulos & sciolos gloriantur, eam ipsam huc attexere minimè grauabor.

Confectio Hamech maior. D. Mes.

CAPVT X.

R. Succi fumi terræ depurati lib. l.
 Passular. mundatar. lib. B.
 Prunorum dulcium n. lx.
 Myrobalanorum citrinorum ℥ iij.
 Cepulorum,
 Indorum,
 rhubarb. optimi
 epithymi an. ℥ ij.
 agarici albißimi,
 colocynthidis,
 polydij querni an. ℥ xvij.
 absynthij,
 hasee, i. thymi,
 sennæ an. ℥ i.
 Violarum ℥ xv.
 epithymi ℥ ij.
 anisi,
 rosarum
 fœniculi an. ℥ vi.
 Succi fumi terræ lib. l.

prunorum n. lx.

passul. mundat. ℥ vi.

*Infunde omnia in aquæ casei quantitate sufficienti,
& ponantur in vase vitreato stricti orificij, & ob-
turetur os eius, & dimittatur per dies quinque.*

Deinde bulliant bullitione vna:

Deinde colentur, & in colatura dissolue

Cassie fistulæ mundat. ℥ iiij.

thamarindorum ℥ vi.

tereniabin ℥ ij.

*fricentur manibus & colentur, & proiciatur desu-
per.*

Zucchari alb. lib. i. ℞.

scammonij ℥ i. ℞.

*coquantur vsque dum habeat spissitudinem mellis,
deinde puluerisentur super illud.*

myrobol. n. r. citrinorum Rebulorum,

Indorum, l. an. ℥ ℞.

Bellericorum,

Emblicorum,

reubarbari

seminis fumi terræ an. ℥ ij.

seminis anisi,

spicæ nardi an. ℥ ij.

COMMENTARIUS.

Is pulvis electario vt decet conficiendo miscendus. Alia est apud Mesueum huius nominis confectio dicta minor, quæ minori & simplicium numero & labore concinnetur. Vtraque nunc à doctis omnia accuratè perpendentibus negligi solet. Nihil enim probandum quod ratio non probat. Ea autem vtramque damnat, seu materiam spectes, quæ inepte vsurpatur, & ineptius geminatur, seu formam, quæ ineptissimè describitur.

Rx Caryophyllorum,
costi,

Cumini an. ℥ij.

hermodactylorum,

Diagredii an. ℥℞.

Mellis despumati q. suff. seu triplum vel lib. ℞.

fiat Electarium.

COMMENTARIUS.

Vt in duabus ciuitatibus etiam non longè à se inuicem dissitis, vix eadem loquela, viuendi lex, & obseruantia morum, Sic vix vnus apud pharmacopœos omnes omnium pharmacorum vsus. Lutetiæ vix innotuit Electarium, quod à cariophyllis & costo nomen trahit, Lugduni tamen habetur in vsu frequenti & fœlici. Qui ipsius dotes non nouit, compositionem accuratè perpendat, & ad multos affectus expugnandos experietur, si voluerit, singularem; quam à peritis medicis & nimium expertis inuentam Gariopontus vetustissimus Medicus scribit. *part. 3. cap. 6. lib. 4.* Vt ritè paretur, puluerandæ prius, ac simul radices, necnon cariophylli & cuminum. Scorsim verò Diagredium, posteriusque adiiciendum melli despumato pulueribus ante concorporato, vt fiat Electarium consistentiæ legitimæ. Aromata quibus constat, partim nobilia membra roborant, partim hermodactylorum, & Scammionij vim noxiam emendant, & simul viscidos humores attenuant, flatus discutiunt, & operationem medicamenti minus torminosam reddunt.

Nonnulli pro Costo Inulam substituunt, Alij Imperatoriam, sed Costum Belgarum, qui nunc satis frequens reperitur, pro exotico lubetiùs præfero. Qui mel cum vino albo despumant & coquunt ad syrupi consistentiam, Electarium iam satis calidum calidius afficiunt, ego mel rosatum colatum præfero: prodest arthritidi, vt & alijs affectibus.

Ioubertus quem nonnulli pharmacopœi sequuntur, zinziberis ℥ij addidit, sed authoris mentem sequutus omittendum censui: qui ℥i. cinnamomi superadiunget, Electarium habebit gratius, nec

Vires.

calidius multò, maxime si pulueres rhodomelle cogantur.

Valde prodest arthritidi biliosæ præcauendæ & sanandæ, vt & aliis affectibus multis, qui à bile & pituita nascuntur: Mirabiliter verò furiosos podagricorum dolores mitigat, & ignitum extinguit calorem, ait author, atque statim vbi vëtre soluerit, solatur, & patientis adeo membra leuat, vt è secessu, seu ventris per medicamentum solutione, solus redeat ad lectulum.

Tryphera solutina.

CAPVT XI.

℞. Dacridij Antiocheni ℥ x.
 turpethi optimi ℥ i. ℞.
 cardamomi minoris,
 cariophyllorum,
 cinnamomi,
 macis an. ℥ iij.
 santali citrini,
 glycyrrhizæ rasæ,
 sem. fœniculi dulcis an. ℥ ℞.
 aconit,
 schoenanthi an. ℥ i.
 corticis citri conditi,
 rosarum, an. ℥ iij.
 violarum ℥ ii.
 penidiorum ℥ iij.
 sacchari tabarzet lib. ℞.
 mellis albißimi in succo pomorum bene despumati lib. i.
 fiat electarium.

COMMENTARIUS.

Tryphera acceptio dicta videtur contrario quam se habeat compositio apud Mesuem, sensu, cuius omnes Tryphera minimè sunt delicatæ, vt nominis intellectio portendit, sed & gustu, & colore ingrata, nec viribus commendabiles. Nos exhibemus vnicam his omnibus dotibus insignem: Gratus enim admodum est illius sapor,

nec color displicet: Vires autem eximiae, & toleratu, quibus conueniunt faciles.

Porro zinziber Turpetho addi solitum relinquimus, quia simul aromata multa suauiora, & magis cardiaca ad illius stimulum & castigationem congeessimus, quæ & diacrydij feritatem simul mitigant, præsertim rosæ, violæ, necnon santala, quæ & aromatum calorem contemperant. Penidia potius ad leniendum, saccharum ad suauitatem, & mel ad conseruationem adduntur.

Iuxta formulam descriptam fideliter, vt solet, parauit Anton. Landæus Pharmacop. Parisiens. dignissimus, multisque meo consilio, ægrotis exhibuit, qui sine oris insuauitate, stomachi subuersione, ventris torsione sceleriter fuerunt purgati, & securè à morbis, quibus detinebantur, liberati.

Operosa multum non est huius Electarij præparatio quæ sic facile peragetur: Santali primum puluerandi, dein turpethum & liquiritia, tum semina, cortices & flores, postea penidia. Interea despumabitur mel, zuccarum simul liquabitur, admiscebuntur pulueres. Seorsim verò tritum Dacrydium puluerum portioni mistum Electario iam vnito, omnium postremum commiscebitur.

Tryphera solutiua his potissimum accommoda, qui multis excrementis biliosis, pituitosisque scatent, & qui vix medicamenta purgantia, nisi grata sumunt. Hæc enim confectio parum insuauis est, & potenter aluum subducit, obstructions tollit, crassos humores, lentos, & viscidos incidendo, & attenuando purgat, febribus compositis congruit, & his omnibus morbis, qui à pituita & bile proficiuntur, vigentibus tamen æstatis ardoribus minus conuenit, nisi cum decocto quodam, aut alio liquore multum refrigerante propinetur.

Vires

Diabalzemer, seu electarium Sennatum. CAPVT XII.

Rx. Radic. cichorij	Ceterac,
buglossi,	cuscutæ
polypodii querni,	artemisia,
cortic. radice caparis,	fumaria.
graminis,	agrimonii,
glycyrrhizæ, an. ℥ ℞.	bethonica,
passular. Corythiacar. ℥ vi.	melisse,
adianti,	florum genestæ,
hemionitidis,	violarum, an. m. ℞.

Coquantur in aqua sufficienti. In colatura ad lib. iii. Infunde & coque.

foliorum sennæ ℥ ii. i.	ellebori nigri,
seminum dauci	turpet hi an. ℥ i ℞.
coriandri an ℥ i ℞.	cariophyllorum ℥ ii.

Bulliant ad consumptionem tertiæ partis: In colat. adde sacchari lib. i. ℞. Coquantur supra consistentiam Syrupi: Cui permisce expressionē rhei electi in aqua chalibeata infusi ℥ ℞.

Sennæ pulueratæ ℥ ii.

lapidis lazuli preparati,

cinnamomi an. ℥ ℞.

sassafras ℥ i.

radic. pæoniæ, tamarisci, epithymi, cortic. mediæ fraxini an. ℥ ii.

sem. agni casti, nigellæ Romanæ, spicæ Indicæ an. ℥ ii.

anthos, stæchados an. ℥ i. fiat electarium.

COMMENTARIUS.

Singulis morbis singula debentur præsidia, quæ quòd ex Dispensariis vulgaribus non suppetant, nunc suppeditamus, & multis affectibus, quibus sanandis deerant auxilia, foeliciùs auxiliamur: vt Hy-

hypochondriacæ affectioni hoc medicamento, ex hypochondriacis, hysteri-
cicis, melanagogis, & quibusdam Indicæ lui curandæ idoneis.
concinato, quod Diabalzemer, seu electarium fennatum nomina-
re libuit, vt cuius Senna Arabibus *Albazemer* dicta, non modò co-
pia, sed viribus sit basis. Nullum enim familiarius melancholico hu-
mori ducendo medicamentum ipsa senna, nullum aptius, nullum
toleratu facilius. Hanc verò partim pulueratam & mixtam, partim
infusam & coctam permiscemus, cum his quæ flatus discutiunt, hu-
mores attenuant, infarctus tollunt, lienem, iecur & viscera roborât,
facultates recreant, vterum respiciunt, qualitatem quamdam mali-
gnam obtundunt, & humores iamdiu congestos securè propellunt,
non modò melancholicos & contumaces, sed & quosdam lentos &
pituitosos, qui melancholicorum naturam interdum induunt, &
quosdam assatos biliosos. Proinde turpethum & Rheum addidimus,
vt simul cum humore melancholico, pituitosus, qui sæpius adest, &
nonnihil ex bilioso, qui rarò abest, educatur.

Et quia medicamentum hoc melancholico humori ducendo desti-
natur, eleborum nigrum selegimus, neglecto albo, pituitoso humo-
ri ducendo conuenientiore.

Modus parandi facilis est, cùm & formula descriptionis illum sa-
tis demonstret. Antequam tamen omnia simul coëant in electarij
molem, lapis lazuli sic præparari debet.

Quantitas eius sumetur idonea, teretur in mortario metallico,
abluetur aqua communi, siccabitur in sole, vel cineribus calidi-
culis: Denuo abluetur, & siccabitur: Rursusque lauabitur, vt antè
donec aqua lymphida remaneat, & postea exsiccabitur: idque non
modò decies, sed vigesies iterabitur, si fuerit opus: Tandem ablu-
etur in aquis cardiacis quater, quinquies aut pluries: Tum exsicca-
tus seruabitur ad vsum. Sic namque inimica quædam huius lapidis
qualitas perit, & retinetur purgatoria. In confectione Alkerimes
vritur, vt pereat purgatoria, remanente cardiaca, qua tunc est
opus.

Lapis la-
zuli præpa-
ratio.

Diabalzemer mirum in modum conuenit lienosis, melancholicis,
hypochondriacis, maniacis, epilepticis, siue febre delirantibus, pas-
sionibus hysteriis, fædis viduarum coloribus, elephantiasis, & In-
dica lue inueterata laborantibus.

Facultates.

Hydragogum eximium. CAP. XIII.

℞. Radicum yreos nostratis,
 ebuli,
 graminis,
 cortic. radic. capparis,
 asari,
 carui an. ℥ vi.
 pimpinellæ,
 polytrichi,
 agrimonij,
 ceterach
 artemisiæ an. m. i.
 florum Persicæ m. ℞.

Coquantur in aqua sufficienti. In colatura infunde, & coque parum
 foliorum sennæ ℥ ij.
 seminis dauci ℥ ii.

In colatura ad lib. i. adde
 succi rosarum pallidarum lib. ℞.
 sacchari lib. i. ℞.
 mellis in decocto ℥ ii. radicis yreos cælestis desp. ℥ x.
 Coquantur in Syrupum. Cui permisce
 mannæ Calabriensis ℥ ij.
 turbith,
 radicis esulæ præparatæ an, ℥ i ℞.
 zinziberis ℥ i.
 acori,
 calami aromatici an. ℥ i.
 mechoacanæ ℥ ii.
 sem. ebuli ℥. ℞.
 seminis brassicæ marinæ ℥ iii.
 cinnamomi ℥ ii. fiat Electarium.

COMMENTARIUS.

Vt multa medicamentorum compositiones sine arte à multis authoribus descripta traduntur, sic & quamplurimæ effectibus planè consimiles. Proinde multa electaria liquida, vt indebitè composita, vel parum ad affectus curandos accommodata despeximus. Alia verò arte & ratione melius descripta, & morbis quibusdam frequentissimis rectè curandis idonea adiunximus: vt præter duo superiora, Hydragogum hoc Electarium, quod ab agendi præstantia eximium nuncupauimus, in pharmacopoliis seruandum cupimus, vt præsto sit semper his auxilium quibus venter aquis plenus est, aut alia corporis pars immersa sero. Sæpe enim accidit, vt hydropicus sine præsidio deferatur, optimi medicamenti aquas ducentis penuria. Quia verò hepatis & interdum lienis errore hydropes fiunt, multa quæ viscus vtrumque roborant, intemperiem emendant, & obstructiones tollunt, adiunximus: Nonnulla quæ flatus discutiunt, & calorem natium excitant sopitum. Præterque multa hydragoga, vt decet, castigata & apparata. Ordo descriptionis formulæ modum parandi docet.

Hydragogum eximium hydropicis tutò datur: Aquas enim ac serosos humores sine violentia ducit, & ad morbos omnes ab eisdem ortos accommodatissimum est medicamentum purgatorium.

Medicamenti similis inopia plebecula Parisiensis confugere solet ad quemdam pseudopharmacopolam, virgini-mulierum interpolatorem, qui puluerem quemdam laxatiuum ad hydropem curandum exhibet, quo vix vnus è multis millibus conualescit.

Electarium rosatum De M. CAPVT XIV.

R̄. Succi rosar. rub. completarum lib. iiii.
 Zucchari tabar̄et lib. β.
 tereniabin puri & recentis ℥ vi.
 Scammonii Antiocheni. ℥ i. β.
 coquantur omnia lento igne ad mellis crassitudinem.
 Tum proice desuper,
 trochiscorum de spodio ℥ i.
 Gallie,
 croci an. ℥ ii.
 trochiscorum de berberis. ℥ iiii.
 Repone in vase vitreo. Dosis eius est, ℥ v.

COMMENTARIUS.

Electaria duo nominis eiusdem à diuersis authoribus dantur: Prius ex Mesueo, alterum ex N. Salernitano depromitur. Illud forma liquida formatur: ob id ad calcem huius sectionis reposui, & multis vrbibus tantum inseruit ad pilularum Aggregatiuarū combinationem: hoc solida solum consistentia seruatur, & vbique, vbi medicina benè fit, foeliciter vsurpatur. De quo paulò post fusiùs.

Ex his duobus vnum Syluius contexuit, singulorum dotibus insignitum; Sed præstat seorsim parare: Qui tamen compositionibus quæ Mesues Rosatum admittunt carere voluerit, illo ipso rectè carebit. Parum enim vsuale est, nec vlla ratio probat tantum succi rosarum vbertatem ad sacchari pondus, nec descriptum ab authore parandi modum, per quem malè Scammonium cum succo rosarum, saccharo & manna coquitur ad mellis crassitiem. Cùm vero mihi parum arrideat, parum quoque in illius explanatione immorabor.

cap. 2
sect. 3
huius
lib.



SECTIO SECVNDA.

De Hieris.



Compositiones quædam purgatoriæ ab antiquis Græcis Hieræ, hoc est, sacræ, & propter insignes effectus, magnæ dicuntur: Magnis enim viribus pollent, & magnis in morbis sæpe foeliciter dantur. Sunt autè sic denominatæ confectiones vulgatissimæ, & ad medicos vsus commendatissimæ, præsertim quæ à commendatissimo authore inuentæ sunt, ac celebratæ, vt

Hiera Picra, seu Dialoë Galeni. CAP. I.

<i>R. Cinnamomi,</i>	<i>croci,</i>
<i>macis,</i>	<i>mastiche</i>
<i>asari,</i>	<i>iunci odorati an. ʒ vi.</i>
<i>spicæ nardi,</i>	
<i>aloës non lotæ ʒ. C. siue lib. i & ʒ ʒ.</i>	
<i>mellis optimi despumati triplum, seu lib. iiii.</i>	
<i>Misceantur simul in Electarium.</i>	

COMMENTARIUS.

cap. 2.
lib. 8.
comp.
med.
loc. Hæc Hiera à Galeno eius authore, Picra, hoc est, amara dicitur, propter Aloën, à qua basim & purgatricem vim habet. Vetus autem compositio retinetur præter xylobalsamum, quod vix reperitur, cuius loco Macim, consilio Eernelij substituimus, & pro floribus iunci odorati, qui nobis non suppetunt, iuncum ipsum: Sicque quantitas à Galeno expetita habetur eorum, quæ cum aloë misceri iussit ipse, vel potius Andromachus, qui aloëm etiam lotam expetiuit: Illota tamen nunc & rectè ponitur.

ca. 14.
lib. 6.
de san. Hæc fuit Hiera picra vſitatissima Romæ, præter alias duas, quibus interdum Galenus utebatur, sed quarum exoleuit vsus, & quibus pro re exigente aliquid detrahebat, vel adiciebat, vel immutabat.

lib. 6.
de san.
lib. 6. Remansit autem hæc hucusque integra, præter lignum balsami, quod multi auferunt, nihil substituētes; Alij furculos lentisci, alij carpobalsamum, quod æquè rarum est, substituunt. Macis optimè succedit illi, vel calamus aromaticus, atque alterutro parata Hiera, xylobalsami loco, nihilo erit inefficacior. Eius autem Galenus perhibetur author, quodd eam potius celebrarit, quàm inuenerit. Parandi modus facilis est. Seorsim primùm terenda mastiche, aloë, crocus: Deinde reliqua. Tum mixta, misceantur denuò expumato melli, ac tepido tantum, vt omnia coëant in electarij spissitudinem.

Hiera picra à Galeno celebrata facultatibus multis insignibus est. *Qualitates.* fixax est: Calefacit enim, incidit, attenuat, siccit, terget, obstructions tollit, humores biliosos, pituitososque, crassos, & lentos expurgat: Affectibus ventriculi, mesenterij, hepatis, capitis &

iunctarum mirè confert. In qualibet vncia compositionis ponuntur aloës ℥ij. & gr. i.ß. Et pulueris reliquorum simplicium grana quindecim.

Hiera Picra cum Agarico.

CAPVT II.

℞. Puluer. hieræ simplicis sine aloë,
agarici trochiscati an. ʒß.
aloes non lozæ ʒi.
mellis de spumæi triplum, seu ʒvi.
Ex arte fiat Electuarium.

COMMENTARIUS.

Duobus constat hæc hiera medicamentis purgantibus benignis, altero cholagogo, nempe aloë, altero phlegmagogo, videlicet agarico. Sat enim non est vnicum humorem noxium foras propellere, cum duo obfuant, & morbum quemdam committunt, vel fouent: Tunc enim ad intemperiem mixtam medicamento mixto, seu qualitatibus multis composito est opus. Quia verò sæpius Hiera picra Galeni datur affectibus ventriculi & cerebri, in quibus partibus raro solitaria bilis aggeritur, sed simul pituitæ plurimum vel crassæ, vel tenuioris: Proinde cum ex illis humorem vtrumque trahere consilium erit, optimè hiera cum agarico imperabitur, à quo cognomen habet. Paratur verò vt præcedens, cuius sæpè puluis seruatur in Pharmacopoliis, eique opportuno tempore, vel aloë tantum cum melle additur, vel simul agaricus, prout hanc, vel illam parare consilium erit.

Vires.

Quæ autem cum agarico paratur, ad multa utilis est: pituitam enim quamlibet educit, sed præsertim crassam ac viscidam, & bilem putrem: humores adhuc incidit, infarctus tollit, in zenterium exonerat, ventriculum purgat, appetitum refarcit, coctionem iuuat, è cerebro noxios humores educit, & confert epilepsiæ, vertigini & sopori vigilantia.

℞. Stæchados,
 marrubij,
 chamædrios,
 agarici,
 colocynthis an. ʒ x.
 opoponacis,
 sagapeni,
 sem. petroselini,
 aristolochiæ rotundæ
 piperis alb. an. ʒ v.
 cinnamomi,
 spicæ nardi
 myrrhæ,
 folij,
 croci an. ʒ iiij.
 mellis despumati triplum, seu lib. iii.
 misce vt artis est, & fac Electarium.

COMMENTARIVS.

alib. 3. Hieram hanc a Oribasius tribuit Ruffo, b Paulus Archigeni, Scri-
Synops. bonius Largus Pacchio. Is tamen non fuit primus author, sed pru-
b ca. 7. dens celebrator, qui cum ex ea plurimum lucrifaceret, tanquam
l. 7. de secretum quoddam non reuelandum, eam apud se vsque ad interi-
remed. rum seruauit. Eo mortuo delata est iuxta formulam descriptam ad
 Tyberium Cæsarem, à quo Scribonius habuit, quam antè nulla ar-
c cap. te extorquere potuerat. c Ætius modò hieram Archigenis, modò
114. Antiochi nominat. Nos verò à præcipuo illius comprobatore Hie-
et. 1. ram Pacchij nominamus. Sic autem paratur.

ser. 3. Sagapenum & opoponax integra nocte macerantur in hydrome-
 lite, aut vino potius quàm aceto: Die colo forti trahuntur, vt for-
 des omnis & pars impurius secernatur: Postea melli despumato com-
 miscentur, vna cum reliquis simplicibus pulueratis. Scorsim verò

Præparatio

teritur crocus, vt & agaricus & colocynthis, cui inter puluerandū gutta quædam olei permiscenda, ne vis eius exhalet, & facilius teratur. Eius autem pulpa tantum sumenda, & prassium seu marrubium album, potius quam nigrum. Sunt qui polium, non folium sumunt: folium tamen apud Scribonium legitur, non polium, quod sanè illius defectu rectè substituetur.

Myrrha cum vix nisi recens & mollis, ac in mortario calido dissoluatur, raroquè nisi admodum vetusta habeatur, pulueranda: aut vna vice, si ita fieri faciliè queat, aut pluribus, si facilius: Tum alijs pulueribus adiungenda, & toti composito permiscenda.

Qualitates.

Hiera Pacchij, ad plura vitia efficaciter datur, inquit Scribonius; *cap. 23.* Sanat enim epilepticos, furiosos, vertiginosos, cephalalgicos, suspiriosos, anhelosos, comatosos, incubo, & alijs diuersis oculorum, *art. 92.* aurium & capitis affectibus obnoxios. Stomachum quoque optimè *comp.* purgat, affectiones hepatis emendat, lienis saburram tollit, illiusque *med.* duritiem minuit, intestinorum morbis auxiliatur, futuras aut iam factas in illis partibus vomicas aut discutit, aut celerius aperit, & menstrua his mulieribus mouet, quæ difficillimè purgantur.

Hiera Diacolocynthidos magistralis. CAPVT IV.

<i>Rx. Pulpæ colocynt. ℥ i.</i>	<i>caryophyllorum</i>
<i>agarici,</i>	<i>cinnamomi,</i>
<i>ellebori nigri an. ℥ ss.</i>	<i>macis,</i>
<i>aloës ℥ x.</i>	<i>baccarum lauri,</i>
<i>dacrydij,</i>	<i>granorum iuniperi</i>
<i>polypodij,</i>	<i>cardamomi,</i>
<i>mastiches, an. ℥ ij.</i>	<i>maiorana,</i>
<i>opoponacis,</i>	<i>stæchados,</i>
<i>bdellii,</i>	<i>croci,</i>
<i>sagapeni an. ℥ ii.</i>	<i>spicæ Indicæ an. ℥ i.</i>
<i>radic. enulæ campanæ</i>	<i>rosarum ℥ iii.</i>
<i>cyperij,</i>	<i>mellis despum. lib. i. ss.</i>
<i>angelicæ</i>	<i>misce, vt artis est.</i>

C O M M E N T A R I V S.

Nihil æquè confusum est in Pharmacopœorum Dispensariis at-

que Hierarum descriptio, quas quisque ad libitum variè & nominat & immutat. Eandem enim sæpè triplici nomenclatura designatam videmus, ut illam, quæ modò Hiera Pacchij, modò Archigenis, modò Ruffi, modò etiam Diacolocynthidos nominatur. Et aliquando tres multum inter se differentes, eadem voce designatas comperimus, ut Hieram Diacolocynthidos quæ alio modo à Mesue, alio à Nic. Myrepso, alio à Fernelio describitur. His verò omnibus Hieram Pacchij præferimus, ut meliorem, quam magistralem nuncupamus. Sic enim ab illius basi, & virium præstantia optima ratione nominatur. Et qui hanc habebit, aliis omnibus, quæ colocynthida capiunt, à veteribus descriptis carere faciliè poterit. Quæ tamè à Pacchio describitur, cum benignior sit, poterit quoque haberi. Parandi modus sic esto.

Opoponax, bdellium & sagapenum per noctem, aut diem integrum macerentur in aceto, potius quàm vino, propter simplicium, quæ ad compositionem accedunt, calorem: Dein optimè colentur, & super cineres calidos acetum resoluatur. Bdellium vix diluitur, diu licet maceratum, nisi recens, ac in mortario & pistillo calidis ductum. Proinde vetustum ex arte puluerandum. Purgantia seorsim puluerentur, & olei amygdalini parum colocynthidi adhibendum, ne late scat inter terendum. Tum reliqua simplicia, primum duriora; Postea aromata: Tandem omnia melli despumato permisceantur in legitimam, ac hieris debitam spissitudinem.

Hieræ magistralis facultates.

Hiera Diacolocynthidos magistralis eximiam habet vim, ad capitis, ventriculi & abdominis morborum curationem, quos humor crudus, pituitosus, crassus, aut melancholicus committit. Maximè autem apoplexiæ, comati, lethargo, paralyfi, epilepsiæ, incubo, asthmatis, colico dolori & melancholiæ hypochondriacæ conuenit, atque omnibus ventris affectibus, qui à pituita vitrea, aut gypsea proficiscuntur, vel qui modo quocunque hebetem habent simul motum & sensum, vel alterutrum tantum.

SECTIO TERTIA.

De Electariis solidis, & Trochiscis purgātib.



*O*VI Antidotaria, seu Dispensaria vulgo dicta componunt, vel verius transcribunt, multum sibi laudis deberi putant, si medicamentorum etiam nulla arte & ratione descriptorum farraginem, à quibusvis authoribus depromptam congerant. Nos verò non modò selectiora, sed ex selectissimis, quæ optima sunt & usu longo comprobata damus. Quibus nonnihil, prout suaseratio, vel addidimus, vel etiam detraximus, ut nimis rara, aut inutilia, aut incognita, non modò recentioribus, sed etiam authoribus primis. Rarò enim non contingit, ut viri gravissimi ex aliorum tantum relatu multa dicant & scribant. Et quæ male audierunt, vel non norunt, pro veris ut habeantur in lucem edunt & defendunt. Pauciora autem medicamenta ideo hac in Officina describo, quòd legitimam illorum compositionem, compositionis modum, illustrationem, & facultates ostendam.

Electarium Diacarthami, seu Diacnicu. Des. Arnaldi Villanovani.

CAPVT I.

Rx. Medul. sem, carthami,
hermodactylorum,
pul. diatragacanthi frig. an. \mathfrak{z} \mathfrak{ss} .
turbith, \mathfrak{z} vi.
zingiberis,
manne granatæ an. \mathfrak{z} ij.
Dacrydij \mathfrak{z} ij.
sacchari candi,
carnis citoniorum conditorum,
mellis rosati an. \mathfrak{z} i.
sacchari albifs. \mathfrak{z} viij. \mathfrak{ss} . fiat ex arte Electarium solidum
tabulatum.

COMMENTARIUS.

Æquè vt vsualis, sic controuersa Diacarthami descriptio, quam vix eandem apud duos authores inuenias, cùm & trifariam à Iouberto descriptam habeas. Vnica tamen aliis melior, & certior, & tutior, quam scilicet ratione & vsu longo plures comprobarunt, cuiusmodi est, quam à N. Præposito mutuati sumus, licèt paulò aliter ab Arnaldo Villanouano primo illius authore descripta comperiatur.

Nomen autem assumit à Carthamo, quod basis locum tenet, licèt turpethum exuperet copia & viribus, imbecillior namque vis carthami purgatoria, quàm turpethi. Vtriusque qualitas intenditur zinziberis adiectione. Diagredium & hermodactyli simul in compositione non tantùm pituitam, sed & bilem ab articulis detrahunt. Castigatur illorum effera qualitas carne citoniorum condita. Manna, diatragacanthum & saccharum ponuntur ad leniendum, contemperandum, pituitam detergendam & mouendam: mel ad conseruandum. Carnem citoniorum crudam autumnis qui sumunt, eam sacchari portionem augent, quæ conditam ingreditur: verum hanc vsurpare, quæ tempore quouis habetur, docuit vsus.

Sic verò paratur Diacarthamum. A cortice primùm purgatur semen carthami, deinde teritur; postea puluerantur zinziber, terbeth ^{Præparatio.} & hermodactyli: tum diagredium & saccharum candum: deinde citoniatum. Tandem saccharo ad electarij solidi consistentiam cocto, & adhuc calenti, mel, manna & cydoniatum permiscebuntur, & postea pulueres, vt fiat electarium solidum, in tabellas, lozengias vulgò dictas, discissum.

In quibusdam vrbibus solus puluis huius Electarij seruatur & vsus tempore solidum in Electarium paratur, vel illius pulueris *Di. pro 3 i.* compacti Electarij dissoluitur.

Electarium diacarthami frequenti est in vsu, & ferè in omnibus ^{Facultates.} pharmacopoliis præparatum seruatur. Humores pituitosos valenter purgat, non solum à ventriculo & mesenterio, sed etiam è partibus remotioribus, si copia paulò maiore sumatur. Nonnihil quoque ex humoribus biliosis detrahit. Proinde non tantùm febribus quotidianis, & merè pituitosis prodest, sed etiam complicatis, & quæ ab humorum diuersorum mixtura exoriuntur.

R. *Succi depurati rosar. rub. lib. i.*
sacchari lib. i. ℞.

Percoque in Electarium solidum, cui adde
trium santalorum an. ℥ ℞.

mastiche ℥ ii. & ℥ ij.

corticis citri sicci ℥ i.

caphuræ ℥ i.

Dacrydij triti ℥ xi.

Ex arte fit Electarium, in tabellis concinnatum, qua-
rum singule pendeant ℥ i. ℞. aut ℥ ii. tantum.

COMMENTARIUS.

Non is sum qui ad ostentationem immutare vetera, aut noua promulgare desiderem, sed si quæ præter rationem acta recensentur, aut scripta leguntur. Is sum ego, qui meam de his liberè sententiam feram: cuique enim philosophari concessum est, & de rebus cognitis sententiam ferre.

Cùm autem Electarium de succo rosarum, à Nic. Myrepsò descriptum, à Nic. Salernitano discriptum, à recentioribus variè confutum & malè concinnatum compererim, quæ pondere maiore ponuntur, minuire, quæ minori augere, & quæ ineptè, immutare nõ verebor. Omnium autem pondus consultò immutauit: Succi enim rosarum quantitas cùm nulla ratione debeat esse par saccharo, rectè quidem est imminuta, auctum verò saccharum: libra namque sacchari citius & faciliùs coquetur in syrupum, vel Electarium, cum succi rosarum libra dimidia, quàm cum integra, nec tamen vires habebit multò inefficaciores, aut minus roborantes.

De santalorum quoque pondere aliquid detractum est, & exigua corticis citri sicci portio substituta, partim ad odoris & saporis maiorem suauitatem. partim ad putredinem arcendam, & membra vitalia recreanda. Caphuram nonnulli relinquunt propter grauem odorem: ego multum probo, quòd suo halitu & Electario gratiam conciliet, & qualitate permeante efficaciam maiorem.

Loco verò Spodij, quod non habetur, vel Antispodij vulgaris, seu eboris vsti, quod malè substituitur, mastichem substitui ad ventriculi robur, & Scammonij castigationem.

Malè verò Ebur vstum Spodium vocatur, & ineptè pro fictitio

Garcias
ab hor-
to. Arabum spodio succenturiatur: quicquid enim pharmacopœorum familia credat, vnicum tantum est Spodium, nempe pompholix, seu *Podium*
Arabum
fictitium
est. spodium Græcorum, quod neutiquam intra corpus sumitur: imperitè siquidem Arabum interpretes pro Tabaxir spodium, pro spodio ebur vstum dederunt. Nam Tabaxir est succus, liquorue concretus arborum quarundam, siue arundinum crassissimarum & prægran-

Clusius dium, quæ aliquando flantibus ventis ex mutuo collisu conflagent: Ex istoque incendio suum mendicauit spodium Auicenna, vel potius ex Tabaxir, infidus illius interpretes spodium fecit suum. Verum nec Tabaxir ad nos ex India defertur, nec cannarum vstarum cines ex Arabia: nec si adueherentur magni essent in medicina vsus. Nec præterea ebur prudenter substituitur crematum. Proinde vel relinquendum, vel medicamentum aliud substituendum, quod parando medicamento sit congruum.

In vulgari autem descriptione maior dacrydij quantitas ponitur, ut Ex x x vj. aut paulò plus pro singulis vnciis compositionis. In nostra verò emendatiore dragma tantum dimidia ad vncias quasque accedit, adhucque medicamentum satis validum ac potens remanet, ut solito more calcar purgantium queat nominari, quod scilicet parua mole vires habet efficacissimas.

Parandi modus idem est cum diacartharo, atque is ex descriptionis formula satis innotescit. Sunt qui succum rosarum tantummodò distillatum assument, in quo gummi tragacanthum macerant, mucaginemque extrahunt ad puluerum comprehensionem, & electarij solidi concinnationem. Ego mallem in balneo Mar. succum inspissare in Rob crassitudinem, quo pulueres non malè queunt concorporari. Si qui velint pro dacrydio scammonium non præparatum ponere, quantitatem succi rosarum solitam poterunt ratione quadam relinquere.

Electarium de succo rosarum merè cholagogen est, atque potenter flauam bilem educendo, his affectibus congruit, & utiliter datur, qui ab eadem materia proficiuntur. *Vires.*

℞. Corticis citri conditi,
 Conseruæ florum violarum,
 Conseruæ buglossi,
 pul. diatragacanthi frigidi,
 Dacrydij an. ℥ ℔.
 turbith ℥ v.
 zinziberis ℥ ℔.
 foliorum sennæ ℥ vi.
 Sem. fœniculi dulcis ℥ i.
 Sacchari albißimi in aqua rosarum soluti, & ex arte
 cocti ℥ x. fiat Electarium solidum.

Si cui minus arriserit hæc à nobis sic restituta des-
 criptio, antiquior à magistro Stephano Arnaldo
 primùm inuenta, & à Guidone Cauliaco cele-
 brata magis probetur, sic iuxta eorum mentem
 parabitur.

℞. Conseruæ violarum,
 florum borraginis, an. ℥ ij.
 radicis buglossi,
 corticis citri conditi an. ℥ i.
 zinziberis ℥ ℔.
 pul. diatragacanthi frigid. ℥ ij.
 diagredii ℥ iij.
 turbith ℥ iij.
 Sennæ ℥ v.
 panis sacchari ℥ x. fiat Electarium in tabulis, ponderis
 ℥ ℔. quæ est iusta dosis.

Antiqua
 descriptio.

COMMENTARIUS.

Electarium de Citro laxatiuum, Catholicum, seu vniuersale catharticum est: Bilem enim vtramque & pituitam satis potenter, ac sine molestia trahit, præsertim quod secundum priorem descriptionem à nobis emendatam paratur, in qua singula purgantia suum habent castigatorium: senna, fœniculum: Turpethum, zinziber: dacrydium, corticem citri conditum, conseruas, & aquam rosaceam, in qua coquitur saccharum. Quæ omnia cor & facultates roborant, & simul dicta purgantia mitigant. Puluis diatragacanthi ponitur ad leniendum, saccharum ad detergendum, leniendum & conseruandum.

Porro quantitatem corticis citri quadruplo pondere posuimus, tum quia compositionis basis est, tum quia partes corporis principatum tenentes recreat. Dacrydii quoque copiam augere fuit æquū ad reliquorum proportionem, alioquin vis purgatoria, quæ iam erat imbecilla, aut non satis potens, conseruarum incremento, & impotentior multo, & imbecillior remansisset. Rectè ergo medicamento basis, roborantia, purgantia & castigatoria, ea qua sunt à nobis descripta proportionem, permiscetur huic Electario, cuius, ut vsus facilis, sic tutissimus & probatissimus.

Vt ritè paretur, turbith primū ac zinziber minutim secta crassiusculè terantur, addantur senna & fœniculi semen, & omnia simul lauigentur. Tum in pila marmorea cortex citri & conseruæ violarū & buglossi simul accuratè pistentur; dein per setaceum traiciantur, postea dacrydium in pollinem reducatur, pauco diatragacantho miscetur. His peractis zuccarum cum rosacea ad Electarij solidi, aut paulo supra consistentiam coquatur: Cui tepido aut parum calenti permisceantur conseruæ simul cum carne citri vnitæ: Tandem reliqui pulueres: Atque ex ista miscellanea fiat pasta, & ex hac tabellæ cuiusuis ponderis.

Electarium de citro solutiuum ob multiplicem illius vim purgatoriam, multi est vsus. Febribus enim tertianis & hemitritæis valde cōfert, stomachum optimè purgat, prauam colluuiem in vtroque hychondrio stabulantem expellit, cibi fastidium tollit, & malum corporis habitum emendat, cor, & ventriculum roborat, & viscerum excrementitiam humiditatem absument.

De Trochiscis libro sequenti differere proposuimus, ut qui roborantes ferè sint vel alliotici, seu alterantes, paucis quibusdam exceptis, hisque purgantibus, de quibus hac in sectione & serie, breuiter nunc agere nostra methodi ratio suadet.

Vires

Trochisci de Rhabarbaro.

CAPUT IV.

<p>R. Rhabarbari boni ℥ x. succieupatorii, amygdalar. amararum an. ℥ ℔. rosarum ℥ iij. spica Indica, chisci</p>	<p>anisi, rubia tinctorum, absynthij, asari, sem. apij, an. ℥ i. formentur ex arte tro- chisci. ℥ i. pondere.</p>
--	---

COMMENTARIUS.

Rarò parati reperiuntur in Officinis eiusmodi pastilli, quibus dum opus est, solent medici rheum assumere, & aliis simplicibus proposito scopo idoneis permiscere. Prudentes tamen pharmacopœi, nec avaritiæ nimium dediti illis non carebunt, quorum scilicet optima est descriptio, & salutaris usus.

Parandi
modus.

Vt autem rectissimè parentur, rheum & asarum tenuissimè læuiganda sunt, vt faciliùs hepatis sinus, mesenterij anfractus, & vteri, renumque vias peruadere queant, reliqua quoque tenuiter pulueranda: deinde cum Eupatorii succi quantitate sufficienti fiat massa molliuscula, de qua formentur trochisci cuiusvis figuræ. Si succus Eupatorii definita quantitate pulueribus excipiendis non sufficiat, augendus, vt omnia simul faciliùs subigantur. Concinnati trochisci exsiccandi & seruandi ad futuros usus.

Pres.

Trochisci Rheii valent ad frigidos, biliososque iecoris affectus, ad eius obstructionem, dolorem, tumorem & deprauatam actionem. Hydropi quoque vel præsentis, vel imminenti profunt, & morbo regio, seu Ictero.

Trochisci de Agarico D. Galeni. CAPVT V.

Rx. Agarici albiff. ſcalpro tenuiter comminui ℥. ij.
aut quantum voles: macera in vini albi, in quo
fuerit Zinziber infuſum, quantitate ſufficienti, & fac
maſſam mollem; & ex ea trochiſcos: qui exſicati de-
nuò puluerentur: eodem vino ſubigantur in paſt m,
ex qua rursus trochiſci formantur, ſiccētur, ſeruentur.

COMMENTARIUS.

Vario modo apud Meſuem præparatur Agaricus, libro de ſimpli-
cibus, cum muſſa, cum oxymelyte ſcillitico, cum ſale gemmeo, cum
fero lactis, cum dauco, & aliis ſimplicibus.

Galenus minori, faciliori & commodiori apparatu in trochiſcos
effingit, in arte pharmacaria uſitatiffimos, quos hîc deſcribimus,
& tanquam præſtantiores magis probamus. Nonnulli ſalem gem-
meum permifcent, vt ſuo, inquit, pondere, agaricum ad fundum
ventriculi delabi cogat, vt ſua abſterſoria facultate purgationem iu-
uet, & vim illius tardam excitet: zinziber tamen ſufficit cum vino,
non modò ad vomitoriam qualitatem arcendam, ſed ad pigram vim
purgatricem excitandam, lentos & craſſos humores attenuandos &
incidendos, atque è partibus remotioribus attrahendos. Zinziber
autem & ſua partium tenuitate per obſtructa viſcera agaricum de-
fert, & ſuo calore vim purgatoriam iuuat, & aromaticitate ventri-
culum, cor, & partes nobiles recreat, quemadmodum & vinũ, quod
ſua adhuc ponderoſa ſubſtantia agarici cohibet leuitatem: cuius ra-
tione ad fundum ventriculi pigrè delabitur: atque ſupernatàs per
vomitum aliquando ſolus, interdum cum humoribus excluditur.

Ex recentioribus multi veterum apparatus minùs contenti agari-
cum albiffimum, vt decet, ſeligunt, ſcalpro argenteo, aut ligno du-
riore comminuunt, vaſe fictili vitrato excipiunt, vinũ album ac ge-
neroſum, in quo zinziber maduerit, affundunt, ſpatula eburnea aut
argentea ducunt, congregant, & in maſſam cogunt, ex qua paſtillos
formant, quos in eodem vaſe figulino, vel alio idoneo reponunt, in
ſole ſiccant ſuperpoſito linteo quodam rariffimo, hac arte trochiſ-
cos habent ſatis albos, pro ipſorum deſiderio.

Trochisci de Agarico pituitosum humorem non tantum è prima regione corporis purgant, sed etiam è partibus longiùs diffitis, si maiore copia sumantur.

Trochisci Alhandal. D. Mes. CAPVT VI.

℞. *Pulpæ colocynthidos à seminibus mundatæ ℥ x.*
incidantur & fricentur manibus cum olei rosati ℥ i.
gummi Arabici,
tragacanthi,
bdellij an. ʒ vi.

macerentur tres aut quatuor dies in aqua rosarum, vt
perfectè liquecant: deinde cum pulpa dicta, & parte
istius mucaginis fiant trochisci: qui in vmbra siccati, de-
nno terantur, & cum reliqua mucagine rursus fiant
Trochisci, iterum siccandi & seruandi.

COMMENTARIUS.

Trochisci Colocynthidos, seu Alhandal, vt loquuntur Arabes, vtiliter iniici possunt in omnes compositiones, quæ colocynthidem recipiunt: Eam enim simplicem, aut non castigatam sumere mole- stum est, præparatam, & trochiscorum forma, vel alia concinnatam, vt cõsuetum, sic tutum. Sic enim præparata medicamentorum alio- rum compositiones ingreditur, quorum virtutem acuit: vnde vali- diùs pituitam, aut alios humores crassos, lentos & viscidos edu- cunt.


Vt autem rectè prædicti trochisci fiant, eligenda primùm pulpa colocynthidos albissima & levis, quæ non modò forcibus inciden- da, sed etiam tenuissimè pulueranda; nam crassiùs trita & intro sum- pta dysenteriam sæpè mouet, abrais intestinis ab illius portiuncula ilci gyris & anfractibus stabulante. In veteri Mesues codice pulpæ colocynthidis ʒ x. tantum ponuntur. Verùm locus erroris suspectus est, & pro ʒ x. ℥ x. ponendæ, alioquin olei rosati quantitas minuenda, necnon bdellij, & aliorum gummi, quorum singulorum ʒ ij. tan- tum sufficiunt ad mucaginem, decem vnciis colocynthidos semel, atque iterum excipiendis destinatam.

Facultates.

Trochisci Alhandal potenter viscidam pituitam, & succos omnes glutinosos

glutinosos purgant : Proinde multum conferunt colico dolori à pituita vitrea & lenta nato, Apoplexiæ, Vertigini, Epilepsiæ, Asthmæ, morbis frigidis, & arthriticis, qui vix medicamentis communibus cedunt.

De aliis trochiscis alterantibus & roborantibus libro sequenti; superest vt alia purgantia solida, nempe catapotia describamus.



SECTIO QUARTA.

De Pilulis.



*S*uperioribus sectionibus Electaria tam liquida, quam solida omni & morbo & causæ morbificæ accommodata dedimus. Nunc vt idem præstemus in describendis catapotis seu pilulis, quas plerique medicamentis quibuscumque præponunt, methodi nostræ suadet ratio. Ab his autem auspicabor, quæ

inter purgantia solam aloem recipiunt, dein quæ aloem & agaricum: Tum quæ cum utroque Rheum, postea quæ sennam: tandem quæ turpethum, aut dactyldium, aut colocynthidem, aut violentius aliquod catharticum admittunt, describam. Ab aloë verò ducitur initium, quod sit non solû basis ferè omnium catapotiæ, sed quod viscera, partesque nobiles recreet, & vix alio modo sumi possit: quæ enim valde amara sunt, vt aloë, & ingrata, cum difficillimè forma liquida & potulenta hauriri queant, pilularum formam Inst. dari solent, vt facilius deuorentur, vt alibi demonstrauimus.

Pilulæ Stomachicæ, vulgo ante cibum. D. Mes. CAPUT I.

Rx. Aloes optimæ 3 vi.
masticæ,

rosarum, an 3 ij

Cum syrupo rosato, vel absynthii, fiat massa molliuscula.

COMMENTARIUS.

Omnes pilulæ quæ aloëm, vel rheum tantùm, aut utrũq; simul inter purgantia admittunt, & clementer purgant, quæque humores tantum è prima regione trahentes, stomacho profunt, Stomachicæ vocantur, vel pilulæ ante cibum, quòd quauis diei parte, paulò antè pastus, tutò sumi possint: cuiusmodi sũnt pilulæ de aloë rosata, quæ fiunt ex eadem in succo rosarum nutrita, & cum vino in massam coacta. Vt etiam pilulæ Scaligeri, Ruffi & de Hiera. Vsitatissimæ tamen cùm sint, quas dedimus, & quouis tempore paratu facillimæ, hæ tanquam regula omnium Stomachicarum debent in omnibus pharmacopoliis asseruari. Verùm parua quantitate tantùm parandæ sunt, vt recentes semper habeantur. Diutius enim asseruatæ nimium exsiccantur, earumque virtus hebescit. Debet vero Massa aluta quadam, oleo pauco delibuta, inuolui, deinde in vase stanneo optimè clauso reponi.

Vires.

Pilulæ omnes, vt & reliqua purgantia dari minimè debent nisi vètre exinanito; præsertim verò quæ ex partibus remotioribus humores noxios trahere debent. Quæ longè ante, & post pastum, vt post primum somnum commodius & vtilius sumuntur. Stomachicæ non item; sat enim est, si sumantur hora vna ante ientaculum, vel alium pastum, vt blandè subducatur aluus, & pituita quædam, aut alia praua colluies in ventriculo & vicinis partibus contenta expurgetur: quam quidem omnes stomachicæ blandè educunt, stomachum roborant, & appetitum refarciunt, vel sopitum excitant.

Pilulæ Ruffi, vulgò pestilenciales, seu communes.

CAPUT II.

℞. Aloes optimæ ℥ ij	myrrha ℥ i.
Croci ℥ ss.	
Cum oinomelite optimo fiat massa mollis.	

COMMENTARIUS.

Vix quoddam datur medicamentum à quodam præter authoris primi mentem non mutatum. Hæ pilulæ ex paucis componuntur, à

multis variè mutantur. Sunt qui myrrhæ tertiam partem adiiciunt: alij tantum quartam: quidam octauam: nonnulli crocum & myrrhā æquali pondere commiscent: alij mediam tantum partem croci ad myrrham adiiciūt, vt myrrhæ ad aloëm, vt nos in hac descriptione, medicorum celebriorum sententiam sequuti, fecimus.

Ca. 36. Horum autem Catapotiorum inuentionem Rondeletius Ruffo lib. 2. denegat, quòd potionem, inquit, quàm pilulas potius tradiderit, demorb. vt ex Paulo Ægin. liquet. Hic sanè medicamentum quoddam ex aloë, myrrha & ammoniaco thymiamate in vino odorato tritis, describit, potumque nominat; fabæ tamen magnitudine exhibet, quæ rerum potulentarum mensuræ repugnat, solidarum conuenit: ideoque Ruffum posterior ætas illarum esse primum authorem non sine ratione credit. Pro vino aromatico oinome generosum substitui-
mus, pulueribus excipiendis maximè idoneum. Si enim solo vino recipiantur, massa hinc subacta, breui duritiem penè lapideam nanciscetur. Syrupus quoque de absinthio illis admittendis multum aptus erit.

Pilulæ Ruffi pestilenciales dicuntur, quod pesti conueniant, sed potius arcendæ & præcauendæ quàm curandæ. Ratione enim aloës corpus ab excrementis liberatur, à myrrha putredine vindicatur, à croco cor & facultates vitales recreantur. Pesti tamen factæ parum profunt, vt quæ medicamenta magis Cardiaca, valentiora & Alexipharmaca ad sui curationem postulet.

Qualitates.

Pilula mastichina. CAP. III.

R. Mastiches ℥ ss.

aloes ℥ x.

agarici ℥ iij.

Confice cum hydromelite vinoso, & fiat massa mollis.

COMMENTARIUS.

Pilulas omnes quæ mastichem excipiunt, Mesue Stomachicas appellat, quarum non ipse solùm varias descriptiones exhibet, sed etiam qui postea illum ea de re scripserunt, & Antidotaria promulgarunt, modo aloës, modò Agarici, modò mastiches pondus augentes, vel minuentes, aut alia adiicientes.

*Pilulæ de
aloë lota.*

Vsitation & tutior est descriptio quam hic damus, cui si Diamoschi parum addatur, erunt Pilulæ de Aloë lota iuxta vulgarem editionem. Parandi modus facilis est. Debet verò agaricus trochiscatus sumi, postea teri, ut & reliqua, nempe aloë & mastiche, atque cum hydromelite aptius, quàm cum vino subigi, tum ad efficaciam, tum ad conseruationem.

Petrus de Ebano perhibetur earum author, quibus ab exuperante medicamento, nempe aloë nomen non dedit, ne simul eiusdem nominis catapotia multa ac diuersa describerentur.

Pilulæ mastichinæ stomachum blandè purgant, optimè roborant, totius abdominis excrementitios humores sine molestia detrahunt & expellunt, doloribus capitis prosunt, & vteri affectibus multis.

Pilulæ de tribus solutiuis.

CAPVT IV.

R. Rhabarbari

aloes,

agarici an. ʒ iij.

Trita excipiantur syrupo rosarum pallidarum, & cogantur in massam.

COMMENTARIUS.

Vocantur hæc Catapotia de tribus solutiuis, quòd tria tantum simplicia purgantia admittant: Syrupus rosarum pallidarum, quo illa excipiuntur, purgatorius quidem est, sed simplex medicamentum non dicitur. Stomachicæ quoque sunt hæc pilulæ, licet paulo validiores superioribus, propter Agaricum: qui si trochiscatus ponatur, ut certè debet, vim incidendi & attenuandi maiorem habebunt, & minùs vomitoriam. Parandi modus facilius est, quàm ut nos moretur.

Vires.

Humores biliosos & pituitosos, crassos & lentos à ventriculo, cauis hepatis & lienis, & à mesenterio perbellè purgant, stomachum roborant, & appetitum reuocant. Sic paucis, quæ de his dicenda, complector.

Pilulæ Imperiales D. Fernelij. CAPVT V.

℞. Aloes optima ℥ ij.
 Rhabarbar. electi ℥ i. ℞.
 agarici trochiscati,
 foliorum sennæ mundator. an. ℥ i.
 cinnamomi ℥ iij.
 Zinziberis ℥ ij.
 nucis moschatæ,
 caryophyllorum,
 spicæ nardi,
 mastiches an. ℥ i.
 Cum syrupo violato subacta cogantur in massam.

COMMENTARIUS.

Egregiam his catapetiis non iniuste denominationem dedit author, ut quæ agendi benignitate & multiplici dote, præ cæteris egregium titulum mereantur. Possunt quoque dici pilulæ Catholicæ, ut quæ & vniuersos humores, & ab vniuersis partibus expurgent, ab hepate, liene, ventriculo, cerebro, & cum dosi paulò vberiore, à partibus quoque longius dissitis.

Quædam eiusdem nominis describuntur à Nic. Præposito, quæ quòd pluribus constent, & efficaciæ sint minoris, rarò parantur.

Virces.

Pilulæ Imperiales Fernel. omnia viscera infarctu liberant, purgant, roborant, & humores quosuis noxios & obuios educunt, omniumque partium nutritiarum œconomiam iuuant.

Pilulæ de Eupatorio maiores. D. Mes. CAPVT IV.

℞. *Myrobalanorum citrinarum,*
Succor. Eupatorii,
absynthij an. ʒ iij.
rhabarbari ʒ iij. ℞.
mastiches ʒ i.
croci ʒ ℞.
aloes ʒ v.
Succi, vel potius syrupi endiuia quantum sufficit: ex
arte fiat massa.

COMMENTARIVS.

Catapotiorum ex Eupatorio duas Mesuë formulas describit, priora maiora nominat, quæ hic inseruimus, alia minora, quæ raro, imò rarissimè ambo parari solent. Illa tamen cum valdè commendentur ad icterum, omnem iccoris obstructionem, ægrorum foeliciùs res ibunt, si in pharmacopoliis habeantur. Deberent autem à Rhabarbaro potius denominari, quod in compositione cæteris præpolleat. Verùm solent authores medicamentis à se compositis nonnunquam imponere nomina ad placitum magis, quàm rationem validissimam.

Porro ad harum pilularum præparationem succi Eupatorii veri, vel eius loco agrimonij, & absynthij per euaporationem inspissandi, exsiccandi, & postea puluerandi, deinde aliis simplicibus seorsim tritis commiscendi, tum omnia syrupo de Endiuia, vel cichorio comprehendenda in massam idoneam. Rectè quoque dictorum simplicium succi æstiuo tempore extracti, fictili vase excepti, & vigenti soli expositi incrassantur & exsiccantur, atque facilè in puluerem reducuntur. Perperam faciunt, qui Mesuei consilium sequuti pulueres excipiunt aqua endiuia, & cogunt in massam.

Vires.

Pilulæ de Eupatorio maiores non solum ictero conducunt curando, sed etiam febribus periodicis ac circuitu repentibus.

Pilula sine quibus esse nolo. D. N. Præp.

CAPVT VII.

*℞. Aloes optimæ ʒ xiiij.
 quinque generum myrobalanorum,
 Rhabarbari,
 Sennæ,
 agarici trochiscati,
 mastiches,
 Absynthij,
 cuscute,
 rosarum,
 violarum an. ʒ i.
 dacrydij ʒ vi. ℞.
 mellis succo fœniculi expumati quant. suffic. fiat massa,
 vt artis est.*

COMMENTARIVS.

Vniuersales sunt hæ pilulæ, vt Imperiales, sed magis cholagogæ, & valentiores propter dacrydium. Earum nomenclatio quadam circumloquutione designata efficaciam & vsus necessitatem notat, vt quibus vel paterfamilias, vel alius, qui optimè suæ sanitati prospectum voluerit, minimè carere debeat, quandoquidem ad earum compositionem accedunt, quæ à cunctis partibus præcipuis humores deducunt & easdem roborant. Rheubarbarum basis erit si à parte earum præstantiore sumi debeat, vt Scammonium, si à valentiore & magis exuperante, vel myrobalani, si à fructuum pondere.

Vt rectè parentur, Scammonium, Aloë, Agaricus, & Mastiche seorsim pulueranda. Reliqua partim seorsim, partim simul. Non sunt verò subigenda cum aqua, aut succo fœniculi, vt placuit authori, sed cum melle eodem succo depurato, ad syrupi consistentiam, aut paulò infrà cocto, ne citius siccescant, aut marcescant.

Præparatio

Quod illis accideret quæ iuxta N. Salernitani methodum parabuntur. Nec multum probatur eorum opinio qui ipsius opinionem sequuti dacrydium in succi fœniculi portione nutriunt, & ad ignem liquant. Dein pulveres adiiciunt cum residuo succi melliti. Sic enim authoris mentem sequi putant, qui nec mellis meminit, nec talem apparatus concepit.

Vires.

Pilulæ sine quibus pituitam & bilem vtramque vndique trahunt, sed præcipuè ex capite, oculis ac sensorijs omnibus. Proinde oculorum suffusiones minuunt, visum conseruant, aurium dolores, tinnitusque solvunt, atque his affectibus profunt qui à cerebro profiscuntur.

Pilulæ lucis maiores. D. M. CAPUT VIII.

R̄. Rosarum,
 violarum,
 absynthij,
 colocynthidis,
 turbiti,
 cubebæ,
 calami aromatici,
 nucis moschatæ,
 spicæ,
 epithymi,
 carpobalsami,
 xylobalsami,
 Sem. seseleos,
 sem. rutæ,
 Schoenanti,
 asari,
 mastiches,
 caryophyllorum,
 cinnamomi,
 anisi,
 fœniculi,
 apij,

cassia lignea,
croci,
macis, an. ʒ ij.
myrobalanorum citrinorum,
chebulorum,
Indorum,
bellericorum,
emblicorum,
rhabarbari optimi an. ʒ ss.
agarici,
sennæ an. ʒ v.
Euphrasie, ʒ vi.
aloes pondus omnium,
Cum syrupo ex succo fœniculi & saccharo aut melle,
aut utroque simul parato fiat massa consistentiæ legi-
gimæ.

COMMENTARIUS.

Axioma vulgare & medicum est, neminem posse oculis benefacere, quin prius capiti prospiciat, nec huic prospicere, quin antè toti beneficiat. Hæc autem catapotia vniuersali beneficio totum corpus, speciali caput, specialiore oculos leuant: vnde Opticæ, seu visoriæ, vulgo pilulæ lucis maiores vocantur, ad aliarum discrimen, quæ minori simplicium farragine constant, minori que leuamine sumuntur. Ambarum author est Mesue, vt & aliarum compositionum multarum, quarum exoleuit vsus.

Sic autem optimè parabuntur. Ante omnia xylobalsamum, aut succedaneum eius xyloaloe, aut santalum citrinum, vel lignum lentisci vel terebinthi, tundetur; dein turpethum & asarum, postea spica minutim incisa; Tum cassia vtraque lignea & aromatica, seu cinnamomum: his omnibus crassiuscule tritis addentur caryophylli, schœnanthum, fructus & semina; Seorsim tamen myrobalani cum olei amygdalini guttis aliquot, comminuendi, vt & crocus, colocynthis, agaricus trochiscatus, aloë, senna & rheum. Commistis simul tot simplicium pulueribus, superaddetur mellis.

Præparatio.

succo fœniculi despumati, aut syrupi ex eodem succo & saccharo parati q. suff. ad massæ corpus consistentiæ legitimæ.

Vires.

Pilularum lucis denominatio earum ipsarum virtutem denuntiat: pituitam enim à cerebro & oculis vacuant, propterea oculorum affectus inde natos curant, visorium quoque spirit. puriorem reddunt, augent, recreant, sicque visum tuentur ac roborant.

Pilula aurea. D. N. Myrep. CAPUT IX.

℞. Aloës optimæ,
Diadacrydij an. ʒ v.
rosarum rubr.

Sem. apij an. ʒ ij. β.

Sem. anisi

fœniculi an. ʒ i. β.

pulpæ colocynthid.

croci,

mastiches an. ʒ i.

Cum gummi tragacanthæ in aqua rosarum solutæ,
vel potius cum melle rosato concinnetur pasta, consi-
stentiæ legitimæ.

COMMENTARIUS.

Non abs re insultat Nic. Præpositus in Nic. Myrepsum harum pilularum authorem, quod diagredium quantitate maiore posuerit, nec locum mendo carere suspicatur, dum ait, & credo, quod debuit dicere, diagredij ʒ v. non ʒ v. quod sanè colligi potest ex eiusdem Myrepsi verbis, qui in fine cap. 107. dosim harum pilularum definiens sic habet: Informentur ad modum ciceris cum aqua infusionis tragacanthæ, & dentur de eis vesperi nouem, aut vndecim cum mulla, aut vino. Hæc enim quantitas saltem ʒ i. β. est aut ʒ ij. quæ ferè dacrydij ʒ β. admittit. Vt ut sit, nunc is inualuit vsus, ut iuxta modum descriptum parentur: ea tamen lege, ut iusto ac idoneo pōdere exhibeantur, pro medici prudentia, & ægrotantis viribus: Cui purgando si diadacrydij gr. iiij. aut v. sufficiant, ea tantum mole catapotia dentur, quæ istam solum dacrydij dosim receperit.

Optimè verò mastichem adiecit Nic. Præpositus ad ventriculi ro-
bur, ne tam violentorum purgantium attactu lædatur. Rectè quoque
tragacanthum permiscebitur ad Scammonij feritatem mitigandam.
Tutiùs verò trochisci Alhandad ponentur, quàm colocynthis ipsa
non castigata: omnia tenuissimè puluerata cum melle rosato cogen-
tur in pastam consistentiæ legitimæ: sic enim diutiùs molliuscula re-
manebit, quàm gummi tragacanthæ dissoluto subacta & compre-
hensa.

Dicuntur autem pilulæ aureæ magis ab aureo colore, ratione cro-
ci, quàm ab effectu aureo, hoc est, præstanti, ac insigni: Non enim
omnia medicamenta, quæ aluum potentissimè ducunt, & affatim
humores purgant, aurea seu præstantissima sunt, sed quæ sine mo-
lestia tantum noxios, & cum facilitate extrahunt.

Pilulæ aureæ plurimum cholagogæ sunt: Bilem enim valenter at-
trahunt, pariterque pituitam, non modò ex ventre inferiore, sed
etiam superiore, videlicet capite: propterea sensus, oculosque ex-
purgant, hisque aciem restitunt.

Pilula de Agarico. D. Anic. CAP. X.

R. Agarici, ʒ. iij.

radic. yreos,

Irassij an. ʒ i.

turbith ʒ v.

hieræ picræ ʒ iij.

colocynthidos,

sarcocollæ an. ʒ ij.

myrrhæ ʒ i.

misce cum sapa, & fiat massa vt artis est.

COMMENTARIUS.

His catapotiis Nic. Præpositus mastichem addidit; damnant re-
uerendi patres censores Mesuei: probat Fernelius, quòd similiter
ex Præposito transcripserit: improbat Ioubertus, suæ tamen opinio-
nis rationem subticēs: Ego nec nociturā, nec valde profuturam pu-

to: si enim defuerit, non deerunt ventriculo, quæ ipsum robore rarequeunt, nempe hiera, myrrha, sapa, Iris; si adfuerit, neque aliorum vim obtundet, neque multo meliorem reddet.

Harum author primus est Auicenna, qui eas descripsit cum myrrha, quam Mesuë non addidit, ut putat Bauderonius, ut ex illius libro tertio liquet, ubi agaricum & colocynthida sine vlla præparatione expressa describit. Melius est tamen utrumque trochiscatum sumere, terere, & permiscere. Præterea pulvis Hieræ picræ Galeni tantum melle non solutus sumendus est: prassium album seligendum, & radix yreos nostratis flore cæruleo, quam Auicenna Liliū celeste vocat. Purgantia seorsim pulueranda; reliqua partim sic, partim simul; tum omnia miscenda cum sapa. Ca. 40.
tr. 1.
Fen. 10.

Vires.

Pilulæ de Agarico cum pituitam vndique potenter educant, cōferunt plurimum capiti & thoraci: proinde comati, catharro, vertigini, & similibus affectibus ab humore frigido ortis, maximèque asthma, ad cuius sanationem ab Auicenna fuerunt inuentæ & descriptæ. cap. 40. lib. 3.

Pilulæ Coccia. D. Rhasis. CAPUT XI.

R. pul. hieræ simplicis ʒ x.
colocynthidos ʒ iii. & ʒ i.
dacrydij ʒ ij. ʒ.
turpethi.
Stæchados an. ʒ v.
Cum syrupo de stæchade fiat massa.

COMMENTARIUS.

Pilulæ coccia non simpliciter à grano, quod κόκκος dicitur Græcis nuncupantur, sed quòd rotundæ sint & parvæ, veluti granum quoddam ciceris aut erui, cuiusmodi fieri solebant olim omnes pilulæ. Et licet nunc ferè maiores concinnentur, ut propriam tamen ab authore datam descriptionem, sic appellationem retinemus, qui ca. 1. lib. 9. ad Almanfor. iuxta formulam præscriptam tradidit. Nonnulli supra modum purgantes indicarunt ratione diagredij maiore pondere commixti: Optimum tamen cum sit in pharmacopoliis haberi blanda medicamenta pro delicatulis, validiora pro robustis & agresti-

bus viris, iuxta Rhasis placitum parandas cenſeo; Adde quod tam exigua quantitate dari poſſunt, quibus conueniunt, vt citra hypercatharſim aluum ſubducere, & humores noxios educere valeant.

De admiscendis autem in compoſitione nonnulli dubitant, an hyera picra Galeni ſumenda ſit, an alia paranda, vt voluit Cordus: Nos ob multas rationes, quas breuitatis cauſa relinquo, nullam validiorem, conuenientiorem, aut meliorem hiera dicta puto. Trochiſcos verò Alhandal melius erit permiscere, quàm colocynthida non præparatam. Quod ſi ſyrupus de Stœchade defuerit, vt re vera paucis in Officinis habetur, nec haberi multum eſt neceſſe, pulueres ſubigi rectè poterunt melle cum decocto ſtœchados deſpumato, & ad conſumptionem aquæ humiditatis cocto. Parandi modus idem atque præcedentium.

Pilulæ coccia humores partim bilioſos, partim pituitoſos expurgant, non ſolùm à capite propter ſtœchadem, quæ minus cephalica quàm hepatica eſt, ſed etiam ab aliis partibus, in quibus dicti ſucci continentur: Eos enim à quacunque parte potenter deducunt.

Pilula de Hermodactylis maiores D. Meſ. CAPVT XII.

R. *Hermodactylorum,*
aloes,
myrobalanorum citrini,
turbith,
colocynthidos,
bdellij,
ſagapeni an. 3 vi.
caſtorei,
ſarcocollæ
Euphorbij,
Opoponacis,
Sem. rutæ agreſtis, vel hortenſis,
Seminis apij an. 3 iij.
croci 3 i. ℞.
Cum ſucco caulium fiat maſſa.

Multum sunt vsuales iſtæ pilulæ quæ ab hermodactylis nomen habent, ſolæque ſufficiunt inueteratis articulorum doloribus, ad idque ſunt efficacioreſ hiſ quæ arthetica vocantur, & ſecuriuſ quàm quæ de Sagapeno, aut Opoponace, aut Sarcocolla nuncupantur, vt ideo harum deſcriptionibus non ſit opus.

Ad præparationem in caulium ſucco Sagapenum & Opoponax liquanda, idoneo linteo tranſmittenda, deinde parum coquenda. Tum pulueres reliquorum ſimplicium ſucco cum melle cocto permiscendi: atque omnia ſimul in mortario terenda, ſubigenda, & manibus oleo delibutis contrectanda, vt conſiſtentiam nanciſcantur idoneam. Poſſent & eclegmati de caulibus rectè ſubigi.

Vires.

Pilulæ de Hermodactylis craſſoſ humoreſ, ſimulque ſeroſoſ potenter ab extremis partibus, præſertim ab articulis euellunt, conducuntque morbis frigidis capitiſ, neruorum & iuncturarum.

Pilula Aggregatina, ſeu polycræſta. D. Meſ. CAPVT XII.

℞. Aloës,
turbith, an. ʒ. vi.
diadacrydij ʒ v.
Rhabarbari
myrobalanor. flauarum, an. ʒ iij.
agarici albiſſimi,
trochiſcor. alhandal,
polypodij,
myrobalanor. Cepularum,
myrobal. Indarum an. ʒ ii.
maſticheſ,
roſarum,
epithymi,
ſem. anifi,
Zinziberiſ,
ſaliſ gemmei,
ſuccorum eupatoriij,
abſynthii an. ʒ ii.
Cũ Syrupo roſarũ pallidarũ fiat maſſa, ad uſuſ ſeruanda.

COMMENTARIUS.

Veterem Mesuei descriptionem retinemus, ordinemque simplicium tantum mutauimus, & pro Electario rosato syrupum rosarum substitutus ad puluerum comprehensionem.

Sunt autem tres apud Mesuem pilularum huiusce nominis descriptiones, quarum prior solum est vsualis, & in pharmacopoliis ferè cunctis parata reperitur, relictis aliis duabus, Aggregatiuis maioribus & minoribus nuncupatis. Dicuntur verò Aggregatiuæ, propter aggregationem dotium multarum, vt etiã Polychrestæ, & à multis Catholicæ, quòd sint vsus multi, & vniuersos expurgent humores.

Compositionis ratio manifesta est, vt & mixtionis modus. Radices primùm terendæ, dein fructus, ac semina: Scorsim verò rheum & Agaricus, qui trochiscatus simplici praferendus. His addendi succi eupatorii & absynthij prius exsiccati, & postea triti. Tum omnia, vt decet puluerata, syrupo rosarum pallidarum excipienda, vt fiat massa, quæ inuoluenda corio oleo amygdalino delibuto. Non verò sine ratione pulueres syrupo rosarum pallidarum excipiendos arbitror, partim vt magis accedant ad mentem authoris, nam rosis nihil similius, quàm ipsæ rosæ, partim quòd Electarium rosatum Mesuei, quo ipse vult pulueres comprehendi, paratum non reperitur, nec parandum censeo, cum eius vt inepta est compositio, sic ferè nullus vsus.

Catapotia Aggregatiua ad multos affectus non modo capitis utiles sunt, sed etiam ventriculi & hepatis. Ex his enim partibus & sensoriiis pituitam, bilem, & melancholicum succum detrahunt, purgantque: Propterea febribus complexis, inueteratis, & morbis complicatis conducunt. Facultates.

Pilulis de octo rebus, & de quinque myrobalanorum generibus carere poterit, qui Aggregatiuas habebit.

Pilula de Fumaria. D. Auic. CAPVT XIII.

℞ *Myrobalanor. citrearum,*
Cepularum,

Indarum,

Dacrydii an. ʒ v.

aloes Socotorinae ʒ vii.

Cum succo fumarie fiat massa, quæ exsiccata teratur,
& rursus eodem succo subigatur. Tercio cum syrupo de
fumaria fiat massa, vsui reponenda.

COMMENTARIUS.

Hæc catapotia denominationem à fumaria sumunt, cuius succo *cap. 7.* pulueres ter, aut saltem bis imbuuntur, & toties siccantur, vt iussit *tr. 3.* illorum author Auicenna. Tandem excipiuntur, non eodem succo, *scæn. 7.* vt multi ignoranter faciunt, sed melle, cui succus hic longiore *co. lib. 4.* ctione dissipatus fuerit, vel potius syrupo de fumaria, vt præstantiore & authoris menti conuenientiore. Nisi enim alterutro subigantur, aut simili liquore pulueres, massa hinc subacta & asseruata rancescet, & in soliditatem ferè lapideam indurescet. Parandi modus facilis est, atque ex describendi formula satis notus.

Vires.

Pilulae de fumaria biliosos humores, acres, pituitam salsam & alios succos adustos & melancholicos, à quibus vitia cutis plurima suboriuntur, vt scabies, pruritus, lichen, impetigo, purgant.

Pilula

Pilula de lapide lazuli. D. Mes. CAPVT XIV.

℞. Lapid. lazuli præparati ℥ vi.
 polypodij,
 epithymi,
 agarici an. ℥ viii.
 hellebori nigri,
 scammoni,
 salis gemmei an. ℥ ij. ℞.
 caryophyllorum,
 sem. anisi an. ℥ iiii.
 hieræ picræ ℥ xv.
 Cum syrupo regis Saboris fiat massa.

COMMENTARIUS.

cap. II. Vt cuique humori noxio suum tribuatur peculiare catharticum,
 sect. I. has pilulas ex Mesuë descriptas ad melancholicum humorem ducen-
 huius dum exhibemus. Nomen autem à lapide lazuli, qui pro basi ponitur,
 lib. assumunt, sed quia inimicæ ac vomitoria cuiusdam qualitatis est par-
 ticeps, præparatione quadam eget, vt ante monuimus. Non verò
 vritur, vt in confectiōe Alkermes, ne pereat illius purgatoria qua-
 litas, sed tenuissimè tantum pulueratur, & decies, aut duodecies, Lapidis la-
 zuli præpa-
 ratio,
 vel etiam pluries lauatur, in aqua primum communi, dein alia me-
 dicata, vt buglossi, aut simili: Semel lotus exsiccatur, dein alluitur,
 vt antè, & rursus siccat, idque adhuc iteratur, vt dictum est. Sic
 enim qualitas vomitoria deperditur, remanente deiectionaria, ac ro-
 borante, qua opus est.

Parandi modus idem cum superioribus. Salem gemmeum pro In-
 do, quo caremus, substituimus, & syrupum regis Saboris pro aqua
 intybi. Sic namque pulueres commodius & excipientur, & subigē-
 tur: atque massa hinc concinnata tutius seruabitur, consistentiam-
 que meliorem habebit, & vires præstantiores, ac humori melancho-
 lico, cui ducendo destinantur, aptiores.

Catapotia de lapide lazuli Elephantiasi, Cancro, quartanæ feбри,
 & omnibus morbis ex melancholico humore, & bile vīta conferunt,

Vires.

easdemque vires habent, sed præstantiores, atque pilulæ Indæ, quibus carere poterit, qui illas habebit.

Pilula Asaiaret. D. Auic. CAPUT XV.

℞. Mastiches,
myrobalanor. citrearum an. ℥ ℞.
hieræ picræ ℥ ii.
aloes optimæ ℥ ii.
Cum Syrupo ex stœchade fiat massa.

COMMENTARIUS.

Desumptæ sunt & hæ pilulæ ex Auicenna, qui aliquando *Asabaia-reth*, aliquando *seiar* vocat, easque describit partim ad caput, partim ad ventriculum: Parum tamen ex partibus longè diffitis detrahunt, cum nihil excipiant ex his, quæ potenter humores frigidos deducunt. cap. 29.
tr. 1.
fen. 1.
lib. 3.

Ad earum confectionem pulvis hieræ picræ Galeni sumendus, nō Hiera forma Electari composita. Myrobalani à nucleis purgandæ, & seorsim terendæ. Tum mastiche Chia, ut præstantior, dein aloë. Omnia autem syrupo de stœchade excipienda, & in massam vnien-da.

Vires.

Pilulæ Seiar, seu Asaiareth cholagogæ quidem sunt, plurimumque ventriculo profunt impuro & languido, & consequuntione quadam capiti quoque benefaciunt, atque eius sanandis affectibus, qui per sympathiam à stomacho & imo ventre profiscuntur, congruunt.

Pilulæ de Hiera.

Pilulæ Benedictæ.

Pilulæ de Hiera cum similes ferè habeant facultates, & facile ex Hieræ pulvere, qui omnibus in pharmaco oliis asseruatur, queant parari, addito mellis rosati, aut alius sufficienti pondere, particularem descriptionem non exigunt: Ut neque quæ à Benedicta nomen & materiam habent, Benedictæ propterea pilulæ dictæ, quarum nullus rarus est usus: Sunt enim nomine tenus tantum insignes; cuiusmodi sunt apud Chymicos multe Confectiones, ut Aqua benedicta Rulandi, Spiritus aureus, & Elixir vitæ.

Pilula de Aromatibus, seu Alephanginae. CAPVT XVI.

℞. Cinnamomi,
 caryophyllorum,
 cardamomi,
 nucis moschatæ,
 macis,
 calami aromatici,
 galangæ,
 santali citrini,
 Schœnanti,
 rosarum, an. ʒ ℞.

Hæc crassiusculè trita macerentur per duodecim horas in aquæ lib. iij. Deinde igne lento bulliant ad tertiæ partis absorptionem. In colatura nutriatur aloës lib. i. Tum absorpta aquea humiditate, super cineres calidos, aut in sole vel hypocausto, adde

myrrhæ,
 mastiches, an. ʒ ℞.
 croci ʒ ii.

Syrupi de absynthio quod sufficit, fiat massa.

COMMENTARIUS.

Magnam materialium partem pilularum Alephanginarum Mesuëi in his à nobis descriptis retinuimus, sed galangam adiunximus, ut conuenientissimam: Rarissima, & carissima detraximus, ut carpo-balsamum, xyloaloen, cubebas, & inutilia, ut asarum Aloës in aqua pluuia lotionem, quòd vim illius reddat imbecilliore, damnamus; & aromatum, & aquæ, in qua ipsa decoquenda sunt, quantitatem à Mesuë definitam non probamus. Nam cum aromata sine virium iactura coctionem longam sustinere non valeant, quid opus est ea cum aquæ lib. xii. incoquere ad duarum partium, hoc est ad lib. viij. consumptionem? Hic enim labor non modò non utilis, sed

detrimentofus & noxius. Quod si parum coquenda, quorsum aquæ tantum pondus? Si præterea triplum aquæ tantum sufficit, aromatum quoque triplum, vel etiam minùs sat esse potest.

Hac autem nostra descriptione, & parandi modo vires aromatum habemus præstantiores, ex tertia tantum eorum parte, quàm ex tota à Mesue definita, & conficiendi ritu ab eodem instituto, qui vnà cum aquæ resolutione vires aromatum resoluit. Absynthium omisimus, cuius loco syrupum ex eo paratum subiunximus, ad coalitum massæ subacta, ne siccitate nimis solidescat, vel interhiet, aut macorem contrahat, sed intus probè conclusa fermentetur.

Sic Mesuei pilulas Alephanginas castigauimus, vel potius nostras exhibemus minore sumptu, & paratu faciliores, præstantioresque; Quibus si parum Opobalsami, seu liquoris Balsami quis voluerit permiscere, nunquam pilulas roborando stomacho inueniet pares.

Ad aloës subactionem, nutritionemve qui tincturis aromatum utetur, non improbabitur: Sic enim medicamentum vires habebit efficaciores, & fragrantiores, à quibus maximè commendatur.

Facultates. Catapotia de Aromatibus omnium maximè eustomachica sunt, & partium neruofarum roboratiua. Nam simul & humores crassos, putres, pituitosos, biliososque è ventriculo & partibus vicinis purgant, & easdem recreant, calorem natium tuentur, coctionem iuuant, flatum discutiunt, cruditates tollunt, appetitum resarciunt, acido ructui & colico dolori conferunt. Senibus autem & frigidis omni tempore conueniunt, iuuenibus & biliosis raro, atque tantum hyeme.

Pilula de Nitro. D. Alex. Tral. CAPVT XVII.

*R. Aloes,
colocynthidos
Dacrydij,
hellebori nigri,
bdellij,
gummi Arabici an. ʒ ii.
euphorbii,
nitri an. ʒ i.*

*Cum succo brassicæ, vel potius cum Rhodomeli, hoc est,
melle rosato, ex arte fiat massa.*

COMMENTARIUS.

Recentiores veterem Alexandri Tralliani descriptionem retinuerunt, sed non nomen. Hic enim pilulas de Colocynthide, illi de Nitro vocarunt: Verum hic plus nitri, minus colocynthidis, illi plus colocynthidis, minus nitri posuerunt. Quia tamen simplicium pondus iuxta nouam descriptionem ratione & vsu magis inualuit, veteris authoris in materialibus, recentiorum, in materialium proportionem mentem sequimur.

Ad illarum autem confectionem colocynthidis præparata, hoc est, trochisci Alhandal sumendi. Bdellium succo brassicæ calefacto dissoluendum, colandum, & ad succi consumptionem coquendum: Dein cætera misceantur, addita mellis rosati sufficienti quantitate. Euphorbium autem multorum iudicio non debet apponi, nisi prius hoc apparatus modo.

Euphorbij
præparatio.

Euphorbij quantitas quælibet primum sumitur, tenuiter pulueratur, cum paucis oleo amygdalino super lapide fricatur, collyriorum multorum ritu: Postea colligitur & includitur poma cotoneo, excavata & pasta obuoluto. Tum in furno coquitur, Scammonij modo. Sic decoctum, & apparatus seruari solet in Pharmacopoliis multis.

Catapotia de Nitro frigidos humores, crassos, lentos & viscidos ex partibus etiam longè diffitis deturbant: unde neruorum affectibus succurrunt, & capitis contumacibus morbis, epilepsiæ, paralyfi, vertigini, & articulorum affectibus. Vtramque bilem quod educant, lûi Indicæ conferre creduntur, unde quidam pilulas Indicas, sed nimis licentiosè nominant.

Vires.

Pilula Mechoacana. CAPVT XVIII.

R̃. Mechoacana ℥ ℔.

R̃. Serbeth ℥ iii.

foliorum thymeleæ acetomaceratorum & siccatorum,
seminis ebuli,

agarici trochiscati an. ℥. ii.

radic. esulæ præparatæ,

mastiches an. ℥ i. ℔.

macis,

cinnamomi,

salis gemmei an. ℥ ij.

Fiat omnium puluis, qui cum vino albo subigatur in massam, ea siccata teratur, & cum succo yreos cælestis denuò coagmentetur. Arida rursus teratur, & cum syrupo rosarum fiat pasta, vsui reponenda.

C O M M E N T A R I V S.

Ex singulis Antidot. vulgus Dispensaria vocat, tanquam ex horto fecundissimo remediorum omne genus, ad morbos quosuis delendos practici medici quæritant: maxima tamen illorum pars medicamenta sunt nulla arte, & ratione descripta, quæ paucis morbis conueniunt; Et sæpè decem medicamenta hisdem viribus prædita, & diuersis nominibus designata traduntur. Nos verò pro morborum & humorum diuersitate diuersa medicamenta damus, non modò ex Dispensarijs vulgaribus, sed ex probatissimorum virorum lectione desumpta: Præter quæ & alia exhibemus nonnulla, quæ & optima compositionis ratio, experientia, & fœlix euentus salutaria esse confirmarunt. Cuiusmodi sunt pilulæ descriptæ ad hydropem, quæ à Mechoacana illarum basi cognominantur: Hæc enim singulis aliis simplicibus præpollet, & efficaciter aquas per secessum educit. Huic addita sunt alia quinque hydragoga, quæ simul vnita cum aliquot cardiacis & stomachicis, sine ventriculi læsione potenter serofos, & aqueos humores non modò ex aluo, sed toto corpore ducunt.

Semen Keruæ, seu ricini, nec Soldanellæ non libuit permiscere cū illa sufficiant, nec parandi modum subiungere, cū hic sit perfacilis.

Pilulæ de Mechoacana quòd aqueos & serosos humores efficaciter educant, hydropi, & omnibus his affectibus sanandis conueniunt, qui à pituita tenui originem sortiuntur.

Vires.

Pilula Fætida. D. Mes. CAPVT XIX.

℞. Sagapeni
ammoniaci,
opoponacis.
bdellii,
colocynthidis,
sem. rutæ agrestis
aloes,
epithymi an. ʒ v.
turpethi ʒ iii.
scammonij ʒ iii.
esulæ præparatæ,
hermodactylorum an. ʒ ii.
zingiberis ʒ i ss.
cinnamomi,
spicæ Indicæ,
croci,
castorei an. ʒ i.
euphorbij ʒ ii.
Dilue gummi succo porri, & finge massam.

COMMENTARIVS.

Fætidæ pilulæ dicuntur, non quòd fætidōs humores educant, vt quidam opinantur, sed quod medicamentis simplicibus fætidis cōstent, vt castoreo, ruta syluestri, sagapeno, opoponace, & aliis multis. Farum plures descriptiones traduntur à Rhafi, & aliis Arabibus, hanc tamen solam, vt præstantiorem retinemus, quam Mesue ma-

iolem nominat, ad differentiam alterius minoris descriptionis, quā, ut inefficaciorem prætermisimus.

Nullos autem dubitasse credo, ut innuere videtur Rondeletius, an potius semen rutæ sylvestris, quàm cicutæ, Aut contra, pilularum foetidarum confectionem ingrediatur: Absurdum enim est semen cicutæ venenatum admittere, & improbatum Constantinus quidam qui pro *harmeli*, aut *harmela* semen cicutæ vertit, cum his vocibus omnes Arabici sermonis interpretes, pyganum, seu rutam sylvestrem semper intellexerunt: quæ si defuerit, in eius locum optimè ruta vulgaris substitui potest.

Debet verò sumi hermodactylus Officinarum & exoticus, citius radices tuberosæ sunt, crassæ, nec rugosæ, & quæ leui contusione in farinaceum puluerem reducuntur.

Perperam faciunt, qui Ephemerium, seu Colchicum, seu nostras sumunt: Hoc enim gerit radices vietas & flaccidas, nec qualitates ullas habet commendabiles, imò noxias: Illud quod breui suffocatu interimat, vnde strangulatorium nominatur, ut lib. 1. de materia Medica notauimus. Optimus autem hermodactylus è Syria aduehitur, vnde Syriacus nominatur.

Alsebram, seu Esula præparari debet antequam admittatur in usū, eo, quo dictum est, antè, modo. Gummi in succo porri liquanda, colanda, coquenda. His pulueres adiiciendi, commiscendi, subigendi. Omnia tandem in massam cogenda, quæ manibus oleo delibutis amygdalino contrectetur, corio inuoluatur, in vase stanneo reponatur, & vsui feruetur.

Vires.

Pilulæ foetidæ ad multa sunt vtilis: vacuant enim humorem frigidum, ac pituitosum & crudum, necnon biliosum: Ob id affectibus conuenient sanandis, qui ab illis originem sortiuntur, ut iuncturarum morbis, podagræ, gonagræ, vertebrarum dolori, elephantiasi, alphis, psoræ, cutis infectionibus, & affectionibus colicis.

Pilula

Pilula de Hydrargyro. CAPVT XX.

℞. Hydrarg. in succo limonum primum extincti, &
 postea in succo saluie nutriti ℥ vi.
 aloes optimæ ℥ v.
 rhabarbari ℥ iii.
 dacrydij ℥ ij.
 agarici ℥ i.
 storacis calamitæ,
 cinnamomi,
 macis,
 santali citrini,
 sarseparrillæ,
 sassafras,
 moschian. ℥ ss.
 mellis in decocto guaiaci despumati, & ad aqueæ hu-
 miditatis exolutionem cocti, quant. suff. fiat massa di-
 gitis paucis oleo terebinthinæ delibutis contrictanda, ac
 ducenda: Tum vsui reponenda.

COMMENTARIUS.

Antidotario nostro quicquam deesse nolumus, & medicamenta non solum ex veterum monumentis omnia depromimus, sed etiam ex Neotericorum tabernis nonnulla ratione inuenta, & euentu fœlici probata probamus & admittimus: Cuiusmodi sunt pilulæ de hydrargyro, quas recentiores ad recentis morbi expugnationem vsurpant. & quum enim est, nouo morbo noua dare remedia, ex ratione inuenta, & debita arte parata, cum inutilia ea esse multa euentus indicet, quæ ab antiquis in lucem edita sunt.

Nouum autem morbum lucem veneream esse it inficias nullus: Ante siquidem annum 1493. in Europa nunquam visa est; sed primū à Christophoro Colūbo, eiusque sociis, vel seruis Italis ex India re-

Lues Indi-
 ca ab Italis
 aduecta.

mul & pudenda, & pudendum morbum communicarunt; Quem postea ipsi Galli ex exercitu, vrbe scilicet capta, redeuntes, aliis mulieribus Italis, quas subierant innumeras, dedere: Ad quas postea mariti accedentes, ac debitum matrimonij persoluentes, à propriis vxoribus acceperunt, quæ ipsæ à Gallis vt Galli ab alijs mulieribus Italis, & hæ à commilitonibus Christophori Columbi.

Cur Itali
luem Indi-
cam Galli-
cam vocât.

Hinc Itali in Gallos turgidi, & irati, suum morbum, in vindictam, Gallicum vocant; Atque ridiculam eorum libri præ se ferunt vltionem, cùm maritos ignorantia, & vxores meretricij notent: Illos, quod veneræ luis originem nescierint: has, quod à Gallis iniuri cupierint.

Ridiculus
Brasauoli
labor.

Forſan huius iniuriæ in parentes illatæ memor Brasauolus, libellum quemdam de suo morbo, quem Gallicum vocat conscripsit, in quo eiusdem 2;4. differentias assignauit. Certè si eo loci ineptire non visus est bonus vir, credo tot eius affines aut vicinas, primo Italici morbi aduentu à militibus Gallis compressas: Atque vt harum nuptiarum signum aliquod in æternam memoriam relinqueret, eiusmodi hieroglyphica posteritati reliquit. Sed hæc obiter dicta sunt, & citra nationis, quæ viros percelebres alit, iniuriam. Nunc ad propositum redeo, & dico, varias esse pilularum de hydrargyro præparationes. Singuli enim ferè Aromatarij & Chirurghi peculiare habent descriptiones, quas velut arcana non reuelanda apud se seruant: Quarum nonnullæ bis tantum iteratæ saluationem mouent. Aliæ tantum alium subducunt, quæ frequentius vsurpantur: Cuiusmodi sunt vulgares de Barbarossa vocatæ. Omnes tamen sæpius iteratæ sputationem creduntur mouere, neruos lædere, & strangulationem interdum adferre. Propterea non tutus est illarum frequens vsus, nisi hydrargyrus optimè præparetur, & aliorum medicamentorum admixtione castigetur, vt oleo terebinthinæ, vel his, quæ in hac nostra descriptione continentur. Cuius parandi modus ex formula satis patet. Aliæ verò sunt hydrargyri præparationes, de quibus postea.

Pilulæ de hydrargyro, seu Mercurio Panchymagogæ sunt, seu Catholicæ, & simul alexiteriæ: Vniuersos siquidem humores vnà purgant, & qualitatem luis Indicæ malignam euincunt, illiusque vestigium partibus impressum radicitus euellunt.

Quibus Pilulis Officina Pharmaceutica carere potest.

CAPVT XXI.

VT in Iurisprudencia multæ veterum leges quasi deletæ silent, & nullius apud magistratum sunt vsus & vigoris: sic in Medicina multa antiquorum medicamenta, vel parum probantur, vel planè improbantur, tanquam nocitura, aut non satis profutura. Quæ-

dam ideo relinquuntur, quod eiusdem efficaciarum, & virtutis plura simul descripta sint, ex quibus vnicum, idque præstantissimum seligi sat est. Imprudentis enim hominis esset parare, & in pharmacopolio seruare cuncta quæ describit Nic. Myrepsus medicamina, qui cum opus suum mille & centum capitulis absoluerit, in singulis non tantum singula medicamenta, sed aliquando duo aut tria simul descripta coniunxit.

• Aëdij quoque, Aëuarij, Nic. Præpositi, aliorumque multorum singula medicamenta parare, & parata seruare medici non imperant, nec morbi postulant, nec pharmacopolæ valent, sed tantum selectiora, securiora, probatiora.

Sic in hoc Antidotario tantum eximia damus; Quæ si ex authoribus non suppetant, ut certè multa multis morbis defunt, nostro labore & industria compensamus, & probatissima suggerimus.

Ex pilularum autem numero eas expunximus, quas pilulas lucis maiores & minores vocant, quod nimium multa & parum apta simplicium farragine constent. Quodque ad oculorum affectus latis efficaces sint pilulæ sine quibus. Imperiales iuxta veterem descriptionem, De quinque generibus Myrobalanorum, De octo rebus, Et Arabicas prætermisimus, quod Aggregatiuæ præstantiores sint, & ad omnia vtilis, quibus prædictæ imperantur.

Pilularum
multarum
suppressio.

Pilulas Indas & de lapide Armeno reliquimus, quod illis affines sint, & efficaciores, quæ De lapide lazuli cognominantur.

Pilulas de Rhabarbaro parui facimus, ut ignauas: De Eupatorio damus, ut efficaciores & affines.

Pilulæ de Hermodaëtylis Artheticas excludunt; Fœtidæ eas, quæ à Sagapeno, Euphorbio, & Sarcocolla nomen habent.

Pilulæ de Mechoacana eas reddunt inutiles, quæ de Mezereo & Esula vocantur.

Benedictæ & de Hiera pauculo tempore possunt confici, cum pulueres semper præsto sint, aut esse debeant in officinis, ex quibus vel Electaria, vel Catapotia ad arbitrium queant dispensari.

Pilulæ de Bdellio omnes negliguntur, quod parum sint purgatoriæ, pro quibus alia medicamenta præstantiora ac magis reborantia, & in rem præsentem paratu faciliora dari possunt.

Alias adhuc multas prætermitto, tanquam indignas nomine & usu. Multa sane medicamenta multi authores describunt, non tam ut hominum sanitati consulant, quam ut sua Antidotaria in molem maiorem accrescant.

Pulueres cathartici quod ingrati ferè sint, solent in Electuarij mollis aut solidi, vel pilularum coagmetari: Empirici tantum St bi puluerem sæpè exhibent cum paucio vino, aut alio liquore, ut etià puluerem Mercurij, quo solo Lutetiæ circulator quidam vendens

omnium morborum sanationem pollicitus est, se palam prophetam naturæ prædicans. Miserrimus tamen aufugit, & vrbes circumit multas, quærens quem deuoret. Indignus est, quem nominem.

Pulueris autem Mercurij præparatio non apud omnes vniuersimodum est: Alij enim hydrargyrum in matratio cum aqua forti includunt, & sublimatione aquam exhalant; quod remanet in fundo vasis, puluis Mercurij dicitur; Vulgus non ineptè præcipitatum vocitat, cuius color ex rufo rubet, habetque vim potius causticam, quàm catharticam.

Puluis Mer-
curij.

Præcipita-
tum.

Alij alio & meliore modo sic parant: Hydrargyrum in aquam fortem immergunt, in quem dilutum iniiciunt muriam, seu salem aquæ liquatum: Tum residere finitur hydrargyrus, & per inclinationem aqua eiicitur: quod crassamentum remanet subalbum est, & puluis Mercurij nominatur. Qua autem proportionem inter se misceantur, quomodo puluis perfectè dealbetur, & qua virtute dotetur, minimè opus est recensere, ne Empirici & pseudopharmacopœi abutentur. Si ea verò arte paretur, quam nouit P. Pijardus Med. Paris. doctissimus, vires habet eximias, & curandis quibusdam morbis, qui vulgaribus remediis non cedunt, efficacissimas.

De Pilulis aliquot non solutivis, Appendix.

Mira ingenij solertia & dexteritate in ægrotantium fauorem, quoduis medicamentum, quauis forma solet effingi & formari. Datur enim medicamentum purgans solidum, liquidum, mediū. Dantur & singula, quæ vel tantum purgant, vel tantum roborant, vel alterant, & aliquando, quæ simul omnia præstant. Pilulæ autem purgatoriæ ferè sunt; omnes siquidem paucis exceptis aluum ducunt, sæpiusque exhibentur, dum à parte remotiore superuacaneos succos educere consilium est. Tali enim forma, consistentiaque diutiùs stabulantur in ventriculo, faciliùsque earum vis defertur ad partes morbidas, & excrementitiis humoribus oppressas. Proinde cum medicamentum diutiùs in ventriculo cupimus immorari, forma solidiore paramus, vt pilulas non solum descriptas ac purgantes, sed & quasdam hypnoticas & Arteriacas, cuiusmodi sunt, quæ sequuntur.

Pilula de Cynoglosso. CAP. XXII.

Rj. *Myrrha optima, ʒ vi.*

Thuris masculis ʒ v.

radic. Cynoglossi ʒ iiii.

sem. hyosciami,

opij, an ʒ iiii.

croci,

castorij, an. ʒ i ʒ.

Cum syrupo de stœchade fiat massa, vsui reponenda.

COMMENTARIUS.

Recentiores harum pilularum descriptionem, sed non nomen retinuerunt: Nam Mesuë illarum author ab effectu pilulas ad omnes morbos catharri vocat. Illi verò de Cynoglosso, quod tamen nec qualitate, nec quantitate in ipsarum confectiōe præpollet, nominant. Forsan pro Cynoglosso Arnoglossum melius poneretur, ab eoque nomen sumerent magis proprium. Nam cum ad sistendas fluxiones Mesuë descripserit, Arnoglossum ob qualitatem astringentem huic scopo magis conuenit. Verum cum Fernelio nouum nomen admittimus, & castorium addimus ad opij castigationem: Sed rhodostagma, seu aquam rosaceam pulueribus excipiendis minimè conuenire putamus, si massam consistentiæ legitimæ, & diu seruare cupimus. Syrupum de Stœchade substituimus, cuius & qualitate caput aduersus opij nocumenta roborabitur, & lentore pulueres simul uniti in pastam cogentur idoneam; Ad cuius cōfectionem radix Cynoglossi sicca primum terenda, vnà cum semine hyosciami, tum reliqua simplicia seorsim. Opium tritum primò subigatur cum syrupo; Postea pulueres alij commisceantur, & cogantur in massam.

Pilula de Cynoglosso valent ad somnum conciliandum, ad catharum sistendum, corizam, tussim, aliosque his succedentes affectus: Cohibent enim omnes destillationes, siue in thoracem & pulmones, siue indentes, aut alio procumbant.

Vires,

De Laudano. CAPUT XXIII.

A Paucis annis quædam pseudomedicorum cohors coorta est, qui pro pilulis de Cynoglossò vñtatissimis, confectionem quãdam Opiatam, Laudanum illis dictam exhibent, qua non tantum somnum conciliare, sed morbos quosvis abigere pollicentur. Agyr-tam vidi qui ferè exanimes & semimortuos suo laudano reuocare iac-tabat. Huius pharmaci nunc apud circulatores adeo inualuit en-comium, vt nullus sit Empiricus, nullus tam hebes medicaster, nul-lus vel plebeius tonsor, qui se Laudanistam non profiteatur.

A multis autem pretio, à quibusdam, precibus, quid esset hoc me-dicamentum (arcanum nominant) rescui. Verum inter viginti eius descriptiones, ne quidem duas similes comperi: omniumque meliorem is se habere sæpè fatetur, omnium qui maximè ignarus est.

Nonnullos verò circumforaneos audiui Catapotia de Cynoglossò pro Laudano exhibere, & pro singulis pilulis dimidij scriptuli pon-dere aureum extorquere. Sic enim credula nimis plebecula, nouorum medicamentorum auida, verborum inusitatorum sub-dola subtilitate plecta, à vafriis circularionibus facillè decipitur.

Quæ porrò Laudani descriptiones à peritioribus dantur Spagyri-cis rarò, difficileque parantur, quod magisteriis consent, gemma-rum, hyacinthorum, & corallorum, essentia croci & opij, oleo cyn-namomi vel caryophyllorum, margaritarum liquore, puluere mo-nocerotis, lapidis Bezoar, ambra grisea, & aliis medicamentis pre-tiosis. Non est autem dubium confectionem quamdam hisce mate-rialibus compositam vires eximias habere: nec inficior doctos diui-tes spagyricos interdum parare, seruare, & ægrotis exhibere. Sed, proh dolor! improbi tam frequenter imponunt, vt probis nunc be-nè & agentibus, & dicentibus vix fides adhibeatur. Felicissimos ef-fectus præstitisse vidi quoddam à viro docto medico regio exhibitũ.

Quod sequitur viribus est eximium, & paratu facile satis.

Laudanũ.

℞. Extracti Catapotiorũ de Cynoglossò ʒ ij. extracti Phillonij Ro-mani & theriacæ an. ʒ j. ambra, moschi an. ʒ ss. lapidis bezoardici, cornu monocerotis an. gr. vj. croci ʒ ss. cum oleo caryophyllorum fiat Laudanum.

Possunt eius innumeræ descriptiones dari: quisque enim vel mediocriter eruditus aut addit, aut detrahit pro arbitrio, seu ad fa-mam, seu ad imitationem aliorum medicaminum opiatorum, vt Philonij, cuius nomenclatione Crato Laudanum designabat, quod nil aliud esse tenebat, quàm Philonium quoddam, quod multi chy-miatri pro basi laudani sumunt, & magisteria, essentias & tincturas adicientes, vt loquuntur, hypnoticum medicamentum efficiunt,

Philonio vulgari magis commendatum. Sed mirum est, vnumquē- que formulam huius medicamenti immutare, necdum inter illos constare, quānam sit genuina, vera, ac retinenda laudani descri- ptio, quam alij ex Paracelso, alij ex Keckio, nonnulli ex Ander- na- co, quidam ex Brunerio, alij ex aliis mutuuntur, sed aliquid perpe- tuò immutant, vt authores primi credantur. Multas descriptiones potuissē huc adducere, sed pigeret laboris, vt inutilis. Non omit- tendum chymicos laudanum sic vocare, quasi medicamentum lau- datissimum, quod & ab illis sapē, sed ineptē, Nepēthes nuncupatur. Nepēthes.

De Pilulis Bechicis.

Pilula bechica, nigra. D. Mes. CAPUT XXIV.

R. *Succi glycyrrhizæ,
 sacchari, an. ʒ vi.
 amyli,
 tragacanthi,
 amygdalar. dulcium mundat. an. ʒ iiij.
 cum mucagine seminis citoniorum in aqua rosarum ex-
 tracta fac massam.*

COMMENTARIUS.

Non seruatur hæc massa integra reliquarum pilularum more, sed in minimas diuiditur particulas scriptuli dimidij, aut integri ponde- re, quæ postea finguntur ad arbitrium, nunc in trochiscos triangu- los, aut polyformes, nunc in formam rotundam, seu in pilulas: Vn- de à quibusdam in pastillorum, ab aliis in catapotiorum ordinem re- feruntur. Cū tamen sub lingua debeant contineri, forma sphaerica conuenientior est, vt facilius volente lingua, huc illuc deferantur, & in diuersis partibus oris liquecant: vnde ὑπογλωττῖδες pilulæ, vul- Hypoglot-
tides pilu-
læ.

ap. 20. gò sublinguæ vocantur. Possunt quoque ad eundem vsum alij tro- lib. 5.

sect. 1. chisci parari, vt in nostris Institutionibus docuimus. Paradi modus

facilis est. Amygdalæ primū à cortice purgatæ cultello minutim incidendæ, deinde super marmor læuigandæ: Tum amyllum & sac- charum: Postea in alio mortario metallico parū calido succus gly- cyrrhizæ terendus, dein tragacanthum: Tandem cum mucagine cō- miscebuntur in pastam idoneam, ex qua pilulæ planæ formabuntur, exsiccandæ & seruandæ.

Vires.

Pilulæ bechicæ nigræ plurimum valent ad tussim siccam ex materia acri, & calida, & ad vocis asperitatem, & rancedinem, difficilesque pectoris excreationes, ut docet Mesue capite de tussi, in sua praxi.

Pilula bechicæ albæ.

CAPUT XXVI.

℞ Pul. yridis Florentiæ.

amylan. ℥ i ℞.

saccharicandi,

penidiorum an. ℥ iiii.

sacchari albiss. lib. i.

Cum mucagine gummi tragacanthi in aqua rosarum extracta, fiat massa, ex qua formentur pilulæ Hypoglotides.

COMMENTARIUS.

Cum incertus sit harum pilularum author, quisque pro animi voto earum descriptionem immutat, nunc quidpiam addendo, nunc detrahendo. Vñtior tamen formula ea est, quam exhibemus, per quam pilulæ paratæ & albæ sunt, iuxta cognomen, & gratæ & bechicæ iuxta mixtionem & compositionis rationem. Cuique autem notus est, etiam tyrunculo parandi modus.

Bechicarum albarum vsus plurimum commendatur ad faucium asperitatem leniendam, ad tussim & rancedinem, atque sputum mouendum.

Vires.

Sic igitur videor non tantum formulas omnes medicamentorum purgantium, sed & cuncta purgantia Officinæ necessaria descripsisse. Superest nunc ut roborantia, alterantiaque sequenti libro describamus.

Finis Libri Secundi.



OFFICINÆ
PHARMACEVTICÆ,
SIVE ANTIDOTARII
LIBER TERTIVS.

*De medicamentis roborantibus, in tres sectiones distinctus,
quarum prior de pulueribus cardiacis sele-
ctioribus agit.*

PRÆFATIO.



IX vllum medicamentum datur solita-
riæ facultatis, sed quod vel purgat, vel
roborat simul atterat : A præpollente
tamen facultate denominatio sumitur.
Et quod roborat magis & minus alte-
rat Roboratiuum, quod magis alterat
& minus roborat, Alteratiuum dicitur.
de vtroque verò non tantum simul in
eadem Cōfectione, quæ ambabus qua-
litatibus constat, sed seorsim, ac diuer-
sis capitibus, hoc in tertio libro differi-
mus quia inter vtrumque magna cognatio aut per qualitates, aut
consistentiam, aut parandi modum. Philonium Romanum & Con-
fectio de hyacintho vix dissimilem apparatus & consistentiam ha-
bent, simulque cum roborantibus describuntur, illud tamen Alte-
rans, hæc tantum roborans perhibetur. Vt autem ordine iustissimo
singula, præsertim roborantia describamus, à pulueribus cardiacis
selectioribus ordiemur, partim à medicis celebrioribus descriptis,

partim nostra inuentione firmis, & experientia longa probatis. Quā-
 ti verò sint vsus in medicina pulueres, non tantum Aromatici, de Cap. 9.
sect. 1.
lib. 3.
 quibus nunc differimus, sed & alij, vel exterius admouendi, vel as-
 sumendi, vel in aliorum compositionem adducendi, in nostris Insti-
 tutionibus abundè demonstramus.

Diamargaritum frigidum D. Platearij. CAPVT I.

R Margaritarum splendidarum ʒ iii.
 quatuor sem. frigid. maiorum mundatorum,
 seminum portulacæ &
 papaueris albi,
 santali albi,
 santali citrini
 ligni aloes,
 Zinziberis,
 rosarum rub.
 florum nymphaeæ,
 borraginis,
 myrcyllorum an. ʒ i.
 coralli albi,
 coralli rubri an. ʒ B.
 fiat omnium puluis, in vase angustli oris reponendus, &
 seruendus.

COMMENTARIUS.

Pulueres aromatici, seu cordiales, vel per se seruantur in vase ido-
 neo ritè operculato ne eorum vis expiret, vel cum melle soluuntur
 in Electarium liquidum, aut cum saccharo perfectè cocto in Electa-
 rium solidum, seu tabulatum coguntur. Per se verò solent in Offici-
 nis seruari, vt eorum portio vel epithematis dissoluatur adhibendis,
 vel aliis medicamentis permisceatur intrò sumendis.

Huius autem pulueris qui à margaritis nomen sumit, tam varia
 est descriptio, vt vix de ipsius authore constet. Quisque enim ad ani-
 mi votum eam variè immutat: hanc tamen quam exhibemus ex Pla-
 teario, genuinam esse doctorum scrip̃ta testantur.

Dicitur verò Diamargaritum frigidum ad differentiam alterius calidi quod à paucis, imò nullis paratur. Dicitur & compositum ad Manus Christi perlatae discrimen, quæ Diamargaritum quoque est, Manus Christi ex saccharo tantum rosato & margaritis constans. Verum aliud ad- perlata. huc vulgari compositius est, quod pretiosos lapides multos, ambrâ & moschum recipit: Sed cum parum distet ab Electario de geminis, nili quod magis refrigeret, vix paratum reperitur.

Praeparatio Diamargariti penes solam triturationem est, de qua, & eius differentius egimus supra in nostris Institutionibus. Margaritæ seligendæ sunt Orientales & pellucidæ, quæ probantur candore, retunditate, laetore, pondere & magnitudine; Verum quæ ponderosæ ac crassæ sunt Vniones dictæ, raro propter raritatem & valorem medicas compositiones ingrediuntur. Debent autem ut & corallia super lapidem porphyrium duci & laugari. Semina quatuor frigida minutim incidenda, & tenuissimè pulueranda. Deinde reliqua solito more, Tandem omnia confusè miscenda.

Diamargaritum efficacissimum est ad virium robur resciciendum, syncopem tollendam, astheneticos inuandos, tussim coquendam, tabidos resciciendos, imbecillitate languentes recreandos, & ad statum priorem recuperandum.

Diamargaritum Magistrale. CAPVT .

*R. Margaritarum splendorum, 3i.
 Rasuræ eboris,
 ossis de corde cervi an. 3ij.
 Hyacinthorum,
 saphyrorum,
 smaragdorum,
 coralli rubri,
 coralli alb.
 ligni aloes an. 3ß.
 santali citrini,
 santal. albi,
 santal. rubri,
 trochiscor. diarrhod. an. 3ii.
 seminum melonum,*

acetosæ,

endiuiæ

caphuræ, ʒß.

amburæ grise ʒß.

moschi, gr. iij.

Auri foliati vel puluerati ʒi.

fiat omnium puluis ad vsum seruandus.

COMMENTARIUS.

Ne quis ægrè ferat nos in priore huius operis editione diamargaricum frigidum Platearij admodum simplex tantum dedisse, aliud magistrale ac magis completum nunc exhibemus, quod medicamenta omnia continet, nota probata, cardiaca, & ex arte ac ratione simul congesta. Non tam verò omisi, quàm neglexi ea quæ suo diamargarito N. Præpositus præter rationem addit, sericum nempe vstû spodium, ben vtrumque, doronicum &c. Sericum enim crudum credo qualitate nulla insigni pollere, vel eam vstione amittere, nec vllam salutarem acquirere. De ben vtroque quoque bene sentire nostrates non queunt, qui nec plantas è quibus promanant, viderunt, nec norunt, nec à quoquam authore fidei edisserunt: Nam quæ radices pro duobus ben circumferuntur, earum altera inodora & insipida est, altera nempe acris, mordax & ingratissima. De spodio vulgari ridicula sunt quæ credunt multi, nam antispodium potius est, cordi nusquam amicum, vt alibi, docuimus. De Doronico lis est inter nuperos, quorum alij venenum esse putantes demonicum nominant, alij quoddam alexiterium putant; vt vt sit illo nostrum Diamargaritum salubriter poterit carere. Ne autem prolixior commentarius tedium lectori pariat, dico Diamargaritum Platearij paruis sumptibus posse parari, & efficacissimum esse. Qui tamen efficacius voluerit, hoc à nobis traditum videat & accuratè consideret: quodque si parari iusserit, nec pigebit sumptus, neque laboris.

Præparatio. Ratio parandi etiam tyronibus nota: gemmæ scorsim vt & margaritæ atterende: Scorsim quoque ligna, ossa, semina, necnon caphura, ambarum & moschus: Omnia autem commiscenda, non omissis auri foliis, quibus pulueris corpus eleganter coruscat.

Vires. Est quoddam diamargaritum calidum Myrepsi, vt & aliud Actuarij, quorum nullus vñus.

Diamargaritum magistrale ac frigidum valde cardiacum est, &

morbis omnibus prodest quibus vitales spiritus sunt imbecilli, ob id omnem virium imbecillitatem firmat, tabidis auxiliatur, longo morbo deiectos & languidos recreat, & pristinum robur reducit.

Electarium de gemmis. D. Mes. CAPUT III.

<i>R. Margaritar. pellucidarum 3 ij.</i>	<i>caryophyllerum,</i>
<i>fragmentorum saphiri,</i>	<i>zinziberis,</i>
<i>hyacinthi,</i>	<i>piperis longi,</i>
<i>Sardinis,</i>	<i>spicæ nardi,</i>
<i>granatorum,</i>	<i>folij,</i>
<i>smaragdi an. 3 i ss.</i>	<i>croci,</i>
<i>Zedoariæ,</i>	<i>cardamomi an. 3 i.</i>
<i>doronici,</i>	<i>trochiscorum diarrhodō,</i>
<i>corici citri,</i>	<i>ligni aloes an. 3 v.</i>
<i>macis,</i>	<i>cinnamomi,</i>
<i>sem. Oximi an. 3 ij.</i>	<i>galangæ,</i>
<i>coralli rubri</i>	<i>Zurumbet an. 3 i. ss.</i>
<i>Electri,</i>	<i>foliorum auri &</i>
<i>limaturæ eboris an. 3 j.</i>	<i>argentian. 3 ij.</i>
<i>been albi,</i>	<i>molchi 3 ss.</i>
<i>Been rubri,</i>	<i>fat omnium puluis con-</i>
	<i>fuse miscendus.</i>

COMMENTARIUS.

Hæc compositio vel forma pulueris seruatur, vel Electuarii, seu mellis, ex cæcis nempe pulueribus, a quibus paribus mellis rosati & emblicati, vel hisdem commistis saccharo rosato, si Electarium solidum magis expetatur. Commodius tamen puluis eius vase idoneo conclusus ad vsus futuros in Officinis custoditur.

A gemmis autem seu lapillis preciosis, quos admittit multos nomen assumit, quibus accedunt alia multa cardiaca vulgaria, & quædam adeo rara & incognita, vt ex veterum & recentiorum lectione vix constet quænam ea ipsi sint, & quibus facultatibus polleant, vt ex Behen examine patet, in cuius locum aptissimè Elenium, quasi behenium substitui potest, cum vtriusque radix pastinacæ sit amula, cardiaca, & calidior, quàm buglossum & berrago, quæ à nonnullis pro vtroque been subrogatur. Rectè quoque radix tormentillæ in vtriusque been locum succenturiari valebit: nec eos rectè facturos puto, qui ad solennis huius Electarij compositionem radices illas

exoticas behen nomine notatas vsurpant, meliusque aut tormentilla sola, aut Elenium solum, aut potius vtriusque par pondus pro vtroque behen assumi potest. Et si quis malit Angelicæ radicem pro Elenij radice fumere, non refragabor.

Præparatio Preparatio pulueris huius in tritura idonea consistit. Gemmæ, & corallia super porphyrium lapidem mola versatili læuigantur: radices, ligna, fructus in mortario metallico teruntur. Postremo simul omnia comminiscuntur.

Vires.

Electarium de Gemmis ad frigidos affectus cerebri, cordis, ventriculi, hepatis & vteri efficacissimum, inquit Mesuë, nam melancholicos, tristes, solitarios & timidos iuuat, cordis palmo medetur, hypochymia succurrit, ventriculū languidum roborat, & interanea omnia recreat. Sed rarissimè parant illud pharmacopœi, tum propter caritatem, tum raritatem simplicium, quæ compositionem ingrediuntur.

Diambra D. Mes. CAPUT III.

℞. Cinnamomi,
doronici,
caryophyllorum,
macis,
nucis moschatæ,
folij,
galangæ an. ʒ iij.
piperis longi,
santali citrini,
ligni aloë. an. ʒ ij.
cardamomi vtriusque
spicæ nardi an. ʒ i.
zingiberis ʒ i ʒ.
ambre ʒ i.
moschi ʒ ʒ.
fiat omnium puluis, vsui reponendus.

COMMENTARIUS.

Hæc compositio multum aromatica est & suavis, tum ratione ambra, à qua denominatur, tum moschi & cæterorum aromatum. Seruatur sub triplici forma vel pulueris, vel electarij solidi, vel mellis. Si eius consistentia requiritur dura, qualis est tabellarum, pulueres excipiunt saccharo rosato perfecte cocto: si molliuscula, qualis Opiatarum, iidem admittuntur zulepo rosato, seu syrupo Alexandrino.

Præparatio pulueratio tantum est, quæ ea arte suscipienda, efficiendaque, quam alibi demonstrauimus.

Cap. 9. Diambra visceribus omnibus roborandis efficacissima est, præfer-
 & 10. tim si à causa frigida sint imbecilla, nam calefaciendo spiritus reficit,
 lib. 2. natium calorem fouet, affectibus vteri prodest, & valde senibus &
 insit. mulieribus conuenit.

Vires.

Puluis diamoschi. CAPUT IV.

<i>Rx. Moschi 3 ℔.</i>	<i>macis,</i>
<i>Ossis de corde cerui,</i>	<i>caryophyllorum an. 3 i.</i>
<i>margaritar. pellucidar.</i>	<i>rosarum,</i>
<i>Scobis eboris,</i>	<i>nenupharis an. 3 i ℔.</i>
<i>coralli albi,</i>	<i>coriis citri,</i>
<i>coralli rubei,</i>	<i>florum buglossi,</i>
<i>santalici curini,</i>	<i>spicæ Indicæ an. 3 ℔.</i>
<i>santali albi,</i>	<i>caphuræ gr. ij.</i>
<i>ligni aloes,</i>	<i>fiet omnium puluis ex arte.</i>
<i>cinnamomi,</i>	

COMMENTARIUS.

Vulgata pharmacopœorum Dispensaria quamplurimis pulueribus cardiacis scatent, hisque impensè calefacientibus, paucis verò refrigerantibus, ut qui ex omnibus aromatum calidiorum generibus promiscuè confusis, ac fere nullo congestis delectu consent: Cuiusmodi sunt, tum duæ postremæ confectiones iuxta descriptio-

nem à veteribus traditam, tum & aliæ multæ, quæ passim occurrunt in Antidotariis singulis. Nam Diacyminum, Dianisum, Diaziniber, Diatrium pipereon, Diamargaritum calidum, Diamoschum dulce & amarum non nisi eosdem effectus proferunt, cum easdem facultates habeant, omnia nempe cum sint ex calidis composita. Quocirca veterem Diamoschi descriptionem non tantum castigavi, sed neglexi, & aliam substitui, quæ & nominis rationem apprimè refert, & compositionis rationem profert, & virium imbecillitati à causa calida confert. Superfluum enim videtur antiquam Diamoschi præscriptionem retinere, cum Diambra, & Electarium de gemmis pares sortiantur vires. Proinde aliud Diamoschum exhibemus & fragrantissimum, & viribus effectis à causa calida securissimum, & paratu facillimum.

Diamoschum dulce multis quod constet cardiacis partes nobiles exhalat: maxime verò cor & vitales facultates à causa qualibet, sed præsertim calida languentes & imbecillas. Confert quoque multis vteri affectionibus.

pulvis Electarij Triasantali. CAPUT V.

℞. *Trium santalorum,*
rosarum,
sem. psyllij an. ʒ ij.
rhaborbari,
Scobis eboris,
succi glycyrrhizæ,
sem. portulacæ an. ʒ iß.
gummi Arabici,
tragacanthi,
sem. quatuor frigidior. maiorum,
Sem. Scariole, an. ʒ i.
caphuræ ʒ ß.
fuit ex arte omnium pulvis.

COMMENTARIUS.

Inter viginti compositionis huius descriptiones, vix duas similes comperi: Alij enim pro zuccaria semen cicute ponunt, ut Ioubertus;
 alij

alii semen psyllij vt Fœsius : alij vtrumque omittunt , vt Val. Cordus ; alij saccharum candum volunt , vt Rondeletius ; alij violas vt Fuschius.

Eadem est varietas in Rheo, amylo & caphura , quorum singula à singulis modò auferuntur , modò adduntur. Ego formulam supra descriptam, doctorum consensu meliorem iudicavi, & psylium apponendum duxi, scopo conuenientissimum: Amylum verò expunxi , vt minus aptum ; suo enim lentore obstruit. Caphuram quidem reliqui ad crassa medicamenta sua tenuitate intrò deducenda, sed de eius quantitate detraxi , ne suo odore graui aliorum aromaticum, quæ pauca sunt, suauitatem, aut obtunderet , aut prorsus deleret.

Tragacathum & arabicum gūmi relictā sunt; quæ si ante commixtionem paululū assentur , vt lentorem deponant , authoris intentioni magis conuenient, qui qualiscunque fuerit , siue N. Alexand. siue alius, de eo enim non satis constat, medicamentum hoc partim ad roborandum, partim ad obstruēta soluenda imperauit, psylium si excipiatur , cuius mucago aqua rosacea leuiter extrahi debet, ea-
que santali puluerati subinde in mortario humectandi & quasi nutriendi: atque sic toties tractandi donec psyllij mucaginea humiditas fuerit absorpta. Sic namque santalorum siccitas & asperitas non modò temperatur , sed eorum rubor magis rutilus euadit. Industriosi enim artifices santalos præsertim rubros solent aqua rosata aspergere, vt maiorem , elegantiorēque ruborem nanciscantur.

Præparatio.

Quomodo
santali præ-
rubri fiant.

Vt vero tragacanthum & arabicum optimè leuigentur, debent vel in sartagine torrefieri, vt sæpè fit, vel multum exsiccari, & in pila calida cum pistillo calido teri , quod frequentius exercetur.

Præparatio eius vt præcedentium fit, & à tritura debita pendet.

Diatrion- santalon mirificè confert iccoris obstructionibus liberandis, Ictericis, tabidis & immoderato viscerum calori : ventriculi quoque æstum contemperat , primam corporis regionem infarctu expedit, & humores à putredine vindicat.

Hic notandum venit , pharmacopœos sæpè dubios esse , quod acturi sint, dum medicorum iussu tabella vna Electarij , tria santali duplicati , aut triplicati rheo præscribitur : An totius pulueris parati, qui iam rheum exceperit, partem vnā , & rhei ad totam istam partem duplum, vel tripulum pro medici imperio, sumere debeant : An duplicatum vel triplicatum solummodo rheum ad istam portunculam, quæ reliquorum puluerum desim præscribendam ingreditur: nam pro ʒi. pulueris gr. vi. tantum aut paulò plus rhei ponuntur. Vtrumque ego modum seruare soleo, sed his legibus obseruatis, vt pharmacopœus non peccat , & æger leuamen persentiat quod sibi medicus promisit. Cum igitur maiorem vim rhei cupio, sic præscribo. ℞. pul. Electar. tria santal. ʒj. rhei pul. tantundem, aut ʒii.

Vires.

prout duplicatum aut triplicatum volo, & cum ſacchari diſſoluti ℥ii. fiat Electarium. Cùm verò rhabbari minor copia ſufficit, ſic loquor. ℞. pul. triaſantal. ſimpl. aut duplic. aut triplicati rheo ℥i. ſacchari in liquore idoneo ſoluti ℥ii. fiant tabellæ, quarum ℥ij. vix gr. i. rhabbari excipient, cum ℥i. pulueris illius tantum gr. vi. admittant. Paucos video hæc aduertere, quæ tamen parui non ſunt in medicina facienda momenti.

Aromaticum roſatum D. Gabrielis. CAPVT VI.

℞. Roſarum ℥xv.
glycyrrhiæ rafæ ℥vii.
cinnamomi electi ℥v.
ligni aloes,
ſantali machazari, id eſt, citrini an. ℥ij.
gummi Arabici,
tragacanthi an. ℥ij. & ℥ij.
caryophyllorum,
macis an. ℥ij ſ.
ſpicæ Indiæ ℥ij.
nucis moſchatae,
cardamomi maioris,
galangæ minoris an. ℥i.
ambrae ℥j.
moſchi ℥i.
fiat ex arte omnium puluis.

COMMENTARIUS.

Electaria multa traduntur à Meſuë cardiaca & ſuaueolentia, ſed ſpeciatiim deſcribuntur ſex: quæ ipſe aromatica appellat, ex quibus vnicum ſelegi, quod qui habebit, reliquis facilè poterit carere.

Aromaticum autem dicitur ab aromatum quibus conſtat fragrantia; Roſatum à roſis quantitate & qualitate pæpollentibus. Cognominatur vero à Gabriele, nescio quo; forſan illius authore, aut Meſues amico: ut ut ſit, optima eſt eius deſcriptio, & eius ſalutaris uſus.

Seruatur vel forma pulueris, qui facilè parari poteſt, vel conſiſtentia Electarij mollis, ut vult Meſuë, ſi partibus æquis ſyrupi ro-

fati & corticis citri excipiat. Frequentior tamen est eius vsus sub electarij tabulati forma, pulueribus nempe saccharo solutis, & ex arte coctis, atque vt puluis colorem magis rutilum habeat, dum santali puluerantur, modico aquæ rosarum, aut alius conuenientis debet irrorari.

Aromaticum rosatum ad multa efficacissimum est, nam cerebrum, cor, ventriculum, atque adeo totum ventrem inferiorem roborat, & earum partium excrementitiâ humiditatem dissipat, putredinem omnem corrigit, appetitum excitat, coctionem iuuat, nauseam & vomitum sedat : proinde imbecillis & ex morbo conualescentibus subuenit.

Vires.

Diarrhodon abbatis. D. N. Saler. CAPVT VII.

<i>Rx. Rosarum,</i>	<i>succi glycyrrhizæ,</i>
<i>sacchari candi an. ℥i. & ʒiij.</i>	<i>seminum anisi,</i>
<i>santali albi,</i>	<i>fœniculi,</i>
<i>santali rubri an. ʒij. ℞.</i>	<i>sem. Ozimi,</i>
<i>gummi tragacanthi,</i>	<i>berberis,</i>
<i>gummi Arabici,</i>	<i>scariolæ,</i>
<i>Scobis et oris an. ʒij.</i>	<i>portulacæ,</i>
<i>macis,</i>	<i>papaueris albi,</i>
<i>spicæ,</i>	<i>Seminum iij. frigidor.</i>
<i>mastiches,</i>	<i>maior. mundat an. ʒi.</i>
<i>cardamomi,</i>	<i>Ossis de corde cerui,</i>
<i>croci,</i>	<i>margaritarum pellucida-</i>
<i>ligni aloës,</i>	<i>rum an. ʒ℞.</i>
<i>caryophyllorum,</i>	<i>moschi gr. iij.</i>
<i>galliæ moschatæ,</i>	<i>caphuræ gr. ii.</i>
<i>cinnamomi,</i>	<i>fiat omnium ex arte pul-</i>
<i>rhabarbari,</i>	<i>uis.</i>

Nec suis caruit ista solennis compositio castigatōribus: A prima siquidem descriptione à Nic. Myrepsō tradita Nicol. Salernitanus corallium, semen lactucae & mandragorae detraxit. Nic. Præpositus castigationem Salernitani sequutus, nec correctoris, nec authoris mentionem fecit. Candidius eius inuentionem collegij alicuius præfidi, quem Abbatem vocat, Nicol. Myrepsus tribuit. Et quia vix ullum datur medicamentum, diuersis in locis celebratum, in quo nonnihil non matetur: Ob id non mirum, si apud omnes Diarrhodon abbatis prorsus idem non sit, ad cuius compositionem, nec Syluius moschum probat, nec Rondeletius rhabarbarum, nec ego asarum, quia vomitorium & stomacho inimicum, cuius loco macim posui. Item nonnulli granula tantum seminis berberis admittunt, alij semen integrum, & melius. Ego vero cum nusquā quicquā sine ratione comprobem, nemo miretur, si nonnullis authoribus minima fide dignis aliquando dissentiam. Semina quatuor frigida, quod breui tempore rancescant, aptius vtendi tempore commiscebuntur si maxima quantitate paretur puluis, & diutissimè seruetur, à coquis omnia eodem tempore permiscenda: Si forma Electarij solidi seruare consilium est, excipiendi pulueres erunt saccharo rosato perfectè cocto.

Vires.

Diarrhodon ventriculum & hepar roborat, coctionem iuuat, appetitum excitat, flatus discutit, ructus compescit, halitum oris suauem reddit, calorem viscerum contemperat, & omnem corporis noxam à calore proficiscentem emendat.

Pulvis Latificans authoris incerti. CAP. VIII.

Rj. Sem. Ozimi,
croci,
Zedoariæ,
santali citrini,
caryophyllorum,
corticis citri,
galangæ,
macis,
nucis moschatæ,
Styracis calamitæ an. ʒ ii. ℞.
rasuræ eboris,
sem. anisi,
Epithymi,
thymi an. ʒ i.
ambre,
moschi,
margaritarum,
Ossis de corde cerui an. ʒ ℞.
foliorum auri,
foliorum argenti an. ʒ ℞.
fiat omnium pulvis, ut artis est, & cum sacchari aqua
florum buglossi diluti sufficienti quantitate fiat. Electa-
rium solidum seu tabularum.

Qui molle voluerit Zuccarum diluat in succorum
borraginis, pomorum redolentium, citoniorum & vini
veteris, ac optimi partibus æquis: hoc est, in ea omnium
quantitate, quæ saccharo, ut decet, coquendo sufficiat
ad pulveres excipiendos in electarij mollis consisten-
tiam.

COMMENTARIUS.

Quatuor inveniuntur huius nominis Confectiones, prior est *a cap. de me-
lanc.* Rhafis 9. ad Almanf. Secunda l Mesues, in suo grabadiu, Tertia *b cap. de ma-
nia.* Conciliatoris, Quarta N. Salernitani, quam solam retinemus, ut *c diff. 196.* præstantiorem: falluntur qui Galeno eius inuentionem tribuunt, cum in eius operibus nec contineatur, nec multa novit ipse, ut moschum, caphuram, ambarium & margaritas, quæ in illius descriptione continentur. Incertum credo primum illius authorem: Sed forsitan accidit, antiquiores pharmacopœos præstantissimæ compositionis vires expertos ipsius inuentionem præstantissimo medico nempe Galeno dedisse, illiusque descriptionem veluti per manus traditam diligenter seruasse. Sic namque medicamenta composita audentius emuntur & ingeruntur, quorum author nomine, doctrina, fama præluet.

Præparatio. Ab insigni effectu dicitur Lætificans, seu pulvis lætitiæ, quia spiritus & cor lætificat. Lignum autem balsami, quod rarissimum sit, & pretiosissimum expunximus, in cuius locum optimè santalum citrinum substituimus. Nec malè quoque substituetur lentiscus & xyloaloë, ut etiam pro ossè cordis cerui, cornu eius. Cætera, ut quotidie sunt ad manus, sic antiballomenis non egent.

Vires. Præparatio huius Electarij præter debitam simplicium puluerationem, quæ ut in præcedentibus sit, penes eius est arbitrium, qui vel solidum, vel liquidum voluerit: Alerutra enim consistentia faciliè parabitur iuxta formulam descriptam.

Electarium Lætificans suas ex nomine vires designat. Cor enim, partes vitales & facultates omnes lætificat, viscera recreat, humores excrementitios absorbit, flatus dissipat, & ventriculum roborat.

Pulvis dianthos D. N. Myr. CAPVT IX.

℞. *Florum roris marini*
rosarum,
Violarum.
Glycyrrhizæ an. ʒ vi.
caryophyllorum,
Spicæ,
nucis moschatæ,
galangæ,
cinnamomi,
Zinziberis,
Zedoariæ,
macis,
xyloaloes,
cardamomi,
anisi,
anethi an. ʒ iiij.
fiat pulvis secundum artem.

COMMENTARIUS.

Desumpta est pulueris huius descriptio ex Nicolao Myrepso, apud quem tamen singula simplicia præter rorem marinum minore

Ci. 64. quantitate ponuntur, quæ non modò ab Actuário aucta est, sed in-

sect. i. super zedoaria addita. Nomen verò sumit à sua basi, nempe à roris-

Anti- marini coronarij flore, qui per antonomasiam anthos dicitur: vnde

dot. Electarium Dianthos: in quo parando nihil est difficultatis, soletq;

forma pulueris in pharmacopoliis seruari. Siquis voluerit forma

Electarij mollis habere, pulueres melle comprehendat: si solidi co-

dem saccharo rosato perfectè cocto excipiat, & in tabellas redu-

cat.

Electarium Dianthos cardiacis succurrit, epilepticis, animi de-

fectionibus; atque in vniuersum omni imbecillitati corporis auxi-

liatur. Maximè verò capitis affectibus prodest.

Vires.

Pulvis Dianisi. D. Mes. CAPUT X.

℞. Sem. anisi ʒ x.
 glycyrrhizæ rasæ,
 mastiches an. ʒ β.
 sem. carui,
 fœniculi,
 macis,
 galangæ,
 Zinziberis,
 cinnamomi an. ʒ ij. β.
 trium piperum,
 castæ lignæ,
 sem. libistici,
 calaminthes montanæ an. ʒ i.
 cardamomi maioris,
 caryophyllorum,
 cubearum,
 spicæ Indicæ,
 croci an. ʒ ij. & gr. v.
 sacchari candi ʒ ij.
 fiat ex omnibus pulvis ut artis est.

COMMENTARIUS.

Hic pulvis maximè vsualis est, & ad multa utilis, cuius descriptionem à Mesuë traditam retinemus, pyrethro tantùm deletò, in cuius locum semen libistici substituimus, & pro saccharo communis candum admisimus: Pyrethrum siquidem quòd acrius sit, nec aromaticum, omittere visum est saccharum candum asseruando pulueri magis idoneum vulgari præferre. Est autem cubebæ fructus parvus, rotundus, longis pediculis adhaerescens & racematim congestus, quem nonnulli carpesium Galeni, alij myrtum syluestrem Dioscoridis, quidam viticis granum putarunt: Nihil tamen istorum est, eique minime conuenit singulorum prædictorum descriptio.

In

In Iaoi fructus hic *Cumuc* dicitur, ibique tanta est in exstimatione vt decoquatur ab incolis, antequam deuehatur, ne forsan aliò fatus germinet, & stirpis perfectam magnitudinem assequatur, vt alibi ostendimus.

Cap. 14 Dianison intemperiem ventriculi frigidam à pituita cruda, vel
sect. 3. etiam à flatibus san-t, tussi diuturnæ ab humoribus frigidis natam
lib. 1. de auxiliatur, & obstructione visceribus expediendis.

Vires.

Mat.
Med.

Diacinnamomum. D. Mes. CAP. XI.

R. Cinnamomi tenuis ʒ x v.
cassiae lignæ, seu canellæ crassioris,
rad. enule campænæ an. ʒ iij.
galangæ ʒ viij.
caryophyllorum,
piperis longi,
cardamomi vtriusque,
Zinziberis,
macis,
nucis moschatæ,
ligni aloes an. ʒ iij.
croci ʒ i.
sacchari ʒ v.
moschi ʒ ij.
Ex omnibus fiat puluis secundum artem.

COMMENTARIUS.

Cap 9. Inter aromata quæ multa recipit hic puluis, cinnamomum, à quo
lib. 1. denominatur valdè præpollet, quod duplici agnoscitur discrimine,
de Mat. vnum tenuius est & plurimè in fragrans, quòd Arabes Darcheni no-
Med. minant, alterum crassius, quasi ligneum & minus odoratum, quod
Cassiam ligneam, seu vulgarem officinæ vocitant. Vtriusque histo-
riam alibi depinximus. Recentiores ad suauitatem maiorem & vi-
rium efficaciam, raro Diacinnamomū parant absque moscho, quod
& tempore Mesuei fieri solitum ipse testatur. Præparatio sola pulue-

ratio est, & puluerum confusa vno.

Diacinnamomum quòd calidis, aromaticisque omnibus constet, viribus reficiendis, spiritibus exhilarandis, & affectibus omnibus, qui à causa frigida proficiuntur optimè confert.

Lithon tripticon. CAPVT XII.

℞. Sanguinis hirci præparati cinnamomi,	
℥i.	macis an. ℥i. β.
sanguinis leporis vsti ℥β	sem. apij,
radic. ænones,	petroselini,
ciclamini,	amneos,
eringij,	asparagi,
rubie tinctorum,	carui,
cyperij,	dauci,
yreos Florentie,	feseleos,
sem. millij solis,	coriandri,
saxifragæ,	curij,
alkekengi an. ℥ij.	maluæ sylvestris,
lapidis spongiæ,	melonum,
putaminis oui vsti,	peponum
tunicæ interioris ventriculi	pimpinellæ an. ℥i.
galinæ,	gummi cerasi ℥ij.
baccarum iuniperi,	Omnia terantur ex arte,
cardamomi	& fiat puluis.

COMMENTARIUS.

Veterem pulueris huius quem pharmacopœorum vulgus lithontribon nominat, descriptionem negleximus, quòd multa tum astringentia recipiat, atque nonnulla, quæ atterendo calculo & arenulis extrahendis obsunt, tum & alia quædam, quæ vel nimis rara sunt, & pretiosiora, vel nusquam sincera possunt haberi. Illius loco aliud verè lithontripticon damus, aptissimè compositum ad confringendos calculos, saburram pellendam, atque ad cæteros renum & vesicæ affectus accommodatum, qui titulo designantur.

Antequam vero sanguis hirci compositionem illius ingrediatur, debet sic præparari. Hircus priore quadratus, aut paulo senior, vel iunior seligendus & iugulandus: sanguis medius effluens olla fictili excipiendus: nam qui primus fuit tenuior, qui ultimus crassior esse solet: Tum liatco raro tectus Soli exponendus, ut coaguletur, & quod ichorosum est abiiciatur. Sic crassior sanguis concretus siccatur, teritur, in vase vitreo seruatur. Namis est superstitiosa illorum consuetudo, qui non nisi Sole Cancrum ingrediente, hircum longo ante tempore saxifragis, pimpinella, apio, & similibus alitum mactant, & solum sanguinem arteriosum colligunt. Hæc enim præparatio licet non inutilis, non tamen necessaria est, vixque dari potest dictarum stirpium vbertas, hirco quæ longum tempus alendo satisfaciatur: & præterea sanguis eius qui consueto pabulo nutritur, vires habet ad atterendum & expellendum calculum nihilo inefficaciores.

Sanguinis
hirci præ-
paratio.

Sanguis verò leporis recens iugulati & concreti ita assandus, ut non in cinerem prorsus, sed puluerem abeat. Quæ ad reliquam pulueris huius præparationem spectant, nihil habent difficultis, nec multum operosi.

Sanguinis
leporis ap-
paratus.

Pulvis hic cum paucis vino albo, aut aqua parietariæ, vel raphani, aut alia conueniente sumptus calculos & arenulas à renibus, venteribus & vesica expellit, & urinam potenter mouet.

Vires.

Pulvis diacalaminthes. D. N. Myr. CAPVT XIII.

*Calaminthes montanæ,
℞ pulegij,
piperis nigri,
seminum seseleos massiliensis,
petroselini an. ʒ. iii. & ℥ ii.
libisticy ʒ ii. & ℥ i.
amcos,
anethi,
summitatum thymi
cinnamomi,
Zinziberis an. ℥ ii.
seminis apii ℥ i.
Ex omnibus fiat pulvis secundum artem.*

COMMENTARIUS.

Diacalamenti varieg sunt à variis authoribus traditæ descriptiones, sed quam ex Myrepso damus, vt meliorem & gratiorem omnes practici magis probant. Similem ferè descriptionem tradit Galenus, sed calidiorem & acriorem, ob zinziberis & piperis maius pondus. Anethum pro aniso posuimus, ea tamen conditione, vt cuique fas sit alterum pro altero sine discrimine & compositionis iactura substitueret: huius vt præcedentium idem est parandi modus.

Vires. Diacalaminthe crassos humores & lentos extenuat, flatus discutit, vrinam & menses mouet, tussi à frigidis humoribus natæ confert, alimenti ad hepar distributionem iuuat, ventriculum roborat, & appetitum auget. Datur sub forma Electarij mollis, si cum melle, vel solidi, si cum saccharo coalescat.

Puluis contra pestem, seu Bezeardicus. CAP. XIV.

<i>R. Radicis tormentillæ,</i>	<i>corticis citri,</i>
<i>angelicæ,</i>	<i>aurantiorum,</i>
<i>enulæ campanæ,</i>	<i>dictamni,</i>
<i>gentianæ,</i>	<i>scordii,</i>
<i>peoniæ an. ʒ ii.</i>	<i>schœnanti,</i>
<i>ligni aloes,</i>	<i>calami aromatici,</i>
<i>santalæ citrini,</i>	<i>rosarum,</i>
<i>cornu cerui,</i>	<i>croci an. ʒ i.</i>
<i>eboris,</i>	<i>boli Armenæ in aquâ rosarum</i>
<i>ossis de corde cerui,</i>	<i>loca,</i>
<i>granorum iuniperi,</i>	<i>terra Lemniæ an. ʒ ii.</i>
<i>cardamomi,</i>	<i>caphuræ gr. viii.</i>
<i>seminum acetosæ,</i>	<i>ambre griseæ,</i>
<i>cardui benedicti,</i>	<i>foliorum auri an. ʒ i.</i>
<i>caryophyllorum,</i>	<i>fiat omnis puluis in vase idoneo</i>
<i>macis,</i>	<i>reponendus.</i>
<i>cinnamomi an. ʒ i. ʒ.</i>	

COMMENTARIUS.

*Gal. l.
s. simp.*

Medicamenta quæ pestem oppugnant, venena expugnant, ab hisdem noxam tollunt, & vitam tuentur, Antidota, Græcis, Bezaardica Arabibus nominantur, cuiusmodi sunt quædam simplicia, vt lapis Bezar, Zerumbet, Zedoaria, lapilli pretiosi & compositiones quædam cardiacæ & Theriacales, quæ scilicet multis constant, cor, spiritus & partes vitales roborantibus, & virus, seu qualitatem venenatam extinguentibus: Mediam propterea dicuntur sortiri conditionem inter venena & nostram naturam vt Theriaca, & Mithridatium: quorum tamen non tutus est vsus frequens, vbi nulla venenatæ qualitatis suspicio est. Si namque obiectum non inueniat in quod agant, inimicæ qualitatis impressum in partibus relinquunt vestigium, humores accendunt, & calori nativo ac spiritibus vim inferunt.

Quæ verò composita medicamenta solis cardiacis, roborantibus & speciali dote venenis aduersantibus, constant, omnibus temperaturis, & morbis, ac omni tempore conueniunt, vt puluis à nobis descriptus, cuius vires sunt insignes ad pestis & malignorum affectuum expugnationem & partium nobilium tutelam.

Datur verò vel cum aqua, vel cum decocto cordiali, aut conserua idonea: vel est excipiendus syrupo Kermes, vel limonum, vt in formam Opiatæ concinnetur. Poterit & cum melle in aquis cardiacis despumato, in Electarij liquidi formam coagmentari, & in Officinis reliquarum confectionum more seruari. Vires habebit excellentiores si lapides pretiosi, cornu monocerotis, & lapis Bezar addantur. Facile puluis hic parari potest, & simplicia, quibus constat, haberi.

Mirum in modum confert morbis venenatis, contagiosis, & pestilentibus expugnandis, & principibus partibus recreandis, & tuendis.

Viros.

Pulvis antilyssos, seu contra rabiem. Des. Iul. Palmarij.

CAPUT XV.

<i>Rx Foliorum ruta,</i>	<i>mentæ,</i>
<i>verbenæ,</i>	<i>artemisiæ,</i>
<i>salviæ minoris,</i>	<i>melissophylli,</i>
<i>plantaginis,</i>	<i>bethonicæ,</i>
<i>foliorum polypodii,</i>	<i>hyperici,</i>
<i>absynthij vulgaris,</i>	<i>centaurij minoris, an. m. i.</i>

Omnia ex arte siccentur, & in tenuissimum pulverem reducantur.

COMMENTARIUS.

Alexiteriū hūc pulverem desumpsi ex clarissimo viro Iul. Palmario *Cap. 3.*
 Med. Paris. qui septem libros de morbis contagiosis edidit, cuius *lib. de*
 eximias dotes & mirandos effectus non modo ipse fœliciter, ac mul- *mors.*
 toties in multis expertus, est, sed etiam Dominus De Pyrou, à quo *canis*
 priorem illius fatetur habuisse descriptionem. Quotquot enim à ra- *rab.*
 bidis canibus demorsi hoc pulvere vti sunt, ab hydrophobia immi-
 nenti, vel iam incepta fuerunt immunes & omnino liberati, modò
 nulla capitis pars dentibus superior, vt nec alia frigida abluta; Tunc
 enim in remediis exigua salutis expectatio.

Præparatio Antilyssum autem pulverem hunc nominauimus, quòd insigni
 virtute & nulli secunda rabiem arceat, vulnera à cane rabioso infl-
 cta sanet, & terrificum illud symptoma quo miselli reformidant a-
 quas, impediat.

Præparatio tam celebris antidoti perfacilis est, in qua hæc tria
 maximè obseruanda, vt simplicia colligantur, quo tempore viribus
 pollent maximis, medio scilicet aut fine veris, vt nec in sole æstuan-
 te, nec in vdo loco siccanda reponantur, vt siccata seruentur, sed ea
 lege, vt quotannis renouentur.

Porrò minimè datur opus magnam huius eximij pulueris quanti-
 tatem in pharmacopoliis seruare: Sat enim est in rem præsentem si
 libra dimidia in vasis idoneis recondatur: Materialia vero seu sim-
 plicia quibus constat, copiosa esse debent; Et artificiosè siccata,

chartaceis facculis excipienda, ac loco idoneo reponenda, ne à mufcis & fordibus conſpurcentur, vel à muribus erodantur. Utendi autem tempore atque exigente neceſſitate, ſingulorum æquum pondus in tenuiſſimum puluerem læuigabitur, cuius ꝓ ſ. aut ꝓ i. quotidie mane tribus horis ante cibum dabitur ex cochleari cum duplo ſaccharo, vel ex iuſculo, aut alio liquore idoneo, vt vino, pomaceo, vel etiam ex melle in formam Opiatæ.

Et licet dragma integra aut duæ ſatis ſint pro doſi etiam homini robusto, poterunt tamen aliquando tres, vel etiam maior quantitas exhiberi, ei maximè qui iamdiu fuit à cane demorſus, vel iam hydrophobia correptus.

Canceræ
pulvis.

Eximius quidem eſt hic pulvis, ſed efficaciorem multo ducerem, ſi pimpinellæ & cancerorum fluuiatilium vſtorum pulvis commiſceatur. Alyſſum quoque cæteris omnibus præferri illius nomenclatio portendit: Sic enim à Dioſcorid. & Gal. vocatur, quòd rabiei medeatur, ipſuſque venenum deleat & extinguat.

Alyſſum.

Verùm hæc planta non multum vulgaris eſt, & à paucis cognita, præſertim quæ hoc nomine à Galeno donatur, aſpectu Marubio valde ſimilis, ſed in ſingulis geniculis è quibus folia emergunt, bina admodum criſpa, incana & ferè inodora, calyces ſpinoli caulicos verticillatim ambiunt. Hanc ſæpè vidi in horto ſcholæ Pariſienſis.

Aliud quoddam Germanicum Echioides dicitur facile Molluginis Apparine Plinio putatum, cui Galenicum prætulerim. Qui altero caret, alterum ſolet ſubſtituere.

CROCUS MARTIS.

CAPUT XVI.



CROCUS Martis ſic dicitur partim à materia, ſeu Scoe chalibis, vel ferri, quod Marti tribuitur, partim à colore qui crocum eſt. Eius præparationem multiplicem agnoui: ſinguli enim ſuo modo parant, ac ferè omnes ea in re diſſentiunt: vnde multi eiſmodi apparatus tanquam inutilem vel neglexerunt, vel improbarunt: Et re vera pro

Croco martis ſolam ferri limaturam, nulla vſtione & ablutione alteratam Riuiſius exhibebat, hancque illo efficaciorem, tutiorem & fœdis virginum coloribus ſanandis conuenientiore afferebat. Eius tamè tanquàm temerarij periclitatoris, qui de corio humano ſæpeluſit, methodum medendi qui ſequeretur, morbis ipſis eſſet formidoloſior.

Vulgaris
chalibis
præparatio.

Duas autem præ cæteris vſitatas Croci martis præparationes comperi; Prior ſatis vulgaris eſt, & pharmacopolis familiaris, qui limaturam chalibis ſemel atque iterum, vel etiam pluries in crucibulo vrun-
t, & toties abluunt, partim in aceto, partim in aqua roſacea, aut alio liquore idoneo: Poſtea exſiccant: efficiuntque puluerem ſub-
ruſſum & ponderoſum, quem præparatum chalibem nuncupant.

Spagyrica
chalibis
præparatio.

Secunda eſt Spagyricorum, qui puluerem ipſum ex ſe grauiffimum arte ſua volatilem efficiunt. Ad eius autem apparatus hoc procedunt modo: Ac primùm quidem limaturam chalibis, & aliquando ferri: vtriuſque enim qualitas vix diſſimilis, aſſumunt: in igne reuerberij diem vnum, aut alterum adurunt: Deinde vbi amouerint, in aquam coniiciunt: Quod ſupernatat aſſumunt & ſeruant: Tum abie-
cta aqua, quod in fundo remanſit, denudè ad ignem reuerberatoriũ iniiciunt, aduruntque vt prius, & poſtea in aquam demittunt, vt antè, cui quod ſupernatat ſeruant. Et ſi quid eius fundum petierit, rurſus cremant, donec aquæ demiffum non ſubſidat, ſed in iplius ſuperficie maneat, quod tandem colligendum, ſiccandum & ſeruandum pro Croco martis optimo, & Chymiatriſ vſitatiffimo.

Alius præ-
parandi
modus.

Hoc quoque modo nonnulli parant. Limaturam ferri catino exceptam igne validiſſimo excandefcere permittunt: vbi refrixerit, in mortario ferreo laborioſè terunt: Deinde abluunt, vt cum aqua pars ſubtilior ſepareretur. Craſſior iterum igne reuerberij vrgetur, & calcinatur; Atque poſtea teritur vt prius. Idque iteratui ſepties, vel etiam ampliùs donec tota limatura abierit in croceum læuorem.

Varij modi
præparandi
Crocum
Martis.

Nonnulli ſcobem ferri ante calcinationem muria pluries lauant, poſtea acetum aſſundunt: Alij vrina abluunt & macerant: quidam ſalem ſubiiciunt: Alij tartarum: Multi cum ſulphure adurunt; Sunt & qui ſcobem in rubiginem conuertunt: ſed vt curioſæ nimis ſunt illæ præparationes, ſic & ferè inutiles: Præſtatque in optimâ quadam conſiſtere, quàm inter tot ancipites vagari.

Notandum verò eſt ſcobem ferri non niſi tenuiſſimè elimatam ſumendam eſſe, quæ vbi igne reuerberij optimè calcinata fuerit, deinde trita, poſt in aquam demerſa & fortiter agitata, eius portio quæ ſupernatabit, colligetur, calore moderato ſiccabitur, nec rursus calcinabitur, ſed talis ſeruabitur: Portio verò craſſior ad ignem reuerberij denuo immittetur, quoad tota volatilis fiat. Sic erim ritè Crocus Martis paratur.

Præparatur adhuc cum ſulphure vel iplius oleo: Aliquando cum ſale in igne reuerberij, dein lotionem ſalfedo deletur. Nonnunquam & cum aquæ fortis octupla portione ad limaturam ſimul immerſam: Tumque per noctem fit digeſtio, & poſtea per alembicum aquæ fortis educio. Sic namque remanet Crocus Martis perruber. Cum autem Chymiatri quotidie nouos apparatus comminiſcantur, du-
buis

bis tyronum fluctuat animus, in quonam illorum debeat consistere.

Ex aliis adhuc metallis Chymiatrī Crocum parant, vt crocum stanni & crocum veneris, sed magis vt artifices periti videantur, quā vt felicius medeantur.


Crocus martis creditur iecur & lienem roborare, & viscerum obstructions tollere, proinde fœdis virginum coloribus conducere.

Vires.

Ex eo & aliis quibusdam pulueribus cardiacis pro medici prudentia præscriptis paratur Confectio quadam forma Electarij mol. Diaſtomoma. lis, aut tabulati, Diaſtomoma dicta obſtructionibus expediendis efficacissima, cui puluerem lumbricorum permiscant. Ego mallem absque puluere isto conficere, vt hoc modo.

℞. chalibis optimè præparati ℥ ij. cinnamomi ℥ β. Specierum Electarij triasantal. & de gemmis an. ʒ i. pul. dictamni ʒ β. cum sacchari in aqua melissæ soluti ʒ iiij. aut v. fiant tabellæ pondere ʒ iiij. aut ʒ β. quæ dentur manè ieiuno stomacho. Solet tabellis cardiacis maior sacchari quantitas adhiberi, sed tunc illarum virtus est inefficacior.

Tabellæ ad
fœdos co-
lores.



PARS ALTERA PVLVERVM

Officinæ necessariorum.



*P*riore Sectionis huius parte selectissimos pulueres cardiacos dedimus, eosque solum omisimus, qui vel hisdem valde sunt affines, aut prorsus similes, vel quorum descriptio nulla ratione fulcitur, & vsus non probatur, aut damnatur. Hac verò secunda parte, de his agere consilium est, qui quod frigidiores sint & dulciores, non quidem vt superiores, aromatici, sed bechici, aut thoracici solent vocari: Conueniunt enim tussi, pulmonum & totius thoracis affectibus.

Pulvis Diareos simplex. CAPUT X. VII.

*Rx. Ireos Florentiæ ʒ ʒ.
 sacchari candi,
 puluer. diatragacanthi frigid. an. ʒ ij.
 Fiat omnium pulvis confusè miscendus, & seruandus.*

COMMENTARIUS.

Author huius pulueris incertissimus est, vñtatissimus tamen vñsus. Solet autem conuenientissimè excipi saccharo, albumine oui in aqua tussilaginis, aut rosarum, vel scabiosæ, aut alius similis clarificato, vt decet cocto, & ad tabellarum seu lozengiarum, vt vocant, formam concinnato. Libra verò sacchari pro quaque vñcia pulueris ponenda est: Aliquando tamen vñciæ duæ sacchari singulis pulueris dragmis ponuntur: Sicque paratum Electarium n gratus quidem est, sed inefficacius: vt contra dum pro singulis pulueris dragmis sacchari tantum vñciam recipit.

Modus parandi ita facilis est, vt etiam ipsis tyronibus satis innotescat, nec opus est pluribus describere.

Vires:

Diarys plurimum valet ad faucium destillationem, ad humorum crassorum attenuationem, coctionem, & expectorationem.

Est alia compositio Diareos Solomonis nomine insignita, quæ quòd paratu sit difficilior, insuauior, nec efficacior, rarissimè paratur.

Pulvis Diatragacanthi frigidi. D. N. Myrepsi. CAP. XVIII.

℞. *Penidiorum* ℥ ij.
gummi tragacanthi ℥ ii.
gummi Arabici ℥ x.
amyli ℥ ℞.
sem. papauer. albi ℥ ij.
quatuor sem. frig. maior. mund.
glycyrrhizæ ras. an. ℥ ii.
caphuræ ℥ ℞.
 Fiat omnium pulvis.

COMMENTARIUS.

Pulvis hic à tragacantho nomen & basim habet, quòd cæteris præpollet in compositione. Multa autem recipit bechica, lenta, refrigerantia & lenientia, quibus N. Myrepsus primus illius author, semen urticæ attenuandis & expurgandis humoribus crassis valdè accommodatum adiecit, quia tamen compositionem, & colore, & sapore multum efficit ingratam, à recentioribus rectè emittitur, hæc enim ipsam alia multa reddunt satis commendabilem.

Servatur sub forma vel pulveris reliquorum more, vel Electarij tabulati, addita ad singulas pulveris vncias sacchari libra.

Semina quatuor frigida maiora in hoc Electario, ut hæc, & alia omnia oleaginosa in aliis omnibus diutissimè servandis, non nisi vendendi tempore debent permisceri: Cito namque rancescunt, & compositionem ingratissimam reddunt: ob id qui ritè pharmaceuticas leges servare voluerit pro totius compositionis vncia vna, pulveris omnis seminum quatuor frigid. simul ℥ ii. & gr. xiiii. sumet: seu singulorum gr. xiii. ℞. aut circiter. Verum hæc raro tam accuratè solent observari.

Omnibus pulmonum & thoracis affectibus calidis confert, maxime tæbe confectis ac macilentis, pleuritidi, linguæ & faucium asperitati, tussi, & sputo coquendo & expectorando.

Vires.

Pulvis Diapenidij sine speciebus. D. N. Myrep. CAP. XIX.

℞. Penidiorum ℥ij.
 nucleorum pineorum,
 amygdal. dulc. mund.
 sem. papauer. alb. an. ℥iij.
 succi glycyrrhizæ,
 gummi tragacanthi,
 gum. Arabici,
 sem. iiii. frigid. maior. mund.
 amyli an. ℥i β.
 caphuræ gr. viii.
 Fiat omnium pulvis.

COMMENTARIUS.

Diapenidiō
 sine specie-
 bus. Diapenidion vel paratur sine speciebus, vt formula descripta, vel cum speciebus, additis cinnamomo, caryophyllis & zinzibere, quo modo describitur à Myrepso primo eius authore. Sicque paratum Diapenidion cum speciebus nominatur. Æquali verò pondere dictæ species, amygdalæ, semen papaueris, & glycyrrhizæ succus ponuntur.

Præpara-
 tio.

Seruatur vel forma pulueris, vel Electarij solidi, quod authoris decreto sic conficietur. In aquæ libra, violarum vnciæ tres maceranda & coquenda, donec violaceum aqua colorem nanciscatur: In colatura coquenda sacchari libra vna ad consistentiam Electarij solidi, cui adhuc calenti, penidia & reliqua simplicia lauigata, ita permiscenda & subigenda, vt formam solidam ac idoneam acquirant, ex qua tessera, seu tabellæ quadratæ, vel rhomboides concinnentur, & vsui reponantur. Sic omnes vno fere consensu Diapenidion conficiunt, pauci tamen in simplicium proportionem conueniunt: Singuli enim singulorum pondus immutant, vsitatissima tamen hæc est formula quam exhibemus.

Parua autem quantitate pulvis hic apparandus, propter copiam seminum oleaginosorum, quæ seruata diu rancedinem contrahunt

ingratissimam, quam & associatis pulueribus impertiuert. Qui secus fecerit diapenidium quidem habebit, sed acriusculum & scopo authoris alienissimum: fauces enim acrimonia quædam vellicabit.

Valet tussiculosis, pleuriticis, peripneumonicis, asperitati faucium & asperæ arteriæ, raucedini, & vitiis pulmonum multis. Si cum speciebus paretur, præter enumeratos effectus, incidit, attenuat, & humores lentos, crassos, frigidos coquit, & ad expectorationem apparat.

Diapenidij
cum & sine
speciebus.
Vires.

Confectio de Rebecha. CAPUT XX.

*R. Puluer. Diaireos
diatragacant. frig. an. ʒ ii.*

pul. liquiritiæ ʒ ss.

sacchari candi ʒ iii.

sacchari albiss. lib. i. ss.

*Cum gummi tragacantho in aqua rosarum soluto,
fiat pasta, ex qua formentur bacilli vsui repo-
nendi.*

COMMENTARIUS.

Hæc licet Confectio sit authoris incerti, vñtatissima tamen est, sapore gratissima, & effectū commendatissima. Pulueres quibus constat, seorsim quidem seruantur, sed vbi miscentur simul, vel tragacantho aqua rosarum, vel alia conueniente soluto, vel saccharo humore quodam idoneo, liquato & cocto coguntur in massam, ex qua vel tesserae, vel pastilli, vel bacilli formantur. Inter autem pulueres bechicos annumerauimus, quod ex hisdem constet, & ad eadem vsurpetur. Quidam putant hanc Confectionem dici Rebecham, quasi bechicam; Est enim Bechicum insigne, quod cum olim imperarent medici, sicque præscriberent. ℞. bechi. Ignari coniunctim dixerunt Rebechi, dein Rebecha, vnde Confectionis huius nomen.

Optimè medetur tussientibus, asthmaticis, Empyicis, pleuriticis, linguæ & faucium asperitati, raucedini, & difficulter spirantibus.

Vires.

De Penidiis. CAP. XXI.

INter Bechica & Arteriaca multum commendantur Penidia, quæ medicamentum sunt ex paucioribus compositum. Constat enim

tantum saccharo, & aqua hordei ea proportionē & arte coctis, ut massa quædam exurgat admodum solida, & ita tractabilis, ut digitis non adhæreat, & faciliè in fila ducatur tenuiora, crassiora, breviora, aut longiora: Quod ut probè fiat, adhuc calens massa vncō ferro trabeculæ affixo adducitur, reducitur, trahiturque denuo quousque dealbetur, & ex filis dictis variæ figuræ ducantur.

Balcasis eius compositionis author ex aqua pura, saccharo & melle parabat, cum tantillo olei amygdalarum amararum commisto. Nunc verò aqua hordei sumitur, mel relinquitur, & marmor tantum super quod medicamentum adhuc calens proiicitur, & manus quæ id ipsum contrahant ac subigunt, oleo liniuntur, ut minus adhærescat. Rectè tamē oleo relicto, mellis despumati parū adijcitur: sic enim compositio corpus ductilius nanciscitur, facilius paratur, & vires habet ad effectus, quibus imperatur, accommodatissimas.

Alphenicū.


Ab albedine quam medicamentum hoc inter subigendum, & ducendum acquirit Alphenicum in Officinis nominatur. Penidium vero non inepte quibusdam dicitur, quasi pœna duorum, brachiorum nempe, quorum robore compositionis huius admodum simplicis moles tandiu trahitur, ducitur & reducitur quoad omnino candescat.

Penidium dici per contrarium sensum videtur, quod minimè *μενόν*, i. nigrum: vel quod parandum seruo committatur, qui *πένος* Græcè dicitur. Rhuf. cap. 539. lib. de nominib. Arab. fanid. vocat, aliis eiusdem nationis fœnic, & vulgus Alphenicum.

Est autem in ipso certus saccharum coquendi modus, per quem scilicet tota viscida humiditas non absumitur. Coctione enim longiore, seu perfectiore, ut vocant, lentior ille qui compositionem ductilem facit, discutitur: atque sic durior & fragilior reddita, ad formam, & vires medicamenti requisitas ineptior euadit. Tractabilior autem erit & paratu facilior, si parum mellis despumati permisceatur, ut diximus.

Plurimum confert tussi, rancedini, arteriæ asperitati, sputo mouendo, coquendo, excludendo, & omnibus affectibus pulmonum & thoracis.

Vires.



SECTIO SECVNDA.

De Antidotis humidis.



*B*x pulueribus descriptis, vel aliis cardiacis & venenis resistentibus, aliquo liquore idoneo dilutis, Confectiones quædam sunt molles, quæ nunc Antidota humida, nunc Opiata, nunc Confectiones cardiales vocantur. Earum verò aliæ vel cardiacæ sunt tantum, quæ spiritus & partes vitales recreant, aliæ alliotica & hypnotica, quæ simul alterant, & somnum conciliant. Aliæ verò theriacales, quæ doctos quidem effectus præstāt, & virus si quod sit, oppugnant & expugnant. A veris autem cordialibus auspiciari statuimus, cuiusmodi est.

Confectio AlKermes. D. M. CAPVT I.

Rx. Succipomorum fragrantium,
aquæ rosar. odoratiss. an. lib. i. β.

Infunde per diem integrum
perici crudi lib. i.

In expressione forti adde
succigranorum kermes lib. i.
sacchari lib. ij.

Coque ad cōsistentiam mellis, aut paulò minùs.
Mixture ab igne sepositæ, & adhuc calenti ad-
dito

ambre crudæ minutim incise ʒ ii.

quibus optimè liquatis iniicito

puluerum cinnamomi,

ligni aloes an. ʒ vi.

lapidis lazuli, vsti & loti,

margaritarum pellucidarum an. ʒ ij.

foliorum auri ʒ i.

moschi ʒ i.

Fiat Electarium molle, vase vitreo ritè obturato seruandum.

COMMENTARIUS.

Pharmacopolarum maior numerus sericum, succo granorum infectiorum, seu Kermes recens tinctum in aqua rosacea, & succo pomorum infundunt: Mauult tamen Ioubertus, in cuius sententiam descendo, crudum sericum in dictis liquoribus ante infundere. Dein expressioni factæ succum Kermes adiacere. Sic enim minor fit iactura, & facilius setæ virtus, si quæ sit, seorsim, ac ante tincturam, per infusionem elicitur. Et licet Mesue primus eius author aliter statuerit, ab eo tamen, ut alio quouis authore discedere fas est, dum nil peccatur, aut susceptæ rei executio melius, vtiliusque perficitur. Magis igitur his assentior, qui sericum crudum, nec infectum in aqua rosarum, & succo pomorum macerant, & expressioni postea Kermes succum adiaciunt.

Prudenter verò in Antidotario Romano vnciæ tantum quatuor setæ macerantur, cum & ipsa nullo compositionis dispendio possit omitti. Ut enim refractarij, sic nimium creduli nomen odi, nec quidquid dicitur aut scribitur, menti præcipitanter adhuc inhæsit: Nam ut libere fatear, sericum cum sit excrementum sordidi cuiusdam infecti, vix eò adduci possum, ut credam, tot ipsum pollere dotibus, quot illi antiquior ætas tribuit. Scio quidem nec lutum viribus destitutum: nec cymices & animalium pilos, vngues, stercore à pharmacopoliis ableganda, sed quibus cardiaca virtus iners est, acris verò & molesta qualitas efficacissima sæpè. Sed de Serico postea fusiùs & aptiùs suo loco. Redeo nunc ad nostram Confectionem, in qua lapis Lazuli ponitur, sed non eo modo quo in pilulis, quæ ab ipso nomen habent. Illic enim crudus ponitur, ut remaneat purgatoria facultas: Hic, vltus, ut ipsa pereat: In utroque pulueratus, pluriesque lotus, ut vomitoria vanescat, remaneat cardiaca ac roborans.

Lapidis lazuli præparatio.

Vritur autem in Crucibulo, seu olla parua fictili, dein teritur, & multoties in aqua primum communi, dein cardiaca, ut rosacea vel alia conuenienti abluatur, totiesque siccatur, atque rursus ablutio iteratur donec aqua limpida post lotionem remaneat.

Pretiosa quidem est hæc compositio, sed non ita operosa, ut pharmacopœa Augustana testatur, illiusque ut reliquarum, idem est, aut parum dissimilis parandi modus. Solumque dissentiant nonnulli in serici tinctura, ut dictum est, & in moschi pondere quod quidam augent, alij minuunt. Si desit lignum aloës, santalum cicrinum substituendum.

Confectio-
nis alker-
mes virtus.

Ad multa autem efficacissima est. Medetur enim cordis palpitationi, animi deliquio, delirio & mœrori sine causa manifesta, multumque prodest languidis, morbo longo defessis, & ab eo reualescentibus.

Confectio

R. Hyacinthorum,
 corallirubri,
 terræ lemnia,
 boli armen. an. ℥ ss.
 granorum kermes,
 rad. tormentilla,
 dictamni,
 sem. citri mund.
 croci,
 myrrhae,
 rosar. rub.
 santal. omnium,
 opis de corde cerui,
 cornu cerui vsti,
 rasuræ eboris,
 sem. acetosæ,
 portulacæ an. ℥ i.
 saphyrorum,
 smaragdorum,
 lapid. Topazj,
 margaritarum,
 serici crudi,
 bracteolarum auri
 argenti an. ℥ ij.
 caphuræ,
 moschi,
 ambre griseæ an. gr. v.
 cum syrupo limonum fiat Confectio.

COMMENTARIUS.

Posterior ætas Confectionem hanc adinuenit, quam clarissimam Scholæ Monspeliensis Medici, à quibus primum videtur vsurpata & celebrata, frequentissimo habent in vsu. Ei autem solùm nomine tenus conuenit, quæ sectione prima Luminaris maioris, cap. de hyacintho vocatur, sub authoritate principis Auicennæ, cum ambæ nulla alia in re inter se conueniant. Quæ ab Auic. describitur tr. i. summ. i. lib. 5. tanquam inepta negligitur. Quisquis vero fuerit huius author primus, optima medicamenta selegit, & optima methodo ac compositionis ratione simul conegessit in vnum: Proinde nihil immutandum censui nisi forsitan ebur, quod ego malim crudum, quàm vstum, & Sericum, quod libenter detraherem, aut tinctum succo Kermes ponerem.

Nec per ignem alicuius cornu excrementitius humor solùm absumitur, superstite primigenio, vt nonnulli chymici credunt, cum ignis sit rationis expers, & æquè in hunc & illum suas vires exerit, quas quæ magis sunt aërea citiùs experiuntur, sed etiam insitus & radicalis, maximè cum vim ignis tertij gradus, aut secundi longiùs producti perpeffus est.

Sunt qui pondus quorundam maius requirunt, quibus per meliceat, parum vel augere, vel minuere, cum mixturæ virtus nihilo sit inefficacior: Quod enim parum differt non differre videtur.

[Vires.

Plurimum valet ad effectus cordis & partium nobilium: Syncopem sanat, cor exhilarat, palium emendat, oris halitum commendat, melancholiam, & ei connatam tristitiam sine causa manifesta tollit, morbis contagiosis & venenatis medetur, atque eosdem quos cocci baphicæ Confectio præstat.

Rosata nouella. D. N. Myr. CAPVT III.

℞. Rosarum,
 zuechari,
 glycyrrhizæ an. ℥ ix.
 cinnamomi ℥ ii.
 caryophyllorum,
 spicæ Indicæ,
 zinziberis,
 galangæ,
 nucis moschatae,
 Zedoariae,
 styracis calamit.
 cardamomi,
 apij an. ℥ i.

Fiat omnium puluis, cui addatur mellis despumati quantum sufficit, ad Opiatæ, seu Electarij consistentiam.

COMMENTARIVS.

Hæc confectio rosas admittit probasi & nomenclatura, & aromata multa, tum ad crassos & frigidos humores tenuandos & concoquendos, cum ad spiritus recreandos, & calorem roborandum. Bechica quoque nonnulla ad sputum mouendum, & promouendum. Seruatur aliquando sub forma pulueris, sed frequentius Electarij mollis seu Opiatæ. Omisimus aliquot & scrupulos, & grana ponderibus maioribus vix probabili ratione addita, quæ si quis voluerit superaddere, nihil vt compositioni adferet detrimenti, sic nec utilitatis.

cap 214
sect. 1. Rosata nouella in becillum ventriculum roborat, nauseam sedat, flatu discutit, appetentiam excitat, coctionem iuuat, humores lentos incidit, colico dolori medetur, vomitum compescit, stomachi & cordis in becillitati succurrit, inquit Myrepsus.

Rosatæ nouellæ vires.

Confectio de Baccis Lauri. CAPUT IV.

℞. Folior. rutæ siccorum ℥ x.
 sagapeni ℥ iiii.
 opoponacis ℥ iiii.
 baccarum lauri,
 seminum anecos,
 cumini,
 ligustici,
 nigellæ Romanæ,
 dauci,
 carui,
 piperis longi,
 piper. nigri,
 acori,
 amygdalar. amar.
 origani,
 mentastri,
 castorij an. ℥ ii.
 mellis despum. q. suff. fiat Opiata.

COMMENTARIUS.

In hac Confectione ponuntur bacca lauri, à quibus denominatur, folia rutæ, origani & mentastri ad basim constituendam: Semina calida multa & incidentia ad lentos humores attenuandos, frigidiores calefaciendos, & ad flatus dissipandos: gummi ad deterfionem & discussionem: mel ad puluerum exceptionem, conseruationem, actionem compositionis efficacioris & suauioris.

Gummi nullo liquore soluenda, quòd pauca sint, ex exigua quantitate præscripta, sed minutim incidenda, & cum reliquis pulueranda, dein omnia melle despumato, & adhuc calente excipienda, atque in opiata spissitudine m cogenda.

Vires.

Conuenit colico dolori ab humoribus crudis, & à flatibus orto, tympaniti, borborygmo, acidum iuctantibus, & frigidis naturis.

Antidotus Diasatyricon. CAP. V.

℞. Radicum Satyrj recentium & succulentorum ℥ij.
 radicum pastinacæ sativæ,
 eringij
 nucis Indicæ an. ℥i.
 pinearum,
 pistachiorum an. ℥i℞.
 caryophyllorum,
 zinziberis,
 anisi,
 seminis erucæ,
 linguæ avis, i. seminis fraxini an. ℥v.
 cinnamomi,
 lumborum Scincorum,
 seminis bulbi, aut Vrticæ an. ℥ij℞.
 moschi gr. vii.
 mellis in decocto radicum præscriptar. despum. lib. iii.
 Fiat ex arte Conditura, Opiatæ consistentiæ.

COMMENTARIUS.

Multæ Diasatyrij traduntur descriptiones, quarum hæc ut præstantissima, sic vltimatissima est, & ad effectus quos pollicetur vtilissima. Cum autem Satyrj multa sint genera, Monorchis, seu quod vnicum habet testiculum, debet seligi, atque primo Vere dum multo succo turget.

Siferis quàm Eringij potiùs radicem nonnulli ponunt, sed parum refert, an hæc, vel illa ponatur, cùm affines habeant vires, quas sanè non tanti facio, quanti practantium vulgus: Rustici enim diebus ferè singulis vtramque esitant, etiam ad saturitatē, nec propterea falaciores. Eruca plaris dicitur, quæ etiam valdè pigros ad venerem excitat maritos. Scinci tamen omnium potentissimè æstrū Veneris accendunt, sed lumborum carnem caudæ prætulerim. De bulbi verò semine dubitati est, cùm nondum quispiam medicus explicitè docuerit, cuiusnam bulbi semen inter tot ipsius varietates su-

mendum sit. Proinde semen vrticæ, quod proposito apprimè congruit, in illius locum substituo.

Præparatio. Paratur verò sic: Coquantur primum radices in aqua sufficienti donec tabescant: deinde pistentur, & per setaceum transmittantur: Tum melli despumato ac cocto permisceantur, atque denuò parùm feruefiant igne lentissimo: ad aqueæ humiditatis absorptionem: Postea addantur strobili & pistachia primum minutim incisa, dein vt cætera læuigata, ita tamen vt moschus seorsim teratur, & vltimò vel confusè cum cinnamomo misceatur. Vetus descriptio iniquè pondus æquum radice pastinacæ & Satyrionis habet: Illa enim cum sit insuauior, & scopo minus apta, minore quoque copia sumenda.

**Diasatyrion
vires.**

Diasatyrion semen auget, venerem stimulat, veretri tentiginem excitat, ac libidinis motus sopitos & languidiores mouet: Contra vesicæ & renum imbecillitatem valet, & vires reficit.

Antidotus Analeptica. D. Fernel. CAP. VI.

*R̄. Rosarum,
glycyrrhizæ, an. ℥ ii. gr. v.
gummi Arabici,
tragacanthi an. ℥ ij. & ℥ ij.
santali albi,
santali rub. an. ℥ iij.
succiglycyrrhizæ,
amylī,
seminum papaueris albi,
portulacæ,
lactucæ,
scariolæ an. ℥ iij.
quatuor seminum frigid. maior.
seminum citoniorum,
maluæ,
bombacis,
sem. violarum,
pistaciorum,
strobilorum,
amygdalarum dulcium,*

pulpæ sebesten,
storacis calamitæ, an. ʒ ij.

caryophyllorum,
cinnamomi,

scobis eboris an. ʒ ij.

croci gr. v.

penidiorum ʒ ss.

Trita, vt decet, omnia excipiantur triplo Syrupi vio-
lati.

COMMENTARIUS.

Antidotus hæc analeptica, seu Electarium restauratiuum, vt vocat Nic. Præpositus, à Fernelio celebratur, in eiusque descriptione nihil immutandum censuit, præter simplicium ordinem, & berberis grana, quorum loco pistacia reposuit. Omisit tamen styracem calamintam, viribus commendatissimum, & huic confectioni utilissimum: Cuius parandi modus facilior est, quàm vt pluribus in eo declarando sit opus.

Antidotus analeptica vires exolutas restaurat, inquit Fernelius, animi deliquium & syncopem impedit, optimum corporis habitum longo sanguinis fluxu, aut alia quauis immoderata vacuatione extenuatum refarcit, macilentis & consumptis succurrit; humectando nempe, nutriendo & corroborando.

Vires.

Antidotum Asyncritum D. Actuar. CAP. VII.

Myrrhæ ℥ ii. & ℥ ii.
Opium ℥ vi.
piperis nigri,
sem petroselini an. ℥ v.
apij,
synapeos an. ℥ ℞.
iunci odorati ℥ iii.
amomi,
styracis calamit. an. ℥ ij.
bedycroi magmatis ℥ i. & ℥ ii.
cassie lignæ, seu canellæ,
piperis albi,
seseleos an. ℥ i. & ℥ i.
mellis despumati quant. suff. fiat opiata.

COMMENTARIUS.

Vocatur hoc Antidotum ab Actuaria Asyncritum, hoc est, in-
 comparabile, quod virium præstantia nulli cedat, aut postponen-
 dum veniat. Ut ex mente authoris ritè paretur, Opium in sapa dul-
 ci macerandum, donec mellis consistentiam habuerit: Styrax melle
 diducendus: dein reliqua arida puluerata commiscenda. Pro cassia
 Ægyptia quam ponit author, cassiam ligneam seu canellam vulga-
 rem optima ratione, & doctorum consensu posuimus, non fistulam
 ac purgatoriam quam passim Actuarius nigram appellat, nulla in re
 Antidoto præscripto conuenientem & accommodatam.

Antidot.
 Asyncriti.
 mixtæ vires.

Hoc Antidotum veteres capitis dolores sedat, inquit Actuarius, ver-
 tiginosos & comitiales affectus mitigat, peruigilias sopit, & furo-
 rem ac desipientiam constringit, magnum oculorum dolorem mul-
 cet, defluxioni, dentium dolori, difficultati respirationis, & omni
 causæ suspirij auxiliatur: Veterem tussim sedat, pulmonis, laterisque
 inflammationi, & siccæ & humidæ medetur, omnem pulmonis hu-
 miditatem exhaurit, sputa tenuia densat, excretaque facilia red-
 dit.

Stomacho

Stomacho præfenti est auxilio, huius si quidem humidam laxitatem astringit, cibi fastidia leuat, singultum tollit, non retentos cibos ob vomitionum impetus sistit, omnem stomachi & ventris inflationem in ructus soluit, ictero prodest, melancholiæ morbo conuenit, & eius tristitia, ærumnosaque symptomata leuat, lienis grauitatem submonet, faciei colorem reddit, obstructions tollit, vrinam mouet, arenulas deturbat, vteri calamitatibus & colico dolori medetur, atque aliis pluribus affectionibus, si modo verum sit, quod clarissimus vir Actuarius, literis de hac Opiata, mandauit.

Philonium magnum, seu Romanum. CAP. VIII.

℞. Piperis albi,
 cassiæ lignea,
 cinnamomi an. ʒij.
 euphorbij,
 pyrethri an. ʒ ss.
 Zedoaria,
 spica nardi an. ʒ ij.
 sem. hyosciami ʒ ss.
 opij ʒ ii. ss.
 croci ʒ ss.
 castorij,
 myrrhæ an. ʒ i. ss.
 seminum apij,
 fœniculi,
 dauci,
 perroselini an. ʒ i.
 mellis optimi de spumari quant. suff. fiat Opiata.

COMMENTARIUS.

Nihil tam anceps ac varium in medicamentorum familia, atque Philonij Philosophi Antidotum, cui simile accidit atque vino, quod è vase in vas transfusum, nō paruā prioris conditionis iacturam fa-

cit. Quotquot enim extiterunt pharmacariæ artis authores, nomen quidem Philonij retinuerunt, sed nihil ferè præterea. Vnus Gal. probauit quidem, sed alia multo celebriora & præstantiora, vt ipse loquitur, subscripsit. Myrepsus quatuor eiusdem nominis antidota dedit, quorum alia opium admittunt, alia dimitunt: De cæteris vix inter se similia, & parum Philonij Tarsensis medicamento conuenientia. Nicolaus Præpositus pauca quadam ex priore descriptione detraxit, alia multa adiecit, & simplicium ordinem, & pondus immutauit. Nonnulli costum, alij castorium, quidam semen papaueris addiderunt. Nos verò Præpositi descriptionem magis probamus, sed pro Costo, Castorium, opij verum castigatorium ponimus: simplicium ordinem aliter disponimus, & piperis, euphorbij & pyrethri quantitatem minuimus. Sic enim tutius & fœlicius dari poterit, absque inflammationis metu. Nonnullos enim aliquando vidimus conqueri de ingenti ardore ad imū ventrem, & intestinū rectum, ex iniecto clystere, in cuius sesquidragma tantum Philonij vulgaris fuerat dissoluta. Quod minimè mirum videtur, cū xvij. constet simplicibus, calidis omnibus, præter Opium, quod à multis calidum perhibetur, & hyosciamum: proinde vix potest deglutiri, quin fauces ardore & acrimonia plurimum afficiantur & lædantur. Sic verò à nobis emendatum tutò per os sumi potest, absque ventriculi, œsophagi & faucium oblæsione. Vocatur Romanum, quod multum fuerit Romæ celebratum.

Philonij
Romani
vires.

Datur pleuriticis, Colicis, vnde & Antidotus Colica à nonnullis dicta, & in omni dolore interno: Somnum conciliat, sanguinem ab internis fluentem sistit, nauseabundis mirificè prodest: dolores ventris, lienis, hepatis & renum ab intemperie frigida, flatibus & crudis humoribus obortos sedat, & singultum tollit.

Per os autem datur quantitate exigua, vt ciceris magnitudine, aut paulo minore, pro sumentis ætate & viribus: Atque pro scopis variis variè dissoluitur, aliquando in Oxymelite, aliquando in plantarum decocto, nonnunquam in vino. Actuarius dabat stomachicis cum hypocistidis succo & vino pauco.

Sæpius vero per anum iniicitur in aluum dilutum in decoctione enematum, quæ ad fœuissimos colici doloris cruciatus sopiendos ac parandos præscribuntur, quibus peculiari virtute mirum in modum confert.

cap. 4.
lib. 9.
comp.
med.
loc.

Opiata Salomonis. D. Iouberti. CAP. IX.

℞. Cortic. citri conditi lib. ℞.
 conseruæ rosarum veteris,
 conseruæ accrosæ an. ℥i ℞.
 conseruarum helenij,
 buglossi,
 mithridatij an. ℥vi.
 conseruæ anthos ℥℞.
 sem. contra vermes,
 sem. citri mund. an. ℥iij.
 cinnamomi ℥ij.
 caryophyllorum ℥i.
 radic. dictamni albi,
 cardui benedicti,
 cortic. citri sicci an. ℥i. & gr. xv.
 ligni aloes optimi ℥i.
 cardamomi,
 macis an. ℥ii. & gr. xv.
 radic. gentianæ ℥℞.
 ossa è corde ceruorum n. iiii.
 grana iuniperi in aceto scillitico per noctem infusa n.
 xxv.
 sacchari solidi lib. ℞.
 Syrupi acetositis citri quantum est satis fiat Opiata.

COMMENTARIUS.

Hanc Opiatam sub nomine cuiusdam Salomonis, nullius in Medicina notæ describit, & ad multa commendat Ioubertus. Illius tamen authorem ὁ Σολομων, seu incertum dicit. Cum illa velut per manus à muliereculis tradita ad eum peruenerit, sed non parum deprauata, ut solet in his fieri quæ calamo, non typis exarantur. Potius er-

go Ioubertum quàm mulierculas aut Salomonem, nescio quem, auctorem voco, qui eam castigavit & ad meliorem formam reduxit. Si quis tamen voluerit ad ostentationem, & maius opiatae encomium, magni illius regis, qui Dei populo imperavit, nomine designare, non refragabor, cum & alia nomina sæpè fictitia, & vix ratione probabili inuenta medicamentis pluribus imponantur. Parâdi modus facilis est. Xyloaloës penuria fantalum citrinum sumi poterit, & pro radicibus cardui & dictamni, huius folia, & illius semina. Reliqua, nec rara, nec inuentu difficilia.

Opiatæ Salom. vires.

Mobis medetur pestilentibus & contagiosis, partes quæ principatum tenent roborat, putredinem arceat, vermes enecat, vomituri-entibus confert, & quavis ex causa languidis & imbecillis auxiliatur.

Electarium de Ovo.

C A P. X.

R. Croci ʒ i ʒ. aut ʒ ii.

Includantur cum vitello in oui putamine, altera tantum parte, per quam eductum est albumen, aperto, & postea alio putamine aut pasta occluso. Deinde assentur in clybano.

Ablata è testa materia tenuissimè pulueretur; cui adde

Dictamni,

Tormentillæ an. ʒ ij.

cornu cerui,

nucis vomica an. ʒ i.

angelicæ,

Zedoariæ,

granorum iuniperi,

helenij an. ʒ ij. ʒ.

cinnamomi,

macis an. ʒ i ʒ.

saphuræ ʒ i.

cheriacæ ʒ iii.

Misce omnia: contunde fortiter, & adde syrupi limonum quod satis erit. fiat Electarium.

COMMENTARIUS.

Non minus est incerta huius Electarij descriptio, quàm authoris primi nomen: Nullibi enim satis constat de utroque. Nec ad eò rudis est Seplasiarius, qui non gloriatur optimam illius descriptionem tenere. Multas quidem vidi, nusquam tamen duas consimiles. Omnium maximè probanda, quæ à Medicis Augustanis euulgatur. Nonnulla tamen vix toleranda, nam cum ingredientia, ut loquitur vulgus, pauca sint, & pauca quantitate præscripta, illis tamen caphuræ vncia dimidia commiscetur, & Synapi ad pondus croci & vitelli oui, simul vstorum ponitur. Neutrum autem ea proportionem tolerandum, cum hoc calidissimum sit, & neutiquam cardiacum: illa cardiaca quidem, sed odoris grauis, nec nisi parua quantitate suaui. Præterea, iubent illi clarissimi viri pulueres, & theriacum simul permisceri sine intermedio melle, aut syrupo, sicque non opiatam, sed pastam quavis catapotiorum massa solidiorem. Ex ea autem Synapi ut noxium, & pimpinellam ut inutilem detraximus, helenium, macim & cinnamomum, ut cardiaca & bezeardica adieciimus, caphuræ dosim legitimanam posuimus, theriacæ quantitatem idoneam, & syrupum omnibus excipiendis, & subigendis aptissimum docuimus. Debet verò sumi gallinæ ouum recens, magnitudinis mediocris, per cuius apicem alterum perforatum educatur albumen, intus remanente vitello. Quod vacuum erit, croco orientali non puluerisato impleatur, dein superposito alio putamine, aut pasta, ut ferè fit occludatur, ne quid transpiret: tum vel in furno, vel in fornace igne lento assetur ad testæ nigredinem, ut quæ intus conclusa sunt, abiectis putaminibus, faciliè queant puluerari.

Nonnulli nucem vomicam reformidant & improbant, quod felibus & canibus deleteria sit, ac præfens venenum, hominibus ventriculum subuertat. Sed huic dubitationi multoties satisfecimus, nam brutorum natura longè distat ab hominis conditione, cui sæpè venenum est, quòd illis pabulum familiare, & contra: Coturnices vescuntur Eleboro, & Sturni cicuta à quibus homo enecatur: aloë & amygdalæ amaræ enecant vulpes, homo illis utitur ad salutem. Præterea nux vomica cum vim habeat alexiteriam, & vomitum proritatem magis confert, nam morbis contagiosis vomitus mirificè prodest, maximè vero his, quibus prima regio corporis prauis humoribus scatet; Sic enim partibus præcipuis maligna colluie liberatis, facultates sunt vegetiores, & ad virus oppugnandum alacriores.

Rarus autem hucusque fuit in Gallia huius Electarij vsus, sed post hac frequentiorè spero, si nostræ emendationis ratio agnoscatur, & iuxta descriptionem à nobis traditam conficiatur, quæ sic efficacissimas vires habet, & ad pestis curationem commendatissimas. Est enim quædam velut parua Theriaca quam recentiorum inuenit sedulitas.

Vires.

Electarium de ovo plurimum laudatur ad præcautionem & curationem pestis, & morborum pestilentium. Datur vel per se, vel cum aliqua conferua, aut aqua vel decocto cordiali.

Mithridatium Damocratis ex Galeno. CAP. XI.

<p>R Myrrhæ optimæ, croci, agarici, Zinziberis, cinnamomi, spicæ nardi Ind. thuris masculi, sem. thlaspeos an. 3 x. seseleos massiliens. opobalsami, vel olei, nucis moschatae, schoenanthi, stœchad. arabicæ, costicandidi, galbani, terebinthinæ, piperis longi, castorij, succi hypocistidis, styracis calamintæ, opoponacis, folij an. 3 i. cassiæ lignæ, polij montani, piperis albi, scordii, sem. dauci Cret. carpobalsami, aut eius loco, cubebarum,</p>	<p>trochiscorum Cypheos, bdellii, an. 3 vii. nardi Celticæ, sem. petroselini macedon. gummi Arabici, Opii, cardamomi minoris, sem. fœniculi, radicis gentianæ, rosarum, Dictamni Cretici, an. 3. v. anisi, aristolochiæ rotundæ, acori, yreos Florentiæ, phu, sagapeni, an. 3 iii. meu Athamantici, acaciæ, sem. Hyperici, ventris sciinci an. 3 ii. B. Vini maluatici, vel alterius, generosi lib. i. B. vel q. suffi- cit gummis, liquoribus & suc- cis diluendis, mellis optimi de- spumati triplum, seu lib. ix. & 3 viii. fiat Opiata in vase ido- neo reponenda.</p>
---	---

COMMENTARIUS.

Solemnis hæc Antidotus à Mithridate rege Ponti & Bithyniæ, eius inuentore cognominatur: hic enim simul & generosissimus erat monarcha & doctissimus, qui duarum & viginti nationum idiomata varia intelligeret & exprimeret, & medicamentaria materia cognitionem haberet, ex qua nobilissimam confecit Antidotum aduersus venena, à quibus maximè sibi metuebat. Eius autem longo usu, ab omni virulenta & deleteria qualitate vixit immunis: Nam superatus à Pompeio, & veritus ne ab eo viuis Romam duceretur in triumphum, venenum sumpsit, à quo cum ne quidem minimum molestiæ sensum sensisset, ac vitæ perasus diuturnioris, quemdam vocauit militem nomine Bituitum, rogauitque vt ipsum interficeret. Atque cum id ægrè & segniter peragere tentaret, eius trepidantem manum in suam cadem adiunxit: sicque seipsum traiecisse dicitur. Porro inter illius thesauros & spolia, Scrinium erat commentationum medicarum, quas ipse rex, arcanorum curiosissimus accuratè seruabat. Eas autem Pompeius Romam detulit, deditque Medicis Romanis, vt Damocrati & Andromacho, qui singula remedia probarunt, maximè verò Mithridatium, quod versibus Latinis reddidit Damocrates, ne immutaretur, ab eoque nunc cognomen habet, vocaturque Mithridatium Damocratis, licet eius non fuerit author, sed transcriptor aut celebrator. Aliud non multum dissimile sub nomine Andromachi à Gal. traditur, sed minus eleganti ordine dispositum, & nonnihil deprauatum. Incertam namque dosim habet folij gentianæ, meu & cardamomi: atque bis repetit nardum sub duabus appellationibus, quæ idem significant. Præterea omituntur alia quædam simplicia huic Antidoto conuenientissima, vt carpobalsamum, aut succedaneum eius idoneum, dictamnus, piper album & longum, & bdellium. Verissimile est Andromachum ad nominis gloriam, priorem descriptionem immutasse, vel sibi vindicasse, vel similem inter Mithridatis secreta inuenisse, aut à Pompeio habuisse. Vt vt sit potius celebratur, & paratur ea, quam exhibuit Damocrates.

Mithridatium Andromachi quale.

Nec minus gloriæ cupidus fuit Nic. Præpos. qui pseudomithridatium ex simplicium farragine congestum, à Nic. tamè Myrepsō mutatum, descripsit, quæ magna ex parte, & idiomate barbaro enuntiauit, & confusè miscuit, & indebita proportionem & iationem disposuit. In summa multum difficultatis in præparatione, parum utilitatis in usu Antidotus illa pollicetur. Proinde illis relinquenda qui in N. Præpositi verba iurarunt, illumque non raro cecutientem, tanquàm cæci perpetuò sequuntur.

Mithridatium N. Præpositi quale.

Præcipua parandi difficultas ex peruestigatione, & electione simplicium pendet, quibus sæpè caremus, præsertim exoticis, raris & pretiosis, quorum loco plerumque succedanea cogimur subrogare, ut pro opobalsamo, oleum caryophyllorum, aut nucis moschatae, pro carpobalsamo cubebas aut semen lentisci, pro vino falerno, aliud generosum, pro melle Attico, nostras. Ex Antidot. Rom. radicem yreos Florentiæ addidimus, & pro Aro. quod nonnulli ponunt, alij omittunt, aristolochiam rotundam posuimus. Succum lacrymæ, gummi præter Arabicum, & thus, quæ teri debent, in vino maceranda sunt. Interea radices terendæ, dein reliqua eo ordine, quem centies docuimus. Gummi macerata parum feruescent, ut vinum absumatur. Tum & hæc, & pulueres lauigati, & per incerniculum transmissi despumato melli commiscebuntur. Sicque fiet Opiata, in vase idoneo reponenda, quotidie semel primo mense rudicula mouenda: secundo mense, bis in hebdomada: tertio semel: quarto ter tantum in mense: Sicque relinquenda, nisi sexto mense quæ denuo semel agitanda.

Vires,

Mithridatium aduersus venena & morbos contagiosos tutissimum ac securissimum est præsidium. Aliæ sunt eiusdem penè innumera vires, quæ cum sint lippis & tonsoribus notæ, in his recensendis non diutius immorabor.

Theriaca

R. Trochisc. Scillit. \mathfrak{z} xl viii. meu Athamansici,
 trochiscor. de viperis, nardi Celticae,
 magmatis hedychroi, amomi,
 piperis longi, phu pontici,
 opij an. \mathfrak{z} xxiiii. se. chamadryos Creticae
 rosarum siccarum, foliorum malabathri,
 yridis Illyrica, calchitidis vsta,
 succi glycyrrhiza, terra lemnia,
 sem. buniados dulcis, radices gentiana,
 scordij, sem. anisi,
 opobalsami, succi hypocistidis,
 cinnamomi, carpobalsami,
 agarici, an. \mathfrak{z} xii. gummi Arabici,
 myrrhae, seminum foenuli,
 costi odorati, cardamomi Idaei,
 croei Corycij, seseleos, thlaspi
 castiae lignae, ammeos,
 nardi Indica, comarum hyperici,
 schoenanthi, acaciae,
 thuris masculi, Saapeni, an. \mathfrak{z} iiii.
 agliae I. piperis albi, castorii,
 piperis nigri, radices Aristol. tenuis,
 foliorum d. Etamni, sem. dauci Cretici,
 marrubii virentis, bituminis Iudaici,
 Rhabarbari, vel Rhei pontici, coma cetaurii minoris
 stachados, opoponacis,
 sem. petrosel. maced. galbani optimi, an. \mathfrak{z} ii.
 calamini hes montana, viri generosi, q. suf. suc.
 terebinthinae Chia, liquor. & gum. diluen.
 radic. pentaphyli, mellis Narb. aut alius
 Zinziberis an. \mathfrak{z} vi. optimi triplu, seu l. 14 B
 polii Creens. mel q. s. fi. Op. ex arte
 chamaepit. hyos, in vase idoneo repetenda,
 styracis calamintae, & ser. ad futuros
 vsus.

COMMENTARIUS.

Non ineptè quidam Mithridatium medicamentorum patrem, & Theriacam, matrem appellant, quæ scilicet dignitate & efficacia reliquis medicamentis antecellant, & vires omnium complectantur: Vix enim affectio præter naturam datur aliqua, cui alterutrum, ut decet paratum exhibitum non conferat.

Vtriusque non immeritò perhibetur author Mithridates, quòd materiam inuenerit & congesserit, ex qua conficiuntur ambo. Andromachus & Damocrates eandem solum in meliorem ordinem disposuerunt, & pauca quadam adiecerunt, sicque ut ex Adamo Eua, ex Mithridatio Theriaca habuit originem. Sic verò primùm à Critone nominata est, à vipera, quàm Græci *Θύπλον* vocant, cuius carnem ex arte præparatam, quam postea docebimus, Andromachus imperatoris Neronis archiatros Mithridatio addidit, ut eius virtutè quo ante hanc commixtionem, ad ferarum & serpentum morsus venenatos erat iners & imbecilla, redderet efficacissimam, sicque ex Mithridatio Theriaca facta est, præsentissima venenis medicina, à qua medicamina, quæ virus quoddam extinguunt, seu venenis obstitunt theriaca, seu theriacalia nominantur. Laudanda autem plurimum Andromachi sedulitas, qui hæc duo Antidota quasi informia exornarit, in optimam formam digesserit & celebrarit: Ad cuius imitationem posterior ætas multas eiusdem nominis compositiones seu theriacas descripsit, quibus officinæ pharmacopœorum quorundam non ornantur, sed onerantur ipsi.

Omnes autem Theriacæ à Rhasi, Auicenna, Mesue, Serapione, Paulo, Oribasio, Aëtio, Myrepsò, & à posterioribus descriptæ, non modò inter se, sed antiquæ & veræ ab Andromacho traditæ sūt dissimiles, proinde rarò parantur, & tanquam inutiles negliguntur.

Licet autem Theriaca Andromachi senioris minùs perueriti potuerit, quod versibus conscripta sit, minùs tamen celebratur ea, quæ ab Andromacho eius filio oratione soluta describitur, quam hic damus: parum tamen est inter vtramque discriminis, & ferè nullius momenti.

Porro ad eius confectiorem accedunt nonnulla, quæ semper & omnibus non suppetunt, quorum loco succedanea, si non genere, saltem qualitatibus primis, aut secundis consimilia ponuntur, ut cum herba pro herba, semen pro semine, metallum pro metallo subrogatur. Optimorum tamen substitutorum inopia ferè usurpamus, quæ desiderata qualitate prædita sunt: Sic Galenus pro amygdalis amaris, absynthium: pro Euphorbio Stercus columbæ, pro pipere zinziber substituit. Nunc autem Parisienses Pharmacopœi nullis sumptibus parcunt, ad simplicia quæuis pretiosissima conquirenda:

Atque ex eorum ordine multi, etiam qui vix secundas tenent, omnia aromatum, lapillorum pretiosorum & simplicium rarissimorum genera in suis pharmacopoliis habent, nullumque simplex ipsis ignotum est, quod medicamentorum compositionem ingreditur.

Si quis tamen nulla arte, labore aut pretio, nonnulla Theriacæ conficiendæ necessaria, præsertim rariora assequi potuerit, ut accidit plerumque, pro opoplyaso, oleum è caryophyllis, vel nuce moschata expressum subrogabit: pro Costo, zedoariam, pro schœnanto, calamum aromaticum, pro dictamno Cretico nostras, pro Amomo acorum, pro carpobalsamo cubebas, aut semen lentisci, pro vino Falerno, muscatellinum, aut aliud generosum. Nihil verò substituendum pro pastillis, qui iuxta modum sectione sequenti descriptum parabuntur. Defectu autem aristolochiæ tenuis longa sumenda, Iridis Illyricæ: Florentina, calcithidis, calcanthum seu vitriolum: Illam tamen multi sentiunt omittendam, cum nihil faciat, inquit, ad Theriacæ virtutem, sed solum ad colorem nigrum illi impertientum, qua tinctura suam qui non infecerit Theriacam, à multis irridetur. Alij contra non præter rationem calcithidem admitti debere tenent, quod sua stypticitate interanea roboret, & siccitate putredinem arceat, adde quod parua quantitate permiscetur, atque semiusta, vel eius loco, calcanthum perfectè vstum, ut acrimoniæ minoris sit particeps. Antiquitus verò aliter quàm nunc parabatur, sed verus conficiendi modus is est, quem de Mithridatio parando dedimus.

Ut autem *Ἰνφίον* de feris & venenatis animalibus dicitur, & pecu- *Ἰνφίον*
liari significato de vipera, in cuius genere, mas *ἄρσ*, fœmina *ἑκιδύα* animalia
vocatur, sic Theriaca Antidotos omnes complectitur: Quæ quod sū- omnia ve-
pta, vel adnota morbis tranquillitatem adferat, à Galeno *χαλινὴ* di- nenata si-
citur. Nam aduersus maxima mala securissimum & expertissimum gnat.
est alexitèrium. Non solum autem morbis venenatis fœliciter mede- *ἄρσ, ἑκιδύα,*
tur, sed aliis quoque communibus: nam capitis dolores diuturnos, *χαλινὴ.*
vertigines, graues auditus, hebetudines oculorum, comitiales & or- Theriacæ
thopnoicos cum multa data sanat. Stomachi vitia, difficilem coctio- vires.
nem, & ventriculi imbecillitatem emendat. Ventriculi & intestino-
rum inflationibus & doloribus medetur, necnon colicis & ileosis:
Lumbricorum genus omne mirificè interficit: animi deliquio & vi-
rium imbecillitati succurrit. Cum aqua raphani, aut parietariæ ex-
hibita deterit calculos renum, & vesicæ, & difficilem mixtionem fa-
nat. Vtiliter præbetur in febrium, maximè quartanarum rigoribus,
& incipientibus, & inclinantibus. Flatus dissipat, humores in ventri-
culo, & aliis visceribus putres absomit, obstructionem tollit, colo-
rem commendat, cordis palpitationi multum opitulatur. Mulieri-
bus menstrua mouet, fœtus mortuos eiicit, hydrophobiam & canis
rabidi morsum opportunè data sanat.

Opiata Neapolitana. CAP. XIII.

Foliorum sennæ Orient. ℥i. ℞.
℞ hermodactylorum,
turpethi an. ℥vi.
scobis ligni sancti,
sarsaparillæ,
sassafras, an. ℥℞.
mellis optimi in decocto radicis Chynæ despumati & ad
aqueæ humiditatis absorptionē cocti lib. i. fiat Opiata.

COMMENTARIUS.

Nullus est tam nouellus pharmacopœolus etiam in suburbiorum quodam angulo degens, qui vel ad gonorrhœam virulentam, vel venereum aliquod vlcus non gloriatur quoddam habere secretum remedium. De hoc autem affectu, eiusque medicatione Empirici omnium maximè mira promittunt, ad quos sæpè Parisiorum vulgus suo damno confugit. Hæc enim gens nouitatis semper auida, credulaque nimis, erroneos quosuis etiam capite damnatos, modò medicos simulent, colit & amplectitur, & ab his intrepidè deleteria quæque pharmaca sumit. Miserum hoc quidem est, quod nolentibus perire, imò sic volentibus tam liberum pateat ad necem iter. In tam nefarios homines, vos hortor, pharmacopœi dignissimi, bellum ut commoueatis, indicatis, viriliter inferatis, atque optima tantùm & à probatis authoribus tradita remedia accipiat.

Opiata cur
Neapolita-
na.

In gratiam autem iuuenum quos Venus momordit, hanc Opiatam damus, optima & ratione inuentam, & arte descriptam, & effectu probatissimam: data enim quando, & quibus conuenit, fœliciter Indicæ lui, quam Neapolitanum morbum appellant, medetur: vnde Opiatam Neapolitanam cognominare minimè nefas putauimus. Aliam eiusdem nominis sæpè inter multorū Chirurgorum manus Lutetiæ vidimus, sed quæ malè primùm descripta, à singulis tyronibus quotidie immutatur & deprauatur. Alij enim tantùm ponunt guaiacum, sennam, mel & aquam vitæ: alij baccas lauri adiiciunt: sunt qui auferunt guaiacum, & sarsaparillam substituunt. Quidam hermodactylos probant; alij turpethum:

alij vtrumque, nonnulli neutrum. Nos iuxta formam descriptam lege & ratione stabilitam & probatam exhibemus. Adiiciunt nonnulli aquam vitæ paucam, sed aquam cinnamomi libētius & vtilius prætulerim. In calidioribus naturis neutram, in frigidioribus alterutram addere nihil vetat.

Valet plurimum ad luis venereæ curationem. Datur alternis diebus & sæpe quotidie manè ieiuno stomacho à ʒij ad ʒß. His potissimum conuenit, qui pluribus negotiis impliciti decumbere non valent, & diutius in cubiculo manere.

Vireo

Plures alias antidotos à Mesuë, Actuário, Myrepso, & Præposito datas omisimus, quarum vel compositio non probatur, vel vsus non laudatur, aut his præstantiores præferuntur. Nam Zazeneæ, Atanasia, vtraque Requies Nicolai, diasulphur, Acaristum, Adrianum, & confectio de styrace nusquam aut rarissimè parantur, quod vnum Asyncritum virtute & parandi facilitate illis omnibus sit anteponendum. Nam cum illorum præcipua virtus in somno conciliando posita sit, sat erit vnicum aut alterum habere medicamētum, vt pilulas de Cynoglossō, aut Philonium Romanum, quod id fœliciter præstare valeat.

Idem est iudicium de Alfessera, de Esdra, de Antidoro hamagoga, & aliis confectionibus penè innumeris ab authoribus, vel potius transcriptoribus sine iudicio collectis, quas recensere nauseam mouere est.



SECTIO TERTIA

De Trochiscis alterantibus, & roborantibus.

Hucusque medicamenta roborantia forma pulveris & Electarii molles, seu Opiatæ, optima methodo descripta exhibuimus: superest nunc antequam huic libro finem imponamus, ut omnes Trochiscos, viribus consimiles & Officinæ necessarios explicemus, & pharmacopœis dispensandos porrigamus, qui vel aliorum medicamentorum, quorum compositionem ingrediuntur, causa parantur, vel qui etiam ex seipsis dantur, nec aliis, ut bene sint, famulantur. Ne autem confusè de purgantibus & roborantibus simul ageremus, ut multi perperam faciunt, ad finem sect. 3. lib. secundi, in quo genus omne Catharticorum describitur, Trochisco de Rhabarbaro, de Agarico & Alhandal adiunximus. Nunc verò ad roborantium & alterantium explicationem accedentes, incipiemus ab his, qui pariter Theriaces & Mithridatii constituunt.

Trochisci de vipera. CAP. I.

R. Carnis Viperarum cum anetho, sale & aqua coctæ
℥ viii.

medullæ panis triticeï, albi sumi exsiccati, & tenuissi-
mè puluerati ℥ ii.

Tere omnia simul & manibus opobalsamo, aut eius
succedaneo inunctis, fac pastillos ℥ i. pondere, in um-
bra siccandos.

COMMENTARIUS.

Vocantur hi pastilli viperini, theriaci, de thyro seu de vipera, ad quorum Confectionem captandæ sunt vipera circa finem Veris aut principium æstatis, quo tempore consueto cibo & aëre aliquandiu fuerunt recreatæ: atque deligendæ potius fœminæ, quam mares, nō pręgnantes, admodum agiles, collum gracile multum porrigentes, aspectu ferino, oculis aliquantum rubentibus, ac rutilis, capite latiore ac compresso & rostro non nihil ad superiora reflexo, ventre amplo, cauda non inuoluta, affatim gracilescente, carnis experte, gressu circa eam firmato, eoquetardo. Maris verò sensim in tenuitatem abit, nec carne destituitur, corporis truncus tenuior est, collum crassius, angustius caput, duo tantum dentes caninos habet, fœmina quatuor. Quæ loca maritima & salsa incolunt, relinquendæ. Recens captæ meliores, quàm asseruatæ. Vt autem ritè præparentur, primùm virgis cæduntur, sic namque ita percitæ virus euomunt, vapulatis cauda & caput abciuntur, utrobique ad quatuor digitorum mensuram: quod etiam in viperis maioribus satis erit. Quæ post harum partium amputationem, irrequieto motu non agitantur, aut sanguinem non effundunt, sed statim immotæ iacent, atque ex ægues, reiiciendæ, ut inutiles. Vtiles ac modo dicto mutilatæ excoriantur, euiscerantur, pinguedine mundantur, probè in aqua limpida ter, quaterque mutata abluuntur, dein in olla idonea ac nitida coquuntur cum aqua sufficienti, pauco sale, & anethi viridis quantitate paulò maiore aut minore pro numero viperarum, ut prudens pharmacopœus facile poterit diiudicare, puta ad m. i. s. aut m. ii. anethi, pro quatuor aut quinque viperis: qui numerus satisfacere poterit parandis tribus vncijs trochiscorum, ad Theriacæ confectionem requisitis. Sic verò igne luculento, non tamen violento, & fumi experte coquuntur, ut à carnibus facillime spina detrahatur. Tū caro separata in pila lapidea cum pistillo ligneo exactè terenda, cui inter terendum, panis albi, sicci & puluerati tertia aut quarta pars adicienda, ut pro carnis vipera vncijs quatuor, panis dragmæ sex, aut vncia integra. Qui maiorem panis quantitatem commiscebunt, pastillorum vires efficient imbecilliores, qui minorem efficaciores.

Quando
vipera cap-
tandæ.

Viperarū
delectus.

Viperarū
præparatio.

Sic per trituram carne pani commixta & subacta fiet pasta, ex qua pastilli seu orbiculi formabuntur. Perperam faciunt, qui dum caro viperina & panis simul teruntur, parum iusculi, in quo vipera fuerint incōcta adiciunt: sic enim humidior est, & trochisci ex ea confecti rancescunt, situm contrahunt, & difficilius exsiccantur. Paruuli autem conficiendi atque manibus opobalsamo aut oleo caryophyllis vel nucē moschata educto inunctis, & quotidie in loco sicco, sed non soli exposito versandi, exsiccandi, & postea seruandi.

Vires.

Pastillis viperinis summa virtus inest ad morsus animalium venenatorum, ab eisque Theriaca talem vim mutuatur : profuntque mirificè, si quid aliud, Elephanticis, & à cane rabioso demorsis.

Trochisci Hedichroi D. Andromachi ex Galeno. CAP. II.

℞. *Aspalathi,*
asari,
mari,
amarici an. ℥ ij.
calami aromatici,
j chœnanti,
costi,
phu Pontici,
opobalsami,
xylobalsami, an. ℥ iij.
folii Indici,
spicæ nardi,
castiæ lignæ,
myrrhæ,
croci an. ℥ vi.
amomi ℥ xii.
mastiches ℥ i.

*Cum vino quodam generoso fiat pasta, ex qua formen-
 tur pastilli.*

C O M M E N T A R I V S.

Prudenter egit Andromachus, qui horum pastillorum descriptionem verbis descripsit; nisi enim id fecisset, nihil aut parum illa pristinae integritatis retinuisset, cum etiam Galenus in illis describendis, præsertim in singulorum simplicium definienda dosi, comperiatur varius. Rhasis & Auicenna non sunt excusandi, qui potius novitatis aut vanitatis studio quàm simplicium optimorum inopia hos trochiscos immutarunt. Europæi medici non tam pervertunt, quàm substituunt, in his potissimum compositionibus, quæ certa

cap. 19.
 lib. de
 ther. ad
 pis. &
 c. 7. lib.
 de usu
 ther.

lege

lego, optima ratione & debita methedo describuntur. Facilius est autē remedium formas, seu à Græcis, seu ab Arabibus descriptas, quam medicamenta simplicia, ex quibus constant habere. Valde tamen rarum est, quod nostri pharmacopœi Parisienses non consequuntur. Qui opportunè omnia non habuerit, pro Aspalatho reponet santalum citrinum, pro maro maioranam veram aut dictamnium, pro Amarako matricariam, pro costo Angelicam, pro Xylobalsamo lignum Aloës, aut lentilci, pro cassia cinnamomum, pro amomo Acorum: pro aspalatho quem Arabes Darisiam vocant, corticem radicis ipsius ponunt.

Sum. 1. Ab Auicenna vocantur hi pastilli *Alindacaron*, à Rhafi *Andaracari*, ab Andromacho & Galeno Hedichroi, à quibusdam Idiocri, ab
tra. 7. 1. authore qui primus composuit Idiocius & Idiocrytus dictus, ut putarunt Gilbert. de Angl. & Iacobus de Maulis, referente Luminaris
lib. 1. maioris authore. Qui Græcorum etymon rimantur, sic verius dici
cap. de credunt à gratiosa compositionis tinctura, iuxta illud, Magma quod
arthritis. hedychroi læto dixere colore. Illius tamen color cum nec lætus sit, nec lætificet, à Græcis non iuste nomen mutuari videtur. De qua re Galenus nihil, qui spissamentum tantum scribit, non herbam, ut
cap. 38. medicus quidam Romæ putabat. Verum de vocabulis parum anxij
sect. 8. esse debemus, modo res ipsa intelligatur. Ad confectionem teruntur
l. An. primum radices & ligna, dein aromata, postea reliqua. Sed seorsim
rid. crocus, mastiche, myrrha, quæ postrema primo loco miscenda sunt cum vino, tum alij pulveres, tandem oleum balsami, aut eius inopia, caryophyllorum. Ex hisque omnibus tritis, & simul subactis, fiet massa, de qua formabuntur trochisci, in umbra siccandi.

Parandi
modus.

Vires.

Historia.

Non solent vero parari nisi Theriaces conficiendæ causa, propterea parua tantum quantitate solent dispensari, multis tamen, quod simplicibus constant medicamentis efficacissimis, per se dari poterunt ad malorum multorum curationem; & in diuite quodam qui odoratum pharmacum expetebat, ad Ozanæ curationem, his pastillis usus est Aëtius, quos subegit cum vino veteri odorato, & mirum est, inquit, quàm breui affectio curata est.

Trochisci Scillitici D. Andromachi. CAP. III.

R. Scille assate lib. I.

farinæ orobi albi, & non ruffi ℥ viii.

Tere in mortario & fiat pasta, ex qua formentur Trochisci, in umbra siccandi.

COMMENTARIUS.

Theriaces adhuc gratia pastilli sunt Scillini, sic dicti à Scilla, quæ ipsorum basis est. Ad hunc verò consilio Galeni, debent parari modum. Scilla mediæ magnitudinis Iulio mense colligenda, cortice exteriori spolianda, pars inferior & durior cui fibriosa radiculæ adherent secanda, separanda, obiciendaque: pasta triticea probè subacta, non luto, ut perperam nonnulli faciunt, inuoluenda: dein sub cineribus calidis, vel potius in furno coquenda, donec pasta induerit, & scilla mollis ac tenera euaserit, tum exteriori crusta, & interiori meditullio ablatis in mortario terenda: tum demùm tertia pars erui albi farinatenuissimæ & cribratæ commiscenda, ut octo scillæ libris. Atque ex omnibus probè subactis vnciæ erui singulis fiat massa, ex qua formentur trochisci in umbra siccandi.

Est autem deligenda Scilla vera & optima, ut Hispanica, non pancratium, atque euellenda Iulio aut messis tempore, vel paulò serius, aut celerius, modò iam folia penitus & scapus aruerint.

Eruum quoque candidum, non ruffum seligendum, quod minus amarum est & magis alexiterium. Sunt qui loco Erui candidi radicem dictamni albi sumunt: quia tamen eruum non valde rarum est, præstat cum Andromacho & Galeno genuinam descriptionem admittere, quàm sine necessitate aliquid substituere, & mentem authoris defraudare.

Vires.

Trochisci scillitici crassos & lentos humores incidunt, infarctus tollunt, putredinem impediunt, epilepsiæ conferunt & morbis venenatis.

Trochisci Cypheos D. Andromachi. CAPVT IV.

℞. Carnis vuae passæ pinguiſſimæ, probè ab acinis &
 cortice mundatæ,
 terebinthinæ puræ an. ʒ. xxiiij.
 myrrhæ,
 schœnanthian. ʒ xii.
 cinnamomi ʒ iiii.
 bdellulacrymæ,
 spicæ nardi,
 cassiæ lignæ,
 cyperi,
 baccarum iuniperi grandium & pinguium an. ʒ iiii.
 calami aromatici ʒ ix.
 aspalathi ʒ ii ʒ.
 croci ʒ i.
 Vini parum,
 mellis optimi quantum sufficit, formentur pastill.

COMMENTARIVS.

Gal.ca. 75. de sim-
 pl.med. Cyphi antiquum & Ægyptiacum est vocabuli genus, quo suffi-
 menta, odoramenta que olim significabantur. Ab eo Mithridates
 hos trochiscos cognominauit, quos postea Democrates carmine
 descripsit. Constant vero multis odoratis, quæ mixturam nomini
 conuenientem & ad multa commendabilem efficiunt. Quod optimè
 nouit Ponthi rex, dum eosdem antidoto permiscuit, quam suo no-
 mine voluit donari. Eius autem variæ traduntur descriptiones, etiam
 Dioscoridis testimonio, sed quam exhibemus retinebit & parabit
 prudens phârmacopœus, hominum salutis & suæ studiosus.

Præparatio multum nec difficilis, nec laboriosa. Myrrha & bdellium in vino generoso primùm diducenda, quibus addenda terebin-
 thina, dein pulpa passularum mundatarum, tum pulueres. Omnia
 tandem melle despumato & probè cocto excipienda, & in massam
 cogenda, ex qua formentur trochisci, in vmbra siccandi, in olla
 vitrea, aut fictili reponendi & seruandi.

Vires.

Hunc usum non modo præstant, quoddam Mithridatio inferuiant perficiundo, sed & dantur per se ad vlcera, & internos affectus multos iecoris & pulmonum.

Trochisci Galie moschatae. D. Mes. CAP. V.

R. Ligni aloes crudi & electi ʒ ii. ʒ.

ambra ʒ i.

moschi coniz ʒ ʒ.

gummi tragacanthi in aqua rosarum soluti quantum sufficit ad ea comprehendenda & cogenda, fiant pastilli.

Nonnulli ambra in vase vitreo dissoluunt oleo Balanino paucio, eoque cætera comprehendunt.

COMMENTARIUS.

Vox Galia non parum Iac. Manlij exercuit ingenium, ut qui rationem eius nominis ad pastillos descriptos accommodati, quærens, nunc ex Placentino ad Galiam herbam odoriferam, nunc ex aliorum opinione ad quamdam Gallie prouinciam refert: herbam tamen illam fictitiam, & Galliam nequidem per somnium vidit Mesuë, nec Gallie nomine compositionem istam, ni fallor, designauit. Confectiones enim aromaticæ, Arabibus Alephangina, ut quæ calidioribus aromatis constant, dicuntur: aliquando *Rumich*, & specialius *such*, quando moscho, ambra, zibetho & similibus suauem odorem spirantibus componuntur. Apud Arab. fere synonyma sunt Alephagina, Rumich, suc, zebeth & Galia. Rectius autem trochisci de xylo aloë moschata, quam de Galia moschata vocari possent, minimè tamen mutandum nomen censeo, quod integrum ferè sæculum recepit & probauit: in cuius peruestigatione non laborandum, modò res ipsa satis innotescat.

Rhassa.

Præparatio. Porro ad præparationem teruntur singula seorsim, ac primum quidem lignum aloës, dein ambra, postremo moschus, tum omnia excipiuntur glutine tragacanthi aqua rosacea diluto, & fiunt trochisci, ad delicias maximè suo halitu accomodati, potius tamen ad sanitatem quàm voluptatem in pharmacopoliis seruati. Horum mentio frequenter occurrit in compositionibus multis, quas hinc inde ingrediuntur.

Cerebrum, cor & spiritus recreant, corporis totius odorem commendant, ventriculum puerorum imbecillum & vomiturientem roborant, & vires longo morbo fractas resarciunt.

Vires.

Trochisci Aliente moschata D. N. sal. CAP. VI.

℞. Labdani ℥ iii.
 styracis calaminte ℥ i ℞.
 styracis rubri ℥ i.
 ligni aloes ℥ ij.
 ambre ℥ i.
 caphure ℥ ℞.
 moschi ℥ i.
 Cum aqua rosarum fermentur pastilli.

COMMENTARIUS.

Minus frequenter parantur hi pastilli quam præcedentes, licet affines sint halitu, suauitate, odore. Laboriosè conficiuntur iuxta modum à Nic. Salernitano descriptum, facilè verò sic: Ladanum in mortario cupreo & pistillo ferreo, utroque calente, cum pauca aqua rosarum diu terendum, ducendum & agitandum, donec vnguenti vndiq; læuis, nec asperi aut grumosi consistentiâ nanciscatur. Addatur postea vterque styrax pistillo rursus multum diducendus, dein xyloaloë, tum caphura, moschus & ambra, cum pauca rosacea seorsim in alio vase diluta. Ex omnibus confusè mixtis, tritis, subactis trochisci fient paruuli, in umbra siccandi, in olla reponendi, in officina seruandi.

Celebrantur ut efficacissimi ad cerebrum, cor, hepar, ventriculum, & ceteras partes nutritorias corroborandas, & reficiendos spiritus.

Vires.

Pastilli Nerae D. N. CAP. VII.

℞. Ambrae optima ℥ i.

lignialoes ℥ iij.

moschi boni ℥ ℞.

caphura gr. ij.

Subigantur omnia simul, & fiat massa, ex qua formentur Trochisci.

COMMENTARIUS.

Præparatio

Trochisci Nerae sic ab inuentore multorum iudicio nuncupati pretiosissimi sunt, rarissimeque conficiuntur, nisi pro regibus & principibus. Nec magna quantitate parandos censeo, & in Officinis diu asseruandos, cum usus tempore statim quantitate requisita possint confici. A Gallia moschata tantum dissident simplicium dosibus & superaddita caphura. Ut ritè parentur, emollienda ambra in mortario calente cum pastillo quoque calido, cui deinde lignum aloës tenuissimè pulueratum commisceatur: Tum moschus seorsim tritus, postremo camphora. Omnia vero probè ducantur, subigantur, malaxentur superaddito pauco oleo liquidambar, aut opobalsamo, ut in massam cogantur conuenientiore, ex qua rotulae aut pastilli formabuntur.

Vires.

Hisdem viribus pollent quibus Gallia moschata, sed efficacioribus, & à magnatibus frequenter usurpantur ad suffitus.

Trochisci de Caphura D. Myrep. CAP. VIII.

℞. Caphura, ʒ ℞.
 croci ʒ ii.
 amyli ʒ iij.
 rosarum rub.
 gummi Arabici,
 tragacanthi,
 scobis eboris an. ʒ ℞.
 sem. cucumeris mundati,
 sem. portulacæ,
 glycyrrhizæ razæ an ʒ i.
 cum mucagine seminis psyllij in aqua rosacea extra-
 cta fiant pastilli.

COMMENTARIUS.

sect sui
 Antid.

Ex variis Trochiscorum de Camphora descriptionibus à veteribus traditis, sola ferè paratur, quam Mesuë describit ad febres ardentes, ad bilis & sanguinis astum, hepatis & ventriculi calidam intemperiem & sitim inexpletam. Multis tamen quod constet calidis, ut nardo, xyloaloe, croco, cardamomo, quomodo id præstare valeat non facile coniecto. Alios eiusdem nominis multo præstantiores, & ad id munus obeundum efficaciores, ac paratu faciliores, ex Myrepso exhibeo, in cuius descriptione nihil est immutatum præter simplicium ordinem. Pro spodio autem, (si quod aliud sit præter pompholiga, seu spodium Græcorum) malo assumere ebur crudum, quam vstum, ob rationes multas superiùs adductas. Præparatio nec molesta nec laboriosa multum est, Scobs eboris seorsim tenuissimè lauiganda, ut & reliqua simplicia, crocus, caphura, amyllum, rosæ & glycyrrhiza. Gummi in mortario calido terenda: Semen cucumeris decorticandum, dein minutim secandum, & lauigandum, tum demùm omnia cremore psyllij comprehendenda, & in pastam ad trochiscos formandos cogenda.

Præparatio

Valent ad iecoris & aliorum viscerum ardores mitigandos, ad Vires.

acrimoniam bilis temperandam, & ad humorum qui ad thoracem delabuntur fluorem compescendum.

Trochisci Diarrhodon D. Mesu. CAP. IX.

Rosarum rub. ℥ i.

℞ glycyrrhizæ ℥ ℞.

ligni aloes,

spicæ aromaticæ an ℥ ij. ʒ ii.

mastiches ℥ ij.

antispodii ʒ iii.

croci ʒ ii.

Tritis omnibus fiant trochisci ex vino albo.

COMMENTARIUS.

Varia sunt pastillorum huius nominis apud authores varios descriptiones: quisque enim ad animi votum addit, detrahit, pervertit, immutat, & plerumque vnum & idem medicamentum diuersis nominibus designat, sæpè & duo, triaue eadem vocum acceptione nuncupat. Patet hoc ex trochiscis Diarrhodon & de Rosis à Mesuè traditis, quorum alij aliorum significato includuntur. Fuit Preparatio rationes quæ huius nomenclaturæ in voce & significatione diuersitatem quærunt. Si tamen cum viro probato sic loqui liceat, pastillos descriptos vocabimus Diarrhodon, non de rosis, quorum præparationem pluribus demonstrare superfluum videtur, cum ipsa per se facilis sit, nec quicquam difficultatis secum ferat. Pro Spodio, Antispodium Officinarum & vulgare diximus, quod ebur vsum est non spodium.

Vires.

Valent ad febres pituitosas, inueteratas, & aliis implexas. Ad ventriculi quoque dolorem leniendum, & humores ipsi adhaerentes detergendos. Commiscentur in multis compositionibus magnis à Mesuè descriptis.

*Troch.
Diarrhodō
Myrepsi.*

Alij sunt Trochisci Diarrhodon N. Myrepsi, quos ipse suis confessionibus miscet. Parantur ex rosar. rub. recens. ℥ iij. spodii ℥ ij. santal. rub. ℥ j. ℞: gr. vij. santal. alb. ℥ j. gr. xij. croci ʒ ij. ℞. caphuræ ʒ ℞. Ex omnibus aqua rosacea coactis fiunt pastilli.

Trochisci

Trochisci de Carabe D. Mes. CAP. X.

R̄. karabes ℥i.
R̄. cornu cerui vsti,
gummi Arabici vsti,
tragacanthi,
coralli vsti,
acacia,
hypocistidis,
balaustiorum,
mastiches,
lacca,
sem. papaueris nigri, asi an. ʒij. & ʒij.
thuris,
croci,
opij an. ʒij.
Cum mucagine seminis psyllij forma Trochiscos, &
reponere vsui.

COMMENTARIUS.

Hos Mesuei pastillos, vt insigniter efficaces, inter quindecim
 eiusdem nominis, à tot authoribus descriptos selegi, quorum magna
 pars illi solum nomine tenus, similis, vel certe multum dissimilis est.
 A succino, seu Karabe Arabibus, & Electro Græcis dicto nuncu-
 pantur, quod mirifice commendatur ad viscera roboranda, sangui-
 nis fluorem cohibendum, & rheumatismum vteri sistendum: auge-
 tur illius vis incrassans, gummi & opij interiectu, astringentia, super-
 addita hypocistidæ & acacia. Opium croco castigatur, ventriculus
 mastiche roboratur, psyllio omnia comprehenduntur & partium as-
 peritas lenitur. Ad præparationem iubet Mesuë multa aduri, quæ Præparatio
 tamen si cruda ponantur, medicamen nihilo deterius, imò forsan
 præstantius erit: si quid enim eximie virtutis habet cornu cerui aut

corallium, hæc ipsa potius habere cruda quàm vsta credibile est. Quid vstio medicamenti conferat, quid ab his auferat, quid adferat, minimè sum nescius, sed multa vix hunc patiuntur apparatus sine magno virium dispendio. Vrat tamen qui voluerit, modò expectitas cum cineribus retineat vires. Acacia & hypocistis debebunt minutim primùm incidi, dein cum balauistiis puluerari, tum & reliqua. Ex omnibus arte & ordine tritis & pauca psyllij mucagine formabuntur trochisci.

Vires.

Vim habent roborantem & astrictoriam. Omnem hæmorrhagiam præsertim à thorace, pulmone, hepate, renibus, vtero, hæmorrhoidibus 3 j pondere cum aqua plantaginis, aut rosacea vel simili sistūt. in dysenteria profunt, & per os sumpti & per enemata iniecti.

Trochisci de Antispodio D. Mes. CAP. XI.

*℞. Rosarum 3 vij.
Antispodij 3 iij.
seminis portulacæ,
succij glycyrrhizæ an. 3 ii.
Cum mucagine seminis psyllij,
fiant Trochisci.*

COMMENTARIUS.

Si aliquandò fas sit balbutire cum balbutientibus, hos pastillos ad Electarij de psyllio condituram accommodatos, de spodio vocabimus: sed inuiti quidem, quod illorum basis spodium non sit, sed potius Antispodium, vel veriùs, ebur vstum, quod hucusque pharmacorum familia pro cannæ seu Tabaxir radicibus vstis usurpauit. Valet tamen istud pseudospodium, vel imaginarium. Arabicæ gentis spodium quod valere poterit, ex eo Antispodio à nobis vocato, parandi & nominandi sunt trochisci descripti, additis rosis, semine portulacæ, & succo glycyrrhizæ, psyllij glutine comprehensis.

Vires.

Sic autem parati non modò in Electarij dicti veniunt compositionem, sed & per se dantur ad febres acutas, ventriculi & hepatis inflammationem, & sitim vehementiorem.

Alij dantur adhuc à Mesuè magis compositi, cum semine videli-

cet acetosæ, pulpa sumach, amylo, coriandro, balauſtiis, berberis & gummi Arabico, omphacij ſucco exceptis. Minus tamen vſuales ſunt, nec probè congruunt Electario nominato.

Trochiſci
de Spodio
cum ſem.
acetosæ.

Trochiſci de Berberis. CAP. XII.

Rx. *Baccarum Berberis, aut ſuccicarum,
ſucci glycyrrhizæ,
ſeminis portulacæ,
Antiſpodij an. ʒ iii.
roſarum rubrarum ʒ vi.
ſpicæ,
croci,
amylī,
tragacanthi an. ʒ i.
ſeminis citruli ʒ iii. ſs.
caphuræ ʒ ſs.
Cum manna ſucco berberis diluta fiant Trochiſci.*

COMMENTARIUS.

Extat huius nominis apud Meſuem alia deſcriptio, ſed exoletæ; Extant & aliæ multæ apud Serapionem, Auicennam, & alios, qui antidotaria conſcripſerunt: Sed hæc vna vice omnium ſit, & ſola tanquam cæteris præſtantior uſurpanda & celebranda. Hæc autem arte optimè parabitur. Incidetur primū nardus, ſuccus glycyrrhizæ & ſemen citruli, dein terentur ſimul cum roſis. Seorſim vero ſpodium, amyllum, caphura, crocus & tragacanthum. Trita omnia excipientur manna in ſucco berberorum liquata, & fiet maſſa, ex qua formabuntur Trochiſci.

Commendantur ad febres præcalidas, ad intemperiem iecoris & ventriculi feruidam, ad ſitim inexhauſtam, & alui fluorem. Expetūtur quoque ad Electarij de Pſylio compoſitionem, deſcriptione Meſuei, apud quem vocantur iuxta interpretum traduccionem, Paſtilli de Oxyacantha: Non autem ingrediuntur Electarium roſatum ab eodem Principe traditum, ut putat Foëſius. Parua quantitate erunt parandi quodæ ferè ſolū uſurpentur ad aliorum medicamentorum compoſitionem.

R. *Seminum quatuor frigid. maiorum mundator.*
seminis papaveris albi,

sem. maluarum,

bombacis,

porculacæ,

cotoneorum,

myrtillorum,

gummi arabici,

tragacanthi,

strobilorum,

pistachiorum,

sacchari candi,

penidiorum,

glycyrrhizæ razæ,

hordei mundati,

mucaginis sem. psyllij,

amigdalæ dulcium mundatæ. an. ʒ ij.

boli armenæ,

sanguinis drachonis,

antispodij,

rosarum,

myrrhæ an. ʒ ss.

Excipiantur hydromelite, & fiant pastilli pondere

ʒ ij. aut ʒ i.

COMMENTARIUS.

A Bauderonio artis pharmacariæ studiosissimo fideliter, à Iou-
 berto deprauatè hi pastilli describuntur: hic enim non tantum sim-
 plicium pondus immutauit, sed alia adiunxit, & nimis pretiosa &
 parum necessaria. Est autem multiplex illorum compositio: Constât
 enim refrigerantibus, detergentibus, astringentibus & roboranti-

bus, lenientibus & quibusdam aperientibus. Ad præparationem quædam tritura vulgari, pistilli nempe solo percussu puluerantur, ut radices, ligna, semina duriora, gummi, bolus Armena & myrrha. Hæc tamen duo non confusè, sed seorsim debent lauiari. Nonnulla minutim prius secantur, dein teruntur, & aliis admixta tenuissimè comminuuntur. Ex omnibus optimè tritis, & confusè mucagini psyllij mixtis, atque hydromelite comprehensis & coactis finguntur trochisci.

Porro pro sanguine draconis nec cinnabaris cum Dioscoride sumenda, nec serpentis, aut alius animalis sanguis cum Plinio queritandus, nec aliud quicquam factitium ex terra Synopica, bolo Armena, sorbis & lateribus tritis simul subactis admittendum, sed lacryma cuiusdam arboris peregrinæ ab indigenis, Dracho nominatæ, ut fusiùs docuimus libro de simplicibus.

Imperantur à Gordonio ad vlcera renum. Vtiliter quoque vsurpantur ad alia partium internarum vlcera: leniunt enim, detergent, Vires. acrimoniam contemperant & roborant.

Ad internas vlcerationes ζ i. cum lacte exhibita plurimum prodest: & si fuerit vlceratio in vesica distemperetur cum lacte, inquit Gordonius, & prouiciatur per syringam.

Trochisci de capparibus D. Mes. CAP. XIV.

℞. Corticis radices capparidis,
 seminis viticis an. ʒ vi.
 gummi ammoniaci ʒ β.
 nigellæ,
 calamintæ,
 acori,
 amygdalarum amararum,
 seminis nasturtij,
 foliorum rutæ,
 aristolochiæ rotundæ,
 succi Eupatorii inspissati an. ʒ ij.
 cyperi,
 scolopendrii an. ʒ i.

Omnia trita ammoniaco dissoluto comprehendantur, & fiant Trochisci.

COMMENTARIUS.

Veterem Mesues descriptionem integram, nec aliqua in re immutatam admisimus, ut quæ optimè ea præstet quæ pollicetur. Trochiscorum enim omnium incidentium & obstructions referantium hi sunt efficacissimi: quandoquidem multis constant, quæ crassos, melancholicos ac terrestres succos tenuant & incidunt, infarctus tollunt, & duritiem emolliunt. Quibus si præterea addere quis voluerit gummi lacæ & rubiæ tinctorum an ʒ i. efficaciores reddentur, nec Trochiscis de Lacca erit opus, quod hi è capparibus satis sint, inquit Plantius, ad lienis obstructionem & veteres affectus. Eorum ac superiorum eadem est parandi ratio, ac methodus facilis. Ammoniacum dissoluetur aceto, coquetur ad consistentiam mellis, eoque pulveres subiguntur, & formabuntur Trochisci.

Vires. Commendantur plurimum ad omnem lienis & hepatis obstructionem, duritiem, inflationem, & tumorem præter naturam. Morbo regio & hydropi incipienti succurrunt, infarctus tollunt, & fla-

tus discutunt. Dosis est \mathfrak{z} j. cum vino tenui, vel aqua decoctionis radicis capparis, corticum fraxini aut tamarisci. Sunt qui valentio, res efficiunt, inquit Mesuë, duplicato Ammoniaco.

Trochiscide myrrha D. Rhas. CAP. XV.

Rj. *Myrrhæ* \mathfrak{z} iij.
Lupinorum \mathfrak{z} v.
foliorum ruta,
mentaſtri,
pulegij,
cūmini,
rubia tinctorum,
aſſæ foetida,
ſagapeni,
opoponacis an. \mathfrak{z} ii.
Cum ſucco artemiſiæ fiant paſtilli pondere \mathfrak{z} ii.

COMMENTARIUS.

Nuſquam omittendi ſunt hi trochiſci à Rhaſi deſcripti : à myrrha, quæ illorum baſis eſt, nuncupati, ab omnibus medicis uſurpati. Ad quorum compoſitionem accedunt multa, quæ mezentereum obſtructione liberant, meatus diducunt, inſarctus tollunt, & potenter humores, qui vel copia grauant, vel qualitate lædunt, deturbant. Vt rite componantur, gummi ſunt liquanda in decocto, vel ſucco artemiſiæ calido, dein linteo forti traicienda ad aquæ humiditatis diſſipationem & conſiſtentiam mellis.

His poſtea addenda reliqua ſimplicia tenuiſſimè, vt artis eſt, puluerata. Nam quæ ad inſarctus expediendos, occluſionem viarum reſerandam, & materiam quamdam foras protrudendam imperantur, debent tenuiſſimè leuigari. Sic enim aſarum & alia multa ſimplicia in pollinem ſubtiliſſimum trita vrinas mouent copioſas, craſſiuſculè puluerata diutius immorantur, & ſegniter ſuas vires exerunt.

Frequens eſt horum paſtillorum uſus in nimia cunctatione menſtruorum, in partu remorante, ſecundis retentis & lochiis ſuppreſſis. Dantur à \mathfrak{z} i. ad \mathfrak{z} ij. ſ. & aliquando, ad \mathfrak{z} iij cum aqua, aut decocto idoneo.

Vires.

Trochisci Alexiterij seu contra pestem. CAP. XVI.

R. Radicum gentianæ ,
R. tormentillæ ,

Ireos Florentiæ ,

Zedoariæ , an. ʒ ij.

cinnamomi ,

caryophyllorum ,

macis an. ʒ ss.

Zinziberis ʒ i.

radicis angelicæ ʒ iiii.

coriandri præparati ,

rosarum an. ʒ i.

corticis citrisicci ʒ ii.

Fiat omnium pulvis subtilissimus & cum succi
 glycyrrhizæ ʒ vi. fiat pasta mollis de qua formen-
 tur trochisci vel potius bacilli oblongi.

COMMENTARIUS.

Pesti præcauendæ multum conueniunt hi trochisci; Eorum enim tantillum in ore detentum saporem quemdam non ingratum relinquit, & odorem, qui aëris inquinati qualitatem malignam arcet & emendat, atque impedit, ne is intro subiens spiritus inficiat. Quæ enim insipida sunt & inodora, vt cornu monocerotis, lapis Bezaar, margaritæ, lapilli pretiosi & alia multa venenis obsistentia, suas tantum vires exerunt in corpus ingesta, vel saltem eorum infusa: in ore enim contenta fere inefficacia sunt, vt quæ vix saporem vllum emittant, aut halitum efflent, à quibus aëris feritas queat domari.

Hi autem trochisci seu in ore tantum detenti, seu inferiùs ad ventriculum delapsi vires habent eximias, & ad virus pestilens euincendum efficacissimas. Vt ritè parentur, succus glycyrrhizæ, quo pulueres excipiendi sunt, in balneo Mar. seu diplomate emolliendus erit, donec facile duci possit, & cum eo quantitas pulueris tota incorporari: quod artificij perito difficile non erit. Inexperto si

videatur.

videatur nimis operosum, liceat illi parū hypocratici vini, aut alius liquoris cōuenientis superaddere, vt ad libitū pastam habeat mollē, ex qua formabit bacillos in vmbra siccādos, & vltui reponēdos. Quid Vinum hypocraticū.
autem sit vinum hypocraticum satis notum est. Parari solet ex vini nigricantis lib ij. sacchari lib. β. cinnamomi ℥ β. quidam addunt ad stimulum maiorem zinziberis ℥ β. & caryophyllorum ℥ i.

Trochisci hysterici. CAP. XVII.

℞. Assæfœtidæ,
galbani an. ℥ ij β.
myrrhæ ℥ ii.
castorei ℥ i β.
asari,
sabinae,
aristolochiæ,
nepetæ,
matricariæ, an. ℥ i.
dictamni ℥ β.

Cum succo aut decocto rutæ fiant trochisci.

COMMENTARIUS.

Hos nostros pastillos, hystericos nuncupamus, quòd aberrationi vteri & aliis affectibus hystericis mirificè profint. Assumpti enim vterum vel ex eo vapores ad partes supernas ascendentes cogunt, sistunt, & grauissima symptomata, hinc nasci solita impediunt. Nam cū vterus rebus odoratis delectetur, licèt non sub specie odoris, trochisci autem descripti, admodum fœtidi sint, illius ascensum ad præcordia, dum per os sumuntur, sistunt. Et præterea colluuiem quamdam prauam, si quæ in locis muliebribus contineatur, meatus aperiendo, obstructions soluendo foras protrudunt.

Facillimè autem parabuntur, si pulueranda tenuissimè terantur, & gummis decocto, aut succo rutæ maceratis, colatis, & ad mellis crassitiem elixaris comprehendantur. Preparatio.

Medentur fœdis virginum & viduarum coloribus, & his omnibus symptomatis, quæ à tetrīs vaporibus, è semine, vel menstruo sanguine corrupto, & ab ytero sursum ad præcordia perreptante procedunt, auxiliantur.

Vires

Trochisci ad Gonorrhœam. CAP. XVIII.

℞. Seminis viticis seu agnicasti,
seminis lactucae,

rosarum,

balauftiorum an. ʒ. i.

scobis eboris,

Electri an. ʒ. j. ℞.

boli armenae in aqua centinodiae lotae ʒ. ii.

seminis plantaginis ℥. iiii.

Sassafras ℥. ii.

Cum mucagine seminis citoniorum in aqua nenupharis extracta fiant Trochisci.

COMMENTARIUS.

Gonorrhœa vel est voluntaria, ut cum semen per coitum & cum voluptate excernitur, vel inuita, ut cum citra venerem effluit: atque ea vel simplex est, & nullius qualitatibus malignæ particeps, quæ aut à feminis plenitudine, aut qualitate, aut labore, cursu, equitatione, & piperatorum usu nimio oritur: vel fœda & virulenta, quæ ex impuro concubitu, cum lue Indica affectis contrahitur, in qua virus albicans, aut ex virore flauescens è vasis seminalibus sine sensu excidit vigilantibus pariter atque dormientibus. Frequens quidem malum est mulieribus perinde atque viris commune, quod tempore nonnunquam tantas vires acquirit, ut per totum corpus serpat, & partes singulas afficiat.

Viros.

Ad utramque verò vtiliter nostri pastilli usurpantur. Ad simplicem quidem, sola sanguinis educatione præmissa: ad virulentam, incipientem vel nondum inueteratam, corpore semel atque iterum repurgato & sanguine imminuto. Dantur cum decoctione seminum papaveris & melonum, vel cum aqua rosarum. Dosis est à ʒ. i. ad ʒ. ij. ℞. aut ʒ. iij. ad summum. Horum ut præcedentium eadem est, ac facilis præparatio.

DE DVOBVS TROCHISCIS EXTERIVS adhibendis.

Trochisci narcotici D Fernel. CAP. XIX.

℞. Gummi Arabici,
tragacanthi,
amyl an. ʒ ℞.
cerus & lotæ aqua rosarum ʒ vi.
styracis calamintæ,
myrrha,
castorij,
opij sapa soluti an. ʒ iij.
croci ʒ ℞.

Trita omnia excipiantur mucagine seminis psyllij in aqua rosarum de prompta, & fiant Trochisci.

COMMENTARIVS.

Superfunt duo pastilli vsuales tantum exterius adhibendi, quos eadem serie describere, nec ad posteriorem Officinæ partem quæ de medicamentis tantum externis agit, differre non libuit, quorum priores vocantur à Fernelio narcotici, quod parti cuiuspiam admoti sensum stupefaciendo dolorem illius consopiant. Horum autem apta est compositio & vsus pernecessarius, neque ulli antè extant ad similes affectus accommodati. Ad præparationem singula primùm seorsim terenda, dein confusè mixta, mucagine seminis psyllij excipienda, & in massam cogenda.

Trochisci narcotici debitè admoti, capitis dentiumque dolorem consopiant, in febrium ardoribus somnum accersunt, erysipelata, inflammationes extinguunt, partium omnium externarum dolores aliis medicamentis soluti compefcunt.

Trochisci Albi D. Rhasis. CAP. XX.

℞. Cerusæ aqua rosar. lotæ ʒ x. gummi Arabici,
 sarcocollæ crassioris ʒ iii. tragacanthi an. ʒj.
 amyli ʒ ij. caphuræ ʒ β.
 Lacte muliebri excipiantur singula per se trita, &
 fiant parui Trochisci.

COMMENTARIUS.

Inter Sief, seu Collyria numerantur ab Arabibus hi trochisci a ^{cap. 15.}
 Rhasi descripti lib. ad Almanforem. Verum eius descriptionem re- ^{Saporta}
 centiores valde immutarunt: Alij enim gummi Arabicum addiderunt, ^{Mat. de}
 alij amyllum, alij opium reiiciunt, & caphuram substituunt, sic enim ^{gradib.}
 pastilli fiunt candidiores, nec minus oculorum affectibus efficaces,
 imò in multis vtilliores. In dolore tamen illorum acerbissimo poterit
 opium addi, vel vt censet Ioubertus, duobus modis parandi sunt,
 cum & sine opio, vt pro rei exigentia, vel hi, vel illi foeliciùs vsurpen-
 tur, nisi quis maluerit, vt fere fit, vtendi tempore, opij pauxillum
 permiscere. Præparatio faciliior est quàm vt longiore indigeat expli-
 catione.

Valde conducunt oculorum affectibus multis. Eorum enim dolo-
 res mitigant, inflammationes temperant, fluxiones sistunt, materiam
 detergunt, exsiccant, digerunt, & partem roborant.

Vires.

Sic videor præcipuos & vsitatiores pastillos in pharmacopoliis om-
 nibus præparandos & asseruandos recensuisse. Alij enim qui passim
 in vulgatis Antidotariis occurrunt, vel nullius, vel improbatum sunt
 vsus, vel facile sub illis comprehenduntur.



OFFICINÆ
PHARMACEVTICÆ,
SIVE ANTIDOTARII
PARS ALTERA, DE MEDICAMENTIS
externis, tribus adhuc Libris distincta.

In quorum priore, de omni Oleorum genere differitur: Quibus Appendix additur de Balsamis.

P R Æ F A T I O.



MEDICAMENTA topica seu quæ exterius adhibentur, multa sunt, ut fofus, epithe-
ma, lytus, collyrium, lotio, frontale, cata-
plasma, fynapismus, dropax, velicatoriũ,
fcutum facculi, cucufa & pleraque alia,
quæ in rem præsentem parantur, nec diu
fine alteratione & corruptela feruantur, de
quibus abundè lib. 5. nostrarum Institutio-
num egimus. Alia multos menses & aliquã-
do annum integrum, bienniumve ad futu-

ros vfus fine virium iactura in Officinis poffunt afferuari, ut Olea,
Cerata, vnguenta & Emplastra, de quibus hac fecunda parte Offi-
cinæ à nobis instructæ differere itatuimus: quorum vfus & gratior
& toleratu facilius est, quàm eorum, quæ per os ingeruntur. Hæc
enim sæpius morbum oppugnando ventriculum subuertunt, appe-
titum tollunt, tormina excitant, & totam naturæ Oeconomiam tur-
bant: vnde medicamenta & potiones rariffimè dari iuffit Cornel.
Celf. Nam cū vix iuftiffima dofi exhibeantur: exhibita ad arbitrium

Cap. 3.
lib. 3.
de re
med.

sua munia non exequantur, cum sapè moueant, nec promoueant, aut humorem laudabilem foras propellant, noxium deferant, aut malam internis partibus intemperiem relinquant, interdum periculosa sunt. Nouit enim quemdam medicum non satis prudentem Aë- *cap. 84.*
tius, qui à malè exhibito medicamento hominem peremit. Topica *ser. 1.*
vero tutiora sunt, quæ non tantùm ad vitia externa, sed etiam inter- *tet. 2.*
na vsurpantur. Nam quemadmodum ob ea quæ foris apparent, interdum purgatoriis ac reliquis medicamentis, quo exuperantem humorem coërceamus, vtimur: ita & ob ea quæ intus infestant, foris emplastra, olea, vnguenta & illitiones plerumque damus. Siue *Actua*
enim stomachus laboret, aut iecur, renes aut aliud quodpiam viscus *cap. 7.*
ex interioribus afficiatur, non parum opis ex istis medicaminibus *lib. 6.*
foris adhibitis accedit. Prima siquidem omnium medicamenta ex- *meth.*
terna fuerunt, quibus sola duce natura, ac citra experientiam olim *med.*
veteres vsi sunt: atque nunc adhuc viri agrestes ictu, aut casu, aut alia re scindente vel contundente læsi sine delectu, obuiam quamlibet plantam assument, & affectæ parti admouent: sed fœlicem exitum, qui robore naturæ nonnunquam accidit, medicamento interdum noxio tribuunt. Quæ autem externa medicamenta optima sint, quæ in pharmacopoliis asseruâda & quo modo parâda, in his tribus libris ostēdimus. Atq; vt in tribus superioribus, à liquidioribus, nēpe syrupis orsi, mox crassiora, vt Eclegmata, dein crassissima, vt Electaria, postea solidissima vt pilulas & Trochiscos optima methodo descripsimus: sic in his posterioribus ab Oleis auspicati, statim vnguenta spissiora, dein emplastra crassissima subiungemus. Ab oleis igitur initium sumentes, à quibus cerata, vnguenta & emplastra magnam suæ compositionis partem mutuuntur, primùm loquemur de his quæ per impressionem seu infusionem parantur, dein ea examinabimus quæ per expressionem trahuntur, postremò ea attingam, quæ per ascensum & descensum eliciuntur.



OFFICINÆ
PHARMACEVTICÆ
SEV ANTIDOTARI
LIBER QVARTVS.

De Topicis , seu externis Medicamentis :
ET PRIMVM

De Oleis ex infusione Medicatis.



OLEA quorum est in Medicina frequens vsus, vel simplicia sunt, vel composita. Simplicia dicuntur, quæ nihil habent ab arte præter educationem, quæ sine rerum aliarum mixtura peragitur, vt olea quæ expressione trahuntur, cuiusmodi est oleum simpliciter dictum, quodd scilicet ex oliuis maturis, omphacinum, quodd ex hisdem immaturis exprimitur: vt etiam amygdalinum, Caryinum, & alia pleraque ex fructibus aut seminibus expressa, quæ pro varietate seminum, à quibus educuntur, variam habent qualitatem, vt à calidis calidam, à frigidis frigidam, ab aliis qualitatibus aliam. Cum tamen oleum absolutè dicitur, Idipsum tantum quodd ex oleæ maturis fructibus extrahitur intelligendum est: Cuius extrahendi ratio non magis ad Pharmacopœos attinet, quam vini exprimendi, aut panis conficiendi modus. Quod negotium & laboriosum opus rusticis, & in his operibus exercitatis meritò committitur, cum illa omnia alimenta sint, atq; in mensâ, potiùs quàm Officinam trahantur. Propterea de oleo communi exprimendo solitus esse non debet Pharmacopœus, sed de aliis omnibus quauis arte præ-

bata elicitis. De quibus omnibus hoc libro agimus, in cuius sectione priore, ea quæ per impressionem & infusionem rerum medicarum parantur, examinabimus, initio ducto à violato, quod scilicet primos Veris flores admittit.

oleum violatum. CAP. I.

℞. Olei loti lib. v.

florum violar. martiarum, recent. ac tritarum,

succi vel aquæ infusionis violarum an. lib. ii.

Confusè omnia misce, & integram hebdomadam insola: Exemptas violatas fortiter exprime, & novas impone; Atque fac ita ter: Postea coque in vase duplici dum aquea humiditas obsumpta sit.

COMMENTARIUS.

Præparatio
ex Mesue.

Omnes artis Pharmaceuticæ studiosi vnum Mesuem, tanquam optimum ducem vno consensu agnoscunt, miris laudibus efferunt, ac venerantur: Illius tamen leges & præcepta ad medicamentorum compositionem spectantia, perpetuò non seruant, sed modò probant, modò improbant. Nec imprudenter ab eo, & aliis antiquis, quibus tamen prima laus semper debetur, aliquando recedunt, dum longo usu doctiores facti, ac magis experti, quæ melius aut deterius, hoc vel illo modo posse fieri norùt, immutât. Sic de medicamentorum cõpositione aliquid sæpe detrahût, aut addût, aut methodum ab inventore traditam non sequuntur. Sic in his oleis medicatis ex infusionis ac maceratis rebus parandis dissentiunt, vt in oleo violato; ad cuius confectiõnem iubet Mesue oleum ex oliuis immaturis expressum, aut amygdalinum, aut sesaminum assumi & ablui; deinde flores diebus septem in oleo macerari, insolari & exprimi: Postea tribus horis in vase duplici coqui: Idque ter iterari, abiectis semper floribus expressis, & recentibus immixtis: Tum demum lento igne coqui ad humiditatis aquosæ deperditionem, & in vase idoneo seruari.

Hanc parandi rationem multi Pharmacopœi sequuntur, vt Tholosani, qui Mesuei præceptiones ac methodum vix vnquam negligunt: Alij non ita in ipsius verba iurarunt, quin pro rationis dictamine nonnulla interdum immutent. Facile enim est inuentis addere,
aut

aut perfectionem maiorem quæ superflua sunt, detrahere, aut minus bene disposita, castigare.

Sic autem ferè vbique locorum oleum violatum paratur. Primò olei communis synceri quantitas quadam ad libitum assumitur: aqua fontana verberatur, abluiturque: In vase vitreo, aut fictili vitrato imponitur: Flores violarum martialium, recentium, simul infunditur: hebdomadam integram macerantur, & si tempus permiserit insolantur. Dein parum ac lento igne feruefunt, vt exprimantur: Postea noui flores, vt ante, immerguntur, & exprimuntur: Idque ter iteratur. Tandem abiectis post vltimam infusionem floribus oleum blado igni feruefit, ad aquæ humiditatis dissipationem. Tuncque in vase idoneo reponitur & seruatur.

Consuetus
parandi
modus.

Vt autem melius fiat, in tertia tantum infusione poni debet succus vel infusio violarum, non in prima, aut secunda, ne tota mixtura rancefcat aut corumpatur. Additur vero ne oleum intercoquendum vratur, atque vt violarum facultas in eo ipso tota relinquatur.

Oleum violatum inflammationem extinguit, pleuriticos iuuat, asperitatem arteriæ, & pulmonis lenit, apostemata calida contemperat, phlegmonas omnes remittit, & dolores mitigat.

Vires

Oleum Keirinum. D. Mes. CAPVT II.

Rx. Florum Keiri, seu leucoij lutei ℥ vii.

olei optimi lib. i. ℞.

aquæ decoctionis florum Keiri ℥ iii. ℞.

simul permisce, insola, exprime: Idque ter: Parum coque & serua.

COMMENTARIUS.

Occurrunt secundo loco flores copiosissimi Leucoij lutei, seu Keiri. ab Arabibus dicti, ex quibus suadet Mesue eo modo per impressionem oleum parari, quo chamemelinum, & hoc, quo rosaceū: hoc est, ex tribus infusionibus insolatis & expressis, addita certa quantitate succi, vel decocti eorundem florum: qua post vltimam macerationem lento igne absumpta, oleum tandem expressum, colatum, ac limpidum in vase reponitur idoneo & seruatur. Vt pluri-

Præparatio

mum tamen paratur nunc ex vna, aut altera infusione, absque decocti alicuius aut succi commixtione, atque confusè flores oleo immersi multos menses relinquuntur ante colaturam. Improbata tamen est isthac parandi ratio, per quam & olei corpus magis turbidum est, & vires imbecilliores.

*Vi-
res.*

Ritè paratum moderatè calefacit, tenuat, lenit, digerit, dolores vel à flatibus, vel materia frigida ac pituitosa mitigat, Arthriticis & resoluti prodest, & neruorum & iuncturarum doloribus auxiliatur.

oleum Iridium. CAP. III.

R. Radicis Ireos lib. i.

florum eiusdem lib. ii.

Maccrentur in decoctionis aliarum radicum Ireos sufficienti quantitate: Adde olei dulcis, aut sesamini lib. v. Coque in vase duplici & percola: Atque tertio fac similiter, novos flores & radices addendo, macerando & exprimendo, oleumque postremo expressum serua.

COMMENTARIUS.

Præparatio Iridis multæ sunt varietates, quas lib. de simplicibus enumerauimus: Omnium prima floret cœlestis dicta, dein alba seu Florentiana: Ex vtraque, sed potissimum ex illa oleum per infusionem paratur, radicibus & floribus explicato modo maceratis & expressis. Sunt qui tantum in diplomate seu vase duplici radices tritas, simulque flores parum tusos cum succo aliarum radicum coquunt, dein oleum superfundunt, atque denudè elixant ad feri deperditionem. Sic paratum oleum & odoratum, & efficacissimum est: Efficacius tamen si bis, aut ter, vt fieri solet, idem repetatur.

De florum autem ad radices proportionem inter authores nulla dissentio, cum illorum ad has, duplum pondus definiant: Sed de aliis radicibus in aqua elixandis, & de aqua ipsa non conueniunt, vt neque etiam de oleo illis commiscendo. At vero relictis, breuitatis gratia, opinionum varietatibus, dicimus libram vnam radicem assumendam, & in aquæ libr. iiii. aut v. ad summum, ad medias incoquendam. Nonnulli definito radicem, florum & aquæ ponderi, lib. ii. tan-

tum olei permiscent, alij lib. vii. ſ. aut lib. viii. Ego medium pondus, nempe lib. v. permisceo, & blando igne ſimul omnia percoquo ad humiditatis ſeroſæ reſolutionem.

Oleum Irinum calefacit, emollit, tenuat, potenter digerit ac reſoluit, concoquit, penetrat, aperit, maturat, aurium ſonitus tollit, ſtumas diſcutit, alioſque tumores duros, ſpasmus, & narium ſœtorem emendat, & dolores à frigida materia natos ſedat.

Vires,

oleum roſatum completum. D. Meſ. CAP. IV.

℞. Olei communis loti lib. iiii.

℞. roſarum recentium, completarum lib. i. ſ.

aquæ infuſionis roſarum lib. i.

In vaſe idoneo ac ritè operculato impoſita, diebus ſeptem inſolentur, dein blando igne horam dimidiam coquantur in vaſe duplici. Exprefſis & abiectis foliis noua imponantur, atque tertio immutentur, tot dies inſolentur, coquantur, exprimantur. Exprefſum oleum ſeruetur.

COMMENTARIUS.

Oleum roſatum completum ſic à Meſuë nuncupatur, quod ſit ex oleo, maturis ex oliuis expreſſo & pluries loto, & foliis roſarū rubearum explicatis ſeu expansis, integram hebdomadam inſolatis, atque ter mutatis, vt dictum eſt in formula præſcripta, in qua iuſtum pondus ſingulorum definimus à Meſuco cuiusque voluntati, & arbitrio relictum, præter aquam infuſionis roſarum, quam oleo æqualem ſtatuit. Nos tertiam aut quartam tantum illius partem ad oleum ſufficere credimus. Dum enim maiore quantitate ponitur, vix poteſt inſolatu reſolui: Coctione verò longiore oleum alienum calorem contrahit, & natiuam odoris ſuauitatem amittit. Tres aliæ deſcriptiones à Meſuë traditæ negliguntur.

Oleum quo
modo laue-
tur.

Oleum autem multifariam ablui ſolet, vel enim olla quadam, aut alio vaſe idoneo ſimul cum aqua excipitur, & diu verberatur: Itaque tamen vt poſtquàm quienerit facile poſſit ſeparari: vel in ampulla vitrea in fundo perforata diutius agitatur, occluſo foramine, nec non orificio ſuperiore. Tum intermiſſa per horam agitatione, ac foramine inferiore aperto, quæ ſubſidebat aqua fluere permittitur: Eo-

dem recluso, quod innatabat oleum, in ampula relinquitur: Cui nonnumquam alia aqua superfunditur. Sed de præparatione medicamentorum satis abundè in nostris Institutionibus disseruimus.

Olei rosati
vires.

Oleum rosatum completum inflammationes extinguit, roborat, cogit, densat, ventriculum æstuantem temperat & recreat, renū ardores temperat, dolorem capitis à causa calida sedat, fluxiones sistit, & humorum impetum cohibet.

Ol. Rosatum Omphacinum, vulgò incompletum.

C A P. V.

Rx. Olei Omphacini loti lib. iii.

rosarum nondum penitus expansarum & exungulatar. lib. i.

misce in vase idoneo, & septem dies insola: Terque repete. Et fac, ut dictum est de oleo rosato completo & serua.

C O M M E N T A R I U S.

Præparatio

Oleum hoc incompletum dicitur, quòd fiat ex rosis incompletè explicatis, & ex oleo ex oliuis incompletè maturis expresso, quod Omotribes seu crudum, viride & Omphacinum nuncupatur, quodque solùm extrahitur ob medicos vsus, cuius inopia oleum commune ac maturum abluitur in Omphacio, ut aciditatem acquirat, & vim magis refrigeratorem. Deligendæ autem sunt rosæ rubræ, recentes, nondum plane explicatæ: Postea ab ungulis seu partibus albidis purgandæ, & in mortario lapideo cū pistillo ligneo tundendæ, in oleo macerandæ & hebdomadâ integrâ soli exponendæ, tū exprimendæ. Expressis & abiectis rosis priorib. aliæ nouellæ immitendæ, insolandæ & exprimendæ: Atque tertio iterandæ & quadraginta dies soli exponendæ: Postremò oleum expressum vsui reponendum.

Vires.

Oleum Omphacinum multum refrigerat & roborat: Ob id doloribus à causa calida confert, Erysipelata extinguit, ardores plurimū mitigat, humorum fluxus cohibet, & ventriculi ac viscerum æstus temperat.

Ol. rosatum simplex, ac vulgare. CAP. VI.

*Olei communis loti lib. ii. ℞.
 Rosarum exungatarum tusarum lib. i.
 misceantur, insolentur dies quadraginta, dein in vase
 duplici coquantur ad humiditatis excrementitiæ deper-
 ditionem: Postea fortiter exprimantur. Expressum oleum
 seruetur.*

COMMENTARIUS.

Isthæc olei rosati descriptio quòd simplicissima sit & paratu facil-
 lima, omnium vſitatissima est. Qui enim magis rebus suis, quàm æ- Præparatio
 grorum ſanitati conſulunt, vix vnquam medicamentum quantum-
 vis euporiſtum, ſeu paratu facile, ex arte & ratione conficiunt. Nam
 hodie multi pharmacopœi roſas recentes quaſuis, modo rubras, non
 exungulatas aſſumunt: In oleo communi illoto macerant: In ſole
 duos meſes, aut plures exponunt vaſe vitreo aut figulino. Poſtea
 vel hyeme, vel alio vtendi tempore, pauco decocto, aut ſucco roſa-
 rum adiecto in diplomate coquant & exprimunt: Sicque repo-
 nunt.

Oleum roſatum ſimplex ſimiles habet vires, atque omphacium,
 ſed imbecilliores. Eo tamen maior pharmacopœorū pars vtitur, & Vires
 per ſe & aliis medicamentis commixto. Et cum à medicis ad inflam-
 mationem quamdam Oxyrrhodinum præſcribitur, huius olei tres Oxyrrhodi
 partes aſſumunt, quibus quartam aceti portionem adiiciunt, & effi- num
 ciunt oxyrrhodinum.

Oleum liliorum simplex. D. Mes. CAPUT VII.

R. Olei maturi lib. ij. ℞.
 florum liliorum detractis filamentis croceis lib. ii.
 aquæ decoctionis liliorum lib. ℞. aut ℥ vii. ℞.
 Macerentur simul, insolenturque: atque per macerationes, insolationes & expressiones iteratas paretur hoc oleum, quo modo rosatum completum.

COMMENTARIUS.

Duplex à Mesue datur huius olei descriptio: vna simplex, quam hic exhibemus, ut præstantiorem & vñtatiorem: altera magis composita quam subticemus, ut inutilem & nullibi parari solitam.

Preparatio Illius autem parandi methodus non omnibus vna: Alij enim simplicissima præparatione contenti flores tantum semel infundunt, insolant & exprimunt. Alij ter hæc omnia repetunt, adduntque quartam aquæ decoctionis liliorum ad oleum partem, quam lenta ebullitione exhalant: hocque modo paratum oleum efficacissimum habetur, & magis vsui reponendum: Trina enim maceratione, insolatione & expressione vires maiores acquirit.

Vires.

Oleum liliorum moderate calefacit, resoluit, dolores à quacunque causa subortos sedat, omnem acrimoniam mitigat: thoracis, ventriculi, renum, vteri, vesicæ ardores & dolores contemperat.

Oleum Nenupharinum. CAP. VIII.

℞. Olei loti lib. v.

florum nymphæ à quibus exterior pars herbacea, & interior crocea detracta est, lib. ij.

aquæ decoctionis florum prædictorum lib. i. & ℥ iii.

Omnia in vase idoneo reponantur, insolentur, exprimantur, atque ter iterentur, ut in oleo rosato completo.

COMMENTARIUS.

Idem est huius olei parandi modus atque violacei. Abluitur primum oleum, vel maturum vel omphacinum. De neutro enim Me- sue loquitur definitè, crudum tamen seu omphacinum maturo convenientius est & accommodatius, in quod flores nenupharis albi, non lutei à partibus dictis repurgati macerentur, & dies septem infundantur, parum feruefiant & exprimantur; antè superfusis lib. i. & ℥ iii. aquæ decoctionis florum nymphæ alborum. Atque ubi cuncta hæc iterata fuere, & aquea humiditas, lenta ad blandum ignem ebullitione, deperdita: Expressum tandem oleum, ut ritè paratum, vsui reponendum est. Ut autem ritè paretur decoctio admiscenda, florum nenupharis ℥ iiij. assumenda sunt: in aquæ fontanæ lib. i. ℔. ad ℥ iii. aut iiij. deperditionem incoquendæ. Hinc colatura macerationi commiscenda.

Compositi-
onis illu-
stratio.

Preparatio

Oleum nenupharinum refrigerat magis, quàm violatum, somnum conciliat, ardores hepatis, renum & iecoris contemperat, venis motus arcet, tentiginem impedit, & dolores capitis à causa calida sedat.

Vires

Oleum de Mentha. CAP. IX.

*. Olei lib. ii. ℞.
 ℞ mentesatiua lib. i.
 succi eiusdem ℥ vii. ℞.
 confuse permisceantur: dies septem Soli exhibeantur:
 Dein per horam in duplici vase coquantur: Postea expri-
 mantur: Atque bis, terque omnia iterentur. Postremo
 oleum expressum seruetur.*

COMMENTARIUS.

Sunt qui ad huius olei confectionem Omphacinum assumunt, quod sua stypticitate ventriculum roboret: Alii maturum & completum, quod eundem magis calefaciat & coctionem iuuat: unde oleum eustomachicum à nonnullis dicitur. Debet autem seligi mentha satiua, crispa ac viridis, cuius folia tunsa oleo macerabuntur, atque ter mutabuntur præscripto modo.

Vires.

Oleum de mentha ventriculum frigidiores calefacit, imbecillū roborat, coctionem iuuat, vomitum sistit, appetentiam reuocat, nauseabundo stomacho succurrit, & flatus discutit.

Oleum de Absinthio. CAP. X.

*. Olei communis lib. v.
 ℞ comarum absynthij lib. ij.
 succi eiusdem lib. i. & ℥ iij.
 misce & confice eodem modo, quo superius descrip-
 tum.*

COMMENTARIUS.

Hoc oleum authoris est incerti, licet à multis describatur, sed diuersa semper absynthii ad oleum proportionem. Alij siquidem illius quantitatem valde exiguum ponunt, alij maximam. Nos Parisiensium pharmacopœorum optimam methodum sequuti, ex olei partibus quinque, absynthij duabus, succi eiusdem tantum quarta ad oleum proportionem. Nonnulli ad maiorem astringentem & robur rosas permisceri debere suadent, satius tamen est descripto modo parare, nam absynthium stypticitate non caret, praesertim Ponticum & vulgare. Si quis maiorem astringentem expetierit, illi licebit vtendi tempore nonnihil ex oleo myrtino aut rosaceo commiscere.

Oleum de absynthio calefacit & roborat, praesertim ventriculum, appetitum excitat, humores crudos coquit, flatum dissipat, vermes enecat, & obstructions à causa frigida tollit.

Vires.

Oleum anethinum, & chamamelinum. CAP. XI.

Rx. Olei communis lib. ij.

florum chamæmeli, vel summitatum anethi lib. i.

aqua decoctionis alterutrius lib. ss.

Permisceto, septem dies insolato, ad serosa humiditatis exhaustionem coquito. Hoc bis, terve iterato, & vsui reponito.

COMMENTARIUS.

Ani- Hæc duo olea similes vt habent vires, sic simili modo parantur.
cen. Vil Nonnulli flores chamæmeli diem integrum siccant in loco Soli non
lanoua- exposito, nec dosim illorum, vt neque olei definiunt. Multi par pon-
mus. dus & florum & decocti eorumdem sumunt; olei verò quantitatem
 sufficientem, in qua nempe flores queant ritè macerari. Sunt qui
 lib. i. tantum florum immergunt in olei lib. v. & sesquimensum circa
 caniculam Soli exhibent, tum exprimunt & seruant.

Composi-
tionis illu-
stratio.

Si autem à medicamento virtute aut imbecillitate, sumitur mixtionis & præparationis bonæ vel malæ indicatio, descripto parandi modo hæc olea confecta erunt efficaciora.

Vires olei
chamame-
lini.

Vires An-
ethini.

Oleum ru-
tæ.

Vires.

Oleum sã-
mpsuchinũ.

Vires.

Oleum sã-
bacinum.

Vires.

Oleum chamæmelinum calefacit & resoluit moderatè, dolores à causa frigida sedat, & nervis roborandis prodest.

Anethinum quoque resoluit, calefacit, flatus discutit, nervos confortat, lassitudines tollit, dolores articulorum mitigat, venarum spiracula laxat, & convulsionibus confert.

Oleum Rutaceum eodem modo parari solet & debet. Aliud magis compositum describitur à Nic. Alexandrino, quod præter folia rutæ tunsa recipit sampsuchum & cuminum: raro tamen præparatum inuenitur. Nam quod à Mesuë datur, satis potenter ea præstat quæ pollicetur. Calefacit, tenuat, digerit, vteri dolores à causa frigida sedat, & flatus discutit, atque doloribus omnium corporis partium, quæ calefieri postulant, accommodatur, inquit Actuarius.

Oleum Sampsuchinum vel simplex est, ex huius foliis & succo, vel decocto & oleo à Mesuë confectum, vel magis compositum ex Dioscoride, quod præter ea folia myrthi, serpillum, abrotonum, sisymbrium, & cassiam ligneam admitit. Hoc vix vnquam paratur, illud rarissimè, nisi ob emplastri è meliloto confectioem. Paratur autem Mesuei decreto vt Oleum Myrtinum: hoc vero vt melinum, siue cydoniorum: hoc est, ex sampsuchi foliis & eorum succo confusè oleo maceratis, insolatis & expressis, atque ter mutatis. Quid vero sit sampsuchus, & an à maiorana diffideat lib. de simplicibus demonstrauimus. Cap. 10.
lib. 6.
dere
medic.

Oleum Sampsuchinum calefacit, & roborat caput, & neruorum genus omne.

Oleum de Iasmino, quod Arabes Sambacinum vocant, Medicorum decreto in pharmacopoliis multis paratum seruatur. Viribus enim pollet efficacissimis, tum ad dolores à causa frigida sedandos, tum ad resoluendum & digerendum. Maximè autem commendatur ad ventris dolores & tormina, quæ sæpè pueros lacerant, mitiganda ac sedanda. Conficitur eodem modo, quo rosatum completum, aut Keirinum. Cap.
57. lib.

Oleum Hypericonis simplex. CAP. XII.

*℞. Summitatum Hyperici nondum maturefcentis l. j.
 Olei communis lib. ij.
 aquæ decoctionis florum & foliorum hyperici lib. ℞.
 Misce, & insola per hebdomadam: dein coque ad feri
 dissipationem: tum exprime: idque ter repete. Et po-
 stemò expressum oleum vsui reconde.*

Oleum Hyperici magis compositum D. Iac. de Maul.

*℞. Comarum hypericonis ℥ iij.
 infunde biduum aut triduum in vini odoriferi ℥ x.
 Dein coque in vase duplici ad ℥ iij. exhalationem. Po-
 stea exprime, & parem hyperici quantitatem impone,
 macera, coque, & percola vt antè. Adde Olei ℥
 vi.
 terebinthinæ claræ ℥ iij.
 croci ℥ i.
 Coquantur simul ad vini consumptionem. Tum exprime,
 & in vase idoneo repone.*

COMMENTARIUS.

Tres olei hypericonis differentię notantur. Prima simplicior & vltior, ex hyperici foliis & floribus & oleo parata. Alia magis composita, quæ præter dicta, terebinthinam, vinum & crocum admittit.

Tertia maximè composita Ioan. Vigonij, quæ alia adhuc olea, lacrymas, succos, radices, folia & vermes terrestres excipit. Prior in

pharmacopœorum Officinis, posterior in Chirurgorum tabernis haberi solet: alia modò in his, modò in illis pro medicorum imperio.

Simplicius autem oleum hypericonis præstantius habetur, si ex solis floribus ter in oleo maceratis, insolatis & expressis conficiatur. Illius tamen summitates cum folliculis & granulis sæpius sumuntur: atque utroque modo confectum oleum prærubrum est, quasi cruentum, & velut Myrelæum, seu quid medium, inter vnguentum & oleum.

Vires.
Ol. hypericoni magis compositum.

Mirum in modum nervos roborat, ecchymosin delet, humores digerit ac resoluit, dolores mitigat, & iuncturas recreat.

Quod à Iacobo Manlio describitur, videtur potius esse balsamum quoddam, aut vnguentum vulneribus agglutinandis accommodatum, quàm oleum. Quia tamen eximium est, non negligendum. Si dum paratur, vinum per priorem ebullitionem citius exhalarit, aliud denuò affundendum, quod per ultimam dissipabitur.

Vires.
Ol. Cyprinum Sambucinum
De Enula.
De meliloto.
De carthamo.
De Santalo citriño.

Calefacit & siccat, nervorum puncturis & vulneribus plurimum confert, ambustis medetur: Ischiadicis utiliter adhibetur, & ad omnes dolores à frigido contractos fœliciter vsurpatur.

Oleum Cyprinum seu Ligustrinum, quod Arabes de Alcanna nuncupant, & Oleum Sambucinum, parantur ut Rutaceum, Rarissimè tamen parantur ut & Oleum de Enula, de meliloto, de carthamo, de Santalo citrino, & alia pleraque ab authoribus ad ostentationem potius, quàm necessitatem descripta.

oleum de pomis mandragora. D. Mes. CAP. XIII.

*℞. Succum pomorum mandragoræ maturorum,
Olei sesamini, vel communis an. partes æquales.
Coque in diplomate ad succi euaporationem.
Dein succi tantumdem adhuc superfunde, & coque, ut prius: idem ter fac, & vsui repone.*

COMMENTARIUS.

Duæ sunt huius olei descriptiones, una Mesues, quam nunc exhibemus, ut paratu faciliorem & tutiorem: Alia Nic. Præpositi quã improbamus, ut nimis stupefactivam & narcoticam. Non solum enim succum mandragoræ admittit, sed etiam hyosciami, papaveris

& cicuta, simulque opium. Nam cum narcotica etiam benigna, nisi ritè preparata & prudenter exhibita, sensus confopiant, & calorem insitum extinguunt, non opus est, tot eiusdem inimicæ qualitatis medicamenta in vnum aggerere: Adde quòd, ex medicamentorum stupefactiuorum usu non summa sensuum requiritur stupefactio & necrosis, sed tantum inflammationis vel doloris sedatio. Si tamen ad Olei de pomis mandragoræ confectionem, parua tantum pomorum quantitas suppetat, poterit radicum succus extrahi & permisceri. Nullum enim est mandragoræ parti magis affine substitutum, quàm pars alia mādragoræ. Præparatio ex formula descriptionis satis patet.

Inflammationem omnem extinguit, dolores sedat, sensus stupefacit, cephalalgia & phrenitidi confert, & renum ardores illitum temperat.

Virec.

oleum Myrtinum D. Mes. CAPUT XIV.

℞. Foliorum myrti viridium ℥ v.
℞. Olei omphacini lib. i.

Misce & insola dies octo: In balneo Mariæ parum coquito: Expressa folia eiicito: recentia iniicito: Idque ter iterato: postremò oleum expressum seruato.

oleum Myrtillorum.

℞. Baccarum myrti lib. j.
℞. Olei Omphacini lib. ij ℥.

aquæ decoctionis foliorum & baccarum myrti ℥ vii. macerentur & coquantur ad aquæ deperditionem. Expressis & abiectis baccis, aliæ recentes, vt priores macerentur, & coquantur donec tabescant. Idque iteretur tertio, si efficacius oleum requiratur. Expressum tandem oleum seruetur.

COMMENTARIUS.

Oleum myrtinum dicitur quod fit ex myrti foliis maceratis & expressis: oleum myrtillorum, quod ex eiusdem baccis seu myrtillis conficitur. Vtrumque vsuale & viribus est eximium: sed baccarum inopia, alterum solummodò, quod ex foliis maceratis paratur, in officinis assèruatur. Qui myrtillos tantum aridos habent, ex hisque oleum parare concupiscunt, vino odorato humidiores & tumidiores efficiunt, dein oleo miscent, coquunt & exprimunt, & vsui reponunt.

Aliquando oleum myrtinum paratur ex succo foliorum myrti & oleo, quibus additur ladanum. Est tamen vsitatius & melius, quod modo à nobis descripto conficitur.

Vtrumque refrigerat, densat, astringit, cerebrum, nervos & ventriculum roborat, capillos retinet, eorumque defluuium sistit, gingiuis medetur, dentium dolori, laxatos artus firmat, pustulas erumpentes illitu emendat.

Oleum cydoniorum. D. Mes. CAP. XV.

*℞. Carnis Cydoniorum integrorum tritorum,
succum eorum an. lib. ℞.*

olei omphacini lib. i. & ℥ iij.

Vase vitreo, aut saltem vitrato excepta dies quindecim insolentur: dein coquantur in vase duplici ad succi consumptionem: Expresso fortiter oleo, alia caro trita & succus addantur, insolentur, concoquantur, exprimantur bis aut ter: postremò colatum oleum seruetur.

COMMENTARIUS.

μελινον
Melinum.

Autumno paratur hoc oleum, Melinum Græcè dictum, quo tempore mala cotonea magnitudinem perfectam adepta maturescunt: Antequàm tamen planè maturuerint assumenda, nec depellenda, sed à lanugine tantum spolianda, dein ras panda, vt cum Aromatariis loquar, seu ferramento segmentis quibusdam exasperato, dera-

denda. Postea pondus æquum succi colati, & carnis tritæ aut deraſæ, nec expreſſe ſumitur, & oleo confuſè permixtum ter inſolatur, coquitur, exprimitur modo explicato. Narrat Syluius ſuccum cydoniorum ita crepitare & agitari dum oleo incoquitur, viſu mirabile, ut oleum omne tandem vaſe excutiat: Ob id, inquit, vaſe duplici, hoc oleum coquendum eſt ſimul, ne ab Empyreumate oleo impreſſo, vires cytoniorum aut deteriores aut imbecilliores euadant.

Oleum id refrigerat, aſtringit, ventriculi & inteſtinorum retentricem facultatem roborat, coctionem iuuat, vomitum ſiſtit: Ob id cholera morbo, lienteria, dyſenteria confert, & partem quamuis laxiorem & imbecillam firmat ac roborat.

Vires;

Pigmelaum ſeu Myrelaum, aut Oleum pigmentatum.

CAP. XVI.

*℞. Summitatū botryos herbae granalis onuſtarū m. iij.
Baccarum botryos fruticis ℥ viii.
vini albi optimi lib. ℔.
olei boni lib. i ℔.*

*Miſce, & ſeptem dies inſola: dein in balneo Mar. ſimul
tandiu rotum incaleſcat, ut vinum vaneſcat.*

*Expreſſum oleum, in vaſe idoneo reponendum cum ℥
iii. terebinthinae venetae, & ad uſus ſeruandum.*

COMMENTARIUS.

Parari debet circa principium Autumni hoc oleum, quod Myrelaum, quaſi Vnguento-laum, ſeu oleum pigmentatum vocauimus. Vtraque enim planta ex qua conficitur, pymentum Gallis, quaſi pigmentum dicitur, & à nonnullis Ambroſia. Halitus enim fragrantia odoratum exhilarat, & lentore quodam aromatico, & velut vnguentario, quo extrinſecus percipitur admodum glutinoſa, contretantium digitos inuiſcat.

Naturam vtriuſque cum accuratè perſpexiſſet honorandus vir Dom. Claud. Gonerius, doctrina & morum integritate comendatiſſimus, ægrè tulit tam eximias ſtirpes, quaſe etiam ipſa natura odore, ſapore, pinguitudine, multum inſignes designat, à medicis nec celebrari, nec vnquam uſurpari. Sed hinc forſan harum planta-

rum contemptus subortus est, quod valdè frequentes sint. Nam quæ inter herbacea continetur, in omnibus hortis cultioribus inuenitur: Quæ vero fruticum modò assurgit, & ramulos ligneos erigit, in solo Parisiensi, aut longè non diffuso, lætè ac spontè prouenit: atque circa Septembris initium copiosa Lutetiam deuehitur, & ibi ferè tantùm à mulierculis emitur ob fragrantiam & odoris suauitatem vestibis conciliandam. Cùm autem qualitates vtriusque sæpe explorarim, & efficacissimas compererim, ex eis Oleum parauijuxta descriptionem traditam, quod sanè viribus, multis Balsamis respondet: Nam paralyfi, tremori, & neruorum imbecillitati valde confert, dolores articularum frigidos aufert, œdematosos tumores digerit, dolores à pituita natos tollit, humores crudos coquit & resoluit, cerebrum & genus neruosum roborat, & cum pauca terebinthina vlcera dysepulotica ad sanitatè perducit: Balsamum quoddam iure dici potest.



SECTIO SECVNDA.

De Oleis, quæ quouis tempore conficiuntur.

Priore libri huius sectione omnia olea vſitatiora & pharmacopoliomagis necessaria perstrinximus, Vere, æstate, & Autumno per infusionem parari solita, pro medicamentorum vbertate & bonitate quæ natura istis temporibus recentia & viribus eximia, libera manu ad tyro-
rum manus suppeditat: Sequitur nunc, vtralia quæ quouis tempore parari queunt, eadem arte describamus.

*oleum Mastichinum D. Mes. CAP. I.**R. Mastiches ℥ iii.**Olei rosati ℥ xii.**Vini generosi ℥ iiii.**Coque in vase duplici ad vini consumptionem. Eo cōsumpto, percoletur oleum, & vsui reponatur.*

COMMENTARIUS.

Duas tradit Mesuë olei mastichini descriptiones, vnā ex mastiche & oleo sesamino compositam, quæ nullibi parata reperitur: alteram ex vino, mastiche, & oleo rosato, quæ frequenti est in vsu. N. Præpositus tertiam præponit, quæ ab omnibus improbat. Myrepsus præter priorem à Mesuë datam, alias adhuc duas subiungit, vix vnquam celebratas. Sola igitur ea est huius olei admittenda descriptio, quam ex Auicenna & Mes. damus: Ad cuius confectio-Præparatio nem mastiche crassiusculè terenda: dein cum oleo rosato & vino rubro in diplomate tandiu coquenda, & inter coquendum spatula mouenda, donec vinum penitus fuerit absumptum.

Oleum mastichinum cerebrum, neruos, ventriculum, hepar & articulos roborat, duros tumores emollit, & dolores sedat.

Vires.*oleum nardinum D. Mes. simplex. CAPVT II.**R. Nardi Indicæ ℥ iii.**Vini & aquæ an. ℥ ii ss.**olei sesamini lib. i. ss.**Coquantur in duplici vase, igne lento, & frequenter mouendo, ad humoris aquei dissipationem.*

COMMENTARIUS.

Multus est nimis aliquando Mesuë in medicamento eodem variando, quadruplex enim oleum rosatum describit, triplex nardinum, sed quæ tantum inter illa priore loco describuntur, usurpantur. Alia nunquam aut rarissimè ut & alia duo à Myrepsō descripta, quæ nimis sumptuosa sunt, & verius balsama aut unguenta quàm olea.

Ad nardini autem simplicis confectionem, olei sesamini defectu, oleum dulce substituitur, nullo aut exiguo errore. Nam Mesuë aliquando imperat oleum sesaminum vel dulce ad libitum assumi. Spica verò minutim incidenda, tres aut quatuor horas in vase fictili, aut vitreo cum vino, aqua & oleo maceranda. Dein omnia vase duplici feruefacienda ad aquæ & vini dissipationem. Sunt qui nardum in aqua & vino tantum macerant, idque diem integrum. Sic tamen cum illius vires magis dissipentur, præstat breuiore temporis spatium, oleo simul, aqua & vino super cineres parum calidos infundere. Olei autem libra dimidia cum parcius videretur ad ℥ iii. nardi, quæ magnam mole admodum levis est, ex Fernelio & Medicis Romanis aucta est, & pro lib. ℞. lib. i. ℞. posita.

Ol. Benedictum. Vires.

Oleum nardinum ob insignes virtutes benedictum appellatur, calfacit, tenuat, digerit, modicè astringit: Ob id affectibus omnibus frigidis, flatulentis, cerebri, ventriculi, iecoris, lienis & vteri plurimum confert, & corporis odorem & colorem commendat.

Oleum Croci D. Mes. CAP. III.

℞. Croci,
calami aromatici an. ℥ i.
myrrhæ ℥ ℞.

Macera dies quinque in aceto: sexto die toto, infunde.

Cordumeni, i. carui, vel eius loco cardamomi ℥ ix.

Septimo coquantur simul lento igne ad acetici consumptionem, cum

Olei ℥ i. ℞.

Percolatum oleum in idoneo vase reposito, & seruat.

COMMENTARIUS.

Cap. 2. Morbus vix datur vllus frequentior Neapolitano, nec medica-
lib. 5. mentum ad ipsius expugnationem vsitatus Emplastro de ranis à Ioã.
Vigonio descripto: Nullus est enim adeò miscellus barbitonfor oppi-
dulanus, qui hoc medicamentũ saltẽ odore, colore & nomine, si non
viribus, non norit, & periculum simul & lucrum fecerit. Ad illius
autem compositionem cùm accedat Oleum de croco, in pharmaco-
poliis paratum debet asservari, alioquin malè & præter autoris in-
tentionem conficitur: Ob eum tamẽ usum à Mesue inuentum nõ
arbitror, qui vel luem veneream non vidit, vt credibile est, aut sub-
ticuit: sed ad vterum & nervos roborandos, amborum dolores se-
dandos, duritates emolliendas & discutiendas, & colorem concilian-
dum. Quid vero sit Cordumeni, lib. de simplicib. demonstratur.

Vires

Oleum de Capparibus. CAP. IV.

Rx. Cortic. radic. cappariz ʒi.
cortic. mediæ tamarisci,
foliorum tamarisci,
sem. agnicasti,
ceterach,
cyperi, an. ʒ ij.
ruta ʒi.
aceti, vini albi generosi, an. ʒ ij.
olei maturi lib. i.

Coquantur omnia in vase duplici ad acetum & vinum de-
perditionem. Percolatum oleum vsui reponen-
dum.

COMMENTARIUS.

Huius olei inuentio recentioribus tribuitur: De eo namque ve-
terum nullus, quod sciam, loquutus est: author tamen incertus per-
hibetur: sed quicumque is fuerit, hoc oleum medicatum methodi-
cè ac legitimè compositum, & viribus eximium descripsit: quod ideo

ferè vbiq̃ue locorum paratur iuxta descriptionem à nobis traditam, & ab omnibus probatam, vno Brasauolo dempto, qui rerum nouarum cupidus illam immutauit. Sed ex his ipse est, credo, qui malunt videri quàm aestimari.

Præparatio Vt autem ritè paretur id oleum, primò radices cyperi minutim incidendæ: dein simul cum corticibus capparum & tamarisci terenda: Reliqua quoque simplicia, tamariscus, scolopendrium, ceu ceterach & ruta simul tundenda, seorsim verò semen agni casti seu viticis. Tum omnia simul miscenda, diebus quindecim maceranda vino, aceto, oleo: postea in diplomate coquenda ad vini & aceti dissipationem. Tandem percolatum oleum seruandum.

Vires. Affectibus lienis magnopere prodest: eius enim duritiei, scyrrho, obstructioni & dolori medetur: meatus & poros cutis aperit, humores resoluit, & flatus discutit.

Oleum ex Euphorbio D. Mes. CAP. V.

Rx. Euphorbij ℥ ss.

olei keyrini,

vini odoriferi an. ℥ v.

Coquantur simul ad vini consumptionem.

COMMENTARIUS.

Præparatio Vt aqua arte frigidior, vel calidior efficitur, sic quoque oleum, quod multum refrigerans, si sedum, seu semperuiua, aut refrigerans & stupefactiuum, si mandragora in eo maceretur: calidissimum, si piper aut Euphorbium. Ab his omnibus legitimè adhibitis olea nonnunquam per impressionem medicata fiunt, medicis vsibus accommodatissima. Licet enim Euphorbium acerrimum & calidissimum sit, ad multa tamen commendatur à Galeno, seu permistum ceræ, ad coxendicum affectus, seu oleo liquatum ad hemicraniam à causa frigida: Ex cuius lectione doctior & audacior factus Mesuë, hoc oleū primum ab illo inuentum, in ordinem aliorum à seipso descriptorū retulit. Aliud adhuc subiungit ex Auicenna, cui pauca quædam adijcit. Sed nullius vnquam fuit vsus, vel penitus exoleuit. Ad superiùs autem descripti præparationem, Euphorbium seligendum album & recens, cuius penuria, vetus dupla portione Galeni consilio sumen-

dum: in puluerem tenuem læuigandum, superfuso pauco vino, aut oleo keyrino, ne acriter, vt solet, nares & cerebrum feriat. Tritum oleo & vino permiscendum, & vase duplici spatula subinde mouendo: lentè, ac tandiu coquendum, donec vinum exhalarit. Postea oleum percolatum vsui reponendum.

Oleū de Euphorbio multū prodest frigidis cerebri, & neruorum affectibus, cephalalgia, hemicrania, lethargo, naribus immissum. Vires. Valet quoque ad dolores frigidos iuncturarum, hepatis & lienis.

Oleum Moschellinum ac Moschatellinum. CAP. VI.

Rx. Nuces moschatas. N. ij.

moschi ʒ ss.

folij,

spica nard.

costi,

mastiches an. ʒ vi.

Syracis calamita,

xylocassia,

myrrha,

croci an. ʒ ij.

caryophyllorum,

carpobalsami, vel cubebarum,

bdellii an. ʒ ii.

Olei puri lib. iii.

Vini generosi ʒ iiii.

Terenda ex arte trita, atque confusè mista bulliant ad vini dissipationem. Percolatum tandem oleum vsui reponendum.

COMMENTARIUS.

Dissidium est inter peritos de huius olei authore, descriptione, nomine, & simplicium dosi. Quotquot enim de eo sunt loquuti, cū aliquid vel addiderint, vel detraxerint, priorem illius originem obscurarunt, & antiquam simul descriptionem immutarunt. Eam au-

tem turpiter deprauatam Ioubertus castigauit, & ad meliorem formam redegit, quam hic non tantum sub olei moschellini aut Muscellini, sed etiam moschatellini nomine exhibemus. Basim enim cum duplicem habeat, atque vtramque eximiam, & voce & viribus coniugatam & affinem, ab alterutra denominari potest. Siue enim Muscellinum, vel potius moschellinum à moscho, seu moschatellinum à nucibus moschatis, vtraque nomenclatio, vt legitima, ferenda est. Ineptè verò à quibusdam Oleum Balaninum, quod simplex est, inodorum, & ex balano myrepfica, seu glande vnguentaria, trita & expressa dicitur.

Præparatio

Vt autem ritè paretur, omnia seorsim trita, & simul mista præter styracem & moschum, macerentur oleo & vino super cineres calidos, diem integrum, aut biduum, in vase obturato: deinde coquantur in duplici vase ad vini euaporationem. Postea oleo percolato, adhucq; calenti, adhuc styrax pulueratus, adhuc parum igne blando feruefiat: postremò moschus misceatur: mixtura seruetur. Sunt qui moschi ꝑ ij. alij ꝑ iij. adiiciunt. Quod diuitibus si arrideat, & mihi quoque ipsi: sed deterioris fortunæ viris non tolerabile duco.

Apud Alexandrinum ponitur oleum punicum: Nonnulli interpretantur purum: alij Punicum dicunt, & oleum in Aphrica natum contendunt. Nos cum Iouberto ponimus oleum dulce & syncerum: pro aqua, vinum: pro *Neregil*, hoc est, nuce Indica, vt in quibusdam codicibus legimus, nucem moscatam: pro costo, si defuerit, radicem angelicæ, pro xylocassia, cinnamomum crassum: pro carpo-balsamo, cubebas, aut semen lentisci, vel terebinthi. Cætera sunt facilia. Si verò quis pro nucibus moschatis nuces indicas, quæ non valde raræ sunt, assumere, non reclamabo, modo integræ non ponantur, cum crassissimæ sint, nec numero mensurentur, vt moschatellinæ, quæ multò minores, sed illarum tantum odoratiores, ac pinguiore partes, quæ multæ sunt, in eadem nuce, iusta quantitate sumantur. De nucis indicæ miris ac variis viribus alibi suo loco dictum est.

Vires.

Valet oleum moschellinum ad omnem frigiditatem corporis, præsertim ventriculi, quem roborat, calefacit, & coctionem iuuat. Stranguriosas, colicis, & neruorum omnibus propè vitis succurrit.



SECTIO TERTIA.

De oleis, quæ ex animalibus integris, aut eorum partibus conficiuntur.



Ec solum nec semper ex stirpibus, sed etiam animalibus integris, vel eorum partibus infusis & expressis, olea medicata conficiuntur. Nam cum animalia cuncta in usum & fauorem homini creata sint, à quibusdam victum habet, ab aliis vestitum, à nonnullis famulatum, ab aliis medicamentum: alit enim ovis, induit bombix, famulatur equus, lumbrici medentur. Plura autem homini sanando, quàm alendo conueniunt, quæ scilicet vires habent medicamentosas, quas multis modis extrahunt, parant, & salubriter exhibent medici. Ex his verò frequentissimè olea medicamentosa conficiunt, cuiusmodi est

oleum Lumbricorum. CAP. I.

*R̄. Lumbricorum terrestrium in vino albo lotorum,
vinirub. generosi an. lib. ʒ.
olei veteris & elari lib. ij.
Coquantur omnia simul ad vini iacturam. Percolatum
oleum vsui reponatur.*

COMMENTARIUS.

Medicamentorum descriptiones nullius probati viri testimonio fulcitæ, vix ad multorum manus perueniant integræ, cum singuli

singula liberè immutent, authore nullo refragante. Hoc tamen oleum *ἄμλον*, seu incerti authoris ab omnibus similiter describitur, nihilque discriminis notatur, nisi forsan in vini & vermium dosi, quæ in nonnullis exemplaribus par, in aliis dispar habetur: in quibusdam vini exigua est quantitas, quæ vermibus coquendis non sufficiat: in aliis liberalior quæ diuturniorem coctionem requirat. Nos legitimam & vini ad vermes, & olei ad vtrumque proportionem dedimus. Proinde sic rectè parabitur. Primum lumbrici terrestres aqua sapius mutata abluentur, dein vino albo, in quo per horam stagnare relinquentur. Peracta lotionē & abiecto vino albo, vermes duplici vase excipientur, oleum affundetur, & vinum rubrum aut etiam album: tum omnia coquentur ad vini euaporationem. Tandem oleum per telam cannabinam traiectum vsui reponetur. Nonnulli coctos lumbricos terunt, & eidem oleo permiscunt in formam vnguenti, cuius tamen perquam rarus est vsus.

Preparatio.

Vires.

Oleum lumbricorum articuloꝝ doloribus confert, & neruis à causa frigida imbecillioribus roborandis, neruosumque genus omne illitum recreat.

Oleum de Scorpionibus simplex. D. Mes.

CAPVT II.

Rx. Scorpiones num. xx. aut paulò plures, vel pauciores pro eorum magnitudine,

Olei amygdalar. amararum lib. ij.

Macerentur in vase vitreo, oris angusti, probe obturari diebus triginta, in Sole æstiuo, Percolatum oleum, seruandum.

Oleum de Scorpionibus compositum. D. Mes.

*R. Radic. Aristolochiaerocunda,
gentiana,*

cyper,

cortic. rad. capparis an. ℥j.

Olei amygdalarum amararum lib. i. ℔.

*Omnia insolentur mixta in vase vitreo operculato, dieb.
xx. Dein Scorpiones à decem ad quindecim oleo iniice:
obtura, insola mense integro. Postremo colatum oleum
serua.*

COMMENTARIUS.

Natura hominem, ut proprium filium alit, tuetur & à morbis liberat, quos vel contrariorum oppositione abigit, vel alexiteriorum partim similibus, partim dissimilibus usu curat. Sic Theriaca inter nostram naturam & venenum media pesti & morbis contagiosis ac malignis prodest. Sic Scorpiones nobis semper infensi, non solum vulnera ab eisdem inflictæ sanant, sed aliis morbis venenatis qualitatem malignam foras euocando, medentur. Ex his autem infusis & expressis parat Mes. oleum quoddam simplex, quod scorpionibus tantum & amygdalino amaro constat: aliud magis compositum, quod præter dicta cyperum, aristolochiam, gentianam & corticem radicis capparis admittit. Si quis Manardi consilium sequutus, alia adhuc alexiteria miscuerit, laboris non poenitebit, Oleum siquidem habebit mirandæ virtutis, contra omnia venena, & pestilentiam. Talis olei compositioris & alexipharmaci formulam subticui, quod eiusdem medicamenti multiplex descriptio nauseam sæpè moueat. Desumpsit autem Mesuë hoc oleum compositum ex Rhasi, debetque potius parari quàm simplex, quia medicatius & efficacius, ad cuius confectionem radices primum cyperi minutim incisæ contunden-
dæ, ut & aristolochia, gentiana & radix capparis. Postea oleo mace-
randæ, & insolandæ, atque omnia peragenda, iuxta formulam da-
tam. Per Rist vnum olei à Mesuë definitum, Syluius intelligit sextarium vnum. Nos certiore dosim arbitrati lib. i. ℔. olei ponimus.

Oleum scorpionum morbis venenatis illitum prodest. Vesicæ &

Præparatio

Vires

renum calculos atterit, meatus diducit, dolores lenit, & saburram expellit, maxime vero id præstat calculoso si ab egressu balnei linia-
tur. Vtrumque viribus hisdem præditum est, sed compositum cali-
dioribus & præstantioribus.

Oleum de Castorio. CAP. III.

*℞ Testium castorii à membranis mundatorum ℥i.
vini albi odoriferi ℥iij.*

olei lib. i.

*Omnia simul coquantur ad exhalationem vini. Oleum
postea vsui reponendum.*

COMMENTARIUS.

Non omnino iniuste Nic. Præpositus accusatur latrocinij, quod multorum medicamentorum descriptiones à se antiquioribus furatus, eorum nomen subticuit, & prioris authoris gloriam sibi vendicavit. Hoc satis ex medicamentorum, quæ transcripsit, farragine pater: Inter quæ si forsan aliquod occurrat à seipso descriptum, nec medici solertiam, nec pharmacopœi dexteritatem sapit. Huiusce rei fidem facit olei castorei descriptio, ad cuius confectionem iubet ℥i. castorij in olei lib. j. decoqui, ad tertiæ partis olei dissipationem, absque intermedio vino, aut aqua vel decocto idoneo. Sed quàm imprudenter ipsis tyronibus notius est, quàm ut pluribus sit opus demonstrare. Quis enim non scit oleum diem integrum, posse ignem sustinere citra iacturam, aut certè pauculam, nisi cum vritur? propterea quæ oleo coquantur, non mollescunt, sed friguntur, & indurantur. Potest quidem hoc oleum sine alio liquore parari, modò castorium oleo tantùm maceretur, insoletur, & sic relinquatur. Astolet enim Oleum Castorinum non percolatum seruari. Fernelius aquæ vitæ ℥i. adlicit, sed hæc tantilla portio, vim ignis non patitur nisi momentaneam. Alia descriptio magis composita datur à Iacobo de Manliis, quæ paratu difficilior, & multo sumptuosior est, rarissimèque paratur.

Castigatam igitur Præpositi descriptionem servabimus, quæ satis efficaciter ea præstat, quæ Manlij descriptio pollicetur.

Confert enim tremori, neruorum & articularum doloribus, con- Vires,
uulsioni & paralyfi.

Ad pforam, impetigines & alia cutis vitia Mesuë parat Oleum O'eum de
ex viperis nigris, integris, igni lento, ad carniū dissolutionem co- Viperis
ctis, in vase terreo, vitrato oris angusti. Mes.

Falopius vyperas cuiusuis coloris duas assūmit, in frustra secat, Ol. de Vi-
oleo immergit, in vase orificij stricti, circa Canem afluuo Soli expo- peris Falopii.
nit: postea exprimit & seruat, ad vlcera ex Indica lue contracta, qui-
bus sanandis apprime conuenit, præscribit.

oleum vulpinum. CAP. IV.

*Rx. Vulpem adultam non strigosam, exenteratam,
pelle nudatam & in partes sectam,*

salis communis ℥iij.

summitatum anethi,

thymi,

chamæpiteos an. m. i.

*Coquantur simul in æquis partibus, & quantitate suffi-
cienti aque & vini albi, ad artuum & ossium separa-
tionem. In colaturæ lib. ij. adde,*

Olei lib. iiii.

saluæ,

rorismarini an. m. i.

*bulliant rursus ad aqueæ humiditatis dissipationem. Tum
oleum percolato, & seruato.*

COMMENTARIUS.

Non sat est medicamenta simplicia optima esse, sed quæ compo-
nuntur ex ipsis, optimè præparari, ex ratione describi, debitè mis-
ceri, & exactè vniri est necesse, nulla singulorum, si fieri possit, de-
perdita & reiecta vtili portione. Sed quàm male olei vulpini com-
munis descriptio his legibus fulciatur, ex eius formula satis patet.
Mesuë enim iubet vulpem integram, cum pelle, pilis, pedibus, so-
lūmque exenteratam, incoqui in aqua fontana, marina, oleo & sa-
le, ad artuum dissolutionem, additis inter coquendum hyssopo &

anetho, & superfusa aqua, in qua vtriusque lib. i. antè incoxerit. Sicque ollam videre videor, pilis, ossibus, carne, & stirpibus aliquot ad putrilaginem coctis, cuius expressa pinguitudo, oleum vulpinum Mesuei est. Paulus suadet vulpem viuam simul & exenteratam, ad ossium separationem elixari. Sed quo modo viua & euiscerata possit concoqui non coniecto. Rondeletius vult cum corio & lactibus coqui, abiectis tantum alui excrementis: sed intestinis remanentibus foras excerni recrementa in cadauere non video. Illius collega Ioubertus mauult pellem quàm viscera abiici: interanea vero bene lota simul cum carne elixari. Nos pellem, caudam & interanea vt inutilia reieciimus: postea corporis truncum & artus secamus: aqua, vino, & sale coquimus, cum herbis nerualibus & digerentibus. Colaturæ addimus oleum, saluiam & rorem marinum, & sic denuò coquimus ad aqueæ & vinosæ humiditatis resolutionem. Hoc autem modo paratum oleum viribus eximium est & ad ea quæ expetit & promittit Mesuë efficacissimum. Potenter enim digerit ac resoluit, nervos roborat, & à frigidis iniuriis tuetur, & articulorum morbis opitulatur.

Oleum Formicarum. CAPVT V.

*℞. Formicarum alatarum ℥ ii.
olei maturi ℥ viii.*

macera quadraginta dies vase optime clauso, æstiuo soli exposito: Postea oleum exprime & vsui reponere.

COMMENTARIUS.

Rarissime paratur hoc oleum, fereque solum expetitur ad genitalia frigidiora calefacienda, & stimulum veneris excitandum. Cum facile & paruis sumptibus confici possit, & à quibusdam natura frigidis expetatur, eo pharmacopolium minime carere debet, sed parua quantitate parandum.

SECTIO QVARTA.

De Oleis, expressione eductis.



LE I genera sunt quatuor: Primum absolute & proprie dictum, quod ex oliuis maturis educitur. Secundum minus proprie, quod oleo quidem dicto constat, sed cui plantarum vel animalium partes infusæ ac insolatæ, vel coctæ sunt. Tertium cum adiunctorei ex qua elicitur, cognomen habet, ut quod ex amygdalis exprimitur, amygdalinum, ex sesamino sesaminum; ex baccis lauri Laurinum. Quartum genus Chymistis familiare, quod per ascensum, vel descensum, ut vocant, elicitur. Prioris extractio, quod sit cuius nota, operosa tamen, quibusdam rusticis tantum committitur, ut ante notavi. De secundo genere superioribus sectionibus egimus abunde. Superest nunc ut de aliis differamus. Ac primum quidem de his quæ ex seminibus oleaginis, tritis & expressis extrahuntur, quæ abusiue olea vocat Syluias. Illud autem prius occurrit, quod ex amygdalis dulcibus elicitur.

Oleum amygdalarum Dulcium. CAP. I.

R. Amygdalar. dulcium, siccarum, non rancidum, utroque cortice mundatarum, quantum volueris: contunde in mortario lapideo minutissime, tela canabina, aut sacculo innolue, & prælo exprime, dum oleum emanet.

COMMENTARIUS.

Amygdalæ vel dulces sunt, vel amaræ: Ex his & illis, modo sine, modo cum cortice membranoso tritis & expressis oleum educitur,

Preparatio.

nunc ignis adiutu, nunc nullo iuuante externo calore Quod ex depellatis sine igne elicitur, præstantius sæper habetur. Proinde multorum pharmacopolarum est improbanda ignauia, qui malunt tyronum & famulorum manus desides videre, quam in simplicibus ritè parandis occupare: Vnde mirum non est, si de amygdalini rancore, acrimonia & insuauitate ægroti sæpe conquerantur. Vt autem ritè pareretur, amygdalæ recentes, siccæ, non rancidæ assumantur: à cortice duplici purgentur, vt purius, synceriusque sit oleum: In mortario lapideo diutius terantur, vt oleosa intus inclusa humiditas proprius in apertum sese proferat: Sacculo, aut stamine, vel cilicio (vt fieri solet) è seta equina contexto excipiantur: Dein vel torculari, *Zaynari*, Mesuæ dicto, vel pralo vulgari, illis simili, quibus bibliopola vtuntur, dum libros colligatos resecant, excipiantur.

Debet vero paulatim exprimi, vt purius sit, pellucidius & dulcius, Nam quod affatim & accelerata violentia trahitur, turbidum & fœculentum esse solet. Promptius autem fluit, si amygdalæ ante expressionem igne aut sole incaluerint. Sic enim oleosa humiditas, calore tenuata, liquata & fluxilior reddita, facilius erumpit foras, & promptius, largiusque exprimitur, atque tanto citius, quanto calor hic est valentior, modo tamen oleum non absumat vrendo. Verùm quod per os sumitur, absque ignis ope elici solet, & debet.

Duobus autem modis amygdalæ purgantur: primo, in aqua tepida, aut paulo calidiore parùm, aut in frigida diutius macerantur, & postea digitis comprimuntur, vt cortex dissiliat: Secundo, in sartagine, cum quadam furfuris macri quantitate, igne lento manu agitantur, donec inuolucrum disrumpatur, quo postea fricando exuuntur facillimè: qui posterior modus altero præstantior est. Amygdalæ enim macerata nisi ante trituram probè siccentur, magis aqueum fundunt oleum. Ex libra autem vna amygdalarum, olei solent extrahi vnciæ duæ, atque tantumdem aliquando ex magmate trito, aqua irrigato, super cineres ad aquæ exhalationem calefacto, & torculari commisso. Hoc tamen postremo emissum fœculentum est, & litibus, vnguentis & alijs medicamentis externis inseruit.

Amygdalini vires.

Oleum amygdalinum ad multa commendatur. Pthificis enim ac tabidis multum confert, nam alimentum humidum & lentum, pingue & aliquantum aëreum præstando, macilentum corpus reficit, gutturis asperitatem, bronchiorum pulmonis, & cæterarum partiũ lenit. Vteri, & vesicæ ardores iniectum mitigat: illitum cutem erugat, scabra & aspera ad æqualitatem perducit & complanat, tensa & dura emolliat, & siccitatem omnem iuncturarum & aliarum partium emendat.

Oleum amygdalarum amararum. CAP. II.

Oleum extrahitur tantum per expressionem ex amygdalis amaris, vt ex dulcibus: Alexandrinus tamen per infusionem quoque parat: In libris enim quinque olei, lib. ij. amygdalarum purgarum tritarum tres dies macerat, ad medias coquit, & exprimit. Neque tamen præparationis modus hic, neque sic præparatum oleum probatur. Fallitur enim Alexandrinus, oleum coqui ad medias imperando, quod igne potius vritur, quam per exhalationem instar aquæ resoluator, vt ante monuimus. Præterea oleum sic ex amygdalis infusis tractum, vix nisi forsan media sui parte amygdalinum est, nec ita gratum, nec viribus eximium. Præstat igitur ex illis tantum tritis & expressis oleum trahere, parum, ac syncerum, dulce ex dulcibus, de quo capite superiori, ex amaris amarum, quod ad multa quoque à multis commendatur, vt ad obstructions soluendas, flatus discutiendos, ad neruorum dolorem mulcendum, duritiæ emolliendam, parum faciei delendum, aurium tinnitus dissipandos.

Præparatio

Vires?

Calefacit enim, incidit, tenuat, digerit, potenter terget: proinde calculosos, difficulter meientes, asthmaticos, lienososque iuuat, vitia cutis multa sanat, lumbricos enecat, sumptum & iniectum. frigidis vteris prodest, vt & asthmati linctum, & illitum, si à frigida causa oriatur, & duritiæ ac dolori neruorum opitulatur.

Oleum ex nucleis malorum Persicorum simili modo paratur, habetque vires easdem, aut parum dissimiles, propterea rarissimè conficitur.

Oleū Persicorum.

Oleum Nucum. CAP. III.

Qua tantum vires habent medicamentosas, nec aliis vsibus, quàm morbis præcauendis aut curandis inseruiunt, à solis pharmacopolis solent & debent tractari: Sed quæ præter has dotes, alias adhuc ob esum, aut vsum alium commendatitias habent, raro à pharmacopœis, sed rusticis quibusdam expertis, ad rei domesticæ subsidium, magna quantitate parantur. Sic vinum vinitoribus, panificum pistoribus, vt dictum est, committitur: Sic oleum, vel commune, vel caryinum, aut sesaminum aliis relinquitur ministris exprimendum, qui & molas versatiles quibus fructus, aut semina moluntur, ac teruntur, habent, & torcularia idonea, quibus oleum magna copia exprimunt, vel ad lucernarum, vel corporis pabulum, vel sanitatis custodiam, aut morborum curationem. Ideoque raro contingit, olea dicta in Officinis parari. Quia tamen turbidum est

& insuaue, quod è iuglandibus seu nucibus regiis, à rusticis extrahi consuevit, melius esset, si quod à pharmacopœis vsurpatur, ab hisdem traheretur: Sic enim limpidius & suauius esset, atque effectus præstaret efficaciores.

Vires.

Eius autem vsus ad multa requiritur: flatus enim etiam crassos. resoluit, tumores dissipat, per habitum digerit, colico dolori vel à flatibus, vel frigidis humoribus nato sciliciter medetur: vi digerente & siccante sine morfu, puncturas neruorum & attrita sanat; Ambustis quoque mira proprietate succurrit, atque vim habet eandem, atque Balaninum. Nam tenuitate substantiæ, vi resolutrice & calore flatulentam materiam resoluit. Propterea qui oleum *καρύνου* habebit, Balanino facile poterit carere.

Quod ex nouellis nucibus & adhuc tenellis extrahitur, plurimum valet ad arcendam lentiginum eruptionem, si eo puellorum recens natorum facies illinatur.

Olea quadam raro parari solita, & eorum vires.

CAP. IV.

VT apud omnes non vna viuendi lex & ratio, sic nec eorumdem medicamentorum vsus: nam vt antiquo versiculo fertur, Vtitur ingenio patria quæque suo. Alii namque medicamentum quoddam admittunt, alij respuunt: Alij non nisi veterum, alij non nisi recentiorum inuenta probant. At verò sint hi, & illi amici, amicior tamen ratio, quam vel in scribendo, vel in agendo præponimus. In multis Mesuem colo, in nonnullis eum suis colendum relinquo, quibus nempe primum scripsit, & medicamenta quadam reliquit, quæ nos etiam illis relinquimus, vt ex medicamentorum in hac officina contentorum catalogo patet. Quædam autem olea describit parum vsitata, sed quia vires habent non negligendas, non omittemus, sed paucis declarabimus.

*Oleū auell-
lanarum.*

Oleum ex auellanis nucibus, inquit Mesue, neruorum & articulorum dolores sedat. Paratur vt amygdalinum. Per auellanam, parua nux *αεθονκάριον* Græcè dicta, intelligenda est, seu nux Pontica, aut Prænestina, à locis, in quibus vberrime fruticat, nominata: cuius oleosa humiditas anodyna est, & humoris discussoria, ob id affectibus dictis idonea.

*Oleū chry-
samelerū.*

Oleum ex nucleis Pomorum Armeniacorum sedis, & hemorrhoidum dolores mitigat, & tumores earum partium, & vulnerum digerit. Simili modo paratur. Habentur vero nuclei illi ex quibusdam pomis, quæ à loco dicuntur Armeniaca, ab aureo colore, chryso-
mela,

mela, à celeri maturitate, præcocia, quorum sapida multum ac dulcissima est caro, nuclei vero admodum, & acres, & amari & ingrati. Ol. persicorum.

Oleum Persicorum vermes enecat, obstructa liberat, aurium doloribus prodest, & tumentibus ac dolentibus hæmorrhoidibus benefacit. Præterea calefacit, tenuat, resoluit, atque eadem commoda præstat, quæ & amygdalinum amarum. Nuclei enim Persicorum, ex quibus paratur, amari sunt, calefacientes & diaphoretici. Ol. ricini.

Oleum de Kerua, seu Ricinium crassos flatus discutit, pituitam viscidam tenuat, & ventriculo & intestinis ab eo succo dolentibus prodest, atque hydropi, seu illitum, seu iniectum. Alias adhuc recenset utilitates Auicenna, rarissimè tamen paratur. Ol. de Cnico.

Oleum de Cnico, seu Carthamo incidit & terget, ob id ictero prodest, thoraci & pulmone, atque ventriculo à frigida materia dolenti. Nec istud quoque paratum reperitur.

Oleum pistaciorum & nucum pinearum gutturis asperitatem lenit, thoracis dolorem mitigat, tussi prodest, macilentos & tabidos impinguat, & sperma auget. Eorum tamen usus potius quam olei celebratur. Ol. pistaciorum & strobilorum.

Atque ut de multis locum nactus commodum, pauca dicam. Ex nucleis ceraforum, nuce Indica, glande vnguentaria, seminibus citri, arantiorum, ex seminibus quatuor frigidis, lactucæ, papaveris, lini & similibus, quouis tempore olea parari possunt, quorum vires eadem sunt, ac fructuum, seminum & nucleorum, ex quibus conficiuntur, extrahunturque ut oleum amygdalinum, etiam sine igne, sed quantitate minore, ex siccioribus verò seminibus etiam calidis, non nisi diutissimè tritis, & aliquando calefactis olea educuntur.

Oleum de Nuce Moschata. CAP. V.

Oleum nucis moschata stomachicum est, aromaticum & suauissimum. In becillum enim stomachum roborat, calorem illius pauperculum fouet, appetitum excitat, coctionem iuuat, humores frigidos coquit, calidos resoluit, flatus dissipat. Paratur ex nucibus tritis, parum calefactis & prælo commissis, ac ita expressis, ut oleum emanet, quod paulatim ac lentè stillat liquidum, dein crassescit ac cogitur in vnguenti soliditatem.

Quia verò nuces moschata pretiosæ admodum sunt, oleumque ex his paratum recens melius est antiquato, parua quantitate conficitur, & pro rei exigentia iteratur. Differt verò multum oleum hoc moschatum simplex expressione tractum à moschellino aut moschattellino, ex multorum simplicium maceratione confecto, quod moschum & nuces moschatas habet pro basi, de quo supra.

Oleum Ouorum. CAP. VI.

Oleum ouorum fit ex eorum vitellis coctione in aqua induratis, qui postea manibus friati, aut alio modo comminuti in sartagine friguntur, spatula aut cochleari assiduè mouendo donec rufescant, & pinguedinem quamdam exudent: Dein adhuc calentes tela canabina, aut sacculo pilis contexto excipiendi, è prælo committendi, vt oleum effluat, v sui reponendum.

Potest etiam ex his oleum trahi tantum coctis, tritis & expressis sine frizione præcedente, instar amygdalini: tuncque oleum elicatum, purius, dulcius & minus rufum habetur, sed parcius, & ad multa cutis vitia, ad quæ commendatur, inefficacius. Solent verò sumi oua recentia circiter xx. aut xxx. Coquuntur vt durefcant: albumina à vitellis separantur, qui postea prælo commissi & pressi oleum fundunt, cuius eæ vires agnoscuntur.

Vires.

Cutem expurgando fœditatem eius tollit, cicatrices delet, aut plurimum minuit, ambustis medetur, impetiginem & serpiginem sanat, atque omnibus cutaneis affectibus prodest, & pedum, ani, manuum fissuris, & malignis vlceribus valde confert.

Oleum Laurinum. CAP. VII.

AD conficiendum oleum laurinum, recentes & maturæ baccae lauri seliguntur; In pila teruntur: Ex aqua in lebeate coquuntur: Post, torculari cauo non plano exprimuntur in vas subditum, in quo oleum supernatans aquæ colligitur. Magma denuò contritum & aqua affusa madidum, consilio Mesuæ exprimitur cauato torculari, & pinguedo oleosa secernitur.

Dioscorides paulò aliter conficit. In aqua enim elixat baccas maturas, quæ ex obducto cortice pinguetudinem reddunt, quam manibus subactam, concha excipit. Prior autem modus vsitatior est, quo tamen pharmacopœi hoc oleum non conficiunt, sed confectum emunt ab aliis, qui congesta baccarum magna quantitate, ipsam elicendi artem exercent. Sunt qui baccas recentes ac maturas terunt, citra aliam mitionem, & torculari fortiter oleum exprimunt.

Simili arte trahuntur olea ex baccis lentilci, terebinthi, hederæ, Iuniperi, & similium baccarum odoratarum.

Olei lauri.
vires.

Vim habet calefactoriam, & emollientem, aperientem & discutientem: ob hæc intemperiem omnem frigidam, & simplicem, & cum pituita, vel flatibus sanat, & ab his colico dolori nato, si cum decocto conueniente, iniiciatur intestina, mirificè prodest. Item cerebri

neruorum, articulorum & lumborum affectibus frigidis præsens est auxilium. Lassitudines quoque tollit, venarum spiracula aperit, paralyfi medetur, spinæ dorsi illitum & horrore febrili.

Non est omittendum Oleum de Copra, vulgo oleum de Palma dictum: quod ex nucibus Indicis, superiore cortice spoliatis, & fractis, ac torculari compressis educitur. Cuius tinctura & consistētia non longè à butyro discedant? Odor verò abscedit quàm plurimum: qui nonnullis suauiter, alijs ingratissimè fragrat. Expetitur ab his qui chirotechas concinnant, ad pelle tractandas & halitu cupito imbuendas.

Oleum de
Cupra

Copra verò barbara vox est, qua Indi dictas nuces mundatas & confractas designant: unde oleum de Copra illis dicitur, quod nos de Palma vocamus. Arbor enim ex qua dictæ nuces habentur, Indica Palma nominatur: quæ inter arbores miras, & beneficiis, quæ præstat hominibus, omnes alias superantes numeratur, vt alibi diximus.

Oleum de
Palma.

Vsus dicti olei non valde frequens est in medicina: laudatur tamen à multis ad neruorum contractiones, & antiquos dolores articulorum.

Vires.

De Oleo Balsami, liquidambar, & petroleo. CAP. VIII.

H Vic oleorum generi proximum Balsameleon, id est, oleum balsami, & Liquidambar: vtrumque ex peregrinis arboribus defluens. Primum ob mirandas vires Balsamum nuncupatur. Elicitur ex arbore pumila, nec elegante, colore subcineritio, flore lutei Iasmini simili. Folia ei circa finem Autumni decidunt, Vere renascuntur. In Arabia fœlice, & Ægypto, atque tractu Babylonico letè fructat. In frigidioribus plagis non nisi ægrè cicuratur. Ad eius succi pinguis educationem aliquando tenuiores surculi præscinduntur, quibus lagenulæ appenduntur cera oblitæ, in quas stillatim defluit. Sapius rami crassiores vulnerantur, & ex hiatu corticis pretiosa ista lacryma stillat: Cuius vsus intus & foris celebratur.

Balsamum.

Aliquot enim guttæ subinde ieiuno stomacho exhibitæ Asthmaticis valde conferunt: iecoris obstructions soluant, menses mouent, stomachi dolores sedant, phtisicos iuuant, appetitum excitant.

Opobalsami vires.

Liquidambar. CAPUT IX.

Liquidambar resina quædam oleosa est, ex arbore quadam incisa defluens, prægrandi & venusta, Ocosolt Indis dicta, vastæ magnitudinis, foliis hederaceis, cortice crasso, cinereo, qui vulneratus, hæc

oleum stiriaticum effundit, Liquidambar dictum, ab odoris suauitate, quasi ambarum liquidum, aut oleum de ambra, vel ambaro.

Vires.

Arbores ex quibus stillat, adeo fragrantis sunt, ut è locis in quibus nascuntur suauissimus odor in vicinas regiones deferatur. Plurimus autem est huius liquoris usus in medicina: Calefacit enim, roborat, resoluit, omnem tumorem emollit, obstructions expedit, menses mouet, hystericiis affectibus prodest, atque aliis multis mulierum morbis succurrit.

Petrolæum. CAP. X.

Petrolæum solius naturæ munus & opus est, non pharmacopœi, qui id tantum colligit, vel collectum emit, seruat, & ad usus adhibet: Nam in terræ sinibus id natura conficit, & è mediis rupibus ac petris eructat, unde nomen.

Bitumen.
Asphaltus.

Eius autem prouentus in his regionibus esse solet, in quibus bitumen, ad quod refertur abundat. Est namque bitumen, Asphaltus Græcè dictum, vel densum, vel liquidum. Densum est veluti terræ pinguitudo aquis primùm supernatans, quæ dein vento & undis agitata ad littus eiicitur, ibiq; concreescens densatur & tenacissima efficitur. Legitimum bitumen Iudaicum est, quibusdam Sodomeum dictum, quod in ripis lacus Sodomei inueniatur. In Europa rarissimum. Liquidum Græcis dicitur Naphta, quæ si Babylonica fuerit, velut bituminis est colamen, colore candidum, cui vis inest ignium rapax, ita ut ex spatio protinus in eam transilient, inquit Dioscorid. Quod etiam de bitumine quouis denso ac vero scribitur. Præter naphtam dictam alia est fluxilior instar olei, quæ è petris & saxis stillat, qualis est illa, quæ in agro Mutinensi ex monte Gibio, & aliis Insubriæ locis scaturit, vocaturque Petrolæum quasi de petra oleum.

Naphta Ba-
bylonica.

Petrolæum.

Cap.
102. li.
1.

Carbo la-
pideus.

Gagates.


Est & bitumen quoddam fossile & terrenum; Idque duplex, vnum minus durum & friatu facile, quod vulgus lapideum, seu petreum carbonem nominat: Alterum durissimum & intensa nigredine nitens, Gagates dictum, de quo postea. Sunt qui succinum, bituminis duri genus quoddam esse non præter rationem dicunt.

lib. de
simp.

Mumia.

Bituminis igitur magna est latitudo, ad cuius cognationem multi referunt Pissaphaltum & Mumiam. Est autem Pissaphaltos mixtura quædam pice & asphaltu seu bitumine denso confecta, quæ in vrbes maritimas pro picandis nauibus aduehitur. Dicitur verò pissaphaltos, Arabibus Mumia, quæ lingua vernacula Balsamum designat, cuius loco, mediocris fortunæ Syri, & Arabes pissaphalto condendis mortuorum corporibus utebantur. Sic pro balsamo, pissaphaltum: pro utroque Mumiam effecerunt, cum tamen inter singula ne quidem sit nominis, aut cognatio vel affinitas: Nam balsamum na-

turale, opobalsamum est: Artificiale ex multis aromatis constat, con-
diendis regum corporibus dicatum: Pissaphaltos mixtura quæ- Pissaphal-
dam ex pice & asphalto composita: Mumia verò quid ex vtro- tos quid,
que vel alterutro, & corporis putrilagine exurgens, cuius improbā-
dos vsus pluribus refellere nostri nunc non est instituti, ad quod, vt
redeam, dico petrolæum à pharmacopoliis non esse ablegandum,
cū vires habeat ad multa requisitas. Calefacit enim, siccatur, essen- Petrolæi vi-
tiæ tenuitate aperit, penetrat, digerit, materiam omnem excreme- ris.
ntiam resoluit, morbis cerebri, & neruorum multis prodest, epilep-
siæ, lethargo, vt paralyfi.



SECTIO QUINTA.

*De Oleis Destillatione tractis, ac primū de his quæ
per descensum eliciuntur.*

Pæter dictos olea conficiendi modos, alios adhuc
multos subiungit Mesue, quibus vn. verbo per reso-
lutionem illa fieri scribit: Chymistæ per descensum
& ascensum; De quibus, postrema huius libri sectio-
ne, vt aliquid dicamus, liberum Mesue nobis a-
peruit iter, & occasio sese obtulit opportuna. De his autem pauca
quædam tantum subiungam, tum quia ad oleorum his artibus edu-
ctionem, operoso labore, diuturno tempore, & magno sumptu opus
est: tum quia, nunc à quibusdam male sortis hominibus, vt plurimū
ignaris, sæpe vafrijs circulatoribus, qui varijs pollicitationibus plebe-
culam fallunt, atque in arcanis perquirendis & magisterijs conficiē-
dis, vt loquuntur tempus conterunt, illa ipsa parari videamus. De
multis pietate & doctrina probatis viris non loquor, qui rerum ab-
strusarum studio pellecti, naturæ secretiores thesauros, ac mirandas
rerum à se creaturum vires rimantur, medicamenta varijs modis
parant, diuersis formis immutant, ac pro diuerso apparatu diuersas
qualitates, vel mistas seiungunt, vel inutili seiuncta, vtilem &
experitam retinent, atque ita solerter cogunt, vt parua sub mole
vires habeat efficacissimas. Verū Medicis tantum peritis, his vti

medicamentis fas est, quæ ab Idiotis exhibita, periculi plena sunt, & multos in discrimen vitæ præcipitant. Licet verò medicis & Pharmacopœis probatis, qui sunt tanquam illorum manus, olea quædam Mesuei consilio, more Chymicorum parare, ut Destillatione, quæ fit, vel per descensum, ad quem refertur descensio per transudationem, & per deliquium, vel per ascensum ad quem refertur destillatio per inclinationem.

Eductio olei per descensum fit, ubi absque elevatione prolectatus humor deorsum stillat in vas subditum, neque datur illi via sursum ascendendi, sed colliquefactus forma vaporis intus prodit, dein cogitur, & per inferiora stillat. Eliciuntur autem olea per descensum, non ex omnibus æquè mixtis, sed ex quibusdam tantum lignis & resinis, atque ex his quæ à calore ascensorio destruuntur. Quæ verò sic educuntur, cum sint crassiora, nigriora, sapore & odore magis ingrata, frequentius ad externos affectus usurpantur. Per os etiam aliquando sumuntur, & effectus proferunt eximios. Vnius autem vel duorum exemplo multa poterunt parari: Vt

Oleum Guaiaci. C A P. I.

Guaiacum comminutum in cucurbita ponatur vitrea, vel fictili, angusti orificii, quod lamina foraminulenta tanquam septo obducatur, & in alterius cucurbitæ orificiū patentius immittatur, & simul ambo ritè iungantur, argilla tenaci, vel pasta, aut luto quodam conueniente circumlito. Dein ex vasis sic coaptatis quod vacuum est in foueam demittatur, & terra sepeliatur supra vtriusque commissuram, & ad illius vsque medium, quod lignum guaiacinum continet. Postea igne circumquaque accenso ex superiore cucurbita oleum stillabit in inferiorem.

Hoc modo educuntur olea iuniperi, hederæ, fraxini, lignorum multorum, baccarum & resinarum.

Olei Guaiaci vires.

Oleum guaiacinum luis Indicæ verum est alexiterium: Eius enim aliquot guttæ singulis matutinis ieiuno stomacho sumptæ, cum aqua vel decocto idoneo, pustulas venereas delent, dolores noctu ingrauescentes sedant, vlcera ad sanitatem accelerant, qualitatem huius affectionis malignam extinguunt.

Oleum Tamarisci. CAP. II.

Ligno & corticibus Tamarisci contusis impleatur boccia: Eius orificium craticula seu lamina foraminulenta occludatur: Ipsa inuerfa in superna cuiusdam fornacis parte ita locetur, vt illius venter sursum spectans, luto optimè cum fornace coniungatur: orificium vero deorsum vergens, ac cameram fornacis traiciens, alteri bocciae inferiori committatur, itaut sit boccia contra bocciam, vt loquuntur, alteraque excipiat alteram diuerso situ: His peractis, firmetur inferior, quæ recipientis vicem gerit, tegula, vel circulo stramineo, vt moris est, vt stet immobilis: ignis verò accendatur in superna fornacis parte, & circum bocciam superiorem, vt materia intus calefacta oleum exudet in inferiorem.

Hic modus superiori similis est, nisi quod boccia inferior terra non sepelitur, sed sub fornace instar tripodis subtus peruia collocetur. Superior verò quasi suspendatur, eiusque collum ultra cameram fornacis deorsum promineat, ventre sursum spectante, ex quo vi ignis circumquaque accensi incalescente, oleum emanat, delabiturque in excipulum inferiorem. Id *oncā* huiusmodi effigiem dedit *Vuekerus* lib. 3. Antidotarij generalis, ad cuius similitudinem alia poterunt formari.

Oleū Tamarisci valde conuenit affectionibus lienis: proprietate enim ipsum respicit & roborat: Humorem melancholicum ad excretionem apparat, illius qualitatem mitigat, aperit, tenuat, dissoluit, obstructions tollit, & flatu resoluit. Vires.

Alia quoque multa solent educi, vt Iuniperinum, modo sequenti, tractu facillimum.

Oleum Iuniperi. CAP. III.

Baccarum Iuniperi quantitas idonea ponatur in vas figulinum, in fundo pertusum: Aliud ei supponatur, cuius orificium illius fundo foraminulento optimè coniungatur, & luteretur argilla tenaci, aut pasta glutinosa circumposita: Atque ita disponantur ambo, vt quod vacuum est, in fouea quadam latitet, terra obrutum; Superius quod iuniperum continet, extra terram promineat, circum quod, dum accenditur ignis, oleosam liquat pinguitudinem, intus latentem, quæ congregata delabitur in ollam defossam.

Ex ligno quoque iuniperi oleum hac arte subducitur, atque etiam gagatis, & quarundam resinarum.

Oleum iuniperinum ad vitia cutis commendatur, vt Serpiginem,

morpheam, & alias affectiones quasdam profundiores. Renū quoque morbis conuenit, vtero frigidiori prodest, eumque ad conceptionem reddit magis idoneum.

PORRO vt laboriosum, sic superfluum esset alia olea recensere, quæ simili modo educuntur. Nunc igitur pauca quædam subiungamus, quæ velut per transudationem, aut deliquium, vt nonnulli volunt, in vdo loco eliciuntur.

Oleum Tartari. CAPVT IV.

Tartarum olla fictili exceptum in fornace, vel furno calcinetur, vt albescat: dein teratur: Post in manica hypocratis, aut simili conceptaculo pyramidalis imponatur, & in loco vdo suspendatur: Supponatur vas idoneum ad liquorem, qui sensim destillabit, excipendum.

Tartarum fax quædam est vini doli, lateribus adhærescens, quæ ex vino quouis vel albo, vel rubro, modò generoso semper optima est. Ex ea oleum, vel potius liquor salsugineus educitur, si idoneo vase excepta, igne luculento vratur, donec albescat: Refrigerata ac trita, sacculo cannabino, aut panno lineo inuoluatur, & in aëre vapo, vt in cella vinaria tres, aut quatuor dies, vel plures, si opus sit, appendatur. Sic enim tabescens liquorem quendam, velut sudorem emittet in subditum excipulum, vocatur saepe tartarum, petra vini.

Nonnulli fæculas vini, seu tartarum aceto macerant, dein calidis sub cineribus coquunt, vtruntque dum nigrescat: Postea denuo terunt, feruantque in vase inclinato dies octo, aut plures in loco vdo, quousque in oleum aqueum resoluiatur. Sed præstat fæculas in olla calcinatas ad albedinem, in sacculo reponere, atque in loco humidiorē seruare, donec oleum in subditum quoddam vas effluerit. De oleo & spiritu tartari in nostra Chymiologia fusiùs dicetur.

Vires.

Valet hic liquor ad cutem erugandam, scabiem tollendam, & vlcera capitis manantia curanda. Confert etiam ad pustulas Indicæ luis sanandas. Obstructionibus quoque soluendis, mensibus mouendis, & meatibus referendis prodest, si ex aqua, vel decocto idoneo debitè sumatur.

Extrahitur quoque tartari liquor ascensoria destillatione, de qua mox loquemur.

Oleum Myrrha. CAPVT V.

Aliquot oua recentia coquantur, donec induruerint: per mediam vel longitudinem, vel latitudinem incidantur: vitelli eximantur: cavitates myrrha pingui, actrita impleantur: albuminum partes incisæ iungantur. Filo parum constringantur, & craticulæ inter

inter duas paropsides collocandæ superponantur. Tum in loco subterraneo, vt cella vinaria, vel alio humidiorē ponantur. Sic enim myrrhæ liquatus humor sensim in paropsidem inferiorem destillabit.

Solent aliquando bacilli craticulæ loco, super patina quadam, aut paropside adaptari, & albumina indurata myrrham tritam continentia superponi: Sed quorum acetabula non ita strictè simul iungenda, vt negetur exitus liquori è myrrha defluenti. Nisi enim pateat vel rimula quædam subterlabendi, vix in subditum vas aliquid stillabit. Bacilli nonnumquam super sartagine aut alio vase idoneo collocantur, quibus ova superponuntur myrrha grauidata. Dein vas in puteo pedem vnum aut alterum supra aquam suspenditur, illicque relinquitur diem integrum aut biduum, vt ex myrrha transudet liquor in vas subiectum. Oleum de myrrha adhuc educitur arte ascensoria.

Vtroque modo eductum ad multa commendatur, & maximè ad Vires. cutaneos affectus multos est efficacissimum. Falluntur qui alterutrum pro stacte vsurpant, de cuius natura & viribus supra egimus li. de simplicibus.

De Oleis ascensoria destillatione tractis. CAPUT VI.

Prolectatio liquoris oleosi vel descensoria est, de qua breuiter loquuti sumus, vel ascensoria, quam paucis quoque perstringere intendimus. Ea autem fit dupliciter, vel per alembicum, vel retortam, seu inclinationem: Quæ tamen hoc postremo modo fit, rectè loquendo, nec descensoria, nec ascensoria est, sed media, vel vtriusque particeps. Quæ verò fit per alembicum destillatio, rectam postulat cucurbitam, aut vesicam cui rostratus alembicus imponendus est. Aliquando rostri loco, alembicus è vertice veluti fistulam quamdam promit, incuruam, quæ canali longo, in gyros, more serpentum, à quibus sæpe nomen habet intorto, committitur. Debet autem collum cucurbitæ esse gracile & longum, si materia destillanda tenuis est, si crassior, & illud breuius & patentius: Atque cum illa sæpius immutanda est & renouanda, matula quauis cucurbita aptior erit.

Serpentina.

Nonnumquam arena, aut sal, aut aliud quippiam destilandæ materiæ commiscetur, dum facilè feruefit, & ad summum perreptat.

Porrò vas materiam destillandam continens ita aptari debet, vt subtus calor administretur, sitque via sursum spiritibus, quib. condensatis pateat exitus per rostrum, cui tubus longior inferitur, versus ima propendens, & medium dolium, frigida plenum (refrigeratorium vocant) traiciens, qui materiam defluentem defert in excipulum illi commissum. Est verò destillatio vel sicca, vel humida. Illa fit in fornace, nunc solis carbonibus accensis, nunc arenæ, aut cine-

rum calidorum interuentu. Humida fit per balneum Mariæ, & balneum roris. Istius verò balnei & fornacis tot sunt varietates ac diuersi destillationis modi, vt vix possint omnes legibus comprehendere. Quomodo verò hac arte olea vilitatiora eliciantur, nunc breuiter explicare instituimus.

oleum de lateribus. CAPVT VII.

Lateres antiquatos in frustula comminutos, prunis accensis tantum diu vrito, donec igniti rubeant: Tum in oleum vetus & clarum iniicito & dimittito, donec oleo se impleuerint: Postea in tenuissimum puluerem terito, & in cucurbitam vitream indito: Alembicum rostratum imponito, & in fornace, vt decet, structa, collocato: Ignem subtus accendito, & oleum quod emanabit seruato.

Paraphrasis

Lateres ex terra rubente confecti, vt præstantiores seligendi sunt, & in frustula crassiora, vt 3 vj. aut 3i. comminuendi: Tum oleo antiquo & claro, vel oleo roris marini, si suppetat, extinguendi & insuccandi: Postea læuissimè puluerandi, & in cucurbita vitrea, fornaci ritè accommodata, & luto oblita reponendi, atque igne supposito ita calefaciendi, vt ex his oleum emanet: Quod diuersis nominibus insignitur: A quibusdam enim Medicis rectè oleum de lateribus nuncupatur; ab aliis, non improprie, petrolæum artificiale, ad differentiam naturalis, quod è saxis sponte naturæ distillat. Nōnulli speciosiore nomenclatura, oleum sanctum, diuinum, & benedictum appellant. Spagyrici multo arrogantius, oleum magisterij, & ol. philosophorum nominant: quos ideo irridet Syluius, quod de philosophos vbique, & quotidiano sermone, & scriptis appellent; Et quod mireris, inquit, solos se philosophos affirmant. Sed quod re non consequuntur, id nomine quærunt.

Petrolæum artificiale.

Ol. benedictum.

Ol. philosophorum.

Vires.

Oleum philosophorum extenuat, in altum penetrat, materiam omnem excrementitiam digerit & absomit: Frigidis affectibus lienis, renum, vesicæ, neruorum, vteri & articulorum conducit. Lethargo quoque, paralyfi & epilepsiæ prodest. Calidum est in 3. recessu; & quanto antiquius, tutò ad omnia efficacius existit.

oleum vitreoli. CAP. VIII.

Vitreoli lib. x. aut xij. pro arbitrio, in vas vitreum luto obdu-
ctum coniiciuntur, & igne subtus accenso, phlegma extillatur:
Dein exemptum vitriolum contunditur, & extillato phlegma-
te perfunditur: Idque denuo iteratur, vt ante, vsque dum plegma
nullum amplius emanet, sed spiritus profiliant: Postea remouetur
ab igne, & calx rubicunda sumitur: quæ puluerata cucurbitæ vel
incuruæ, vel potius rectæ imponitur, & amplo recipiente adaptato,
atque commissuris diligentissimè obseratis, nocte dieque luculen-
tissimo igne, vrgendo oleum destillatur. Vbi omnia refrixerint,
rotus liquor eximitur, imponiturque in ampulla vitrea, & ex are-
na calida, primùm aqua insipida, dein acida & acris, quam oleum
appellant, separatur, purgaturque à sedimento. Hoc oleum si sæ-
pius phlegmate perfusum distilletur, dulce redditur: vt etiam cir- Oleum vi-
culatione cum vini spiritu. Huius enim & olei prædicti pondus trioli dulce.
æquum Chemici miscent, digerunt, & ex ampulla singulari euo-
cant, donec alumine à calcanthi sulphure separato, oleum dulce
remaneat.

Ex vitriolo multa habentur seorsim elicita remedia, spiritus, oleum
acidum & subdulce, sal, colchotar & balsamum quoddam chymia- Paraphrasis
tris dictum. Spiritus vitrioli ab oleo, præparatione, tenuitate & a-
gendi virtute multùm distat: Est enim subtilior chalcantli liquor, Spiritus vi-
seu quinta essentia, vt cum Chymicis de Chymico remedio loquar, trioli.
quæ sit multis, vt ex chalcantli igne vehementi in erecta ampulla
nouies agitato, adeo vt, quod destillauit, super terram ipsam (col- Quinta es-
chotar vocant) pulueratam, semper refundatur, tandemque igne sentia vi-
vehementissimo per ampullam incuruam propellatur. Sic enim spi- trioli.
ritus vitrioli efficacissimus habetur. Nonnulli ex præstantissimo vi- Spiritus vi-
triolo aquam, & oleum seu spiritus crassiores simul extillant, quos trioli edu-
dein à fecibus repurgant, donec in subtiliores spiritus attenuentur. Etio multis
Melius tamen eliciuntur, dum ij pelluntur per nouum alembicum, fit modis
effundendo semper extillatitium liquorem super caput mortuum,
atque postea ipsum circulando integram hebdomadam.

Vulgare autem oleum vitrioli modo hoc vulgari solet educi.
Sumitur primò quantitas quædam idonea vitrioli naturalis &
optimi vt Cyprij, veri nec adulterati; In vase cupreo calcinatur
ad ipsius rubedinem & phlegmatis dissipationem: Dein teritur,
& in cucurbita luto obducta includitur: aqua vitæ irrigatur, & Oleum vi-
diem integrum sic relinquitur, vt dicto liquore madeat: Tum trioli edu-
in fornace, vt decet, instructa, vt plurimùm quadrata colloca- cer. dimo.
tur & lutatur: Postea subtus, ignis primùm moderatus, dein ve- tus.
tus.

R r r ij

hementissimus accenditur, quoad totus liquor extillarit, qui postquam refrixerit, cucurbita parua excipitur, capitello superposito coarctatur, & sic in balneo Mariæ igne blando aqueus liquor stillat, remanetque in fundo vasis oleum purum & acidum. Id postea alia cucurbita exceptum, igne circunquaque accenso magis purgatur, atque pro illius efficacia & moderato, aut violento calore, calorem acquirit magis, aut minus rubrum vel album. Ex lib. i. vitrioli rubificati ℥ iiij. olei sæpius eliciuntur.

Vires.

Oleum vitrioli qualitates habet omnes adeo intensas, ut per se solum non assumatur, sed vel aquis, vel decoctis, vel conseruis antè permixtum. Et licèt sit calidissimum, eius tamen aliquot guttæ, multa aqua confusæ, eam reddunt acidulam, & febrientibus ut gratam, sic sæpe utilem. Tenuitate enim partium cito penetrat, aquam ad partes remotas defert, & obstructa liberat, aciditate putredinem arcet, & viscera recreat, atque pesti, epilepsiæ, paralyti & urinæ suppressioni plurimum confert. Non tantùm decoctum simplex rosarum, sed syrupum violatum, colore purpureo, & eleganti mira vi inficit, & acidulo sapore gratissimum utrumque reddit. Illius enim aliquot guttæ in dicti syrupi vnciam iniectæ, eum ex violaceo rubrum efficiunt.

oleum sulphuris,

C A P. I X.

CAmpanæ suspensæ ita supponatur patina aliquanto latior, ut labra utriusque circiter duos, aut tres digitos à se inuicem distent. Fundo patinæ admodum elato superponitur vasculum sulphuris ignem non experti quantitatem quamdam cōtinens, quod ferro ignito accenditur & agitur. Eo absumpto, aliud ponitur & similiter ignitur, ut ex eius copioso vapore sursum ad campanam raptò, concretus liquor oleosus descendat in subditam paroplidem, qui rectè quidem spiritus sulphuris dici potest.

Spiritus sulphuris.

Alij sulphuris & pumicis, vel silicis tritorum partes æquas sumunt: mixturam incurua cucurbita exceptam, ad moderatum ignem adhibent, & oleum educunt optimum.

Paraphras.

Non tantum his duobus modis, sed aliis pluribus, oleum è sulphure educitur. Nonnulli enim spiritum vini sulphuri puluerato adiciunt & accendunt: Absumpta aqua sulphur terunt, eique etiam commiscunt, & ampulla includunt, atque igne lento oleum eliciunt. Quidam addunt calcem, alij tartarum, nonnulli salern: verum id melius habetur quod ex solo sulphure, dein quod sine his educitur.

Oleum vel potius spiritus sulphuris non tantum vtiliter adhibetur exterius ad dentes dealbandos, cutis sorditates delendas, & vlcera venerea sananda, sed etiam interius sumitur ad eorum morborum expulsionem, qui à flatibus, aut materia frigida, crassa, & putri oriuntur. Pesti quoque non parum confert, epilepsiæ, asthmati, & multis aliis pulmonum affectibus, si ex aqua vel decocto idoneo sumatur. Odontalgia etiam proficit, si eo dens affectus vel leniter attingatur. Inficit quoque prærubro colore rosarum infusum, si in id illius aliquot guttæ iniiciantur.

oleum Mellis. CAP. X.

Mellis boni quantitas idonea sumitur, in bocciam amplam cum tertia, aut quarta arenæ parte iniicitur, & superposito pileo rostrato, & infernè igne accenso, aut cineribus, vel arenis calidiqribus circumpositis oleum elicitur.

Ad huius olei educationem arena aut silices triti commiscuntur, quod ignis vi mel facile ferueat, & totum ascendat, maximè si ignis luculentus, quo opus est, accendatur. Proinde cucurbita luto quodam incrustanda est, & vas recipiens, vnà cum pileo rostrato subinde pannis frigida madentibus tegendum. Qui vero postea liquor effluit, vniusi modi non est: Primum enim aqua quædam effluit alba, dein magis colorata ac rubescens, & oleosa, quæ seorsim aliquando seruantur ad dissimiles vsus. Simul verò mixtæ in balneo separantur: Nam aquosiore parte extillata pinguior remanet & seruatur.

Paraphra-
sis.

Oleum mellis valet ad dolorem podagræ sedandum, vulnera curanda, capillos renascendos, producendos, & ruffo colore inficiendos.

Vires.

oleum Cera. CAP. XI.

Ceræ virginis & odoratæ quantitas quædam sumitur, cui liquatæ lilicum tritorum, aut arenæ à sordibus purgatæ tertia pars commiscetur. Vbi mixtura refrixerit, ampullæ erectæ imponitur. Superponitur capitellum cum rostro; Substernitur ignis primum lentus, dein auctior, vt oleum extillet.

Ex multiplici huius olei trahendi modo, selegimus hunc, vt breuiorem & faciliorem, per quem oleum educum ad multa est efficacissimum. Si quis malit alio modo parare, nec laboris peni-

Paraphra-
sis.

teat, ceram odoram & liquatam in aquam proiciat, idque octies, aut decies repetat, manibus semper agitando, dein in retortam ponat, & lento igne sine cineribus oleum educat: quod si cui propter spissitudinem displiceat (butyri namque instar crassum est) bis, terve destillationem iteret, & oleum habebit liquidum & fluxile.

Ol. gummi
elemi.

Ex gummi Elemi, oleum modo simili, quo ex cera educitur optimum, & ad vulnera sananda accommodatissimum. Eodem quoque modo trahitur ex pinguedinibus animalium, additis silicibus tritis, vel arena, aut lateribus comminutis.

Oleum Terebinthinæ.

C A P. XII.

Oleum ex Terebinthina trahitur in cucurbita tam recta quam incurua, addita arena à pulvere & sordibus mundata, & substructo igne, primum blando, dein paulò validiore. Primum exit oleum clarum & tenue, dein crassius, & aurei coloris. Vnumquodque seorsim reponendum.

Paraphrasis

Nonnulli ad terebinthinæ lib. iii. salis m. j. & aquæ vitæ parum adiiciunt. Ista sic confuse mixta & matratio inclusa, igneurgent, ut oleum emanet.

Vires.

Oleum terebinthinæ intro sumitur ad asthma, Empyema, anhelitus difficultatem, ad calculum, colicum dolorem, & ad frigidos, flatuososque affectus. Exteriùs adhibetur ad nervos fauciatos, vel intemperie quadam laborantes, & ad vulnera carne implenda, agglutinanda, & ad cicatricem perducenda.

Plurimum valet ad extinctionem hydrargyri, cuius ad lucem veneream celebratur usus.

Oleum Caryophyllorum.

C A P. XIII.

Caryophyllorum quantitas idonea sumitur; in aqua pluvia horas duodecim, vel diem integrum maceratur, in boccia recta, vel, ut alij malunt, retorta, bene obturata, ut nihil expiret; dein superposito capitulo, per ci-

neres calidos ita vrgetur, vt oleum extillet, ab aqua postea seiungendum.

Per alembicum quoque cupreum affabrè constructum, o. Paraphrasis
leum hoc facilè educitur, atque etiam per descensum, vt
oleum iuniperi & guaiaci. Nonnulli parum vini stillatitii com-
miscent.

Ob vires eius insignes pro opobalsamo substitui solet, nam intrin-
secus, partes quæ principatum tenent, & spiritus recreat, putredi-
nem arcet, flatus discutit, meatus aperit, frigidos humores dige-
rit, melancholicos dissipat. Externis admotum vulnera recentia &
vlcera antiqua sanat, cariem ossium emendat, & dolorem dentium
à causa frigida sedat. Vires.

Oleum Macis simili modo extillatur. Calefacit & dige-
rit humores frigidos, ventriculum roborat, coctionem iu-
uat, appetitum excitat, atque alijs commodis multis vtentem
beat. Ol. macis.

Oleum cinnamomi operosius & carius educitur: ex eius Ol. cinna-
enim lib. i. vix olei 3 i. extillatur. Sed ob eius præstantiam bal-
samo naturali comparatur. momi.

Oleum nucis moschatæ vt macis destillatur, & ad eisdem
vsus exhibetur. Vt etiam illud quod ex nucibus moschatis
exprimitur, de quo supra.

Oleum ex corticibus citri ad multa laudatur. Sed de eo ac alijs Ol nucis
quibusdam præparationibus industria Chymica susceptis in nostra Ol nucis
Chymiologia fusiùs. moschatæ.

Oleum anisi. CAPUT XIV.

A Nisi lib. j. aut maior vel minor quantitas sumatur, con-
tundatur; in octupla, aut decupla aqua per horas ali-
quot maceretur: in vesica cuprea, seu alembico, refrigerato-
rio quodam comitato ponatur; dein igne primùm moderato, po-
stea valentiore destilletur. Tum demum ab aqua oleum sepa-
retur.

Cùm hoc modo oleum & aqua simul ascendant, & descendant Paraphrasis
postea in excipulum, hæc ab illo seiungenda est: quod ritè fiet in-
strumento quodam instar infundibuli formato in quod totum de-
stillatum conicietur, & ita collocabitur, vt acuminata & angu-
stior infundibuli pars, cera obturata, versus ima propendeat.
Tunc namque locum imum aqua, supernum oleum occupabit:
ablata cera, & referato foramine, illa effluet, hoc remanebit & ser-
uabitur.

Vires.

Valèt ad colicum dolorem à flatibus & frigore natum , ad Tympaniam, ventriculi inflationem, cruditatem, acidum ructum & intestinorum rugitum.

Ol. cumini.

Eadem arte parantur olea ex seminibus petroselini, fœniculi, dauci & cumini: quę vt ex plantis proueniunt cognatis, sic cognatas habent vires.

oleum de Spica. CAP. XV.

SPica maior, seu lauendula latifolia alba sumitur, in vino albo odorato maceratur, & per alembicum destillatur: dein serofus liquor separatur ab oleo vsui reponendo.

Vix vnquam per se hoc oleum vsurpatur, sed aliis ante permixtum medicamentis maxime topicis vt emplastro Vigonio. Ad alios quoque multos, præter medicos, adhibetur vsus.

Ol. thymi.

Thymi oleum eodem artificio trahitur, valet ad affectus quosuis frigidos, si debite tam intra quàm extra vsurpetur.

Ol. perlarum.

Ex margaritis tritis, succo limonum, vel aceto distillato maceratis, solutis, in calcem redactis, aqua pluuia irroratis, & artificiosè destillatis, liquor quidam trahitur, sed cùm materia superet opus, opus virium præstantiam, hoc remedio sumptuosiore, pharmacopolam carere censemus.

olea metallorum. CAPUT XVI.

NON tantum ex vegetantibus & mineralibus, sed etiam metallis Chymiatrī multiplici arte, labore & mixtione olea quędam exhibent, sed quę non adeo sunt eximiis dotibus insignita, vt ipsi prædicant. Nam omnia metalla nostrę naturę vix amica sunt, aurum & argentum si exceperimus, ex quibus oleum vix vnquam prostat eductum Sed demus salis nitri, aut aceri distillati, aut vini spiritus, aut aquę fortis, vel omnium, vel horum tantum aliquot, vel etiam succi limonum, aut blandiorum auxiliorum interuentu, tincturam quamdam elici aut liquorem seu eductum seu acquilitium haberi; hinc tamen vires eximias tribuere videtur iniquum: Qualescunque verò sint, intro si sumantur, infœlices, vt plurimū, producūt effectus, vt sæpe ancipites dū foris adhibētur. Hoc nō tantum videtur innuere Hieronym. Rubeus artis Chymicę peritissim, sed illa etiā remedia improbare, dū scribit, extrinsecus à perito medico admota posse iuuare; sed interi⁹ præbere, inquit, vix auderē quod

quod ab acutis aquis, & ignis vi, inimicam visceribus qualitatem & admodum perniciosam adipiscantur. Quo nomīe Paracelsi remedia complura mihi admodum suspecta sunt: & plerique scribunt, Basileæ ad vnum omnes, licet initio præclarè adiuti viderentur, tamen intra anni spatium mortuos esse quicumque Chymica eius pharmaca, ex metallis confecta in corpus assumpserunt.

In metallis igitur in calcem reducendis, aceto macerandis, solvendis, sale tartari, aut nitri elaborandis, aut alia mixtura, artificioque tractandis, nec res suas frustra nec tempus conteret prudens pharmacopœus: Cum quæ in Officinis solent consueto modo parari, ad medicinam rectè faciendam, sat esse possunt. Non tamen improbe quorundam oleorum per distillationem eductorum vsum, his in morbis, qui ordinariis medicaminibus non cedunt. Nam cum malo nodo malus cuneus sit adhibendus, si consuetum remedium sæpe datum non profuit, ad aliud transire ex arte inuentum & datum non nefas. Propterea vſitatorum quorundam oleorum & minus violentorum descriptionem dedimus quibus aliquādo medicus prudens poterit vti. Vt autem multa alia per distillationem educi solita negleximus: sic alia quoque non pauca per expressionem & impressionem elicita omisimus, tanquam superflua & ferè nunquam vſitata, vt oleum Costinum, Balaninum, nucis Indicæ, hyosciami, de ranis, de piperibus, de torpedine, & alia quædā potius ad ostentationem quàm necessitatem inuenta.

Appendix ad olea.

DE BALSAMIS.

Palsamum, seu Balsamon Syris dictum, in Officinis generali significato lignum, succum & fructum cuiusdam arbusculæ peregrinæ notat: Specialius eiusdem tantum succum, Opobalsamum Græcis nominatum indigitat: Abusivè Chymici Balsamum vocant suas tincturas, olea, liquores, quintas essentias & extracta. Licentio è quoque, sed non improprie medici quosdam liquores crassiusculos & rubentes, multa arte, mixturaque conf. ctos, & eximius viribus insignitos balsama nominant, cum tamen, Antibalsama potius, vel balsame læa rectius debeant appellari. Id verò nominis mutantur, ob terebinthinæ, quæ velut omnium basis est, resinarum & aromatarum mixturam, quæ corpus, colorem, odorem & vires tribuunt, omnia balsamo naturali analogæ. Fiunt autem per distilla-

tionem, ut plurimum inclinatoriam, in retorta, per quam liquor aqueus primum extollitur, deinde ad latus per incurvatum retortæ collum in excipulum delabitur: Qui secundus emanat, oleosus: qui tertius mellis instar crassus est.

Balsamum
paratu faci-
le & opti-
mum.

Nonnunquam balsama quedam parantur citra distillationem, inclusis nempe idonea ampulla, simplicibus medicamentis, & mensem integrum, aut alterum, in equifimo, quem ventrem dicunt, aut alio loco idoneo maceratis, dilutis & putrefactis. Sic ex aqua, quæ e folliculis ulmi colligitur, abiectis qui intus reconduntur, vermiculis, terebinthina, oleo hyperichonis, & paucis gummi elemi phiala inclusis, diutissime concorporatis & insolatu, vel alius caloris adiutus foris, balsamum habetur ad multa commendatissimum, efficacissimumque. Nam ulceribus quantumvis dyssepuloticis & malignis mirifice prodest, & quæ nullam cacoëthiam habent, ut & vulnera, citissime persanat.

Balsamum primum D. Mes. falso Guidoni tributum.

R. Myrrhæ electæ,
aloes hepaticæ,
spicæ nardi,
sanguinis Drachonis.
thuris,
mumiæ,
opoponacis,
bdellij,
carpobalsami,
ammoniæ,
sarcocolle,
croci,
mastiches,
gummi Arabici,
styracis liquid. an. ʒ ij.
ladani,
castorij, an ʒ ij. ℞.
moschi ʒ ℞.
terebinthinæ ad pondus omnium.

Arida terantur, vino macerentur & percolentur: tum simul omnia terebinthinæ commisceantur. Tota mixtura in alembico ponatur, qua vi ignis substructi calefacta, primùm exhibit liquor tenuis, dein crassius & ex rubro flauescens, qui Balsamum optimum est.

Lib. de passion. cordis. Huius balsami descriptio desumitur à Mesuë, illius auctore, qui vires illius pene mirandas recenset: nam subuenit, inquit, ad omnia *Vires in-* quæ oportet, & si yngatur corpus mortuum, non putret, & con- *gnes;* fortat animam & naturam.

Eius tamen vsus potissimum celebratur ad neruosum genus roborandus, intemperiem frigidam tollendam, natium partis calorem excitandum & fouendum, & robur membris conciliandum. Eo dum illinitur dorsi spina, mira celeritate paralyti & stupori succurrit. In his affectibus qui coniunctam habent loquendi impotentiam, si parum in aures & nares immittatur, aut aliquot guttæ sub infirmæ lingua contineantur, mirificè iuuant. Vocatur hoc Balsamum à Petro Apponensi, medicamentum omnium medicamentorum, in celeris cordis roboratione, & virium restitutione.

Balsamum II. D. Hollerii.

R. *Thuris albiss.*
maslich. an. ʒ ij.
ligni aloes ʒ i.
caryophyllorum,
galangæ,
cinnamomi,
zedoariæ,
nucis moschatæ,
cubebarum an. ʒ vi.
myrrhæ,
aloes,
ladani,
sarcocollæ,
castorij an. ʒ ss.
baccarum lauri,
nucleorum pini an. ʒ vi.
ireos,
aristolochiæ rotundæ,
dictamni,

consolidæ maioris an. ℥ i.

resinæ elemi,

opoponacis, benioini an. ℥ ij.

herbæ paralyfis an. ℥ ij.

succi chamæpitheos, & terebinthinæ ad pondus omnium.

Omnia concorporabis & destillabis in alembico. Extillabit primum aqua: deinde veluti oleosum quid: postremò quasi mel.

Vires.

Commendatur hoc balsamum ab illius authore Hollerio ad neruorum debilitatem, stuporem & resolutionem. Valet quoque ad omnem intemperiem frigidam & natium calorem excitandum.

Balsamum 3.

R. *Terebinthinæ Venetæ, & abietinæ an. ℥ ij.*

resinæ elemi,

thuris alb. an. ℥ ij.

aloes hepaticæ,

myrrhæ,

mastiches,

benioin,

boli Armenæ,

sanguinis drachonis an. ℥ ss.

aquæ vitæ ℥ iiii.

Ex his confusè mixtis, & simul retorta inclusis balsamum extilletur.

Vires.

Nulli medicamēto cedit hoc balsamum ad vulnera implenda carne & agglutinanda. Nervos quoque roborat, calorem partis insitum fouet, cicatricem minimè nodosam facit, & intemperiem emendat.

Balsamum 4. D. Fallopii.

R. *Terebinthinæ claræ lib. ii.*

Olei lini lib. i.

resinæ pini ℥ vi.

thuris,

myrrha,
 aloes,
 mastiches,
 sarcocollæ, ℥ij.
 macis,
 croci,
 ligni aloes an. ℥ij.

Ponantur omnia in retortam, & moderatō calore, primū educes
 aquam claram, dein in illo aucto, habebis oleum rubicundum.
 Vtrumque seorsim seruabis, & optima medicamenta vulneraria ha-
 bebis.

Balsamum 5. Medicor. Florent.

℞. Terebinthinæ lib. i.
 Olei veteris ℥vi.
 olei lauri ℥iiii.
 cinnamomi,
 spicæ nardi, an. ℥ii.
 Tegularum bene coctarum & recentium ℥viii.

Tritis terendis per alembicum distilla.

Vrinam mouet, calculos atterit, lumbricos enecat, aurium sibilo,
 paralyfi, spasmo, arthritidi & omnibus iuncturarum doloribus pro-
 dest, vel potum, vel inunctum: sed parua eius portio aquæ affectio-
 ni accommodatæ mixta bibatur.

Vires

Balsamum 6. D. Euonymi.

℞. Terebinthinæ ℥℞.
 Olibanī ℥vi.
 aloes socotorinæ,
 mastiches,
 galangæ,
 cinnamomi,
 croci,
 nucis moschatae,
 caryophyllorum,

℥iij

cubebarum, an. ℥i.

gummi hederae ℥ij.

Pulueriscentur & misceantur cum terebinthina: Exponentur in alembico vitro, addanturque

Caphura,

ambrae griseae, an. ℥ij.

Vires.

Destillantur lento igne: prima aqua alba est & clara, & vinum balsami: secunda, flaua, & vocatur Oleum: tertia crocea, & est balsamum certissimum.

Ob virium præstantiam, ad multos vsus commendatur hoc balsamum: Vulneribus enim præsentissimum est collecticum, vlceribus cauis sarcoticum, singulis tutum epuloticum: paralyti & neruorum imbecillitati securum auxilium.

Balsamum 7. & Vulgare.

Terebinthina Veneta lib. i.

Resinae elemi ℥v.

resinae communis ℥ij.

liquefiant simul: dein addito,

pul. aristolochiae longae ℥ii.

Sanguinis draconis ℥ij.

reponere in vase idoneo, & seruat.

Nulli secundum est hoc Balsamum vlceribus & antiquis, & recentibus ad sanitatem perducendis. Maximè verò capitis ægritudinibus externis benefacit. Paratu facillimum est.

Balsamum 8. & mirabile.

℞. Foliorum & florum, vel granorum Androsami,
 foliorum & florum, vel summitatum hyperici,
 summitatum botryos utriusque,
 foliorum hederæ terrestris an. m. ij.
 salviæ utriusque,
 chamæpitheos,
 folior. & florum primulæ veris,
 bethonicæ,
 florum lauendulæ an. m. ℞.
 granorum iuniperi ℥ ij.

In vase fictili macerentur per duos dies in
 vini albi & generosi lib. ij. Adde
 olei veteris lib. ii. ℞.

Bulliant lento igne ad vini dissipationem.

In colatura permisce,

Præparatio

Terebinthinæ lib. i.

mannæ thuris ℥ iiii.

myrrhæ ℥ iii.

masticis,

sanguinis drachonis an. ℥ ii.

styracis calamitæ ℥ i.

Fervefiant parum ac lento igne: deinde reponantur dies sep-
 tem in Sole, & serventur in vase fictili aut vitreo ad v- Vires?
 sum.

Non immeritò hoc Balsamum mirabile vocavi: mul-
 ti enim affectus, qui aliorum præsidiorum vim neglexe-
 runt, ipsius adiutu, quasi miraculo fuerunt sanati. Vul-
 nera quævis, ut & ulcera non inueterata citò percurat:
 antiquata etiam dysepulotica sanat, nervorum debilita-
 ti, tremori, & paralyfi efficacissimè prodest, capitis om-
 nibus morbis externis præsertim frigidis confert, calo-

rem natium reficit, dolores frigidos aufert, & partes roborat.

P O S S E M alia multa describere, sed cùm affinia sint, & ferè vulneraria, plura in Officinis haberi nihil est necesse.

Finis libri Quarti.



OFFICINÆ



OFFICINÆ
PHARMACEVTICÆ
SEV ANTIDOTARIÏ

De Medicamentis externis,

LIBER QVINTVS.

De Vnguentis & Ceratis.

P R Æ F A T I O .



ANTIQUITVS vnguenta tanto fuerunt in vſu & nomine, vt qui ea non ſolum pararet, aut venderet, ſed alia quauis medicamenta tractaret & uſurparet, Vnguentarius & Myropola diceretur: & Arabes cerata & emplaſtra ſapius vnguenta narrant, vt Dioſcorides olea pleraque odorata, iuxta illud Hippocratis, Medicus eſſe debet vnguentarius, hoc eſt, odoratus, vt

Actua.
cap. 1. l.

5. met.

Ca. 27.

lib. 10.

colleſt.

Ca. 2. l.

4. comp.

med.

gen.

me plus,

estate minus olei Myropola ſolent permiscere. Cum autem magna ſit

T

inter Ceratum & unguentum conformitas: Vtrumque enim ex hisdem, sed paulo diuersa proportionem mixtis, componitur, ut unguentum plus olei, minus cere recipiat, sitque medium inter ceratum & linimentum, hoc nempe spissius, & liquidius illo, de utroque in hoc libro agere statuimus; in cuius priore sectione unguenta, in altera cerata usitata & probatiora describemus. Fiunt verò unguenta, vel cum igne, ut quæ ceram, resinas & decocta simplicium admittunt, vel absque igne, ut sola nutritione & subactione, ut unguentum crudum, seu de lithargyro, vulgò nutritum dictum: de quibus in particulari hoc toto libro differemus: initio sumpto à refrigerantibus, inter quæ primum occurrat Rosaceum.

Unguentum Rosatum D. Mes. CAP. I.

*R. Axungia porci nouies aqua calēte, & toties frigida lota,
rosar. rubear. recent. an lib. iij.
misceantur & dimittantur marcescere dies septē,
deinde coquantur lēto igne & colentur. Rūrsus
tantumdem rosarum recent. contusarum totidē
dies marcescere dimittantur: tum coquantur &
colentur, ut antè: tandem affunde
succum rosar. rub. lib. i. ℞.
olei amygdalar. dulc. lib. ℞.
Coque igni lento ad succi consumptionem, &
repone vsui. Si inter coquendum parum opij soluti in aqua rosarū iniicias, erit eximium, & mirū
ad vigiliarum leuamen.*

COMMENTARIUS.

Paraphrasis Ut hoc ritè paretur unguentum, axungia suilla debet accuratè à membranis repurgari, nouies aqua parum calida, dein frigida lauare, ut sit omnis expers odoris: sic enim ad quemlibet odorem excipiendum aptior reddita, facillimè rosarum fragrantiam admittit. Debet verò earum maceratio ad maiorem efficaciam iterari, & colaturæ media illarum succi pars, & olei amygdalini sexta ad axungiam, ex Mesuei decreto adiungi. Sic pro lib. iij. adipis porcini ponimus lib. i. ℞. succi rosarum, & lib. ℞ amygdalini. Nonnulli pro amygdali-

no, rosaceum aut omphacinum. At sic paratum, cutis meatus minus referat, nec intrò ita promptè permeat. Potest absque oleo prorsus bene parari, cum ex se sit liquidum satis: quo modo tota fere myropolarum familia parat. Præstat tamen liquidiusculum cum amygdalino, quàm crassiusculum sine ipso confectum habere. Sed ut totà olei quantitatem à Mesueo statutam permiscere, non ex arte, sic omnino nullam, non ex ratione est.

Plerique ad ruborem maiorem & coloris elegantiam, cuius studiosissimi sunt aromatarij, anchusam inter coquendum permiscunt, sed melius est multò, illum colorem roseum ex rosis, quàm alius simplicibus, dissociatis mutuari. Anchusa enim pinguibus tantum associata, ut lignum Brasilianum aqueis, rubro colore inficit.

Imperat adhuc Mesuë ad somnum præ vigiliis immoderatis interruptum, reuocandum, opium rhodostagmate dilutum accedere ad confecturam, Cuius sententiæ libens assentior, hortorque pharmacopæos, si non totam, saltem quamdam huius vnguenti quantitatem cum opio compositam in Officinis asservare.

Et quia capiti per febres æstuanti adhibitum pro frontali cito liquatur, optimum esset ipsius portioni ceræ portionem adhibere. Sic enim crassius redditum affectæ parti diutius adhærebit.

Vnguentum Rosatum calorem immoderatum extinguendo, phlegmonas omnes, Erysipelata, & herpetas sedat, dolorem capitis à causa calida, & ventriculi, renum ac hepatis incendium mitigat: Quod opium admittit, hæc omnia potentius præstat, & præterea somnum conciliando, phreniticis plurimùm conducit, & vires reficit.

Eodem modo queunt parari vnguenta ex violis, nymphæa, & aliis floribus cuiuscunque qualitatis.

Vnguentum album Rhasis. CAPUT II.

℞. Olei rosar. ℥ ix.

ceruse bonæ in aqua rosarum lotæ ℥ iij.

ceræ albæ ℥ iij.

Ex arte fiat vnguentum.

COMMENTARIUS.

Vnguentum hoc & paucis constat & à paucis eodem modo describitur. Varietatem hinc maximè natam coniecimus, quòd Rhasis illius author simplicium dosim non definierit; quam ob id quisque ad arbitrium, auget, minuit, & immutat. Nonnulli magis odoris quàm virtutis gratia caphuram adiiciunt, alij mucaginem tragacanthi: quidam lytargyrum, alij albumina ouorum: sicque nullibi certa manet illius descriptio, nisi Lutetiæ, vbi iuxta formulam datam à pharmacopœis conficitur, qui primùm cerusam ad cribrum setaceum ita fricant, vt traiciatur: dein pluries abluunt aqua communi post rosacea: tum siccant: siccata friando in pollinem reducunt: tum demùm ceræ oleo rosato liquatæ permiscent, & spatula lignea agitando vnguentum tradunt, colore albissimum, consistentia legitimum, viribus multis commendatum. Valet enim ad pruritus, scabiem, adustionem, intertrigines, vlcera, pustularum eruptiones, acrem serpiginem, intemperiem vlcera calidam, atque alia multa cutis vitia sananda.

Vnguentum Populeon D. N. Myreps. CAP. III.

℞. Oculorum populi nigre lib. i ℥.
 foliorum papaveris nigri,
 foliorum mandragoræ,
 cimarum rubi tenellarum,
 foliorum hyosciami,
 solani, lactucarum,
 vermicularis,
 sedi, seu semperuini maioris,
 foliorum violarum,
 cotyledonis, an ℥ iij.
 axungie porci recent. & insulsæ lib. iij.
 fiat vnguentum vt artis est.

COMMENTARIUS.

Nic. Salernitanus ex Myrepsō, Præpositus ex Salernitano huius vnguēti descriptionem mutuatus est: neuter tamen debitum auctori primo reddidit honorem, cum vterque nomen ipsius subtricerit. Dicitur autem Populeon à sua basi, nempe à tenellis populi nigre oculis, vt loquitur vulgus, seu germinibus, quæ primo Vere in arboris summitatibus erumpunt, & mense Martio, ante perfectam illorum explicationem colliguntur, quibus pleraque refrigerantia & somnum inducentia adiunguntur, vt folia mandragoræ, papaveris, hyosciami, lactucarum & solani, necnon vtriusque *αἰζοῖ*, seu sedi, minoris nempe, quod herbam vermicularem, & maioris quod semperuiam, myropolæ nominant. Ea verò seligenda vermicularis, quæ flores albos gerit, & nulla linguam acrimonia vellicans. Adduntur & folia cotyledonis, quem rei herbariæ periti modo cymbalium, modo cortalum, modo veneris umbilicum nuncupant. Paratur autem sic, Germina populi recentia contunduntur, axungie à membranis repurgatæ permiscuntur, & vase figulino excepta operculato, loco modicè calido reponuntur ad mensem vsque Maium, aut

Preparatio

Tt iij

Iunium, aut conſequēdum ceteræ ſtirpes expetitæ poſſunt haberi ſatis adultæ & vegetæ: quæ tum collectæ, & à ſordibus purgatæ in pilæ teruntur, & mixturæ priori aſſervatæ & fermentatæ concorporantur: atque rursus in loco tepido, aut paulò calidiore, integram hebdomadam, vel etiam diutius fermentantur: poſtea in cacabo ponuntur cum lib. j. vini, vel aceti, ut nonnullis placet, quodd ſcopo magis conueniat. Nihil tamen obſtat, quominus vinum hac moderata quantitate frigidis multis permiſceatur, cum nonnulli bardanam calidiorē adiungant: ſunt qui ſolani ſuccum ponunt, ut colorem nancifcatur viridiorē.

Somnum conciliat, & febricitantibus ac caput dolentibus propter calorem, inunctum fronti & temporibus, aut plantis pedum, aut manuum carpis prodeſt.

Unguentum Nutritum, ſeu crudum, vel de Lithargyro, & Tripharmacum dictum D. Meſ. CAP. IV.

℞. Olei roſari lib. i.

lithargyri tenuiſſimè lænigati lib. ſſ.

aceti ℥ iiii.

Affunde viciffim ad lithargyrum, modò oleum, modo acetum & agita in mortario, donec ipſe liquorem ebiberit vniuerſum, & fiat vnguentū conſiſtentia legitimæ.

COMMENTARIUS.

Ex his eſt hoc vnguentum, quæ à ſingulis artificibus ſolent deprauari, ob ſimplicium. quibus conſtat, doſim ab authoribus indefinite traditam. Nam Meſuē ad huius vnguenti apparatus imperat tantū, ut modò oleum, modò acetū ad lithargyrū accedat, & iugiter in mortario agitentur: adhucque multi quotidie, nec olei, nec aceti quantitatem limitant, ſed ſolum, quantum ſufficit, imperant: alij variuſque partes æquales, & tantumdem lithargyri: Alij, contrà, & melius, olei lib. i. lithargyri lib. ſſ. aceti ℥ iij. Nos debitam ſingulorum proportionem dedimus, ſi tamen inter agitandum, myropolatorit, quantulacunque huius, vel illius menſura, præter definitam, opus eſſe, vel non eſſe, illi liberum eſto, quicquam vel addere, vel de-

trahere. Continua verò agitatione pistilli debet hoc vnguentum nutriri donec spissitudinem sibi comparet idoneam. Nec initio multum olei & aceti affatim super lithargyrum affundere fas est, alioquin submergetur, nec postea vnquam in vnguenti consistentiam debitam coibit. Nonnulli in plumbea pila nutriunt cum pistillo plúbeo, vt magis desiccet, sed multis displicet in vnguentis, hæc obscurior & nigricans tinctura: alij lithargyrum abluunt aqua rosacea: quidam addunt succum solani, vel plantaginis & cerusam: sed melius est parare iuxta formulam datam, quam sequuntur Parisienses pharmacopœi; non tamen omnes & semper oleum rosatum, sed aliquando commune sumunt, nec peccant. Dicitur autem vnguentum Crudum, quia absque igne paratur: nonnumquam Nutritum, quod nutritione longa vnguenti formam acquirat: interdum Tripharmacum, à trium simplicium quibus constat, vnione: ex quibus, vt decet coctis, fit emplastrum, in omnibus Officinis seruandum, quia vsitatissimum.

Vnguentū
crudum.
Vng. nutritum.
Vng. tripharmacum.

Vim habet reprimendi, desiccandi, carnem in vlceribus cauis generandi, eaque ad cicatricem perducendi.

Vires.

Vnguentum de Bolo. CAPVT V.

℞. Bol. Armenæ lib. ℞.
succorum solani, plantaginis an ℥ iij.
aceti ℥ ij.
olei rosati lib .j.
Sensim agitentur in mortario, donec vnguenti spissitudinem acquirant.

COMMENTARIUS.

Cap. 5. Eandem aut parum dissimilem descriptionem tradit Guido Cauliacus, quam ex Galeni lib. 9. simplic. accepisse fatetur: eum tamen doct. I. librum euoluens, minimè tale quid inueni. A quocunque verò auctore prodeat, vt optimum medicamentum à Chirurgis plurimum tract. 7. expetitur. Eadem est huius atque præcedentis præparatio: & vtrūque, cum fiat absque igne crudum nominari potest.

Vim habet refrigeratorem, astringentem & roborantem, optimèque conuenit initio fluxionum calidarum, proinde incipienti phleg- Vires.

monæ, Erysipelati, & similibus affectionibus valde prodest.

Vnguentum stypticum D. Fern. CAP. VI.

Olei rosati sæpius in aqua aluminosa loti lib. i. ℞.
 ceræ albæ, ℥ iiii.
 gallarum immaturarum,
 nucum cupressi,
 baccarum myrthi,
 balaustiorum,
 malicorii,
 corticum glandium,
 acaciæ,
 rhois,
 mastiches an. ℥ ii.
 Cum succis mespillorum & sorborum immaturorum fiat vnguentum.

COMMENTARIUS.

Præparatio Vnguentum hoc astringens, quod validissimum sit, ac paratu facile, inquit Plantius, vsurpandum erit pro vnguento Comitissæ & alio quouis astringente. Qui tamen noluerit vnquam ægrotantibus deesse, poterit hoc & illud habere. Semel enim remedio fœliciter adiuti, idem semper exposcunt, in eundem morbum denuo relapsi. Vt Stypticum ritè paretur omnia tenuissimè pulueranda, & dies circiter quatuor maceranda in succis sorborum & mespillorum, vel horum tantum alterutro; deinde lento igne siccanda: Tum ceræ oleo rosato liquatæ commiscenda, spatula agitanda, & accuratè commiscenda.

Inter astringentia primum locum obtinet: Ob id admouetur partibus imbecillis roborandis, ab humorum irruentium tuendis & laxioribus constringendis & angustandis. Nam fluxiones omnes intercipit, vulvæ, vteri, sedis, intestini que prolapsum cohibet, & profluentem sanguinem admotum sistit, mammillas pendentes retrahit, minores efficit, & ventris rugas à partu tollit.

Desiccatiuum rubrum. CAP. VII.

℞. Olei omphacini lib. i.
 ceræ albæ ℥ v.
 terræ Lemniæ, vel boli Armenæ,
 lapidis calaminaris an. ℥ iiii.
 lithargyri auri,
 cerusæ an. ℥ iiii.
 caphuræ ℥ i.
 fiat vnguentum, vt artis est.

COMMENTARIUS.

Desiccatiuum sic ab effectu dictum, vt rubeum calore, omnibus in Officinis præstat, vt topicum vsu frequenti & foelici probatissimum. Et licet de huius authore non satis constet, iuxta tamen formulam à nobis traditam, ferè apud omnes describitur, & sic paratur. Cerusa, caphura, lithargyri primum seorsim terenda & læuiganda; Cera moderato calore oleo liquanda: his ab igne semotis pulueres permiscendi, ita tamen, vt caphura postremo loco iniiciatur. Omnia sic confusè mixta sedulò spatula lignea agitanda, vt in debitam coëant vnguenti spissitudinem. Preparat.

Poterit quoque cum Syliuo parari, igne lithargyro prius nutrito, dein pulueribus vnà commixtis. Sed sic coadunatum, vt magis desicca, sic refrigerat minus. Sunt qui cum terra Lemniæ conchiunt: cum bolo tamen confectum nihilo est inefficacius.

Cera olei quantitatem magis superat, quàm vnguenti conditio requirit; Idcirco nec vnguentum, nec emplastrum ex antiqua descriptione paratur, sed velut quid inter vtrumque medium, vnguento quod solidius est, & emplastro mollius. Vnde libenter suaderem oleum augendum, vel minuendam ceram. Hæc vero minui potius debet, vt exsiccatoria vis remaneat integra, quam illud augeri.

Refrigerat, roborat, fluxionem sistit, partem affectam tuetur, humiditates excrementitias digerit, absorbit, siccatur, & vlcera ac vulnera ad cicatricem perducit. Vires.

Vnguentum Diapompholigos D. N. Alex. CAP. VIII.

Rx. Ol. rosat. ℥ x.

succi granorum solani ℥ iiii.

bulliant lento igne ad succi dissipationem: adde,
ceræ alb. ℥ v.

psimythij, seu ceruse lotæ ℥ iii.

pulueris plumbi,

pompholygis an. ii.

thuris ℥ i.

Coquantur & cogantur in vnguenti formam.

COMMENTARIUS.

Desumptum est hoc vnguentum ex Nic. Alexand. sed immutata simplicium singulorum dosi & ad meliorem formam redacta, iuxta Syluii castigationem. Illius basis pompholix, est, à qua nomen habet. Quid autem sit Pompholix, & quid differat à Tutia, postea dicitur. Iubet porro Alexandrinus vsti plumbi puluerem assumi & ablui, ego tamen malim id ipsum crudum, & ex arte in pollinem redactum, ut præstantius assumere: quibus tamen vstum magis arridet, his Dioscorides sic iubet vtendum. Super quam minutissimas plumbi laminas, inquit, fictili nouo inditas sulphur inspargito, additisque rursus aliis laminis, interiecto semper sulphure, vsque dum vas expleueris, succendito: flagrante autem plumbo, ferrea rude versato, donec perfectè redigatur in cinerem, nihilque è plumbo vstum hæserit: tum obturatis naribus, ne plumbi halitus noceat, eximito. Elimata quoque plumbi scobs cum sulphure vti facillè potest: ut etiam absque eo, si tenuissimæ illius laminæ igni acri imponantur, & rudicula ferrea perpetuò moueantur, dum soluantur in cineres.

Plumbi
vstio.

Alius
modus.

Tertius
modus.

4. modus.

Puluis plu-
bi crudi qui
fiat.

Vrunt nonnulli sine sulphure melius hoc modo. In fictili nouo reponunt, & prunis circumcirca accensis liquant, atque ferrea spatula agitant, ignem semper augendo, ut spumam non modò multam eructet, sed ut totum in spumam abeat, quæ velut cinis est, qui de nouo igni adhibitus non difficillè pulueratur. Vstum autem & pulueratum lauatur ut cadmia. Crudum verò facile in pollinem reducitur, si eius laminæ tenues, minutissimè incidantur, aceto acerrimo tres

Cap.

1038.

sui an-
tidot.

Lib de
simpl.

Ca. 96.
lib. 5.

dies immergantur, quotidie immutato, si videtur, aceto, & postea exemptæ & liccatæ citra usionem terantur. Ad præparationem coquitur primum solani succus in rosaceo ad succi deperditionem: Deinde cera eodem oleo liquatur: Tum adduntur pulveres tenuissimi, & continua agitatione rudicula lignea mouentur, donec tota mixtura refrigerit, in vnguentum abitura.

Præparatio

Præstantissimum est ad vlcerum sanationem: Eorum enim calorem mitigat, humiditatem siccatur, malignitatem cancerosam domat, dolorem lenit, cavitatem carne implet, & ad cicatricem perducit. Maximè autem tiliarum vlceribus prodest.

Vires.

Vnguentum ad pruritus scabiosum. CAP. IX.

*℞. Axungia suilla in succo scabiosa sæpius lotæ lib. ℞.
 Radic. oxylapathi in aceto ad putrilaginem coctæ, &
 per setaceum traictæ,
 sulphuris in succo limonum abluti an. ℥i. ℞.
 vnguenti populei in succo enule nutriti ℥ ℞.
 Omnibus in mortario prole subactis fiat vnguentum.*

COMMENTARIUS.

Historia
notanda.

Dum hæc scriberem, venit ad me rusticus quidam opem efflagitans pro quodam amico & affine, qui cum nocte, dieque pustuloso pruritu importunè stimularetur, à barbitonfore idoneum postulauit remedium. Ille vngvine sibi familiari, ex mercurio, sulphure & axungia suilla parato, partes prurientes semel atque iterum obliniuit, & tãto impetu prauam totius corporis colluuiem mouit, & ad ceruicem & collum promouit, vt suborta sputatione violenta, penè misellum suffocauit. Nolo plures alias similes historias recensere, cum ex dicta satis eorum innotescat error, qui vt imperitè, sic infelicitè ad leuè scabiem, & pruritus linimentum ex hydrargyro, adipe, vel butyro & sulphure confectum, imperant. Ne autem posthac ad vomitum redeant, vel aliis vt ita faciant, medicamentorum optimorum inopia consilium dent, hoc vnguentum damus, paratu facillimum, & ad scabiem pruriginosam efficacissimum. Serum enim biliosum & pituitam acrem, & salsam mitigat, humores quosuis calidos contemperat, & scabiem & pruritus sanat.

unguentum ophthalmicum. CAP. X.

R. Bol. armen. in aqua rosar. lotæ ℥ i.
℞ lapid. calaminaris in aqua euphras. abluti,
tutchie præparat. an. ℥ ij.
margaritarum tenuissimè leuigatar. ℥ ss.
caphura ℥ ss.
opi gr. v.
butyr. recent. aqua plantag. sæpius abluti ℥ v.
Fiat unguentum secundum artem.

COMMENTARIUS.

Vires.

Vix dici potest, quot, quantisque morbis & symptomatis obnoxius sit oculus, quibus oppugnandis omnia quidem medicamentorum genera debentur, sed non omnes eorum formulæ adhibentur: Præter enim colyria & unguenta quædam oculi non nisi difficillimè ferunt. Nam cataplasmata, emplastra & similia, ut super palpebras, & extra oculum aliquando profunt, sic intra admouere, excæcare est. Ad multos autem illorum morbos curandos unguentum quoddam ophthalmicum, ab effectu dictum exhibemus, quod humorum fluxiones arcet, calorem temperat, acrimoniam mitigat, lacrymas & sistit, & siccit, dolorem sedat, ruborem aufert, & oculum roborat, si illius tantillum post vniuersalia remedia purgationem, & sanguinis educationem ad angulos, & palpebrarum oras adhibeatur.

Vnguentum de Minio, seu vnguent. rubrum, caphuratum. CAP. XI.

<i>R. Minij trici ℥ iii</i>	<i>caphura ℥ ii.</i>
<i>℞ lichargyri ℥ ii.</i>	<i>olei rosati lib. i. ℞.</i>
<i>cerusæ ℥ i ℞.</i>	<i>cera alb. ℥ ii.</i>
<i>cuthiæ ℥ iii.</i>	<i>fiat vnguentum, vt artis est.</i>

COMMENTARIUS.

Duplex huius vnguenti datur descriptio: vna simplicior, quæ sine camphura, altera magis composita, quæ cum ipsa paratur. Vocatur autem rubeum à colore & de minio, à sua basi. Vtilissimè datur ad vlcera mala, inueterata, & quæ vix integram curationem admittunt, & ad cicatricem perducuntur.

Vires.

DE VNGVENTIS CALIDIS.

Vnguentum Resumptiuum. D. Præp. CAP. XII.

R. Butyr. recentis lib. i.
cerae flauæ lib. ℞.
axungie porci quart. i.
axungiarum anseris,
anatis,
gallinæ,
olei amygdalini,
anethyni,
chamæmelini an. ℥ ii.
mucaginum radicis altheæ,
lini an. ℥ i ℞.
mucaginis fœnugræci,
œsopi humidæ an. ℥ ℞.
fiat vnguentum, vt artis est.

COMMENTARIUS.

In hoc vnguento, in Antidotario Præpositi descripto, cum multa reprehendenda inuenisset Rondelerius, quædam detrahendo, nonnulla substituendo, alia prorsus, ut inutilia, nec scopo accommodata improbando, illius compositionem non parum immutauit: Nam pro cera alba, flauam: pro oleo violato, amygdalinum subdidit: Mucilagine verò tragacanthi, gummi Arabici & seminis citoniorum expunxit, quod sua virtute astringentiore digerendis humoribus minime conueniant. Quod si vnà cum resoluentibus in morborum principiis iis roborantia debeant aliquando usurpari, facile erit, utendi tempore, vnguento iuxta formam datam conficere, parum olei citoniorum, aut omphacini, vel similis, quando postulabit occasio commiscere. Ut vim digerendi maiorem habeat, addita est adhuc fœnugræci mucago, sed quantitate parua, quòd odoris insuauitate displiceat: Si medulla ossium vituli adiiciatur, virtutem habebit magis emollientem & relaxantem, ut voluit Fernel. Ut ex arte paretur, cera frustulatim diuisa cum oleis primùm liquanda, dein butyrum & axungia. Liquefactis simul omnibus æsypus addenda, & spatula agitanda. Ab igne semotis & accurate unitis mucagines in aqua communi, vel, ut aliis placet, in rosacea ad maius robur extractæ, commiscendæ, & lignea spatula mouendæ ut vnguenti spissitudinem idoneam acquirant.

Præparatio

Vires.

Totius thoracis dolores lenit, humores tussim committentes coquit, sputum mouet, pleuritidi auxiliatur, & succos inutiles musculis thoracis impactos resoluit, & partes relaxat, lenit, emollit.

Unguentum de Althea D. Myreps. CAPVT XII.

. Rad. althea,
℞ sem. lini, &
fenugraci an. lib. ℞.
Scilla ℥ iij.
 Lota, tritaque macerentur triduum in
aquæ lib. v.
 Dein bulliant donec inspissentur: His ad lib. i.
 expressis, misce
olei lib. ij.
 Feruescant denuò ad mucaginum exhalationem.
 Oleo superstiti adde
cerae flauæ lib. ℞.
colophonia,
resinæ an. ℥ iij.
terebinthina,
galbani,
gummi hederæ an. ℥ i.
 Omnia simul in cacabo liquecant, agitentur, &
 ab igne remoueantur, vt refrigerata in vnguenti
 spissitudinem idoneam concrecant.

COMMENTARIUS.

Fernelius huius vnguenti descriptionem multò simpliciore exhibet, omis-
 sis scilla, colophonia, galbano & hederæ gummi, quòd
 sordidum nimis vnguentum efficiant, nec his sit opus, ad digeren-
 tem vnguenti vim augendam, ex aliis simplicibus formula compre-
 hensis, satis efficacem. Ea tamen vtilia credo, quæ si quis expunxe-
 rit, vt medicamenti odorem, sic virtutem immutabit. Si desit gum-
 mi hederæ, eius succus substituendus. Aquæ quantitas nempe lib.
 iij. ℞. quòd minor esset, nec mucaginibus eliciendis, & postea co-
 quendis sufficeret, aucta est ad lib. v.

Cætera sunt facilia, vt & conficiendi modus, ex vnguenti formu-
 la artificiosè descripta satis notus.

Vires.

Vires.

Vnguentum de althea calefacit, emollit, lenit, humectat & digerit: Ob id intemperiem frigidam tollit, nervorum duritiei prodest, siccitatem nimiam emendat, pleuritidi & aliis affectibus ab humore crudo musculis adhærente natis, medetur.

Tetrapharmacum, seu Basilicum minus D. Mes.

CAP. XIV.

*R. Cera flauæ,
Resinæ,
picis nigrae an. ℥ij. ℔.
olei dulc. lib. I.
fiat Vnguentum secundum artem.*

Basilicum maius. D. Mes.

*R. Cera,
Resinæ pini,
sepi Vaccini,
picis naualis,
thuris,
myrrhæ an. ℥i.
olei lib. I.
fiat Vnguentum.*

COMMENTARIUS.

Vnguentum hoc à viribus quibus pollet maximis ad humores coquendos, seu suppurandos, Basilicum, seu Regium dicitur. Cōstat autem vel quatuor tantum simplicibus, ob id Tetrapharmacum dictum, seu Basilicum minus: vel pluribus, & Basilicum maius appellatur. Vtrumque diapyeticum est, seu pus mouens, aut suppuratiuum; Simplex tamen imbecillius est magis composito, & minus calidum, ac velut temperatum, propterea pepasmo, seu coquendis, & in pus vertendis humoribus magis idoneum: Nam verum pepasticum seu maturatiuum medicamentum temperatum est, & calori nostro natiuo cognatum, vnde sua qualitate potius agit, inquit Galenus, quàm quantitate, vt remollientia potius qualitate, quàm quantitate, cum sint validiora, non ita tamen superfluum humorem absumere. Cum ergo Tetrapharmacum sit quasi symmetrum, optimū suppuratorium est, & humores coquendo in pus ritè conuertit, perinde ac vola manus temperatissima parti cuiuspiam prauis humoribus scatendi diutissimè admota.

Ad Basilici confecturam resina & pix nigra, quæ nondum picandis nauibus inseruiuit, cum oleo primùm liquanda, & vbi parum refrixerint, pistillo agitanda, vt vnguenti consistentiam nanciscantur. Preparatio.

Tetrapharmacum seu Basilicum dolorem mitigat, humorem noxium parti impactum coquit, illius acrimoniam lenit, & carne vlcera implet.

Vires.

Mundificatium expertum. CAPUT XV.

Rj. Absynthij,
 centaurij minoris,
 agrimon.
 veronica,
 hormini,
 plantaginis an. m. i.
 macerentur in lib. ii. aquæ, & coquantur lento igne do-
 nec marcescant. in lib. ß. colaturæ expressæ, iniice,
 Mellis communis lib. ß. Bulliant rursus ad aquæ fere
 dissipationem. Tum adde,
 olei rosæ lib. i.
 ceræ in eodem liquatæ ℥ iii.
 pul. cancerorum vstorum ℥ iii.
 farine lupinorum,
 pul. radic. gentianæ an. ℥ ij.
 myrrhæ,
 aloes an. ℥ i ß.
 ireos,
 viridis æris an. ℥ i.
 fiat vnguentum vt artis est.

COMMENTARIUS.

Cum nullum extaret in vulgatis Dispensariis mundificatium
 eximium, de cuius efficacitate Chirurgi ad vlcerum deterfionem
 possent sibi scelices satis effectus polliceri, in illorum gratiam hoc
 rhypticum seu medicamentum extergens (mundificatium nomi-
 nant) concinnauius, his præditum viribus, quas Galenus requirit,
 ratio postulat, & probat vltus. Nam cum eiusmodi medicamentum
 tenuitate substantiæ mediocriter exsiccantis vlcus extergeat, seu
 fordes à parte cui adhibetur separet, & foras amandet, præter eam
 substantiæ tenuitatem, & qualitatem exsiccantem, & sæpius nitro-
 sam, ab emplastico, & viscido, quod in parte cohibet, excrementa

cap. xi.
 lib. 5.
 simpl.

& sordes aggerit, longè distare videtur. At verò mundificatiua vulgaris, magna sui parte, ex sarcocolla, thure, & mastiche componuntur: nonnunquam ex resinis, symphyto toto, & semperuiuo, quæ tantùm abest, vt effectus præstent quos illa promittunt, cùm sapius vlcera sordidiora reddant. Proin illis relictis, fœlicius in ægrorum salutem hoc nostrum rhypticum, seu extergens medicamentum in Officinis seruabitur.

Cancros autem fluiatiles vltos excipit, quibus vis est ad extergendum, & exsiccandum insignis. Seligendi verò sunt fluiatiles, quorum tamen defectu marini poterunt assumi. Vrendi vero in patella ignita, eousque dum faciliè redigi possint in lauorem, qui miscbitur vnà cum pulueribus reliquorum simplicium seorsim tritorum. Tum omnia incorporata agitabuntur, vt in vnguenti crassitiem vniantur idoneam.

Cancrorū
vltio.

Vim habet excrementa serosa ab vlceribus absumendi, crassiora separandi, & extergendi: Sed quæ sordibus crassissimis, vel cadauerosa carne conspurcantur, validius detergens, & sæpe catharticum postulant. Insigni autem virtute, eaque peculiari prodest vulneribus à canerabido inflictis. Eorum enim virus specifica proprietate extinguit, & humores infectos veneno exterget, siccatur, absumit.

Vires.

Vnguentum Aureum. D. Mes. CAP. XVI.

℞. Olei lib. ij.
cera citrinæ lib. ℞.
terebinthinæ claræ ℥ ij.
resinæ,
colophoninæ an. ℥ i ℞.
olibani,
mastiches an. ℥ i.
croci ℥ i.
fiat vnguentum, secundum artem.

COMMENTARIUS.

Vocatur hoc vnguentum Aureum & Regium, utroque nomine à colore & virtute deprompto: Nam vt aurum flauum est, vt rege dignum medicamentum, quod vix vnquam infelicitè adhibetur.

Xx ij

Eius adeo facilis est apparatus, ut ne quidem iuniores tyrunculos lateat. Perperam faciunt, qui lucri quàm nominis avidiores, absque croco & mastiche parant: Sic enim immutata illius virtute, & colore negato nec amplius aureum, nec regium est.

Vires.

Rite paratum aureum vulnera salubriter agglutinat, vlcera caua & mundata carne implet, dolorem, si quis in his sit, mitigat, & ad cicatricem accelerat.

Vnguentū
fuscum.

Easdem aut parum dissimiles vires habet vnguentum Fuscum, quod fit ex olei lib. i. β. ceræ novæ ℥ iiii. picis nigræ, sagapeni an. ℥ ii. mastiches, galbani, thuris, terebinthinæ an. ℥ i. Vtrumque enim sarcoticum est, seu vlcera implens, & ad perfectam curationem ducit.

Vires.

Enulatum cum Mercurio. CAP. XVII.

℞. Radic. enulæ in aceto coctæ, ritæ & cretæ lib. i.
axungie porci veteris, & salitæ,
olei communis an. ℥ iii.
ceræ novæ ℥ i.
hydrargyri extincti,
terebinthinæ claræ an. ℥ ii.
salis vulgaris ℥ β.
fiat vnguentum, legitimæ consistentiæ.

COMMENTARIUS.

Excerptum hoc vnguentum Præpositus ex Myrepsso, apud quem ferè simile legitur in fine tertiæ sectionis: sed ut illius videretur primus author, oleum, ceram, salem & terebinthinam addidit, & efficacius reddidit: Ante tamen istud incrementum, ob miras eius dotes, Mirabile vocavit Myrepsus.

Paraphrasis

Paratur autem in Pharmacopoliis iuxta maiorem descriptionem simplici securiorem, licet utriusque vsum auersentur multi propter hydrargyrum: Eius tamen per salivam, aut succum limonum extinctio metum omnem ex illorum animis excutere debet: Adde quod terebinthina, & adeps suillus commiscetur, quæ illius feritatem, si si quæ remansit, obscurans. Sunt qui loco hydrargyri Sulphur ponunt, alij succum fumarie vel limonum. Ad huius vnguenti appa-

ratum, nonnulli radicem enulę tantum in aceto terunt, & per cribrum traiciunt, sed melius est eas ad putrilaginem coqui, idque in acetum lib. ij. & aquę lib. j. potius, quā in aceto solo: Nam quę simplici concoquuntur aceto, acerrimam qualitatem adipiscuntur.

Cerę igitur oleo liquatę axungia additur, dein enulę pulpa, post argentum viuum & sal, tandem terebinthina; Quę omnia confuse *Præparatio* mixta, probè agitata abeunt in vnguentum.

Ad pruritum, scabiem siccam, humidam, & à quacunque causa *Vires,* ortam atque ad alias cutis fœditates mirè est efficax.

Vnguentum ad Vermes.

CAP. XVIII.

*Rx. Centaurij minoris,
absynthij,
farinę lupinorum an. ʒi.
pulpę colocynthid. criticę, aceto macerata, & postea sic-
cata ʒij.
olei amygdalarum amararum lib. ʒ.
cerę ʒi ʒ.
fiat vnguentum, consistentia idoneum.*

COMMENTARIUS.

Vermes in multis corporis partibus generantur, atque in his potissimum in quibus materia quædam excrementitia corrumpitur, ut in intestinis, ex quibus tria vermium genera reiciuntur; Ex superioribus teretes & longi, ex colo lati, ex recto ascarides, seu breues cucurbituli dicti. Omnes enecantur acris, salis, acidis & amaris, *Præparatio* vel interiùs assumptis ut aloë, santonico, rhabarbaro, vel exteriùs adhibitis, ut vnguento à nobis descripto, ad cuius præparationem, Colocynthis primum terenda, & aceto maceranda, dein insolatu, vel in cineribus calidis exsiccanda: Post, oleo cerę liquatę miscenda, vnà cum reliquis simplicibus in pollinem reductis: Tum omnia simul agitanda, & accurate vnienda in vnguenti concretionem.

Plurimum valet ad lumbricos interficiendos, si eo umbilici regio liniatur, vel totum abdomen, aut eius portio cum decocto enematis communis per sedem in aluum iniiciatur.

Vires.

Unguentum ad Achoras, vulgò tineam. D. Gordon.

CAPUT XIX.

℞. Elebori alb. ℥
 ℞. Elebori nigri,
 sulphuris vini,
 auripigmenti,
 lithargyri,
 calcis viuae,
 aluminis,
 gallarum,
 fuliginis,
 cinerum clauellatarum an. ℥ ss.
 hydrargyri extincti,
 virid. æris, an. ℥. ii.
 Fiat omnium puluis, qui bulliat læto igne in succorū,
 borraginis,
 scabiosæ,
 fumarie,
 oxylapathi ℥
 aceti an. ℥ iii. ad succorum cōsumptionem : Adde
 olei veteris lib. i.
 picis liquidæ ℥ ss. cere parum, fiat Unguentum.

COMMENTARIUS.

Huius unguenti Gordonius perhibetur author primus, licet cuiusdam Ioannes de Concoregio meminerit, qui in elebori vtriusque dosi limitanda ab ipso dissentit : ut etiam Guido Cauliacus, qui de hydrargyri & viridis æris quantitate non parum detraxit, cuius castigationem sequimur. Extinguitur autem argentum viuum multis modis, sed vsitatioꝝ modus fit per saluam ieiuni, aut succum limonium, & aliquando hyosciami. Cetera quæ ad apparatus attinent facilia sunt, eaque medicamenti formula descripta satis indicat.

Istud unguentum, inquit Gordonius, proculdubio tantæ virtutis

est, ut in corpore mundificato, seu purgato, omnem infectionem per scientiam humanam curabilem curat, siue fuerit tinea, seu scabies, malum mortuum, morphea, aut aliud quodcunque infectionis genus. Quare in honore, ut loquitur bonus vir, & reuerentia habeatur.

unguentum Apostolorum. D. Auic. CAP. XX.

℞. Olei communis lib. ii.
 ceræ flauæ,
 terebinthinæ,
 resinæ,
 ammoniaci an. ʒ xiiii.
 lithargyr. auri ʒ ix.
 aristolochiæ rotundæ,
 thuris masculi,
 bdellij an. ʒ vi.
 myrrhæ,
 galbani an. ʒ iiii.
 opoponacis,
 æruginis an. ʒ ii.
 fiat unguentum.

COMMENTARIUS.

Auicennam unguentum hoc inuenisse, & sic nominasse fertur, qui tamen Apostolorum numerum, nec rescivit vnquam, nec similiter deum coluit: Qui enim Christi legem sequentes Deum verè agnoscunt, certò sciunt apostolos non unguentis, sed verbis, imò sola vestium vmbra ægrotos sanasse; Vnde facilè credo interpretes Arabicæ linguæ deceptos qui unguentum hoc *Albauerin* Auicennæ dictum, Apostolorum verterunt. A quocunque tamen fuerit hæc imposita nomenclatio non improbatur, ut quæ compositionem ex tot simplicibus, quot olim fuerunt apostoli, cohærentem designet. Sic autem paratur.

Gummi primùm in aceto duodecim horas maceranda, dein colāda, & igne lento coquenda ad spissitudinem mellis quibus adhuc ca-

Preparatio

rr. 12.
 sum. i.
 lib. 5.

lauiatus in oleo, blando igne nutriatur. Tum eodem cera liquabitur, vt & resina. His ab igne semotis gummi dicto modo appparata commiscebuntur: Dein aristolochia, myrrha & thus: Tandem ærugo Cuius dosim augent imperitè multi, vt vnguenti colorem efficiant viridiorē: Simul enim cum tinctura acrimoniam acquirit vehementiorem, vlceribus nimis mordacem & noxiam. Auicenna aristolochiam longam ponit, non rotundam, & florem æris, non æruginem, quæ non parum inter se distant, vsus tamen magis probauit descriptionem vulgarem à nobis traditam.

Vires.

Vulnera & vlcera contumacia, itemque fistulas detergendo expurgat, fungosam, aut mortuam carnem exedit, & absumit, & nouæ restitutionem accelerat.

Vnguentū
è calce.

Ei viribus non malè conuenit vnguentum è Calce, septies, vel etiam decies in aqua communi, dein in rosacea, vt decet, abluta, & olei sufficienti quantitate excepta ad vnguenti crassitiem. Vlcerum enim efficaciter à sordibus exterget, humiditates absumit, & ad cicatricem perducit. Paratur aliud magis compositum, additis cerussa, pompholige, lithargyro, sepo vitulino, & vnguento rosato: Sed rarò est in vsu.

Vnguentum Ægyptiacum. CAPVT XXI.

R. Æruginis ℥ v.

Mellis ℥ xiii.

aceti fortis ℥ vii.

Coque super ignem donec inspissentur in vnguenti crassitudinem.

COMMENTARIUS.

Ægyptios omnes Medicos olim fuisse antiquo prouerbio fertur, ab hisque primas medendi leges, & medicamenta multa mansisse patrum scripta, & rerum monimenta testantur; Verùm Græci gloriæ semper auidissimi, quæ ab illis sunt mutuati sæpè tam astutè immutarunt, vt primi nunc ferè authores habeantur. Superfunt tamen adhuc quædam olæa, & vnguenta ab illis cognominata, vt vnguentum hoc vulgare Ægyptium dictum, quòd eius cognitio primùm ex Ægypto ad nos delata est, vel quia illic & laudatissimum, & vtitatissimum parari consueuerit. Ex his enim causis potius, quàm

ex Ægyptiorum colore fusco, ac vnguento simili probabilius est nomen deriuatum. Multi à sua basi, videlicet melle, melleum nomināt. Sed cū rationi nonnunquam præponatur vsus, cum n. yropolis Æ. *Præparatio.* gyptiacum nominabimus, quod sic parabitur. Mel cum aceto, & ærugine puluerata, in figulino vase igne lento coquetur ad aceti dissipationem, æruginis tincturæ immutationem, & vnguenti consistentiam legitimam. Vocatur à Mesue magnum, id est, viribus eximium, non ad differentiam minoris, seu minus compositi.

Ad vlcera antiqua & fistulosa est vñtatissimum: Ea enim terget, putredinem aufert, saniem absomit, carnem excrecentem, & mortuam exedit, non sine sensu doloris. Si thus masculum addatur, vt consentire videtur Mesue, aliquanto mitius erit, & minus sarcoticum.

Vires.

Vnguentum Agripæ D. Myr. CAP. XXII.

*R. Radic. bryoniæ lib. ij.
cucumeris asinini lib. i.
scille lib. ß.
yrcos ℥ ij.
radici filicis,
ebuli,
tribulorum aquaticorum an. ℥ ij.
olei veteris lib. iij.
ceræ citrinæ ℥ xv.
fiat vnguentum ex arce.*

COMMENTARIUS.

A Myrepso vocatur vnguentum *μύρσα*. Latini codices de Agripa, & ratione vix probabili ad regem Agripam retulerunt. Sic forsitan dicitur, quod fiat ex simplicium agrestium succis per macerationem in oleo relictis, vnde *ἀγρίππων*, quasi succus agrestis, à quo detorta est de Agripa nomenclatio. Sed de nominū ratione non disserendū, modò res ipsa probè dignoscatur. Huius autē vnguenti descriptionem à Myrepso datam Salernitan. parum immutauit. pro radice althææ syluestris, cucumeris asinini radicem ponendo, scopo conuenientiore, serosis humoribus educendis, & hydropi curan-

do, iuxta Myrepsi institutum accommodatiorem. Sic verò illius præparatio suscipitur. Radices recentes primùm seligendæ, abluendæ, diligenterque à sordibus purgandæ & terendæ: Deinde oleo super cineres calidos quinque aut sex dies, in vase fictili macerandæ: Postea coquendæ, donec contabuerint, & aquea humiditas exhalarit. Tum percolandæ. Percolato liquori denuò ad ignem adhibito, & feruere incipienti, addenda cera, & ex arte conficiendum vnguentum: quod ventri illitum hydropicis prodest, vt & lienosis, si hypochondrium sinistrum inungatur. Aluum quoque non rarò subducit, licèt tantùm extrinsecus adhibeatur. Maximè verò pueris & habitu mollioribus. Aliis adhuc multis qualitatibus pollet quas breuitatis causa prætereo.

Vnguentum Aregon. D. Myrep. CAP. XXIII.

<i>R. Laureolæ ℥ ix.</i>	<i>piperis an. ℥ β.</i>
<i>calamenti lib. β.</i>	<i>pyrethri,</i>
<i>radicis cucumer. agrest.</i>	<i>euphorbij,</i>
<i>yreos recent.</i>	<i>petrolæi, an. ℥ i.</i>
<i>maioranæ,</i>	<i>mastiches,</i>
<i>cimarum roris marini,</i>	<i>thuris an. ℥ vi.</i>
<i>serpilli,</i>	<i>olei moschatellini ℥ β.</i>
<i>rutæ an. ℥ iiii. β.</i>	<i>laurini,</i>
<i>foliorum lauri,</i>	<i>adipis vrsi an. ℥ iiii.</i>
<i>saluæ,</i>	<i>butyri ℥ iiii.</i>
<i>sabinæ an. ℥ iiii.</i>	<i>ceræ puræ ℥ xv.</i>
<i>zinZiberis,</i>	<i>olei communis lib. v.</i>

Herbis & radicibus vino maceratis, coctis cum oleo, colatis, & additis pinguibus & pulueribus, fiat vnguentum vt artis est.

COMMENTARIUS.

Qui ad huius vnguenti apparatus medicorum commentarios euoluunt, tot varietates, quot authores in descriptione eius agnoscunt: Nam Salernitanus addidit radicem bryoniæ, iari, cucumeris asinini, & folia vtriusque Conisæ: Fernelius additionem illam ad-

mittit, omittit radicem iridis, & dosim immutat : Alij alia vel detraxunt, vel adijciunt. Ioubertum authoris mentem fidelius sequuntur, magis sequimur, & descriptionem quam ipse in meliorem ordinem redegit, exhibemus. Eius autem apparatus sic instituendus. Radices & herbae tritae, & à sordibus purgatae diem integrum maceantur: postridie eximantur, & probe terantur; In oleum immergantur, & sic dies septem dimittantur: Tum coquantur & percolentur. Expresso liquori addantur butyrum, adeps & cera: His liquidis affundantur olea: Tum pulveres permiscendi. Omnia sic rite permixta, & subacta unguentum efficiunt consistentiae legitimae: *ἀνζόν.* quod ab effectu *ἀνζόν*, id est, auxiliare, à quibusdam, Adiutorium, *Vog. adiutorium.* à Nicolao Prapósito ineptè Aragon dicicetur.

Valet ad affectus corporis frigidos, convulsiones, resolutiones, colicum dolorem & articulare. Ante invasionem quartanae prodest spinam dorsi, & scapulas eo inungi.

R. Olei antiqui lib. ii. myrrhæ an. ℥ i. ℞.
 cera, lib. i. fœnugræci,
 roſis marini, butyri an. ℥ vi.
 foliorum lauri, ſeminis vrticæ,
 rube, an. ℥ iiii. violarum,
 maioranæ ℥ iiii. papaueris albi,
 ebuli, mentæ ſatiuæ, &
 Sabine, mentæ agreſtis,
 baſamitæ, rubiæ tinctorum,
 ozini, oxylapathi,
 eleliſphaci, polyrrichi,
 polii montani, cardiobatani,
 calaminthes, periclymeni,
 arthemifiæ, herbæ moſchate,
 enulæ, florum chamæmeli,
 bethonica, ſcolopendrij,
 acanthi, criſpula,
 ſpargula, herbæ camphorate,
 herbæ venti, ſtyracis calamitæ,
 pimpinellæ, thuris,
 agrimonii, medullæ cerui an. ℥ ii.
 abſynthii, axungiarum vrfi,
 herbæ paralyſis, gallinæ, &
 coſti noſtratiſ horteniſ, anſeris,
 cymarum ſambuci, maſticheſ an. ℥ ℞.
 vermiculatiſ, olei nardini ℥ i.
 ſemperuini maioris, Radices & herbæ tritæ vi-
 millefolij, no macerentur, coquan-
 chamædrios, tur, oleum affundatur, &
 quinqueneruiæ, ruruſ coquantur donec
 centaurii minoris, marceſcât. Colato liquo-
 fragariæ, re & calente cera lique-
 pentaphylli an. ℥ ii. ℥ ii. tur, dein butyrũ & axun-
 radicis althææ, giæ: Tum pulueres addâ-
 cumini, tur, & fiat vnguentum.

COMMENTARIUS.

cap.
99.

Putat Salernitanus hoc vnguentum debere vocari Martianum a Martiano; Manlius, Martiatum à Martiatone medico peritissimo illius inuentore. Sed is, quicumque fuerit, vnguentum sanè ad multa efficacissimum, & vsitatissimum descripsit. Multis autem quod constet simplicibus, ad differentiam alterius minoris descriptionis ab Alexandrino traditi, magnum vocatur.

Verùm ne quis in eius dispensatione admittat errorem, simplicium aliquot obscurior appellatio sic elucidanda, vt per acanthum, brancha vrsina intelligenda, per balsamitham mentha aquatica, per Elelisphacum, saluia, per spargulam aparine Græcorum, per herbæ venti, non parietaria, sic quoque dicta, sed anemone syluestris; alterutra tamen nullo errore sumi potest, per herbam paralytis, primula veris, per costum notratem mentha Græca, herba sanctæ Mariæ vulgo dicta, per temperauum, sedum, seu aizoon maius, per quinque-neruiam, plantago minor, per cardiebotanum, carduus benedictus, vel potius cardiaca, per periclymenum matrisylua seu caprifolium, per herbam moschatam, prima geranij species, per crispulam cotula non fœtida, quam buphtalmum, seu oculum bouis appellant, per herbam camphoratam, abrotonum mas. Reliqua facilia sunt.

Composi-
tionis illu-
stratio.

Præparatio

Pro tamarisco autem non amaracum cum Iouberto posuimus, sed maioranam scopo conuenientiore. Ad præparationem radices, & herbæ medio Vere collectæ, abluendæ, purgandæ, terendæ, vini generosi sufficienti quantitate, in vase idoneo, super cineres calidos macerandæ & coquendæ ad mediæ parris vini dissipationem: Deinde oleum affundendum, atque omnia rursus coquenda simul ad vini perfectam exhalationem. Post hæc ab igne semoueantur, & sacculo excepta exprimantur, & rursus igni reddatur. Tum addenda cera, liquandaque, Dein butyrum, axungia, medulla, & reliqua puluerabilia, in tenuem pollinē redacta. Omnia sic dissoluta, probè mixta & agitatione continenti vnita, igni subtrahantur, vt coëant in vnguenti formam.

Efficacissimum est ad frigidos cerebri, neruorum & articulorū affectus. Tremori, paralyti, conuulsioni & arthritidi plurimum confert, & præduris lienis tumoribus, atque omnibus doloribus à crudis humoribus natis.

Vires,

Vnguentum Citrinum D. Myr. CAP. XXV.

R. Boracis,
 marmoris albi an. \mathfrak{z} ij.
 capbura \mathfrak{z} i.
 coralli albi \mathfrak{z} β .
 amianti, Umbilici marini,
 antalii,
 dentalij,
 cristalli,
 nitri,
 tragacanthi,
 amyli,
 thuris albi an. \mathfrak{z} ij.
 gersæ \mathfrak{z} i.
 cerusæ \mathfrak{z} vi.
 adipis suilli recentis, nec saliti lib. i. β .
 seu caprini \mathfrak{z} i β .
 adipis gallinæ \mathfrak{z} i.
 mala citria n. ij.

Ea minutim incisa adipibus liquatis misceantur, co-
 quantur & percolentur. Expresso liquori reliqua
 ex arte puluerata cōmiscébūtur, & fiet vnguentū.

COMMENTARIUS.

Cum hoc vnguentum nomen tantum habeat à citro, non colorem
 (album enim est) rectius citreum quàm citrinum dici potest: sed
 effecit vocum affinitas, vt nullo, aut exiguo errore, modò hoc, mo-
 dò illo nomine designetur. Ex his vero est, quæ ad artem cosmeti-
 cam, seu exornatoriam potius, quàm morborum curatricem spe-
 ctant. Constat namque multis quæ cutem erugant & detergant,
 prauum illius colorem emendant, meliorem conciliant, & ad lauda-
 bilem statum reducunt. Verum cum multa ex his, barbaris vocibus
 enuntientur, explicationeque indigeant, ne vocum ambiguitate,

ac multiplici acceptione tyrones decipiantur, hanc illis subiungimus interpretationem, vt pro amianto, seu amento dulci, alumen scissum, vulgo plumeum, non gypsum coctum cum Manlio sumatur: pro vmbilicis marinis intelligantur belliculi marini, figuram vmbilici humani referentes, satis noti ac vulgares. Pro Antalio, tubus quidam marinus intelligendus est, longitudine digiti minoris, foris striatus & inter buccina numeratus. Pro Dentalio, conchula parua, longa, rotunda, candida, intus lauiſſima, incurua, altera parte acuminata, in qua vermis marinus viuit, & aliquando exit. Et cum antalia & dentalia conchylia ſint, & velut buccina, non male ipſorum defectu, turbines marini & cochleæ uſurpantur.

Per Gerſam autem velut Ceruſa quædam intelligenda eſt, ex radice Drachontæ, ſeu Serpentariæ, vel eius penuria, ex radice Iari & aqua roſarum confecta, cuius præparatio ſic ſe habet. Radices Drachontæ ſeu Serpentariæ maioris Vere collectæ, abluendæ, & à for-
 dibus purgandæ & ſiccandæ: deinde in mortario lapideo tenuiſſimè puluerandæ: & fictili, aut vitreo vaſe idoneo exceptæ, aqua roſarum inſuccandæ: tum linteo tecto ad Solem ſiccandæ: poſtea rursus terendæ, roſacea irrorandæ, & vt antè inſolandæ & exſiccandæ. His omnibus ter, quaterque iteratis, tandem puluis vino odoro madefaciendus, & in paſtillos cogendus: qui in vmbra ſiccati, uſui reponendi ſunt, & pro Gerſa uſurpandi.

Gerſæ præparatio.

Porrò huius vnguenti ſic ſuſcipitur præparatio. Axungia primùm ſimul in vaſe fictili liquantur; quibus duo mala citria per taleolas ſecta noctem integram macerantur: manè ſequenti coquuntur & percolantur. Inter ea marmor, cryſtallus, corallium, vmbilici, antalia, & dentalia tenuiſſimè puluerabuntur, vt etiam reliqua, ſed ſeoriſim, maximè verò caphura, amylum, thus, amiantum & borax. Gerſa autem quod friabilis ſit, leui ad cribrum inuerſum tactu comminui ſolet. Omnia vt decet læuigata adipibus liquatis, colatis & adhuc calentibus commiſcebuntur & agitabuntur, vt concreſcant in vnguentum. Minor autem videtur quantitas adipis ad pulueres, qui propterea minuendi, vel ille augendus: Nam pro libra pulueris ſæpius requirunt pharmacopœi axungia, vel adipis lib. vii. aut viij. ferè autem puluis ſeruatur, & rectè, atque vtendi tempore axungiis commiſcetur.

Præparatio

Inutilis videtur eorum curioſitas qui in malum Poncerium excavatum axungiam mundatam & liquatam iniiciunt, in balneo mariæ ponunt, pulueres pro axungia quantitate commiſcent, mouent, agitant, ab igne tepido amouent, tum diu mouent donec vnguentum conſiſtentiam acquirat idoneam.

Vnguentum Citrinum papulas ex bile, aut ſalfa pituita, in cute, præſertimque faciei erumpentes reprimit, impetigines, liuores & lentigines extergit, fœdas cicatrices delet, oculorum rubores auferit, & cutaneos affectus ſanat.

Vires.

℞. Seui hœdi ℥ iiii.
 axung. porci recent. ℥ viii.
 pomorum fragrantium lib. ℞.
 pul. ireos florent. ʒ ij.
 calami aromat. santal. citrin. an. ʒi.
 Caryophyll. cinnamomi an. ʒ ℞.
 florum lauendulae ʒi.
 styracis calamint.
 bensoin an. ʒ ij.
 Ex arte fiat vnguentum.

COMMENTARIUS.

Antiquorum nullus vnguentum pomatum
 & melius pomatum nominat, sed plerique quod à vuneribus
 fracturis & vlceribus curandis vtilissimum in suis voluminibus
 attexere neglexerunt. Omnes tamen pharmacopœi quamdam illius
 descriptionem apud se seruât, & parant, vixque datur officina quæ-
 dam, nisi paupercula valde, aut plebeciana, in qua venale non pro-
 stat vnguentum pomatum: Cuius cum variæ descriptiones circum-
 ferantur, optabiliorem ad quos commendatur vsus, selegi. Displicet
 enim quod à Cerato refrigerante Galeni colore & odore parum di-
 stat: Nam cum sit vnguentum, à delicatioribus mulierculis, quæ
 odoratis delectantur, experitum, non modo suauem halitum spirare,
 sed & colorem gratum habere debet. Propterea seduli myropolæ
 moschum, ambram, zibethum, aliaque aromata permiscent ad fra-
 grantiam: & nonnulli laccæ factitia vel anchusæ nonnihil, aut alius
 tincturæ conijciunt, ad rubellum, vel vt loquuntur, carneum colo-
 rem inducendum.

Parandi difficultas si quæ sit, non multum laboriosa; Seuum &
 axungia à sbris purgantur, liquantur, & in vas vitreum mundum
 colo traiecta iniiciuntur: Refrigerata abluuntur aqua rosacea, vel
 alia odorata: Tum medulla pomorum commiscetur: postea igni blan-
 do omnia committuntur, agitantur, & simul feruefiunt ad aquæ dis-
 sipationem, nodulo prius qui pulueres contineat, immisso.

Vires.

Prodest cutis nigredini & aspredini à solis æstu, vel Aquilonio
 flatu

flatu contractæ, labiorum, papillarum & manuum scissuris, maculis faciei delendis, eiusdem furfuribus impediendis, rubori mitigando, & scabritiei leniendæ. Valebit ad ambuſta plurimum, ſi olei nenupharis & ceruſæ parum admiſceatur.

Vnguentū
ad ambu-
ſta.

Vnguentum ſpleniticum. CAP. XXVII.

℞. Olei de capparibus,
Olei de Iaſmino an. ℥ ix.
Butyri æſtiui & inſuſi ac recentis lib. ſſ.
Succorum bryoniæ & Ciclaminis an. ℥ vii.
Gummi ammoniaci aceto diſſoluti ℥ ii.
Puluerum corticis tamarisſci, Fraxini,
Ceterach,
Seminis agni caſti an. ℥ i.
Cumini ℥ ii.
Cera noua & odorata q. ſuff.
Fiat vnguentum: cui adde,
Olei de Spica ℥ ii.
terebinthinæ Venet. ℥ i.

COMMENTARIUS.

Multis lien tumet, aliis induratur ſine incremento inſigni: aliis ſimul inſigniter & augeſcit & indureſcit. Omnibus grauitas adeſt & circumſcriptus in hypochondrio ſiniſtro tumor, ſpiritus difficultas, prauus color, ad plumbeum vergens, decubitus in ſiniſtrum latus grauis, venæ ad lienem nigricantes & turgidæ, & pedum ſæpe inflatio.

Illis poſt generalium præſidiorum opem confert regioni lienis hoc vnguentum adhibere, quod vim habet malacticam ſeu emollientem, reſoluentem, aperientem, roborantem ac ſpleniticam, vnde nomen. Non debet igitur omitti, & cū eius vſus ſæpe ſit vtiliſſimus, in pharmacopoliis omnibus debet haberi.

Vt ritè paretur olea, & butyrum igne lento bulliant cum ſuccis ad eorum diſſipationem. Commiſceatur ammoniacum dilutum & terebinthina, vnitum: Addantur pulueres: tum demum cera, & fiat.

unguentum, cui parum olei de spica addatur, quod sua tenuitate efficit, ut reliquorum vis melius ad partem deferatur, & suo halitu unguenti odor minus sit ingratus.

Unguentum Neapolitanum. CAPUT XXVIII.

℞. *Axungia fœllæ in succo saluæ loræ lib. i.*
argenti vini extincti ℥ iiii.
olei laurini,
chamæmeli, &
lumbricorum, an. ℥ ij.
ol. de spica ℥ i ℞.
aquæ vitæ ℥ i.
cere flauæ ℥ ij.
terebinthinæ in succo enulæ loræ ℥ iii.
pulueris chamæpytheos & saluæ an. ℥ ii.
fiat unguentum ut artis est.

COMMENTARIUS.

Vellem citra nationis alicuius iniuriam de morbo venereo & eius curatione medici loquerentur; sed cum multi istius luis originem, causam & naturam primo sui aduentu ignorarent, in eos à quibus vel iuste, vel iniuste se læsos putarent, retulerunt: hinc alij Hispanicum, alij Italicum, alij Gallicum, ut Itali, nuncupant. Galli vero cum homines sint, nec iniuriam illatam facile ferentes, morbum quem antea Indicum, aut venereum rectè vocabant, audito Gallici morbi nomine ab Italis imposito, non modò morbum, sed etiam remedium Italicum & sæpe Indicum nominant. Ex India enim primò ab Hispanis delatus est in Italiam, unde Galli post captam Neapol. domum redeuntés hunc fructum Neapolitanum detulerunt. Sed hæc ridendi quàm rodendi gratia, potius dicta sunt: Redeo nunc ad unguentum à nobis ad Indicæ luis curationem descriptum, quod aliorum eiusdem nominis multorum loco erit: quæ velut per manus pharmacopœorū & chirurgorum tradita, in quibusdam Officinis ex solo adipe suis & hydrargyro, aut simul paucis quibusdam aliis simplicibus indebitè paratis & vnitis conficiuntur. Ob id ægroti sæpè ab ipsorum unguentorum litu incidunt in tremorem, stuporem

& p̄alyſim. Hoc autem à nobis deſcriptum multis conſtat, quæ dictos affectus impediunt, neruoſum genus roborant, qualitatem malignam humorum peccantium extingunt, & humores ipſos partim reſoluunt, partim propellunt, & ſputando per os educunt. Sunt qui petrolæum & Euphorbium adiiciunt: quæ licet propter partium tenuitatem & calorem excedentem aliquando frigidioribus naturis proſint, bilioſis tamen & temperatis ſæpius obſunt. Mithridatium & Theriacam alij permifcent, nos tamen omiſimus, quòd non ſint huiusluis efficax alexiterium: argentum autem viuum vt decet uſurpatum, efficaciffimum eſt, vt alibi demonſtrauimus.

Ad huius autem vnguenti apparatus, primùm cera igni moderato cum oleis liquanda, & addita aqua vitæ agitanda & calefacienda ad eius ipſius exhalationem: dein adeps & terebinthina vnà cum hydrargyro illis incorporato. Tum demùm pulueres: ſicque omnia probè ſubacta concreſcent in vnguentum. Præparatio

Si hoc paratum modo diu ſeruari non poſſe videatur, alio ſic paratur: Axungię primùm lento igne cum ſaluę ſucco ferueſcat, ad eius diſſipationem: admiſceantur olea chamæmeli lumbricorum, de Spica & cera: omnia agitentur ſpatula donec cera probè liquata commixtaque fuerit: Tum omnibus ab igne ſemotis laurinum adiungatur. Interea mercurius extinctus cum terebinthina in mortario accuratè ducetur. Poſtea totum ſimul agitando, vt artis eſt cõmiſceatur. Tandem proijciantur pulueres & aqua vitæ, & rurfus agitatione multa fiat ex omnibus vnguentum.

Vt verò ritè præparetur hydrargyrus, debet primum per laneum pannum traici, vt tollatur illius plumbago, deinde ſaluæ hominis ieiuni ac ſani extingui. Sic enim domitus aptior eſt ad huius vnguenti confectionem, quam ſucco limonum aut hyoſciami extinctus, licet axungię & terebinthine mixtus multùm de ſua feritate amittat. Illius malefica vis adhuc optimè caſtigatur oleo Terebinthine, vt decet, parato. Hydrargyri
extinctio

Plurimum valet hoc vnguentum ad oris fluorem, vt vocant, ſeu humoris virulenti per os exſpuationem, eo poſt repurgatum corpus partes bis atque iterum liniantur.

Vnguenta porrò multa ſparſim in Antidotariis vulgaribus deſcripta negleximus, quòd eorum uſus vel non ſatis probetur, vel improbetur, vel quia vires habent his affines quæ in hoc libro deſcribuntur. Qui enim habebit, exempli loco, Strypticum Fernelij & Arcgon, nihil erit ei neceſſe vnguentum Comitiffæ & de Arthanita parare. Vires.

SECTIO SECVNDA.

De Ceratis.

Ceratum
quid.



T cerata media sunt inter vnguenta & emplastra, sic inter hæc & illa à nobis describuntur. Dicuntur Cerata quod ceram admittant; Vt etiam Ceronea, quæ nunc ab emplastris soliditate & compositione non differre videntur, ita ut Chirurgis emplastra & Ceronea idem sint: Et qui inter ipsos tantum ossa fracta aut luxata reponunt, omnia emplastra Ceronea nominant: at verò Cerata molliora cum sint angustiore acceptione designantur, pro medicamēto, nēpe externo, ex oleo, cera, & sirpium, animaliumque partibus, atque metallis & mineralibus aggregato, consistentiæ inter vnguentum & emplastrum mediæ: nam plus ceræ recipiunt, quā vnguenta, hinc duriora; minus quā emplastra, ideo duriora. Ea proportio ceræ in vnguentis seruatur, vt vnciis olei singulis ponantur ceræ dragmæ duæ aut paulò minus: In Ceratis huius dragmæ duæ cum dimidia aut paulò plus: In emplastris sæpe duplum, sæpius triplum, & aliquando quadruplum ceræ ad oleum pondus. Variat tamen ista proportio, pro diuersa rerum aliarum mixtione & tempore, nam vbi puluerum maior quantitas adhibetur, ibi plus olei: vbi minor, ibi minus: vt etiam æstate, (quod omnia pingua faciliè liquecant) minor quàm hyeme olei dosis ponitur, adeo ut sæpius penes artificem peritum sit oleum vel ceram augere vel minuere. Vt autem ceroneum pro emplastro, sic ceratum pro vnguento ferè vsurpatur. Eadē enim est simplicium commixtio, præparatio & spissitudo, & nonnunquam ceratum vnguento mollius efficitur.

*Ceratum refrigerans Galeni. CAP. I.**.Cere alba ℥ i.**℞ Olei rosati Omphacini ℥ iiii.*

Liquentur simul in vase duplici. Refrigeratis affundatur paulatim in mortario, aquæ frigidissimæ quantum absorbere poterunt, percutiendo & agitando: postremò addatur aceti ℥ β.

Fiat ceratum.

COMMENTARIUS.

Cap. 6. lib. 1. simplic. lib. 10. method. & lib. 6. sanit. tuend. Inter medicamenta composita & euporista, nullum est frequentius & simplicius hoc cerato, à Galeno multis in locis descripto & celebrato, quod à nonnullis modò vnguentum, modò Ceratum album, & aliquando ceratum refrigerans Galeni nuncupatur in Officinis.

Sic vero eius suscipitur præparatio: Cera in frustula diuisa oleo rosaceo omphacino in diplomate liquatur: dein ab igne remouetur, & in aliud vas transfunditur: atque vbi refrixerit, & modicè concreuerit: aqua frigidissima subinde affunditur & agitatione continua subigitur: Et rursus noua frigida affusio & agitatio iteratur, donec ipsam mixtura respuat: cui si parum aceti albi & renuis adiciatur, magis humectans & refrigerans vnguentum parabitur. Vbi magis refrigerare consilium est, etiam Galeni autoritate, succi lactucæ, solani, semperuiui, aut similium refrigerantium nonnunquam adduntur. Sed hoc rarò nisi vtendi tempore fieri solet, atque in pharmacopoliis tantum, quod simplicius est asseruatur.

Præparatio

Valet ad phlegmonas, Erysipelata, herpetas, carbunculos, phygethla, omnemque intemperiem calidam. Febrientibus quoque multum conducit, si hypochondriis superponatur.

Vires.

Ceratum Santalinum D. Mes. CAPVT II.

R. Rosarum ʒ xij.
 Santal. rubri ʒ x.
 Santali albi,
 Santali citrini, an. ʒ vi.
 boli Armenæ ʒ viij.
 cereæ albæ lotæ ʒ xxx.
 eboris ʒ vii.
 caphuræ ʒ ii.
 olei rosat. lib. i.
 fiat Ceratum vt artis est.

COMMENTARIUS.

Minus est irridendus pharmacopola, qui saccharo quàm qui hoc cerato caret, cuius perennis & fœlix vsus nobilitatem ostendit. A cera Ceratum dicitur, à santalis, Santalinum, & paratur sic:

Præparatio Santala primum omnia simul puluerantur: seorsim rosæ, bolus armenæ, ebur & caphura: deinde cera igni blando, vt cineribus calidis, aut balneo maris, cum oleo adhibetur, vt lique scat: vbi aliquantum refrixerint ambo, confuse liquata, aqua rosacea ter quaterque lauanda: postea dicti pulueres commiscendi, ita tamen vt caphura postremo loco ponatur, pauco oleo ac igne lento dissoluta. Tum omnia simul agitanda, subigendaque, vt coëant in idoneam consistentiam Cerati. Vt santala prærubra sint, inter puluerandum subinde aqua rosarum sunt aspergenda. Minime autem oleum cum cera abluendum, sed seorsim ne ceratum rancescat. Porro ebur crudum pro spodio posuimus, non vltum vt perperam, aromatariorum vulgus. Cur verò id egerim, pluribus in locis superius, vbi spodium occurrit, fusissimè demonstraui.

Vires:

Ceratum Santalinum phlegmonas & omnes intemperaturas calidas ventriculi, hepatis & partium aliarum exustiones efficacissimè compescit.

Ceratum Stomachicum Galeno ascriptum D. Mes.

CAP. III.

*℞. Rosarum,
mastiches an. ʒ x.
foliorum absynthii sicci ʒ vii. ℞.
spica nardi ʒ v.
cera ʒ ij.
olei rosati ʒ ix.
fiat ex arte Ceratum.*

COMMENTARIUS.

Ceratum hoc à Mesuë traditum efficacius cùm sit duobus aliis à Preparatio Galeno descriptis vsitatus est, & in Officinis pluribus assèruatur. Ad eius apparatus, cera & oleum liquātur: refrigerata sæpius aqua rosarum abluuntur: postea rursus liquata lauantur æquis partibus succi citoniorum & vini nigri & austeri, addito pauco aceto; quod tamen multi non sine ratione omittunt. Interea rosę & absynthium simul pulueranda: seorsim verò mastiche & spica Indica: tum omniū puluis confusè mixtus, cerelæo, seu ceræ oleo liquatæ & lotæ, permiscendus, & ita subigendus, vt in cerati crassitudinem abeat legitimam. Ista præparatio multum quidem vsualis est, malunt tamen nō. nulli seorsim oleum abluere quàm ceræ commixtum, ne diu seruatum rance scat ceratum. Hoc autem non similiter describitur à Galeno, licèt ei tribuatur à Mesuë, cui potius debetur illius inuentio, vel saltem amplior & melior descriptio. Dicitur Stomachicum à parte cui confert & adhibetur: Calorem enim stomachi & totius ventriculi fouet, coctionem iuuat, flatu absomit, crudos humores coquit, appetitum excitat, & vomitum compescit.

Solet autem & debet extendi super aluta & superiori regioni stomachi, & aliquando etiam toti ventriculo admoueri. Eum enim roborat, & ad munia perfectiùs obeunda vegetiorem reddit.

Ceratū Oesypatū, Galenotributū D. Mes. CAP. IV.

R̄. Oesypi ℥ x.
 Oleorum chamæmeli,
 ol. Irini an. lib. ℞.
 cera flaua ℥ iii.
 mastiches,
 terebinthinæ an. ℥ i.
 resina ℥ ℞.
 spica nardi ℥ ii.
 croci ℥ i. ℞.
 ammoniaci ℥ i.
 styracis calamitæ ℥ ℞.
 fiat Ceratū secundum artem.

COMMENTARIUS.

Tria describit cerata Mesuë, quorum hoc selegimus Galeno ascriptum, ut efficax & usu frequentiore celebratum; efficacius tamen redditum, Rondeletij consilio, ammoniaci & styracis calamitæ incremento: sic enim effectus feliciter præstat, quos alia Philagrij & Pauli cerata à Mes. conscripta pollicentur. Propterea qui hoc habebit, aliis dictis carere facile poterit. Dicitur autem Oesypatū à sua basi Oesypo, quæ sic extrahitur. Lanæ succidæ ex ouium collo, ventre & fœminibus euulsæ quantitas quædam idonea sumitur, aqua calida horas octo maceratur, & subinde baculo agitatur: deinde igni feruescere dimittitur, donec pinguedinem in aquam deposuerit. Extractis & fortiter expressis lanis aqua è vase in aliud vas magno impetu sæpius transfunditur, ut spumam multam eructet, quæ colligenda & in alio vase seorsim reponenda: tum aqua denuò agitatur ad spumam, quæ adhuc collecta cum præcedente ponenda. Idque toties iteratur sub æstiuo Sole, dū tota spumescens pinguitudo colligatur: Collecta, aqua pura sæpe lauatur, manibus agitando, quousque sordes mixtæ auferantur, & aqua pura effluat, atque pinguedo linguæ admota, nullum acrimoniæ sensum inferat: postea vase fictili denso excepta, in loco frigido seruanda. Vim habet emolliendi, resoluendi, calefaciendi, & dolores sedandi.

Oesypiedu-
 ctio & ap-
 paratus.

Vix autem concrefcit lentor ifte ſubunctuoſus, niſi aquea portio admixta aduentitio calore exhalarit.

Citius adhuc, faciliusque ſic paratur, Lana ſuccida in aqua maccratur & coquitur: dein fortiter exprimitur, donec tota ſordes excrementitia ac ſubpinguis in aqua remaneat: idque bis iteratur, ſi videatur opus. Tum aqua vel in ſole, vel igne, vel D. M. aut æſtuario euaporatur. Quod in fundo vaſis relinquitur, Oeſypus eſt.

Sic autem paratur Ceratum deſcriptum, primò ſeorſim puluerantur crocus, maſtiche, ſpica & ſtyrax: dein omnium pollen commiſcetur: ammoniacum in aceto maceratur, liquatur, & coquitur ad mellis conſiſtentiam: poſtea cera in oleis liquabitur. His igni ſubſtractis, miſcebitur Oeſypus; tum ammoniacum ſolutum, & terebinthina ſimul: tandem pulueres ſemper agitando, vt abeant cuncta in cerati ſpiſſitudinem legitimam.

Præparatio

Vim habet emolliendi, reſoluendi, ac digerendi, & dolores ſedandi: proinde duris tumoribus hepatis, lienis, vteri, neruorum, articulorum & aliarum partium conducit.

Alia quædam externa medicamenta, ceratorum nomine deſcripta ab authoribus traduntur, quæ quod duriore conſiſtentia frequentius parentur, de his ſub Emplaſtris libro ſequenti loquemur. Alia autem molliora, qualia à Meſue deſcribuntur, aut nunquam, aut rariffime parantur.

Vires.



OFFICINÆ
PHARMACEVTICÆ
SEV ANTIDOTARIII
DE MEDICAMENTIS EXTERNIS,
LIBER SEXTVS.

De Emplastris.

P R Æ F A T I O.



MATERIES vnguentorum & Empla-
strorum eadem est, vt & virtus, sed consi-
stentia diuersa, in illis quippe molliuscula, in
his valde crassa, ac solida: Ob id non in
vasculis vnguentorum more reconduntur,
sed in magdalias, seu bacillos digiti crassi-
tudine & lōgitudine formantur; qui char-
ta inuoluti in Officinis seruantur. Vt eam spissitudinem acquirant,
plus ceræ quam vnguenta, & minùs olei ad sui confecturam admit-
tunt, vt sæpe duplum ceræ ad olei pondus: interdum triplum, atque
etiam aliquando quadruplum. Augetur tamen vel minuitur cera
pro resinarum & succorum concretorum copia, vt etiam Oleū, prout
medula, adipēs & axungia maiore aut minore dosi veniunt in con-
fectionem. Ex stirpium autem & animalium partibus, mineralibus
& metallis emplastra conficiuntur, quorum nonnulla velut corpus

& consistentiam tantum præbent: virtutem verò nullam aut exiguam, cera nempe, oleum commune, lithargyrus & interdum resina: alia simul cum materie virtutem & efficaciam, ut mineralia, plantæ, & reliqua omnia quæ accedunt ad compositionem. Non omnia tamen emplastra ceram aut resinas admittunt, quæ scilicet aliunde materiam illis proportionatam, ut ladanum, thus copiosum aut quid simile excipiunt. Fiunt & quædam absque cera & ignis adiutu, quorum nempe materialia melle aut mucaginibus, vel viscido quodam cremore subacta in emplastri spissitudinem concrescunt, ut emplastrum de Crustapanis, & de baccis lauri, aliaque multa quæ inter emplastra & Cataplasmata ambigunt. Porro, in emplastris conficiendis is ordo seruandus, ut primum cera oleo liquetur, dein liquores, succi & mucagines permiscantur, & lentè coquantur ad aqueæ humiditatis exhalationem: tum resina & adipēs induntur, ut & gummi genera, ex quibus nonnulla commiscantur syncera, alia, non nisi vino, aceto, aut alio liquore diluta, colata & cocta. Si terebinthina desideretur, ea addatur emplastro iam percocto & igni subtracto. Tandem pulueres creti insperguntur, seduloque versantur, agitantur & subiguntur, ut in massam concrecant, nec mollem nec duram, sed mediam & lentam quæ tamen digitos contrectantium non inquinet. Si succi liquidi, vinum, acetum, aqua medicamentosa, vel decocta quædam emplastri confectionem ingrediantur, ea coquenda ad serosæ humiditatis dissipationem. Succī inspissati & recentes aliquo solvantur liquore, qui etiam coctione absumitur. Dū sicciiores sunt & friabiles, solūm puluerantur & miscentur. Et ut magni refert, quæ prius & quæ posterius in dispensandis emplastris ponuntur, sic quæ minus aut diutius coquantur: nam lithargyri levis coctio emplastrum album facit, longior nigrum: Ærugo modò melinum, modò viride, modò fuscum reddit: pro vario ignis calore: Sæpèque coloris mutatio qualitatis arguit mutationem, nam lithargyrium diutius coctum, emplastrum efficit simul & nigrius & exsiccantius. Et licet consistentia & facultas in emplastris potissimum expectantur, attamen color & odor multum commendantur. Cum autem de præceptis generalibus in emplastrorum compositione seruandis abundè in nostris Institutionibus egerimus, superest nunc ut de particulari singulorum præparatione & confectione agamus.

Diachylon album D. Mes. CAPVT I.

℞. Olei veteris lib. ii.
 lithargyri puri tenuissimè triti lib. i. ℞.
 mucaginum radic. altheæ,
 sem. lini, &
 fœnugraci an. ℥iiij.
 fiat emplastrum, consistentia legitimum.

COMMENTARIVS.

Preparatio.

Multiplex est huius emplastri denominatio: A succis enim mucagineis quibus magna sui parte constat, & virtutem assumit, Diachylon vocatur: à colore, album: à communi eius vsu, commune, à quinque simplicibus ipsius confecturam ingredientibus, Pentapharmacum, & sæpe Diachylon simplex ad differentiam minus compositi. Eius inuentorem tota myropolarum familia Mesuem agnoscit, ante eum tamen Serapio & Auicennas illius descriptionem dederunt. Omnes autem iuxta formulam superiorem exhibent, in qua oleum & lithargyrus potius materiam & corpus, mucagines efficaciam suppeditant, ex quibus diuersa proportionem mistis, & præparatione unitis Paulus emplastrum suum de succo conficit: Melius tamen sic, iuxta descriptionem traditam paratur. Lithargyrus à scoria, plumbo, & fordibus repurgatus tenuissimè læuigatur: mortario metallico diutissime, vt duodecim horas, cum oleo agitur, subigiturque: post igni lento coquitur, semper versando, donec lithargyrus crassescat, & consistentiam mellis nanciscatur, atque fundo pilæ non adhærescat. Tum igni eximatur, vt paulatim frigescat: postea seorsim mucilagines in aqua extractæ parum feruefiant, ad aquosioris partis exhalationem: dein earum pars circiter tertia primùm lithargyro miscetur & accuratè misceatur, atque rursus igni redditur, vt crassescat: tandem residuum addatur, agitur & blando igne ita feruefiat, vt ex omnibus sic unitis & concorporatis fiat emplastrum consistentiæ legitimæ: In cuius libris singulis si pulueris Ireos vncia vna commisceatur, Diachylon Ireatum habebitur. Signum emplastri perfectè cocti habetur, cum ipsius portio marmoris adhibita non adhæret, aut digitos, dum contrectatur, non inquinat: illius enim compages

Cap. 17
lib. 7.

æquax esse debet, lenta & viscida, vt ex ea formentur magdalie al-
ba papyro inuoluendæ, & in pharmacopolio seruandæ.

Vt albius hoc Emplastrum habeant quidam industriosi artifices,
nucagines simul cum lithargyro & oleo miscent, & diligenter igne
uculento ita coquunt, vt fiant voti compotes.

Emplastrum Diachylon, malacticum optimum est: hepatis enim, Vires.
lien, ventriculi & aliarum partium duros tumores emollit, & hu-
mores coquit. Quod Iridim admisit magis attrahit, incidit & re-
soluit.

Diachylon magnum D. Mes. CAP. II.

*℞. Lithargyri auri tenuissimè puluerati lib. i.
oleorum Irini,
ol. anethini,
chamæmelini an. ℥ viii.
mucaginis radic. altheæ,
carycarum,
ichtyocollæ,
sem. lini, &
fœnugraci,
succorum Ircos, &
Scillæ,
æsypi an. ℥ xij. ℞.
terebinthinæ ℥ iii,
resinæ pini,
ceræ flauæ an ℥ ii.
fiat emplastrum, vt artis est.*

Diachylon magnum cum gummis.

*℞. Bdellii,
Sagapeni,
ammoniaci an. ℥ ii.
Vino dissoluantur, colentur & coquantur ad
mellis crassitudinem, addantur massæ Diachy-
li magni, fiat emplastrum.*

COMMENTARIUS.

Vt Diachylon simplex & Ireatum, sic magnum & gummatum coniunguntur, atque omnia eadem serie describuntur, quod inter se viribus & nomine plurimum conueniant. In magni descriptione & apparatu Paul. Æg. multum à Mesuë dissentit, Oribasius à Paulo: ab utroque vulgaris vsus, Mesuei doctrinæ accommodatus, quem hoc in emplastro sequimur, neglectis tamen vuis passis, in quarum locum ex Guidone radicem altheæ substituimus. Sic autem paratur.

Lithargyrus purgatus & subtilissimè tritus, in mortario cupreo diutissimè cum oleo agitandus & nutriendus: deinde igni lento coquendus, assidue mouendo & versando, donec crassescat: tum mucilagines adduntur atque lente coquuntur, ad feri euaporationem. Postea *alkanach*, seu *ichtyocolla* ponitur succis Ireos & scillæ diluta, coquiturque ad succorum absorptionem. *Alkanach* loco, *alkamb*, seu viscum illud, quo capiuntur aues poni potest, quod huic emplastro non minùs, imò magis conuenit. His omnibus adhuc igni stratis cera liquanda, vt etiam resina: igni subtractis, terebinthina diluenda, necnon Oesypus, assidue mouendo, vt tota mixtura in emplatri coeat massam idoneam. Nonnulli industriosa sedulitate, paruum quamdam mucaginum portionem in principio vnà cum oleis & lithargyro commiscunt, coquunt & agitant, & postea reliquâ earumdem partem; sic enim lithargyrum impediunt, ne ad vasis fundum decidat, & albius emplastrum efficiunt. Cum autem lithargyri coctio non sit omnibus æquè facilis, & pro coquendi modo, vel longiore aut breuiore coctura nigrius, aut candidius emplastrum efficias, illius pondus à nonnullis augetur in his emplastris, quæ citius crassescere, & colorem habere gratiorem cupimus. Quid sit autem

Scillæ succi
extrahendi
modus.

Icthyocolla lib. tertio de Mater. Medic. dictum est, cap. 17.

Modus vero succi scillæ extrahendi non omnibus notissimus: Alij namque eam tundunt, & statim prælo committunt, alij post tusionem & aliquot dies ante expressionem in cella vinaria relinquunt, alij aliquot horas super cineres calidos ponunt. Huius tamen succi lenior efficit, vt ipsius parua admodum quantitas hac arte educatur; copiosissima verò si scilla integra pasta inuoluatur, in clybano parum coquatur, dein ablata pasta scilla torculari fortiter exprimatur: sic enim vberior quam aliâ operâ succi quantitas educetur.

Eadem præstat hoc emplastrum, quæ superius sed efficacius: magis enim duritiem quamlibet mollit, coquit, et digerit. Gummatum potenter attrahit, emollit & resoluit.

*Rx. Mucaginum sem. altheæ,
lini,
fœnugræci,
corticis mediani ũlmi an. ℥ iiii.
ol. chamæmeli,
liliorum,
anethi, an. ℥ i.
ammoniacy
galbani,
opoponacis,
sagapeni an. ℥ ß.
ceræ nouæ ℥ xx.
terebinthinæ ℥ ii.
croci ℥ ii.
fiat emplastrum arte iam præscripta.*

COMMENTARIUS.

Licet de emplastri huius auctore non satis constet, fere tamen ab omnibus pharmacopolis paratur iuxta descriptionem hanc, quam ex Fernelio eius transcriptore exhibemus: ad cuius apparatus primo mucagines in aqua extrahuntur: extractæ cum oleis lento igne coquuntur ad aqueæ humiditatis resolutionem. His cera frustulatim secta liquatur, & spatha agitur. Postea gummi dicta, aceto diluta, colata & cocta ad aceti dissipationem adduntur, & rudicula agitantur. Omnibus ab igne semotis terebinthina commiscetur; Tandem crocus: atque sic accurate versando massa idonea conficitur, ex qua formantur magdaleones pondere vnciæ dimidiæ, & aliquando integræ.

Præparatio

Vires.

Emplastrum de mucilaginibus partim emollit, partim coquit, ac maturat: Ob id tumoribus præter naturam duris, utroque dicto modo sanandis, confert. Enumeratur enim inter emollientia & suppurantia, eiusque frequens est usus.

Hic autem tyronem monitum velim, difficilem admodum esse gummorum cum reliquis in Emplastrorum confectione permixtionem: Nisi enim artificiosissimè tractentur, vel in grumos abeunt, vel vruntur potius, quàm ritè misceantur. Ob id varij varios parandi modos inuestigant: Nonnulli verò sic optimè. Gummi pri-

Annotatio.

Alius parandi modus.

mum fictili vase excepta, in aceto, vel alio succo macerant, per setaceum traiciunt, deinde coquunt ad Emplastri, vel vnguenti parandi conditionem. Interea cum oleo ceram liquant, & mucagines, si quæ sint, addunt: atque elixant ad humiditatis aquosæ diffusionem: huius vero mixturæ portionem gummi transcolatis sensim agitando commiscent, adiecta terebinthina, si medicamentum parandum postularit. Postea gummi sic ducta ad reliquum Emplastri corpus adijciunt, diligenter ducunt, ac mouent, & pulueres, si qui sint, admouent, & agitatione multa permiscent: atque sic medicamentum habent consistentia legitimum.

Emplastrum de Meliloto D. Mes. CAP. IV.

R. Meliloti ℥ vi.
 florum chamameli,
 comarum absynthii,
 sampsuchi,
 fœnugræci,
 baccarum lauri,
 radic. althææ an. ℥ iii.
 sem. apii,
 ameos,
 cardameni,
 ireos,
 cyperi,
 spicæ,
 cassiæ lignæ an. ℥ i ℞.
 ammoniaci ℥ x.
 styracis calamitæ,
 bdellii an. ℥ v.
 terebinthinæ ℥ i ℞.
 ficus pingues n. xii.
 sepi caprini,
 resinæ an. ℥ ii ℞.
 ceræ ℥ vi.
 olei sampsuchini,
 ol. de spica an. ℥ vi. vel singulorum ℥ i.
 Aquæ decoctionis meliloti, Chamameli & Fœnugræci
 quant. suff. fiat. emplastrum.

COMMENTARIUS.

Multis constat hoc emplastrum, quæ seorsim & artificiosè debent preparari antequàm accedant ad illius confecturam: ac primo quidem loco radices terendæ; secundò semina; tertio herbæ & flores: tum cinnamomum & styrax, sed seorsim vtrumque: deinde miscentur omnia. Inter ea macerantur bdellium & ammoniacum in aceto, potius quam in decocto meliloti, chamæmeli & fœnugræci, ut nonnulli volunt, in quo non nisi ægrè dissoluuntur. In eo tamen mucagines radicis altheæ & fœnugræci optimè possunt, & debent extrahi, quibus colatis adijciuntur ficus tulsæ, eodem decocto macerata, & per cribrum traictæ. Ex his autem sic apparatus conficitur emplastrum hoc modo. Cera, resina & sebum hircinum simul liquanda: his igni substractis addenda gummi macerata, colata, & ad mellis crassitiem cocta: Tum tercbinthina, dein pulveres simul uniti. Quibus omnibus probè subactis adduntur olei sampsuchini & de spica an. ʒvj. vel ʒj. ad summum. Qui enim illorum ʒvj. ex Bauderonio addiderit, vnguentum, quam emplastrum potius effecerit. Si ficus sicciore sint, poterunt teri & cum reliquis puluerari, ut etiam bdellium: præstat tamen ea macerari & percolari. Pro Cordumeni carui semen ponendum est, non cardamomum, ut multi faciunt, vocum affinitate decepti. Cætera facilia sunt.

Iniuste verò conqueritur Bauderonius fil. quoddam patris lapsum in sua paraphrasi super isto emplastro notarim: Quam ut à censura liberet, non, inquit, olei pondus pater definiuit, sed pharmacopœi iudicio omnia committens, quantum sufficit, ponendum dixit. At verò textum Mesuei, quem Bauderonius transcripsit, ut ille ipse reliqui, sed paraphrasim tantum ab illo recognitam. secunda editione typis commissam Lugduni, in ædibus Benedicti Rigaldi, ann. Dom. 1596. Tum & apud Stephanum Scruium, eodem anno pag. 725. linea 6. paucis ac humanis verbis animaduertendam monui, in qua olei nardini & sampsuchini ʒvj. imperantur. Tertia quoque editione ann. 1603. apud Petrum Rigaldum eadem olei quantitas à Bauderonio præscribitur, eius tamen filius absque iudicio & veritatis indagatione maternis oculis leuissimè scripsit me leuiter, licet verissima, esse loquutum. Litera cum scripta maneat, legat accuratiùs illustrator auctoris labores, quos magis obscurat, dum sampsuchum esse maioraui inuit. Nolo calamum acerbius in iuniorum conuertere, falsa licet ac ridicula subscribat, Renodæum nempe suum opus ditasse, quibusdam ex patre desumptis. Sic inepthè Salmonæus quidam tonitru mentiebatur, ut deitatis opinionem sibi vendicaret.

Emplastrum è meliloto inueteratas durities iecoris, lienis, ven-

Vires.

tricoli & reliquarum partium emollit, coquit & resoluit, hypochondriorum tensionem laxat, & flatus discutit.

Emplastrum
Tripharmacum.

In emollientium & resoluentium classe describitur à Iouberto Emplastrum, tripharmacum, cuius ut simplex est compositio, sic qualitas imbecillior, propterea rarus admodum usus. Illius materia est eadem prorsus atque vnguenti crudi siue de lithargyro: Constat enim oleo, lithargyro & aceto coctis ad emplastri consistentiam.

Emplastrum Oxycroceum D. Myr. CAPUT V.

℞. Croci,
picis naualis,
colophonie,
cære an. ℥. iij.
terebinthinae,
galbani,
ammoniacy,
myrrhæ,
thuris,
mastiches an. ℥j ℥iij.
fiat emplastrum, ut artis est.

COMMENTARIUS.

Preparatio.

Ad durities quoque emolliendas, digerendasque emplastrum hoc fuit institutum, inuentumque à Myrepso, qui nomen illi dedit ab aceto, in quo gummi macerantur & dissoluuntur, & à croco, cuius colore tota mixtura inficitur. Ad hunc autem modum componitur: Ammoniacum & galbanum parùm contusa macerantur noctem integram in aceto, ut diluantur; deinde coquuntur ad aceti depurationem. Inter ea, cera in vase idoneo liquanda; liquatæ addenda zopissa, seu pix naualis; tum colophonia. His admiscuntur gummi dicto apparatu liquata: quibus ab igne semotis terebinthina commiscenda; deinde myrrha, thus, crocus & mastiche seorsim trita & vnita, semper agitando, ut fiat massa idonea, quæ in marmor oleo mastichino inunctum & puluere croci conspersum iniicitur, & formantur magdaliæ solitæ magnitudinis. Nonnulli croci

quantitatē minuunt, nullo aut exiguo virium dispendio, quibus assentior.

Rectē quoque sic à quibusdam parari solet; in mortario cum pistillo parum calidis liquantur, cera, pix, & colophonia, adduntur gummi macerata, colata & ad emplastri crassitudinem, vt alibi dictum est, cocta ac cum terebinthina post coctionem vnita; tum portio croci, dein myrrha, thus & mastiche, tandem totum vt in alia præparatione, tractandum, ducendum, peragendum.

Emplastrum hoc virtutem habet emolliendi, digerendi, articulorum & neruofarum partium dolores sedandi, & ossa fracta iu-
uandi.

Vires.

Ceroneum parare non tenebitur, qui oxycroceum habebit, propter multam virtutis, quæ inter vtrumque est, affinitatem.

Ceroneum

Emplastrum de Ianua. D. Anselmi à porta. CAP. VI.

*R̄. Terebinthinae claræ ℥iij.
cerae flauæ ℥ij.
resinae siccae ℥j.*

Liquefiant simul & colentur super acetum, dimittanturque per diem & malaxentur cum eodem aceto: Deinde rursus liquentur, & super proiiciantur succorum.

berthonica ℥iij.

verbenæ ℥ij.

lactis muliebris ℥j.

Malaxentur denuò cum istis succis & lacte muliebri, & fiat emplastrum.

COMMENTARIUS.

Hæc est vera emplastri de Ianua descriptio, iniuste Nicolao cuius tributa. Cùm inter alios quatuor medici Nicolai nomine donati quædam dispensaria descripserint, omnium illorum postremus Nicol. nempe Præpositus medicus Turonensis aliorum laborem, honoremque surripuit, vt qui Antidotarium Iacobi de partibus ex

Nicolao Myrepso & alijs antidotariographis collectum & transcriptum denuò transcripserit, & suo nomini dicarit, saltem priorum authorum cognomina, à quibus opera denominari solent, de industria subticens medicamenta ab eo solùm transcripta: Nicolai tantùm esse scribit, omissis Nicolaorum, vt ita loquar, aliorum cognominibus, Myrepsi nempe, seu Alexandrini, Florentini & Salernitani, à quibus habuit Iacobi de partibus labore, quæ sua credi cupit. Et re vera pharmacopœorum vulgus tenet, Nic. Papositum esse genuinum authorem omnium medicamentorum, quæ in trito ac vulgari quodam dispensario continentur, barbaro textura compilato, in cuius fronte cognomen nomini iunxit, in singulorum verò medicamentorum apice solum nomen proprium reliquit.

Malè autem emplastrum de Bethonica minus emplastrum de Ianua vocauit, cuius se falsò aut alium Nicolaum authorem dicit, cùm re vera Anselmus de Ianua, aut vt alij volunt, à porta illius author dicatur.

Preparatio.

Vires.

Præparatio ex descriptione satis vt quæ ex facili liquatione & debita malaxatione ac manuum contrectatione tantùm pendeat. Efficacia insigni capitis vulneribus confert, nam ipsius ossa eleuat, inquit Guido Caul. saniem educit, incarnat & sanat, huiusque doctem expertus est magister quidam Petrus in cane sauciato ad cerebrum vsque & perfectè sanato.

Guid.

Caul.

cap. 1.

doct. 2.

tr. 7.

Emplastrum de Bethonica minus D. Henrici Hermond.

CAP. VII.

*Rx. Succorum Bethonica,
plantaginis,
apij, an. lib. i.
ceræ flauæ,
resinæ,
terebinthinæ,
picis, an. lib. ß.
ex arte fiat emplastrum.*

COMMENTARIUS.

Emplastra duo sunt de Bethonica dicta, vnum descriptionis minoris, quod malè de Ianua dicitur: alterum maioris quod ex Andernaco desumitur, & ad plures capitis læsiones valere perhibetur. Falluntur autem myropolæ qui illius authorem Nic. Prapositum esse putant, describitur enim à Guidone Caul. à quo vocatur emplastrum Henrici Hermondaueillæ, nempe quem passim vt authorem fide dignum citat.

Doct.

2.

Tract.

3.

Vt optimè paretur, in succis bethonicæ, plantaginis & apii colatis nec depuratis liquanda cera, pix & resina, & cum terebinthinæ portione coquenda semper mouendo ad succorum resolutionem, deinde reliqua terebinthina addenda, & adhuc parūper feruefacienda, vt cuncta vniantur in idoneam emplastri consistentiam, ex qua formentur magdalæ digiti crassitudine & longitudine, in pharmacopolio ad vsus futuros asseruandæ.

Preparatio.

Qui colorem magis herbaceum ac viridem petierint, quem sanè petunt multi, portionem simplicium crassè tritorum in eorundem succis coquant, & in colatura ceram, picem & resinam liquent, atque cætera, vt dictum est, perficiant.

Emplastrum de Betonica minus capitale Chirurgis dictum, vim habet maturandi, digerendi, saniem expurgandi, & putredinem ar- cendi. Peculiari autem dote caput roborat, eiusque vulneribus & vlceribus sanandis prodest.

Vires.

Emplastrum de betonica maius D. Andern. CAPVT VIII.

R̄. Betonica viridis,
 pimpinella,
 agrimon.
 saluia,
 pulegii,
 millefolii,
 consolida maioris,
 callitricbia an. \mathfrak{z} vi.
 thuris,
 mastiches an. \mathfrak{z} iii.
 ireos,
 aristolochia rotunda an. \mathfrak{z} vi.
 cera alba,
 terebinth. an. \mathfrak{z} viii.
 resina gummi olea Æthiopica \mathfrak{z} ii.
 resina pini \mathfrak{z} vi.
 ol. abietini,
 vini alb. an. quod sufficit.
 fiat emplastrum secundum artem.

COMMENTARIVS.

Cum morbi capitis quamplurimi sint, qui præter Chirurgorum manus topica medicamenta desiderant, eorum tamen paucis quibusdam tantum cum emplastrum de Ianua auxilietur, rectè ab Andernaco maius hoc & efficacius emplastrum de Betonica descriptum est, ut quod pluribus præter naturam affectionibus capitis optimè, & salubriter medeatur. Paratur verò sic. Herbae in mortario probè contusæ hebdomadam integram in vino albo macerantur, agitantur & coquantur. Vino expresso colatoque, & lento igne cocto ad tertie partis consumptionem oleum abietinum adiicitur; dein cera liquata; mox resina & gummi; postea terebinthina. His paulatim

Preparatio.

refrigeratis reliqua trita, & creta adduntur, & manibus assidue subiguntur, dum totus humor exhalet. Postremo lac caprinum, aut aliud vt vaccinum additur ad magdaleones formandos. Triplum autem ceræ ad oleum accedere debet, vt lib. 3. Institut. docuimus. Aliud quoddam describit Vigonius, multum affine quod ceratum capitale nobilissimæ operationis vocat, sed quo poterit carere, qui supra descriptum habebit. Nolo enim medicamentorum similium farragine has lucubrationes onerare.

Vires.

Commendatur plurimum ad fracturas vniendas, ossaque carne contegenda, squamas ossium detrahendas, & ad ea quæ in alto latent foras euocanda efficax existit; Carnes amissas durasque restituit, valde abstergit, digerit & siccatur.

Emplastrum de Baccis lauri. D. Mes. CAP. IX.

*℞. Baccarum lauri ℥ii.
thuris,
mastiches,
myrrhæ an. ℥i.
cyperi,
costi an. ℥ss.
mellis despumati quod sufficit; fiat ex arte emplastrum.*

COMMENTARIUS.

Huic emplastro conficiendo præter aliorum conditionem, neque ceram, neque oleum, aut axungiam addidit Mesue, sed solum mel ad excipienda reliqua, cuius dosim non definit, sed artificis relinquit arbitrio. Illius verò ℥i ss. aut ℥ij. tantum pulueribus comprehendendis satis esse creduntur, ad idoneum corpus emplastro impertiendum, quod efficacissimum & mirabile ad hydropem Mesue scribit, si cyperi quantitas triplicetur, & addatur stercus capre, aut vaccæ siccam ad pondus omnium; sed præstat simplicius habere, aut cyperum tantum triplicare, & vsus tempore alterutrius animalis dicti stercus permiscere.

Ad præparationem omnia præter mel separatim puluerantur, & Præparatio.

melli despumato, nec cocto, sed adhuc calenti, cyperus & costus adiiciuntur: Refrigerato thus, mastiche & myrrha permiscetur, & magdaleones formantur, qui quod citius indurescant, nonnulli malunt totam massam in vase fictili recondere, & seruare, sic enim reposita non facile exsiccatur, & diutissime custoditur, nulla, aut exigua virium iactura.

Si per tempus nimis indurescat, parum mellis adiiciendum, & denuo terendum, optimum censerem ad consistentiam magis idoneam, maioremque virtutem, olei laurini parum admiscere.

Vires.

Dolorem ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vteri & vesicæ à flatibus, vel à causa frigida ortum sedat, & materiam tenuiorem, & flatulentam discutiendo hydropi sicco confert.

Empl. st. Tonforis. D. Aëtii. C A P. X.

*℞. Picis siccae lib. ii.
cera lib. i.
resinæ pini lib. ℞.
farinæ scenugræci,
pollinis radicis chamæleontis nigri an. ℥ iiii.
cumini tenuissime triti ℥ ii.
fiat emplastrum.*

COMMENTARIUS.

Medici quotidie multa in rem præsentem medicamenta præscribunt his præstantiora, quæ in vulgaribus dispensariis continentur; Illorumque felices effectus ut pharmacopœi obseruarunt, descriptiones quoque seruant, & postea singulis audacter exhibent. Sic mulierculæ quasdam receptas, ut nominant, magni faciunt sæpissime, & in gynæceis custodiunt, à quibus leuamen aliquod senserunt: Sic Tonfor quidam ex Bithynia à Medicis sibi coætaneis emplastrum habuit, quo solo cum sæpè & feliciter vteretur, emplastrum tonforis vocatum est: Sic adhuc textor quidam Parisinus à vigintiannis, vnguentum quoddam nigricans basiliconi vulgari simile habuit, ad omnesque plagas exhibuit: Eo mortuo, filius eius similiter parat & dat, vixque semestre quispiam Lutetiæ degit, qui

qui non viderit, aut expertus fuerit vnguentum Textoris.

Licet autem Medici sæpiùs improbent quæ ab ignaris probantur, attamen Aëtius plurimi ducit hoc emplastrum Tonforis ad splenicos, & hydropicos, & ischiadicos: Multos enim, inquit, à coxendicum dolore liberauit: Nam humores serofos, & flatus attrahit, digerit & resoluit. Hęc autem faciliùs præstat, si cum oleo irino, aut axungia quadam conficiatur. Vix enim sine pinguibus confici potest; proinde olei dicti libram dimidiam adiiciendam cenfeo.

Vires:

Si radix Chameleontis desit, pondus æquum radicis Bryonię vulgaris, quam vitem albam nominant, poterit assumi, præsertim cum hydropicis, & splenicis mederi consilium erit. Ischiadicis verò proderit magis, vt & alijs doloribus arthriticis, si substituatur radix alterius Brionię syluestris, quæ Officinis, Sigillum Beat. Mariæ vocatur, Dioscoridi Cissophyllos, & Ciclaminos altera, Mauritaniis *Bothormarien*, id est, tuber terre, quibusdam rapum terre, aliis *Tamus*, Plinio Cissanthemos, Democrito Malacocissos.

Brioniæ syl-
uestris no-
mina varia.

Est enim velut quędam mollis hedera, in arundinetis ac iuxta aquas nascens quarum est adeò amans, vt earum scaturigines perpetuò quæritet, atque ibi aquam subesse, vbi reperitur, botanici experientia multa fulti contendunt.

Ab Arnaldo Villanouano Sigillum cæleste vocatur, plurimumque valere arthriticis doloribus sanandis sic scribit; Cæleste Sigillum, dolores pedum sanat in æternum.

Empl. phænicinum. i. Palmeum, seu Diachalciteos. D. Gal. CAP. XI.

*℞. Olei veteris,
lithargyri auri an. lib. iii.
axungię suillę, veteris & insulsę lib. ii.
vitrioli alb. ℥ iii.*

Coque igni lento, assiduè mouendo spatula palmea, & fac emplastrum.

COMMENTARIUS.

Vsu magis quàm ratione hoc emplastrum à tota Myropolarum & Chirurgorum turba vocatur Palmeum, & vulgò Diapalma, vt quod palmea tantum spata, inter coquendum agitetur, versetur,

Diachalci-
teos.

Preparatio.

subigatur. Nonnulli à sua basi nomen mutuati, rectius emplastrum Diachalchiteos nuncuparunt: sed qui discrimen inter Vitriolum & Chalcitum constituunt, ex hac emplastrum Diachalchiteos, ex illo Palmeum fieri dicunt; In reliquis vtrumque simile est, vnde alterum alterius nomine sine discrimine donatur. Multi tamen ambo non similiter parant, nam ad confectionem Diachalchiteos, sumunt Chalcitum vltam, eiusque tantum ℥iij sumunt, & inter coquendum tenellos ramulos palmæ minutim incisos, consilio Galeni, iniiciunt; Palmeum verò iuxta formulam præscriptam conficiunt, spatula palma affiduè mouendo. Ac primum quidem lithargyrum tenuissimè laeuigatum, lento igne, cum oleo & axungia diutissimè coquunt ac nutriunt semper agitando rudicula, seu ramo palmæ, vt dictum est, vel alius arboris altringentis, vt quercus, vel mespilli, qui recentior sit incisus: Atque vt spatulæ vis medicamentosa melius emplastro communicetur, eius extremitatem subinde præscindunt, & superficiem abradunt, ad humiditatem vsque natiuam. Mixturæ sic coctione & agitatione incrassatæ, & igni subtractæ Vitriolum Romanum, seu album, chalcitidis veræ penuria, pulueratum iniiciunt & subigunt: sicque massam habent consistentia laudabilem, ex qua magdaleones formant. Multi ratione optima vitriolum simul cum reliquis emplastri compositionem ingredientibus coquunt, vt partem acrimoniam deponat. Nonnulli parum aquæ oleo & lithargyro inter coquendum miscent vt citius coeant in corpus vnum. Nigricant enim quæ diutius coquuntur. Oleum vetus seligitur, vt ex axungia ad desiccationem maiorem.

cap. 6.
lib 1.
comp.
gen.

Vires.

Valet ad cruenta vulnera, tumores pestilentes, & exituras. Ad vlcera quoque, & contusas, diuulsasque partes & ecchymomata. Est emplastrum chirurgorum ad omnes plagas, vt vulgò dici solet.

Emplastr. de Gratia Dei. CAP. XII.

℞. Resinæ lib. i.
terebinthinæ lib. ℞.
ceræ albæ ℥ iiii.
mastich. ℥ j.
verbena,
bethonica,
pimpinellæ an. m. i.

Tulis & coctis ex vino albo plantis, & reliquis simplicibus in illarum decocto colato, & ad ipsius absorptionem coctis, fiat emplastrum.

cap. 55.
cet 2.
serm.
4.
cap. 17.
lib. 7.

Ex his est hoc emplastrum, quæ ad ostentationem specioso nomine designantur, cuiusmodi est Isotheos Antidotus, apud Aëtium, Emplastrum Isis apud Paulum, & aliud emplastrum *Homo* appellatum, ex sandice & oleo paratum, cuius meminit Aët. Audita enim eiusmodi nomenclatione, non modo rustici, sed qui inter urbanos sese putant sapientiores, ad emendum medicamentum alliciuntur. Vocemus ergo cum tota aromatariorum familia hoc emplastrum, De gratia Dei, & sic conficiendum imperemus.

Emplastrum
homoditum.

Herbæ recens collectæ, ac virides minutim incidantur, in pila lapidea cōminuantur, in vini albi generosi sufficienti quantitate per diem macerentur, dein coquantur ad mediæ partis vini absorptionem: Expressis herbis, abiectisque, in colato liquore cera minutim fracta, vel secta liquanda, coquendaque assidue spatha mouendo, ad liquoris exhalationem: Tum resina trita permiscenda & liquanda: His ab igne semotis terebinthina vnienda: Refrigeratis mastiche concorporanda in legitimam consistentiam emplastri. Sic namque melius conficitur, quàm methodo à Præposito proposita. Huius Emplastri massa recens antequam in magdaleones formetur lacte subigi solet vt albior reddatur & terebinthinâ minus redoleat.

Preparatio.

Laudatur ad vulnera, vlceraque repurganda & coalescenda, & ad partes quibus adhibetur roborandas. Efficacius tamen hæc cuncta præstaret, si ex vino rubro pararetur.

Vires.

Emplastrum Diuinum. CAP. XIII.

R. Lapidis Heraclii, id est, magnetis ℥iij.
ammoniaci ℥iij. & ℥iii.

bdellii ℥ii.

galbani,

myrrhæ an. ℥i. ℥ii.

olibani ℥i. ℥i.

opoponacis,

mastiches,

aristolochiæ longæ,

viridis æris an ℥i.

Lithargyri auri,

olei communis an. lib. i.

terebinthinæ ℥iij.

cere nouæ ℥ viii.

misce omnia, vt decet, & fac emplastrum.

COMMENTARIVS.

Dum speciosa hæc medicamentorum nomina vel lego, vel audio, in mentem simul, & risum veniunt bellissima chymicorum remedia, qui cùm viderint suum Elixir vitæ iam nunc nimis tritum, potiones quasdam modò liquores cælestes, modò potiones angelicas nominant. Sed tolerabile nomen est, cui medicamenti vires vtrcumque respondent, quæ cùm in hoc emplastro efficacissimæ sint, licet non diuinæ, idipsum, cum authore, diuinum nominabimus.

Præparatio

Sic autem paratur. Lithargyrus subtilissimè tritus horas duodecim cum oleo ducendus, agitandus & nutriendus, ac lento igne semper mouendo coquendus supra mellis crassitudinem; Dein cera in frustula diuisa, miscenda & liquanda. Inter ea gummi in aceto, vel vino tenui maceranda, diluenda, colanda, & ad humiditatis aquosæ discussionem, & euaporationem coquenda: quibus terebinthina commiscenda & parum coquenda. Post-hæc, omnia in lithargyrum cum oleo nutritum, & ceræ vnitum coniicienda & incorporanda. His omnibus pulueres myrrhæ, mastiches, thuris, aristolochiæ, & aymentis, hoc est, magnetis, seorsim tritorum commiscendi: Tum demum ærugo trita, ne cocta diutius emplastrum faciat nimis rubrum. Ex omnium sic probè mixtorum vnione fit legitime spissitudinis emplastrum. Caueat nouitius tyro, ne affatim totum lithargyrum oleo coctum gummis admisceat, sed primum portiunculam quamdam, deinde paulatim residuum semper agitando. Caueat adhuc ne ante perfectam emplastri cocturam, quæ coqui non debent, vt thus, myrrha, mastiche, misceantur. De olei & lithargyri quantitate tertiam singulorum partem substraxi & adieci terebinthinam, vt minore mole maiores habeat vires. Sic enim æquius Diuinum vocitabitur. Pro puluere aymentis, vt cum vulgo loquar, quidam Amenti dulcis, id est, Sagiminis vitri puluerem sumunt, melius tamen cum magnete vbique paratur. Si desit bdellium propollis sumatur.

Vires.

Emplastrum diuinum vim habet partibus quibus adhibetur emolliendi, dolorem sedandi, humores attrahendi, digerendi, ac resoluedi.

Emplastrum de Cerusa. CAPVT XIV.

*R^y. Olei rosati lib. ii.
cerusæ lib. i. ℞.
ceræ albæ ℥ iiii.*

Coquantur in vase terreo vel stanneo, fiat emplastrum.

COMMENTARIUS.

Incertus quidem est emplastri huius author, sed incertior multò descriptio, simplicium dosis, & parandi modus. Alij enim forma vnguenti conficiunt, vt Præpositus, alij forma emplastri, ad cuius compositionem nonnulli lithargyrum, amyllum & ouorum albumina ponunt, vt Paul. & Myreps. Alij ex cera tantum & oleo parant; Alij ex cera, cerusa & oleo. Præterea sunt qui duplum olei ad cerusam pondus assumunt; Alij partes vtriusque pares. Sunt qui plus ceræ, sunt qui plus olei adiungunt. Vsitatior descriptio est, quam damus, faciliior confectio, quam docemus, efficacior compositio, quam probamus, in qua olei rosati, & omphacini potius quam communis libræ duæ sumuntur, Cerusæ libra vna cum dimidia, & ceræ tantum vnciæ quatuor ponuntur. Antequam verò Cerusa emplastri Confectionem ingrediatur, lauari pluries debet in aqua communi, vel potius rosacea, illam ducendo in pila marmorea cum pistillo ligneo: Dein residere permittitur, & vbi in fundo quieuerit, aqua effunditur, aliaque rursus affunditur, cum qua denuo versatur: Idque iteratur, quousque aqua nitida, & omnis impuritatis expers apparuerit: qua eiecta, ex cerusa remanente albissima, trochisci formantur, in sole siccantur, & vsui reponuntur. Eorum autem quantitas descripta ad nostrum emplastrum parandum sumitur, & tenuissimè læuigatur, dein cum oleo lento igne subradiante sole coquitur, iugiter spatha versando, simulque cera liquatur & agitur, vt subeant cuncta spissitudinem emplastro conuenientem.

Cerusæ
lotio.

Præparatio

Qui maiorem albedinem in hoc emplastro postulabunt, sine virium dispendio, imo maiore, qua commendatur, exsiccandi virtute, duplex cerusa pondus, aut paulò minùs ad oleum permiscebunt,

aquæ parum illi, vt faciliùs liqueſcat, adiiciendo, quæ coctura facile poſtea diſſipabitur.

Vires.

Plurimi uſus eſt non modò ad vitia cutis, & ſuperficiarias exulcerationes ſiccandas, ſed ad vlcera maiora coaleſcenda, inflammationes ſedandas, & intertrigines ſanandas. Ambuſtis quoque plurimùm prodeſſe certum eſt.

Emplaſtrum pro ſtomacho. CAP. XV.

℞. *Abyſynthii,*
menta,
maiorana,
roſarum,
balauſtiorum,
nucum cupreſſi an. ℥iſſ.
zingiberis,
nucis moſchat.
caryophyllorum,
ſem. anethi,
dauci an. ℥ ii.
benjoin,
ſtyracis calamit. an. ℥℞.
oleorum maſtiches,
ol. citoniorum an. ℥ iii.
cerae flauæ lib. ℞. fiat emplaſtrum.

COMMENTARIUS.

Quæcunque pharmaca forinſecus ſtomacho imponuntur, ſiue aſtringendo condensent, ſiue indurent, improprie & licentioſe nimis Aſclepiades, & Andromachus malagnata vocarunt. Rectius illa Galenus ſtomachica, quod ſtomachum; vt ſplenica, quod ſplenem roborent, nuncupauit. Aptè ſiquidem à partibus, quibus maxime congruunt, nomen mutantur, licet aliis quoque prodeſſe comperiantur. Vnde emplaſtra Stomachica optime dicuntur, quæ

cap. 5.
lib. 8.
comp.
med.
loc.

Stomachum roborare, & vires ipsius imbecilliores refarcire valent. Cuiusmodi sunt medicamenta multa simplicia, quæ & primis qualitatibus ipsum calefaciendo recreant, & affinitate quadam respiciendo iuuant, ex quibus pauca quædam selegimus, ad nostrum hoc emplastrum concinnandum. Vix namque farraginem immensam simplicium inutilium probo, ex quibus emplastra Stomachica vulgaria, parata video, quæ pharmacopœo tantum sunt sumptui, labori, oneri. Paucioribus itaque, sed præstantioribus eustomachicis, emplastrum hoc constabit; ad cuius apparatus cera primum cum oleis liquanda & versanda: dein pulueres simul iniiciendi, ita tamen ut styrax & benjoin seorsim trita omnium postrema commisceantur; atque omnia in mortario calido mouenda, subigendaque, ut in legitimam abeant emplastri consistentiam.

Preparatio.

Vires.

Cardialgiæ per consensum ventriculi confert, eidem frigido, imbecillo & nauseabundo succurrit, ructus acidus corrigit, coctionem iuuat, & colico dolori à flatu vel pituita imminenti prospicit, præsentem non segniter auxiliatur.

Emplastrum de Mastiche. CAP. XVI.

*R^x. Mastiches ℥ iiii.
 boli armen. in vino nigro lotæ ℥ iß.
 rosarum ℥ vi.
 scobis eboris,
 coralli rub. an. ℥ ß.
 terebinthinæ ℥ ii.
 cere flauæ lib. ß.
 olei myrtillor. ℥ ii. aut quant. sufficit, fiat emplastrum.*

COMMENTARIUS.

Stomachicum quoque est hoc Emplastrum, sed non perinde calidum ac superius descriptum: Nam cum Stomachi omnis imbecillitas à frigida causa non semper proficiscatur, ut neque subuersio, quæ sæpius ab intemperie frigida ortum ducit, aut supinitas, quæ iuxta intemperiem quamcumque, etiam citra vitiatos humores contingit, ait Galenus, non est æquum, illi roborando, medicamentum perpetuò calidissimum adhibere, sed pro causæ affectionem committentis varietate, id ipsum variare, & immutare ratio suadet. Impossibile enim est pharmacum inuenire ad multas affectiones optimum, & quod vni efficaciter, alteri imbecillè prodest:

cap. 3.
 lib. 8.
 comp.
 med.
 loc.
 Gal.

Præparatio. Sæpeque accidit, ut emplastrum calidum Stomacho adhibitum, feruido hepatis plurimum officiat: Hinc prouerbum. Stomachicum uiuit & occidit hepaticum. Calidiori igitur, & imbecillo ventriculo tutissimè hoc imperabitur emplastrum, Ad cuius præparationem omnia pulueranda separatim erunt terenda. Deinde cera in oleo liquanda, liquata & igni substracta terebinthina unienda: Tum bolus, rosæ, ebur & corallium tenuissimè leuigata permiscenda, tandem mastiche accuratè subigenda in emplastri crassitiem legitimam. Omnia autem in mortario parum calido fortiter ducenda ut artis est.

Vires. Commendatur illius virtus ad robur toto ventriculo conciliandum, feruorem illius contemperandum; supinitatem ac subuersionem cohibendam, vomitum compescendum, & imbecillitatem firmandam.

Emplastrum pro matrice. D. Præpos. CAP. XVII.

R. Ra. tici bistortæ lib. ℞.
 ligni aloë,
 santali moschatellini,
 nucis moschatæ,
 berberis,
 antheræ an. ℥ ℞.
 cinnamomi,
 caryophyllorum,
 schœnanthi,
 florum chamæmeli an. ℥ ii.
 thuris,
 mastiches,
 Aiptæ moschatæ,
 Gallie moschatæ,
 Syracis calamitæ,
 Syracis rubei an. ℥ ℞.
 moschi gr. xv.
 ceræ citrinæ ℥ ix.
 terebinthinæ ℥ iii.
 ladani lib. ii.
 picis naualis lib. i. ℞.
 olei moschatellini ℥ ii.
 fiat emplastrum secundum artem.

COMMENTARIUS.

Matrix seu uterus morbis quamplurimis non tantum scater, sed & morborum muliebrium pars maxima vel ab utero, vel in utero est: Eo enim male affecto, totum, pene dixerim, afficitur corpus; Recreato, totum & recreatur ipsum. Ob id medicamenta multa in illius solamen à Medicis imperantur, ut priapiscota, fots, incessus, litus, vnguenta & emplastra, quibus aromata & suaueolentia permiscuntur, quorum vel interiorum immisforum, vel exteriorum adhibitorum fragrantia, & odoris iucunditate plurimum delectatur, licet non sub odoris specie, ut in nostris institutionibus annotauimus. Vtitur autem Topicum illi dicatum est emplastrum ab illiusmet nomine, pro matrice, nuncupatum; Ad cuius confectionem, cera Preparatio: & ladanum in frustula secta, cum oleo liquanda, & simul agitata, Mox pix naualis: Sic promiscue liquatis & ab igne semotis, adhuc tamen calentibus terebinthina addenda, necnon styrax calamita. Omnibus ita unitis & refrigeratis, reliqui pulueres permiscendi, spatha diligenter agitando, versandi & subigendi, ut ex omnium concursu fiat Emplastrum, ut decet spissum & odoratum. Præpositus nec adipem, nec olea ponit. Recte tamen parari non quit absque horum alterutro. Ob id oleum moschatellinum adiunximus, ut scopo & parti conuenientissimum. Hinc colligitur Nicolaum Præpositum non modò ineptum scriptorem esse, ut qui sapius barbarè loquatur, sed imperitum pharmacopœum, ut qui compositionem medicamentorum non sciat legitimam, nec parandi modum, nec consistentiam idoneam: mirorque posterioris huius ætatis primates, authoris adeò stolidi nomen patienter tulisse, aut eius paginas tam præcipitanter euoluisse, ut eius ineptias non aduerterint. Verum hæc obiter dicta sunt: Nolo enim sauire in mortuum. Acerbius tamen sauiunt in viuos qui medicamina periculi plena recipiunt. Ad rem verò ut redeam, putant quidam oleum gagatis, aut aliud fœtidum debere permisceri, ut strangulationi ab utero magis conueniat; improba tamen est illorum ratiocinatio, ut qui autument per matricis suffocationem fœtida ipsius regioni imponenda; quæ

cap. 7. si in hoc affectu prosint, ut certè prodesse comperiuntur, naribus
lib. 6. adhibenda sunt. Demus autem graueolentia ad regionem uteri con-
meth. ducere, ea tamen minime sunt commiscenda moscho, santalo ci-
cap. 22. trino, Aliptæ & Galliæ moschatis. Non emittendum est, hic, per
et. 2. Antheram, quæ ad huius emplastri cōfectionem accedit, partem ro-
serm. sarum inferiorem, capillamentis, granulisque comitatam intelligi:
4. non antheram, i. floridam, quæ medicamentum erat compositum
cap. 11. hoc nomine, ab antiquis, ad oris vitia descriptum, quod planè
lib. 6. exoleuit. Ut legitur apud Actuarius. Aët. Cor. Celsus, & alios.

Anthera
 duobus
 modis vsum
 patitur.

Parandi modus cum sit idem ac superiorum, & satis facilis, omis-
sus est, ne commentarius prolixior censeatur.

Vires.

Emplastrum pro matrice vires habet eximias ad ipsius prociden-
tiam, aberrationem, peruersionem. Illius enim deprauatum motum
cohibet, symptomata hysterica restinguit, & pluribus aliis præter
naturam affectionibus medetur.

Emplastrum contrarupturam, vulgò Herniam D. N. Præp.

CAP. XVIII.

℞. *Picis naualis,*
aloës an. ℥ iii.
lithargyri,
cereæ albæ,
colophonie,
galbani,
ammoniæ an. ℥ ii.
baccarum visci querni ℥ vi.
aristolochiæ longæ,
aristoloch. rotundæ,
gypsi an. ℥ iii.
myrrhæ,
thuris an. ℥ vi.
terebinthinæ ℥ ii.
ysculorum, hoc est, vermium terræ,
gallarum,
symphyti maioris,
symphyti minoris,
boli armen. an. ℥ iii.
sanguinis humani lib. i.
oleorum mastiches, &
citroniorum an. ℥ iii.
Iuris pellis arietinæ quod sufficit, fiat empla-
strum.

COMMENTARIUS.

Facile est medicamēta à N. Præposito inuenta, ab his quæ transcripfit agnoscere. Quæ enim adinuenit ipse in multis vel deficiunt, vel excedunt, vel in simplicium dosi, & parandi modo peccant, vel incepta descriptione prostant, vt præter cætera, hoc emplastrum fidem facit, quod vix iuxta authoris mentem paratur, aut paratum pastæ cuiusdam durioris quàm emplastri potius consistentiam refert: Breui enim exsiccat, induratur & facile pulueratur. Propterea quædam olea superaddenda putavi, scopo accommodata, & pulueribus colligandis conuenientia simul cum simplicibus reliquis.

Vt autem ritè paretur, pellis arietis iunioris recenter detracta in *Præparatio*, frustra secta, cum pilis duodecim horas, aut etiam diem integrum, si sit opus, coquitur ad eius dissolutionem: Dein exprimitur decoctum, & abiicitur lana: In libra vna liquoris colati bacca visci querni, aut alterius arboris, cognatæ qualitatis coquuntur donec tabescant, & aquea exhalet humiditas: Tum percolantur. Interea, ysculi, seu lumbrici terrestres vino abluuntur, & ad dissolutionem coquuntur & colantur: Colaturæ olea permiscetur, & igni denuò redduntur, ad feri totius discussionem. Postea duæ hæ colaturæ commiscetur: His liquantur cera, colophonia & pix, exactè versando, ne vrantur. Liquori coctura penè consumpto, galbanum & ammoniacum in vino rubro diluta, colata & ad mellis spissitudinem cocta, commiscenda. Omnibus igni substractis terebinthina ponenda: Tum demùm pulueres ex arte læuigati & creti, ex omnibus sic debite præparatis, mixtis, vnitis, & accuratè subactis, fit Emplastrum consistentiæ legitimæ.

Baccarum visci querni penuria (defunt enim sapissimè) consentit Ioubertus taurocollam subrogari. Alia adhuc multa astringentia superaddit, vt vis insit emplastro magis agglutinaria. Arnaldus ineptè sanguinem hominis ruffi postulat: Melior siquidem est, qui ex alio, modò sano & polyhemo habetur: Æque aptus & suillus. Præpositus ceram rubram exigit, id est recentem, quæ ita flauescit, vt subrubra appareat, sed alba est accommodatior. Vult quoque marmor, in quod massa iniicitur oleo violato madere, nos mastichinum præferimus, aut citoniorum, aut vtrumque, tum ad ceræ liquationem, tum ad emplastri colligationem, quod cito indurescit, aut grumescit, nisi quid oleosi aut pinguis interuenerit. Si cui oleorum quantitas iusta non videatur, liceat illi eam minuere vel augere.

Efficacissimum est ad laxiores partes constringendas & roborandas, Ad fluxiones cohibendas, ad dilatationem productionis peritonei, per quam intestinum delabitur, coarctandam. Ob id ad

Vires;

Ramicem, seu enterocalem, vulgo herniam valde confert, vnde emplastrum ad herniam à Pharmacopolis dicitur, A quibusdam de Pelle Arietina, A Manlio Emplastrum pro Crepatis.

Emplastrum Catagmaticum, seu, ad fracturas ossium. CAP. XIX.

Radicum Symphyti maioris,
R*altheæ,*

visci quernian. ℥ ii.

plantaginis,

chamæpitheos,

hypericonis an. m. i.

Fiat decoctio in æquis partibus vini nigri, & aquæ fabrorum ad medias. In colatura adde

mucaginis seminis citoniorum in decocto omazorum extractæ,

olei mastich.

ol. rosar. an. ℥ iii.

cere virginis lib. i.

lithargyr. auri ℥ ij.

terebinthinæ ℥ ij.

balaustiorum,

rosarum,

myrtillor.

acaciæ an. ℥ ss.

Mumia,

granorum androsæmi,

colophonix,

mastiches,

succini an. ℥ vi.

piceis navalis ℥ i ss.

bol. armenæ,

farinæ volatilis,

thuris an. ℥ i ss.

sanguinis Drachonis. ℥ ij.

Ex arte fiat emplastrum.

COMMENTARIUS.

Vt partes corporis inter se forma, temperie & actione sunt dissimiles, sic dissimilibus opus habent medicamentis, quibus vel conseruantur vel curantur; Alia enim oculus, alia pulmo, alia vterus, alia ossa male affecta postulant; Et sæpe diuersis medicamentis eadem pars eget, pro affectionis qua laceffitur diuersitate, nam quæ ossium cariei, seu teredini conducunt, raro aut nunquam in ipsorum fracturis vsurpantur; quibus sanandis Chirurgorum maxima pars astringentia sola perperam adhibet: Quidam Oxycroceum; Alij Emplastrum de pelle arietina, seu contra rupturam: Alij vulgare Ceroneum, à quo forsan detorta est illius emplastri nomenclatura, quod Lutetiæ tanti nominis est, & singulis opem efflagitantibus, abs quodam sine discrimine datur, & promiscuè morbis omnibus & partibus adhibetur. Vnde ab occlusis meatibus & retentis humoribus excrementitiis sæpè dolores ingrauescunt, nonnumquam pruritus ingens oritur, sed sæpius vlcera nascuntur, vt in multis obseruauimus.

Peculiare igitur debet in Pharmacopoliis Catagmaticum optimum haberi, quod non solum vim habeat astringendi & roborandi, sed partis temperiem conseruandi, pori sarcoidis, *Alrosboth* Arabes vocant, generationem & incrementum accelerandi: Cuiusmodi est, quod nunc exhibemus, cuius præparatio licet ex formula descriptionis satis pateat, in tyrunculorum tamen subsidium apertius declarabitur. Primum igitur radices mundatæ, & in frustula sectæ, & herbe minutim incisæ in pari portione vini nigrioris, & aquæ chalibeatæ, vel fabrorum coquentur ad mediæ partis dissipationem. In percolatum liquorem mucagines iniicientur, elixabunturque donec aquosa exhalet humiditas: Tum olea miscebuntur; Mox lithargyrus & igni moderato coquentur, in Emplastrum; postea addentur pix & colophonia; Inde cera simul liquabitur. Igni sublatis & sufficienti coctura, & agitatione vnitis terebinthina adiungetur: deinde pulueres: omniaque simul probè miscebuntur, agitabuntur, subigentur, vt coëant in Emplastrum, consistentia legitimum.

Præparatio.

Si *Androsæmum* non suppetat, in eius locum hypericonis semen, aut summitates substituentur. Per ceram virginem flaua, seu citrina & recens à melle secreta intelligenda est, quæ neruis roborandis aprior est, & vtilior.

Vires.

Emplastrum Catagmaticum vires habet insignes ad fracturas ossium sanandas: Eorum enim coalitum iuuat, & accelerat, callum quo simul agglutinantur, auget, calorem partis natium fouet, & humorum fluxiones sistit.

Chirurgos hortor, emplastrum hoc parare, nec ignaros quosdam tam libere pati, qui vnico Ceroneo, vt vocant, seu emplastro, forsan sine ratione concinnato, omnes plagas, vt vulgo fertur, sanare promittunt.

Emplastrum Vigonium, seu de Ranis. CAP. XX.

℞. Oleorum chamæmeli,
anethi,
de spica,
de lilio, an. ℥ii.
olei de croco ℥i.
pinguedinis vituli lib. ℞.
euphorbii ℥v.
thuris ℥x.
olei laurini ℥℞.
adipis viperæ ℥ii ℞.
ranarum viuientium n. vi.
lumbricorum lotorum in vino ℥iii ℞.
succorum radic. ebuli, &
enulæ an. ℥ii.
schœnanthi,
stœchados,
matricariæ an. m. i.
vini odorifer. lib. ii.
Bulliant omnia simul ad consumptionem vini.
Colaturæ adde
lithargyri lib. i. ℞.
terebinthinæ claræ ℥ii.
ceræ albæ, vel potius flauæ, quod sufficit,
styracis liquidæ ℥i ℞.
Post hæc ab igne depone, & vbi refrixerit, misce
argenti viui saliuo hominis ieiuni extincti ℥iiii.
misce diu pistillo, & fac emplastrum.

COMMENTARIUS.

Vt India naturæ statuto luem veneream simul & remedium protulit. Sic Italia, in quam primùm aduecta est, hoc morbi genere, totam Europam infecit, & optimo medicamento refecit. Ioannes quippe de Vigo Italus, vt suis, vel etiam sibi, forsan consuleret, emplastrum hoc eximiæ virtutis composuit, ad Italici morbi, quem ineptè Gallicum appellat, curationem: Cuius licet probetur descriptio, improbatur tamen modus parandi, quem ipse præscribit. Vult enim simul ac confusè omnia concoqui ad lithargyrum vsque; Sed recentiores paulò aliter, & melius multò sic apparant.

Lumbricos terrestres vino ablutos, & ranas viuentes maiusculas, Preparatio. & aquaticas in pinguedinibus porci & vituli simul cum vino coquunt, ad tertiæ partis vini consumptionem: Deinde matricariam addunt, stœchadem & schœnanthum, & rursus elixant ad vini depeditionem: Tum succos ponunt & olea; Paulo post axungiam viperæ, aut eius defectu colubri. Adhucque coquunt ad humoris aquei excussionem, & postea fortiter exprimunt. In percolato iure lithargyrum læuigatum agitant, nutriunt, & iugiter versando coquunt ad formam vnguenti; Tuncque ceram adiiciunt & liquant. Post hæc ab igne remouent; thus & euphorbium trita coniiciunt; Deinceps terebinthinam & styracem. Omnibus ordine dicto mixtis versatis, vnitis & refrigeratis, argentum viuum per pannum densum traiectum, & salua hominis ieiuni extinctum exactè permiscet, terunt, subigunt, & in formam emplastri idoneam reducant, ex quo magdaleones formant, & vsui reponunt.

Optima est hoc emplastrum parandi ratio, quam peritiores Pharmacopœi sequuntur, inter quos nonnulli pondus hydrargyri duplicant, alij triplicant, vt vires nanciscatur efficaciores ad Italici morbi expugnationem. Quidam illius extinctionem cum salua ieiuni damnant, maluntque cum terebinthinæ & axungię porci aliqua portione extinguere; nec quidem malè istis omnibus modis castigatur; Mallem tamen saluam quàm saliuam assumere, illius enim succo castigatus hydrargyrus neruis minus obest.

Querunt multi, quodnam oleum sumendum sit pro oleo de Spica, Dubitatio. cuius multæ perhibentur varietates? quibus, vt paucis respondeam, dico Vigonem illud oleum intelligere, quod per destillationem trahitur, ex lauandula maiore latifolia, quam vulgus *Assicam* nominat: non verò aliud, quod per infusionem educitur ex spica Indica, quod idem author cum Mesue semper vocat oleum Nardinum, vt lib. 8. Antidotar. cap. 4. Olei verò de Spica alibi meminit, nempe lib. 4. cap. de auxiliis ad dolorem dorsi.

Aliud dubium.

De ranis quoque non conuenit inter omnes, alij namque aqua-

ticas, alij syluaticas, seu rubetas venantur, sed palustres, seu aquaticas rubetis sæpè venenatis prætulimus: Verum alię aliarum defectum sine magno discrimine facile supplebunt: Atque has, vel illas quisque seligat pro animi arbitrio, cum æque ferè huic externo medicamento conueniant.

Medicos interea monitos velim raro myropœos hoc emplastrum iuxta veram descriptionem concinnare, ob viperarum pinguedinis inopiam, quæ exigua quantitate è singulis excerpitur. Notus est qui vix eius unciam 30. lib. emplastri permisceat. Cera autem quantitatem, quæ tripla solet esse ad oleum, artificis periti prudentiæ committo. Lithargyri vero pondus inexpertus nulli leuius ponunt, quàm vt rite possit emplastrum parari.

Vires.

Vires autem huius emplastri, quod forma cerati, vel vnguenti multi parant, non modò Medicis, Pharmacopœis, & Chirurgis notissime sunt, sed omnibus qui Veneris calcitratu fuerunt oblæsi.

Tela Galteri, vulgo Sparadrap. CAP. XXI.

<i>℞. Olei rosati lib. ℞.</i>	<i>thuris,</i>
<i>seui arietini ℥ iiii.</i>	<i>mastiche an. ℥ ii.</i>
<i>cerae ℥ x.</i>	<i>bol. armen.</i>
<i>lithargyri,</i>	<i>farinae volatil. an. ℥ i. Ex arte fiat</i>
<i>resinae pini,</i>	<i>Empl. in quod adhuc liquatum,</i>
<i>& calidum immergatur tela parum attrita.</i>	

COMMENTARIUS.

Ad Emplastrorum cateruam refertur quædam tela vtrinque emplastica, quam recentiores modò Sparadrapum, modo telam Galteri nominant, cuius multæ varietates dantur, à varietate emplastrorum, quibus inficitur tela, sumptę: Alia enim vulneraria, alia catagmatica dicitur: Illa vulneribus magis, hæc ossibus agglutinandis dicatur; vtraque tamen, vtrique affectioni proficua. Sed nullis in morbis Sparadrapum frequentior est vsus, quàm in vlceribus antiquatis, & in ipsis fonticulis à pyrotico relictis. Ad hæc autem omnia valet, quod hîc exhibemus, ad cuius confectionem sebum & cera primùm liquanda cum oleo: Liquatis lithargyrus subtilissimè tritus, commiscendus, ducendus, nutriendus & spatha assiduè mouendus, coquendus. Post hæc, reliqui pulueres addendi, & ita versandi, permiscendi & vniendi, vt in legitimum abeant emplastrum, in quod

Parandi
modus.

in quod adhuc calidum, & liquidum, tela quodam modo vetustate iam attrita demergenda, & sæpè inculcanda, quousque infecta planè, & vndiquaque inquinata, & quasi incrustata fuerit. Tuncque extrahenda, & exponenda aëri, vt refrigerata, obdureseat, & ad futuros vsus seruetur.

Solent nonnulli lithargyrum coquere cum sebo & oleo ad idoneam emplastri formam, dein ceram addunt & liquant; hisque ab igne semotis farinam & bolum miscent, denique thus & mastichem; Verùm vtroque modo rectè solers myropœus poterit parare.

Tela hæc partim sarcotica est, partim collectica & epulotica, hoc est, vim habet nouam carnem generandi, vulnera glutinandi & eadem, vt & vlcera, exsiccandi, & ad cicatricem ducendi. Fluxiones quoque sistit, & partes quibus adhibetur roborat.

Vires.

Qui alias Sparadraporum descriptiones desiderarit, legat caput vltimum sectionis secundæ lib. 3. nostrarum Institutionum.

Porro ex aliis Emplastris liquatis tot sparadrap, quot illa sunt, possunt hac arte parari.

Alia quædam emplastra, pauca tamen omisimus, quorum vsus vel improbatur, vel non satis probatur, vel affinis sit eorum qualitati, quæ superius à nobis describuntur: Exoleuit enim emplastri vtriusque Barbari & Diaphœnici vsus: Apostolicum vero rarissimè paratur, eoque faciliè carere poterit, qui Diuinum habebit, vt Ceronium, qui oxycroceum. Præstantiora autem vsitatioresque dedimus non modò emplastra, sed alia medicamenta, tam quæ exterius adhibentur, quàm intro sumuntur; quæ omnia si parare voluerit Pharmacopœus, & in officina seruare, nihil illi deerit morbis omnibus expugnandis.

Finis Libri Sexti.

APPENDIX.

De quibusdam aquis medicatis, arte paratis.

DRÆTER aquas simplices destillatas, aliæ quædam in Pharmacopoliis seruantur compositissimæ, quarum vsus plurimum commendatur, non modo ad externos corporis affectus, dum adhibentur, sed etiam ad interiores, vt intemperiem partium corrigendam, robur hisdem conciliandum, & facultates erigendas dum assumuntur; Cuiusmodi sunt vsuales quædam & eximie virtutis, quas ad calcem huius operis, ne quid ei decisset, adiunximus, initio ab his sumpto quæ intus sumuntur.

Aqua Theriacalis.

℞. Radic. gentianæ, enulæ campanæ, tormentillæ, angelicæ, imperatoriæ an. ℥ i. cyperi, ireos florent. an. ℥ vi. Zedoariæ, cortic. citri sicci, & arantiorum, cinnamomi, caryophyllorum, sem. cardui bened. corymborum hederæ, granorum Iuniperi an. ℥ ℔. dictamni, scordij, melissæ, calendulæ an. m. ℔.

Macerentur diem integrum super cineres calidos in vase oris non multum patuli & rite obturati, cum vini albi lib. vi.

Die sequenti, adde decoctionis ulmarie, betonicæ & nenupharis lib. i. Deinde bulliant parum, ac lento igne: Tum fiat expressio, in qua dissolue & infunde per noctem theriacæ bonæ ℥ iiii.

Postea ponantur in alembico vitreo, & fiat destillatio in balneo M. Aqua hinc destillata seruetur.

Inter aquas Theriacales, & Alexiterias nulla est hac præstantior & efficacior: Facultates enim non modo recreat, sed qualitatem omnem pestilentem, & venenatam oppugnat & extinguit. Syncope, palmo, ac omni animi deliquio prodest, vertigini, lethargo, Epilepsiæ, Apoplexiæ & paralysi.

Aqua Theriacalis alia, paratu facilior.

℞. Radic. enulæ campan. angelicæ an. ℥ iiii.

sem. cardui bened. caryophyllorum, granorum iuniperi an. ℥ i.

Scordij, echij, ulmarie, maioranæ, melissæ, betonicæ an. m. i.

Fiat decoctio, In qua colata ad lib. iiii.

Infunde diem integrum, vel etiam biduum,

Mithridatij & Theriacæ an. ℥ ii.

Ponantur in alembico, & destillentur, ut artis est.

Vires habet superiori affines, sed imbecilliores. Parari facillè poterit non solum in Pharmacopoliis, sed etiam in singulis ciuium ædibus. Paucis enim constat, quæ vbique ferè reperiuntur.

Aqua Cinnamomi.

℞. Cinnamomi optimi, crassiusculè triti lib. ℞.

aquæ rosarum fragrantissima &

vinum albi generosi an. lib. i.

misceto, ac biduum simul relinquito in vase rite operculato, ne quid expiret. Deinde super cineres calidos destillato, & aquam seruato.

De cinnamomi ad vinum & rosaceam proportionem non vnus est omnium consensus. Alij enim partem vnā cinnamomi ponunt, vini partes duas, aquæ rosarum partes quatuor. Alij vinum & aquam eadem mensura permiscunt, in quibus cinnamomum maceratur, & totum destillatur: hicque parandi modus vsitator est, & melior perhibetur.

Huius aquæ facultas valde commendatur ad partum accelerandum, secundinas expellendas, menses ciendos, facultates recreandas, & flatus discutiendos.

Aqua vulgò Clareta dicta.

℞. Macis, caryophyllorum, cinnamomi an. ℥ i. galangæ ℥ ℞. cardamomi minoris, schœnanthi an. ℥ ii. zinziberis ℥ ℞.

Infunde in balneo M. viginti quatuor horas in aqua vitæ lib. i. aquarum absynthij, & rosarum an. lib. ℞. adde sacchari ℥ viii.

Traiciantur ter, quaterque per manicam Hippocratis. fiat Clareta, in vase idoneo reponenda, & seruanda.

Valet plurimum ad robur stomachi, coctionem iuuandam, flatus discutiendos, intemperiem frigidam partium nutritiarum corrigendam, ad vires cordis restituendas, & facultates erigendas.

Clareta alia.

℞. Radic. pœoniæ utriusque, visci querni an. ℥ ii. ligni lauri, lentiscæ an. ℥ ℞. florum bethonic. saluie, anthos. an. p. ii.

Macerentur per diem integrum, in vase stricti oris, & bene cooperulato

in vini albi optimi lib. i. ℞. aqua melissæ lib. ℞. Postea distillantur. Et aqua destillata macera cinnamomi ℥℞. sacchari candi ℥v. Tum colentur & bis atque iterum transmittantur per colum laneum. Colatura seruetur.

Mirum in modum confert Epilepsiæ, Lethargo, Paralyfi, Apoplexiæ, & aliis frigidis affectibus cerebri, & totius neruosi generis.

Clareta alia.

℞. *Aquar. melissæ & tusilaginis an. lib. ℞. Infunde per noctem super cineres calidos Emulæ Campanæ ℥ii. Ireat florentiæ ℥i. cinnamomi ℥iiii. Factæ expressioni, & bis, terque colatæ adde Syrupi ardentis, seu olei sacchari, ut vocant, ℥iii. Fiat Clareta, parum insolanda, si seruanda.*

Facultates habet eximias ad Asthmæ, tussim ab humore frigido natam, & expectorationem. Incidit enim, attenuat, coquit, & sputum mouet.

Syrupus autem ardens fit ex saccharo diluto in aqua vitæ, quæ accenditur: Nam post eius conflagrationem liquor relinquitur, quasi oleosus & crassitie syrupi.

Clareta vulgaris.

℞. *Aquæ vitæ optimæ lib. ℞. aquæ rosarum rubrarum ℥iiii. sacchari ℥iii. cinnamomi ℥i.*

Traiciantur per manicam Hippocratis, bis atque iterum, & fiat Clareta.

Gratissima est hæc Clareta, & cor atque reliquas partes, quæ principatum tenent, recreat, calorem natuum fouet, & materiam flatulentam discutit.

Aqua contra calculum.

℞. *Radicum apij, oionones, eringij & raphanorum per taleolas incisarum an. ℥ii. siliquarum virid. fabarum ℥iii. saxifragarum omnium, cristæ marinæ, pimpinellæ, ameos, summitatum althææ an. m. ij. granorum alkekengi, cicerum rubror. sem. millij solis an. ℥ii. mala citria in orbiculos secta m. iii.*

Macerentur diem integrum in vino albo: Postea destillantur. Aquæ reponatur vase idoneo, cui si parum olei vitrioli admisceatur, ut acescat, vires habebit efficaciores.

Mira est huius aquæ vis ad calculum atterendum, & expellendum, urinam ciendam, menses mouendos, partum accelerandum, viscidos humores attenuandos, & obstructions tollendas. Debent verò illius sumi duo cochlearia aut paulo plus, pro sumentis ætate & viribus: Idque manè ieiuno stomacho, vel longè post pastus.

Aqua ad Gonorrhæam.

℞. *Foliorum acanthi, & lapathi hertensis concisorum, summitatum altheæ an. m. ii. florum nenupharis m. iii. sem. lini, Senelorum an. ℥ i. B. seminum quatuor frigid. maiorum an. ℥ i. macerentur per diem in lacte asinino, aut vaccino, postea destillentur in Balneo.*

Facultatem habet leniendi, acrimoniam auferendi, sordes renum, & partium per quas, & lotium, & semen excernuntur, expurgandi, & intemperiem corrigendi.

DE AQUIS TOPICIS SEV
exteriùs adhibendis.

Aqua Ophthalmica.

℞. *Succorum chelidonij, fœniculi, rutæ, apij & hormini an. lib. B. mellis ℥ iii. fellis hircini ℥ j. fellis caponum & gallinarum an. ℥ B. aloës ℥ vi. caryophyllorum, nucis moschatæ, sarcocollæ an. ℥ ii. Ponantur omnia simul in alembico: Destillentur: vase vitreo excipiantur, & aqua destillata seruetur.*

Multis oculorum affectibus prodest, vt Ambliopiæ, caligini, visus debilitati & hebetudini.

Aqua communitalis.

℞. *Euphras. m. ii. chelidonii, verbenæ, bethonica, camæpitheos, anethi, summitatum hormini, anagallidis flore rubro, aneos, caryophyllatæ an. m. i. anthos m. B. piperis longi ℥ ii. Macerentur in vini albi sufficienti quantitate per diem integrum, & destillentur.*

Vocatur aqua communitalis, quod communis sit, nec vlla domus ea carere debeat. Plurimum valet ad omnem visus imbecillitatem, sordes oculorum detergendas, maculas auferendas, vlcera sananda, suffusionem impediendam, claritatem oculis augendam, & robur conciliandum.

Aqua ad Epiphoram & oculorum ruborem.

R. Vini alb. aquæ rosarum an. lib. ℞. tuthiæ præparata ℥i.
macis puluerata ℥℞.

Omnia misceantur in phiala bene obturata, & insolentur per tres hebdomadas.

Efficacissima est ad oculorum ruborem delendum, lacrymas ipsorum exsiccandas, tunicas roborandas, & vlcera sananda.

Aqua Calcis.

Aqua in qua pluries calx extincta fuerit, aqua calcis ob id dicta, multis vlceribus phagædenicis ac disepuloticis mirum in modum confert, quia tamen facilè quouis tempore parari potest, in eius descriptione non immorandum.

Aqua Fortis.

Aqua fortis vulgo dicta, ad aurifabros potius, quàm Pharmacopæos spectat, qua vtuntur ad separandum argentum ab auro: Ob id, aquam separationis vocitant Gall. *eau de depart*. Liquat enim argentum, auro integro. Quæ autem illorum operibus inseruiuit, & portionem aquæ admisit, vel per se ignaua iam facta colorem cyaneum acquisiuit, aqua secunda vulgò dicitur, qua nihil communius in Chirurgorum tabernis, ad illorum subsidium, qui Veneris Mephitim attigerunt.

Paratur autem aqua fortis ex vitriolo, & sale petræ in matraccio inclusis, & adhibito excipulo, seu vase idoneo, optimè lutato, in quod vi ignis spiritus velut accensi perreptant.

Alia fit adhuc ex auripigmento, flore æris, sale nitro & alumine rupeo: Verum hæc relinquenda, quibus inseruiunt.

De aquis comptoriis seu fucatoriis.

Corporis pulchritudinem aut deformitatem magni quicquam ad morum probitatem, aut improbitatem adferre non auctumo; Multi enim Theriite deformiores clarissimi floruerunt, & nonnulli Adonide formosiores inter sceleratos computati sunt. Ferè tamen mulieres deformes impias esse noui, quibus, vt nec edentulis senioribus, nullum fucum, aut aquam comptoriam ad faciem

cap. 3
lib. 1
compo.
medic.
secund.
loc.

erugandam exhibeo: In hoc Galeni, licet pagani prudentiam sequutus, qui non modò vultus, sed capillorum fucum, seu tincturam improbat. Quæcumque, inquit, præ deliciis seipsas ornant, nihil tale quippiam à me petenti exhibui.

Carebit igitur Antidotarium nostrum his nefariis medicamentis, quibus pellices solent iuvenes irretire, & incautos fallere: Hanc enim fucatoriam artem videmus tantum exerceri à quibusdam circulatoribus, & vafis lenonibus, qui ut cautè ad meretricum nummos perueniant, illis oleum de Talko, quod nusquam viderunt, pollicentur, quo non tantum faciem erugare, sed iuuenescere prorsus asserunt. Duo autem vnguenta solent exhibere; Vnum rubellum, & candidum alterum: Vtrumque Hispanicum cognominant, nec malignæ qualitatis expers vllum: Nam quod Album Hispaniæ vocitatur, ad sui confecturam Sublimatum admittit, quod licet ex partibus æquis hydrargyri, & vitrioli, & ex sale communi, potius quàm ammoniaco constet, quæ seorsim lethalia non sunt, simul tamen ut decet mixta, in vitreo vase sublimatorio indita, cui per gradus datur ignis duodecim horarum spatio, fit pulvis ita causticus, & deleterius, ut eius malignitas vix possit vlla arte deleri. Hinc accidit, mulieribus, quæ fucis sublimatis utuntur, dentes nigrescere, teredine absumi, & faciem corrugari, ac citius senescere. Melior ergo color is est, quem sola natura pinxit, cuius opera inimitabilia dum miramur, opificem summum laudemus in æternum.

Sublimatū
quibus
constat,

Finis totius operis.





EPIPHANII EMPI-
 RICA 1561. 21. APRILIS, FUIT IS
 EMPIRICVS MEDICVS IN GRÆCIA
 PEREGRINATVS, QVEM GESNERVS ADO-
 lefcens cognouit, & ex cuius libro, qui hic est,
 quædam descripsit in libro suo, quem
 inscripsit Euonymus.

A Q V Æ

*Aqua experta in ulcere præputii
virgæ & testicularum.*

℞. Oua iij. elixa dura à quibus
albumen accipias, quod subtili-
liter scindas & in mortario te-
xas, deinde infunde quartam
partem vnus mensuræ aquæ vi-
tæ aluminis ℥ β. camphoræ ℥ ij.
viridis aris ℥ β. terantur om-
nia simul in mortario, postea
per telam lineam fortiter expri-
matur, vtendi modus est, capiā-
tur fila lanca in hac aqua made-
facta, quæ in vulnere ponantur
ter aut quater in die & miraberis
effectum.

Aqua experta ad asthma.

℞. Calamenti hyssopi capill.
veneris prassii scabiosæ vngulæ
caballinæ an. m. i. aristol. rot.
℥ i. Ireos ℥ s. sem. vrticæ ℥ i. β.

rad. fœniculi petroselin. an. ℥ 2.
enulæ campanæ lb. β. sem. sina-
pi nastureii an. ℥ i. β. costi ℥ s.
spicæ ℥ io. baccarum lauri ℥ 4.
nigellæ ℥ i. β. terantur omnia
subtiliter & stent per dies 6. in
infusione in vino albo mensuris
6. deinde lento igne distillantur
manæ ℥ 3. dentur.

*Aqua qua in tinea, ac in omni cutis
fœditate caput aut totum corpus
lauetur.*

℞. Farinæ cicerum lb. i. fœnu-
græci surfuris tritici baurach sa-
lis nitri sinapis an. ℥ 2. rad. al-
theæ incisæ ℥ 3. misceantur in a-
ceto & aqua, & postquam suda-
ueris lauetur deinde & locus
fœdus vngatur cum vnguen-
to, de quo infra in lite-
ra V.

Aqua ad idem pro pauperibus.

℞. Lactis virginis ℥i. β. aquæ rosatæ parum sulphuratæ ℥i. olei de tartaro, de frumento, de vitellis ouorum an. ℥β. camphoræ ℥i. quære olea in lit. O.

Aqua ad mundificandos dentes.

℞. Salis amoniaci, salis gemmæ an. ℥3. aluminis Tuceanini ℥i. β. ponantur ad alembicum & destillentur, quod si aliter vis facere imponas aquæ fontis lb. 2. & sic stent per 8. dies, colentur & dentes lauando frica.

Aqua contra calculum.

℞. Hyperici chamædrios chamæpitheos; senecionis, graminis pentaphyllon, scolopendræ patietariæ verbenæ, eupatorii pulegij rutæ an. m. i. quinque rad. diureticorum, acori, enulæ rubræ tinctorum, azari, tamariscian. ℥ii quinq; sem. diureticorum, saxifragiæ milii Sol. dauci raphani Macedonici, ameos maratri carui leuistici an. ℥ij. nucleorū persicorum 3. v. liquiritiæ ℥j. granor. iuniperi ℥β. Quatuor sem. com. frigid. maior. mundatorum an. ℥j. β. terantur & infundantur in lb. v. vini, stent per duos dies in infusione, postea lêto igne destilletur, da post balneum vel mane in aurora tepida ℥β. vel ℥j. β. pro vna vice vt tibi videbitur.

Aqua experta ad grossos, id est fici (Cels. l. 5. c. 3. σίκοις græcis) circa nasum & poma maxillarum.

℞. Sulphuris viui ℥j. terantur & per syndonem fiat alcool: postea ponatur aquæ rosar. lbj electæ, omnia in phiola obturata ad solem suspendantur diebus 40. in canicularibus vt quotidie bis

vel ter vitrum moueatur, postea illa aqua loca inungantur, cui iudicio meo si addas camphoræ ℥j. melior erit quia probata est.

Aqua frigida in febricitantibus, ne fumi à stomacho ad caput ascendant.

℞. Hordei mundati ℥iij. iuiubarum sebesten an. n. xii. prunorum n. xv. granorum granatorum acetosorum ℥j. β. sachari rosati ℥ij. aquæ mensuras ij. bulliant vsque ad consumptionem medietatis, bibat frigidum.

Aqua faciem de albens.

℞. Entale dentale (conchæ sūt) classis boracis sarcocolle corallorum alborum, cristall. alb. gypsi aceti, rizi farine orobi portulacæ an. ℥β. cum aqua fabarum miscantur, fiât trochisci & cū opus fuerit fumigetur antea facies cum aqua decoctionis hordei & auenæ, deinde trochiscus vnus distemperetur cū aqua fabarum, & facies liniatur quando cubitum vadit, mane verò lauetur facies cum aqua decoctionis fabarum & furfuris, postea cum aqua frigida, & si formantur trochisci cum aqua limonum fortius operatur, imo limone affato facies liniatur, nam ipsam pulchrâ reddit.

Aqua elegans contra calculum.

℞. Asparagi brasçi apij fœniculi petroselini rubæ tinctorum an. ℥β. sem. v. diureticorum leuistici milij solis, ameos raphani silleris montani dauci, saxifragiæ an. ℥iij. adianthos scolopendræ ceterach, trifolii hepaticæ, graminis, sem. peucedani, senecionis an. m. i. ireos ℥β. liquiritiæ ℥ij. quatuor

sem. frigid. communium maior. mundat. an. ℥. s. hederæ arboreæ & terrestres an. m. i. s. nucleorum ceraforum ℥ j. spicæ nardi ℥ iiii. gummi hederæ ℥ vi. sanguinis hirci præparati ℥ β. cinnamomi ℥ i. terantur & in vini albi vij. mensuris, per dies aliquot infusa maneant, postea destillentur.

Aqua somnifera.

℥. Sem. hyoscyami ℥ ij. mandrag. ℥ i. opii. ℥ i. gith, corabe an. ℥ ii. semperuini vermicularis, nenufaris lactucæ an. m. i. terantur & infundantur in ℔. ii. aquæ papaueris cum ℥ i. β. seminum lolij per dies 2. postea secundum artem destillentur.

Aqua caponis restauratiua & stiptica.

℥. Caponem coctum secundum artem, cui addatur aquæ rosatæ ℔. i. conseruæ rosar. borraginis buglossæ an. ℥ i. corall. amborum an. 3. ii. spec. diarrhodon ablatis ℥ i. passularum ab arillis mundatarum ℥ i. coriandri præparati 3 β. fragmentorum omnium, margaritar. an. 3 j. β. destillantur.

Aqua multum odorifera.

℥. Basiliconis mentē sampsiuchi Iris balsamitæ hyssopi satuireiæ saluiæ melissæ lauedulæ rorismarini an. m. β. garyoph. cinnamomi nuc. mosch. an. ℥ j. citranguli (citri) n. iiii. aut iij. aquæ rosatæ q. n. terantur & infundantur in aqua per dies tres, postea lento igne destillentur, & destillationi adde musci ʒj. ponas postea ad Solem.

Aqua frangens lapidem.

Succi saxifragiæ ℔. ij. succi mi-

lii Sol. petroselini anisi an. ℔. β. aceti albi ℥ viij. destillantur, da ℥ β. ieiune.

Aqua ad fistulas experta.

℥. Vini albi optimi destillati in vase in quo aqua vitæ destillatur ℔ iij. aquæ rorismarini saluiæ an. ℔. v. sacchari ℔. ij. destilletur in simul iterum, deinde ℥. antheros sol. Saluiæ an. ℥ j. misce per dies 8. cola & serua in vase vitreo, vtere quando opus est.

Aqua ad fistulas artificialis.

℥. Rorismarini lauri anethi apij sylvestris, & domestici receptum an. ℔ j. destillantur, postea adde terebinthinæ ℥ vj. gummi hederæ ℥ iij. thuris ℥ ii. croci mastice cubearum nuc. mosch. myrrhæ galangæ cinnamomi aloes garyop. an. ℥ j. destillantur & bibat. valet etiam contra stomachi passiones.

Aqua faciem dealbans.

℥. Lithargyri argenti ℔. β. triti & cribrati cocti in aceto albo ℔. ij. destillati per filtrum cum spatula miscendo, donec tertia pars aceti minuatur, cui adde caphoræ ℥ β. aluminis laurini, boracis, olei tartari an. ℥ j. deinde cola per filtrum & vbi opus fuerit faciem & collum inunge.

*Aqua ad caput frigidum
qua caput fricetur.*

℥. Aquæ vitæ ℥ ij. nuc. mosch. garyoph. maioranæ, cubearum, piperis longi an. 3 β. terantur & in simul misceantur, caput cafricetur diu, postea ponatur quod in litera S. L. aliqui addunt in aquam euphorbij ʒ s.

BALNEA.

Balnea ad matricem frigidam.

℥. Calamenti pulegii arthemisia, camomillæ meliloti an. m. ij. matricariæ nepetæ an. m. i. Ireos ℥i. bulliant in aqua proiciantur in tineam in qua ieiuna sedeat ad vnam horam, & post prandium ad duas horas, postquam sæpe purgata fuerit.

Balneum ad leprosos.

℥. Scabiosæ fumi terræ anthos camomillæ meliloti an. m. iij. rad. lapacii lb. i. sulphuris ℥4. bulliant postea lauetur corpus cum lotionem. quære in lit. L.

Balneum pro leprosis & fæda scabit infectis

℥. Fumiterre scabiosæ an. m. 2. camomillæ meliloti saxifragiæ an. m. i. rad. lapacii acuti subtil. incisarum & recent. lb. i. piperis longi sinapis aloes nitri ℥i. sulphuris ℥3. coquantur in x. vel xv. lb. aquæ & 3. aceti donec plusquam tertia pars remaneat, & in balneo fricetur, & deinde liniatur cum sanguine leporis in exitu, aut à balneo datheriacam cū vino, postea vngatur vnguento, quod quære in litera. V.

Balnea ad calculum.

℥. Maluæ bismaluæ, brançæ vrlinæ verbenæ camomillæ rad. fœnic. rad. althææ meliloti parietariæ, graminis, agrimoniar. rad. petroselini acori an. m. 3. sem. lini lb. i. bulliant in aqua.

Balneum ad idem.

℥. Violaria maluæ bismaluæ parietaria scolopendria senecio-

nis rad. fœniculi apij petroselini an. m. 2. sem. lini lb. i. s. fœnugræci lb. s.

Balneum in dolore capitis frigidi.

℥. Rutæ saluiæ betonice maioranæ calamenthi hyssopi sticados arab. rosmarini garyophyllatæ, sol. lauri an. m. i. misce fi. sacculus ex quo confice lixium.

Balneum stipticum consolativum ex quo ulcerum lotio fieri potest.

℥. Gallarum nucum cupressi, balaustiarum, cupulorum glandium an. m. i. myrtillorum ℥x. thuris mastiches sarcocollæ an. ℥r. aluminis ℥2. vel plus vt vis videl. 4. consolidæ plantaginis rosarum millefolij centaurij an. m. 2.

Balneum ad imprægnationem.

℥. Myrtillorum rosarum an. lb. s. corticum mandragoræ ℥i. s. gallarum n. xxx.

Balneum ad idem.

℥. Artemisiæ m. 2. sem. papau. alb. ℥2. agni casti, ros. ru. cassiæ lignæ, rad. mandra. an. ℥4. granorum præniæ lb. s. terantur grosso modo in aqua situlis duabus in qua ferrarij extinguunt ferra, in ea mulier sedeat cū tepida est horam vnam ante introitum lecti, mane verò bibat potionem, quam quære in litera P. & pessarium quære in litera eadem, aut puluerem. Q.

Confectio matricalis.

℥. Speciei diamusci dulcis ℥i. diambra ℥3. linguæ avis sem. fraxini rasuræ eboris, nepetæ an. ℥i. sachari dissoluti in aqua matricariæ q. l.

Confectio ad vermes.

℞. Senæ Alexandrinæ ʒ 2. cornu cerni vsti cortic. granat. an. ʒ β. dictāmi, garyoph. Rhabarb. an. ʒ i. centonici ʒ i. β. cinnamomi ʒ 4. sachari in aqua graminis aut absynthij dissoluti.

Confectio bona restaurativa in febribus.

℞. Pulpæ corporis perdicis fassiani aut hædi ʒ 4. amigd. dulc. excortic. ʒ 2. pistachiar. in aqua ros. calida infusarum per horas 5. postea exiccatarum, pinear. similiter præparatarum an. ʒ i. liquiritiæ rasæ ʒ β. passularum, pulpar. sebesten an. ʒ 3. sem. cōmunium maiorum frigid. an. ʒ 2. minorum an. ʒ. β. sachari q. s. fiat confectio in liquida.

Confectio alia ad idem.

℞. Pulpæ quā vis ʒ 4. amygd. dulc. pinearum an. ʒ 6. fisticorum auellandarum an. ʒ β. Specierum aromatici rosati ʒ 2. triasantali ʒ i. ameli ʒ i. gummi dragacanthi arab. an. ʒ 2. liquiritiæ rasæ ʒ β. sachari dissoluti in aqua melissæ q. s. fiat confectio, vt vis.

Confectio ad impregnationem.

℞. Sem. pastinacæ, napi, rasuræ eboris, seseleos, beë vtriusque, linguæ auis an. ʒ β. cinnamomi doronici garyoph. macis galange piperis longi, anthos, xilobalsami, blaccæ byzantiæ, maioranæ pulegij an. ʒ 2. melissæ buglossæ, cortic. citri an. ʒ i. Spica ʒ i. β. ambre margaritarum an. ʒ β. terantur & cum saccharo dissolutio in morsello fiat confectio in morsellis.

Confectio ad vomitum cholericum solutionemque.

℞. Nucleorum granatorum assorum, sumach an. ʒ 3. rosarum spodij santali citrini, Sem. portulacæ an. ʒ i. β. mastiches antofacti cubebarum, cardamomi, ligni aloes an. ʒ i. Syr. myrtini q. s. fiat conditum.

Confectio pro nauigantibus & phlegmaticis.

℞. Garyoph. piperis anisi cumini ligni aloes cardamomi galangæ cinnamomi ʒ 3. an. ʒ i. Semelonum, citrulli cucumeris cucurbite rosarum an. ʒ β. santalorum ʒ 3. macis schœnanthi an. ʒ i. senæ epithymi an. ʒ 3. croci ʒ i. mellis rosarum q. s. fiat elect. da ʒ β. mane ieiunē.

Confectio admirabilis ad tussim frigidam.

℞. Succu liquiritiæ hyssopi capill. veneris an. ʒ 3. cardamomi piperis nigri, an. ʒ i. amygd. amar. sem. vrticæ an. ʒ 4. aristoloch. ro. ʒ 2. mellis despumati q. s. hoc elect. pectus ab omni superfluitate copiosa mundificat.

Confectio turbith ad purgandum humorem tuberositatem, phlegma grossum in scrophulis, bolio, morbo gallico.

℞. Turbith. albi præparati, agarici trochiscati, eliebori nig. i an. ʒ i. β. polypodij ʒ 2. Methridatij Rhabarb. an. ʒ 3. diagridij ʒ i. cinnamomi spicæ an. ʒ. β. sachari q. s. ad incorporationē specierum fiat confectio: in morsellis vel Syr. ros. q. s. ad incorporationem fiat mixtura da ʒ β. plus vel minus vt videbitur in morbo gallico præsetaneū est remediū.

*Confectio euphrasie valens aduersus
oculorum caliginem, eorum sani-
tatem conseruans, visum cla-
rificant, reacuens.*

℞. Euphrasie ℥j. β. cinnamo-
mi cubebæ macis piperis lōgi
garioph. an. ʒj. β. sem. fœniculi ʒ.
β. mellis despumati lb. j. β. succi
rutæ verbenæ an. ʒ. ij. succi cheli-
doniæ ʒ. j. β. bulliant in simul vs-
que ad succorum consumptionē,
postea cætera misceantur, & fiat
confectio da ʒ. j. β. ingressu lecti
continue.

Confectio ad Hydropem.

℞. Specierum diacurcumæ,
dialacæ an. ʒ2. diacymini ʒi. β.
triasandali ʒ2. adip. lupi ʒ2. tro-
chisci de spodio, de berberis an.
ʒ β. sachari dissoluti in aquis en-
diuic hepaticæ an. q. s. fiat confe-
ctio in solida.

CLYSTERES.

*Clyster conferens materiei adusta in
cerebro ut est melancholia, mania,
lupina, &c.*

℞. Fumariæ polypodij senæ
thymi epithymi an. m. colocuin-
tidæ in petia ligatæ ʒ i. agarici
turbith. hermodactyli an. ʒ β. ste-
chad. arab. saluiæ acori maiora-
næ betoniciæ pœoniæ an. m. i. flor.
nenuph. violarum an. ʒi. sem.
end. acetosæ rosarum an. p. mel-
lis violati ʒi. β. salis gemmæ ʒ.
diasenæ ʒi. olei camomelini, mel-
lis colati an. ʒ2. misce & videas
ne debilites, quia forti conuenit,
vide Montagnanum in antido-
tario.

*Clyster forte & diuersum in dolo-
re nuchæ & iuncturarum.*

℞. Fol. collum camomillæ cen-
tauræ an. m. i. rad. cappa. aristo-
loch. Vtriusque gentianæ, rad.
cucumeris asinini vel agrestis a-
na p. i. colocuintidis in petia li-
gatæ ʒ2. bulliant, capiat lb. i.
intus dissoluatur benedictæ laxa-
tiuæ ʒi. olei camomelini, mellis
colati an. ʒ2. salis communis ʒi.
& lac Lanfranci doctrina 2. tra-
ctat ʒ. cap. 17. Sed nota quod si-
cut artificiale est hoc clyster, &
multum conueniens, ita non de-
bet dari, nisi præcedente vna aut
duabus purgationibus.

*Clyster in dolore capitis frigido pleg-
matico.*

℞. Saluiæ vtriusque, stæcha-
dos arabicæ hyssopi maioranæ
betonicæ centauriæ blitis mercu-
rialis an. m. i. colocuintid. in pe-
tia ligatæ ʒ2. agarici aloes an. ʒi.
β. Hiera picra, hiera Logodij, o-
lei de ruta, ros. an. q. s.

Clyster in dolore capitis calido.

℞. Violarum mal. brançæ vr-
sinæ blitis an. m. j. succi mercu-
rialis, cassiæ extractæ an. ʒi β. olei
violati.

Clyster stipticum.

℞. Plantaginis m. 2. rosarum m. i.
sumach, balaustiorum, cupular.
glandium an. ʒi. β. fiat decoctio:
postea adde pul. rosarum ʒ2. se-
ui renum caprarum ʒ2. albu-
minis oui n. i. fiat in parua
quantitate.

*Clyster conueniens apoplexia, paraly-
si, subeth & lethargia.*

℞. Centauræ abrotani cala-
menti organi vtriusque saluiæ
rutæ an. m. i. Sem. maratri anisi

feseleos an. ʒ2. stecados arab. ʒ3.
pulpę coloquintid. in petia liga-
tā ʒ2. agarici ʒ1. β. cassię ext. ʒ11.
Hierę picrę Gal. salis gemmę,
olea, & possunt addi de casto-
reo ʒ2. β. & erit melius & for-
tius.

Clyster conueniens paralytico.

℞. Saluię rutę siccę stecad. a-
rab. malux mercurialis centau-
reę camomillę furfuris an. m. i.
Hierę picrę, benedictę Hierę
Logodij, mellis rosati colati, cas-
się, olei communis, vel camo-
meli, salis communis, potest e-
tiam addi sem. anisi fœniculi ci-
mini ʒ1. & erit fortius.

*Clyster carminatiuum ventosita-
tis.*

℞. Sem. anisi fœniculi, anethi
carui cymini an. ʒ1. rutę absyn-
thij origani calamenthi centau-
reę an. m. β. camomillę melilo-
ti, rad. althę furfur. an. m. i.
Sem. lini fœnugręci an. ʒ. i. β.
mellis rosati colati, cassię Hie-
rę picrę, benedictę, olei de ruta,
anethini camomelini, salis com-
munis, possunt etiam addi bacca
lauri, ameos cartami polypo-
dij, & erit melius etiam cum
electuario Indo & de baccis
lauri, & diaphœnicone an.
q. s.

*Clyster in colica phlegmatica ven-
tosa cum magno dolore appro-
priate va-
lens.*

℞. Polypodij quercini ʒ3.
folliculorum senę ʒ2. β. salis
gemmę ʒ6. seminis cartam

ʒ1. agarici turbith an. ʒ2. sem.
anisi fœniculi cymini carui an.
ʒ1. thymi epithymi an. ʒ2. ʒ3.
galangę an. ʒ1. β. aquę lb. 10.
in qua bulliat antiquus gallus
virgis cęsus & euisceratus, cum
supra scriptis vsque ad consum-
ptionem medietatis, sed vlti-
mo addatur thymus epithy-
mus sena, misce, fiat clyster, &
da clyster hoc cum oleo de
Sem. lini & electuario Indo
diaphœniconis. Clyster hoc
etiam potest dari in potione
ʒ5. cum electuario Indo aut
diaphœnico. Sed melius esset
quod ante daret aliud clyster
cum herbis, Hiera picra, ad in-
testina mundificanda, quia hoc
remouet dolorem. In summo
etiam dolore dedi, decoctio-
nem cymini carui ameos anisi
fœniculi, facta in solo oleo ane-
thino, & expressa, bene con-
uenit.

*Clyster confortatiuum abstersiuum
& confortati-
uum.*

℞. Vini albi odoriferi ʒ8. v-
rinę pueri ʒ4. vel 6. mellis
colati & despumati ʒ3. salis
communis ʒ1. β. olei commu-
nis ʒ3. confert ad sequentia.
Clyst. hoc pulchrum dari de-
bet quibus intestina phlegma-
tis viscosi plena sunt & obtu-
sa, quibus cachecticum est cor-
pus & ad hypofarcam tendens,
factis tamen antea vniuersalibus
purgationibus.

Clyster elegans ad validitatem & firmitatem intestinorum.

℞. Violarum endiviæ lactucæ, nenupharis, solatri an. m. i. bulliāt adde olei violati de papauere nenupharini, de cucurbita Syr. violati an. q. f.

Clyster in schiadica.

℞. Centauræ abrotoni an. m. i. acori ℥ 2. vtriusque stœcados an. p. i. meliloti camillæ bliti mercurialis an. m. i. Sem. saxifragiæ anisi an. ℥ 3. milij solis ℥ j. β. bulliant: addantur Hiera Logodij: benedictæ laxat. an. ℥ β. Hermodactyli sub. puluerisati ℥ 2. olei liliorū camomelini mellis despumati cōmunis an. ℥ i. salis gemmæ ℥ 2. da semel aut bis in hebdomada.

Clyster ad lethargiam & subeth.

℞. Bliti meliloti chamemeli, anethi an. m. i. polypodij ℥ 2. helleb. nigri ℥ β. mellis salis, olei cōmunis, potes addere agaricum & coloquintid.

Clyster in tympanite cum caliditate.

℞. Camomillæ, meliloti anisi fœniculi tribulorum an. m. i. bulliant ol. camomel. anethini, de lilio q. f. mellis, salis, &c.

Clyster vltimum sedans dolorem & ventositatem in colica.

℞. Rutæ ℥ β. bulliant in oleo de sem. lini aut anethini q. f. capiantur ex eo ℥ 4. deinde intus dissoluatur castorei ℥ j. opoponacis Serapini an. ℥ β. plus & minus de istis duobus vt videbitur opij grana 7.

Clyster stipticum consolidatinum vlceris intestinorum.

℞. Eupatorii rosar. ambar. barbæ hircinæ an. m. i. arnoglossæ, plantaginis an. p. i. cupulorum

glandium ℥ 2. β. risi ℥ i. β. coquantur in aqua q. suf. capiat tb. β. in quo dissoluatur puluis iste. ℞. thuris sang. draconis cerussæ lithargyri boli mastice an ℥. i. opij ℥ β. vitelli duorum ouorum misce. fiat clyster.

Clyster soda calidæ & phrenesi somniferum.

℞. Florum violarum nenupharis an. m. i. sem. communium frigid. cum corticibus contusorum an. ℥ 2. herbarum violariæ maluæ, Mercurialis an. m. i. β. olei violarum nenupharis an. ℥ j. β.

Clyster conferens Cephalicæ, subeth, lethargiæ, scotoniæ, vertigini, epilepsie attrahens phlegma & melancholiam a capite.

℞. Gentianæ peucedani Ireos aristol. rotun. acori rad. pœoniæ an. m. i. arthanitæ p. β. cubebarum calami aromatic. hyssopisefamecos leuistici an. p. i. Sc. althææ maluæ lini an. ℥ 2. hellebori nigri ℥ j. β. foliorum sennæ ℥ i. thymi epithymi an. p. i. hyera Logodij Hieraruffi, cassiæ extractæ, olei anethini, in diebus frigidis vesp̄i calidis mane ponatur.

Clyster ad omnem dyscrasiam sensuum.

℞. Stœcados origani folij, maioranę betonicæ saluiæ rorismarini an. m. i. β. fol. hederæ lauri, hyssopi, cupatorii melissæ an. m. i. rad. apij acori pœonię an. p. i. polij montani m. 2. electuaria olea adde vt vis.

Clyster

Clyster euacuans materias calidas à pectore, thorace, stomacho & ventre inferiori.

℞. 4. Sem. maio. friz. an. p. i. sem. portulacæ lactucæ an. ʒ 2. endiuæ acetosæ scariolæ cuscutæ an. ʒ i. maluæ bliti violariæ, mercurialis an. m. i. electuarij de psyllio cassiæ extractæ olei violati communis.

Clyster conferens dolori intestinorum ventoso & phlegmati mucilaginoso.

℞. Centauræ folij chamætryos chamæpitheos Iuæ, rutæ absynthij an. m. ss. cam. meliloti anethi an. m. i. sem. carui rutæ cimini anethi lini apij an. p. i. polypodii ʒ 2. agarici ʒ 2. electuarij de costuni, de baccis lauri, Elefscop. Indum, de dactylis, salis gemmæ, Indi an. ʒ ss. olea anethi &c. da vt supra.

Clyster ad omnes passiones iuncturarum vt sciatica, podagra, gonagra à materia frigida.

℞. Herbæ paralyfis iuæ stecad. arad. Betonica pulegij saluiæ rorismarini melissæ fol. hederæ an. m. i. agarici ireos hermodactyli an. ʒ i. colocynthid. in petia ligatæ ʒ i. ss. vtriusque aristoloch. an. p. ss. polypodij folliculorum senæ an. ʒ i. sem. carthami epithymi an. ʒ 4. electuaria, olea quæuis, & amigdal. dulcium.

Clyster ad prafocationem matricis, menstrua alba, sterilitatem, à materia frigida aquosa.

℞. Matricariæ mellissæ rutæ scabiosæ anthos abrotani peucedani an. m. i. sem. ameos seseleos amomi an. ʒ i. baccarum

lauri ʒ 2. calami aromatis cassiæ lignæ corticum cassiæ fistulæ sem. an. ʒ 4. cimini anethi anisi an. ʒ j olei de costo, de ruta, elect. de baccis lauri, benedictæ, bis in hebdomada clysterizentur, deinde dum vadit dormitum fumiget se hoc fumigio. ℞. aliptæ muscatæ confectionis neræ an. ʒ 2. galliæ muscatæ, storacis calamitæ an. ʒ 3. aluminis crudi ʒ i. ss. pulueriscentur omnia per se vel cum succo matricariæ fiant trochisci dosis ʒ i.

Clyster conferens schiaticæ.

℞. Foliorum hypericonis, camomillæ, centauræ maluæ anethi an. m. i. Sem. lini fœnugræci an. ʒ i. rad. bryoniæ ʒ i. anisi ʒ i. ss. colocynthid. in petia ligatæ ʒ 2. olei amigd. amaran. ʒ 2. mellis despumati ʒ i. Hieræ picræ benedictæ sal gemmæ &c.

Clyster in passione renali expertum

℞. Maluæ mercurialis blit camomillæ meliloti rad. althea an. m. i. parietariæ senecionis an. m. ss. furfuris macri p. i. sem. lini fœnugræci an. ʒ i. bulliant in aqua qu. suf. pro clystere capiantur lb. i. in qua dissoluatur cassiæ extractæ ʒ i. ss. benedictæ ʒ 3. vitelli ouorum n. 2. olei camomelini anethini violarum an. ʒ i. sacchari ʒ ss. misce, fiat enema.

Clyster vnum nobile & expertum ad dysenteriam & rasuram intestinorum.

℞. Hordei lentium excorticatarum omnium afforum balaustrorum, corticum mali granati, sem. myrthi an. ʒ ii. os. rub. ʒ i. bulliât in aqua chalibcata q. s. p. clysteri

accipiantur ꝯ8. intus addatur seui caprarum ꝯ1. boli ꝯ2. gummi arabici, dragaganti, acacię, assorum an. ꝯ4. cerussę ꝯ1. vitelli oui assati n. i. misce fiat enema.

Clyster ad spasmodum & paralyfin ex repletionem.

℞. Camomillę meliloti stecados arab. irię chamępithyos muscatę anethi an. m. 3. rad. enulę ꝯ1. ebulorum ꝯ2. maioranę prassii saluię nepetę matricarię rutę an. m. i. anisi cimini an. ꝯ2. castorei gr. 6. theriacę ꝯ4. mellis ꝯ3. ping. vulpinę ꝯ6. olei camomelini anethini, de lilio an. ꝯ1. β. caput vnius castrati aliquoaliter contusi, bulliant omnia simul in aquę s. q. vsque ad consumptionem medietatis fortiter colentur, ex colatura capiatur ꝯ12. vini odoriferi ꝯ3. iterum parum bulliant & administra quia expertum est.

Clyster in febre acuta & phrenesi.

℞. Violar. lactucę papauer. albi maluę an. m. i. nenupharis, semperuius, solatri an. m. β. olei violati nupharini an. ꝯ1. β. sachari violati ꝯ6. salis ꝯ1. adde si lubet decoctum bliti lb. i. olei violati qu. suf.

*Clyster ad illum quem post sedę pun-
ctio intestinorum sequitur ex acui-
tate materię unde sequitur
excoriatio.*

℞. Adipis renum caprarum ꝯ3. β. vrsi ꝯ1. hordei excorticati mundi ꝯβ. decoquantur sine sale in s. q. aquę capiantur ꝯ8. chalibeatur, postea addatur vitelli oui assi dissoluti in oleo rosato, Sief albi ꝯ3. misce fiat enema, de Sief albo lege in litera. S.

Clyster magistrule in torsione & colica.

℞. Caput vnius castrati ferro aliquoaliter contriti, camom. meliloti, anethi, rad. altheę, parietarię maluę an. m. i. Sem. fęniculi cymini carui an. ꝯ1. β. bulliant omnia in simul cum s. q. aquę vsque ad cocturam carnis, de qua colata capiatur lb. i. in qua dissoluatur olei camomelini, anethini, rutacei, mellis rosati ana ꝯ1. vitelli ouorum duorum, electuarij Indi, de dactylis, Hierę picrę, benedictę laxatiuę vt vis.

COLLYRIUM.

Expertum ad surditatem.

℞. Folio. saluię stęcados arabic. lauri an. ꝯ1. ellebori albi ꝯβ. castorei gr. 6. baurach ꝯβ. euphorbij gr. 2. Coloquintidę gr. 4. olei amigdal. amar. de spica odorifera an. ꝯ1. succi raphani ꝯ1. β. vini albi ꝯ3. terenda terantur & bulliant vsque ad vini consumptionem colentur, intus addatur musci gr. 2. misce, ponatur ad vitrum.

Collyrium album ad oculorum inflammationem.

℞. Cerussę ablutę ꝯβ. gummi dragaganthi arab. an. ꝯ2. amyli cretę marinę an. ꝯ6. misce omnia simul cum aqua ros. q. suf. deinde extendatur super pannum & fronti applicetur.

Collyrium ad idem.

℞. Cerussę ablutę ꝯβ. sarco. collę nutritę in lacte mulieris gummi arabici dragacanthi an. ꝯ2. opij ꝯ1. aquę rosatę fiat vt supra.

*Collyrium ad idem multoties
probatum.*

℥. Farinæ hordei cretæ mari-
næ an. ℥. i. β. boli armeni ʒ 6. gū-
mi arabi. dragracant. an. ʒ 2. Cā-
phorē ʒ 2. aquæ rosatæ plantag.
an. q. suff. fiat in forma empla-
stri.

*Collyrium Mesue nobile visum acūes
& conseruans.*

℥. Succī fœniculi rutæ an. ℔. i.
vini granatorum ℔. β. mellis ʒ i.
β. misceantur & stent ad solem
per menses tres aut super fornacem
in hyeme, vitro in arenam
sepulto, deinde fæces abiiciantur,
residuum seruetur, & oculis duæ
guttæ ponantur in vno quoque
oculo bis in die diebus 30. con-
tinuis.

*Collyrium ad interficiendum ver-
mem in aure.*

℥. Succī foliorum persici vel
persicariæ aut succī absynthij ʒ i.
ellebori albi ʒ 2. coloquintidæ ʒ i
tepidum auribus imponatur.

*Collyrium expertum ad sibilum &
tinnitum aurium.*

℥. Olei nardini facti secundum
artem & non per infusionem ʒ 3.
olei de orig. ʒ 3. pul. coloquintid.
subtilis ʒ 5. origani, ligni aloes an.
ʒ 3. bulliant omnia vsque ad con-
sumptionem tertiæ partis: bis per
pānum spissum coletur, & ad vi-
trum ponatur, & gutta vna aut
duæ auribus imponantur, & nota
quod nullum medicamen auri-
bus imponatur nisi præmissa eua-
cuatione, deinde auris bene mū-
detur, postea nihil frigidum aut
calidum sed tepidum impona-
tur, neque sit multæ quantitatis,

quod auribus imponitur, sed
gutta vna aut duæ, non plus.

*Collyrium ad lacrymas oculo-
rum.*

℥. Myrrhæ electæ ʒ β. lapidis
hamatitidis ʒ i. succi tenerrima-
rum partium, rubi & extrema-
tum partium rosarum an. ʒ i. bul-
liant in ampulla clauso orificio in
caldario aquæ bullientis vsque
ad consumptionem medietatis,
coletur & ponatur vna gutta ta-
ctu frigida in oculis quater in
die, frons autem sero in introitu
lecti vngatur succo rosarum.

*Collyr. sublime & expertum ad a-
cuendum visum.*

℥. Aquarum rutæ chelidoniæ
euphrasiæ an. ʒ iiii. succi fœniculi
verbenæ an. ʒ i. β. fellis luscij ʒ vj.
ligni aloes subtiliss. triti ʒ j. Sem.
rutæ, chelidoniæ maioranæ an. ʒ i.
pulueris sand. pulueriscentur, &
omnia in simul ponantur in vase
vitreo bene obturato & pasta
molli circumuoluto, deinde po-
nantur in furno bene calido post
extractionem panis per diem na-
turalem, quo elapso extrahatur,
postea deponatur orificio be-
ne clauso & ad solem per dies
cōponatur, vltimo per pannum
spissum bene coletur, de quo
collyrio ponantur guttæ duæ
in vnoquoque oculo bis in die
22. supra, supinus iaceat, die-
bus xx. continuis, & laudabis
effectum.

Coll. ad lacrymas oculorum.

℞. La. id. hemathitis decies in aqua frigida præparati ℥ij. rosarum spodii corallorum amborum carabe Mirabolano. citrin. an. ʒj. succi extremitatum rubi ℥viii. fiat alcohol. omnia, & misceantur cum succo stent diebus x. ad solem vel fornacem, & de collyrio illo bis in die in oculos guttæ ij imponantur.

*Collyr. dolorem sedans & incarnans
ulcus vesicæ, & per syringam im-
mitti debet.*

℞. Cerussæ sarcocollæ thuris, gummi arabici, amyli opij sanguinis draconis an. ʒß. terantur ut alcohol: postea cum lacte mulieris qu. suff. fiat collyrium non multum spissum nec multum liquidum, sed antequam ponatur hoc collyrium, intromittatur per syringam aquæ mellis mixta cum aqua decoctionis apij & sem. lactucæ & cucurbitæ.

*Collyr. nobile ad idem dolorem sedans, & ulcera mundificans
una cum urinae prouocatione.*

℞. Hordeum bullitum cum aqua donec aliquantulum tumescat, oletur, capiatur lb. j. de illa aqua, in qua ponantur ℥iii. mellis & pulueris huius subtilissimi ℞. gummi arabici, tragacanti thuris, sanguinis draconis, opij papaueris albi, Sem. lactucæ melonum cucurbitæ an. ʒiij. bulliant item omnia in simul colentur, & per spongiam tepide proiciantur.

Collyrium nobile ad ardorem urinae.

℞. Sem. papaueris albi ℥iij. pascuntur perfectæ, ita quod humi-

dum fiat in modum olei, deinde addatur opii ʒi. olei violati ℥iii. omnia ad ignem calefiant spatula bene agitando, postea ponantur ad sacculum, & torculari exprimantur per syringam ponantur.

*Collyr. album expertum M. Petri
Cathelani ad rubedinem oculorum
& pruritus.*

℞. Cerussæ lotæ in aqua rosata ʒv. amyli ʒiii. gummi arab. dragacanthi an. ʒii. camphoræ ʒß. aquæ rosar. lb. i. fiat collyr.

*Collyrium ad dolorosum ulcus virgæ,
renum & vesicæ.*

℞. Lactis mulieris ℥ij. emulsionis 4. sem. com. frig. maior. ℥j. cerussæ amyli an. ʒj. per syringam ponatur.

*Collyr. expertum ad oculorum socor-
tium.*

℞. Liquoris qui emanat ab hepate hirci dum assatur in veru ℥j. thutia præparata ʒi. lucij sarcocollæ nutritæ in succo fœniculi an. ʒj. fiat alcohol & teratur ad radios solares, vel in hyeme ad fornacem iij. hebdomadas, & de hoc collyrio ponantur ii. guttæ actu frigida in oculos ter in die: expertum & singulare est.

Collyrium expertum ad surditatem.

Origani pulpi coloquintid. serpilli, maioranæ an. ʒiiij. hellebori albi ʒij. musci ambræ an. ʒj. cubearum ladani macis, storacis calamitæ an. ʒß. terantur omnia per se, & ponantur in ampulla vitrea, deinde addatur olei amigd. amar. liliorum alborum

an. ʒv. bene obturetur & ponatur per horas ij. in caldario aquae bullientis, deinde singulis diebus ter ponantur guttæ duæ in vnaquaque aure.

Collyr. ad idem cui par non reperitur.

℥ Alcool aloes colocintidos an. ʒj. euphorb. j ʒß. cum felle vaccino fiant trochisci exiccati, quorum vno quando vti volueris cum succo raphani fiat collyrium iij. in die tepidum imponatur.

Collyrium ad fistulam in oculo.

℥. Antimonij thutiae præparatæ: an. ʒj. sarcocollæ in lacte mulieris nutritæ ʒv. lini sanguinis draconis spodij dragaganthi torrefacti, scorix ferri præparatæ an. ʒiii. aquarum rutæ solaris chelidonis an. ʒi.ß. fiat Sief cum succo rutæ, ponatur in oculo, deinde supponatur emplastrum, hoc ita, quod locum bene tangat. Quære in litera E.

Collyrium expertum & indubium ad imagines oculorum.

℥. Maioranæ fœniculi basiliconis recentium an. ʒi. rutæ ʒß. Vini montani subtilis & clari lb. ß succi euphrasie veleius aquæ ʒiii. ponantur in vase vitreo obturato in caldario aq uę fortiter bullientis per horas ij. postea ad radios Solis exponantur diebus xx. cum ʒi. thutię præparatæ, & ex hoc liquore ter ponantur in die guttæ duæ: in vnoquoque oculo exterius epithementur in introitu lecti cū tela in hoc collyrio madefacta.

CAPVT PURGIVM
SIVE NASALIA.

Caputpurgium ad sedam antiquam phlegmaticam ventosam, dolorem oculorum & tinnitum aurium.

℥. Fellis tauri myrrhæ aloes an. ʒj. musci gr. iij. fiant pilulæ, & cum necesse fuerit dissoluatur vnà cum aqua saluæ, aut alia, quamuis naribus attrahatur mane ieiune.

Caputpurgium ad antiquam hemi-craniam.

℥. Opoponacis fellis lucii vel alterius piscis an. ʒiii. lentium amararū ʒv. Serapini origani an. ʒi.ß. pilulæ ex quibus capiantur ad quant. iij. gran. hordei naribus attrahatur.

Caputpurgium vocatur omne quod caput purgat, & specialiter illud ponitur cum nasalium aut alio aliquo modo vel ingenio, per quod purgatur materia ventosa aut humoralis. Scias præterea, quod ex istis pulueribus linimēta nasalium canonice facere potes, ideo sub hoc capitulo caputpurgia omnia sub omni forma continentur.

Caputpurgium mirabile expertum ad debilitatem visus, tenebrositatem panum & lacrymas.

℥. Succorum rutæ, & eupatorii cichoreæ chelidonis euphrasie fellis tauri gruis aut luscii an. ʒß. naribus attrahatur, factis purgationibus cum pilulis cochiis: attrahatur autem bis aut ter mane ieiune in hebdomada.

*Caputpurg. scilicet & expertum ad
corroborationem omnium sen-
sum.*

℞. Agarici electi ℥iij. musci
ambrae an. gr. v. cubearum ligni
aloes an. ℥j. terantur & infun-
dantur in aqua ireos & sic exsic-
centur, & fiant trochisci, quorum
vnus parvus ieiune masticeetur &
miraberis effectum.

*Caputpurg. in materia phleg-
matica.*

℞. Fellis vaccini luscij aut ca-
prini opoponacis an. ℥ij. casto-
rei gr. v. croci ℥ss. fiant magda-
lones, & cum vti volueris dissol-
ue ex eis gr. vj. cum aqua maio-
rane, aut da in puluere.

Caputp. in dolore capitis frigido.

℞. Succu bliti Maiorane ana-
gallo an. ℥ss. aromatizetur cum
puluere nucis musc. cubearum
an. ℥j. misce, potest etiam addi
succu caulium, ac parum succi
cyclaminis, quod licet forte sit,
vidi tamen digna experientia in
vno congelato, cui optime suc-
cessit, ideo in tali casu vti potes
securè.

Caputp. nobile ad idem.

℞. Aquæ mellis ℥iij. succu bli-
ti depurati ℥j. ss. nigellæ præpara-
te vt supra, nucis musc. cubearum
an. ℥ss. vini albi odoriferi ℥ss.
misce, trahatur per nares, quod
si fortius cupis adde condysi (o-
strutii) ℥j.

Caputp. superinfluitatis cerebri.

℞. Succu maiorane, succu me-
diarum corticum sambuci an. ℥j.
pulueres condysi vel piperis vel
castorei, vt ere vt vis.

Caputp. elegans.

℞. maioranæ melissæ anthos

an. ℥ss. lauendulæ cardamomi cu-
bebarum spice nardi piperis lon-
gi an. ℥ss. cum ladano cera & te-
rebinthina fiant nasalia.

C E R O T V M.

*Cerorum nobile & expertum ad
scrophulas.*

℞. Galbani opoponacis bdel-
lij serapini ammoniaci in aceto
infusorum an. ℥j. gummi elemi
℥j. ss. picis naualis terebinthine
resinæ pini, visci quercini, sordi-
ciei vasorum, apij an. ℥iij. rad.
harundinis laparij calamenti an.
℥ss. axungia porcina, olei lilio-
rum cælestium an. ℥iii. cere q. s.
fiat ceratum quia certe est artifi-
ciale, præmissis purgationibus.
Elegantem quære supra in lite-
ra C.

*Cerorum ad callos mundificandos
pulchrum.*

℞. Limatura panis ℥ss. picis q.
suf. pix liquefiat & misceatur in
simul postea applicentur, quia
mollicabit.

*Cerorum supra commissura coronali
applicandum, raso antea capite,
& posita ventosa absque sca-
rificatione ita vt locus ru-
beat, valens mirabi-
liter ad decur-
sum cathar-
ri.*

℞. Ladani, gummi elemi,
sandarachæ, olibani, storacis ca-
lamitæ, resinæ, storacis liquidæ
an. ℥ss. myrrhæ ℥ij. & cerorum
excellens est.

*Cerotum ad idem præstantius ad descensum phlegmatis viscosi mucilaginosi versus palatum, nares & fauces, ex quo time-
tur suffocatio.*

℞. Resinæ claræ & electæ ℥ij. ladanii ℥j. myrrhæ masticis an. ʒj. sandaracæ ʒij. gummi dissoluantur in aqua cicerum ʒj. & acetii ℥ss. deinde coquantur & cū ceræ ʒvj. fiat cerotum, quod extendatur super panno grosso calido, tota caluities emplastretur, cum ipso multos homines vidi ab imminente periculo subitæ suffocationis fuisse liberatos, sed caput antea radatur.

Cerotum cordiale.

℞. Been vtriusque, doronici ossis de corde cerui, fragmentorum hyacinthi, smaragdi saphiri an. ʒi. margaritarum ʒij. fol. auri n. x. resinæ electæ & coctæ in aceto rosaceo ʒx. infusionis dragacanthi in aqua rosarum muscata qu. suf. fiat cerotum supra panno de grana extensum, continuo portetur supra māmilla sinistra, quia pulchrum est.

Cerotum elegans ad duriciem splenis.

℞. Ammoniacy ʒvj. bdellij ʒiij. dissoluatur in aceto squillitico tamarisci ʒj. ss. Scolopendriæ Se. agni casti, plantag. anethi an. ʒss. ceræ qu. suf. resinæ parum fiat cerotum.

Cerotum ad dolorem sciaticæ excellent.

℞. Ammoniacy ʒj. ss. serapij bdellii opoponacis j. zarthanictæ, pæoniæ hermodactylor. an. ʒss. vitrioli ʒj. ceræ & resinæ an. q. suf. fiat cerotum.

Cerotum ad nodum iuncturarum.

℞. Oxycrocei ℥ss. emplastri de mucilaginibus ʒvj. euphorbij ʒj. Serapini opoponacis ammoniaci an. ʒj. dissoluantur in aceto forti resinæ electæ ʒvj. caræ albæ ʒiij. fiat cerotum.

Cerotum ad dissoluendam natam.

℞. Ammoniacy ʒj. ss. pyrethri euphorbij an. ʒj. salis nitri ʒss. resinæ ceræ an. q. s. fiat.

Cerotum calidum pro stomacho.

℞. Masticis cinnamomi gariofil. ligni aloes spicæ, calami aromatici, galangæ an. ʒj. ss. sandal. ambor. coriandri præparati, seminis acetosi an. ʒj. galliæ muscat. aliptæ muscat. ladanii an. ʒss. cum cera & parum resinæ, & oleo de menta an. qu. suf. fiat cerotum, aromatizetur cum gr. iij. musci.

Cerotum stomachale fluxum dysentericum & vomitum ultimum stringens.

℞. Picis naualis resinæ an. ʒj. masticis mentæ gariofil. an. ʒss. trochisc. de carabe de bolo, de terra sigillata lapidis hæmathitis, sanguinis dracon. hypocyf. mumie an. ʒj. galliæ musc. storacis calamentæ an. ʒij. vini citoniorum q. suf. fiat & ceræ q. suf. cerotum.

Cerotum ad stomachum debilem, sitim, mordicationem, vomitum nimium, à calore proueniens ex febre.

℞. Rosarum spodij, masti

coriandri myrtillorum hypocy-
stidis acaciæ veruicis sanguinis
draconis an. ʒj. ladani ʒiii. gal-
liæ muscatæ ʒii. picis naualis re-
sinæ an. ʒv. ceræ qu. suf. fiat ce-
rotum quod bulliat in ʒvi. vini
citoniorum vsque ad vini con-
sumptionem & vtere quia pul-
chrum est.

Cerotum ad stomachum frigidum.

℞. Gallia musc. alyptæ muscat.
an. ʒii. ladani ʒi. mastice macis
storacis calamitę gariof. nucis
moschatæ cinnamomi electi an.
ʒß. ligni aloes ʒii. corallorum
amborum an. ʒi. Spicæ nardi ca-
lami aromatici, Spicæ celticæ an.
ʒi.ß. absynthii mentæ an. m. ro-
sar. rub. Sem. citoniorum myr-
tillorum an. ʒii. grana paradysi
ʒi.ß. abrotani calamenti an. p.i.
galangæ ʒʒ. an. ʒii. thuris cype-
ri an. ʒi. croci ʒi. olei citoniorum
de mastice, de absynthio an. ʒii.
ceræ q. suf. fiat cerotum.

*Cerotum pro renibus utile atque mi-
rabile ad prohibendum abortum, de
quo vidi utilia, & præcipue in
uxore Illustriss. principis
Sabaudia ducis Phi-
lippi & aliis
matronis.*

℞. Mastice electi ʒi. ladani ʒvi.
rad. bistortæ, nuc. cyßi hypocy-
stidis acaciæ sanguinis draco-
nis rosar. rub. corall. rub. sanda-
lor. coriandri præparati galliæ
mosc. terre sigillatæ an. ʒii. olei
oliuarum ʒß ii. substitui possunt
olea huc facientia, in minori
pondere, terebinthinæ parum
ceræ q. s.

*Cerotum ad fluxum matricis album
expertum.*

℞. Galbani ʒii. opoponacis
ʒß. sandaracæ thuris hypocy-
stidis an. ʒi. gummi dissoluantur in ace-
to rubeo, & cætera addantur, po-
stea liniantur super corio & seri-
co interbastetur ad quantitatem
vnius nebulae, & miraberis ope-
rationes.

DESTILLATIO.

*Destillatio mater omnium medica-
minum ad cunctas nervorum
passiones.*

℞. Myrrhæ electæ, aloes he-
paticæ, spicæ nardi sanguinis
draconis, thuris mumia carpo-
balsami, mastice, gummi arabici,
storacis liquidę rubæ an. ʒi.ß.
bdellij opoponacis, sarcocollæ
an. ʒvi. croci ʒß. musci ʒi. herbæ
paralysis ʒii. ladani ʒiii.ß. tere-
binthinæ ad pondus omnium, de-
stillentur per balneum Mariæ, &
liquor seruetur in vase vitreo, ex
quo nucha dorsum iuncturę bis
in die liniantur, quia expertum
est, & præcipue in materia frigi-
da, vera descriptio est in Mesue
cap. de passionibus cordis.

*Destillatio experta in ulceribus re-
num & vesicæ Domini Cardina-
lis Tritelli.*

℞. Caudę equinæ plantaginis,
ros. rub. maluaufci, gran. alker-
mes liquiritiæ rasæ ana ʒi. iuiu-
barum Sebesten ana ʒvi. boli ar-
meni ʒß. quatuor sem. frigid.
maior. mundatorum an. ʒiii. se.
papau. albi ʒvi. citoniorum ʒß.
seri caprini ʒß. vj. stent per duos
dies

dies in infusione, postea secundum artem destillentur, da repide ieiune ℥ iij. quamdiu durat.

DECOCTIO.

Decoctio ad dolorem dentium.

℥. Piperis longi cubebarum, staphysagriae cortic. rad. mori. rad. cappar. rad. mandragoræ an. ʒj. hyoscyami albi ʒ.ß. pyrethri ʒi.ß. terantur & bulliant in vino nigro q. s. vsque ad ℥ i. deinde in ore teneat, quia expertum est si reiteratur sæpe calid. fuerit.

Decoctio pectoralis siccitatem faciliat.

℥. Hyssopi m. i. violarum ʒj. sem. papau. albi ʒß. malua cucurbita lactuca an ʒij. capill. veneris fursurellæ an. m. i. hordei mundi p. i. liquiritiæ ʒj. ficum dactylorum an. n. vj. passularum ʒvi. Iuiubarum sebesten an. n. x rad. Ireos enulæ, altheæ an. p. i. sem. vrticæ ʒj.

Diazinziber elegans confortatiuum & solutiuum.

℥. ʒß. b. albi ʒj. liquiritiæ rasæ ʒß. garyo. h gran. paradyf. macis cardamomi, cubebarum an. ʒj. turbith. ʒij. scammonæ ʒß. sacchari q. s. da ʒß. vel ʒv.

ELECTVARIVM.

Electuarium Nephriticis sanguinem purum & guttatim mingentibus sequente dolore & ardore.

℥. Pinearum mundatarum amigd. dulc. an. ʒß. sem lini, dragacanth. assorum an. ʒij. succi liquiritiæ ʒi.ß. herbæ pentaphyl-

lon. p. i. solatri, melonum citrulli cucurb. cucumeris an. ʒj. sem. altheæ portulacæ, papaueris albi, acetos. boli, spodij an. ʒ.ß. sem. bombicis, apii anisi petroselini an. ʒij. lactuca hyoscy. an. ʒj. opij ʒj. cum syrupo de liquiritia fiet electuarium. da ʒß. cum aqua alkekengi & arnogloss.

Electuarium in hydrope frigida.

℥. Masticis aristolochiæ longæ costi spicæ calamenti asari galangæ, ʒß. sem. maratri anisi apii squinanthi lacca, piperis longi, garioph. cubebarum eupatorii folij an. ʒß. croci absynthii an. ʒj. myrrhæ gentianæ an. ʒß. Rheubarb. elect. ʒß. cum syr. de eupatorio q. s. fiat electuarium, da ex eo vsque ad ʒß. mane ieiuno, quia pulchrum est & solutiuum.

Electuarium ad idem nobile & pulchrum in cachexia stomachi & hepatis.

℥. Masticis cinnam. ʒß. b. garyoph. squinanthi sem. anisi maratri, rad. azari, herbæ absinthii an. ʒij. Rheubarb. el. ʒ. v. costi spicæ lacca cassiæ lignæ, aristol. rotund. sem. apij an. ʒj. croci calamenti, cardamomi an. ʒß. syrurup. de eupat. q. s.

Elect. in mala dispositione calida stomachi & hepatis.

℥. Vini granatorum acetosorum ℥j. zuchari ℥.ß. coque ad spissitudinem: postea ℥. rosarum spodij sandal albo. an. ʒij. masticis dragacanthi an. ʒß. carabegalliæ moschat. an. ʒj. ligni aloes cinnam. an. ʒii. croci ʒß. camphoræ gr. viij. fiat elect. da cum aqua

frigida quam vis, si addes frag-
menta auri & alia cordialia tunc
in peste nobile erit.

*Elect. in mala dispositione Stomachi
frigida humida, vomitu, ventosi-
tate, defectu appetitus, debi-
litate cordis, senibus pro-
priè valet.*

℥. Mastichis ʒʒb. cinnam. ga-
langæ, calami aromatici, carda-
momi, mentæ, an. ʒi. β. croci ʒβ.
ligni aloes ʒi. β. spicæ piperis ni-
gri azari macis, cubearum cas-
siæ lignæ, galliæ mosch. sem. a-
nisi an. ʒij. musci gr. vj. syr. cito-
neorum, siue de menta q. s. fi. e-
lect. da ʒiiij. ieiune cum vino albo
quia pulchrum est elect.

Elect. ad idem.

℥. Mastichis ʒʒb. cinnam. spicæ
cassii lignæ an. ʒij. β. garyoph.
asari galangæ, calami aromat. s.
anisi herbe menthæ an. ʒij. pipe-
ris vtriusque, cardamomi folij,
carui ciperi ameos macis an. ʒjβ.
croci ʒ. β. ligni aloes, costi, cu-
bebarum, sem. apij cumini, ma-
ratri an. ʒj. galliæ moschat. ʒij.
musci gr. vj. cum syr. de mentha
q. s. fi. elect. nobile certe est.

*Elect. ad sputum sanguinis & vl-
cus siue vulnus pectoris, phthisicis
quoque valens.*

℥. Spodioboli an. ʒj. cancro-
rum vstorum ʒi. dragacanthi
myrtillorum amyli sem. cuscu-
tæ maluæ arnoglossæ nucleorum
passularum omnium assorum an.
ʒβ. syr. myrtini q. s. fi. electua-
rium da ʒi. aut ij.

Electuarium ad idem.

℥. Cancrorum vstorum β ʒ.
succu liquiritiæ ʒij. dragacanthi

ʒj. sem. portulacæ arnoglossæ
maluæ cucurbitæ cucumeris me-
lonum citrulli antheræ papauer.
albi an. ʒj. amyli ʒvj. conseruæ
rosarum veteris ʒx. syrupi rosa-
ti q. s. & da vt vis.

*Electuarium nobile certe & arti-
ficiale in tussi sicca restau-
rans quoque.*

℥. Sebest. n. xxv. passular. enucl.
ʒb. β. succu liquiritiæ ʒij. bulliant
omnia in ʒb iiij. aquæ vsque ad
consumptionem medietatis, co-
letur, colaturæ addatur penidio-
rum, candi, an. ʒiiij. bulliant ite-
rum vsque ad spissitudinem, de-
inde addatur gummi dragacant.
arabici, succu liquiritiæ an. ʒiiij.
sem. maluæ citrulli cucurbitæ
cucumeris melonum lactuæ pa-
paueris albi aut alterius ad hoc
præparatum q. s. amyli ʒvj. vel cū
zucharo q. s. fi. forma liquida &
non in alia.

*Elect. cordiale ad melancholiam
capitis cum timore.*

℥. Chebulo. condit. ʒj. flor.
borrag. bu. an. ʒij. karabe osse de
corde cerui, berberis terræ sigil-
latæ spodij corall. amb. ʒβ. ozy-
mi serici an. ʒij. squinanthi ligni
aloes garyoph. zedoariæ folij
macis doronici an. ʒi. cinnamo-
mi ʒij. musci gr. vj. camphoræ
gr. iij. sachari q. s. fiat in liquida.
Quod si laxatiuum cupis habere
adde follicul. senæ elector. ʒ vi.
lap. lazuli præparati ʒiiij. scam-
moni ʒij. potes etiam incorpora-
re cum aliquo syrupo & erit me-
lius da ʒiiij. vt lubet.

*Elect. ad melancholiam valens
timidis ex cholera
adusta.*

℥. Quatuor genera miroba-
lan. an. ʒi indorum ʒii. ʒ. sandal.
citriini flor. violarum nenupharis
rosarum rubearum, buglossæ, cu-
scutæ, squinanthi epithymi an.
ʒi. azari ligni aloes thymi, ga-
ryoph. cinnamomi macis an. ʒi.
croci ʒβ. troch. de agaric. ʒi. fol-
licul. fenæ ʒβ. lapid. lazuli præpa-
rat. ʒii. dragacanti mastich. an. ʒi.
syrupi borraginis buglossæ q. s.
*Elect. ad pulsum cordis, paucorem, de-
bilitatem ex melancholia, senibus
proprie valet.*

℥. Chebul. condit. ʒi. flor. cor-
dialium an. ʒi. cortic. citri ga-
ryoph. ozymi ciperi ligni aloes
zedoariæ doronici an. ʒii. macis
nuc. mosc. an. ʒβ. cinnamomi ʒi.
ʒ. musci gr. vi. cum aliquo syru-
po cordiali.
*Elect. optimum probatum contra pe-
stem, quo omnes facillime à peste
præservantur.*

℥. Granorum iuniperi ʒii. ʒ.
garyoph. nuc. mosch. macis ʒʒ.
zedoariæ an. ʒij. aristolochiæ v.
triusque, gentianæ tormentillæ
enulæ, rad. herbæ tunicæ an. ʒj. ʒ.
saluiæ rutæ balsamitæ pulegij cer-
uini: i. chelidoniæ an. ʒi. bacca-
rum lauri sem. acetosi, sem. citri
masticis olibani boli armeni, ter-
ræ sigillatæ, ossis de corde cerui,
spodij rasuræ eboris, rasuræ v-
nicornu margaritarum electa-
rum, fragmentorum saphyri
smaragd. hyacinth. topazii, co-
rall. rub. ligni aloes sandal. rub.
muscatellinorum an. ʒβ. confer-

uæ rosarum buglossæ, nenupha-
ris acetosæ, carniū tamarindo-
rum subtil. incisorum, theriacæ
an. ʒj. sachari q. s. ad incorpora-
tionem, & non plus dissoluti in
aqua scabiosæ & rosarum si. con-
fectio in liquide cum ʒβ. cam-
phoræ gr. viij. mane detur ʒj. in-
fecto autem ʒvi. quia singulare
Bezoarticum est.

*Elect. nobile, cordiale & excel-
lens.*

℥. Limaturæ auri & argenti
vel foliorum eius an. ʒβ. ossis de
corde cerui doronici corallorum
rubeorum, folij macis an. ʒj.
hyacinthi rubini smaragdi sa-
phyri an. ʒβ. cinnamomi ʒj. ʒ.
garyoph. ʒij. melissæ rosarum an.
ʒβ. corticum citri ʒj. mirobala-
norum chebulorum conditorum
ʒj. fisticorum ʒβ. nutritorum
per duos dies in ʒiiij. succi bu-
glossæ ʒij. vini albi, specierum
lætificantis Almanforis ʒj. sacha-
ri candi & taberzer dissolutum
in aqua buglossæ an. q. s. fiat e-
lectuarium in solida vel in li-
quida.

*Electuarium fluxum hamor-
rhoidalem strin-
gens.*

℥. Myrob. indorum, embli-
corum belliricorum, lotorum
in aqua plantaginis, donec a-
maritudinem amiserint an. ʒβ.
rad. tapsi barbari ʒ iiij. ʒʒ b.
cinnamomi nuc. mosch. ga-
langæ olibani an. ʒj. ameos,
spicæ squinanthi an. ʒβ. sco-
riæ ferri præparati & coctæ

H h h ij

aceto ꝓ iij. conseruæ rosarum veteris, rob. de ribes, de berberis an. ꝓß. sachari q. s. fiat morfellatum.

Electuarium ad tussim siccam.

℥. Sem. citrulli excorticati ꝓß. sem. altheæ maluæ an. ꝓiij. amig. dulc. an. ꝓj. gummi arab. dragacanth. sem. citoniorum excorticat. an. ꝓß. succi liquiritiæ ꝓii. amili penidiarum an. ßi. capiant rad. liquirit. subt. incise, & bulliant in aqua violarum q. s. vsque ad aliquam spissitudinem, deinde cætera misceantur, & fiat electuarium, in quo si opus fuerit potes addere syrupi de papauere ꝓij.

Electuarium excellens contra calculum.

℥. Milii solis, saxifragiæ ameos anisi carui maratri, dauci, petroselinii apii cimini anethi leuistici cardamomi piperis longi, fileris montani, sem. papauer. albi, melonum maluæ asparagi, granorū iuniperi, hederæ nucleorum persicorum an. ꝓi. rad. saxifragiæ ꝓß. b. galangæ cinnamomi spicæ azari ciperi, acori sandali amborum, lapidis iudaici, lienis spongiæ rasuræ eboris maxillaris luscii an. ꝓß. sanguinis hirci præparati ꝓii. Syr. de liquiritia q. s. da ꝓii. vel iii. cum decoctione cicerum rubeorum in aurora vel post balneum.

Electuarium stipticum valde, quod in ruptura valet.

℥. Conseruæ consolid. ꝓß. rosar. veterum ꝓj. ß. specierum diatragacanth. ꝓii. diacymini ꝓi. ß. rad. valeriana, boli, lapidis sanguinari an. ꝓij. sachari dissoluti

in aqua ferrata.

Electuarium herniosorum.

℥. Radicum consolidæ nuc. cupressi, dragacanthi masticis gummi arabici boli sanguinis draconis spodii keireos aruinæ an. ꝓi. pilorum leporis subt. incisorum ꝓii. mellis despumati q. s.

Electuarium solenne & expertum in hydropse.

℥. Croci azari, sem. petroselinii dauci apii anisi ana. ꝓi. Rheubarb. elect. ꝓß. meu. costi, cassiæ lignæ squinanthi spicæ rubeæ tinctorum absynthii an. ꝓß. lacce ꝓi. calami aromatici cinnamomi an. ꝓiiii. rosarum ꝓi. ß. bdellii ꝓii. mellis q. s. da ieiuno ꝓß. cum liquore vt vis.

El. in dyscrasia calida capitis.

℥. Conseruæ rosarum ꝓi. borraginis violarum an. ꝓß. sem. cichor. endiuia acetosæ scariolæ an. ꝓii. flor. violarum nenupharis an. ꝓ. o. coriandr. præparati ꝓii. vini aut syr. gra. si. in liquida.

Electuarium de pæonia.

℥. Granorum pæoniæ ꝓi. conseruæ pæoniæ ꝓi. macis spicæ croci corall. rub. margaritarum non perforatarum an. ꝓß. myrtillorū an. ꝓi. o. masticis ꝓß. stecad. arab. cinnamomi nuc. mosch. garioph. folii ꝓß. b. piperis longi, cubebarum, cardamomi gr. paradys. me. legeræ an. ꝓij. liquiritiæ ꝓ. v. anacardine ꝓi. ß. musci ambrean. gr. 6. sachari dissoluti in aqua rosarum & rutæ an. q. s. Hoc electuarium solenne est ad epilepsiam, apoplexiam, patalyum, hemicraniam, ad omnem quoque dyscrasiam capitis frigidam.

*Electuarium tutum expertum ad
coitum.*

℞. Nuc. mosch. ʒi. ʒ ʒ b. macis zedoariae an. ʒ β. cardamomi piperis longi cubebae, granorum paradyfi, cinnamomi an. ʒi. β. conseruae salynorum, id est radicū ʒii. sem. vrticæ rapæ syluestris pastinacæ an. ʒ β. caudæ & vmbilici scincorum an. ʒi. Gariophyllorum ʒv. thuris ʒii sem. cimini carui pori siseleos an. ʒi. fisticorum mundatorum ʒi. β. pinearum mundatarum ʒvi. pyrethri ʒiiii. mellis q. s. fiat electuarium, vtatur mane & sero ad quantitatem vnius nucis mosch.

Electuarium in apoplexia & similibus capitis confortatiuum.

℞. Aureæ Alexandri ʒi. Mithridati ʒi. β. theriacæ ʒi. Specierum diaplicis cum musco ʒii. n. mosch. ʒi. misce, fiat conditum, capiat ter in hebdomada ad quantitatem auellanae post euacuationes.

Electuarium ad coitum.

℞. Pinearum fisticorum amygdal. mundatarum an. ʒ β. sem. vrticæ, cinnam. piperis longi dactylorum ʒ ʒ b. an. ʒii. sileris montani galangæ an. ʒ β. sem. sinapis cardamomi an. ʒiii. croci ʒi. conseruae salynorum ʒi. sachari dissoluti in aqua melissæ q. s. fi. electuarium.

Electuarium ad apoplexiam.

℞. Pyrethri siseleos sticados an. ʒx. agarici ʒi. cardamomi assæ foetidae aristoloch. rotund. an. ʒi. β. succi squillæ ʒ β. mellis q. s. fi. electuarium da quotidie ieiuno.

Electuarium excellens contra calculum.

℞. Cineris corticum ouorum ex quibus pulli nati sunt ʒij. nitri combusti lapidum spongiæ iudaici an. ʒi. β. sem. apii petroselin. asparagi brusci leuistici faxifragiæ milii solis, raphani, an. ʒi. liquiritiæ rasæ ʒ β. sanguinis hirci præparati ʒiii. anisi ʒ β. oxymellis compositi ʒiii. sachari q. s. fi. electuarium cum ʒiii. fisticorum mundatorum, & in liquore conuenienti aliquandiu maccratorum.

Electuarium de citre Mesues, stomachum confortans, digestionem corroborans, odorem oris bonum faciens.

℞. Citri conditi ʒii. garyoph. cinnamomi macis galangæ an. ʒii. cardamomi vtriusque, nuc. mosch. ʒ ʒ an. ʒi. musci gr. iiii. terantur & cum syr. de ʒ ʒ. q. s. fi. elect. carminatiuum etiam est.

Elect. contra sterilitatem

Siseleos rasuræ eboris, rad. & gran. pæoniae, rad. spinæ albæ an. ʒi. β. cinnamomi, ciperi, calami aromatici, squinanthi artemisiæ an. ʒi. spicæ garyoph. oliban. masticis an. ʒ β. ambrae ʒ β. sachari q. s.

Electuarium expertum ad idem.

℞. Sem. agni casti, rad. pæoniae an. ʒi. coriandri præparati ʒii. granorum myrti ʒi. β. conseruae rosarum veteris ʒiii. iulepi rosarum q. s.

*Electuarium expertum & utile
ad restaurandam virtutem
animalem & vita-
lem.*

℞. Pulpæ perdicis bene coctæ
℥b. β. beea vtriusque flor. borrag.
bugloss. zedoariæ an. ʒ i. croci
ʒj. macis ʒβ. hyacinthi smarag.
dia saphyri, ossis de corde cerui
an. ʒj. limaturæ auri ʒβ. fol. au-
ri n. x. (alij v.) margaritarum ʒj.
pinearum recentium ʒij. per v-
num diem infusorum in vino
dulci & ʒij. vini citoniorum, zu-
chari q. s. fiat in forma liquida,
da in aurora ʒj. postea da desu-
per parum aque buglossæ.

*Electuarium indubium & certum
contra epilepsiam.*

℞. Pyrethri costi sticados a-
rabi. an. ʒv. agarici ʒj. β. carui
sem. anethi aristoloch. rotun. as-
sæ fatidæ an. ʒ iiij. succi squillæ
ʒiiij. mellis ℥b. j. misce secun-
dum artem cum oxymelle squil-
litico, fiat succus vt mel co-
quantur.

*Electuarium nobile ad torturam
oris.*

℞. Aureæ Alexandrinæ ætatis
annorum quinque, methridati
an. ʒβ. gran. præoniæ nuc. mos-
ch. maioranę sem. rutæ an. ʒj. fiat
electuarium da ʒiiij. mane in au-
rora & sero in introitu lecti,
factis antea quæ canonice fieri
debent.

Electuarium sublime pectorale.

℞. Pinearum amigd. dulcium
mundatarum ʒj. piperis ʒj. hys-
sopi prassii an. ʒij. fisticorum ʒij.
ireos ʒiiij. capilli veneris ʒi β.
liquiritiæ ʒvj. anisi ʒβ. croci ʒj.
rad. enulę ʒβ. ficuum da ctylo-

rum an. n. vj. passularum ʒij. pul-
monis vulpis præparati secun-
dum artem ʒiiij. sachari q. s. fi. e-
lect. quod mirabiliter materias
grossas à pectore euacuat, si zu-
charum cum sapa decoqueretur
sublime esset certe Thomas.

*Elect. ad asthma pectoris mun-
dificatiuum.*

℞. Hyssoi, prassii, rad. enulę
an. ʒβ. ireos ʒij. capill. veneris
ʒv. anisi cinnamomi liquiritiæ
rasæ an. ʒβ. trium pipereon. an.
ʒβ. passularum ʒij. β. ficum n. vj.
coquantur omnia in simul vsque
ad aliqualem spissitudinem cole-
tur, intus addatur succi liquiri-
tiæ ʒβ. sem. apij fœniculi an. ʒij.
urticæ infusæ per diem natura-
lem in decoct. liquiritiæ ʒij. car-
damomi ʒj. penidiorum ʒiiij. za-
chari mellis an. q. s. fi. elect. cum
ʒj. croci.

*Elect. ad fastidium stomachi &
caninum appetitum.*

℞. Cimini piperis vtriusque
garyoph. ligni aloes croci cas-
się lignæ azari squinanthi ca-
lami aromatici ameos ʒʒ. an. ʒi.
β. masticis ʒβ. cum syrupo de
pomis & citoniis an. q. s. fi. e-
lect. da ʒ iiij. in aurora cum a-
qua vt vis.

*Elect. ad frigiditatem & infla-
tionem stomachi.*

℞. Croci ʒβ. sem. rutæ leui-
stici apij cimini carui an. ʒj. ʒʒβ.
ʒij. β. pinearum ʒβ. amigd. a-
mar. ʒij. thuris piper. an. ʒβ.
garyoph. galangæ nuc. mosch.
an. ʒij. sachari q. s. fiat morsel-
latum.

*Elect. contra inflammationem
& ventris solutionem.*

℞. Spodii, sandalorum citrinorum berberis an. ℥j. β. acetosæ portulacæ gummi dragacanthi boli præparati acaciæ an. ℥j. cum syrupo granatorum q. s. fi. elect. da vt vis.

Elect. contra crapulam.

℞. Sc. caulium ℥ij. β. boli carabæ. an. ℥β. borraginis berberis cuscutæ an. ℥i. sem. portulacæ ℥ii. camphoræ gr. vj. syrapi de agresta.

Elect. ad idem.

℞. Sem. citrulli cucumeris, berberis an. ℥i. spodij carabæ an. ℥β. rosarum ℥ii. folij cuscute ligni aloes an. ℥j. sem. portulacæ ℥i. β. mastices ℥ij. sem. arnoglossæ ℥v. cum syrupo de agresta aut similis fi. elect.

Electuar. nobile & pulchrum ad fluxum ventris.

℞. Furfuris farinæ ℥ij. mespilorum sumach melonum granatorum an. ℥i. berberis sem. acetosæ castanearum an. ℥β. cum vna agresta fi. pasta seruetur & cum vti volueris pulueris. da ℥β. cum aqua quam vis.

Elect. ad idem stipticum.

℞. Nucleorum granatorum assatorum sumach an. ℥i. spodii mastices rosarum rub. cimini assati an. ℥i. sem. portulacæ sem. nasturcii assorum an. ℥ii. cum syrupo citoniorum.

Elect. ad idem

℞. Sem. nasturtii assi ℥iii. cimini in aceto infusi, sem. lini, porri assorum an. ℥i. mastices ℥iiii. myrebal. indorum asso-

rum ℥β. syrapi citoniorum q. s.

Electuarium ad coitum ex frigidityte renum testiumque, sperma quoque augens.

℞. Rad. lignorum ℥β. piperis longi cinnamomi costi been vtriusque an. ℥i. sem. nepæ erucæ anisi dauci asparagi cynoglossæ an. ℥ij. pinearum ℥j. croci ℥β. sachari q. s. fi. elect. in liquida da cum brodio cicerum rubeorum.

Electuarium ad coitum ex frigidityte renum & testium nobile.

℞. Pinearum auellandarum pistachiarum an. ℥β. sem. lini sesami erucæ capæ anisi fœniculi asparagi bulbi bauriæ vrticæ, been vtriusque piperis longi an. ℥β. satyrionum ℥β. caudæ scincorum iringorum an. ℥ij. galliæ mosch. ℥j. β. croci ℥i. fiat electuar. in liquida.

Electuarium ad idem pulchrum & elegans.

℞. Bauriæ vrticæ assæ calido cinere postea mundato & pistato lb. β. amili prius infusi in decoctione bauriæ ℥iiij. croci ℥β. piperis vtriusque ℥j. galangæ garyoph. been vtriusque an. ℥i. satyrionum scincorum iringorum an. ℥iiij. nucis indæ, pinearum, fisticorum auellandarum ℥β. misce fi. electuar.

*Elect. nephriticis & guttatim
cum dolore & ardore min-
gentibus.*

℞. Pinearum amigdal. dulc. a-
uellanarum an. ʒ β. sem. lini cu-
scutæ, melonum citrulli cucu-
meris cucurbitæ althææ portula-
cæ, papaueris albi lactucæ an. ʒi.
apii anisi petroselini maratri an.
ʒii. hiosquiami ʒi. gummi arab.
dragacanthi, succi liquiritiæ an.
ʒi. gra. alkekengi, sem. solatri
an. ʒi. apii ʒi. β. si placet cum
syrupo de liquiritia misce, fiat e-
lectuarium.

*Electuarium ad iuvenes cholericos
constipatos, appetitu carentes,
sitibundos & exic-
catis.*

℞. Violarum mannæ an. ʒii.
gummi arabici dragacanthi cu-
scutæ rosar. rubr. an. ʒi. diagridii
ʒii. β. syrupi granato. q. s. fiat e-
lectuarium.

*Electuarium nobile pro ictericis &
illis, qui post acutam febrem do-
lorem capitis & aurium
tinnitum patiuntur.*

℞. Florum violarum ʒ β. my-
rabal. citrinorum ʒ v. indorum
chebulorum an. ʒi. cassiæ noui-
ter extractæ ʒi. diagridii ʒ β. sy-
rupi violati q. s. fi. electua-
rium.

*Electuarium ad omnem dyscrasiam
stomachi & hepatis frigidam,
principium hypofarcæ, dolo-
rem articularum &
paralysin.*

℞. Cymini ʒiiii. mastices ʒi.
ʒʒb. carui cinnamomi garyoph.
an. ʒi. origani saluiæ maioranæ,
anthos sticados arabicæ an. ʒi.
ciperi piperis longi cardamomi,

nuc. mosch. macis, azari, carpo-
balsami xilobalsami, calami aro-
matici folii squināthi spice, sem.
anisi ameos dauci apii an ʒ β. li-
gni aloes ʒij. sachari q. s. fac vt
lubet in solida aut in liquida.

*Elect. ad ardorem urinae, & ulce-
rarenurum & vesicae.*

℞. Rec. sem. melonis cucume-
ris cucurbitæ, portulacæ, papa-
ueris albi, endiuia hiosquiami a-
pii sang. draconis cortic. man-
dragoræ an. ʒi. syr. de liquiritia
q. s. f. electuarium.

Elect. ad idem.

Rec. sem. melonum ʒi. citrulli
cucurbitæ portulacæ papaueris
albi an. ʒi. hiosquiami ʒij. syrupi
liquiritiæ q. s.

Elect. ad gonorrhæam.

℞. Rec. coriandri preparati
mastices acaciæ gr. myrti capul-
glandium, spodii an. ʒi. β. sem.
rutæ agni casti torrefactorum &
in aceto sparforum, menthæ ma-
cis pyrethri an. ʒij. corall. rub.
ʒiiij. miuæ citoniorum q. s. fiat e-
lectuarium capiat ʒ β. mane in
aurora cum aqua decoctionis
gallarum aut cipressi sex diebus
continuis quia vltimum est.

*Elect. ad coitum breue & vlti-
mum.*

℞. Coquantur tres vitelli ouo-
rum in vino dulcissimo lb. β. de-
inde addatur penidiarum ʒvj. sa-
tyrionum ʒij. β. macis ʒi. bibat
diebus 8. continuis mane in au-
rora, quo plerisque impotentes
ad coitum reduxi.

Electuarium ad idem.

℞. Pinearum pistachiarum a-
uellanarum, amygd. dulc. an. ʒii.
sem. lini, sisami, anisi, baulicæ
cape,

capæ, vrticæ asparagi an. ʒi.
 ʒʒb. galangæ cardamomi an ʒii.
 fatyrion ʒvi. zachari q. s. fiat in
 liquida.

Elect. ad botium gula.

℞. Rad. vrticellæ cucurbite,
 polypodii brusci asparagi aristo.
 loch. rotundæ porri tapli barba-
 ri, spongiæ marinæ, palea ma-
 rinæ an ʒi. palea & spongia te-
 rendo, mane autem da syrupum,
 quem quære in litera S. deinde
 da emplastrum, quære in litera
 de emplastris.

*Electuarium contra heſticam & ſe-
 nium propter dominium ſiccita-
 tis per totum corpus & vo-
 catur reſtauratiuum*

Placentini.

℞. Vnam gallinam veterem
 pinguem & perdicem, vel quar-
 tam partem anteriorem vnus
 hœdi lactantis, vel vnus agni
 non lactantis, bulliant vi-
 del. iſtæ carnes gallinæ & perdi-
 cis tantum, vel carnes hœdi, vel
 agni tantum per ſe tamdiu, quod
 caro ab offibus ſeparetur, hinc
 accipiantur lb̄ iiij. & pulpæ pec-
 toris & alarum, incidantur fru-
 ſtatim, poſtea ponantur in mor-
 tario & contundantur vltima
 contuſione, deinde addatur ʒiiij.
 iſtius pulueris. ℞. Cardamomi
 cinnamomi ligni aloes folij ga-
 ryoph. cubearum ʒ ʒ. gummi
 dragacanthi arab. galangæ, nuc.
 moſch. an. ʒj. macis croci ʒi. ſ.
 deinde addantur ʒiiij. de iſtis re-
 bus. ℞. amili liquiritiæ pinea-
 rum mundatarum, amygdal.
 dulc. paſſularum, auellanarum,
 ſebeſten, fiſticorum ſem. cucur-
 bitæ, melonum, cucumeris, la-

etuce papaueris albi portulacæ
 an. ʒij. penidiorum ʒiiij. ſacchari
 lb̄. iiii. diſſoluti in aqua carniū
 q. s. fiat electuarium, probatum
 eſt.

*Electuarium contra peſtem dia-
 phoreticum.*

℞. Succi rutæ ſaluiæ pimpinel-
 læ pulegii centaureæ nucis gal-
 licæ non maturæ, abſynthii vale-
 rianæ matricariæ an. partem v-
 nam mellis partem mediam to-
 tius. fiat decoctio vſque ad ſpiſ-
 ſitudinem, de qua ℞. ʒiii. the-
 riacæ boli armeni terræ ſigillatæ
 an. ʒß. da ʒiiij. ante ſomnum,
 quia ſudorem prouocabit. Si ve-
 ro ſuccos non habes, capias de-
 coctionem diu decoctam, in qua
 reliqua diſſolue & da ʒß.

*Electuar. ad aſthma propter peſtus
 plenum.*

℞. Vngulæ caballinæ hyſſopi
 farfarellæ capill. veneris an. ʒii.
 liquiritiæ ʒß. cinnamomi ʒij.
 ſem. ſœnugræci ʒß. paſſularum
 ʒvi. pinearum fiſticorum amygd.
 an. ʒj. Ireos ſem. vrticæ an. ʒj.
 ſyrupi violati q. s. fiat elect.

*Electuarium reſtauratiuum in ſpu-
 to ſanguinis.*

℞. Pulpæ caponis coctæ in a-
 qua chalybeata lib. ſ. gummi
 dragacanth. arabici an. ʒß. boli
 armeni præparati in aqua roſa-
 rum ʒi. carabæ, mumix, terræ-
 que ſigillatæ lapidis hæmathitis
 an. ʒß. ſem. portulacæ, planta-
 ginis an. ʒij. amigd. dulc. loto-
 rum in vino citoniorum ʒiiij. iu-
 iubarum ſebeſten n. x. ſachari
 candi & albi an. qu. ſuff. fiat Ele-
 ctuarium ſecundum artem.

Electuarium de pulpa caponis restaurativum ut in phthisi.

℞. Pulpæ caponis ℥.ß.4. sem. frigid. comm. maior. an. ʒ2. pinearum infusarum in aqua violata ʒ2. sem. scariolæ endiviæ, lactucæ an. ʒ1. amili de hordeo ʒ2. gummi arabici dragacanthi an. ʒ1. macis ʒ2. sacchari dissoluti in aqua violarum q. s. fiat Elect. in morsellis, comedat quater in die.

E M P L A S T R V M.

Emplastrum nobile resoluens & maturans omnem squinantiam.

℞. Nidum hirundinis tritum & coctum in aqua deinde cum aqua per cribrum colatum in quo postea coquantur herbe istæ. ℞. Rad. lilij maluaufci Brioniæ fol. Mal. viol. parietariæ an. p. j. deinde cum farina sem. lini fermenti boni acris an. q. s. & ol. veteri & axungia porcina sine sale an. q. s. Emplastrum.

Emplastrum in squinantia quando maturari vult.

℞. Farinæ hordei lini an. m. i. carniū dactylorum ficuum an. n. ʒ. Micæ panis infusæ in ol. lini ʒ4. Butyri sine sale ʒ1.

Empl. doloris sedativum

℞. Medullæ panis albi infusi in aqua fermenti & expressi ʒ4. Vitelli oui n. 3. Ol. Ros. q. suf. fiat Emplastrum, valet etiam in dolore brachij aut pedis factio à phlebotomia, potes panem in aliquo oleo aut aqua infundere,

Emplastrum ad dolorem membri paralytici aut spasmati ex repletionē.

℞. Absynthij, pulegij Baccar. lauri cumini an. ʒ1. terantur & bulliant cum melle qu. suf. donec inspissentur & tepidi loco dolenti apponatur, quia mirabiliter dolorem sedat expertum est Ioan.

Empl. ad idem.

℞. Fol. Maluæ Bismaluæ Violar. parietariæ brancę vrsinæ volubilis maior hyposciami an. ʒß. bulliant vsque ad spissitudinem & cum Axungia veteri & farina hordei q. sufficit fiat Emplastrum in calida valet.

Emplastrum sanguinis constrictivum & fracturarum conglutinativum.

℞. Farinæ volatilis Molendini ʒj. sang. draconis thuris mastiches sarcocolle an. ʒj. cum albo oui. fiat emplastrum.

Empl. ad idem.

℞. Myrrhæ Aloes Boli Thuris Acaciæ Dragaganthi Mastiches ladani farinæ volatilis Molendini an. ʒ1. puluerisentur & fiat Emplastrum.

Emplastrum ad Restorationem iunctorum.

℞. Ol. Ros. ʒ4. Resinæ ʒ3. Cere ʒ2. Colophonix Thuris Mastic. an. ʒß. nucum Cupressi Cucurmæ an. ʒ2. croci ʒ1.

℞. Thuris Mastiches farinæ Volatilis Molendini Boli Sang. draconis an. ʒ2. sepi arietini ceræ albæ an. ʒ8. liquefiat sepum & cera vitimo addatur tela & aliquantulum grossa ibi madesiat & calefiat, postea extrahatur & vtere quando vis in decoctione

autem si addideris mucilaginem rad. Consolidæ præstantissimum erit.

Empl. Nobile ad duritiem post ossium fracturam remanentem.

℞. Axungia porcina ℥i. pinguedinis anseris gallinae anatis Cerae Terebinthinæ an. ℥i. Ol. communis ℥2. farinæ fœnugræci sem. lini an. ℥6. Bdellij opopanacis Mastiches Thuris an. ℥β. Gummi in vino temperentur, postea axungia, pinguedines & oleum dissoluantur & cetera addantur quibus si adiungitur ladani hyssopi humidæ storacis calamitæ an. ℥j. melius erit ut patet consideranti.

Emplastrum excellentius omnibus in vulnere capitis & saniem attrahens, ossa eleuans & consolidans.

℞. Terebinthinæ ℥vj. ceræ ℥iij. resinae ℥ij. Liquefiant ad ignem colentur super aceto & dimittantur per diem, postea cum aceto bene malaxentur, deinde secundo liquefiant & proiciantur super succi bethonicae ℥vj. verbenæ ℥iij. bulliant iterum & cum lacte mulieris bene malaxentur & fiat magdaleon secundum artem : hoc pulchrum Emplastrum lege.

Emplastrum in dolore virgæ.

℞. Micæ panis ℥j. vitelli oui n. j. olei papaueris albi qu. s.

Empl. mirabile extrahens ossa cum velocitate.

℞. Sordiciem apum ol. lilio-

rum alb. ceræ citrinæ Euphor. aristol. rot. ammoniaci Bdellij dissolutorum ol. liliorum alb. an. ℥β. f. Empl.

Emplastrum certum & indubium ad eleuandum os cranei depressum ex casu ut in pueris contingit quando cadunt.

℞. Mellis communis lb. β. coquantur ad ignem & addantur ista furfuris frumenti salis communis an. ℥β. cumini absynthij an. ℥iij. f. Emplastrum, quia expertum est in xv. diebus.

Emplastrum vnum craneum sit fractum cum nulla latio ab extra appareat.

℞. Thuris ceræ ladani an. ℥i. β. pulueriscentur & incorporentur, & per Emplastrum capiti ponatur prius tamen abrafo & per noctem vnā dimittatur, mane autem remoueat, & ubi latio fuerit pars ista erit exiccata & per istud exprimentum lationem percipiet.

Empl. ad idem.

℞. Succu agrestis myrthi an. ℥β. fœni encaustæ pictoris ℥iij. croci de aluminis iameni ℥j. cum aceto, misce. nota quod strictura in hoc multum valet.

Empl. nobile & expertum ad dolorem capitis calidi.

℞. Rosarum violarum nenupharis an. ℥j. farinæ hordei ℥β. sem. maluæ ℥j. sandalorum alb. & rub. an. ℥v. sem. papau. alb. lactuca an. ℥j. capitum papau. ℥iij. succi solatri vel

vermicularis aut semper viuæ aut lactucæ ol. ros. aut pauco aceto misce, frigide apponatur.

Empl. nobile ad idem & somniferum est.

℥. Cort. Ca. papauer. albi ℥ij. sem. maluauisci lactucæ hioisquiamian. ʒß. Rad. mādragoræ ℥ij. Farinæ pistilli hordei an. ʒvi. opij. ʒß. cū succis superscriptis, & adde modicum aceti propter penetrationem.

Emplastrum ad dolorem capitis frigidum.

℥. Rad. Cucum. asinini absynthij coctorum in oleo & aqua q. s. f. f. Empl. valet etiam in vertigine.

Empl. ad idem.

℥. Fol. ruthæ recentis m. j. ß. arthemisiæ m. ß. Bethonicæ. m. j. solatri m. ß. salis communis ʒii croci ʒj. cum alb. oui.

Empl. ad splenem.

℥. Ammoniacy in aceto dissoluti ʒj. extendatur super corio & spleni applicetur, dissoluit & mollicat.

Empl. ad idem.

℥. Absynthij eupatorii an. m. j. terantur deinde an. ʒj. ß. farinæ lupinorum & cum aceto decoctionis fœnugræci q. s. fiat emplast.

Emplastrum sanguinis constrictiuum.

℥. Boli ʒiiij. sangui. draconis ʒi. ß. farinæ volatilis molendini ʒß. aluminis ouorum.

Emplastrum ad idem Nobile & pulchrum.

℥. Sanguinis vnius columbæ postea pulueris cumini camomilæ an. ʒi. ß. farinæ fœnugræci ʒi. spicæ celticæ nardi an. ʒi. vini maluatice q. s. fiat.

Emplastrum ad idem mirandum.

℥. Calamenthi m. ij. decoque in vino optimo & calidè superpone.

Emplastrum supra ventrem ad hydropem.

℥. Ol. irini ʒij. laurini, de ruta an. ʒiiij. succorum ebuli eupatorii sambuci an. ʒj. sulph. viui ʒß. salis communis ʒj. ol. de euphorbio ʒj. ß. de costo ʒj. chimoleæ ʒvij. stercoris columbini caprini exiccatorum & pulueris factorum an. ʒvj. cineris vitis Querci an. ʒß. bulliant omnia simul vsque ad succorum consumptionem s. Empl.

Empl. ad idem elegantis.

℥. Serapini Bdellij opoponacis an. ʒii. sulphuris viui ʒij. salis nitri communis an. ʒi. stercoris columbini ʒiiii. caprini ʒv. cineris lignorum querci & vitis an. ʒii. farinæ milii hordei fabarum an. ʒi. limatiarum cum testudinibus ʒi. chimoleæ pumicis an. ʒi. Baccarum lauri ʒiiii. cumini ʒi. ß. succorum ebuli eupatorii sambuci an. quartam vnam ol. rutæ lauri irini an. ʒiiii. misce, f. Emplastri secundum artem cum modica cera.

Emplastrum Mesue valde somniferum.

℞. Succī lactucæ portulacæ semperuiuę herbæ hiosquiami solatri an. ℥ii. farinæ fabarum hordei an. ℥i. opii puluerisati ℥i. ol. mandragoræ nenuphari rosati, de papauere an. ℥i. mucilaginis psillii ana ℥i. β. bulliant in simul vsque ad spissitudinem & postquam frigidum factum fuerit fronti applica.

Emplastrum matricis confortatiuum ad imprægnationem valens.

Rec. Cerae picis natalis an. lb. i. ladani lb. ii. Rad. Bistortæ ℥iiii. ligni aloes sandali muscatellini Berberis antheræ an. ℥vi. cinnamomi caryophyllorum squinanthi chamæleontis an. ℥iii. Mastiches aliptę mosch. galliæ moschata storacis calamitę liquidæ an. ℥ii. musci ℥ii. terebinthinæ qu. suff. f. Empl.

Unguentum pro vermibus quod supra stomacho poni debet.

℞. Nigellæ ℥i. aloes corall. rub. an. ℥ii. absynthii ℥β. mastiches ℥iii. coriandri preparati ℥i. fiat puluis, incorporentur cum ℥iii. farinę siliginis & ℥vi. farinæ lupinorum croci ℥i. succi rutę ℥ii. succi absynthii ℥iii. misce f. Empl.

Empl. mirabile ad idem.

℞. Myrrhę Gentianæ aloes diptami an. ℥ii. absynthii sem. portulacæ attriplicis pulueris lupinorum rasurę eboris cornu cerui vsti an. ℥i. croci ℥β. farinæ hordei ℥i. β. cum succo pororum non transplantatorum qu. suff. misce f. Empla. cū gr. iii. musci

Emplast. nobile contra contusionem.

℞. Rad. Consolidę vtriusque an. lb. β. Camomillæ Meliloti an. ℥2. Croci ℥β. farinæ fabarū ℥4. Butyri sine sale ℥5. farinæ fœnugræci ℥4. coquantur radices vsque ad coctionem temperatam, deinde reliqua ponantur nisi addis succi absynthii succi Cumini an. ℥i. par non habet in resoluenda & exsiccanda materia mortificata in loco contuso.

Empl. ad inflationem testiculorum puerorum ex aqua & vento.

℞. Rad. liliorum alb. ℥4. farinæ lini subtilis ℥i. farinæ fabarum ℥6. Dauci Arneos an. ℥β. sulphuris viui ℥i. Gallarum cupressi ℥2. Bdellii dissoluti in aceto squillitico ℥i. β. fiat emplastrū testiculis antea vnitis cum istis Oleis ℞. de piperib. de croco an. ℥i. misce, postea immediate ponatur.

Empl. Carminatiuum in hydrope Tympanica.

℞. Storacis capræ sicci lb. i. Cumini ℥2. Rad. Cucum. asin. ebuli an. ℥3. farinæ hordei ℥4. Acci Chalybeati ℥4 per Emplastr. cum lixiuio bene coctum quo calide emplastretur totus venter, quia poros aperit & ventositatem resoluit.

Empl. ad prouocandum lac.

℞. Radic. & fol. petroselini Coaguli hordi an. ℥β. storacis calamithæ ℥3. ol. amygdal. dul. recent ℥4. farinę hordei ℥i. β. Emplastrum cum decocto petroselini & appone tepidè.

Emplastrum hæmorrhoidarum fluxum stringens.

℞. Succī extremitatum Rosarum ℥2. Albumina ouorum lapidis hæmatitis ʒj. gypsi ʒss. f.

Empl. cordiale.

℞. Capillorum Veneris flor. Bor. Buglossæ Acetosæ an. m. i. Rosarum m. 2. farinæ hordei ℥3. Been Vtriusque an. ʒi. doronici ossis de corde cerui anethos Viol. an. ʒ2. croci ʒ2. Resinæ si placet ʒi. succi Borag. ℞. ss. misce fiat.

Emplastrum solenne ad Epilepsiam quod supra coronali commissuræ supra corio extensum applicari potest.

℞. Thuris Mastiches spicæ subtiliter puluerisatorum an. ʒ6 Galbani opopanacis an. ʒi. visci quercini ʒ2. Rad. Vel granorum Pœoniæ ʒ2. Gummi Ruthæ Sylvestris ʒ3. nucis mosc. cubebæ an. ʒi. castorei euphorbij ambæ an. ʒi. ladani ʒ6. Malaxentur & fiat.

Empl. vltimate Constrictiuum in fluxu hepatico.

℞. Fol. plantag. ℞. ss. fol. granatorum vtriusque consolidæ recentis an. ʒ2. pentaphilon ʒi. ss. Gallarum perforat. Sumach granorum Myrthi an. ʒi. Coriandri præparati ʒ2. Terræ Sigill. ʒi. Sang. draconis ʒ ss. Boli ℞. ss. croci ʒi. macis ʒss. 6. arabici dragaganthi torrefactorum an. ʒi. terantur & bulliant in aquæ chalybeatæ ℞. iʒ. & ℞. io. vel ʒ. a ceti nigri vsque ad spissitudinem, postea adde camphoræ bonæ tritæ ʒi. misce f. Empl.

Emplastrum ad duritiem Mamillarum dissolutiuum.

℞. Farinæ hordei fabarum an. ℞. ss. cumini ʒi. ol. violati ʒi. coaguli hædi ʒ2. ss. aquæ acetosæ q. s. fiat Emplastrum.

Emplastrum maturatiuum, resolutiuum, mitigatiuum doloris in apostemate auris.

℞. Rad. Maluauisci mundatarum à medullis costarum incisarum optimi & pistatarum. ℞. i. farinæ lini scænegræci flor. camomillæ an. ʒ2. Butyri ʒ3. vitelli ouorum n. ʒ. incorporentur & actu calidum apponatur loco dolenti.

Emplastrum ad extrahendum codexellas.

℞. Rad. althææ ʒij. Farinæ frumenti farinæ linosæ an. ʒj. ss. farinæ hordei farinæ synapis an. ʒi. Terebinthinæ ʒi. ss. Album ouorum n. ij. ficuum n. vj. Capelili n. ij. fiat emplastrum secundum artem.

Emplastrum ad lac coagulatum.

℞. Siclæ apij calamenti an. m. j. Bulliant & calide applicentur.

Emplastrum ad idem.

℞. Micam panis farine hordei scænegræci lini an. p. j. Rad. Maluauisci maluæ erucæ an. ʒi. bulliant omnia trita vsque ad spissitudinem & cum oleo anethino siue camemelino q. s. Emplastrum conficiatur.

Emplastrum ne mamilla crescant.

℞. Lapides duos cum quibus cultelli acuuntur, tritos diu subtilissime, & in aceto fortissimo diu mixtos & fricatos & in for-

mam emplastri factos calide super mamillas positos & cum binda in eo tincta mamillas liga bis in die, quia expertum est, mamillæ verò non tangantur neque palpitentur.

Emplastrum puerperis ut mamillarum papilla exeant.

℞. Cupulam glandium aut nucum Terebinthinæ plenam & calide applicatam bis in die per dies tres continuos.

Emplastrum ad lac coagulatum.

℞. Rad. Maluauisci herbæ erucæ an. m. j. terantur & bulliant in aqua q. s. vsque ad spissitudinem, postea addatur micæ munda panis farinæ hordei lini fœnugræci an. ʒß. Ol. camem elini anethini q. s. fiat emplastrum calide apponatur.

Emplastrum scrophularum resolutiuum.

℞. Synapis sem. vrticæ sulphuris spumæ maris vel lapidis pumicis Aristol. rotun. ammoniaci an. ʒ. j. Ol. antiqui q. s. fiat emplastrum aliqualem molle in quo potes addere parum de emplastro de meliloto.

Emplastrum in hypofarca.

℞. Spicæ mastiches ciperi squinanthi cīnamomi calami aromatici myrrhæ croci an. ʒß. Coquantur in vino albo optimo grosso modo contusæ vsque ad spissitudinem, postea extendatur super tela & hepar emplastretur & vbi frigidum est iterum calefiat & calide apponatur.

℞. Calami arom. Zedoariæ galangæ cīnamomi squinanthi ana ʒ. j. ß. Mastiches myrrhæ ci-

peri an. ʒ. ij. Spicæ croci an. ʒ. j. pulueriscentur singula, mastix vero & myrrha & crocus in modico vino dissoluantur & cum reliquis misceantur, deinde cum modica cera & Terebinthina fiat emplastrum extendatur super corium & formam emplastri apothecario da.

Emplastrum de bethonica ad vulnera capitis.

℞. Succī bethonicæ succi plantaginis succi apij colatorum an. lb. ß. Resinæ ceræ nouæ an. ʒ. iij. Terebinthinæ ʒv. Coquantur ad succorum consumptionem, deinde addatur Terebinthina, & fiat emplastrum.

Emplastrum ad idem fortius vte est de centaurea.

℞. Centauræ minoris m. vj. Temperetur per vnā noctem in vino albo lb. iij. postea coquantur vsque ad consumpt. medietatis, coletur fortiter & bulliat vsque ad aliqualem spissitudinem, postea capias mellis ʒiij. lactis mulieris ʒij. terebinth. lb. ß. ceræ nouæ ʒiij. resinæ, ʒj. ß. thuris mastiches gummi arab. an. ʒi. fiat, est pulchrum certè hoc.

Emplastrum saniei mundificatiuum & incarnatiuum

℞. Mellis ros. col. ʒiij. farinæ hordei ʒß. terebinthinæ ʒv. ceræ resinæ ana ʒij. thuris mastich. ana ʒj. mumie myrrhæ farcocollæ ana ʒß. ol. mastich. ʒj. fiat.

Emplastrum ad paralyfin colli et lingua balburien.

℞. Florum camomillæ meliloti maioranæ baccarum lauri & fol. eius pirethri ꝑ. piperis longiana ꝑ. opopanacis ꝑ. cum oleo sambucino & cera q. s. fiat emplastrum, calide loco applicetur.

Emplastrum valens ad extrahenda ossa & spinas & sciaticæ conueniens.

℞. Granorum inuentorum in palma baurach solis ammoniaci Aristol. rot. cucum. asinini an. ꝑ. terebinthina ꝑ. piperis nigri albi ammoniaci amomixilobalsami an. ꝑ. thuris myrrhæ colophonix capitis lacertæ an. ꝑ. lactis arborum morum ꝑ. x. ceræ ꝑ. xx. adipis capræ ꝑ. facis ol. de lilio q. s. per emplastrum vtatur sic. locus læsus cum oleo de lilio ad ignem vngatur, deinde per aliquam vilem personam sugatur, postea emplastrum intromittatur, & cum lana succida carpinata leuiter cooperiatur & cum binda scissa in medio secundum crucem vt non comprimatur locus suauiter ligetur, semel in die sufficit.

Emplast. incarnans & mundificans.

℞. Plantaginis cōsolidæ vtriusque bethonicæ verbenæ pimpinellæ pilosellæ millefolii linguæ canis caudæ equinæ omnium recentium an. m. ii. terantur & cum lb. iiii. sepi veruecis bulliant vsque ad succorum consumptionem coletur, addatur resin. cer. ana ꝑ. sarcocoll. galbani an. ꝑ.

terebinth. ꝑ. iiii. misce fiat.

Emplastrum de vermibus ad idem consolidans & incarnans vulnera & ulcera nervosa elegans & pulchrum.

℞. Vtriusque consolidæ cynogloss. pilosell. vtriusque plantaginis an. m. j. vermium terrest. lb. ss. terantur omnia & ponantur in lb. v. olei communis per dies septem, deinde modicum bulliant, exprimantur, tunc adde sepi arietini mundati ꝑ. viii. picis naualis ꝑ. iii. Græcæ ꝑ. i. ss. ammoniaci opopanacis galbani terebinth an. ꝑ. ss. thuris mastiches ana ss. misce fiat magdaleon.

Emplastrum gratiæ Dei speciale.

℞. Bethonicæ verbenæ consolidæ vtriusque centaur. pimpinell. hypericon herbæ saraconicæ an. m. j. bulliant in lb. iiii. vini albi vsque ad consumptionem medietatis coletur, postea addatur ceræ albæ resin. an. ꝑ. vi. ammoniaci ꝑ. j. terebinth. ꝑ. iiii. galbani olibani mastichis myrrhæ an. ꝑ. ss. Aristol. rot. ꝑ. j. cum lacte mulieris & ol. ros. fiat magdaleon.

Emplastrum ad dolorem hæmorrhoidarum excellens.

℞. Camomillæ rad. althææ meliloti tapsi barbari an. m. j. coquantur donec inspissentur, addatur vitelliorum elixatorum numero ij. croci myrrhæ aloes an. ꝑ. i. farinæ fœnugræci lini an. ꝑ. vj. butyri sine sale q. s. fiat emplastrum, in quo si addis opij ꝑ. optimum erit.

Emplastrum

Emplastrum ad tumorem pedum antea facta fermentatione.

℞. Sulphuris ℥j. stercoris columbini ℥x. farinæ fabarum ℥j. ℞. pulueriscentur & cum modico aceto decocto aphodilorum & succo caulium rub. fiat emplastrum quod tepide applicari debet, pulchrum est.

Emplastrum de lino Auicenna vulnera maxime consolidans.

℞. Pannum de lino ablutum & tritum, donec fiat ut pulvis ℥j. thuris Aristol. adustæ ℥j. ol. ros. ℥iij. minij in ol. ros. dissoluti ℥j. vel galbani ℥ss. consolidatium supra omnia expertissimum.

Emplastrum contra ossium fracturam.

℞. Aloes myrrhæ boli armeni thuris acaciæ, nucis cupressi dragacanthi laudani an. ℥j. pulueris molendini ℥vj. cum albumine oui q. s. fiat emplastrum, extendatur super telam.

Emplastrum anthracis furiosi maturatium.

℞. Ficus pingues n. vij. passularum ℥j. spicæ alij mundati n. ij. piperis ℥ss. salis ℥ij. pistentur optime & cum oleo antiquo ℥i. aceti fortiss. ℥ss. fermenti acerri- mi, ad medietatem totius fiat emplastrum.

Emplastrum aliud ad idem.

℞. Fermenti acris lactis mulieris mellis vitelli ouorum an. ℥j. stercoris gallinæ columbini an. ℥ss. misce in baurach ℥iij. & est forte maturatium.

Emplastrum carbunculi maturatium.

℞. Ficum pinguedinum ℞j.

sinapis ℥iij. farinæ fœnugræci & lini an. ℥i. ℞. ammoniaci in aceto dissoluti ℥ij. terebinth. ℞ss. fiat emplastrum cum melle.

Emplastrum aliud ad idem.

℞. Mucilaginis lini althææ fœnugræci an. ℥ss. axungie gallin. anatis anseris medullæ crucis vaccæ an. ℥j. ammoniaci dissoluti in oleo liliorum alb. bdellij galbani dissoluti an. ℥ss. cum farina hordei fiat electuarium etiam in peste pulchra emplastra.

Emplastrum aliud ad idem solennissimum.

℞. Rad. cucum. asinini cum glutine albo ana ℥iij. salis nitri ℥j. ficuum ℥ii. fermenti ℥j. fiat emplastrum cui si addatur ℥j. ℞. fellis porri exsiccati in modum unguenti basiliconis non habet par: lege Bertapalium de apostematibus cap. x.

Emplastrum ad idem maturatium in codexellis probatum.

℞. Ficum n. vj. passularum ℥j. capæ lilii albi sub prunis tostorum & optimè pistatorum n. ii. mellis ros. colati fermenti an. ℥j. croci ℥ss. baurach ℥j. farinæ fœnugræci lini an. ℥iij. althææ optimè coctæ & pistatæ ℥ij. ol. camomill. anethi liliorum alborum an. ℥j. butyri sine sale axungia pormiæ gallin. an. ℥ss. cum decocto althææ q. s. fiat emplastrum.

Emplastrum ad idem vesicatorium.

℞. Fermenti ad quantitatem unius oui cantharidas pulueris- siti. cochlear j. aceti fortiss. q. s. fiat emplastrum, ponatur super anthracem quia attrahit venenum aperiantur vesicæ deinde

cum butyro & maturatiuis procede vt venenum ad exteriora exhalet.

Emplastrum in combustione ignis expertum.

℞. Calcis viue decies extinctæ in aqua frigidissima, deinde exsiccata in petia ad umbrā ℥iij. ol. rosarum cerussę lotę in lacte mulieris an. ℥j. β. camphoræ zi. ceræ q. s. fiat vnguentum molle limentur ample & valde totus locus.

Emplastrum in superfluo fluxu menstruorum ex quo fumigium quoque facere potest.

℞. Thuris mastiches nucis cupressi spodij sang. draco. gal-larum psidii boli arm. cornu cerui vsti sumach balaustiorum cupulorum glandium gummi arab. tragaganthi mumia an. ℥j. ladanii ℥vj. Terantur & cum succo arnoglоссæ & parum mucilaginis psillii fiat Trochiscus vnus quibus se fumiget bis in die. Si vero emplastrum. ℞. Trochisci de carabe de terra sigill. an. ℥β. boli ℥x. Aceti Ros. ℥j. Cre-tæ ℥iii. aquarum arnoglоссæ q. s. fiat emplastrum applicetur dorso & pectori.

Emplastrum mollificans duritiem membri restaurati.

℞. Rad. maluauisci fol. malue melliloti an. m. j. sem. melliloti an. m. j. sem. lini fœnugræci an. ℥i. Ol. communis ℥iij. bulliant omnia in brodio castrati donec fiat in forma emplastri.

Empl. ad duritiem splenis pulchrum.

℞. Ammoniæ serapini bdellii opopanacis in aceto dissoluti an. ℥β. farinæ lini fœnugræci an.

℥ij. lupini ℥iij. Terebint. ℥ij. β. Ol. de spica ℥iij. de capparibus ℥ij. cera, Oleum & gummi dissoluantur, deinde cætera addantur & fiat emplastrum, semel in die remouetur.

Emplastrum remouens duritiem mammillarum.

℞. Farinæ fabæ hordei an. ℥β. farinæ lini fœnugræci an. ℥. vj. Ol. Ros. ℥iij. croci ℥j. fiat emplastrum.

Emplastrum optimum ad tumorem & vehementem mammillarum inflammationem.

℞. Plantaginis fol. maluæ recentis m. j. β. bulliant omnia in aqua solatri Rosarum an. q. s. vsque ad aliqualem spissitudinem, deinde addatur farinæ hordei ℥ii. Ol. Rosarum ℥j. β. bdellii in aceto dissoluti ℥ij. fiat empl.

Emplastrum nobile ad sciaticam.

℞. Emplastri de melliloto lb. β. Galbani ℥β. Ammoniæ bdellii an. ℥ij. styracis liquidæ ℥β. calamenthi ℥iij. castorei ℥j. Terebinthinæ q. s. ac incorporandum fiat emplastrum loco dolenti apponatur inuncto ante loco vnguento. quod quære in litera V. fol.

Emplastrum ad puncturam optimum.

℞. Galbani ℥j. armoniæ ℥ij. opopanacis ℥j. ceræ lb. β. lithargiri aurei lb. j. β. Ol. laurini ℥i. oliuarum lb. i. β. myrrhæ Thuris virid. aris Aristolochiæ rotundæ mastiche an. ℥j. lapidis calaminaris ℥i. Terebinth. lb. β. fiat magdaleon. Si in punctura remanserit ferrum adde ad lb. j. emplastri ℥β. magnetis.

Emplastrum stypticum.

℞. Carabæ sang. draconis corall. amborum limaturæ chalybis boli armeni an. ʒii. Acaciæ spodij Terræ sigillatæ an. ʒii.ß. Gallarum balauſtiorum nucum cupreſſi an. ʒiii. nucis moſch. galangæ garyophyllorum an. ʒß. Thuris maſticheſ ſtyracis calami thæ mumia Rad. biſtortę conſolidæ an. ʒv. lig. aloes ſandalorum omnium an. ʒi. ſem. naſturtii torrefacti plantaginis an. ʒ ii. ceræ qu. ſ. fiat ceratum.

Emplastrum ſolutiuum in colica.

℞. Saponis butyri recentis an. ʒj. ß. diſſolue poſtea ſalis cõmunis ʒ ß. extendatur totum ſupra corio & frigido ſuper vmbilico ponatur ad laticem vj. digitorum.

Emplastrum ad molliſicanda oſſa male conſolidata vt iterum facilius refringi poſſint & etiam cerum ad omnia apoſtemata dura.

℞. Fol. Cicutæ in aqua decoctæ in forma emplaſtri in quo adiunge axungię gallinæ vel porci parum & hoc reiterando quotidie continuetur per dies x. (vide conſil. Helidei.)

Emplastrum ad retentionem vrinæ quod ſuper pectinem poni debet.

℞. Maluæ vitricariæ apij an. m. j. bulliant ad ſpiſſitudinem, poſtea adde farinæ fœnugræci an. ʒi. olei ſcorpionis anethi camomelini an. q ſ. fiat emplaſtrum quod ſi in decoct. addis anethi m. j. milij ſolis ſaxifragiæ an. ʒ. j. parietariæ m. j. ex-

cellentius erit.

Emplastrum expertum in carbunculo.

℞. Ruthæ recentis m. j. fermenti ʒ. ß. piperis ʒj. ſalis communis ʒj. ß. ficuum ſeccarum n. iiij. piſtentur omnia optimè. Si in forma emplaſtri ponatur bis in die & ſeparat in duabus diebus carnem malam à bona.

Emplastrum cordiale mirabile ad pulſum & tremorem cordis prouenientem à materia calida virtutis vitalis reſtauratiuum.

℞. Doronici oſſis de corde cerui been vtriuſque an. ʒj.ß. ſantalorum amborum ſpodij lãbruſci corall. amborum an. ʒij. Roſarum ʒiiij. farina hordei ʒiiij.ß. croci ʒi. margaritarum ʒj. hyacinthi ſmaragdi ſaphyri an. ʒj. Ol. de croco ʒß. aqua bugloſſa ʒi. ß. vini maluatici cyathum j. Reſinæ ʒii. fiat emplaſtrum quod etiam magis frigidum fieri poſteſt augmentando lambruſcum coralloſ & ſpodium.

Emplastrum maturatiuum bonum & expertum.

℞. Rad. althææ ʒiiij, cape liliorum alb. ficuum ping. an. nu. ij. florum camomillę, melliloti an. m. j. farinę lini hordei fœnugræci an. ʒii. butyri ſine ſale Ol. liliorum alborum camomill. ping. gallinæ an. ʒj. piſtis piſtandis & coctis coquendis.

Emplastrum constrictiuum fluxus.

℞. Fol. plantaginis ℥ii. coriandri præparati ℥i. β. myrtyllorum fol. nucis an. ℥j. farinæ volatilis molendinæ an. ℥ii. glutinis piscium ℥x. gummi arabici ℥i. farinæ fabarum ℥ii. nucis cupressi ℥vi. granorum iuniperi ℥j. specierum elect. constrictiuum de olibanii descriptio. Rhasis cap. de fluxibus ℥j. β. fiat emplastrum ponatur ab ore stomachi vsque ad pudibunda.

Emplastrum mirabile ad omnes fluxus antiquos excoriatiuos quo a stomacho tota regio ventris & hepatis vsque ad pudibunda emplastrari calide debet in diarrhæa quoque excellens.

℞. Eupatorii m. j. squinanthi ℥ii. spicæ ℥ij. macis mastiches an. ℥β. ligni aloes ℥ii. myrobalan. emblic. chebulorum assatorum an. ℥j. boli hæmatitis terræ sigillatæ an. ℥vj. coriandri præparati ℥j. β. spodij ℥ii. rosarum ℥j. farinæ hordei ℥ij. Trium sætalorum camphoræ an. ℥β. scorie ferri ℥j. Ol. mastych. myrtilli an. q. s. fiat emplastrum sine igne quod calidum applicetur.

Emplastrum expertum in muliere quæ ex nimio fluxu menstruorum deducta fuit in pulsum vermicularem 1419. quod super ventre Alcharin dorso vsque ad sphincterem applicari debet. valet etiam ad omnem fluxum hæmorrhoidarum & dysenteriam.

℞. Lentium excorticatarū lb. j. bursæ pastoris plantaginis an. m. iii. stercoris asini & capræ exsiccati menthæ siccæ ana. ℥j. β. thuris ℥. β. sanguinis draconis

℥x. acaciæ hypocistidis licij an. ℥i. gypsi in aceto infusi per diem vnum ℥iiij. albuminis ouorum nu. v. farinæ fabarum ℥iii. bulliant omnia simul in succo plantaginis q. s. ad spissitudinem fiat emplastrum.

E P I T H E M A.

Epithema cordiale temperatum.

℞. Aquarum melissæ buglossæ acetosæ an. ℥. iii. ros. viol. an. ℥. iii. specierum cordialium temperat. ℥i. β. croci ℥β. lig. aloes sandal. citrini sem. basiliconis behen vtriusque hyacinthi smaragdi an. ℥β. succi limonum ℥ii. anthi ℥. β. vini maluatici ℥i. aquarum florum salicis melissæ lambrusci an. ℥i. misce per epithema.

Epithema cordis ad magnam caliditatem.

℞. Aquarum buglossæ violarum scariolæ borraginis an. ℥. iii. rosarum ℥. viiij. specier. cordial. temperat. coralli. alb. an. ℥. iii. camphoræ ℥β. margaritarum ℥j. β. sol. auri nu. viii. species subtilissime terantur misce & fiat epithema.

Epithema cordis calidum.

℞. Aquarum buglossæ melissæ an. ℥. iii. maioranæ rosismarini an. ℥ij. rosarum ℥. iii. behen vtriusque sem. basiliconis corall. rub. an. ℥. iii. croci ℥i. musci ambre an. gr. ij. hyacinthi smaragdi saphiri an. ℥β. vini maluatici ℥. ii. bulliant omnia parum simul optime testa.

Epithema aliud cordiale.

℞. Aquarum buglossæ ℥. iii. melissæ rosarum acetosæ foliorum salicis an. ℥. i. β. ros. santal.

amborum an. ʒi. camphoræ ʒi.
croci ʒ. ʒ. misce.

Epithema aliud ad idem Nobile.

℞. Aquarum melissæ ʒv. rosæ
præparatæ cum musci ambra
an. gr. ij. viol. salicis lambrusci
an. ʒii. ʒ. spodij rosarum sanda-
lorum amborum ossis de corde
cerui fol. & sem. basiliconis an.
ʒij. vini maluatici ʒi. croci ʒj.
lig. aloes ʒ. ʒ. bulliant vnica lē-
ta ebullitione bene lenta & scar-
lacum madefiat pulchrum est, in
quo si spongiam madefeceris
modicum bullitum præstanserit,
fitque emplastrum ad idem ex
speciebus supra scriptis farina
hordei, quibus bullitis parum
addatur fol. auri n. x. marg. pul-
uerizatarum ʒj. quod extendi-
datur super scarlaco applicetur.

Epithema ad vermes.

℞. Nigellæ ʒj. aloes absynthii
centauræ gentianæ mastiches
an. ʒi. ʒ. coriandri præparati ʒi.
corall. rub. ʒii. fiat puluis & cū
succo absynthii & aceto fiat e-
pithema super vmbilico.

Epithema aliud.

℞. Aquarum hyssopi menthæ
an. ʒv. graminis ʒviii. vini mal-
uatici ʒ ii. gentianæ myrrhæ
croci an. ʒi. lig. aloes sem. san-
cti an. ʒi. ʒ. musci gr. v. areti co-
chlear v. misce.

Epithema ad hepar.

℞. Aquarum solatri endiuia
hepaticæ acetosæ an. ʒiiij. absyn-
thii ʒ ii. specierum diatriasand.
diarrhodon spodii an. ʒ ʒ. croci
gr. iii. aceti ros. ʒvi. misce.

Epithema aliud.

℞. Aquarum rosarum ʒiiii.
endiuiæ solani acetosæ an. ʒi ʒ.

spodii ros. rub. sand. rub. an. ʒii.
camphoræ ʒ ʒ. aceti ros. parum
misce.

*Epithema frigidum reperiussium ad
inflammationem membri.*

℞. Cerusæ lythargiri subtili-
ter pul. ʒ ʒ. camphoræ ʒi. boli
ʒii. aquarum portulacæ planta-
ginis vermicularis an. ʒiii. mis-
ce.

Embrocha stomachalis cum spongia.

℞. Menthæ absynthii origani,
calamenthi an. m. i. sem. fœnicu-
li, anisi cumini anethi an. ʒ ʒ
mastiches ʒii. corall. amborum
an. ʒi. galliæ moschata ʒ ʒ. ros.
rub. lambrusæ an. i. squinan-
thi myrtillorum coriandri an.
ʒi. terantur & bulliant in vini
veteris nigri ʒb iii. ad consum-
ptionem tertiæ partis.

Embrocha ad menstrua prouocanda.

℞. Pulegii arthemisiæ cala-
menthi abrotani ruthæ centau-
ræ hyssopi an. m. i. sabinę m. ii.
cinamomi galangæ rubeæ tincto-
rum an. ʒi. myrrhæ ʒ ʒ. bulliant
in aqua & embrocetur pecten
dorsum & etiam desuper se-
deat.

Embrocha somnifera.

℞. Lactucæ viol. rosarum ca-
papaueris albi an. m. i. rad. man-
dragoræ flo. nenuph. an. m. ʒ.
hyoscyami lactucæ papaueris
albi an. ʒ ʒ. maluæ melissæ ca-
momelli an. p. i. misce embro-
cetur frons, poterit etiam pedes
ex eo lauare.

Embrocha ad pleurifim.

℞. Camomillæ meliloti violar. capillorum veneris anethi vngulæ caballinæ sem. altheæ maluæ an. m. ii. passularum ℥j β. cort. pap. albi n. v. bulliant adde butyri sine sale ℥iii. misce vtere.

Fomentatio ad dolorem ventris & hypochondriorum frigidorum.

℞. Arthemisiæ matricariæ ruthæ recentis si haberi potest an. m. ij. hederæ arboreæ m. ii. camomillæ m. iij. cap. papaueris albi n. x. rad. paucedini n. xij. terantur grosso modo & bulliant in aqua vsque ad consumptionem tertiæ partis in quam spongiæ magnæ infundantur. Experimentum certe est sæpe ad dolorem spatularum & præcipue ventrem frigidum.

Fomentum ad surditatem.

℞. Pulpe colocynthidos ℥ij. serpilli ruthæ abrotani stœch. arabici pulegii calamenthi an. m. j. β. origani m. iij. nitri ℥i. β. bulliant hæc omnia in vino & aqua q. s. & intus ponantur lapilli igniti & fumus exeat qui per embolum intromittatur in aures.

Fomentatio feri, lotio pedum trahens phlegma à capite.

℞. Camomillæ meliloti stœchados abrotani fol. lauri maluæ origani saluiæ maioranæ misce.

Fomentatio ad sciaticam.

℞. Camomillæ meliloti an. p. ij. flo. vtriusque stœchadis an. p. i. absynthii p. i. β. sem. anethi marathri an. ℥i. nucis cupressi ℥i. β. terantur & bulliant

in aqua & vino an. qu. s. & fiat fomentatio in spongia.

F V M I G I V M.

Fumigium phlegma à capite vacuans & confortans.

℞. Maior. ℥ii. cort. citri ℥i. camomelli ℥i. lig. aloes ℥iiii. spice ℥ii. bulliant in aqua saluiæ aut alia capitali in vase stricti orificii bene obdurato aperiat & odoretur.

Fumig. ad idem fortius.

℞. Nigellæ ℥iiii. maioranæ fol. persici stœchad. arab. an. p. f. misce.

Fumig. ad idem.

℞. Sambfuchii m. i. fol. citri camomillæ an. m. f. lig. aloes ℥iii. spice ℥i. misce.

Fumig. ad dolorem capitis frigidum.

℞. Fol. lauri pulegii bethonica rorismarini narcissi abrotani an. m. i. bulliant hæc omnia in vino rub. optimo in olla bene cooperta, deinde fumum per os ad nares recipiat, & cum hoc tepidius lauentur brachia, manus, crura & pedes.

Fumig. ad idem.

Gall. i. in pastillos conuersam & assam in furno cum herbis. ℞. fol. lauri rorismarini maioranæ an. p. i. cubeb. ℥z. lig. aloes piperis longi nuc. mosch an. ℥ii. postquam assauerint deponantur & super pastillos foramen fiat & odoret, deinde comedat famil.

Fumig. ad idem Nobile.

℞. Florum lauri pulegii bethonica rorismarini maioranę an. m.i. abrotani pis. cubebæ piperis longi nucis moschataę an. ʒ.ii. terantur grosso modo & bulliant in vino albo q. s. deinde later incensus capiatur super quem vinum hoc aspergatur & fumus per os & nares trahatur.

Fum. ad sedam calidam expertum.

℞. Sand. citrini farfarellæ rorismar. rub. ana ʒ.ii. β. spicæ ʒ.i. bulliant.

Fumig. ad provocanda menstrua.

℞. Pulegii calamenthi abrotani ruthæ Iuæ centaureæ hyssopi an. m.j. surinæ matricariæ an. m.j. β. opopanacis ʒ.iii. ammoniaci ʒ i. β. galangæ cinnamomi an. ʒ. ii. sileris montani rubiæ tinctorum an ʒ vi. myrrhæ ʒ.ii. bulliant omnia in aqua q. s. fiat fumig. factis antea purgationibus.

Fumig. ad tumorem matricis.

℞. Salviæ ruthæ rorismarini serpilli coquantur in vino bono nigro, & fumigetur.

Fumig. ad matricem frig.

℞. Ligni aloës thuris an. ʒ.i. fiseleos galliæ moschataę rasuræ eboris ireos buglossæ an. ʒ.ii. cum styrace liquida fiant trochisci.

Fumig. ad fluxum albarum humidatum.

℞. Ros. rub. corall. rub. an. ʒ. ii. ramich ʒ.iii. gallarum sumach balaust. cupulorum gland. an. ʒ β. moschi ambraę an. gr.iii. bdelii ʒi. β. cum aqua rosa. ferrata formentur trochisci.

Fumig. materiam cholericam à capite educens & caput confortans expertum.

℞. Ros. rub. sand. rub. lig. aloës an. ʒ. i. flores camomillæ ʒ. i. β. aqua ros. q. s. bulliant in vase stricti orificii bene tecto, & vbi bullierint fumus recipiatur, si autem vigilias patitur adde cort. papa. albi.

Fumig. aliud.

℞. Ireos lb. i. Rosarum ʒiii. styracis calamitę ʒ i β. sandali Muscatell. ʒ i. calami aromat. ʒ vi. cyperi ʒi. sampsuchi ʒβ. garyophyl. ʒ ii. coriandri præparati ʒ iii. moschi ʒi. fiat pulvis, quoniam etiam in pillulas reducere potest. Item in Electuar. vt ita contra fœtorem oris in vsu habere multum valet.

GARGARISMA.

Gargar. ad elongationem vulvæ.

℞. Piperis pyrethri saxifragiæ balaustiæ gallarum ana ʒi. mellis ʒii. aceti ʒi. vini dulcis lb. i. β. bulliant ad consumptionem medietatis colentur, dissoluatur intus mellis, aut oxymellis simpl. aut compos. aut squillitici ʒii. vt tibi videtur.

Garg. melancholicam à capite educens.

℞. Syr. de Epithymo ʒi. β. aquæ decoct. stæchad. lb. i. misce.

Garg. aliud ad idem.

℞. Oxymellis simpl. ʒii. aquæ decoct. cyperi acori epithymi pæoniæ passularum anthos lb. i. misce

Garg. ad idem.

℞. Ciperi acori fol. senæ epithymi camomillæ stœch. arab. pœoniæ coquantur in aqua & vino odorifero adde oxymellis s. ℥ii. misce.

Gargif. ad paralyfin, torturam & granitatem lingua.

℞. Sinapis maioranæ origani hyssopi ana p. i. zinzib. piperis longi cubeb. pyrethri ana ℥iiij. staphidisagriæ ℥i. β. baurach ℥ii. rad. lilii cælestis capparorum ana ℥iiij. granorum granatorum acetos. torrefactorum ℥β. oxymellis s. ℥ ii. β. aquæ qu. s. misce.

Garg. ad catarrhum salsum os aut linguam vesicantem.

℞. Gallarum balauft. rosarum, sumach, corti. granatorum, plātag. solani ana m. β. sem. alchannæ, acaciæ, spodii, sand. rub. ana ℥i. aluminis ℥j. β. bulliant in lb. j. aquæ & aceti ros. ℥ii. aquæ plantaginis ros. solani ana ℥iiii. vsque ad consumptionem tertię partis coletur, intus addatur diamoron ℥iiii. mellis ros. ℥i. misce, fricentur etiam vesicæ cū puluere quem quære in litera P. folio.

Gargarif. stipticum ad os.

℞. Diamoron ℥i. rob. nucum ℥β. aluminis vsti ℥i. mell. ros. ℥i. β. nucis mosch. ℥i. β. aceti ros. ℥β. aquæ prunellæ lb. i. gargari- zet sæpius in die.

Garg. ad idem.

℞. Gallarum n. ii. sumach myrtillorum rosarum rub. ana ℥vi. stercoris canis ossa solum comedentis gallinæ saturagiæ

ana ℥i. fiat puluis cū aqua mellis distemperetur, fiat garg.

Garg. ad paralyfin & balbutiem lingua phlegma valde purgans.

℞. Stœch. arab. hyssopi saluię maioranæ ana p. i. pyrethri ℥i. cort. rad. capparorum ℥i. β. bulliant in aqua q. s. ad remanentiam lb. i. coletur intus dissoluatur oxymel squilliticum ℥i. β. misce.

Garg. ad idem.

℞. Origani sambucei fo. lauri hyssopi an. m. i. costi nigellæ pyrethri & piperis longi cubeb. ana ℥j. misce cum oxymelte squillitico.

Gargarif. ad squinantiam & elongationem vuluæ stipticum.

℞. Rob. nucum ℥i. β. aquæ decoct. sumach ℥β. misce.

Garg. nobile & expertum ad ulcera gutturis ex morbo gallico.

℞. Fol. plantaginis ros. caudæ equinæ acetosæ ana m. i. lentium hordei ana p. j. sumach balauftiorum ana ℥i. licij ℥β. myrob. citrin. ℥ii. bulliant in aqua ros. plantag. chalybeata vel in qua fabri extinguunt ferrum an. q. s. ita quod lb. i. β. remaneat coletur intus dissoluatur aluminis ℥j. β. aquæ vitæ ℥β. mellis ros. ℥iiii. misce.

L I X I V I V M.

Concordat cū balneis sacculis.

Lixinium ad dolorem capitis.

℞. Meliloti camomeli sam- psuchi satiregiæ arthemisię calamenthi origani ana m. i. fiat sacculus.

Ad

Ad dolorem capitis antiquum expertum.

℞. Decoctionis pœoniæ & rad. bryoniæ ana q.s. fiat lixiuiū quo caput lauetur, deinde in introitu lecti vngatur pars dolens cum ℥j. dialthææ & musci g. iij. miraberis effectum.

Lixiuum ad idem expertum.

Recip. Rad. serpentariæ pœoniæ ana ℥j. fol. hederæ lapideæ maioranæ bethonicæ rorisinari ana m. ij. coquantur in aqua ad consumptionem tertiæ partis, postea cum cinere, fiat lixiuium.

Nota, quod aliqui capiunt vitellum oui & aquam vitæ, & simul miscent, postea caput lauant & præcipue partem posteriorem, quod mihi certe maxime contulit.

Lixiuum aliud capitis confort.

℞. Calamenthi origani pulegii saluiæ iux rorisinari maioranæ camomillæ ana m. j. absynthii m. i. β. spicæ celticæ ℥j. flo. & baccarum lauri ana p. j. terantur & bulliant, & fiat sacculus.

Lixiuum aliud pro capite phlegmatico.

℞. Camomill. melliloti stœchad. arab. abrotani fol. lauri saluiæ maioranæ ana p. j. fiat sacculus.

Aliud ad idem.

℞. Camomillæ stœchad. arab. fol. lauri Bach. folliculorum fenæ ana m. j. misce.

Aliud ad idem.

℞. Azari panis porcini hederæ maioranæ rorisinari ireos ana m. j. cineris ligni ficus aut

iuniperi & lauri fiat lixiuium, in quo bulliet sacculus iste. ℞. Maioranæ rorisinari saluiæ camomillæ stœch. arab. calamenthi fol. lauri rosarum rub. ana p. j. macis nigellæ, nucis muscatæ, caryophyllorum cort. citri ana ℥ii. sandali albi & citrini ana ℥ss. terantur & fiat sacculus in tela linea.

LOTIO.

Lotio pedum semmifera.

℞. Fol. salicis solatri violarum lactucar. nenuph. ana m. ij. camomill. m. j. misce, da in introitu lecti.

Lotio alia.

℞. Cort. mandragoræ ℥ss. viol. maluæ scariolæ, lactuæ, portulacæ ana m. i. flor. nenuphar. cort. papau. albi ana ℥ss. lauentur crura & nares in introitu lecti.

Ad dolorem dentium, & gingivas putrescentes.

℞. Balaustiorum sumach gra. myrtillor. cap. glandium ana zi. β. cort. rad. mori cappar. ana zii. liquiritiæ zii. β. sandaracæ, sarcocollæ thuris ana zi. ireos zi. β. bulliant in aqua ferrata vel vino tenui austero.

Ad gingivas putrescentes.

℞. Gallarum sumach myrtillor. balaust. capul. glandium sem. myrtillorum plantag. ana zi. vitrioli albi aluminis scissilis ana zi. β. antophili, sem. rorisinari ana zii. β. terantur grosso modo, & bulliant vsque ad consumptionem medietatis, coletur & sæpe os lauetur, deinde

super gingiuas & radicem dentium aspergatur iste puluis. ℞. Mastiches sandarachæ acaciæ hypocystidis ana ℥i. thurię præparatæ ʒj. vitrioli albi ℥iiij. fiat puluis, expertum est.

Lotio manuum & pedum elegans contra epilepsiam quæ semper horans ante cœnam fieri debet.

℞. Granorum & rad. pœoniæ ana m. ij. visci quercini m. ij. granorum paradisi lign. aloes, styracis, calamitæ ana ʒß. fiat sacculus, & bulliat & prohibet paroxysmum epilepticum.

L I C I N I V M.

Licin in tenasmo & dysenteria.

℞. Sumach ʒi. hypocyst. ℥i. balauft. acaciæ ana ℥ij. opij ℥j. cum succo plantaginis & albumine oui.

Aliud dolorem sedans in dysent.

℞. Croci thuris licii myrrhæ ana ʒi. ß. opij ℥j. cum vino rubro.

Aliud ad idem.

℞. Thuris gummi arab. licij ana ʒi. opii ℥ij. cum infusione tragacanthi.

Aliud ad idem pulchrum.

℞. Myrrhæ boli arm. acacię hypocyst. licij croci opij ana ℥j. cum infusione tragacanthi q. s.

Aliud ad idem nobile.

℞. Sang. draconis boli armeni cerussæ nouies ablutæ in decoctione mastiches ana ʒi. opii, hyosciami ℥ij. croci ℥i.

Aliud ad idem excellentius ceteris.

℞. Opii hyosciami papaueris albi mandragoræ an. ʒi. cortic. granat. myrtill. croci mastiches

ana ʒi. succi plantaginis q. s.

L I N I M E N T V M.

Limimentum in morphaa subnigra.

℞. Tartari fulig. ana ʒii. sulphuris viui nitri ana ʒi. aluminis helleb. vtriusque auripigmenti lithargyri ana ʒß. pulueriscentur omnia & incorporentur cum sapone saraconica & succo lapathij acuti fumiterræ panis porcini, misce bene ad bonam spissitudinem.

Linimen. ad idem.

℞. Aquæ ros. succositatis citri ana ʒiiij. sulphuris viui puluerisati ʒi. stent per dies xx. ad solem in vase vitreo & faciem illines bis in die vitrum non mouendo.

O D O R A M E N T V M.

Odoramentum capitale & cordiale nobile in materia mixta.

℞. Ros. rub. non adhuc maturatum ʒij. lambrusci flo. falicis ana ℥ij. behen vtriusque sem. basiliconis florum eius maioranæ ana ʒß. melissæ ʒj. caphuræ ʒß. moschi ambræ ana g. iii. terantur & fiat sacculus in syndone rubea interbastatus. Nota, quod ex istis odoramentis sacculos, puppas, poma, syrupos quoque facere potes.

Odor. ad dolorem capitis frig.

℞. Origani folii maioranę ana ℥i. lign. aloes ʒj. ß. styracis calamithę cyperi mastiches

ana ʒ β. ambra ʒ viii. ladanii ʒi. fiat pomum cum infusione tragacanthi in aqua origani cum musco ambra, & ligentur in syndone rubea.

Odor. ultimum ad cerebrum frigidum confortandum.

℥. Aqua maiorana ʒiii. musci el. g. v. trahatur mane ieiune octo diebus continuis tepide per nares parum factis antea euacuationibus, quia videbis effectum mirabilem.

Odor cerebrum confortans & ipsius opilationes profundas aperiens.

℥. Lign. aloes maioranae anthos sem. basiliconis ana ʒi. gra. paradisi cubeb. zinzib. garyophyl. ana ʒij. musci ambra ana gr. iij. ros. cort. citri ana ʒj. origani ʒij. terantur omnia per se, & ligentur in syndone rubea & saepe odoretur.

Odoramentum aliud sublime & mirandum ad caput confortandum.

℥. Musci ambra ana ʒi. lign. aloes ʒi. maiorana ʒβ. behen vtriusque croci garyoph. ana ʒi. rosarum non perfecte apertarum lambrusci spodii ana ʒi. pulueriscentur omnia per se & ligentur in syndone rub. & odoret quia expertum est.

Odor. trahens phlegma à capite

℥. Nigella horas 24. in aceto nutrita & in syndone inuoluta ʒβ. expertum est. Si volumus ut attrahat infundatur, si solum aperire debet non infundantur.

Odor. ad idem.

℥. Ladani lig. aloes ana ʒij. musci gran. iij. misce.

Odor. ad dolorem capitis frigid.

℥. Lig. aloes ʒi. β. florum hederæ spicæ stæch. arab. ana ʒi. macis maiorana an. ʒj. azari origani ana ʒj. lambrusci ʒj. β. fiat sacculus & odoretur.

Odor. aliud expertum & nobile.

℥. Nigellæ in aceto infusa & exiccata ʒj. ʒ. Nucis mosch. lig. aloes. sand. citrini an. ʒβ. ligentur in petia.

Odor. in dolore capitis calido.

℥. Flor. nenuph ʒi. ros. rub. violarum se. acetosa, endiuia, portulaca ana ʒβ. macis ʒij. camphoræ ʒβ. lig. aloes ʒi. terantur vt fiat puluis, & ponatur ad puppam & odoretur.

Odor. ad idem.

℥. Flor. violarum nenuph. ros. sandal. citrini ana ʒβ. infundantur in aceto parum, exiccantur & odoret, vel absque aceto odoret. In materia autem mixta adde garyoph. ʒj. infundantur in aceto.

Odor. ad tremorem cordis.

℥. Croci ʒβ. macis ʒj. cort. citri ʒij. lig. aloes ʒj. β. behen vtriusque fol. basiliconis an. ʒiiii. terantur & ponantur in syndone rub. & odoretur.

Odor. ad dolorem capitis cal.

℥. Flor. violarum nenuph. salicis ana ʒβ. ros. rub. ʒij. camphoræ ʒj. fiat sacculus tritis speciebus, & cum aqua ros. fiat magdaleon.

Pulvis ebrietatem tardans.

O L E V M.

Oleum ad erectionem virgæ.

℥. Formicarum habentium alas ℥iiii. ol. sambucellini ℥ vii. stent in vase vitreo obdurato ad solem 10. diebus, postea adde cumini caryoph. piperis galange pyrethri costi ciperi ana ℥i. pulveriscentur & bulliant in succo maioranæ ℥iiii. & vini ℥viii. ad consumpt. medietatis, fortius colantur & cum formicis miscentur, & iterum parum bulliant, coletur, vngatur pecten & virga, pulchrum est certe.

Oleum de fermento, de synapi, de vitello ouorum, de tartaro, de iunipero, de serpentibus, valent ad faciem decorandam.

P V L V I S.

Pulvis pro botio montagnana.

℥. Auellanæ spongiæ vsta paleæ marinæ chartæ combustæ oct. supra sem. plantag. ana ℥β. trium piperum ℥γ. salis gemmæ lapidis pumicis nucis moschatae gallarum aristol. longæ cinnamomi helleb. alb. & nigri ana ℥ii. limaturæ ferri præparati cineris corticum ouorum ana ℥β. (℥β.) misce fiat pulvis da ℥i. ieiuno per 4. hebdomadas.

Pulvis pro mingentibus in lecto.

℥. Stomachorum gallinarum præparatarum ℥β. agrimonie ℥i. cineris Eritii combusti ℥iiii. fiat pulvis da ℥i. in introitu lecti cum modico vino aut brodio.

℥. Sem. caulium nabaci cumini amygd. dul. mentastri absynthii ruthæ siccæ ana ℥i. salis ℥i. β. ameos ℥i. fiat pulvis da ℥ii. cum aqua frigida si tum febris non est.

Pulvis ad idem.

℥. Coriandri præparati sumach berberorum se. caulium citoniorum spodii ana ℥β. caphoræ ℥β. (℥β.) misce fiat pulvis da ℥ii. cum vino granatorum.

Pulvis pro cerebri confortatione, depilatiuus & materialium phlegmaticarum consumptiuus.

℥. Stechad. arab. origani calamenti pulegii, granorum paradysi aristol. rotund. maioranæ azari ana ℥iiii. bethon. flo hypericonis macis ana ℥ii. fiat pulvis, ponatur in introitu lecti super commissuras capitis mane cum sedula aut pectine caput à pulvere mundat.

Pulvis optimus ponendus super commissuras capitis ad ventositatem & humiditatem in oculo.

℥. Sem. ruthæ gallitrici euphrasie verbenæ caryophilaginis ana ℥i. ligni aloes ℥ii. caryophyllorum ℥i. β. fiat pulvis. Caryophilago est herba crescens ad altitudinem vnius palmæ pluribus ornata virgulis folijsque subtilibus & mollibus pilisque quamplurimis referta.

Pulvis electus ad ardorem urinae cholericum.

℥. Sem. endiuia scariolæ

acetosæ ana. ℥ii. se. portulacæ
lactucæ ana. ℥ß. papa. albi pi-
nearum incisarum ana. ℥i. sem.
hyosciami ℥ ii. pulueriscentur
puluerisanda, cætera scindantur,
& cum dupla quantitate zuchari
tabasset, misce & fiat puluis.

Puluis stomachalis.

℞. Cinnamomi el. ℥iß. zz. li-
quiritiæ ana. ℥ß. piperis longi,
caryophyllorum, galangæ macis
cardamomi meletæ nucis
mosch. ana. ℥i. spicæ ℥i. misce
fiat puluis.

*Puluis alius stomachalis qui dicitur
dulcis.*

℞. Cinnamomi el. garyophyl-
lor. interiorum cinnamomi, a-
momii melligetæ trium pipercon
zz. folii ligni aloes, macisan. ℥
ß. cardamomi cubeb. ana. ℥i.
spicæ nardi ℥ß. moschatæ am-
bræ ana. gr. v. nucis mosch. ℥i.
zuchari ℥vi. fol. auri n. vi. misce.

Puluis pro epithemate cordialis.

℞. Flo. borag. buglossæ, melif-
sæ ana. m. ß. sand. om. ros. rub.
ana. ℥ii. doronici behen vtriuf-
que charabe ossis de c. cerui ana.
℥iii. cort. citri sem. acetosæ ca-
ryoph. ana. ℥ß. croci ℥ß. frag-
mentorum om. ana. ℥i. fiat pul-
uis aut cum aliquo syrupo elect-
fol. auri & arg. n. xxv. si placet.

*Puluis cordialis temperatus in cali-
ditate.*

℞. Corall. amborum terræ si-
gill. ana. ℥ß. rasuræ eboris, cor-
nu cerui, margaritarum, corian-
dri præparati, spodii rosarum
ana. ℥ii. sem acetosæ ossis de
corde cerui fragment. om. ana.
℥ß. fol. auri n. xxv. zuchari ℥iii.
fiat puluis cum ℥ß croci marg.
℥ii.

Puluis contra vermes expertus.

℞. Cornu cerui vsti, nigellæ
præparate, myrrhæ diptami sem.
caulium sem. acetosæ coriandri
præparati tormentillæ sem. por-
tulacæ ossis de cor. cerui ana. ℥i.
fragmentorum om. ana. ℥ii.
rheub. el. ℥iii. fol. auri n. vi. sem.
leuistici ℥ iii. misce fiat puluis.

*Puluis in ardore urinae & mictu
sanguinis.*

℞. Sem. melonum mund. ℥ i.
citrulli portulacæ cucurbitæ pa-
pa. albi an. ℥ß. hiosquiæ ℥ii.
zuchari ad pondus om.

Puluis stomachalis pulct. eret. brevis.

℞. Cinnamomi ℥ß. caryophyll.
galangæ lign. aloes, macis, nu-
cis moschat. zinzib. ana. ℥iii.
coriandri ℥ß. zuchari ℥vi.

Puluis stomachalis.

℞. Cinnamomi caryophyll. ga-
langæ macis nucis moschat. car-
damomi cubeb. zinzib. ana.
℥i. folii foliorum lauri ana. ℥ii.
lig. aloes ℥ii. se. anisi, fœniculi,
coriandri ana. ℥iii. zuchari ℥ßß.
misce.

Puluis capitalis.

℞. Cinnamomi caryophyllor-
um galangæ nucis mosch. car-
damomi cubeb. piper. longi ana.
℥i. se. pœoniæ ℥ii. zuchari ℥v.

*Puluis elegans ad caput frigidum
qui supra commissuram coronali po-
ni debet.*

℞. Anthos maioranæ stœchad.
amb. ana. ℥. caryoph. ℥iii. misce,
fiat puluis, & scias, quod solus
puluis caryoph. ad hoc summe
valet, potest etiam sacculus fieri.

Pulvis aspergendus super commissuras capitis sero, quando vadit dormitum ad idem.

℞. Bethonicae pulegii origani calamenthi stœchad. arab. ana ℥i. macis lig. aloes an. ʒß. maioranæ caryophyl. ana ℥ii. misce, fiat pulvis.

Pulvis violarum Francisci Ferrarij.

℞. Ireos Florentinæ ʒxiiii. rosarum ʒi. storacis cyperi sand. alb. & citrinorum ana ʒvi. sam-pfuchi ʒii. ß. calami arom. ʒiii. caryoph. ʒi. ß. lauendulæ ʒiii. coriand. ʒi. ß. misce, fiat pulvis, adde muscum ad placitum.

Pulvis alius.

℞. Ireos ʒviii. rosarum ʒxi. sand. albi ʒi. caryoph. ℥ii. maioranæ ʒx. calami aromatici ʒii. cyperi ʒß. (ʒß.) coriandri ℥ß. lauendulæ g.iii. fiat pulvis.

Pulvis elegans solutivus.

℞. Mastiches ℥i. croci ℥ß. spicæ, cinnamomi cardamomi caryoph. macis ana ʒß. sc. anisi azari ana ℥ii. rosarum ℥i. violarum ʒi. turbith. ʒi. ß. zz. ℥i. rheub. el. diagridii ana ʒi. fiat pulvis da ʒi. quia satis fortis est.

Pulvis phlegmatis & melancholice solutivus.

℞. Violarum epithymi stœchad. arab. an. ʒß. carthami ʒii. ß. caryoph. zz. spicæ macis anisi ana ℥ii. diagridii ʒi. ß. da ʒi. fortis satis certè est.

Pulvis solutivus in dyscrasia frigida stomachi.

℞. Spicæ cinnamomi garvoph. carpobalsami galangæ xylobalsami zz. lig. aloes, azari, piperis longi cassiæ lignæ calami arom. cyperi ana ℥i. ma-

cis ʒi. ß. turbith. ʒii. ß. diagridii ʒi. ß. fiat pulvis da ʒi.

Pulvis elegans solutivus in mixt.

℞. Sand rub. & alb. violarum ana ℥ii. anisi ʒßi cinnamomi nucis mosch. macis ana ʒi. turbith loti vt supra hermodactylorum ana ʒii. rheub. el. ʒi. ß. spicæ zinzib an. ℥ß. diagridii ʒi. misce da ʒi.

Pulvis ad idem.

℞. liquiritiæ rheub. el. ʒii. diagridii ℥iiii. pul. stomachalis confortatiui ʒiii. macis ʒi. senæ ʒv. fiat pulvis.

Pulvis solvens humorem phlegmaticum.

℞. Turbith albi & gummosi hermodactylorum ana ʒii. zz. mastiches caryoph. galangæ cinnamomi ana ʒß. diagridii anisi fœniculi grana solis ana ʒi. ß. zuchari ʒii. da ʒi.

Pulvis ad idem.

℞. Turbith ʒß. hermodactylorum ʒii. zinzib. ʒi. caryoph. macis nucis mosch. diagridii ana ʒß. zuchari ad pondus om. misce da ʒi.

Pulvis solutivus in mixtis humoribus elegans.

℞. Cinnamomi sacchari ana ʒiii. zz. caryoph. liquiritiæ, nucis moschat. ana ʒi. turbith. diagridii ana ʒi. ß. rheub. ʒii. ß. spicæ ʒi. fiat pulvis da ʒi.

Pulvis senæ caput purgans.

℞. Senæ ʒxii. zz. ʒiii. tartari cinnamomi ʒi ß. macis cubeb. piperis longi, nucis moschatae ana ʒi. fiat pulvis.

Pulvis ventrem leniens qui horis duabus ante cibum cum brodio sumi debet.

℞. Thymi, epithymi, poly-podii ana ʒi. fol. senæ ʒvii. tartari ʒiii. cinnamomi, macis, anisi, anethi ana ʒi. fiat pulvis da ʒi.

Pulvis ad ulcus renum & vesica, & ad ardorem urinae calidum.

℞. Sem. cucurb. cucum. melonis citrulli ana ʒii. portulacæ maluarum papa. albi dragacanthi succi liquiritiæ ana ʒj. sem. scariolæ lactucæ ana ʒij. citoniorum ros. spodij ana ʒj. ʒ. pinearum amygd. dul. ana ʒʒ. da cum syrupo violaceo, ego addidi mastiches ʒi.

Pulvis ad ardorem urinae, renum & vesica.

℞. Cucurb. melonum citrulli cucum. papau. albi portulacæ succi liquiritiæ dragacanthi ana ʒij. maluæ apii ana ʒi. amygdal. dul. ʒʒ. misceantur.

Pulvis elegans in passionibus renum & vesica & ardore urinae.

℞. Sem. cucurbitarum cucumeris melonum endiuæ lactucæ maluæ citrulli anisi ana ʒj. succi liquiritiæ ʒʒ. pinearum amygd. dul. ana ʒv. misce fiat pulvis.

Pulvis ad idem in magno dolore & mictu sanguinis.

℞. Sem. portulacæ, maluæ, lactucæ, citrulli cucurb. melonum ana ʒʒ. hyosquiami ʒiiij. spodii dragacant. boli ros. rub. violarum ana ʒj. sem. apij ʒʒ. amygd. dul. ʒʒ. succi liquiritiæ ʒi. misce fiat pulvis, da vt supra opij ʒʒ. adde si placet.

Pulvis expertus in ardore urinae.

℞. Sem. hyosquiami ʒii. opij ʒii. ʒ. se. citrulli lactucæ portulacæ ana ʒi. papau. albi ʒiiij. misce fiat pulvis da ʒj.

Pulvis sanguinis restrictius in vulnere.

℞. Boli sang. draconis aloes ʒi. misce, fiat pulvis apponatur vulneri.

Pulvis ad idem fortior.

℞. Calcis viuæ sang. draconis gypsi aloes thuris vitrioli ana ʒj. puluerisa cum albumine oui & tela aranea apponatur.

Pulvis sanguinem stringens.

℞. Boli ʒj. gallarum s. vstarum ʒj. sang. draconis, thuris aloes, mastiches ana ʒʒ. pilorum leporis subtiliter incisorum ʒij. misce fiat pulvis.

Pulvis ad idem.

℞. Thuris ʒj. sang. drac. ʒʒ. calcis viuæ ʒj. misce fiat pulvis.

Pulvis ad idem expertus.

℞. Balauft. ʒij. alum. ʒj. rosarum vstar. ʒʒ. (ʒʒ) misce.

Pulvis ad idem.

℞. Colophonix ʒj. boli ʒʒ. mastiches olibani sang. draconis ana ʒj. ʒ. rad. consol. maio. ros. rub. ana ʒj. misce.

Pulvis exiccans & sigillans superficiem vulneris cutimq; generans.

℞. Balauft. aloes sang. drac. caccochymicæ argenti, æris vsti & loti ana ʒj. misce fiat pulvis.

Pulvis alter ad idem.

℞. Cort. pini ʒʒ. lithargyri cerussæ ana ʒij. nucis cupressi centaureæ minoris aristol. vstæ an. ʒi. misce fiat pulvis, & si calidum est vulnus adde rosas nenuph. sand. alb. laccæ lotæ siccæ an. ʒij. misce.

Herniosorum elegans & stipticus vel consolidans continuus, puluis.

℞. Trium consolidarum, sigilli S. Mariæ vtriusque altheæ plantag. vtriusque valerianæ pimpinellæ ana m. i. nucis cupressi, muschatæ cinnamomi rheub. assi fructus tamarisce seminis nasturtii, cumini, coriandri in aceto præparati ana. ℥ii. sang. draconis thuris mastiches mumix terræ sigilli, boli sarcocollæ dragacanthi ana. ℥i. misce fiat puluis in aurora cum vino rubro stiptico ℥i.

Puluis ad elongationem vulvæ.

℞. Gallarum balaustiorum piperis pirethri ana ℥i. sand. rub. ℥ß. caphuræ ℥ß. misce fiat puluis, suffletur cum penna aut spatula eleuetur asperso hoc puluere.

Puluis in tenasmonæ & dysenteria intestinalium.

℞. Cerussæ ℥ß. gummi arabici dragacanthi amyli ana. ℥iii. clinix ℥ii. opii ℥i. misce.

Puluis restrictivus sanguinis.

℞. Thuris g. arabici dragacanthi torrefactorum ana ℥i. carabæ hæmatites anaz. i. ß. plumbi vsti sanguis draconis ana. ℥iiii. boli armeni ß℥. mumix sang. draconis ana ßii. fuliginis furni gypsi ana, ℥iii. misce fiat puluis.

Puluis stipticus.

℞. Boli ℥iii. myrtillorum ℥i. ß. sang. draconis ℥i. thuris mastiches ana. ℥ß. rosarum balaust. ana. ℥i. misce fiat puluis.

Puluis expertus multoties ad aperiendas vias renum & matricis.

℞. Milii solis ameos saxifrag. anisi marathri carui dauci petro-

selini apii anethi macedonici raphani asparagi brusci nucleorum persicorum ana ℥ß. spicæ azari cyperi acori ana. ℥i. rubeæ tinctorum ℥v. lapidis spongiæ Iudaici maxillarum lucii ana. ℥i. liquiritiæ rasæ ℥ß. sang. hirci præparati ℥ii. g. tragacanthi ℥i. ß. misce fiat puluis.

Puluis diureticus.

℞. Azari petroselini ana ℥i. ß. meu acori phu ana. ℥ii. dauci anisi carpobalsami apii liquiritiæ ana. ℥i. sem. citrulli melonum cucum. ana. ℥i. ß. misce fiat puluis, da vt conuenit.

Puluis alius.

℥. Sem. dauci anisi saxifrag. carui milii sol. & petroselini apii ameos ana. ℥i. squinanthi carpobalsami costi azari rad. capparorum acori enulæ rub. tinctorum ana. ℥ß. chamædrios chamæpytheos parietariæ verbenæ meu spicæ ana. ℥i. caryophyl. nucis mosch. ana. ℥ii. liquiritiæ ℥ß. misce fiat puluis, potes si libet addere rheub. el. ℥iii.

Puluis ad idem nobilis.

℥. Sem. melonum mund. dauci milii solis vitri combusti ana. ℥iii. liquiritiæ ℥ii. da post balneum ℥i. cum brodio cicerum rub. potes si libet fortiolem facere.

Puluis nobilis & expertus contra calculum.

℥. Milii solis saxifrag. ameos anisi carui marathri dauci petroselini apii cumini anethi leuistici cardamomi piperis longi sileris montani se. papa. albi melonum maluæ aspargi gr. iuni-
peri

peri hederæ nucleorum persicorum ana ʒj. rad. saxifrag. zzb. galangæ cinnamomi spicæ azari cyperi acori sandal. amborum, lapidis Iudaici, lincis spongiæ rasuræ eboris, maxill. lucij ana ʒß. sang. hirci præparati, ʒj. fœniculi ʒi. misce fiat puluis. Si vis elect. parare, adde syr. liquiritiæ, q. s. da ʒij. vel iij. cum decoctione cicerum rub. in aurora vel post balneum.

Puluis ad retentionem urinæ.

℞. Sem. apii, raphani, milij solis, rubear tinctorum, petroselin. Macedonici, iuniperi, ameos fœniculi, spicæ, amygd. amararum, an. ʒß. azari, sem. melonum, an. ʒij. canthar. abscissis alis & capitib. ʒj. Misce, fiat puluis cum ʒj. armoniaci in vino dissol. da cum decoct. diuretica.

Puluis urinam subito prouocans.

℞. Sanguinis hircini præparati, lapid. lyncis, spongiæ Iudaicæ, vitri combusti, an. ʒj. misce, fiat puluis, da ʒß. cum liquore aliquo conuenienti.

Puluis valde odoriferus, qui supra carbones poni debet.

℞. Ireos tbi. rosarum ʒiii. storacis, calamitæ, ʒiß. sandali muscatellini ʒx. calami aromatici ʒvi. cyperi, ʒi. sampsuchi ʒß. caryoph. ʒii. coriandri præparati ʒiii. musci ʒi. misce, fiat puluis: hunc puluerem potes reducere in pilulas, & elect. contra fœtorem oris in usu habere, quia summe valet.

Puluis ad putrefactionem gingivarum.

℞. Consolid. maior. caryoph. cinnamomi, ros. rub. cort. gra.

natorum an. ʒi. Misce, fiat puluis cum cornu cerui vsti & salis gemmæ an. ʒß. Valet enim in carne addita.

Puluis ad idem.

℞. Caryoph. nucis mosch. rosarum rubr. aluminis zucharini, pyrethri, capitum & crurium cancerorum, ossium dactylorum combustorum, cort. mali granati, an. ʒii. Misce. fiat puluis, ante huius pulueris vsum dentes fricentur, cum aceto aut aqua rosarum, fortior est superiori & elegantior.

Puluis ad morsum canis rabidi.

℞. Cineris cancerorum fluuialium adustorum ana ʒvi. gentianæ, ʒii. ß. terræ sigillatæ ʒi. Misce. fiat pulta cum aqua mane ʒiii in qua cancri fuerint cocti, & hoc fit per mensem vnum continuum.

Puluis ad morsum canis rabidi, & præcipue, ubi iam incipit melancholizare, & expertum est.

℞. Veterum cantharid. abscissis cruribus & capitibus ʒi. lentium mundat. ʒß. croci. spicæ, caryoph. an. ʒß. da ʒß. cum vino mane tribus aut quatuor diebus, donec sanguinem mingat, & liberabitur.

Puluis cibalis pro stomacho frigido.

℞. Cinnamomi ʒß. ligni aloes, spicæ, caryoph. macis, nuc. mosch. an. ʒi. ß. zz. ʒiii. zuchari ʒiii. misce fiat puluis.

Puluis contra ebrietatem.

℞. Coriandri præparati ʒß. sumach. berberorum, sem. citoniorum, caulium an. ʒi. camphoræ gra. vi. da cum vino granatorum.

Pulvis ad idem.

℞. Sem. caulium, endiuia, berberorum, lentium excorticat. ros. rub. spodii an. ℥ii. da cum vino.

Pulvis ad idem.

℞. Coriandri ℥β. sem. citoneorum, caulium, spodii, berberorum an. ℥i.

Pulvis expertus contra lepram, & omnem sanguinis infectionem.

℞. Seri caprini q. sufficit pro haustu, puluer. epithymi ℥ii. Misce, bibatur mane tepide 40. aut 50. diebus, quia maximæ virtutis est.

Pulvis papau. communis expertus ad rubedinem oculorum.

℞. Thuthiæ præparatæ ℥i. antimonii præparati ℥β. margaritarum ℥ii. corallor. rub. ℥iβ. ferici crudi de flosculo vermis ℥β. misce, f. alkohol, seruetur in ferreo aut plumbeo vasculo, & cum stylo imponatur argenteo.

Pulvis cibalis in tympanitide.

℞. Cinnam. ℥β. cardam. ℥i. cumini, carui, fœniculi, anisi ana ℥β. caryoph. nuc. mosch. piperis longi, ℥℥. an. ℥i. β. piperis nigri ℥β. croci ℥i. zuchari &c.

Pulvis calidus cibalis.

℞. Piperis longi, caryoph. nuc. mosch. solii, galangæ ana ℥ii. cardamomi ℥β. croci ℥i. ℥℥. ℥iii. macis ℥i. cinnamomi ℥i. zuchari &c.

Pulvis stipticus ad destillationem urinae.

℞. Glandium ℥β. myrtyll. ros. rub. an. ℥i. β. acaciæ ℥i. amyli, carab. dragacanthi, boli an. ℥i.

lentium excorticat. ℥iii. Misce, fiat pulvis.

Pulvis exiccans sperma.

℞. Cumini, carui, origani, menthæ, calamenthæ, rutæ an. ℥i. ℥℥. cinnamomi an. ℥iii. ameos, amomi, sem. agni casti, an. ℥i. β. Misce. fiat pulvis.

Pulvis ad idem.

℞. Sem agni casti ℥β. mentastri, ruthæ, cumini, cyperi, balauft. ameos, anaomi an. ℥i. Misce. fiat pulvis.

Pulvis ad imprægnationem.

℞. Granorum pœoniæ, rad. mandrag. an. ℥β. moschi, ambræ an. gr. iiii. Misce. fiat pulvis, aspergatur bombaci & intromittatur.

Pulvis pro hepate elegans confortativus, & præcipue in hydrope.

℞. Cinnamomi ℥i. β. cardamomi caryophyll. nuc. mosch. an. ℥i. β. sem. anisi, fœniculi, cumini, dauci, ameos, an. ℥i. piperis longi, ℥℥. an. ℥β. sandal. alb. & rub. rasuræ eboris an. ℥i. amili, spicæ ℥i. Misce fiat pulvis.

Pulvis quo fricantur vesicæ in ore vena cum gargarismate ad hoc.

℞. Citoniorum combust. ℥i. β. gallarum nuc. cupressi cort. granatorum, balauft. boli armeni, mastiches an. ℥β. aluminis zucharini ℥i. caphuræ ℥i. Misce fiat pulvis.

Pulvis exiccationis stipticus.

℞. Nucum cupressi, cort. granatorum ℥ii. balauft. pul. qui reperitur in lignis marcidis quernis gallarum (aloe) cortic. pini an. ℥iii. lythargyri, cerussæ, ana ℥ii. aristol. vstæ, centauriæ an. ℥i. β. thuthiæ præparatæ ℥β. vermiū

terrestrium, testarum conchilio-
rum, plumbi vsti, aris vsti, san-
guinis draconis an. ℥ii. masti-
ches, sarcocollæ, colophonix,
olibani an. ℥ii. β. atramenti ℥β.
cort. salicis ℥i. Misce fiat pulvis.

Pulvis contra dolorem matricis.

℥. Nuc. mosch. ℥i. zz. ℥i. se.
urticæ, nasturtij, myrtillorum
an. ℥ii. Misce. f. pulvis. da ℥j.
cum oleo oliuarum aut amygd.
dulcium.

Pulvis contra calculum.

℞. Sem. milii solis, saxifragiæ,
alkakengi Macedonici, Petro-
selini, bauriæ cretæ marinæ an.
℥β. sem. anisi, fœniculi, xilo-
balsami, carpobalsami an. ℥ii. li-
quiritiæ ℥iii. pilorum leporis
combustorum, lapidis lyncis,
spongiæ an. ℥i. sang. hircini præ-
parati ℥β. cinnamomi, caryo-
ph. ligni aloes, nuc. moschatae
an. ℥i. Misce. fiat pulvis.

*Pulvis elegans ad Stomachi debili-
tatem.*

℥. Cinnamomi ℥β. macis nuc.
mosch. galangæ, zz. melegetæ,
cardamomi, folii, piperis longi,
an. ℥i. croci ℥β. zuchari ℥v. Mi-
sce fiat pulvis.

*Pulvis capitalis, qui poni debet su-
pra commissur.*

℥. Pulegij, calamenthi, stæ-
chad. cort. citri, maioranæ, be-
tonicæ, sandaracæ, caryophyll.
an. ℥ii. Misce. fi. pulvis.

Pulvis pro mingentibus in lecto.

℥. agrimonix ℥i. vel plus da
cū pauco vino in introitu lecti.

Pulvis ad idem.

℥. Pulveris Erinacei ℥i. vel
plus, similiter caro eius mirabi-
liter valet.

*Pulvis & est magnum meum secre-
tum ad putrefactionem gingiva-
rum, & dicitur pulvis de Brion-
ia, valens ad quasunque corru-
ptiones cancrasas & ulcerosas gin-
givas & aliarum partium corpo-
ris humani.*

Rec. succi brionix, ℥β. dra-
gacanthi, carab. torrefactorum
an. ℥i. sarcocollæ, mastiches,
thuris, Ireos an. ℥β. thutiæ lo-
tæ cum aqua rosarum ℥ii. cala-
menthi combusti ℥β. terantur
omnia, postquam fuerint pulue-
risata vt Alkohol in mortario la-
pideo, & ad solem exponantur,
donec consumatur succus: de-
inde alter succus addatur & hoc
fiat quinquies, postquam exic-
catus fuerit, aspergatur, aut cum
melle & puluere hoc sæpe li-
niatur.

*Pulvis ad Botium gulæ expertissi-
mus.*

℥. Spongiam vnā in furno
exiccatam ita vt possit pulueriza-
ri, & da ℥i. istorum pulu. cum
vino albo ieiuno, deinde desuper
ad omnes minus hor. iij. ieiunet,
& hoc facies hebdomadis aliqui-
bus continuis, & miraberis no-
bilem effectum.

*Pulvis experientissimus ad egressio-
nem ani & matricis.*

℥. ossium dactylorum vt alk o-
hol puluerifatorum, superasper-
gas ano & matrici.

Pulvis contra pestem excellens.

℥. boli præparati ℥i. tormen-
tillæ, daronici, diptamni, sand.
rub. an. ℥i. ras. ebor. spodij, cor-
tic. citri an. ℥β. margarit splēdid.
℥ ii. Iacynthi, saphyri an.
℥β. anth. off. de corde cerui

M m m ij

an. ʒi. rasuræ vnicornu ʒß. zuchari ad pondus omnium misceantur. f. puluis, da ʒß. & plus cum vino subtili.

Puluis carminatiuus.

℥. Origani, ruthæ, anisi calamenthi, ameos, carui an. ʒß. Thuris, mastiches an. ʒi. caryoph. ʒi. Misce fiat puluis.

Puluis cordialis elegans.

℞. Lapid. omnium pretiosior. an. ʒß. corall. amb. an. ʒi. ossis de corde cerui, spodij, ligni aloes, cinnam. an. ʒi. limaturæ auri & argentiana ʒi. croci ʒi. ambre gr. ii. Misce fiat puluis.

Puluis expertus ad ardorem vrinæ.

℥. Sem. cucumeris, cucurbitæ, citrilli, melani, portulacæ, maluæ, papau. albi an. ʒi. 6. dragacanthi, viol. amyli, spodii, boli ana ʒß. zuchari ad pondus omnium f. puluis.

Puluis contra dolorem post partum.

℥. Cassiæ lign. cinnamomi, capill. veneris an. ʒii. sem. anisi, passularum an. ʒß. Misce. f. puluis, da cum vino albo quia optimus est.

Puluis pro fluxu spermatur.

℞. Menthæ siccæ ʒiii. sem. agni casti, rad. ireos, an. ʒii. sem. ruthæ ʒi. sem. lactucæ ʒii. ʒ. zachari ad pondus omnium, Misce, f. puluis, da ʒii. cum vino albo ieiune.

Puluis expertissimus ad epilepsiam puerorum.

℞. Coriandri præparati cum aceto & vino citoniorum ʒi. sem. pœoniæ, portulacæ an. ʒi. vngularum asini adustarum ʒß. Misce, f. puluis, da cum aqua ruthæ diebus 40. continuis.

Puluis ad exitum ani.

℥. Thuris, mastiches, nucis cupressi, antimonij, cort. granatorum balauft. glandium an. ʒi. Misce f. puluis.

Puluis expertus ad frangendum lapidem in vesica.

℞. Milii solis, saxifragiæ, cinnamomi, capill. veneris sem. anisi an. ʒi. liquiritiæ ʒi. ʒ. lapidis lincis iudaici an. ʒi. sem. melonum, asparagi ana ʒi. Misce, fiat puluis, da cum vino albo ʒiiij.

Puluis contra morsum scorpionis, & phlegmaticam febrem, item quartanam expertus.

℞. Asæ fœtidæ, ruthæ, piperis, myrrhæ ana partes æquales, Misce. fiat puluis, da ʒi. cum vino, contra morsum scorpionis, contra quartanam hora vna ante paroxysmum, cum oxymelite simplici, ʒii. diebus 3. in hora paroxysmi factis antea euacuationibus.

Puluis ad morsum scorpionis nobilis.

℞. Aristoloc. vtriusque ʒz. an ʒii. calamenthi ruthæ syluestris an. ʒß. Misce, f. puluis, da ʒi. cum vino, & locus emplastratur, cum foliis lauri in vino decoctorum.

Puluis ad occultam ventositatem stomachi & intestinorum.

℥. Cassiæ lignæ, spicæ, celticæ, sem. apij, marathri, anisi, anethi, rad. cotti, azari vtriusque, cardamomi, caryophyll. ʒz. piperis longi & nigri an. ʒß. cinnamomi ʒii. macis ʒi. Misce f. puluis, da ʒj.

Pulvis carminatiuus ventositatum.

℞. Carui, anisi, cumini, cinnamomi, cardamomi, vtriusque macis, apij, ameos, caryoph. ʒʒ. galangæ, piperis vtriusque ana ʒi. baccar. lauri ʒ iij. Misce. fiat pulvis.

Pulvis ad idem.

℞. Cumini, carui, anisi, marathri ana ʒiij. sem. petroselini, apij, ameos, anethi an. ʒij. pyrethri, ʒʒ. galangæ, piperis vtriusque an. ʒʒ. asari ameos, cinnamomi, spicæ, squinanthi, ciperi, cardamomi, cubeb. garyoph. an. ʒ i. Misce. fi. pulvis.

Pulvis ad idem.

℞. Cumini, piperis longe ʒʒ. galangæ an. ʒi. ʒ. costi, azari, ameos, spicæ, carpobalsami caryoph. cub. folij, Xilobalsami, sem. marathri, sileris montani an. ʒi. maioranę, ruthe, an. ʒj. fiat pulvis.

Pulvis ad grossam ventositatem & grossos humores in stomacho.

℞. Sem. anisi, ameos, apij, ʒj. ʒ. mastiches, squinanthi, costi, ana ʒʒ. thuris ʒj. nasturtij, pyrethri an. ʒi. Misce. fiat pulvis.

Pulvis digestionem confortans, inflationem curans, epilationes hepatis & splenis aperiens senibus, &c.

℞. ZZ. ʒiij. origani, mastiches an. ʒj. carui, cumini, piperis nigri ʒj. ʒ. sem. anisi, marathri, carui an. ʒ ii. Misce. f. pulvis.

Pulvis ad frigiditatem stomachi & corruptionem.

℞. Mastiches, caryoph. cumi-

ni, cubeb. ʒʒ. cardamomi, spicæ, anisi, ʒj. ʒ. ozymi, azari an. ʒʒ. ligni aloes ʒij. galangæ ʒj. Misce f. pulvis.

Pulvis ad stomachum malum & colorem pallidum.

℞. Mastiches, caryoph. cassiæ, lignæ asari, ros. ozimi, cort. citri an. ʒj. galangæ, macis ʒʒ. nucis mosch. ana ʒj. Misce fiat pulvis.

Pulvis ad idem.

℞. ZZ. sem. anisi, apii, marathri, spicæ ana ʒj. ameos ʒi. ʒ. menthæ, calamenthi an. ʒj. cassiæ lignæ, cumini, carpobalsami, pyrethri ana ʒ ij. folij ʒʒ.

Pulvis de Polypodio solutivus.

℞. Sem. anethi, anisi, liquiritiæ violarum, acetosæ, endiuicę an. ʒi. ʒ. poly. odij ʒj. macis, cinnamomi an. ʒi. mastiches ʒj. diagridii ʒij. flor. nenuphar. ʒiij. Misce. fiat pulvis.

Pulvis de polypodio.

℞. Polypodii ʒi. cinnamomi ʒi. ameos, anisi an. ʒj. tartari ʒij. salis Indi ʒi. Misce. fiat pulvis.

Pulvis addysenteriam.

℞. Boli ʒiij. spodij sem. acetosæ, amyli max. (asforum) an. ʒij. sem. maluæ, acaciæ an. ʒʒ. psilij albi ʒij. Misce. f. pulvis, da cum liquore stiptico.

Pulvis ad idem.

℞. Sem. porri ʒ ii. Ozymi, dragacanthi, amyli asforum, glandium siccarum, sanguinis draconis, balaust. an. ʒʒ. Misce. f. pulvis.

Pulvis alter elegans ad idem.

℥. Sem. ozymi, nucleorum, passularum, sumach an. ʒii. glandium siccarum assarum, cast. ceterach, balauft. an. ʒj. sem. coriandri assi ʒi. sem. acetosæ, spodii, myrtill. gallarum assarum an. ʒi. β. Misce. fiat pulvis.

Pulvis ad lienteriam.

℥. Nucleorum granatorum acetosor. ʒ. cumini in aceto infusi & assi, myrtill. Xylocaractæ, coriandrorum assor. sumach, glandium, balauft. assar. an. ʒi. mastiches ʒ2. Misce.

Pulvis alius elegans & expertus ad fluxum antiquum & diuturnum.

℥. Balauft. sumach, glandium, Xylocaractæ, myrtill. nucleorum, granatorum acetos. hypocist. spicæ, coriandri, nucleorum passularum, apii gallar. omnium assarum an. ʒi. sem. hyosciami ʒi. β. mastiches, olibani an. ʒi. Misce. f. pulvis.

Pulvis elegans in excoriatione intestinorum.

℥. Psillii ʒi. sem. portulacæ, acetosæ, arnoglossæ, anteræ, amyli, terræ sigillatæ gr. dragacanthi, omnium assorum an. ʒ3. Misce. f. pulvis.

Pulvis ad sanguinem fluentem ex ano & vulua.

℥. Sumach, balauft. coriandri, gallarum in aceto infusarum, caryoph. concharum assar. carabe, corall. an. ʒβ. Misce. f. pulvis. Nota quod ex huiusmodi stipticis facere potes pulveres, emplastra, cerata, fumigia,

lixivia & alia, vt proposito tuo videbitur.

Pulvis valde stipticus pro clistere in dysenteria & tenasmonie.

℥. Panis assi ʒβ. sandal rub. gland. gallar. gr. dragacanthi assar. sanguinis draconis, acaciæ an. ʒi. opij ʒi. β. Misce. f. pulvis, da ʒi. β. in vna vice, potes etiam cerussæ ʒ4. addere si libet.

Pulvis ad idem.

℥. Sandaracæ ʒi. acaciæ, carthæ, bombicis vst. an. ʒ2. β. ros. rub. antheræ, arnoglossæ an. ʒi. Misce. fiat pulvis, dosis ʒ2.

Pulvis ad mictum sanguinis.

℥. Sem. citrulli, cucurbitæ, cucumeris, melonum portulacæ, spodij, succi liquiritiæ an. ʒ2. lactucæ, maluæ, ros. rub. papau. albi, dragacanthi an. ʒ2. sem. myrtill. acetosæ, boli acaciæ an. ʒi. Terantur & cum succo plantaginis, f. trochisci, excidentur, & iterum puluerisentur, da cum liquore conuenienti.

Pulvis sanguinem stringens expertus.

℥. Thuris, sang. draconis, gipfi, granorum passularum, pulueris molendini, stercoris equini vel asini vsti an. ʒi. fiat pulvis, qui imponatur cum albumine oui.

Pulvis Rhasis carnem generans.

℥. Olibani, sarcocollæ, sang. draconis, rad. ireos, an. ʒi. Misce. f. pulvis.

Pulvis Lanfranci ad idem.

℥. Thuris, mastiches, fœnu-græci an. ʒi. f. pulvis.

Pulvis incarnatiuus.

℞. Rad. ireos, aristoloc. rotūd. vsta, myrrha, mastiches, aloes, sang. draconis, farinae orobi an. ʒ 2. Misce. f. pulvis.

Pulvis sanguinem stringens.

℞. Thuris, aloes, sang. draconis, mastiches, pilorum leporum subtiliter incisorum, tela araneæ an. ʒ ʒ. cum albo oui.

Pulvis ad idem fortior.

℞. Sarcocollæ, cort. granatorum, arill. pastular. sumach, spongiæ marinæ vsta, lateris vsti, scorix plumbi, tragacanthi, thutic an. ʒ i. tela araneæ ʒ i. ʒ. pilorum leporum subtiliter incisorum, Misce cum albumine oui.

Pulvis ad idem.

℞. Thuris ʒ 2. aloes ʒ i. pilorum lep. subtiliter incis. ʒ ʒ. cum albumine oui pulcher est & brevis.

Pulvis incarnatiuus stipticus elegans.

℞. Gallarum, nucum cupressi, glandium, thuris, mastiches, sarcocollæ, tartari aluminis zucharini an. ʒ i. f. pulvis.

Pulvis incarnatiuus.

℞. Farinæ lupinorum, orobi olibani, Ireos, sarcocollæ, myrrha an. ʒ i. Misce. f. pulvis.

Pulvis vulnera consolidans.

℞. Cerussæ lythargirij an. ʒ i. scorix plumbi, myrrha, gallarum an. ʒ ʒ. Misce. f. pulvis.

Pulvis ad idem probatissimus.

Rec. Olibani, aloes, sang. draconis, sarcocollæ an. ʒ i. ʒ. aristol. vsta, lithargirij, cerussæ, cortic. arbor. pini vstorum,

centauree minoris an. ʒ ʒ. gallarum, balauft. an. ʒ ij. Misce. fiat pulvis. vtere & miraberis.

Pulvis sanguinem stringens, ossa consolidans, unde in affectibus vularum magnum est secretum.

Rec. Consolid. maior, boli armeni an. ʒ i. picis Græ. ʒ ʒ. mastiches olibani an. ʒ ʒ. sang. draconis, mumix ʒ i. ʒ. potes addere telæ araneæ, spongiæ vsta, pilorum leporis subtiliter incis. an. ʒ i. Misce. fiat pulvis, expertum est.

Pulvis in stillicidio vrinae.

Rec. Spodii, rosar. an. ʒ 2. sem. portulacæ lactucæ, antheræ, sumach, succi liquiritiæ, sand. alborum, dragacanthi, lentium mundatar. coriandri in aceto infusi, an. ʒ i. Misce. f. pulvis, da cum liquore stiptico.

Pulvis expertus in macula oculorum.

Rec. Sacchari candi, tuthiæ præparatæ ʒ 2. pulueriscentur, & cum aqua rosarum in pelui aspergantur, imeretur pulvis, super fumo ligni aloes & modicum thuris, postea exiccetur vt alcohol, Misce. f. pulvis.

Pulvis expertus in icteritia & Hydrope.

Rec. Cantharid. adustar. ʒ i. vel ʒ 2. da ʒ ʒ. cum vino, quia multam humiditatem per vrinam euacuat, vbi aduruntur, adde parum gummi cerasarum, misce.

Pulvis supra vulnera capitis debet poni.

Recip. Ireos, farinae orobi,

thuris aristolochiæ, cort. capparorum, myrrhæ, sarcocollæ, sang. draconis, myrtill. nucis cupressi, Misce f. pulvis.

Pulvis apertius hemorrhoid.

℥. Hellebori nigri ʒi. pulueriza & misce cum succo cape, postea exicca, & hoc fiat quater, deinde cum felle tauri licinium imponas tandiu donec fluxus cesset.

Pulvis qui supra commissuram capitis frigidi aspergi debet.

Rec. Caryophil. cubeb. ligni aloes, piperis longi thuris, maioranæ an. ʒ β. ros. lambrusci, sandal. alb. ana ʒ i. Misce, fiat pulvis.

Aliud ad idem sed in calido.

Rec. Spodij, coral. rub. lambrusci, ros. rub. coriandi an. ʒi. macis, caryop. ana ʒ β. Misce.

Pulvis ad descensum catharri.

Rec. Flor. camomil. ʒ i. maioranæ, mastiches, thuris, nucis cupressi, cubeb. caryoph. nucis mosc. macis an. ʒ ʒ. Misce. f. pulvis.

Pulvis in discrasia calida cordis.

Rec. Rosarum, spodii, sem. portulacæ, berberis, borraginis an. ʒ β. boli, carabe, ligni aloes, caryoph. an. ʒ β. sem. cucum. ʒi. camphoræ gr. 8.

Pulvis carminativus.

Rec. Sem. anisi, fœniculi, amomi, petroselini, rutæ, pulegii, calamenti origani an. ʒ 2. seseleos, apii, leuistici an. ʒi. cimini piperis an. ʒi. β. cinnamomizz. an. ʒ 6. liquiritiæ mundæ ʒ 3. Misce. f. pulvis subtilissi.

mus.

Pulvis ad idem.

Rec. Piperis ʒ β. sem. anisi, fœniculi, seseleos, apii, carui, ameos, amomi, euphrasiæ, ʒ 2. granorum parad. galangæ an. ʒ 2. baccarum lauri ʒ 3. liquiritiæ ʒ 3. Misce. f. pulvis.

Pulvis ad oculos valens.

℥. Ruthæ, chelidoniæ, euphrasiæ sicc. an. ʒ β. sem. seseleos. carui cimini an. ʒi. cinnam. ʒ 2. piperis longi, cubebarum, carpobalsami, sem. apii, an. ʒ β. sacchari q. s.

Pulvis partum facilitans.

℥. Sauinæ, pulegii, artemisiæ an. p. i. cort. cassiæ fistulæ 2. ʒ β. croci ʒ β. cinnamom. 1 ʒ. β. galbani, myrrhæ an. ʒ β. Misce f. pulvis, da ʒi. cum vino calido. Si vero decoctionem vis, quæ melior erit, adde ficuum da & tylorum an. n. ij bulliant in ʒ 6. vini ad consumptionem tertiæ partis, cola, da ʒ 3. calide.

Pulvis elegans contra stranguriam.

℥. Sem. apii, petroselini, granor. pœoniæ, sem. saxifragiæ, genistiæ an. ʒi. β. sem. anisi, fœniculi carui an. ʒi. sem. com. frigidorum mundatorum an. ʒi. milii solis ʒ β. spicæ, cinnamomi an. ʒ 2. liquiritiæ ʒ 3. sem. pap. albi ʒi. β. lactucæ, portulacæ an. ʒ β. sachari ʒi. β. Misce. f. pulvis, da ʒi. β.

Pulvis stringens fluxum sanguinis immoderatum.

℥. Gummi dragacanthi arabici torrefac. an. ʒi. sang. draconis corall. rub. lapidis hæmatitis an.

ʒ β.

3ß. da 34. cum aqua plantaginis adiungendo p filij assi ossis de corde cerui, carabæ an. 31. Misce. f. puluis.

Puluis elegans ad sanguinem coagulatum.

℞. Rhabarb. elect. lacce, terræ sigillatæ, mumia sperma cæti an. 31. Mice. f. puluis, da 31. bis in die, facta tamen euacuatione vtraque si opus est.

Puluis ad vertiginem & epilepsiam.

℞. Maioranæ balsamitæ, betonicæ, saluiæ, rorismarini, lauendulæ, melissæ, sticad. arab. an. 31. coriandri præparati nuc. mosch. cinnamomi an. 33. cubebæ, cardamomi, galangæ, piperis longi, sem. gallitrici, visci quercini, gran. pæonia, an. 31. caryoph. macis, zedoariæ, zzb. sem. fœniculi, carui, agni dei, carpobalsami, Xilobalsami an. 3ß. Misce. f. puluis.

Puluis matricem confortans ad conceptionem.

℞. Piperis longi, zz. galangæ, spicæ nardi, seseleos, gran. pæonia, nucum mosch. zedoariæ cardamomi cubeb. cassiæ lignæ, an. 32. gran. paradyfi 3ß. saluiæ, mentæ, maioranæ, nepetæ diptami an. 31. coaguli leporis 3ß. sacchari 31. Misce. f. puluis, da 31. mane ieiuno, in aurora cum brodio cicerum.

Puluis ad idem.

℞. Pulu. reginæ 31. spec. di. margarit. calid. 3ß. musci gran. v. sem. anisi, maratri, cymini an. 31. Misce. fiat puluis, comedat hora vna ante cænam. cum pane

asso, & in vino madido cum hoc puluere.

Puluis lac generans.

℞. Anisi 33. da sero in introitu lecti cum brodio cauilum.

Puluis expertissimus ad elongationem vuluæ.

Re. pulueris facti ex corticibus exterioribus nucum exiccati & puluerisati, imponatur cochleari, ligetur, ac sub vulua ponatur. Ad hoc fortius valet puluis aluminis tamen combusti, positi vt supra, fortius adhuc sal armoniacum vstum & positum vt supra.

Adhuc pulchrius.

Rec. Ros. balaustiarum, cort. granatorum hypocistidos, acaciæ an. 31. pyrethri 3ß. cinnamomi piperis albi an. 3ß. myrrhæ gr. v. expertus est.

Puluis præseruans à peste.

Rec. Sem. citri, acetosæ an. 32. boli præparati 31. diptami, gentianæ, tormentillæ an. 32. cinamomi electi 31. margaritarum, saphirorum, ossis de corde cerui, sandal. omnium, ozymi an. 31. Misce. f. puluis, da 31. vel 32. vel 3. vel 4. postea bibat parum aquæ acetosæ desuper.

Puluis ad imprægnationem.

℞. nucum mosch. zz. cubeb. an. 3ß. piperis longi masticis, cinnamomi an. 31. galangæ 3ß. linguæ auis, raluræ eboris, seseleos been vtriusque ana 31. Misce. fiat puluis, da 31. ß. ieiunè, cum aliquo liquore diebus con-

tinuis aliquibus.

Pulvis muscatus optimus ad vermes.

℞. Sem. atriplicis ʒi. sem. sancti ʒii. rad. gram. hyssopi, abrotani an. ʒß. liquiritiæ ʒi. ß. sem. anethi ʒß. musci ʒß. f. pulvis, da cum aqua graminis calida.

Pulvis alius muscatus ad idem.

℞. Sem. atriplicis, portulacæ polii motani, origani an. ʒi sem. sancti ʒß. liquiritiæ ʒj. lupinorum ʒij. musci ambræ ana ʒß. misce. fiat pulvis.

Pulvis ad eminentiam umbilici.

℞. Lupinorum petias, panni linei an. ʒß. combure & cum vino misce ut emplastrum, & tunc suprapone supra umbilico.

Pulvis mundificans gingivas.

℞. Ramusculorum querci, balauft. ana p. i. gallarum, sumach, granorum myrthi cupularum glandium an. ʒi. vitrioli albi, aluminis an. ʒj. ß. antophyli, sem. rosar. an. ʒij. ß. pistentur grosso modo, & bulliant in lb. ij. ß. vini fortis, donec. lb. i. ß. remaneat, deinde ablue in die, & postea cum suprascripto puluere dentes & gingivas leuiter frica. ℞. mastiches, sandaracæ hypocist. an. ʒi. thutia præparata ʒi. vitrioli albi ʒj. ß. Misce. fiat pulvis.

Pulsus Casui & percussioni.

℞. Lacæ, myrrhæ an. ʒij. boli ʒj. ß.

Pulvis ad idem.

Rec. boli, terræ sigillatæ rubiæ tinctorum, rhabarb. electi ana ʒj. ß. myrtill. ʒi. croci, costi, an. ʒj.

Pulvis ad idem.

℞. Boli, balauftiorum, amygdal. amar. an. ʒi. sang. draconis, myrtill. ana ʒß. da cum succo arnoglossæ, & præcipue vbi sanguinem spuunt.

Potio secreta in peste, & nulli reuelanda est.

Comedat omni die herbam verbenæ masticando, donec gustus deglutiatur. Vel da succi eius ʒß. cum vino aut brodio ad bibendum, & verum scias esse hoc secretum, quia mirabile est, potes etiam syrupum facere, sed non tantum valebit.

Potio brevis Cordialis.

℞. Theriacæ ʒi. ß. aquæ muscata rosata q. s.

Potio excellentissima ad debilitatem neruorum.

℞. Pulvis pyrethri ʒß. aquæ rorismarini ʒiij. bibat mane in aurora diebus continuis 30. quia miraberis effectum.

Potio experta ad idem.

℞. Mithridati vetustissimi ʒij. aquæ saluiæ agrestis ʒiij. da xv. diebus.

Potio sedans dolorem ventris post partum.

℞. Trypheræ magnæ ʒiij. decoct. arthemisiæ. q. s.

Potio somniferæ in phreneticis.

℞. Papaueris albi ʒß. cort. mādregoræ, sem. hioscyami albi an. ʒi. terantur grosso modo, ponantur in petia rara, postea accipe ʒvi. aquæ nenupharis, in qua per horas sex stent, deinde post prandium vel cœnam da ʒi. ß. vel ʒij.

Potio experta diuretica lapidem frangens in renibus & vesica.

℞. Radic. raphani sylvestris ℥ii. saxifragiæ ℥iii. liquiritiæ ℥i. lapidis lycis ℥j. bulliant in vino & modico mellis, da ℥iiii. quoties opus fuerit.

Potio secretissima ad debilitatem cordis.

℞. Pulu. Zedoariæ ℥i. vini albi aromatici aut maluatici ℥ii. aquæ melissæ ℥iiij. Misce, fiat potio, detur tepida 4. vel 5. diebus.

Potio ad idem sublimis.

℥. Aquæ florum aut foliorum croci ℥iiij. musci gram. iiij. Misce.

Potio experta ad confortandum stomachum frigidum.

℥. carnis ℥j. mastic. ℥i. gran. piperis integri n. ij. bulliant & f. potio, quia experta est.

Potio Imperialis Maximiliani aureis literis in libro suo scripta, inuenta, contra intensum dolorem colicum, quam post primam euacuationem clysteri ieiuno tepide dabat.

℥. Ruthæ absynthij an. p. i. cimini, carui an. ℥ss. gran. piperis integrorum n. 20. bulliant in vino albo & aqua camomillæ q. s. pro haustu vno, deinde addatur theriacæ probatæ philonii en. ℥i. sperma ceti ℥i. opir gr. ij. Misce. tepide detur ieiuno, philonium dico sine euphorbio, videbis certe operationem.

Potio ad ascensum matricis experta.

℥. Stercoris equi auenam solum comedentis ℥ii. puleg. Caryoph. ℥ii. pulu. carabe ℥ij. vini

framini ℥x. terantur, bulliant, in simul colentur, in duas partes diuides, quarum vnam da mane tepide ieiuno, deinde bene te tegat, potest etiam alia hora dari.

Potio diaphoretica.

℞. Claudæ equinæ m. j. rad. os. mundæ ℥i. ss. tragacanthi ℥vi. bulliant in vino q. s. coletur, pro vno haustu da quando opus est.

Potio in hydropse experta quia diuretica est.

℥. Grillos aut cantaridas, ablatis alis & capitibus in furno combustis ℥ij. cum aqua conuenienti.

Potio nobilis & experta, mundificans vias urinae, saniem, arenulam expellens & menstrua prouocans.

℥. Lixiuij cineris truncorum fabarum ℥iiij. tepide bibat ieiune, si addes sanguinis hirci præparati ℥ss. pulueris diurectici gr. viii. præstantiss. erit remedium.

Potio ad scrophulas.

℥. Rad. brusci, asparagi, polypodii violarum esule, bismallæ, ireos, tragacanthi, ellebori nigri acori rad. cimmarumque oliuæ, stæchados, pœoniæ, scrophulariæ an. m. i. squille ℥ss. coceognidi ℥iiii. cimini ℥vi. rad. herbæ & omnia infundantur in ℥b. iiii. vini per diem naturalem, postea bulliant, vsque ad consumptionem medietatis, & sic stet in infusione per vnam diem, colentur & cum melle dulcorentur, da ℥iiii. in aurora, & horas 4. desuper ieiuna.

Potio ad idem.

℞. Scrophulariæ ℥iij. violar. azari arist. rotund. rad. bryoniæ, mali terre an. ℥i.

Potio ad idem.

℞. Cinnamomi, caryoph. nu. mosch. spicæ olibani an. ℥j. piperis ℥ii. coriandri ℥ß. diagridii ℥ij. Misce. f. puluis: da ℥i. cū aqua scrophulariæ.

Potio ad matricem frigidam & humidam.

℞. Cyperi ℥vi. rad. mandrag. ℥iiii. hyssopi artemisi æ an. m. sem. ameos, feseleos an. ℥j. agni casti ℥ii. piperis longi, cassiæ lignæ an. ℥ß. hellebori nigri ℥ii. gran. pœoniæ ℥ß. sacchari q. s. da in aurora ℥iiij. cum ℥j. tryphæræ magnæ sine opio facta ante purgationem cum myrabolanis, & hoc fac ad duas purgationes menstruales.

Potio Rhabar. de opilata hepatis ac viarum urinæ excel-
lens.

Rec. Rad. petroselini asparagi brusci, apii, rubæ tinctorum ana ℥ß. liquiritiæ ℥vi. sem. lactucæ endiuæ, cucumeris, cucurbitæ melonum ana ℥ij. rhabarb. ℥iij. non in petia ligati sed puluerisati, & in decoctione iam facta impositi, da ℥iiij.

Potio in febre acuta loco potus.

Rec. Prunorum num. xx. sem. lactucæ, portulacæ endiuæ, cichorii cucurbitæ ana ℥ß.

Potio menstrua prouocans breui.

Rec. Cyperi, cappari, aco-

ri zizeleos ana ℥i. asari ℥j. ß. rubiæ tinctorum ℥ij. ß.

Potio elegans solutiua in ascyte.

Rec. Fumi terræ m. i. ß. absynthij, eupatorij an. m. i. spicæ nardi ℥i. endiuæ p. i. bulliant omnia in aqua qu. s. pro haustu vno, coletur, intus addatur myrobal. citrin. ℥ß. bulliant iterum vnica ebullitione, stet per noctem in infusione, mane coletur, intus addatur rhabarb. puluerisati ℥i.

Potio ad imprægnationem.

℞. Cort. mandragoræ, gran. pœoniæ, sem. agni casti, ros. rub. piperis longi, cassiæ lignæ ana ℥ß. terantur & bulliant in vini rubr. lb. iij. vsque ad consumptionem medietatis, coletur postea accipiantur ℥iij. in quib. dissoluatur tryphæræ magnæ sine opio ℥i. & bibat in aurora interuallatis diebus, & incipiat post menstrua diebus xiiij. continuis balneet se, & balneo comedat ieiune & quotidie, etiam ieiune de feseleos.

P O M V M.

Pomum odoriferum ad caput frigidum.

Rec. Gran. paradyfi, pulegij origani, calamenti, serpilli ana ℥i. ß. rutæ, sticad. arabici, maioranæ ana ℥ii. macis ℥ß. garioph. storacis, calamitæ ana ℥i. ß. laudani ℥ii. musci ambreæ ana gran. v. infusionis dragacanthi in vino infus. qu. s. fiat puluis.

Pomum odoriferum capitis confortatium quod nudum manibus gestari debet.

℞. Ros. rub. ℥ ii. maioranæ, flo. lauendulæ anthos ℥ i. cort. citri ℥ i. β. ligni aloes, caryoph. an. ℥ i. cinnamomi ℥ ij. storacis, calamitæ ℥ ij. benzuen. ℥ β. galliæ mosch. aliptæ mosch. ana ℥ iii. laudani ℥ iii. infusionis tragacanthi in aqua rosata muscata, storacis liquidæ an. q. f. musci ambrae an. ℥. β. olei de spica, parum malaxentur.

Pomum confortatium capitis frigidi.

℞. Storacis, calamitæ ℥ i. caryoph. macis an. ℥ ii. β. ligni aloes ℥ vj. ladani ℥ i. spicæ ℥ i. galliæ mosch. ℥ β. musci ambrae an. ℥ β. infusionis tragacanthi qu. f. ex hoc eleganti pomo si lubet trochiscos facere potes, quia elegantis sunt odoris.

Pomum aliud ad idem.

℞. Folior. citri spicæ an. ℥ β. garyoph. nuc. muscatæ, ligni aloes an. ℥ ii. laudani ℥ β. musci gran. iij. infusionis tragacanthi, aqua maiorana muscata q. f. fiat pomum.

Pomum odoriferum capitis frigidi.

℞. Laudani ℥ β. nigellæ cort. citri, nuc. mosch. garyoph. ligni aloes an. ℥ β. galliæ mosch. ℥ ij. musci ambrae an. gran. iij. infusionis tragacanthi in aqua saluiæ q. f. fiat pomum.

Nota quod huiusmodi odorifera dari non debent nisi bene euacuato.

Pomum contra pestem Montagnana.

℞. Storacis calamitæ ℥ i. β. flor. buglossæ ℥ ii. garyoph. ℥ j. been viriusque ana ℥ i. ligni aloes ℥ ij. myrrhæ, calami aromatici, nuc. moschatae, spicæ, thuris, mastiches an. ℥ i. musci ambrae ana gr. viij. croci ℥ j. carabæ ℥ ij. semperuiæ ℥ iii. camphoræ ℥ ij. trium sandal. an. ℥ j. ros. rub. ℥ iii. succi portulacæ, succi arantiorum an. ℥ ij. coriandri torrefacti, nenufar. ana ℥ ii. corall. rub. spodij ana ℥ β. syrupi de citroboli ana ℥ β. terræ sigillatæ ℥ ij. laudani infusi in aqua rosata & aceto, ℥ ij. infusionis tragacanthi in aqua rosar. qu. f. fiat pomum.

Pomum odoriferum.

℞. Storacis, calamitæ ℥ β. sandali muscatellini ℥ ij. caryoph. ℥ j. laudani ℥ j. β. camphoræ ℥ i. storac. liquidæ ℥ j. fiat pomum, cum infusione tragacanthi in aqua rosata muscata.

Pomum odoriferum in descensu catarrhi.

℞. Laudani ℥ j. ligni aloes storacis calamitæ, colti spicæ, olibaniana ℥ β. nucum mosch. cupressi, sandaracæ ana ℥ i. nigellæ, cinnamomi, caryoph. an. ℥ ii. galliæ mosch. aliptæ mosch. an. ℥ i. β. musci ambrae gran. vj. cum aqua rosata & paucio vino f. pomum.

Pomada sic fit.

Rec. Pomorum dulc. mundatorum à cortice & semine n. 6. aquæ nenupharis, plantaginis, rosar. an. gr. i. caryoph. ℥ ij. fac decoctionem usque ad me-

N n n iij

dietatis consumptionem, postea coletur & bene exprimatur, deinde intus addatur axungiae caprinae colatę quarta vna, cerę albę ℥j. axungię gallinę ℥.ss. bulliant hæc vsque ad mediam consumptionem, & dimittas infrigidari cum spatula semper agitando, deinde adde camphorę ℥ii. aquę muschataę ℥ss. musci ℥i. fiat ad modum vnguenti liquidi.

Pasta ambra ex qua poma aut pater noster facere pote.

℥. Laudani purissimi ℥iiii. benzuin ℥iss. storacis calamitę ℥ii. aliptę moschataę ℥i. gallię moschataę ℥i. garyoph. cinnamomi an. ℥ss. macis amyli an. ℥i. musci ℥i. infusionis tragacanthi in aqua rosata, muscata q. s. fiat pasta.

Pasta Hartmanni.

℥. Pul. saponis ℥.iii. laudani garyoph. Ireos an. ℥vi. storacis calamitę ℥ss. musci optimi ℥ss. aq. ros. q. s. fiat pasta.

℥. Saponem in aqua rosarum bene lotum quantumvis garyoph. ℥i. & pone saponem in testa noua ad ignem cum aqua rosarum, & fac bullire parum semper agitando cum spatula & dum bullit pone medietatem pulueris garyophyllorum, & aufer ab igne, & sine parum infrigidari, & pone aliam medietatem pulueris & cum posueris cooperi bene, & dimitte infrigidari, & cum formare volueris pone parum olei benzuin, & erit optimum pomum odoriferum.

PURGATIO.

Purgatio cholera.

℥. Violarum ℥i. prunorum num. x. Sebesten num. vi. Iuiubarum num. xv. coquantur in aqua sa. pro haustu vno, stent per horas vi. in infusione coletur, intus dissoluatur Elect. de psillio de Zucharo rosat. aut diaprun. solutiui.

Purgatio alia ad idem artificialis.

℥. Violarum ℥i. prunorum num. xii. Sebesten num. x. Iuiubarum num. xx. bulliant ℥.ii. ss. aquę vsque ad medietatem, coletur, intus addatur tamarindorum ℥ss. myrabolanor. citrin. an. ℥ii. mannę ℥vi. item bulliant, coletur, colaturę ℥v. addantur electuar. q. vis vt Rhabbari.

Purgatio ad inflammationem cholerae & sanguinis.

℥. Prunorum num. x. tamarindorum ℥vi. myrobalanorum citrin. ℥ii. ss. pruna & tamarindi bulliant in aqua q. s. ita quod ℥viii. remaneant cum prunorum Iuiubarum an. num viii. colentur, deinde myrobalani contusi intus addantur & bulliant postquam per noctem in infusione steterint & mane bullierint, colentur, colaturę addantur, mannę ℥ii. cassiæ extract. ℥iii. de succo rosarum ℥ii. ss. syr. granat. vel de acetositate citri ℥ss. macis gr. i. Misce.

Purgatio ad idem.

℞. Prunorum Sebesten an. numer. x. tamarindorum ℥xi. florum nenupharis violarum, ros. rub. lactucæ an. p. j. bulliant in aqua q. s. ita quod ℥viii. remaneant, coletur, quibus addatur ℥iii. pulu. myrobalanorum citrinorum per noctem infusorum, postea mane colentur, colaturæ adde vt supra, & si adhuc magis comprimere vis, da in substantia ℥i β. Myrobal. citrinor.

Purgatio elegans nobilis & artificialis, ita vt nulli sit manifestum.

℞. Pullum iuuenem extractis visceribus in cuius ventre bulliant hæc.

℞. flores frigidos an. p. i. Rhabbarbari electi ℥iii. scammonæ ℥ii. bulliant & fiat iusculentum & bibat cum gran. i. macis, quia soluit sine torsione, potes & myrobalanos addere, & permutare cum medicinis respuccientibus phlegma aut alios quosuis humores.

Purgatio ad idem elegans.

℞. Passularum ℥β. coctarum in aqua violarum per mediam horam, colentur per cribrum, deinde aspergantur cum ℥ii. pulu. scammonæ, da quando vis 30. aut 40. & non plus cum panatella.

Purgatio ad choleram & sanguinem.

℞. Prunorum num. x. passularum mundat. ℥i. β. violarum borraginis buglossæ fumi terræ

an. m. i. quatuor sem. frig. maior. mundat. an. ℥. ii. fiat decoctio in aqua q. s. donec ℥viii. remaneant, quibus addatur cortic. myrobalanorum citrinorū pulverisato ℥vi. stent per noctem in infusione, mane coletur adde supra.

Purgatio elegans ad idem.

℞. Ros. violarum capill. veneris an. m. i. prunorum num. xv. iuiubarum Sebesten an. numer. viii. bulliant s. a. in aqua q. s. ita quod ℥b. i. remaneat, coletur, cui addatur tamarindorum ℥vi. pul. myrobal. citrinor. ℥β. stent per noctem.

Purgatio elegans tibi sæpe experta in dolore stomachi, intestinorum & tenesimone à materia cholericæ.

℞. Prunorum Damascenorum num. v. Sebesten num. iii. flor. borrag. violarum buglossæ thymi epithymi fumi terræ an. p. β. passularum ab arillis mundatarum ℥β. fiat horum decoctio. f. artem in aquis endiuix lupinorum an. ℥. vi. colentur, intus dissoluatur pulueris myrobalanorum (adustorum, si lubet) citrinorū ℥β. vel ℥vi. & si aliquid de phlegmate admixtum adde Chebulorum ℥ii. stent per noctem in infusione mane bulliant vna ebullitione, colentur, intus addatur Rhabbarbari electi ℥i. syrupi granat. ℥β. misce.

Purgatio elegans ad choleram.

℞. Capill. veneris hepaticæ violarum ℥β. quatuor sem. frigid. maior. contusor. an. ℥i.

prunorum num. xv. Iuiubarum Sebesten nu. iiii. liquiritiæ passularum an. ʒss. bulliant s. a. in aqua q. s. ita quod ꝑb. i. remaneat, coletur, intus addatur tamarind. ʒss. pulueris Myrobal. citrin. ʒss.

Purgatio alia ad idem.

℞. Capill. vene. endiuia borraginis scolopendriæ, hepaticæ violarum p. i. tal. fœniculi ʒii. quatuor sem. frig. id. cōtusorum maior an ʒi. iuiubarum prunorum Sebesten an. n. viii. bulliant adde myrobal. citrin. ʒiii. tamarindorum ʒss. bulliant & colentur: Rhabarbar. electi ʒi. Spicæ gran. i. Iterum vna lenta ebullitione bulliant, coletur, intus dissoluatur sachari rosati noui propter stomachorum ʒii. Misce.

Purgatio ad sodam phlegmaticam catharrosem.

℞. Flor. borraginis violarum an. m. i. polipodii ʒss. turbith anisi an. ʒiiii. zinzib. ʒii. passularum mundat. liquiritiæ an. ʒss. terantur & bulliant in ꝑb. i. aquæ vsque ad consumptionem medietatis, colentur, intus addatur chebulorum ʒss. agarici albi ʒii. iterum vna lenta ebullitione bulliant in qua per noctem stent, mane colentur, intus dissoluatur elect. de dactylis ʒi. ss. Macis gr. i. Misce.

Purgatio ad icteritiam.

℞. Myrobalanorum citrin. ʒvi. prunor. nu. x. terantur & bulliant in aqua q. s. ita quod ʒ. vi. remaneant, stent per noctem in infusione, mane coletur, & iterum intus bulliat, secundum

Rhabarb. electi, ʒii. vel ʒi. fortiter colerur, & intus addatur Syr. ros. Nenupharis aut aliarum &c. potes etiam addere electuarium de succo rosarum. prassium expertum, adiathos hepatica & polytricum, expertum eupatorium endiuia, illa à proprietate valent inquit Placentinus.

Purgatio in tenesmone & dysenteria.

℞. Myrobal. citrin. emblic. an. ʒvi. ros. amb. sumach, balaustiorum acaciæ an. ʒi. sem. anethi fœniculi ameos an. ʒss. bulliant postea, adde Syrup. citonior. aut myrtill.

Purgatio elegans contra phlegma in stomacho.

℞. Turbith albi & à cortice mundati agarici trochiscati an. ʒii. ss. zinzib. ʒss. Spicæ gr. v. hyssopi ʒi. terantur & fiat infusio in aqua decoctionis passularum q. s. & bulliant secundum artem, in qua ebullitione stet per noctem, deinde mane coletur, & intus dissoluatur electuarii eleusophi ʒii. de dactylis ʒi. ss. de succo rosarum ʒi. macis gr. ii. syr. acetos. compos ʒ. ss. i. misce.

Purgatio ad idem pulchra & precipue in mixta.

℞. Eupatorii azari an. ʒi. agarici albi ʒii. Rhab. electi ʒi. ss. Spicæ zinzib. an. gr. v.

Purgatio ad Melancholiam.

℞. Chebulorum nigrorum an. ʒss. flor. borraginis buglossæ stœcad. arab. thymi, epithymi herbæ vtriusque buglossæ cum rad. an. p. i. fumiterræ, chamedryos, chamæpitheos, an. p. ss. agarici

agarici ʒj. polypodij ʒß. fol. Sennæ ʒ vi. liquiritiæ passul. an. ʒiij.

Purgatio ad idem.

℞. Flor. borraginis bugloss. viol. thymi, epithymi, an. ʒj fol. Senæ ʒj. polypodii ʒß. passul. mundat. liquiritiæ an. ʒiij. fiat decoctio in sero Caprino q. s. pro haustu vno coletur, intus infundatur myrob. emblic. bellic. an. ʒß. stent per noctem in infusione, mane verò fricetur manibus & vna ebullitione bulliant, colentur, intus dissoluatur electuaria quævis.

Purgatio ad idem.

℞. Flor. melissæ nenupharis borraginis buglossæ violarum thymi, epithymi, stœcados arab. an. p. j. fol. Sennæ ʒß. fiat decoctio in sero caprino q. suf. pro haustu vno, coletur, intus addatur prunor. emblicor. an. ʒß. stent per noctem in infusione.

Purgatio sublimis ad idem, multoties experta in melancholia euacuanda, & est secretum.

℞. Flor. borrag. bugloss. Sem. acetosæ, scariolæ, endiuia & violarum adianthos, polytrichi an. ʒ ij. fisticorum in succo buglossæ per duos dies & noctes infusorū ʒiij. pinearum, similiter infusarum ʒiij. cort. myrobal. Indorum ʒj. Hyacinth. Smaragdi, Saphyri an. ʒi. offis de corde cerui, doronici Zedoariæ, an. ʒij. lapidis Lazuli armeni præparatorum an. ʒij.ß. margaritarum elect. ʒjß. syrupi de pomis ʒv. musci gr. ij. ambr. gr. iij. sachari q. s. Huic simile secretum est sequens.

Purgatio elegans solutina, experta in melancholia euacuanda.

℞. Thymi, polypodii, Sennæ, centaureæ an. ʒj. lapidis armeni præparati ʒij. ellebori nigri ʒß. diagridii gr. xv. Myrobal. indorum ʒiij. flor. violarum nenupharis melissæ buglossæ, cinnamomi elect. macis, Sem. basiliconis, been albi, an. ʒß. terantur, & cum ʒij. passularum confictarum & Syr. myrobalan. indorum, conseruationis earum aut Syrupo de citro q. s. fiat electuarius, da mane in aurora cum aqua lactis aut Zuchari ʒii.

Nota quod ex istis elongationibus purgationibus Syrupos longos magistrales & conuenientes facere potes, etiam in omni tal. purgationis decoctione addere succi pomorum dulcium ʒiß. vel ij. vt lubet plus vel minus & elegans erit.

Purgatio elegans & artificialis in Melancholia.

℞. Aquarum bugloss. melissæ borraginis an. ʒiij. polypodii grossomodo contusi ʒiii. agarici albi ʒj. passularum liquiritiæ an. ʒij. stent per diem in infusione, postea bulliant duabus ebullitionibus coletur, postea infundatur Chebulorum contusorum ʒij. Indorum ʒj. epithymi ʒii. ʒʒ. macis an. gr. v. flor. borragin. bugloss. cuscutæ stœchad. arab. an. ʒj. iterum vnica ebullitione bulliant, coletur, addatur diacatholicon diasennæ.

Purgatio ad idem.

℞. Eupatorii fumi terræ an. p. j. stœcados arabici ʒi. epithymij ʒiij. chebul. emblicor.

belliric. an. ℥ii. turbith. agarici
an. ℥i. polypodii folliculorum
sennæ an. ℥ß. squinanthi ℥i. el-
lebori nigri ℥i. passularum li-
quiritiæ an. ℥ß. hamech. diaca-
tholicon diasennæ an. ℥ii.

Purgatio ad idem.

℥. Vtriusque buglossi cum
rad. fumiterræ, chamædryos,
chamæpytheos, eupatorii, ca-
momeli an. p. i. polypodii foli-
culorum sennæ an. ℥ vi. capil-
lorum vener. epithymi stœcados
arab an. ℥i. squinanthi ℥ß. el-
lebori nigri ℥i. succi pomor-
um dulc. ℥i. flor. borrag. bu-
gloss. an. p. i.

*Purgatio elegans phlegmatis &
Melancholia.*

℥. Hellebori nigri ℥ß. Rha-
barb. electi ℥ii. turbith ℥i. fo-
liculorum sennæ, ℥vi. croci ℥℥.
an. ℥ß. spicæ ℥.ß. macis nuc.
moschat. cinnamomi garyoph.
an. ℥i. ß. liquiritiæ rasæ ℥i. sy-
rupi de ℥℥. conditi & de che-
bulis conditis q. suff. fiat elect.

Purgatio elegans.

℥. Agarici albi ℥i. follicul.
℥i. thymi epithymi an. ℥i. po-
lypodii ℥ß. sem. anisi fœniculi
℥ii. prunorum num. v. diaca-
tholicon. diasennæ diacarthami.

P I L V L Æ.

Pilula ad quartanam febrem.

℥. Costi, spicæ, Myrrhæ,
Chamædrios, Cinnamomi, Cro-
ci, Azari, squinanthi, Carpobal-
sami, Amomi, Scordeon, folii
Aristol. rotund. Mastiches, Ca-

ryophyl. Helleb. nigri, Gentia-
næ, Agarici, Polypodii, an. ℥ß.
Diagridii ℥i. Aloes ℥ß. tempera
ut vis, da cum conuenit.

*Pilula ad ablationem, appetuntur à
materia cholerica.*

℥. Ros. rub. ℥ß. Rheub. My-
rob. Citrinorum, an. ℥i. Masti-
ches sand. alb. & Citrin, an. ℥
ß. spec. Hieræ picæ ad pondus
omnium cum aqua Absynthii
fiat massa, potes si lubet Diagri-
dium addere.

Pilula excellentes ad fætorem oris.

℥. Cardamomi, Caryophyl.
nucis Moschat. Galangæ, Cin-
namomi, Fol. lauri, Macis, Ori-
gani, ℥ß. ligni aloes, ℥i.ß. Mos-
chi, Ambra, an. gran. vi. cum
vino albo & aqua ros. q. suff.

Pilula ad idem.

℥. Caryophyllorum, Galangæ,
Cyperi, Calami aromat. rosarum
myrtyllorum, ligni aloes, spicæ
folii, nucis Moschata, Macis,
Origani, Ireos, an. ℥ß. Musch.
gran. iii. cum vino.

*Pilula hepaticis, aschiticis & iste-
ricis.*

℥. Myrob. citrinorū Rheub.
ol. an. ℥i. mastichis spicæ squi-
nanthi ros. rub. sandal. alb. anisi
an. ℥i. laccæ ablutæ ℥ii. diagridii
℥ß. croci ℥ß. succi Absynthii
eupatorii an. ℥ii. succi scariolæ
q. suf. fiant pilulæ.

Pilula ad tympanitidem.

℥. Rheub. el. ℥ii. carui ameos
ana ℥i. turbith. coloquintid. an.
℥ß. spicæ ℥i. cum succo eupa-
torii.

Pilula in aschite quando est febris & urina rub.

℞. Rheub. elect. ℥i. turbith. agarici colocynth. ℥℥. an. ℥℔. sem. endiuia lactuca cichorii opii an. ℥℔. cum succo endiuia qu. suf. fiat massa.

Pilul. in aschite ubi non est febris neque urina rubra.

℞. Fol. mezereon Rheub. an. ℥ii. euphorbij ℥ii. rosarum mastiches an. ℥i. turbith. colocynth. an. ℥℔. cum succo eupatorii aut absynthii q. suf. fiat massa.

Pilul. ad idem.

℞. Sem. endiuia cichorii lactuca apii fœniculi petroselini an. ℥℔. euphorbij mezereon an. ℥i. Rheub. ℥iiij. colocynthid. agarici turbith. an. ℥℔. spica mastiches ros. rub. an. ℥j. succi Eupat. q. suf. f. massa.

Pilula ad hydropem elegantes.

℞. Pilul. de rhabar. ℥ii. turbith. agarici ana ℥ii. pulpæ colocynth. ℥℔. bdellii gran. viij. sem. fœniculi, cardamomi an. ℥j. salis com. salis nitri ana ℥℔. fol. mezereon præparat. ℥i. rorismarini, spica, cuscuta ana ℥℔. cum succo ebuli & eupatorii quan. suf. fiant pilula ix.

Pilula ad pulsus cordis expertissima.

℞. Smaragdi el. carabæ ana ℥℔. hyacinthi seminis Basiliconis an. ℥ij. cum aqua rosar. qu. suf.
℞. Pilul. commun. da in hora qua molestatur à pulsu.

Pilula ad oppilationem splenis.

℞. Ammoniaci ℥℔. bdellij ℥ii. agni casti cortic. capparorum, tamarisci, scolopendria

an. ℥℔. cum syrupo acetoso compos. q. f. fiant pilula vij. & postquam sæpè fuit digestus syrupis longis, & purgatus cum diasena, capiat diebus viii. pill. 2. hora vna ante cœnam, & hoc interuallatim sæpè reiteretur, quia laudabilis operatio est.

Pilula excellentes & probata contra debilitatem memoriae ut vidi in quodam, qui memoriam amiserat, & his pilulis per mensem continue utendo ad bonam memoriam rediit.

℞. Cubebarum calamenthi, nucis mosc. caryoph. an. ℥i. ambræ ℥ii. moschi gran. ij. fiant pilulae vj. cum succo maioranæ, da in introitu lecti vnam, vel ii. tribus diebus continuis.

Pilula stupefactoria ad dolorem dentium vehementem.

℞. Opii manu calefacti in pauca quantitate cum cera mixti, & in pil. redacti, ponatur denti doloroso, & subito cessabit.

Pilula stomachica purgantes choleram & phlegma sine impedimento.

℞. Specierum Hieræ picræ ℥ii. myrob. citrin. Indorum, agarici trochiscati, turbith. an. ℥℔. epithymi, ameos, anisi, ana gran. vi. diagridii ℥℔. cum liquore quemuis accipe f. pilula vii.

Pilula contra fumos à Stomacho ad caput ascendentes, visumque clarificantes.

℞. Myrob. citrin. Indorum ana ℥i. ℔. licii folii, cassia lignea, squinanthi, ros. mastiches, cubeb. piperis longiana

℥ss. agarici trochisc. ℥ij. colocynthid. ℥j. Spec. Hierę picrę ℥ii. euphrasie q. s. fiat massa.

Pilula ad fætorem oris.

℥. Caryoph. cardamomi, macis, ligni aloes, folii costi, sandal. citrin. Xilobalsami cubeb. ana ℥ss. origani ʒß. galangę, nucis mosch. an. ℥i. camphorę gran. ii. aquę menthę, rosacę muscatę, qu. suf. fiant pilulę, da ante cibum 8. post ii. pil.

Pilula ad viscosos humores & ventositatem stomachi artheticos, podagricos & calculos nobiles.

℞. Emblicorum Indorum belleric. an. ʒi. bdellii sem. apii anisi, carui, ameos, maratri, ros. ceterach, mastiches, amomi ana ℥ß. cinnamomi cardamomi, a-cori, spicę, croci, cassię lignę an. ℥j. hermodactyl. ℥iiij. agarici albi an. ʒß. colocynth. ʒi. cum aqua saluę, q. s. fiat massa.

Pilula ad Epilepsiam.

℞. Seseleos, Aristoloch. vtriusque, gr. pęonię, sem. ruthę, stęcad. arabici, epithymi, polypodii, camędrios, camępithęos, an. ℥ß. Myrtil. citrin. Indor. Belleric. hellebori nigri, turbith. ana ℥i. colocynth. trochif. squillę an. ℥ii. lap. lazuli preparati ʒi. castorei gran. vi. cum succo ruthę.

Pilula ad hydropem calidam aschitem.

℥. Rheubarb. elect. succi eupatorii ana ʒi.ß. sem. scariolę ℥ii. agarici ʒß. mezereon ʒii. succi scariol. q. s. misce fiat massa.

Pilula sublingua cum quibus Lanfrancus restituit loquelam uni mulieri.

℥. Granor. lauri n. vi. euphorbii gran. vi. cum ficu mundo, (alii habent ficuum siccarum mundatar. num. vi.) corticib. ligno & sicco. f. xii. pilulę, da vnam sublingua bis in die, quibus si addis assam & castoreum meliores erunt, verum horribiliores.

Pilula contra pestem.

℞. Myrrhę, croci, cornu cerui, spodii, sem. basilicon. been vtriusque, boli an. ʒß. flor. borraginis ℥ii. caryoph. cort. & sem. citri an. ℥ß. ambrę grana iiii. agarici trochisc. granator. an. ℥i. camphorę ℥ß. aloes ad pondus omnium cum vino.

Pilula elegantes ad choleram & dolorem capitis calidum.

℞. Myrob. citrin. Indorum an. ʒii. rheubarb. elect ʒi. sem. scariolę, port. endiuie ana ℥i. diagridii ʒß. ros. rub. sand. alb. & citrin. an. ℥ß. cum succo scariolę, q. s.

Pilula ad dolorem capitis phlegmaticum.

℥. Spec. hierę picrę ʒi sem. apii, colocynth. an. ʒß. agarici trochif. chebul. ana ℥ii. cum succo saluę q. s.

Pilula elegantes ad idem.

℥. Agarici ʒiß. cassię lignę polypodii camędrios, camępith. mastiches, anisi, fęniculi cinnamomi, cubeb. ligni aloes, nucis mosch. costi piperis longi, granorum pęonię ana ℥i. turbith. ʒi. aloes ʒß. colocynthid. ʒi. scammonę ʒß.

cum succo saluiæ.

Pulvis ad dolorem capitis melancholicum.

℞. Thymi, epithymi, cuscute, stecad. ara. hypericon. rad. capparorum, sem. anisi, fœniculi an. ℥i. colocynth. ʒj. scammonæ ʒss. myrob. Indorum chebul. an. ʒj. ss. aloes ʒss. folior. senæ ʒii. tum doron. epithymi qu. suf. fiat massa.

Pilula ad duritiem splenis & quartanum.

℥. Rhabarb. elect. ʒj. costi, aristol. lon. rad. cappar. laccæ, absynthii, mastiches squinanthi, azari, folii, spicæ celticæ, sem. anisi, apii, cassiæ ligni aloes, eupatorii, gentianæ an. gran. viij. croci, carvoph. an. ʒ ss. lapid. Lazuli abluti & præparati ʒij. diacridii ʒij. ss. cum diasenæ q. s.

Pilula ad cholera elegantes.

℥. Aloes ʒij. myrob. citrin. Indor. rheubarb. an. ʒi. spicæ, ros. rub. sand. citrin. alb. ana ʒss. scammonæ ʒss. succi solani. qu. s.

Pilula Bechica.

℥. Succu liquiritiæ, zuchari candi an. ʒv. amyli gummi tragacanthi, amygdal. dulc. ana ʒii. ss. syrup. de liquiritia quan. suf. fiant pilulæ latæ.

Pilula elegantiores ad materiam cholerica, melancholicam, adustam, descendentem à capite, phlegma quoque purgant.

℞. Mastiches, spicæ cassiæ lignæ, cub. ligni aloes an. ʒi. carvophil. folii an. ʒ ss. colocynthid. agarici, turbith, hermodact. senæ, epithymi an. ʒ ss.

hellebori nigri ʒi. rhabarbar. elect. ʒi. ss. aloes ʒss. conficiantur cum succo rutæ in quo per noctem vnam residentiam fecerint ʒii. scammonæ, fiant pilulæ in aqua fumaria.

S Y R V P V S.

Syrupus aperiens oppilationem hepatis, renum dolorem, & febrem mitigans ac ventositatem in intestinis dissoluens.

℥. Rad. marathri, apii ʒss. liquiritiæ ʒij. borrag. capil. ven. amygdal. cuscute, absynthii, ros. an. m. j. squinanthi ʒj. sem. anisi ʒss. petroselini, dauci, asparagi, cucurbit. melonum cucumeris an. ʒj. ss. spicæ, folii, mastiches an. ʒi.

Syrupus in febre acuta, siti, linguæ ariditate & caliditate, iuuenibus & cholericis conueniens.

℥. Prunorum, sebesten iuiubarum an. num. xv. flor. violarum, nenuph. solatri portulacæ lactucæ an. m. j. bulliant postea adde mannæ granatæ ʒi. ss. granatof. acetof. ʒss. j. zuchari q. s. pulcher fit si addis tamarind. ʒvi. in colore & incisione.

Syrupus ad idem nobilis, præcipue in tussientibus.

℥. Iuiubarum, sebesten prunorum an. num. xv. liquiritiæ rasse ʒi. borrag. violar. an. ʒss. sem. malux, citoneor. ʒ ij. mannæ granatæ ʒi.

Syrupus ad stomachum ventosum frigid. dolorem hypochond. & diaphragmatis, corruptionem appetitus, necnon aperitiuus.

℞. Rad. endiuia, apii, acori an. ℥i. sem. anisi, fœniculi an. ℥β. absynthii, centaurea, cuscuta, ros. an. m. j. squinanthi, spica, azari, folii an. ℥i. liquiritia ℥vi. bulliant postea adde rheub. in puppa ligati ℥ii. & zuchari q. s.

Syrup. ad phlegma salsum & scabiē.

℞. Myrob. Indorum ℥vi. citrinorum ℥β. cuscuta endiuia, lupulorum, fumiterræ, cichorii, capillor. veneris, epatica, absynthij, borraginis, buglossa, violarum an. m. i. rad. lapatii acuti ℥ii. rosar. sumach. an. ℥ii. liquiritia ℥β. prunorum, sebesten. num. xx. tamarind. ℥β. thymi epithymi an. ℥i. Nota quod omnes istos & alios quoscunque vis, syrupos solutiuos facere potes, & præcipue in materia phlegmatica & melancholica secundum doctrinam Auicennæ. i. tertii cap. de canonibus curationis.

Syrupus in discrasia stomachi & laterum ventosa cum pallore cutis.

℞. Eupatorii, cuscuta, absynthii, centaurea capillor. veneris, ros. borrag. an. m. i. radic. apii, acori an. ℥i. sem. anisi, fœniculi, marathri, apii an. ℥β. liquirit. ℥i. spica, caryoph. galanga, piperis longi, squinanthi an. ℥i. sem. scariolæ ℥i. β.

Syrupus in omni vehementi inflammatione elegans & nobilis, qui & in peste solennis est.

℞. Succu, citri granat. acetos. vuarum immatur. aqua ros. an.

℔β. aceti ℥iii. camphor. ℥β. zuchari &c.

Syrupus in caliditate hepatis febre acuta variolis asperis à sanguinis ebullitione ipsius feruorem comprimens, unde & ebriis conueniet.

℞. Tamarindor. ℥i. sebesten, iubar. an. n. xv. sem. portulacæ, lactuca, endiuia, malue, cuscuta, citrulli, cucum. sandal. amb. an. ℥i. ros. viol. an. p. i. berb. ℥vi. vini granat. ℔. i. aceti rosar. ℥i. bulliant omnia donec ℔. ii. remaneant, colata pastæ addatur vinum granatorū & acetū, mænē ℥i. β. aqua ros. ℥iiij. camphoræ ℥i. iterum bulliant & cum saccharo dulcorentur.

Syrupus elegans aromaticus in omni frigida dispositione stomachi & hepatis & membrorum.

℞. Spica, azari, folii, squinanthi, mastiches an. ℥i. costi ciperi, carpobalsami, xilobalsami, amomi an. ℥ii. β. galangæ caryophil. cardamomi, cub. nucis mos. macis & calomi aromatici an. ℥β. calamenti, mumia (vel mentha) an. m. i. pass. enucleat. ℥vi. vini alb. ℔. i. aqua lib. ii. moschi gran. iiij. zuchari, &c.

Syrupus de stœchados ad articulos.

℞. Stœchados ara. ℥i. calamenti, origani, saluia, thymi, epithymi, maiorana, rorismar. an. m. j. acori ℥i. se. marathri, anisi carui an. ℥i. pyrethri ℥ii. agatici albi ℥i chebul. ℥vi. pass. ℥ii. aromatizetur, cū puppa piperis longi, zz. calami aromatici, spica an. ℥β. cubeb. nu. mosch. macis an. ℥ii. Elegans est & pulcher, si aliqua iūcturas magis respiciētia addis.

Syrupus digestivus phlegmaticis.

℞. Rad. petroselini, apii, bruscii, asparagi graminis an. ℥i. infundentur primum diem in acetoo, deinde parum exicentur, postea. ℞. hyssopi, calamenthi origani, maioranæ, camædrios abrotani an. m. j. sem. anisi fœniculi, carui marathri ameos an. ℥ii. β. zinzib. zedoariæ, spicæ an. ℥i β. fl. anthos ℥ iij. coquantur ad syrupi consistentiam.

Syrupus nobilis & expertus de buglossa ad melancholiam digerendā.

℞. Buglossæ cum. rad. ℥iij. fumiterre, lupulorum salicis ℥i. co. fraxini tamarisci genistæ an. ℥β. scolopendriæ ca. ven. melissæ an. m. j. β. se. melonum cuscuta vrticæ, anisi marathri an. ℥ij. thymi epithymi an. ℥j. β. myrob. citrin. chebulor. an. ℥i. follic. senæ ℥ij. carthami ℥i. polypodi ℥j. β. spicæ calami aromatici, behen vtriusq; an. ʒ. liquirit. ℥j. passul. ℥j. β. vini albi ℥4. aceti squillitici ℥ iij. da diebus aliquibus continuis, & in splene excellentissimus.

Syrupus vulneratorum elegans.

℞. Cinnamomi ℥j. zz. ℥β. galangæ, gr. paradyfi, cardamomi, piperis vtriusq; caryophyll. an. ℥i mellis zuchari an. lb. ij. vini clari lb. iij. Misce. fiat claretum ex quo ℥v. dabis cū ʒ4. pulueris infra scripti. ℞. pimpinellæ, betonicæ, sanamundæ valerianæ, gentianæ, caryophyl. an. ℥i. pilosellæ ad pōdus omnium, expertum est.

Syrupus ad sanguinis corruptionem ut lepra, scabies & id genus.

℞. Fumiterræ m. iij. buglossæ cū radicib. scabiosæ, lupulorum, lapatii, capill. veneris polytrichi, scolopédriæ cichorii endiviæ an.

m. j. β. liquiritiæ ℥i. sem. melon. cuscuta acetosæ anisi an. ℥j. flo. viol. bor. buglossæ, ros. epithymi an. ℥i. β. polypodii ℥ii. folliculorū senæ ℥i. β. myrob. Indor. chebul. citrin. an. ℥β. se. carthami ℥ii. passularum ℥j. β. prunorum, sebesten nu. xx. tamarind. ℥vj.

Syrupus ad sanguinem infectum.

℞. Rad. enulæ campanæ, lapatii acuti an. ℥j. follic. senæ ℥j. β. fumarie, scolopendriæ, epaticæ an. m. ij. lupulor. cuscuta, absynthij endiviæ, cichorii an. m. j. prunorū n. xx. sebesten. n. xxx. thymi, epithymi, flo. viol. bor. bug. an. ℥β. sticados ara. ℥ij. myr. chebul. cit. an. ℥vj. tamarind. ℥v. polypodij ℥j. se. anisi ℥β. *Syrupus ad costum.*

℞. Singulorū pastinachæ, erucæ an. m. j. β. pinearū pistach. ficuum an. ℥i. testicul. vulpis ℥iij. bulliāt postea, addatur mel q. s. mos. gr. v. *Syrupus ad diserasiam capitis et stomachi frigidam nobilis.*

℞. Menthæ melissæ, bethonica saturagiæ, balsamitæ, saluiæ serpilli polii, pulegii, astæ regiæ, maioranæ, stœchad. ara. roris marini Origani an. m. cubeb. ligni aloes, nucis moschate, piperis lōgi, caryo. an. ℥i. acori ℥β. g. pœoniæ ℥v. *Syrupus ad idem & præcipue in subtili phlegmate.*

℞. Fo. saluiæ, cupressi, an. m. i. β. mastic. olibani a. ℥j. β. nucis mos. macis cupressi an. ℥iij. ligni al. ℥i. *Syr. ad dolorē capitis melancholicum.*

℞. Capil. ven. rad. vtriusq; bug. & folior. earū an. m. ij. polypodii ℥ij. epithymi ℥vi. follic. senæ ℥ii. β. chamæpyth. stœchados arab. camædrios, eupatorij an. m. j. fumiterre m. j. β. ellebori nigri ℥iii. succi pomorum dulcium ℥viij.

Syrupus secretissimus in ascite & precipue calida.

℞. succi scariolæ lib. ij. succi apii petroselini an. lib. j. aquæ decoctionis esulæ ℥i. β. spicæ ℥i. mastiches ℥β. sem. fœniculi apii an. ℥β. bulliant omnia vsque ad consumptionem medietatis, coletur & fortiter exprimatur, deinde adde Rheubar. in puppa ligati ℥β. zuchari lb. ii. iterum vna lenta ebullitione bulliant da ℥iiij. bis in hebdomada secundum patientis virtutem & miraberis effectum, postea emplastra ventrem de stercoreibus cum aceto, super hepar autem pone emplastrum triasand. Mesue.

Syrupus urinam prouocans, & eius dolorosum ardorem sedans.

℞. Sem. apii ℥ij. fœnugræci ℥i. scolopendriæ capill. ven. an. m. i. sem. cucurb. melonis, cucum. lactucæ, cichoreæ, endiuia an. ℥β. aquæ cucumer. fiat syrupus.

Syrupus ad caliditatem hepatis elegans.

℞. Endiuia, scariolæ, lactucæ, cichori, meliloti an. m. i. scolopendriæ acetosæ polytrichi, capill. ven. adianthos an. m. β. prunorum num. xx. sebesten. num. x. sem. melonum, cucurbitæ cucumeris citrulli an. ℥ii. cyperi, capparis ℥j. β. acori ℥β. bulliant.

Syrupus contra ardorem urinae.

℞. Epaticæ ℥iiij. adianthos, polytrichi, capill. veneris, scolopendriæ, lactucæ, endiuia, buglossæ, v. ol. borraginis an. ℥j. sem. melonum citrulli cu-

curb. an. ℥β. papau. albi ℥i. liquiritiæ ℥x. myrtill. ℥vi. Est expertus contra ardorem ex vlcerere & ad mictum sanguinis.

Syrupus ad scabiem, & ad sanguinem infectum.

℞. Fumiterræ, scolopendriæ, polytrichi, adianthos, scabiosa, cichorii lupulorum an. m. i. rad. lapatii acuti, enulæ an. ℥i. β. ciperi, capparor. an. ℥iiij. acori ℥x. epithymi ℥β. follic. senæ ℥iiij. bulliant s. *Syrupus ad formicam.*

℞. Epithymi, cuscutæ, ellebori nigri an. ℥β. folliculorum senæ ℥iiij. polypodii ℥v. scolopendriæ polytrichi fumiterræ, capill. vener. cichorii lupulor. an. m. i. bulliant.

Syrupus elegans & pulcher certe solutius ad hydropem.

℞. Radicum quinque diureticorum an. p. i. rad. ebulor. ℥x. epaticæ, scolopendriæ chamedrios eupatorii, origani, ruthæ, fumiterræ, cuscutæ flor. sambuci, borrag. an. m. i. sem. anisi carui, cumini, fileris montani, ameos, leuistici, baccarum lauri, gran. iuniperi an. ℥i. quatuor seminum frigid. maior. an. ℥ii. sandal. rub. cinnamomi, spicæ, mastiches, folii azari, agarici albi an. ℥i. follicul. senæ ℥i. thymi epithymi, cort. capparor. squinanthi, tamarisci an. ℥i. myrob. citrin. ℥i. fol. laurea. preparat. ℥j. β. limaturæ chalybis ℥β. bdellij, salis gemmæ an. ℥i. fiat horum omnium decoctio secundum artem in aqua lb. iiij. vsque ad consumptionem tertiæ partis, coletur, deinde addatur succi scariolæ apii, fœniculi an. lb. β.

℞. β. succi ebuli, fumiterræ an.
 ʒ4. succi ireos, plantaginis an.
 ʒ4. rheubarb. electi in petia li-
 gati, ʒβ. Iterum bulliant omnia
 simul, & cum zucharo q. s. fiat
 syrupus clarificatus. f. a.

Syrupus ad ulcera pulmonis.

℞. Rad. enulæ ʒii. ireos al-
 theæ, liquiritiæ mundæ an. ʒi.
 thymi ʒβ. prassii, centaureæ, ca-
 pillor. veneris, polytrichi anthos
 an. m. i. polypodij ʒj. xilobalsami
 carpobalsami se. vrticæ ana ʒiiij.
 pinguium ficuū nu. xij. passulæ ū
 ʒiiij. se. fœniculi coriandri, endi-
 uiæ althææ an. ʒβ. terantur & fiat
 infusio per noctem in aqua q. s.
 postea, ita vt lib. ij. remaneant,
 coletur intus addatur penidia-
 rum ʒv. mellis rosati ʒiiij. acori
 passul. ʒj. fiat syrupus da cum a-
 quis, aut da per se.

Syrupus ad lapidem renum.

℞. Sem. saxifragiæ, milij so-
 lis an. ʒi. sem. anethi, brusci
 petroselini an. ʒiiij. 4. sem. fri-
 gid. maior. mundator. an. ʒij.
 rad. saxifragiæ, brusci asparagi,
 petroselini, rubææ tinctorum,
 philipendulæ an p. i. parietariæ,
 verbenæ, scolopendriæ, endi-
 uiæ, cichorii an. m. i. rad. apii,
 fœniculi an. p. i. liquiritiæ ra-
 sæ ʒi. nucleorum cerasorum ʒiiij.
 sem. althææ maluæ an. ʒij. vini
 albi ℞. i. aquæ ℞. iiij bulliant,
 fiat syrupus clarificatus, da cum
 aqua milij solis, saxifragiæ &
 raphani.

Syrupus ad idem laxatiuus.

℞. Rad. saxifragiæ, petrosel-
 lini, fœniculi apij, acori, rubææ
 tinctorum, an. ʒi. polypodii ʒi.
 follicul. senæ ʒij. β. petroselini,

milij solis, alkakengi anethi,
 raphani Macedonici, 4. sem.
 frigid. maior. mund. an. ʒij. fiat
 horum decoctio in aqua qu. suf.
 ita quod lib. ij. remaneant cola-
 tæ, quibus addatur benedicta
 laxatiua cassia extracta ana ʒj.
 Misce.

*Syrupus ad quartanam & oppilatio-
 nem splenis.*

℞. Fumiterræ lupul. scolopend.
 endiuia eichoreæ cuscute an. m.
 i. thymi epithymi an. ʒi. β. tur-
 bith. agarici, rhabarb. an. ʒi.
 spicæ squinanthi ʒβ. cort. cap-
 par. tamarisci an. ʒii. follicul.
 senæ ʒi. polypodij ʒi. quinque
 radicum diureticorum an. p. i. β.
 sem. anisi fœniculi carui an. ʒii.
 myrob. citrin. Indor chebul.
 an. ʒβ. fiat decoctio. f. a. in a-
 qua qu. s. ita quod ii ℞ rema-
 neant, stent per noctem in in-
 fusione, mane coletur, intus
 addatur aliquid ex istis syrupus
 de meliloto, fumo terræ borra-
 gine, de Epithymo, oximel diu-
 retic. acetosus, partim de en-
 diuia.

Syrupus ad epilepsiam.

℞. Ruthæ, hysopi an. m. ij.
 passular. thymi epithymi an.
 ʒβ. gran. pœoniæ rad. pœoniæ,
 an. ʒi. visci quercini ʒβ. aristol.
 rotundæ, agarici albi, pyrethri
 an. ʒij. fileris montani carui,
 baccarum lauri, squillæ an. ʒi.
 coaguli leporis ʒiii. fiat deco-
 ctio in aqua, ita quod libræ due
 remaneant colatæ, deinde cum
 mell. ros. ʒiiij. fiat syrupus.

Syrupus cordialis frigidus.

℥. Florum borrag. buglossæ endiuia, melissæ an. m. i. sem. acetosæ ʒ ij. quatuor sem. frig. maior. contusi an. ʒi. β. minor. an. ʒi. an. ʒi. vini granat. vini pomorum arantiorum an. ʒiij. corall alb. subtiliter puluerizatorū ʒβ. aquar. endiuia buglossæ, melissæ an. ʒvi. aquar. ros. rub. lib. i. zuchari albissimi q. s. fiat syrupus ad tremorem cordis, calorē, maniam, sitim.

Syr. digerens materiā cholericā in cap.

℥. Flor. violar. rosar. nenuph. borraginis, buglossæ an. ʒij. sem. Endiuia lactucæ, scariolæ, portulacæ an. ʒiij. sem. melon. cucum. citrulli, cucurb. psillij integri an. ʒβ. decoquantur, & in fine addatur succi semperuiuæ ʒii. zuchari q. s. valet ad omnem inflammationem.

Syrupus ad materiam grossam cholericam in capite.

℥. Flor. violar. rosar. nenuph. borrag. buglossæ ana & c. omnes alias res positas in syrupo supra scripto, quibus addatur rad. fœniculi, endiuia cichorij an. ʒβ. stœcad. arabici ʒii. capillor. ve. m. i. succi apij ʒij. zuchari q. s. *Syrupus ad materiam cholericam adustam in capite expertus.*

℥. Succorum cichorij ʒiij. endiuia semperuiuæ, lupulorum, buglossæ, fumiterræ an. lb. β. depurentur & bulliant in iis floribus violar. nenuph. stœcad. arabici, epithymi, cuscureæ an. ʒ. aquar. zuchari ana q. s.

Syrupus ad phlegma in capite.

℥. stœcad. arabici, origani, maioranæ, serpilli an. m. i. rad. petroselini fœniculi apij an. ʒi. rad. pœoniæ ʒx. cinnamomi, ma-

cis, nucis mosch. cubeb. carui, fileris montani an. ʒi.

Syrupus ad phlegma grossum in capite.

℥. Cinnamomi, nucis mosch. cubeb, zedoariæ, fileris montani, anisi, fœniculi, petroselini apij an. p. i. bulliant, in fine addatur succi maioranæ origani, calamenthī depurat. an ʒij. zuchari q. s. cum aqua saluiæ.

Syrupus de acoro expertissimus ad dolores iuncturarum.

℥. Rad. acori ʒiij. hyssopi, calamenthī, Origani, melissæ, buglossæ, maioranæ, saluiæ, ruthæ betonicæ, pulegij an. m. j. polypodii ʒij. stœcad. arabici ʒij. pyrethri ʒβ. piperis longi ʒj. cinnamomi ʒβ. zz. ʒi. β. vel ij folliculor. senæ ʒij. thymi epithymi an. ʒi. myrob. cheb. emblic. indor. an. ʒβ. passular. ʒj. anisi ʒj. bulliant, zuch. q. s.

Syrupus diuinus ad dolorem capitis oculorum phlegmaticam debilitatē.

℥. Stœcad. arab. thymi epithymi, calamenthī, pulegij, origani herbæ paralytis, euphrasie ruthæ maioranæ an. m. j. spice nard. ʒj. rad. enulæ fœniculi, ireos, euphrasie an ʒβ. nigelle ʒij. flo. buglossæ, borraginis an. ʒj. rad. iringior. ʒβ. sem. & rad. pœoniæ an. ʒj. fol. anethos, an. ʒi. β. aquæ mensuræ duæ bulliant, donec mensura i. β. remaneat, coletur postea, addatur sacchari lb. β. acetī squillitici ʒij. ameos, cardamomi, macis, nucis moschata, a. ʒiij. galangæ, grana paradyfi, cubeb. an. ʒ. muschi ambræ an. gra. 4. ligentur in petia, & bulliant, donec mensura vna remaneat, da ʒiii. mane in introitu lecti, diuinum hanc & expertum vocat

Montagnana in litera B.

*Syrupus excellens & multoties exper-
tus per me, ad imagines oculorum,
scotomiam & vertiginem.*

℞. Euphrasie, sileris montani
mucorum rosar. id est non aper-
tarum, chelidonia, ruthæ an. m. i.
rad. fœniculi, verbenæ, chelidoniæ
an. ʒvi. se. fœniculi, flo. hyperico-
nis, macis, an. ʒß. bulliant & aro-
matizentur cum zucharo & istis
speciebus. ℥. ligni aloes ʒij. sem.
anisi ʒj. ß. mac. ʒiiij. pulueris eu-
phrasie ʒß. ligentur in petia.

Syrupus ad catarrhum salsum.

℥. 4. sem. frigid. maior. an. p. i.
sem. lactucæ endiuia, scariolæ, a-
cetosa, portulacæ an. ʒi. polytri-
chi adianthos, ros. fumiterræ ci-
chorij, capill. ven. lupulorum an.
m. i. flor. nenuph. viol. an. m. i. sã-
dal. amb. an. ʒii. rad. fœniculi, pe-
troselini an. ʒi. acori ʒß. bulliât,
addatur zuchari q. s. vini grana-
tor. ß. ß. macis ʒiiij.

Syrup. ad materiam salsam in capite.

℥. Endiuie, cichorij, capillor.
veneris, origani pulegii, calamẽ-
thi, stœchad. arab. bethonice an.
m. i. flo. borraginis buglossæ, vio-
larum an. ʒi. quatuor sem. frigid.
maior. endiuie cichoreæ, an. ʒi. ß.
azari, ciperi, xilobalsami, spicæ,
squinantii an. ʒi. corian. præpa-
rati ʒvi. folior. senæ ʒiiij. passular.
ʒi. ß. gr. myrthi, sumach. an. ʒij.
cinnamomi, caryoph. behen v-
triusque an. ʒij. acori ʒi. bulliât
zuchari q. s.

*Syrup. ad Melancholiam & morbum
Italicum solutius.*

℞. Rad. liquiritiæ leuistici ebu-
li, lapatij acuti an. ʒß. polypodij
ʒi. herbæ cum florib. borraginis,
buglossæ, endiuia, lupulorū, Fu-

miterræ, serpilli epaticæ, capillo-
rum ve. epith. thymi an. ʒii. stœ-
cad. arabici, polytrichi, gallitri-
chi an. ʒi. folliculorum senæ ʒiii.
sem. anisi, fœniculi cumini, carui
an. ʒij. myrob. chebul. ʒi. agarici
albi ʒiii. passul. ʒi. ß. prunorum
n. xv. ficuum n. vi. cinnamomi ʒz.
caryoph. macis an. ʒi. bulliant
omnia secundum artem in aqua
qu. s. ita quod syrupi ʒvi. rema-
neant, deinde. ℥. huius decocti
ʒz. vel iiij. syrupi.

Syrupus potens ad hypofarcam.

℞. Centauræ, absynthij, cala-
menti, eupatorii an. m. i. endiuia,
cuscutæ cichorii an. m. ß. rad. a-
pij, petroselini, asparagi, brusci
an. ʒii. ciperi ʒß. acori ʒi. liquiri-
tiæ rasæ ʒvi. rubæ tinctorū ʒiiij.
asari ʒij. sem. ameos, endiuia, fœ-
niculi apij, petroselini an. ʒi. ß. 4.
se. frigid. maior. an. ʒj. spicæ ʒij.
squinantii ʒj. galægæ ʒz. an. ʒß.
cinnamomi ʒi. ß. agarici albi ʒiiij
fiat horum decoctio in qua q. s. i-
ta quod syru. ʒvi. remaneât, stêt
per horas xii. in infusione, co-
lentur intus addatur syrup. de
endiuia ʒii. eupatorii ʒiii. rha-
barbari in puppa ligati ʒiii. lac-
cæ ʒi. tere, vnica tamen ebulli-
tione bulliant, bibat quotidie in
aurora ʒiiii.

*Syrupus nobilis aromaticus senibus
frigidis stomachicis.*

℥. Calamentii vtriusque, absyn-
thii an. m. i. mastiches ʒii. ʒz. ʒiii.
sem. anisi fœniculi ana ʒß. passu-
larum ʒi. bulliant, aromatizentur
cū lig. aloes, carioph. cinnam. az.
piperis longi ana ʒi. croci ʒß. &
bulliant omnia in simul, postea
cum zucharo q. s. fiat syrup.

P p p ij

Syrupus elegans in inflatione magnæ cholerae & sanguinis.

℞. Prunorum, iuiubar. sebesten. ana n. xx. viol. nenuph. ros. an. ℥j. solatri, portulacæ lactucæ an. m. j. 4. seminum frigid. maior. mundat. an. 3℔. minorum an. 3i. succi granator. acetosor. succi vuarum agrestis an. ℔. 3. camphoræ ʒi. zuchari q. s.

Syrupus nobilis ad idem.

℞. Iuiubarum, sebesten, prunorum ana n. xx. liquiritiæ rasæ ℥j. sem. lactucæ, maluæ citoneorum, cucurbit. cucum. melonum portulacæ an. 3ij. zuchari q. s. manna granatæ 3j. 3.

Syrupus ad idem perpulcher & nobilis.

℞. Sem. cucurbitæ 3℔. melonum portulacæ, an. 3ij. tamarindor. 3iiij. viol. 3j. rosar. 3℔. teranda terantur & bulliant in aqua q. s. ita quod libræ duæ remaneant, colentur intus addatur cassiæ nouiter extractæ, manna ana 3i. aquæ rosar. 34. vini granatorum acetosorum ℔. 3. zuchari q. s. fiat syrup. contra choleram & pectoris asperitatem sublimis est.

Syrupus hepaticis, spleneticis, aperitiuus, diureticus ad phlegma valens.

℞. Absynthij, eupatorii, chamædrios, chamæpitheos centaureæ an. m. j. squinanthi, spicæ, azari, cyperij, folij an. 3i. vini albi ℔. j. aquæ ℔. ii. zuchari qu. s. puppæ rheubar. 3ij. macis 3℔.

Syrupus pro caliditate hepatis & ictericia.

℞. Cuscutæ, capil. veneris, ros. endiuia, cichorij lupul. lactucæ,

solatri an. m. j. fumiterræ m. j. 3. liquiritiæ 3℔. squinanthi, cord. cappar. an. 3j. 4. sem. frigid. com. maior. mundat. an. 3i. 3. bulliant, addatur vini granatorum ℔. 3. spicæ ʒ3. puppæ rheubarb. 3ij. zuchari 3ii.

Syrupus ad phlegma in stomacho incisius valens etiam ad nimiam pinguedinem.

Calamenthi, hyssopi origani, menthæ ruthæ centaureæ ana m. j. rad. enulæ campanæ, apii, endiuia, costi, azari aristol. longæ an. p. j. sem. anisi, marathri an. 3℔. apii, ameos sileris mōtani an. 3i. squinanthi 3℔. zz. 3j. 3. cassiæ lignæ, folij, spicæ, xilobalsami an. ʒii. squillæ ʒiiij. bulliant aromatizentur, cum cinnamomo, cardamomo an. 3i.

Syrupus semibus diserasiatis frigido stomacho.

℞. Absynthij origani, menthæ calamenthi centaureæ a. m. j. epithymi m. j. 3. sem. anisi, fœniculi, dauci, marathri an. 3℔. passul. 3i. zuchari aromatizetur, cū puppa mastiches, cinnamomi, piperis longi galangæ zz. an. 3i. croci ʒi.

Syrupus nobilis & expertus in caliditate hepatis, febris acutæ, variolas asserit à sanguinis ebullitione, ipsum feruorem comprimens, unde & ebriis conuenit.

℞. Succij endiuia, granat. acetosor. vuarum agrestium, aquæ rosar. ana ℔. i. tamarindor. 3i. aceti rosar. 3ii. 3. spodii, berberis, sandal. alb. an. 3i. 3. stent horis 24. in infusione, deinde parum bulliant, colentur addito zucharo q. s. camphoræ ʒi. fiat syrupus.

Syrupus nobilis & expertus ad scrophulas.

℞. Scrophulariæ ℥i. filipendulæ ℥β. pimpinellæ pilosellæ tanacetī caulium, spatulæ foetidæ, rad. raphani ana m. β. coquantur in vino cum modico melle, da in aurora ℥iiii. diebus 8. continuis, postea purga cum puluere tuo, scrophulare & hoc sæpè reitera, deinde appone emplastrum vnum ad scrophulas.

Syrupus ad botium.

℞. Rad. maliterræ, rassi, berbaci, polypodii, bethonicæ, brançæ vrsinæ, purga, reitera, vt in scropulis.

Syrupus vulneratorius.

℞. Rubiæ maioris ℥i. consolidæ, plantag. tanacetī chamæpyth. caulium rub. herbæ Rupertī, pedis columbini, caryophyl. linguæ canis pimpinellæ, pilosellæ ana m. i. coque in aqua si febris est, si autem non parum vini, & dulcora cum modico melle, da ℥iiii. mane ieiuno.

Syrupus ad idem.

℞. Centauræ, costi, nepetæ, caryophyl. pimpinellæ pilosellæ, summitatum canabi, caulium rub. tanacetī liquiritiæ, rub. maioris ana m. i. cum aqua, vino & melle da ℥iiii. in aurora.

Syrupus expertus ad pectus vulneratum.

℞. Radic. tritæ cardī, fullo-nis, id est, dipsaci ℥iiii. puluerifat. & cum melle, fiat syrupus, da singulo mane ℥β.

Syrupus contra calculum.

℞. Quinque rad. diuret. saxifrag. ana ℥i. quinque sem diure-

ticorum, saxifragiæ macedonici carui leuistici, milii solis, raphani anethi, sileris montani, amomi ana ℥ii. liquiritiæ rasæ ℥iβ. lapid. lyncis, spongiæ ana ℥i. sang hirci preparati in puppaligati ℥i. da ℥iiii. ieiuno.

Syrupus elegantissimus ad idem.

℞. Rad. fœniculi, raphani, acori, apii, petroselini, asparagi, brusci leuistici saxifragæ, rubear tinctor. ana ℥i. sem. Macedonici, anethi leuistici, saxifragæ, milii solis, raphani, sileris montani, basiliconis ana ℥ii. quinque sem. diureticorum ana ℥i. parietariæ, pentaphillon, verbenæ, camomill. hypericon, graminis, bethonicæ ana m. i. liquiritiæ ℥i. β. mastiches ℥ii. grana hederæ ℥iβ. spicæ, zz. galangæ, cinnamomi, macis, nucis mosch. ana ℥ii. 4. sem. maior. frigid. contus. ana ℥ii. cicadar. cantharid. sanguinis hirci an. ℥i.

Syrupus elegans ad idem.

℞. Cretami marini scolopend. capill. veneris, cichorii, graminis filipendulæ parietariæ ana m. i. rad. fœniculi, apii, petroselini, asparagi brusci, acori, rubiæ tinctorum ana ℥β. spicæ celticæ ℥i. sem. saxifragiæ fœniculi petroselini, apii, milii solis, raphani nasturtii ana i ℥i. sem. 4. frigid. maior. scariolæ ana ℥2. squillæ assæ ℥3. granorum iuniperi ℥i. medullæ ossium cerasorum ℥β. bulliant cum ℥3. oxy-mellis diuretici, deinde cum zucharo fiat syrupus, da ℥2. cum ℥3. decoct. aut ciccerum rubeorum.

Syrupus ad idem pulcher.

℞. Rad. fœniculi, apii petroseliniana ʒi. sem. apii, petroseliniana ʒ3. milii solis ʒß. saxifragiæ ʒvi. cicerum rub. ʒ2. scolopend. acori ana m. i. ß. polypodii ʒi. bulliant in lib. i. aquæ, & lib. 2. vini, vsque ad consumptionem medietatis, coletur, intus dissoluatur oxymellis diuretici ʒ3.

Syrupus ad idem.

℞. Milii solis pistati ʒa. tribulorum ʒi. capill. ven. ʒv. scolopendriæ ʒß. ficuum pinguium n. vi.

Syrupus in paralysi.

℞. Calamenthi, stœch. arab. organi consolid. an. m. i. saluiæ primulæ veris ana m. 2. senæ mundæ rad. bryoniæ vtriusque, nasturtii ana m. i. piperis longi ʒz. cubeb. ana ʒi. cum melle.

Syrupus ad scrophulas, elegans.

℞. Rad. arundinum, rad. maliterræ, rad. herbæ scrophulariæ, rad. asparagi, brusci, ellebori vtriusque, aristol. rotund. rad. fabæ lupinæ, raphani agrestis & domestici, rad. spatulæ fœtidæ an. m. i. fol. laureolæ ʒß. hellebori pondus diminuat, bulliant cum vino da ʒ4. bis aut semel in hebdomada, & domi maneat, qui laxabitur.

Syrupus in lepra expertus.

℞. Radicum raphani aut petroselini, aut fœnicul. perforiat. postea helleb. nigro lardentur, deinde iterum cum terra cooperiantur, diebus 40. postea extrahe lardones & facias oxymel quod nobile erit, & nota, quod non debes à terra totam radi-

cem extrahere, sed mediam partem, deinde bene lardatam cooperi cum terra.

Syrupus ad sanguinem infectum.

℞. Succor. borrag. fumiterræ, scabiosæ, lapatii acuti, endiuæ cuscute ana ʒv. flor. borraginis, buglossæ, violar. epithymi, cuscute ana m. i. folliculor. senæ ʒ3. polypodii ʒi. ß. tamarind. ʒß. liquiritiæ ʒi. aquæ qu. suff.

Syrupus de rhabarb. qui ad ardorem urinae excellens est.

℞. Rad. apii, petroselini, asparagi, brusci fœniculi ana ʒi. ß. fœnugræci ʒvi. sem. apii, fœniculi, petroselini, leuistici seseleos an. ʒ3. fœnugræci ʒi. ß. sem. papau. albi, endiuæ, cucurbitæ, melonum. cucum. ana ʒi. fol. lactuce, papauer. scariolæ, scolopendriæ ana m. i. pistentur grosso modo & bulliant in lib. 4. aquæ ad consumptionem medietatis, coletur & cum saccharo q. s. fiat syrup. in quo ponantur Rheubarb. el. ʒvi. spicæ ʒß. in puppa ligati.

Syrupus cui non par inuenitur in frangendo lapide.

℞. Camēpytheos, calamenthi fluuiialis & montani, hyssopi, menthæ parietariæ, scolopendriæ, prassij ana m. j. sem. hyosciami, bauriæ dauci apii, petroselini, raphani, ameos, cumini, crucæ fœniculi ruthæ syluest. fœnugræci ana ʒß. caryophil. galangæ, cinnamomi ana ʒvi. rad. apij, capar. costi, pyrethri, cassiæ lignæ ʒx. aristolochiæ vtriusque ana ʒß. mastiches, myrrhæ ana ʒ3. apij ʒi. scillæ assæ ʒi. euphorbij ʒ2. castorij

℞. asæ foetida ℥i. lapid. lyncis, spongiæ ana ʒ 2. iudaici ʒß. olei balsami artific. ʒi. sed melius ex eo destillationem facere propter horribilem odorem cum vino poteris.

Syrupus aperiens oppilationem hepatis & mezeiicar.

℞. Acetosæ m. i. β. cichorii, lactucæ, nenuph. ana m. i. sem. endiuia, scariolæ ana ʒi. cyperei ʒß. papau. albi ʒ2. calam. aromatic. cardamomi ana ʒi. β. aceti ʒi. β. spicæ ʒß. rad. fœniculi ʒvi. capparor. ʒi. bulliant secundum artem in aqua qu. suf. ita quod syrupi ʒvi. remaneant, colentur, intus addatur rheubarb. in tela ligati ʒ3. iterum bulliant vna lenta ebullitione cum modico zuchari.

Syrupus ad oppilationem hepatis & febris tertianæ, & hepar calid.

℞. Capill. veneris, cichorii, endiuia cum toto lactucæ scariolæ, hepaticæ ana m. j. β. rad. apii petroselini, fœniculi cichorii in aceto per noctem temperaturorum ana ʒi. 4. sem. frig. maior. & minor. contus. ana ʒi. flor. viol. nenuph. rosar. ana p. j. prunor. iuiubar. sebesten ana n. xii. bulliant secundum artem zuchari q. s. ad dulcorationem, Misce fiat syrupus.

Syrupus phlegma in stomacho & hepate digerens.

℞. Rad. raphani, genistæ, apii, petroselini, fœniculi asparagi ana ʒvi. menthæ, mellissæ, absynthii chamædryos, chamæpytheos ana m. j. quinque sem. com. calid. ana ʒ2. camomillæ stœchad. arab. an-

thos ana p. j. laric. n. vi. squinanthi cinnamomi ana ʒ2. zuchari mellis ana q. s.

Syrupus stipticus.

℞. Sem. plantag. ʒß. nucis cupressi contus. gland. castanear. sumach, torrefacti, cort. papau. ana m. j. myrtill. ʒß. citoneorum n. 2. sorbæ, mespillorum ana n. viii. acaciæ ʒ3. hypocystid. ʒi. bulliant in aqua plantag. q. s. cum saccharo, fiat syrupus.

Syrupus ad quartanam & splenem.

℞. Radicum apii fœniculi petroselini an. ʒi. polypodii ʒ3. thymi, epithymi ana ʒ2. folliculorum senæ ʒi. β. chamædryos, chamæpyt. borraginis, buglossæ, centaureæ, calamenthi, endiuia, fumiterræ, scolopend. ana m. j. prun. n. x. cort. cappar. ʒ2. tamarisci ʒvi. stœchados arab. ʒ i. β. liquiritiæ rasæ ʒi. ros. viol. flor. borrag. buglossæ ana p. j. sem. com. frigid. contusorum ana ʒ2. tamarind. ʒß. agarici albi, myrobal. citrin. Ind. emblic. belleric. ana ʒ2. sandal. alb. & rub. spicæ ana ʒi. bulliant cum saccharo q. s.

Syrupus de plantagine stipticus.

℞. Succu plantaginis depurati ʒ4. aquar. ros. tb. 2. spodii, nucis cupressi, balaust. sumach, sang. draconis gum. arab. mastiches, thuris, hypocystid. lap. hemathites, ras. eboris gallarum ana ʒ2. Terantur & bulliant deinde cum saccharo q. s. dulcoretur.

Syrupus de iua ad paralysin & dolorem iuncturarum.

℞. Iuæ ʒ4. saluiæ, maiora-

na, rorismarini polii montani, origani calamenthi, mentastri pulegii, hyssopi, thymi, ruthæ domesticæ & sylvest. betonica, serpilli ana m. i. rad. acori ℥i. aristolochiæ vtriusque, peucedani, valerianæ, bryoniæ, diptami ℥ss. gentianæ ℥i. fœniculi, leuistici, ameos carui sileris montani ana ℥ss. pyrethri ℥vi. passul. ℥ss. aquæ mellis q. s. fiat syrupus, aromatizetur cum cinnamomo, piperis longi, cubeb. nucis mosch. ana ℥ss. elegans est.

Syrupus ad sputum sanguinis stipticus.

℥. Chimoleæ hypocistid. boli acaciæ, corall. ambor. mumiæ psidiæ, gallarum balauft. menthæ, ros. gum. arab. tragacanthi, symphiti corrigiolæ, sem. plantag. sumach, rad. pentaphyllon, sang. draconis ana ℥ss. aquæ ros. ℥b. 2. aquæ pluuiialis q. s. cum saccharo.

Syrupus aromaticus erga debilitatem stomachi.

℥. Cubeb. carioph. ℥ss. cinnamomi, nucis mosch. macis cardamomi, calami aromatici ana ℥i. ss. spicæ, mastiches, azari, squinanthi, folii ana ℥ss. amomi, ameos, costi, ciperi, carpobalsami, ligni aloes ana ℥ss. Terantur & infundantur, in vino veteri albo ℥b. x. tribus diebus, postea coquantur, vsque ad ℥b. 4. vel v. postea manibus exprimitur fortiter atque prius fricetur, deinde coletur, cum saccharo dulcoretur, fiat syrupus, atque aromatizetur cum moschi gr. vi.

Syrupus de cichorea ad oppilationem hepatis.

℥. Endiuia vtriusque, scario-læ, lactucæ lupulorum fumiter-re ana m. i. hordei mundati p. i. alkekengi ℥i. ss. liquiritiæ rasæ ℥i. capill. ven. ceterach., polytrichi, dianthos, cuscute ana m. ss. rad. fœniculi, apii asparagi, ana ℥i. 4. sem. frig. maior. an. ℥i. sebesten n. x. flor. borraginis, buglossæ, viol. nenuph. ana p. i. spicæ ℥ss. bulliant cum aqua q. s. fiat syrup. ponatur in eo rhabarb. el. in petia ligat. ℥ss. zuchari q. s.

Syrupus ad stomachum & matricem frigidam expertus.

℥. Matricariæ pulegii, origani, calamenthi rorismarini, serpilli, arthemisiæ, cuscute ana m. i. carpobalsami, calami aromatici, xylobalsami sileris montani cassiæ ligneæ ana ℥ss. sem. fœniculi, anisi carui ana ℥ss. ligni aloes doronici cinnamomi ana ℥i. sem. agni casti ℥ss. rad. mandragoræ ℥i. hyosciami ℥ss. bulliant in aqua q. s. saccharo dulcoretur.

Syrupus mirabiliter sudorem prouocans & sitim sedans.

℥. Milii cortice superiore depilati, quod pistum vinum appellatur, & faciès coqui in aqua donec crepet, quia cito decoquitur, & de tali bullitione & brodio accipiantur ℥ss. cum ℥i. vini & calide bibatur, quia mirabiliter est, in febre tertiana pura post euacuationes.

Syrupus ad omnia vitia matricis frigida.

℥. Calamenthi petroselini, chamæ.

chamadrios, chamæpyt. sem. polii montani, maioranæ ana m. j. stœchados arabici ʒiʒ. sem. dauci, ameos petroselini seseleos ana ʒ2. squinanthi, cyperi ana ʒ2. cuscutæ m. j. cassiæ lignæ, aristolochiæ longæ, gentianæ, baccarum lauri rheupontici ana ʒiʒ. aquæ fontis lb. x.

Syrupus ad Epilepsiam.

℞. Hyssopi siccæ ʒiʒ. ruthæ, saluiæ maioris calamenti, origani ana m. j. rad. ireos, acori, cyperi, visci quercini, squillæ ana ʒ2. polii m. i. aristoloch. rot. ʒ2. sem. ameos, anisi marathri, seseleos, basiliconis ana ʒ2. pœoniæ ʒi. liquiritiæ mund. passular. ana ʒʒ. flor. anthos stœchados arab. ana ʒi. absynthii, fumiterræ ana p. j. bulliant cum zucharo & melle, acetosetur cum aceto squillitico, & aromatizetur cum nucis moschatae ruta & pœonia.

Syrupus ad idem.

℥. Rad. fœniculi, graminis, pœoniæ ana ʒi. aceti ʒʒ. hyssopi ʒi. ruthæ, polii, saluiæ ana m. i. succorum borraginis, scabiosæ, fumiterræ ana ʒv. epithymi, stœchad. arab. an. ʒ2. sem. ruthæ pœoniæ ana ʒʒ. squillæ ʒ2. visci quercini ʒʒ. polypodii ʒ2. follicul. senæ ʒiʒ. passular. liquiritiæ ana ʒi. dulcoretur cum saccharo & melle, & aromatizetur vt supra, Nota, quod si febris adesset, oportet frigida aliis, vt herbas aut semina adiungere.

Syrupus ad tremorē experiētissimus.

℥. Herbe paralysis, satyregiæ, maioranæ, ruthæ, saluiæ, cha-

mædryos, chamæpitheos, calamenti mentastri origani ana m. i. stœchad. arab. ʒʒ. rad. acori ʒ3. bulliant cum melle q. s. fiat syrupus, & in secunda decoctione addantur isti pulueres, in petia ligentur, ℥. cinnamomi, caryophyl. cubeb. macis, nucis moschat. piperis longi gr. pœoniæ, calami aromatici, ʒʒ. spice, anisi ana ʒi. vel in prima decoctione, bulliant omnia in simul, & fiat syrupus.

Syrupus ad passiones oculorum.

℥. Betonicæ, ruthæ, chelidoniæ, euphrasiæ gallitrici ana m. i. pulegii, chamædryos, rorismarini, saluiæ, maioranæ ana m. ʒ. sem. anisi fœniculi, sileris montani ʒʒ. flor. borrag. buglossæ ana p. ʒ. ros. rub. ʒʒ. bulliant in saccharo.

Syrupus multoties expertus ad materiam phlegmaticam cerebri, stomachi & iuncturarum.

℥. Melissæ, anthos, saluiæ, pulegii, betonicæ, origani ana m. i. herbe & flor. primulæ veris peucedani, eupatorii ana m. i. stœchad. arabici ʒ3. azari ʒ2. ameos, galangæ, nucis moschatæ, gr. paradysi, amomi ana ʒ2. granorum pœoniæ, rad. pœoniæ, acori ana ʒi. baccarum lauri ʒʒ. bulliant & aromatizentur cum ambra & muscho ana gr. 2. fiat syrupus.

Syrupus ad discrasiam capitis frigidam & humidam cum debilitate membrorum.

℥. Folior. hederæ, lauri, betonicæ satyregiæ, rorismarini, ruthæ ana m. i. origani, hyssopi, pulegii, calamenti asari

ana m. ij. iuæ artheticae, primulae veris, hyperici ana m. iij. stœchados arabici 33. granorum pœonię, 31. cubeb. nucis moschat. piperis longi, ana 32. bulliant.

SACCVLVVS.

Sacculus capitalis.

℞. Flor. chamomillæ, stœchad. arab. maioranæ ana m. β. macis, mastiches, cubeb. ligni aloes ana 31. nucis moschatæ, corticum citri, ros. rub. ana 31. corall. rub. 31. β. salis vsti 34. β. Terantur grosso modo, & fiat sacculus cum synd. rub. interbastatus secundum artem. (potest addi sandaracha arabica, quæ est gummi iuniperi ad 32.

Sacculus pro tinnitu, sibilo & dolore punitiuo aurium.

℞. Pulpæ, colocynth. iuæ azari, centaureæ minoris ana m. i. β. mentastri m. ij. terantur.

Sacculus frigidus pro corde.

℞. Ros. bugloss. borraginis ana 31. cort. citri, spodii, folior. myrth. corall. ambor. coriandri præparati ana 32. sandal. amborum ana 31. misce, fiat sacculus.

Sacculus temperatus pro corde.

℞. Sandal. amb. ros. corall. amb. spodii, camphoræ, foliorum myrthi, borraginis ana 31. been vtriusque cort. citri, nucis moschatæ setę combustæ, off. de corde cerui, grana tinctorum, fol. lauri, caryoph. zedoariæ, ligni aloes, ozymi, caryophil. cubeb. melissæ, rorisinarini ana 3β. moschi, ambræ ana gr. 4. croci gran. 3. terantur.

Sacculus carminatiuus pro stomacho.

℞. Sem. apii, anisi, feseleos, fœniculi macedonici, ruthæ ana m. i. origani, calamenthi ana p. i hyssopi, pulegii, ruthæ siccæ chamædrios chamæpyth. camomill. ana m. i. absynthii m. iij. calami aromat. caryoph. cinnamomi ana 31. Terantur, fiat sacculus & caldus apponatur super latere vino asperso.

Sacculus pro stomacho frigido.

℞. Menthæ, absynthij. lambrusci, pulegii, calamenthi ana 32. caryophill. 31. β. nucis moschatæ, macis mastiches, ana 32. galangæ 31. ros. rub. coriandri præparati ana 32. galliæ moschatæ 33.

Sacculus confortatiuus cerebri.

℞. Maioranæ, stœchados, calamenthi, fol. lauri senæ ana 31. nucis moschatæ, caryoph. cinnamomi ana 33. stercoris columbini, sinapis ana 31. laudani 3β. cort. citri, ligni aloes cubeb. piperis longi ana 32β. terantur.

Sacculus ad tenasmonem.

℞. Coriandri præparati, granor. myrthi, sem. plantaginis, cupul. glandium, antheræ gallar. cupressii perforati ana 31. gr. tragacanthi arab. torrefactorum ana 33. terantur fiat sacculus, qui bulliat in vino rubeo & sedeat desuper.

Sacculus elegans pro stomacho scuti loco.

℞. Ligni aloes, absynthii, calamenthi, bethonica, mastiches, thuris, ciperi, costi cumini, fœniculi ros. viticellæ ana 31. macis, cinnamomi, caryoph. spi-

cæ; nucis moschat. galangæ, pi-
peris longiana ʒ2. calami aro-
matici, cassiæ lignæ, corall. rub.
vel amb. ana ʒß. fiat sacculus in
forma scuti, (fiat tantum media
pars.)

Sacculus cordialis.

℞. Sandal. amb. coral. amb.
ana ʒß. melissæ, buglossæ, cort.
citri, oss. de corde cerui, setæ
combustæ ana ʒi. spec. elect. de
gemma frigid. croci ʒß. campho-
ræ ʒi. misce fiat sacculus.

Sacculus elegans capitalis.

℞. Maioranæ, rorismarini,
saluiæ, camomillæ, stœchados
arabici, fol. lauri, ros. rubr. ana
p. i. macis, nucis moschatæ, ni-
gellæ, caryophil. cort. citri ana
ʒ2. sandal. citrin. ʒß. Misce fiat
sacculus.

Sacculus ad idem.

℞. Maioranæ, stœchados arab.
balsamitæ, fol. lauri, nucis mos-
chatæ, acori ana ʒ2. misce. No-
ta, quod ex sacculis lixiuia, pe-
dum lotiones facere potes.

Sacculus frigidus pro corde.

℞. Flor. borraginis, buglossæ,
rosar. ana ʒiß. cort. citri, fol.
myrthi, chamomil. arab. corian-
dri præparati ana ʒ2. camphoræ
ʒi. sand. amb. ana ʒi. misce,
fiat sacculus, quadrangularis s.
artem.

*Sacculus ad fluxum ventris, cum
quo infirmus sedere debeat.*

℞. Origani, sumach, myrtil.
coriandri camomillæ ana m. i.
balaust. cort. granatorum hy-
pocyst. antheræ ana m. ß. rad.
tapsi barbati (alibi cort. cardo-
nic) cardonis, ana m. ij. Misce.
fiat sacculus in forma scuti.

*Sacculus capitalis & expertus ad si-
bilum & tinnitum aurium, ac si
nucis frangantur.*

℞. Azari, calamethi, stœ-
chad. arab. pulegii, rorismarini
ana m. i. origani m. ii. spicæ nardi
Romanæ, fol. basiliconis ana m.
i. ß. ligni aloes ʒ2. macis ʒ3.
Terantur subtiliter, & fiant sac-
culi duo, calefiant super aslere
infra scripta, capiatur tabula de
ligno cupressi vehementer cale-
facta, supra qua hos sacculos ca-
lefacias & auribus appone: sed
si velis elegantius remedium,
tunc tabula calefacta superpo-
nas bonam quantitatem pulue-
ris origani, dein auribus appo-
natur. Hoc remedium ab illu-
stribus ignoratur, imo fere om-
nibus fedenegi siue fedenegi
est.

Sacculus cordialis elegantissimus.

℞. Flor. borrag. buglossæ, me-
lissæ, rub. anthos sandal. om-
nium, been vtriusque, boli præ-
parati, oss. de corde cerui, coral.
amb. ana ʒß. sem. acetosæ, terræ
sigillatæ, cortic. citri ana ʒ2. li-
gni aloes, caryophil. doronici a-
na ʒi. musci gr. 4. misce.

Sacculus capitalis calidus.

℞. Bethonica, sampsuchi, stœ-
chad. arabici, anthos saluiæ, flor.
camomillæ, melliloti ana p. i.
cort. citri ʒß. nucis mosch. ca-
ryoph. cubeb. macis ana ʒi. sa-
lis vsti ʒ4. calef. ponatur super
latere vino asperso.

Sacculus alter ad idem.

℞. Cubeb. crasso modo pul-
uer. aspersor. in aqua ros. ʒi.
fiat sacculus, apponatur capiti,
id faciūt caryophilli puluerizati,

& supra commissuram positi.
sacculus quo nonnulli in peste utun-
tur.

℞. Hyacinthi, smaragdi, sa-
 phiri, rubini coral. ambor. ana
 ℥i. croci ℥i. margaritarum non
 perforatarum ℥ss. ambre gr. vi.
 ireos ℥ss. cornu cerui vsti, auri-
 pigmenti ℥i. arsenici albi ℥iss.
 contundantur grosso modo per
 cribrum grossum, fiat sacculus
 in zendalo rubeo fortissimo, in-
 terbastatus portetur super re-
 gione cordis, tempore pestis tan-
 tum.

Sacculus cordialis.

℞. Flor. borraginis, buglossæ,
 melissæ ana p. i. sandal. om. ros.
 rub. ana ℥2. doronici, been v-
 triusque, carabe, ossis de corde
 cerui ana ℥4. cort. citri, sem. a-
 cetosæ, ligni aloes, garyophyl.
 ana ℥iss. croci ℥ss. margarit. ℥i.
 musci gr. 3. camphoræ gr. vi.
 fragmentorum om. ana ℥i. co-
 ral. ambor. spodii ana ℥ss. teran-
 tur omnia, fiat sacculus.

Sacculus cordialis temperatus.

℞. Flor. borraginis, buglossæ,
 violar. melissæ ana p. i. sandal.
 omnium, been vtriusque, ossis
 de corde cerui, ana ℥i. flor. ca-
 momillæ, anthos ana p. ss. ros.
 rub. m. i. corall. rub. sem. ace-
 tosæ, cort. citri ℥ss. ligni aloes,
 caryophil. ana ℥2. terantur se-
 cundum artem, fiat sacculus.

Sacculus capitalis elegans.

℞. Grana cum quibus tingi-
 tur, maioranæ, serpilli, verbe-
 næ, origani ana ℥2. nucis mos-
 chatæ cubeb. caryophil. & fusti-
 culorum eorum ana ℥2. fimi co-
 lumbini ad pondus omnium,

Misce fiat sacculus, cum medie-
 tate calefiat, super latere ignito,
 asperso vino, & capiti applice-
 tur, madefacto antea capite cum
 aqua, quæ in litera A. fol.

SUPPOSITORIUM.

Suppositorium secretissimum ventosi-
tatum carminativum, ut in hy-
drope & colica.

℞. Cumini, folior. ruthæ vi-
 rid. ana ℥i. maratri, rad. rapha-
 ni, maliterræ, bryoniæ ana ℥i. sa-
 lis nitri ℥ss. mellis q. s. Nota,
 quod suppositoria leuia fiunt ex
 melle, sale, gemmis speciebus
 hieræ picræ, fortiora vero ex
 colocynth. hellebori albi, felle
 tauri, stercore muris, esulæ dia-
 grid.

Suppos. in sciatica.

℞. Specierum hieræ picræ
 Gal. ℥2. esulæ ℥i. stercoreis mu-
 ris ℥4. salis gemmæ ℥2. mellis
 q. s. fiat supposit. commune.

Suppositorium fortius.

℞. Esulæ puluerizat. ℥ss. poly-
 podii quercini stercoreis muris,
 salis gemmæ, agarici an. ℥2. lau-
 reolæ ℥i. caric. saponis duri a-
 na q. s. fiat pasta dura, & deinde
 supposit. formentur cum succo
 cucumeris asinini.

Supposit. ad tenasmonem.

℞. Thuris, myrrhæ licii ana
 ℥2. opii ℥i. croci ℥i. cum mu-
 cilag. psilii & vitello oui, ana q.
 s. fiant suppositoria parua &
 subtilia.

Spongia somnifera.

℞. Opii ℥ss. succi hyosciami,
 mandragoræ lactucæ, cicutæ he-
 dere arbor. ana ℥i. imbibe
 spongiam, & permittes ad so-

lem exiccari, & vbi vti vis infunde in aqua calida, & odoretur & dormiet, si vis autem eum fuscitare, da ad odorandum spongiam in aceto infusam, vel in succo ruthe vel fœniculi.

TROCHISCI.

Trochisc. ad defectum hepatis & renum calidum appetitum prostratum & virtutem debilem

℞. Berberorum, ros. cuscute a. ʒi. β. spodii succi liquiritiæ, sem. scariolæ portulacæ an. ʒii. rheubarb. ʒ4. 4. sem. frigid. maior. mund. a. ʒi. laccæ ʒβ. spicæ, azari, mastiches ana gr. vi. caryophil. croci ana gr. v. folij gr. 4. cum succo endiuæ. Misce, f. trochisc. da cum syrupo aliquo frigido hepatis aut aqua.

Troch. contra calefactionem hepatis & sitim.

Rec. ros. zuchari, an. ʒij. spodij ʒi. succi liquiritiæ, berberis, sād. alb. sem. scariolæ portulacæ an. ʒj. cucumeris, lactucæ, cucurbitæ an. ʒβ. camphoræ ʒβ. cum succo lupulorum aut alia re, da cum oxyfaccharo & aqua acetosæ.

Troch. stomachicis, hepaticis laterum & viscerum oppilationem patientibus ab indigestione & ventositate, unde & hydropicis conuenit.

℞. ros. berb. an. ʒj. spodii, absynthij cuscute an. ʒβ. spicæ, squinanthi, laccæ mastiches an. ʒi. caryoph. costi, azari, sem. apii, cucurb. cucumeris an. ʒij. croci ʒi. rheubarb. ʒi. cum succo endiuæ.

Troch. hepaticis stomachicis calidis.

℞. sem. scariolæ, portulacæ, cucurbitæ an. ʒii. ros. ʒj. spodii, berb. violarum, cuscute, sand. alb. & citrini amyli, tragacanthæ, an. ʒβ. caryoph. ʒi. cum succo endiuæ.

Troch. Episcopi Rigenfis expertissimi in doloribus vesicæ.

℞. sem. hyosciami albi ʒii. a. ii ʒβ. sem. citrulli lactucæ an. ʒβ. papaueris albi ʒiij. cum syrupo de liquiritia.

Troch. de Benzuin suavis admodum odoris, tam pro fumigio regum, quam etiam pro fœtore oris.

Rec. ligni aloes, benzuinana ʒ4. muschi ʒβ. vel plus, si vis zuchari fieri ʒ3. f. puluis, cum aqua ros. muscata, q. s. fiant troch. ita parandi, quod multi faciant ʒi.

Troch. ut capilli crispi bene oleant.

℞. saturagiæ, maioranæ an. ʒj. gum. arab. tragacanthi an. ʒii. musci ʒβ. album. oui qu. s. fiant trochisci parui, quarum vnum dissolues in modico lixiui, & vtere quia elegantes.

Troch. ad idem.

℞. saturagiæ, saluiæ lauendulæ an. ʒi. cinnamomi, macis, nucis moschatae an. ʒi. β. gū. arab. tragacanthi an. ʒii. moschi ʒβ. spicæ gr. 3. album. oui, aquæ, ros. q. s. fiant troch.

Trochisci de rosis laxatiui.

℞. ros. ʒii. spicæ ʒi. liquiritiæ ʒi. β. diagridii ʒi. cum syrupo viol. qu. s.

Trochisci de rosis excellentes laxatiui conuenientes stipticis & calidis.

℞. sem. portulacæ, mannae endiuæ, viol. liquiritiæ, diagri-

dian. ℥ii. berberis, mastiches,
ros. spodii sem. citrulli, melo-
num an. ℥i. croci, camphoræ an.
℥ß. fiant trochisci, da cum aqua
font.

Troch. in tympanite excellentes.

℞. berber. cuscute, absynthii
an. ʒj. rhabbari ʒ2. ß. laccæ
℥4. succi liquiritiæ mastiches,
squinantii, spodij, endiuie, sem.
anisi marathri an. ʒß. spicæ, po-
lij, azari tragacanthi, sem. cu-
cumb. cucum. an. ℥2. cum succo
endiuie & eupatorii ana qu. s.
fiant trochisci.

Troch. ad oppilationem splenis.

℞. Radicum cappar. rubiæ
tinctorum, sem. agni casti, ari-
stoloch. longæ, azari, mastiches
epithymi, costi, spodij, amygd.
amar. origani scolopendriæ, ca-
lamenti, sem. anisi, apij, spicæ
an. ℥i. rhabarb. ℥4. cum succo
scolopendriæ, & parum aceti.

*Troch. ad humores grossos ventosos in
splene.*

℞. cort. cappar. tamarisci,
scolopendriæ, spicæ, cardamo-
mi, liquiritiæ an. ʒj. sem. apij, a-
nisi, azari centaureæ, cuscute,
chamæpyth. laccæ, costi an. ʒß.
misce fiat.

Trochisci ad idem elegantes.

℞. rad. cappar. azari, sem. apij,
absynthij, calamenti, rheubarb.
laccæ, spicæ, costi, anisi tamarisci
squinantii, scolopendriæ prassii
an. ʒß. misce fiat.

Troch. valde stiptici.

℞. balauft. sumach, glandium
afforum nucleorum passular. gra-
natorum affor. sem. myrthi, gal-
larum affarum, cumini aceto in-
fusi, & assi ana ʒi. cum succo

plantaginis chalybeata q. s. fiant
t. rochisci.

V N G V E N T V M.

*Vnguentum expertum ad debilitatem
iuncturarum.*

℞. dialtheæ axungia cerui, vr-
si, medullæ cruris vituli an. ʒi.
piperis longi ʒi. ol. vulpini ʒ3.
vini maluatici ℥j. bulliant om-
nia vsque ad aliqualem spissitu-
dinem, postea ex eo vngantur
iuncturæ bis in die, & mirabe-
ris effectum.

*Vnguentum commune ad omnes
plagas malignas & virulentas
mundificans sine dolore, & consoli-
dans.*

℞. galbani opopanacis an. ʒi.
armoniaci ʒ2. ceræ ʒ8. olei co-
lythargirij an. ℥i. ß. olei laurini
ʒ3. myrrhæ, mastiches, aristolo-
rotundæ, thuris, viridis æris, la-
pid. calaminaris, an. ʒi. gummi
in aceto dissoluantur, deinde fiat
magdaleon: Nota quod hoc mū-
dificatium & consolidatium
expertissimum est.

*Vnguentum de galbano mirabiliter
consolidans vulnera.*

℞. seui hircini, ceræ an. ʒ4. te-
rebinth. ʒ2. thuris, mastiches,
galbani, lapid. calaminaris an.
ʒß. myrrhæ alum. vsti an. ʒ2. f.
magdaleon. secundum artem,
potes si lubet addere boli ʒ2.
Nota quod sub hac litera aut
dictione vnguentum, compre-
henduntur & cum cerota spar-
radrappa, emplastra, & è con-
uerso.

Vnguentum nihili.

℥. ol. ros. ℥b. β. pulueris nihili
34. tuthiæ præparatæ 32. camph.
32. ceræ albæ 3 β. fiat vnguen-
tum.

Vnguentum ad pustulas faciei.

℥. olei ros. vnguent. citrini an.
3 β. de vitellis ouorum 3 i. aceti
3 i. lythargirij auri marg. alb. an.
3 β. camphor. 3 i. ceræ albæ pa-
rum, misce, fiat vnguentum
molle.

Vnguentum certissimum ad idem.

℥. ol. de vitellis ouorum 3 i. β.
olei tartari 3 β. mastiches, gum-
mi, tragacanthi an. 3 β. campho-
ræ 32. olei amygdal. dulc. 3 i. ce-
ræ albæ q. s. misce, fiat vnguen-
tum. Nota quod si facies fæda
fuerit & leprosa addas mercurij
sublimati 3 β. & faciem vnga,
diebus octo continuis, postea di-
mittas donec crustæ cadant, de-
inde vnge cum vnguento citrino
aut cum isto absque mercurio.

*Vnguentum tum nobile contra pu-
stulas faciei ex morbo Italico.*

Rec. olei tartari 3 i. rosar.
3x. aluminis vsti 3 i. virid. aris
gr. vi. vnguent. Ægyptiaci 32.
camphor. 32. cer. est q. s. misce,
fiat vnguentum molle, vngatur
facies bis in die expertum.

*Vnguentum ad scissuram lingua ex
ariditate.*

℥. aluminis vsti, boli armeni
an. 32. mellis ros. qu. s. misce,
fiat in forma vnguenti quo ter
in die lingua vngatur.

*Vnguentum ad alep. virga exiccati-
uum & incarnatiuum.*

Rec. ext. sarcocollæ, thutiæ,
aloes, thuris, lapid. hæmathit.

cann. combusto. gallarum, ba-
laust. acaciæ an. 3 i. puluerisen-
tur & cum oleo rosaceo & cera
qu. s. misce, fiat vnguentum
molle, pulchrum, exiccatiuum,
est expertum.

*Vnguentum expertum ad sedandum
dolorem hæmorrhoid.*

Rec. butyri despumati, postea
ducti ad solem in mortario plû-
beo, donec nigrescat, quo inun-
gatur locus.

Vnguentum ad idem.

Rec. olei ros. 3 i. cerussæ 3 i.
β. lythargirij 3 β. opij 3 β. ceræ
parum, misce.

Vnguentum ad idem.

Rec. thuris, myrrhæ, licij
croci, opij an. 3 i. cum mucila-
gine psillij, & modico olei rosa-
ti, fiat linimentum.

*Vnguentum de ranis ad poda-
gram.*

Rec. ol. rad. cucum. agrestis
℥b. ii. ol. maioranæ alchannæ,
ceræ terebinthinæ, galbani,
medullæ cruris cerui ana 3 i. β.
ranarum n. vi. sang. duarum
testudinum, coque ranas sang.
oleum vsque ad medietatem, de-
inde cætera misce, fiat vnguen-
tum, quia pretiosum est.

*Vnguentum sanctum & nulli reu-
landum in vlceribus tiliarum
difficilis curationis à materia ca-
lida pronenientibus.*

Rec. cerussæ cineris plumbi
an. 33. mastiches thuris an. 33.

lythargirii ℥3. thutiae ℥β. matris perlarum ʒvj. ceræ ℥2. colophon. ℥i. β. axungiae cerui ℥4. terebinthinę ℥i. camphoræ ʒ3. fiat magdaleon, cum modico ol. ros. si opus fuerit. vngatur locus bis in die extensus super tela, & plagę applicetur, quia mirum in modum consolidat. Locus vero circa plagam ad latitudinē duorum digitorum, vngatur cum vnguento albo camphorato.

Vnguentum album, de cerussa artificiali expertum sigillans & consolidans superficiem plagę & cutem generans.

℥. ceræ albę ℥4. ol. ros. ℥β. β. terebinthin. ℥i. cerussæ ℥4. lythargirii ℥i. thuris aluminis vsti limatiarum vstarum an. ʒ β. fiat magdaleon cum modico ol. ros. si opus fuerit addatur camphoræ ʒi.

Vnguentum nobile, ad omnes plagas, combustiones erysipelas & id genus calidorum morborum.

℥. ol. ros. ceræ albæ an. ʒ4. succi granatorum, succi solatri an. ʒ3. plumbi vsti & loti Thutiae an. ʒi. cerussæ lotæ ℥2. thuris ℥β. camphoræ ʒ3. cera & oleum liquefiant, deinde bulliant bulliēda, & fiat magdaleon pulchrum, hoc certe est & artificiale.

Vnguentum regis Anglię consolidans & incarnans.

℥. ceræ albæ res. an. ʒi. β. olei communis vel rosati ℥2. terebinthinę lotæ ℥i. thuris mastiches an. ʒ β. fiat vnguentum pulchrum est.

Vnguentum viride mundificatiuum & incarnatiuum.

℥. chelidonię panis cuculi (qui dicitur alleluia) centrum galli leuistici, scabiosę an. m. i. seu i. arietini ℥β. i. olei communis ℥β. β. ceræ, mastiches aloes virid. æris an. ʒi. misce.

Vnguentum carnis generatiuum.

℥. picis nigræ ceræ sepi vaccini, olei communis resina an. ʒi. myrrhę ℥β. misce.

Vnguentum ad idem fortius.

℥. ceræ ʒv. resinæ quartam vnam, terebinth. ℥β. i. mellis quartam semis, mastiches, thuris myrrhæ, sarcocollæ, aloes an. ʒβ. misce, aliqui addūt croci ʒi.

Vnguentum ad idem hoc fortius.

℥. rasurę telæ lineæ ℥β. opopanacis ℥i. vini, mellis ros. an. ʒ3. lythargirii, myrrhæ aloes sarcocollæ an. ʒ2. ol. ros. myrthini an. q. s. misce.

Vnguentum ad idem potens, nobile & pretiosum.

℥. arthemisiæ, scabiosæ, absynthii, gallitrichi tamarisci apii, verbenæ, lanciollæ, senecion, pimpinellæ, cynoglossæ, chelidoniæ, pilosellæ, milii solis ana. m. i. terantur omnia & succus extrahatur, aut si recentia haberi non possunt, bulliant in vino rubro q. s. vsque ad consumptionem medietatis, deinde bulliant iterum, vsque ad mellis spissitudinem, postea addatur axungia porci veteris ℥β. i. seu hircini ℥β. β. olei ℥β. i. β. mellis ℥4. bulliant simul secundum artem, in fine vero adde thuris, myrrhę, mastiches, sarcocollę, aloes an. ʒβ. misce.

Vnguentum

Vnguentum ad idem excellens.

Rec. ceræ $\mathfrak{z}4$. armoniaci $\mathfrak{z}6$. terebinthinæ $\mathfrak{z}2$. bulliant in vino rubro secundum artem, in fine vero adde lac mulieris, malaxentur cum lacte.

Vnguentum ad idem probatum, & est barbitonforis Montis pefsulani.

Rec. sepi vaccini \mathfrak{lb} β . olei ros. $\mathfrak{z}4$. rad. ireos, $\mathfrak{z}1$. thuris, mastiches, myrrhæ, sarcocollæ, aristoloch. rot. aloes an. $\mathfrak{z}3$. terebinthinæ quartam vnam.

Vnguentum album sigillans superficiem plagæ & cutim generans.

\mathfrak{z} . olei ros. \mathfrak{lb} β . ceræ albæ $\mathfrak{z}2$. cerussæ $\mathfrak{z}x$. camphoræ $\mathfrak{z}1$. aluminis ouorum. n. iij. lythargirij \mathfrak{z} β . similis est operationi emplastri de matre perlarum.

Vnguentum ad remouendam humiditatem & saniositatem vulnerum.

Rec. lythargirij pulueriz. $\mathfrak{z}1$. ol. ros. aceti, mellis puri an. $\mathfrak{z}1$. misce insimul donec albescant, deinde \mathfrak{z} . aluminis vsti, tragacanthi, balauft. gallarum vstarum $\mathfrak{z}1$. misce, fiat vnguentum.

Vnguentum ad scissuras labiorum expertum.

\mathfrak{z} . gum. tragacanthi, amyli, penid. an. $\mathfrak{z}1$. aqua ros. $\mathfrak{z}1$. rad. portulacæ $\mathfrak{z}1$. β . ol. ex nucleo nucis combusto $\mathfrak{z}6$. fiat linimentum.

Vnguentum carnem generans.

Rec. olibani, mastiches, aloes, picis græc. aristoloc. rotund. combustæ, ireos an. $\mathfrak{z}1$. ol. ros. $\mathfrak{z}1$. β . ceræ q. s.

Vnguentum consolidans & cutim generans.

Rec. gallarum, balauftiorum, olibani, aluminis lythargirij ros. an. $\mathfrak{z}j$. ol. ros. $\mathfrak{z}ij$. β . ceræ q. s.

Vnguentum ad idem.

\mathfrak{z} . sang. draconis, olibani, lythargirij ossium combustorum, gallarum balauft. ros. vitrioli Romani combusti ana $\mathfrak{z}j$. olei myrthini ana $\mathfrak{z}ij$. ceræ q. s. misce. fiat vnguentum.

Vnguentum exiccans vlcera virulenta pulchrum & elegans.

\mathfrak{z} . lythargirij in aceto & oleo been imbibiti atque mixti, donec albescat & intumescat $\mathfrak{z}1$. antimonij gris vsti balauft. curcumæ, vermium terrestrium gallarum, sang. draconis, aluminis vsti, chinæ argenti $\mathfrak{z}\beta$. ol. ros. myrthini an. $\mathfrak{z}2$. β . ceræ q. s. misce. fiat vnguentum.

Vnguentum ad dolorem intensum hæmorrhoid.

Rec. croci myrrhæ licij ana $\mathfrak{z}1$. opij $\mathfrak{z}\beta$. ol. ros. mucilaginis psillij, vitelli oui q. s. fiat vnguentum molle.

Vnguentum ad remouendam caliditatem & ardorem vulnerum.

Rec. lythargirij subtiliter puluerisati $\mathfrak{z}1$. ol. ros. aceti ana $\mathfrak{z}1$. β . terantur insimul, donec inflentur & tumescant, deinde adde cerussæ $\mathfrak{z}1$. camphoræ $\mathfrak{z}1$. misce. fiat vnguentum.

Vnguentum ad remouendam frigiditatem vulnerum.

Rec. olei oliuæ $\mathfrak{z}3$. serapini opopanacis an. $\mathfrak{z}1$. thuris, sarcocollæ, aristol. combustæ an. $\mathfrak{z}2$. β . gummi in oleo dissoluatur.

tur ad ignem, deinde cætera misceantur, & cum cera q. s. fiat vnguentum molle.

Vnguentum ad remouendam siccitatem vuln.

Rec. ceræ, picis olibani visci an. \mathfrak{z} i. ol. q. s.

Vnguentum ad escharas.

Rec. poma alba cocta extractis granis ol. nenupharini an. \mathfrak{z} i. misc. insimul in formam linimenti, ad idem valet infrigidans Galeni.

Vnguentum supra anthraces.

Rec. armoniaci in aceto dissoluti \mathfrak{z} 2. ol. liliorum alb. ceræ q. s. fiat vnguentum molle, quia maxime dissoluit & venenum extrahit.

Vnguentum carnis generatiuum.

Rec. olibani, mastiches aloes, picis græcæ, aristoloch. longæ combustæ, ireos anatis \mathfrak{z} i. ol. ros. \mathfrak{z} 3. ceræ q. s.

Vnguentum ad idem nobile.

Rec. mastiches madefacti in aqua ros. actu calid. donec fiat vt colla \mathfrak{z} i. postea adde puluerem hunc, Rec. thuris, aloes, picis græcæ, vernicis an. \mathfrak{z} i. boli terre sigil. sang. draconis an. \mathfrak{z} β . ol. ros. myrthini an. \mathfrak{z} 3. cer. q. s. fiat.

Vnguentum expertum in contractione nervorum.

Rec. adipis vulturis, tapsi barbati, serpentum medullæ cruris vaccæ, mandibulæ porci \mathfrak{z} i. β . adipis anatis, hyssopi humidæ an. \mathfrak{z} i. mucilag. fœnugræci, licij, maluaufci an. \mathfrak{z} i. β . bdellij armoniaci, galbani, opopanax an. \mathfrak{z} β . castorei \mathfrak{z} β . euphorbij \mathfrak{z} i. ol. camomillæ, co-

stini de castoreo nardini laurini de euphorbio an. \mathfrak{z} i. mucilaginis, fiat cum succo aut decocto, rad. ebuli adipis leporis vulpis an. \mathfrak{z} i. ol. vulpini de terebinthina an. \mathfrak{z} i. β . ceræ nouæ \mathfrak{z} 2. adipis anferis asini marciaton, dialtheæ Agrippæ Arrogon butyri sine sale an. \mathfrak{z} i. Nota terram sigillatam maxime putrefactioni obistere, quid ergo de ea in peste confid.

Vnguentum frigidum reperiussium.

Rec. boli armen. \mathfrak{z} β . terre sigillatæ \mathfrak{z} ii. aceti parum, ol. ros. \mathfrak{z} 2. si vero membri corruptione rimes, tunc da terræ sigillatæ \mathfrak{z} β . boli \mathfrak{z} ii. & vnge locum sanum. Nam terra sigillata à sua proprietate, membrum vltius corrumpi non permittet, quid ergo de ea in peste fol.

Vnguentum reperiussium mitigans ad idem.

\mathcal{L} . sand. alb. spodij, acaciæ an. \mathfrak{z} i. opij \mathfrak{z} j. camphor. \mathfrak{z} β . succi solatri \mathfrak{z} ij. misce.

Vnguentum vt crustæ cadant, dolorem quoque mitigans.

\mathcal{L} . vitelli ouorum ol. ros. an. \mathfrak{z} β . misce. fiat vnguentum

Vnguentum reperiussium ad idem.

\mathcal{L} . lythargirii \mathfrak{z} β . distemperz cum ol. viol.

Vnguentum stomachale calidum.

\mathcal{L} . ol. de spica \mathfrak{z} i. de absinthio de mastiche an. \mathfrak{z} β . caryoph. cinnamomi, coral. rub. an. \mathfrak{z} ii. ligni aloes, galliæ moschatæ, an. \mathfrak{z} β . ceræ q. s. fiat vnguentum molle.

Vnguentum elegans certe & pulchrum.

℥. ol. de spica ℥i. ol. de cinnamomo ℥ β. cinnamomi galang. anatis ℥ β. galliæ mosch. ℥ii. musci ambræ ana gr. ij. cer. qu. s. misce fiat vnguentum, quo stomachus vngatur, facta tamen antea fomentatione hac. ℥. flor. absynthij, camomillæ balsamitæ ana m. β. cinnamomi spicæ, squinanthi an. ℥j. β. caryoph. galangæ, ligni aloes, folij anatis ℥j. bulliant in duabus partibus aquæ, & vna vini vsque ad consumptionem medietatis, deinde sponsia decoctione infusa calido stomacho applicetur, ter vel quater donec siccetur & inungatur. Verum si sacculum feceris vt supra latere ignito asperso vino maluatico calefeceris, & stomacho ter vel quater applicueris, postea inunxeris, artificialius certe erit & pulchrius.

Vnguentum ad sodam calidam.

℥. Fit ex ol. ros. aqua ros. & quarta parte aceti, bene in mortario agitatis.

Vnguentum ad idem expertum.

℥. cerati Galeni vel infrigidantis Galeni ℥ij plurimis lotionibus in mortario lauetur, vt succis aut solatri aut endiuic aut semperuiuæ, cucurbitæ, camphor. adde si lubet ℥ β.

Vnguentum nobile & expertum ad excoriationem ani, ob nimiam equitationem.

Rec. ol. citoniorum, rosati, myrthini om. lotor. vicibus quatuor in aqua rosati anatis ℥ j. mucilag. tragacanthi ex

aqua plantaginis anatis ℥ β. amy. li, boli, gallarum anatis ℥ij. camphoræ ℥j. ceræ albæ qu. suf.

Vnguentum ad dolorem.

Rec. ol. camomillæ ℥j. de costo ℥ β. de spica de lilio anatis ℥ii. acori stœchad. arabici piperis longi, nucis moschata, ligni aloes anatis ℥j. ceræ qu. s. vngatur membrum tremens, quod si hæc decoxeris in vino vsque ad vini consumptionem fortius erit.

Vnguentum ad materiam frigidam.

℥. ol. de lilio ℥j. irini ℥ β. cinnamomi ligni aloes, feseleos anatis ℥j. galliæ moschatae ℥ii. ceræ q. s. vngatur ab umbilico infra.

Vnguentum calidum capitale.

Rec. ol. de costo ℥j. de spica ℥ β. nigellæ baccarum lauri, piperis longi, cubeb. acori, anatis ℥ β. croci ℥i. muschi ambr. anatis græ. ij. cer. q. suf.

Vnguentum in formica miliari expertum.

Rec. olei ros. populeon anatis ℥ iiij. myrthini ℥ ij. succi plantag. solatri anatis ℥iiij. aluminis ℥ iiij. antheræ balauft. anatis ℥ β. rad. lapatii acuti recentis, si haberi possunt, subtiliter incisorum ℥ j. vel succi eius ℥ij. aceti ros. ℥ ij. bulliant omnia simul, vsque ad succi consumptionem, coletur intus, addatur lythargirij vtriusq; a. ℥ β.

R r r ij

thutia, cerussę scorix ferri puluerisatę camphorę an. ʒi. misce, fiat in forma vnguenti cum modico cerę si opus est, & diuidas in partes duas, in quarum vnā pones viridis æris ʒß. vngat se ad dies aliquot, & ponat telam madefactam in aqua quare in litera sol. Postea in alia parte, absque viride æris, vngat se, & miraberis effectum.

Vnguentum ad dolorem capitis, sed in declinatione.

℞. viol. ros. meliloti an. m. j. farinę hordei ʒ2. summitatum papau. albi p. i. vel semen eius ʒi. cum omphacino oleo, misce, fiat emplastrum.

Vnguentum optimum ad idem.

Rec. olei ros. viol. lactis mulieris an. ʒß. aceti parum, liniatur frons & tempora.

Vnguentum ad idem optimum.

Rec. vitel. oui, olei viol. lactis mulieris.

Vnguentum somniferum.

Rec. ol. viol. ros. chamomel. ʒi. succi mandragorę, vel olei eius hyosciami lactucę a. ʒß. opii ʒi. cerę albę. qu. s. misce. fiat vnguentum molle, pulchrum est.

Vnguentum ad duritiem quę reman. sit in membro post restitutionem fracturę eam duritiem leniens.

Rec. cerę ʒi. ol. de lilio adipis gallinę, anatis, medullę cruris vaccę, mucilaginis, sem. lini ana ʒi. misce diu in mortario.

Vnguentum ad duritiem splenis.

Rec. succi eupatorij absynthij

cichoreę, aceti an. ʒ2. armoniaci, opopanacis, bdellij, serapini in aceto dissolutorum an. ʒß. ping. anieris, gallinę, anatis ʒi. omnia ad ignem dissoluantur, & cum cerā q. sufficit fiat vnguentum.

Vnguentum contra vermes.

Rec. ol. de rutha absynth. nucleis persicorum amygd. amar. anatis ʒ2. ruthę, myrrhę, gentianę, centaureę, iupinorum, cornu cerui vsti aloes prassij matricarię colocynth. an. ʒi. aceti ʒß. fellis tauri ʒi. cerę qu. s. fiat vnguentum.

Vnguentum ad maciem renum.

℞. ol. ros. viol. an. ʒi. butyri sine sale ʒ2. ping. anseris, anatis, gallinarum an. ʒi. pinguium renum hœdi & arietis an. ʒ2. cerę q. s. fiat vnguentum.

Vnguentum ad destillationem vrinę stipticum.

℞. gummi arab. tragacanthi, boli cerussę, myrtillorum an. ʒi. opij ʒi. ol. ros. ʒ2. ʒ. cerę q. s. fiat vnguentum.

Vnguentum ad coitum.

℞. ol. de spica ʒ2. euphorbij, piperis, cubeb. sinapis costi an. ʒi. ʒ. muschi gr. viii. cerę ʒ2. misce.

Vnguentum optimum ad idem.

℞. ex oleo de euphorbio, cum ana cardo pipere costo, cerā & in balneo virgę fricetur.

Vnguentum nobile ad dolorem hæmorrhoid.

℞. sem. hyosciami vtriusque an. ʒij. aluminis vitrioli an. ʒß. cerussę, tapsię an. ʒi. cerę ʒß. ol. ros. ʒij. misce.

Vnguentum ad pruritus ani.

℞. Mastichini ℥i. sulphuris
33. cerę ℥β. fiat vnguentum.

Vnguentum ad nervos.

℞. saluæ, ireos, bethonica
nucis cupressi, macis balauft. a-
na ℥i. mucilag. altheæ, linicau-
lis scœnugræci ana ℥β.

Vnguentum de adipibus ℥i. β.
terebinthinę lotæ ℥i. adipis ta-
psi vrsi ana ℥i. ol. vulpini laurini
de ireos an. ℥2. opopanacis
bdellii ana ℥3. croci myrrhæ ana
℥β. ceræ viridis q. s. misce fiat
vnguentum.

*Vnguentum de corticibus castanea-
rum valens ad immoderatum flu-
xum menstruorum & dyssente-
rium.*

℞. Olei mastichini ℥vi. myr-
thini citoniorum ana ℥iβ. ma-
stiches, acaciæ sang. draconis
ana ℥vi. coral. rub. ℥β. carabæ
terræ sigillatæ an. ℥4. cort. ca-
staneorum, scorix ferri ana ℥i.
boli, balauft. thuris ana ℥3. re-
sinæ ℥i. ceræ q. s. misce fiat vn-
guentum. potes ex hoc facere
emplastrum.

*Vnguentum ad remotionem escharæ
in combustione ignis.*

℞. Cerussæ ℥iβ. camphoræ
℥i. anisi ℥i. aqua ros. ℥iβ. al-
buminis ouorum duorum mis-
ceantur diu insimul, & fiat in
forma vnguenti.

Vnguentum defensiuum optimum.

℞. Boli terrę sigillatæ, sang.
draconis ana ℥i. aceti ros. pa-
rum ol. ros. q. s. misce fiat vn-
guentum.

*Vnguentum frigidum ad excoria-
tionem factam in coxis ab acuita-
te vrinæ.*

℞. Aluminis oui vnus ol.
viol. ℥i. lythargirii, spumi finiti.
℥vi terantur in mortario plum-
beo diligenter, vt fiat vnguen-
tum, valet in affolis & labiis.

Vnguentum pro vermibus vsuale.

℞. Centauræ, absynthii, lu-
pinorum an. ℥β. ligni aloes, cor-
nu cerui vsti diptami ana ℥i. a-
loes ad pondus omnium, ol. de
absynthio ℥2β. fellis tauri ℥i.
ceræ q. s. fiat vnguentum.

Vnguentum ad idem nobile.

℞. Absynthii lupinorum ana
℥2. feseleos cumini nigellæ cen-
tauræ santonici cornu cerui
vsti ana ℥β. ol. de absynthio
perfic. amygd. amar. ana ℥2β. a-
garici myrrhæ ana ℥2. aloes ℥i.
fellis tauri ℥. x. ceræ q. s. fiat vn-
guentum molle.

Vnguentum ad idem probatum.

℞. Theriacæ ℥β diptami, sem.
lumbric. gentianæ ana ℥3. fellis
tauri ℥β. aloes ad pondus om-
nium, adde olea vt supra.

*Vnguentum de Tuthia expertum ad
ulcera virgæ.*

℞. Thutię preparatæ ℥β.
mastiches, thuris ana ℥2. ceræ
albæ ℥i. ol. ros. q. s. fiat vnguen-
tum.

*Vnguentum ad parauitium digito-
rum.*

℞. Olei mastichini ompha-
cini ana ℥2. antimonii, ℥i. ce-
rusę lotæ plumbi vsti ana ℥β.
thutię preparatæ ℥β. ceræ albæ,
resinæ lotę tribus vicibus ana
℥i. f. vnguentum bene tenax.

R r iij

Vnguentum ad sanguinem è pectore emanantem.

℞. Succorum plantaginis, corrigiolę bursę pastoris ana ℥3. boli armeni ℥1℔. gum. arab. leniter torrefact. tragacanthi ana ℥2. amyli ℥2. terrę sigillatę, sang. draconis, acacię spodii granatorum myrthi hypocystidos ana ℥vi. glutinis carthę dissolutę in agresta ℥1℔. Bulliant in simul parum, addatur ol. ros. ℥v. fiat vnguentum.

Vnguentum ad sciaticam.

℞. Ol. de lilio ℥3 laurini, nardini ana ℥1℔. castorei ℥2. pyrethri ℥1. euphorbij ℥2. sem. sinapis ℥℔. stiracis liquidę ℥℔. calamit. ℥2. cerę parum fiat vnguentum : vngatur bis in die, postea superponatur emplastrũ. *Vnguentum ad faciem mundi ficiendam.*

℞. Saponis duri ℔i. saponis mollis ℔℔. vitel. ou. nu. vi. ol. tartari q. s. fiat in forma vnguenti liquid. cum ℥vi. pulueris ireos, adde camphorę ℥i. si placet.

Vnguentum ad coitum.

℞. Succum nepetę, calamenti, succi squillę, succi serpentarię, succi vrticę, rad. pyrethri ana ℥2. ol. sambucci ℥3. de euphorbio ℥1. bulliant omnia in simul vsque ad consumptionem medietatis, & non coletur, sed cum cera q. s. fiat vnguentum praputiũ & tota virga vnhat, olea valentia sunt olea pastinacę sinapis sambucci, formicarum euphorbii.

Vnguentum somniferum.

℞. Populeon ℥1. ol. violati ℥1. ℔. de hyosciamo, mandragorę,

ana ℥vi. q. s. fiat vnguentum molle.

Vnguentum dolorem & tumorem hemorrhoid. sedans.

℞. Pingued. anatis, gallinę ana ℥. ol. viol. ℥4. cerę q. s. fiat vnguentum, dimittatur infrigidari, postea addatur vitelli oui vnius opii ℥1. croci ℥℔. misce expertum est.

Vnguentum ad dolorem & scissuras ani.

℞. Boli gummi arab. sang. draconis ana ℥3. myrtil. balaustr. ros. rub. ana ℥3. puluerisentur vt alkohol. deinde adde butyri ℥1. ol. ros. ℥3. succi fol. porrorum ℥3. succi solatri ℥4. cerę q. s. fiat vnguentum.

Vnguentum pro splene duro ventoso in materia mixta.

℞. Ol. capparorum ℥3. de sesamo ℥1℔. scolopendrię, cort. capparorum, tamarisci, sem. portulacę, trochisci de caparibus, sem. endiuia, scariolę, lactucę ana ℥1. agni casti ℥1. ceti parum, cerę q. s. fiat vnguentum.

Vnguentum ad hepar calidum.

℞. Ol. ros. nenuph. de spica ana ℥℔. rosar. spodii, sandal. amb. sem. plantaginis, portulacę ana ℥1. spicę mastiches ana ℥i. eupatorii ℥℔. cera q. s. fiat vnguentum.

Vnguentum ad dolorem magnum renum & lumborum.

℞. Oleorum sambuccini ℥1. viol. ros. ana ℥1℔. cerusę ℥x. thuris, mastiches ana ℥1. camphorę ℥℔. amyli ℥x. aquę rosaceę ℥1. albuminis ouorum duorum, cerę ana ℥℔. bulliant olea & cera in simul, postea vbi

vbi infrigidata fuerint, adde species ultimo album. ouor. & boli armeni ʒx. agitentur in spatula diu, postea renes vngantur, deinde superpone spicæ post vntionem folia solatri, & hoc fiat bis in die.

Vnguentum expertum ad scissuras manuum.

℞. Ol. ros. axungia gallinæ ana ʒ2. ceræ albæ ʒß. Thuris, mastiches ana ʒ2. pulueres vt alcohol, terantur & diu omnia insimul agitentur, donec asperitatem perdens, & fiat sicut vnguentum molle.

Vnguentum ad confortandas iuncturas extenuatas.

℞. Mucilaginis, althææ, lini fœnugræci ana ʒ4. medullæ cruris vaccæ ʒ2. adipis porci colati ʒ4. ol. de lilio antiqui communis ana ʒ4. ceræ q. s. fiat vnguentum.

Vnguentum contra calorem heceticorum, si bis in die vngatur spina dorsi.

℞. Mucilag. psilii citoniorum ana ʒ1. gummi tragacanthi ʒ1ß. ol. nenuph. de sem. cucurb. viol. ana ʒ2. ceræ albæ q. s. fiat vnguentum.

*Vnguentum hæmorrhoid. constri-
ctiuum.*

℞. Scoriæ ferri præparatæ ʒß. gallarum cupressi, hæmatidos, carabe hypocystis ana ʒ2. ol. de chrysom. ʒ3. ceræ albæ q. s. fiat vnguentum molle & bulliant in ʒvi. succi, semperuiui, citoniorum vsque ad consumptionem succi bulliant.

*Vnguentum siue linimentum ad de-
scædationem faciei, faciei maculas
rubeas, panum, lentigines, impe-
tigines*

Primo phlebotomes venam vnâ maiorem repertam in tempore, quæ vt plurimum superior est, & multum laudata à principe in hoc casu quarta i. cap. 20. postea capiat lythargyrium spumatum & album effectum in succo fol. serpentariæ, quo sero tamen in introitu lecti totam faciem liniat, & hoc faciat 22. diebus, & si iuuerit, tunc facies sic: Minuatur alia vena superior temporis, postea lineatur facies hoc meo experimento. ℞. sem. maluaïsci recentium ʒ3. Terantur vltima contritione, deinde supponatur gummi oliuarum, dissoluto modico aceto forti ʒß. styracis liquidæ ʒ3. ol. de frumento facto secundum artem ʒ2. cort. medianæ vlmæ exiccata & puluerizata ʒ1ß. per linimentum, qua tota facies, per noctem vincta maneat, mane autem lauetur cum aqua ciclamini, cuius magna est certo ad superscriptas res, vis ipsius enim aut succus aut aqua faciem decoret, facto hoc linimento per xv. dies, si non iuuerit, faciat hoc vltimum. ℞. rad. serpentariæ ʒ2. incorporentur subtiliter scissæ in aqua rosarum, muscata vt prius & exiccentur vt prius, postea addatur ossis sapiæ puluerizata vt alcohol ʒ2. & interu vt prius incorporetur & exiccentur, & cum opus fuerit dissoluas vnũ in aqua ciclamini & faciẽ liniat, quia non fallit te bis in die.

Vnguentum pulchrum ad excoriationem narium à catarrho salso.

℞. Amyli de hordeo ℥β. lythargyrii spumificati ℥vi. thurie præparate, cerussæ ℥iβ. ol. de vitellis ouorum ℥i. terantur & agitentur diu in mortario plumbeo, & sero nares liniantur, mane vno lauetur cum decoct. sem. melon. non excort. & cocto lauentur.

Vnguentum in calculo.

℞. Mucilag. althææ lini fœnugræci ana ℥β. medullæ cruris vituli, porci sine sale, gallinæ tassi, anatis ana ℥3 resinæ terebinthinæ ana ℥β. ol. de scorpionibus ℥2. camomillæ amygd. dulcium, ana ℥iβ. laudani ℥i. ceræ q. sufficit fiat vng. molle, quod si cerotum facere cupis, adde plus de cera & linitum super corium interbastatum die solum portetur.

Vnguentum ad spasmodum, paralysin, nervorum contractionem ex repletionem, factis tamen antea euacuationibus & balneis diaphoreticis.

℞. Olei mustellini ℥i. petrolei ℥β. communis butyri sine sale ana ℥4. ceræ ℥2. storacis calamitæ, benzui, mastiches, ol. bani, gr. hedere, ana ℥β. liquefacienda liquefiant, deinde storaces ponantur & fiat vnguentum.

Vnguentum sanguinis restrictum.

℞. Thuris ℥2. aloes ℥i. albuminis oui q. s. pilorum leporis subtiliter incisorum ℥4. s. vng. vulneri imponatur.

Vnguentum ad vulnus & puncturam nervorum.

℞. Centauræ minoris lan-

ceolata, pilosellæ consolidæ vtriusque ana m. i. vermium terrest. lb. β. ol. communis lb. i. vini lb. iβ. pistentur & misceantur stentque insimul per 7. dies, deinde ℞. seui arietini mundati lb. i. picis nigræ resinæ ana ℥3. armoniaci galbani opoponacis in aceto dissolutorum ana ℥β. bulliant donec vinum & acetum sit consumptum, coletur & ubi aliquoties infrigidatum fuerit, adde terebinthinæ ℥iβ. thuris, mastiches, sarcocollæ ana ℥β. croci ℥2. duces cum spatula, donec infrigidetur, est enim pretiosum.

Vnguentum ad ulcera gingivarum.

℞. decocti fol. oliuarum, abluantur & leuiter ex eo dentes fricentur, postea hoc linimento vngantur. ℞. vtriusque aluminis salis adustorum, gallarum, psidie, cupularum glandium, cinnamomi, caryoph. aristol. saluiæ, ros. ossium dactyl. tibiarum cancerorum adustorum ana ℥i. fiat alkohol, deinde cum aceto squillitico & melle ros. q. s. fiat linimentum pulchrum.

Vnguentum certum & nobile ad scabiem, tineam, scabiem fœdantem & vniuersaliter omnem cutis fœditatem.

℞. Hellebor. vtriusque sulphuris vini atramenti, auripigmenti lythargyrii, cathimiæ viuæ, vitrioli aluminis, gallarum fuliginis clauill. ana ℥β. argenti viui extincti virid. aris ana ℥2. pulueriscentur & bulliant in succo borrag. scabiosæ, fumiterræ, lapatii acuti aceti ana ℥3. olei antiqui lb. i. vsque ad succi consumptionem

sumptionem, in fine addatur picis liquidæ $\mathfrak{z}\beta$. ceræ q. s. fiat vnguentum molle, lauetur tamen antea corpus cum aqua salsa aut decoct. lupin. & staphisag. aut lauetur cum aqua fortiori caput aut totum corpus, quare in litera A fol.

Vnguentum ad idem.

\mathcal{L} . Adipis vrsi, vaccæ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. stercoris muris $\mathfrak{z}\beta$. granorum iuniperi $\mathfrak{z}2$. araneæ adustarum $\mathfrak{z}2$. picis liquidæ, olei ana q. s. fiat linimentum.

Vnguentum ad idem.

\mathcal{L} . Axungie antiquæ porci dissolutæ in succo acetosæ $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ j. o. lei communis, picis liquidæ ana $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$. β . succi abrotani, succi menthæ saracenicæ, succi fumiterræ, succorum lapatii, erucæ, mercurialis ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. aluminis vitrioli, gummi hederæ combusti, fuliginis baumach, vsti tartari, aloes ana $\mathfrak{z}\beta$. Misce, fiat linimentum, vt supra.

Vnguentum ad hypofarcam expertum.

\mathcal{L} . Olei de absynthio $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$. mastichini $\mathfrak{z}2$. de spica $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. cyperii, squimanthi, spicæ, ligni aloes ana $\mathfrak{z}\beta$. cinnamomi, ros. rubr. ana $\mathfrak{z}\beta$. ceræ q. s. fiat vnguentum.

Vnguentum resolutiuum in materia calida.

\mathcal{L} . Olei camomillini, ceræ $\mathfrak{z}\beta$. pulueris camomil. anethi ana $\mathfrak{z}2$. axungie, anatis, gallinæ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$. fiat linimentum.

Vnguentum ad leprosos.

\mathcal{L} . Vnguenti citrini $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$. pingued. serpen. $\mathfrak{z}4$. ol. ros. myrtini, populeon ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\beta$. misce,

vngatur membrum post balneum, quare in litera B. fol.

Vnguentum ad morpheam.

\mathcal{L} . Succi chelidoniæ saponis albi, vnguenti albi camphoræ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. f. vnguentum.

Vnguentum ad combustionem ignis mirabiliter consolidas & exiccās.

\mathcal{R} . Calcis viuæ septies lotæ in aqua frigida donec acuitatem perdat $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. f. q. olei ros. ducatur in mortario, fiat vnguentum, expertum est.

Vnguentum ad idem expertum & præcipue aquæ, ignis & olei.

\mathcal{L} . Succi solatri endiuia, virgæ pastoris aq. ros. hæc prohibent vesicationem, aut fiat cum vitellis ouorum, olei ros. succo solatri & est bonum. Si autem locus vesicatus fuerit aut vulneratus tunc sic fit. \mathcal{L} . Calcis viuæ $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. olei ros. q. s. ducatur diu in mortario & fiat vnguentum. Calx abluitur sic, supra ea aqua frigida, donec operiatur, & sic per tres horas dimittatur, donec parum infrigidetur, deinde aqua illa proiciatur & alia superponatur, hoc autem septies fiat, donec acuitas sedetur. Nota pulchra potens in combustionem ignis, olei aut aquæ, item calcis ablutionem.

Vnguentum nobile & dignum ad plagas difficilis curationis.

\mathcal{R} . Aeris vsti, antimonii, plumbi aluminis, vstor. balauft. gal-larum sang. draconis, rad. cureumæ, cathimæ, argenti ferici vsti lumbricorum terrestriū siccator. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. cerussæ $\mathfrak{z}2$. lythargyrii $\mathfrak{z}3$. puluerisati, & cum oleo ros. & aceto ana q. s.

ducti in mortario plumbeo, donec spissetur & tumescat, postea cetera addantur & fiat vnguentum.

Vnguentum nobile & magnum secretum in consolidanda cute, & in omni vulnere malo.

℞. Aquæ aluminis, si autem in sola cute est. ℥. aquæ plantaginis, camphorata & modicum aluminata, aquis istis vlcus benelauctur, deinde superponatur lamina plumbea ad magnitudinem vlceris, & bene ligetur, quia mirabiliter operatur. Finge autem quod sit aliud propter vulgares, quia nihil approparant, nisi quod sumptuosum est. Quot autem honores habuerim cum isto auxilio, ille scit qui nihil ignorat.

Vnguentum utile ad tineam.

℥. Lythargyrij, miux calchimiæ vitrioli, auripigmenti, cupressi, fuliginis, virid. eris ellebori vtriusque, aluminis, gallarum ana ℥β. argenti viui extincti ℥i. picis græcæ olei nucum ana lb. β. succi lapatij, fumiteræ, scabiosæ, borraginis ana ℥3. bulliant cera, pix, oleum insimul, deinde cetera addantur, fiat vnguentum.

Vnguentum probatum ad alopeciam.

℞. Succu calcid. ℥i. puluer. sanguisugarum vistarum lacertæ viridis vstæ, talparum apum vistarum, solcarum vistarum setarum porci combustarum virid. æris ana ℥i. mellis q. s. fiat vnguentum, quod probatum est.

Vnguentum certum & verum Hægonis contra paralyfin & contractionem nervorum.

℥. Saluiæ, absynthii, caryoph. menthæ, sabina, marrubii, lauendulæ, fabrifugæ, tanaceti, eupatorii, herbæ S. Petri, stæcad. arab. citrini teromand. maioris, rad. libistici, menthæ, mentastri, mæliissæ ana m. j. rad. brancæ vrsinæ maluaufici ana m. iij. baccarum lauri sem. lini fœnugræci ana ℥2. β. agni casti ℥i β. pimpinellæ, gentianæ, rad. valerianæ tenerimarum fol. malux ana m. i. summitatum iuniperi cum granis eius m. iij. decoquantur in aqua & vino albo parum, vsque ad consumptionem medietatis, colentur, postea addantur axungia gallinæ, anseris, anatis, arietis, porcina, vaccinæ, ana quartam semis. Tassu vulpis ana ℥2. bdellii, galbani in vino infusorum ana ℥3. olei de castoreo, de spica, de iunip. ana ℥i β. limaciarum, ceræ rubæ ana quartam vnam bulliant iterum insimul, vsque ad aquæ & vini consumptionem, ultimo gummi addantur, & f. vnguentum, quo calide nerui & membra contracta vngantur, potes si placet addere linimentum de pipere longo ℥2. & pulchrius erit.

Vnguentum ad spasmodum & paralyfin.

℥. Euphorbii ℥i. pyrethri, thuris, myrrhæ, aloes, mastiches ana ℥β. ol. laurini sambucini de pulegio communis ana ℥2. ceræ q. s. fiat vnguentum molle, vngatur spina collum & ceruix.

Vnguentum ad idem optimum Huius.

℞. Olei mustellini ℥i. petroselinii ℥β. communis butyri sine sale, ana ℥2. storacis calchimiæ benzuini mastiches olibani gummi hederæ ana ℥β. ceræ ℥i. misce fiat vnguentum.

Vnguentum pretiosum ad duritiem quæ remansit, post fracturam ossium aut dislocationem.

℞. Bdellii, opoponacis ana ℥i. β. in vino dissoluantur postea, ℥. pingued. porci sine sale ℥2. anatis, anseris, gallinæ ana ℥i. ceræ q. s. fiat ceratum.

Vnguentum ad capillorum regenerationem & cutis perfectam mundificationem.

℥. Cineris capillorum hominis ℥i. setis ol. lini aut nucum, mellis despumati ana ℥3. myrtil. 3vi. sulphuris viui ℥β. staphisagriæ 32. euphorbii 3β.

Vnguentum mirabile ad remouendum dolorem, ubicunque fuerit.

℞. Panem subtilissimum calidum, prout à forno egreditur, sume ex eo medullam, quam calidam in lacte pone, deinde bene mollificatum exprime & loco dolenti appone, quia videbis mirabilia.

Vnguentum ad spasmus expertum.

℥. Ol. costini de piperibus ana ℥2. de euphorbio, de lateribus ana ℥i. terebinth. non lotæ 34. ceræ q. s. fiat vnguentum.

Vnguentum ad idem nobile, valens quoque in paralyti.

℥. Ol. de lateribus, de piperibus ana ℥i. vulpini 3vi. de terebinth. de costo ana ℥β. ceræ q. suff. fiat vnguentum molle,

quo vngatur membrum, facta tamen semper antea fomentatione, quam quære in litera F. folio.

Vnguentum ad remouenda frustra ossium corrupta.

℞. Serapini, galbani in aceto dissolutorum, pulueris capsularum papaueris, pulu. flor. papau. rub. ol. nucum, frumenti, lilii, ceræ q. suff.

Vnguentum ad idem.

℥. Pulueris tartari, sepiæ, maxillarum & dentium lucii ana 3i. pulu. ossis humani combusti 3i. colophonix 32. ol. tartari 3. vi. anethini ruthæ ana q. s. cum cera q. s. misce fiat vnguentum.

Vnguentum scripticum stomachale, quod valet etiam ad fluxum album matricis.

℞. Ol. ros. cithoneorum, mastichini ana ℥i. balauft. ros. sumach, berberorum, myrtil. ana 3β. vini citon. 33. bulliant omnia insimul vsque ad vini consumptionem, colentur, intus addatur laudani 3β. galliæ mosch. des. Nicolai 32β. moschi ambræ ana gran. 2. ceræ q. sufficit fiat vnguentum molle, vngatur stomachus in viro, in muliere semper supra ventrem, ℞. vini rubri 3b1β. maluatici 3bβ. ros. rub. balauft. sumec. myrtyll. ana ℥i. squinanthi, spicæ, calami arom. mastiches ana 3i. bulliant insimul.

Vnguentum ad idem.

℞. Ol. mastichini rosati, citon. ana ℥i. troch. Ramich. 32. caryoph. corall. rub. ana 32. muschi gr. 2. ceræ.

§ ss ij

Vnguentum ad idem & albas humiditates.

℞. Infrig. Galeni ℥2. succi semperuiuæ plantag. ros. ana ℥℥. sumach, hypocyst. spodii Troch. Ramich ana ℥i. ol. mastich. citon. ana ℥℥. ceræ q. s. fiat linimentum.

Vnguentum ad generationem pilorum.

℞. Talparum combustarum, cort. auell. nucum, castan. apium muscat. combust. ana ℥2. capill. ven. spice nardi, laudani ℥i. bulliant omnia in oleo laurino q. s. vsque ad aliqualem spissitudinem, & locus scarificatus vngatur bis in die.

Vnguentum ad dolorem capitis calidum.

℞. Ol. ros. aceti aquæ ros. ana ℥℥. agitetur diu insimul, deinde tela in oleo infusa commissuræ capitis & parti dolenti applicabis.

Vnguentum ad idem.

℞. Fol. maluauisci, ana ℥2. puluerisentur, deinde capias telam infusam in aquam ros. & acetum, & eam puluere asperge.

Vnguentum ad idem.

℞. Psilii ros. ana ℥℥. album ouorum.

Vnguentum nobile ad idem.

℞. Sem. psilii, papau. albi ana ℥i℥. populeon ℥4. ros. rub. sandal. alb. & rub. flor. nenuph. siccorum ana ℥i. Terantur & insimul incorporentur, deinde pars anterior & commissura capitis epithimetur, si autem vigilæ sunt, potes addere opium lac papaueris in forma emplastris.

Vnguentum somniferum.

℞. Populeon ℥i. ol. violati hyosciami, mandrag. ana ℥℥. croci ℥℥. ceræ parum fiat vnguentum.

Vnguentum ad dolorem & duritiem hæmorrhoidarum.

℞. Ping. anethi, gallinæ ana ℥i. ol. ros. ℥2. ceræ q. s. dissoluantur & infigidentur, postea addatur vitelli oui vnus opii ℥i. croci ℥i. s. vnguentum.

Vnguentum pro splene.

℞. Ol. de capparibus ℥i℥. sesami ℥vi. scolopendriæ, cort. cappar. endiuæ, scariolæ, lactucæ ana ℥℥. sem. agni casti ℥4. aceti parum, ceræ q. suff. fiat vnguentum.

Vnguentum pro hepate temperatum.

℞. Ol. ros. de spica, nenuph. ana ℥℥. ros. rub. spodii. ana ℥i. sand. alb. & rub. sem. plantaginis, portulacæ, spicæ, eupatorii ana ℥℥. mastiches ℥i. ceræ q. s. fiat vng.

Vnguentum pro vermibus.

℞. Absynthii, lupinorum, fileris montani, cumini ana ℥2. nigellæ, centaureæ, doronici cornu cerui vsti, myrrhæ, prassii matricariæ ana ℥i. aloes ℥2. agarici ℥i℥. succi arantiorum ℥2. ol. de absynthio, amygd. amar. de nucleis persicorum ana ℥3. de fellis tauri ℥i℥. ceræ q. s. fiat vng.

Vnguentum stomachale.

℞. Ol. mastiches, nardini, citoniorum de mentha ana ℥℥. de absynthio ℥2. mastiches caryoph. spicæ galangæ, nucis moschata, myrtillorū labrus. men-

thæ an. ʒß corall. ambr. absyn-
th. ros. an. ʒi. ceræ q. f. fiat vn-
guentum.

Vnguentum pectorale.

Rec. pingued. anatis, gallinæ
an. ʒvi. butyri sine sale ʒß, cro-
ci ʒi. ol. viol. ʒi. ʒ. ceræ parum,
fiat vnguentum molle, quod
postea lauetur bis cum aqua hor-
dei tepida, pulchrum est in spu-
to facilitando.

Vnguentum pectorale temperatum.

℞. Olei amygd. dulc. sesami-
ni, viol. an. ʒvi. pingued. galli-
næ, butyri sine sale an. ʒiij. croci
ʒi. Misce, bis lauentur cum a-
qua violata, deinde ceræ albæ q.
suff. fiat vnguentum.

Vnguentum bonum ad lumbricos.

Rec. succi menthæ ʒij. succi
centauræ, cotonici fol. lupi-
nor. an. ʒß. gentianæ, absynthii
an. ʒj. diptami se. sancti an. ʒiij.
aloes, ʒij. feilis tauri ʒj. olei ma-
stichini de absynthio, de nucleis
persicorum an. ʒi. succi arant.
ʒij. ceræ qu. suff. fiat vnguent.
molle cum gr. musci.

Vnguentum aliud pro vermibus.

℞. succorum persicariæ, absyn-
thii, abrotani, centaureæ, cicla-
minis, fol. persici, fol. lupinor.
ebul. cort. granat. an. ʒj. porro-
rum non transplantatorum ʒij.
nasturtii aquatici ʒiij. aceti for-
tissimi ʒij. ceræ qu. suff. fiat vn-
guentum, sic fiat: bulliat cera
cum oleis, & cum incipit tepe-
fieri, addantur species diligen-
tissime tritæ & bulliant cum suc-
cis vsque ad consumptionem,
fiat vnguentum, in fine addatur
muscus.

*Vnguentum de semperuivæ, valens in
febris acutis & renibus mul-
tum calefactis.*

Rec. Ol. viol. ros. an. ʒi. ping.
anseris ʒvi. succi semperuivæ
ʒiij. bulliant vsque ad succi con-
sumptionem, postea adde croci
ʒi. camphoræ ʒß. Misce, vn-
gantur renes & spina dorsi, qui
semper calefacti sunt.

*Vnguentum appropriatum scissuris
manuum in hyeme.*

℞. ol. ros. ceræ albæ, thuris
mastiches an. ʒß. pulu. sicuti al-
kohol.

*Vnguentum mitigativum doloris in
combustione ignis.*

Rec. Olei omphacini, ros. an.
ʒj. ʒ. vitell. ouorum num. vi.
agitantur diu in simul, deinde
tela intus madefiat & applicetur
loco, aut inuncto vnguento de
calce potes dimittere oleum om-
phacinum & tenere rosatum.

Vnguentum ad idem.

℞. Ol. ros. ʒiij. boli ʒß. Misce
fiat vnguentum.

*Vnguentum ad pustulas totius
corporis.*

℞. Cerussæ lotæ, fuliginis, ly-
thargyrii, gallarum, myrtæ a-
loes an. ʒß. Terantur vt alko-
hol, postea cum oleo nucum &
myrtino an. q. f. fiat & c.

Vnguentum ad dolorem renum.

℞. Spicæ nardi, dauci, anethi
milij solis an. ʒß. amyli ʒvi. vi-
telli ouorum num. ii. fiat vn-
guentum molle in mortario plu-
beo.

Vnguentum ad imprægnationem.

℞. Gallinæ moschata, coaguli
leporis, sang. draconis an. ʒij.
bellii ʒj. castorei ʒß. laudani

S s s iij

ziii. olei laurini, nardini, nasturtij, myrtini an. ℥i. β. cerę q. suff. fiat vnguentum molle.

Vnguentum calidissimum contra apoplexiam & paralyfin.

℞. Vnguenti Martiati ℥j. β. ol. de euphorbio, de costo benedict. laurini an. pulueris pyrethri, sinapis, piperis, costi, zinz. an. ℥i. β. euphorbii ℥i. axungię vrsi, taxian. ℥β. cerę q. s. fiat vng. elegans certe.

Vnguentum ad dealbandam faciem & remouendas lentigines & phlegma falsum.

℥. Boracis, ℥ii. camphorę, coral. alb. an. ℥iiii. amygd. amar. ℥β. vmbilici marini tragacanthi, amyli, gummi arab. crystalli, marmoris gallarum, enthalis, denthalis, nitri ℥i. β. porcellę ℥ij. Terantur omnia vt alcohol & cum axungia gallinę ℥b j. fiat vng.

Vnguentum ad rubedinem & lentigines faciei.

℞. Zinzib. albi, salis vsti, sulphuris viui, baccarum lauri, caphorę an. ℥ij. Terantur & cum axungia gallinę, q. s. fiat vnguentum, & cum patiens lectum intrat, faciem aqua calida lauet, & exiccari permittat, tum vngat vnguento faciem, & permittat exiccari, deinde quarta die iterum lauet faciem aqua calida.

Vnguentum ad fluxum sanguinis per anum.

℞. Acacię, mastiches, thuris, boli armeni, terrę sigillatę, sang. draconis an. ℥i. telę aranę, pilorum leporis aliquantulum, myrtillorum, gallarum an. ℥j. cum cera & ol. myrti-

no q. suff. fiat vnguent. postea fiat suppositorium ad formam parui digiti, & hoc vnguento vngatur & in anum intromittat. Non sit autem valde grossum.

Vnguentum pulchrum ad vermes.

℥. Absynthij, lupinorum, fileris montani, cumini, nigellę, centaureę minoris, daronici cornu cerui vsti, myrrhę an. ℥β. aloes ℥vi. agarici ℥i. succi arant. ℥ij. ol. de absynthio amygd. amar. de medullis persicorum an. ℥iiii. fellis vnius lauri, Bulliant sed & succus, vsque ad succi fere consumptionem, & cerę q. s. fiat vnguentum molle. Hoc vnguentum pulchrum frangit potenter lapidem & calculum.

Vnguentum elegans anodynum ad renum dolorem.

℥. Ol. de violis citrinis ℥b. β. amygd. dulc. de sesamo an. ℥iiij. butyri recentis ℥ij. croci ℥ii. cerę albę, ℥ii. fiat vnguentum, in cuius facie addantur vitelli ouorū nu. iii. Misce hoc vnguentum dolorem renum sedat & pectori maxime valet.

Vnguentum ad omnia genera vermium expertissimum.

℞. Succimenthę ℥ij. succi centaureę lupinorum centonici an. ℥β. gentianę, absynthii an. ℥i. diptami, sem. sancti an. ℥iiij. fellis tauri ℥j. ol. mastichini, de spica, de absynthio an. ℥i. omphacini, panis assi in aceto infusi & expressi an. ℥ij. succi arantiorum, ℥i. β. cerę albę ℥j. Coquantur cera, oleum & succi & cum infrigidati fuerint, addantur spec. cū gr. ii j. musci & fiat vnguentum, extendatur late & supra vmbilic-

co ponatur, quia omnes vermes interficit.

Unguentum ad omnem dolorem calidum oculorum.

℥. Thutię præparate, in aqua ros. ℥ss. axungię porcine recentis sine sale ℥iij. amyli ℥vi. agitur diu in mortario conterendo, deinde abluantur tribus vicibus in aqua solatri & liniantur intus & extra palpebrę & extra tempora & palpebrę.

Unguentum de anthera stipticum.

℥. Antherę ℥vi. ros. rub. balau. gallar. cort. granat. nucis cupressi, gummi arabici, myrrhę, myrtil. tragacanth. terre sigillatę, coriandri præparati, boli sand. rub. an. ℥ss. sang. draconis, mastiches, thuris, hypocystidos an. ℥iii. acacię sumach. an. ℥ss. bdellij, spodij, coral. rub. an. ℥ij. camphorę ℥i. cupularum glandium ℥vi. ol. ros. lb. j. myrtini, mastichini, citoniorum an. ℥iij. carabę, se. plantag. an. ℥ss. cerę q. s. fiat vnguentum molle.

Unguentum ad debilitatem stomachi & malam digestiõem.

℥. Ol. nardini, mastiches, camomillę de mentha de absynthio a. ℥ii. citonior. ℥ss. ros. ℥ij. ss. macis, mastiches, caryoph. nucis mos. cardamomi vtriusque galangę, ligni aloes an. ℥ij. coral. rub. coriandri præparati, ros. rub. spicę an. ℥j. ss. sumitatum absynthii, menthę, camomillę, squinanthi an. ℥i. vini rub. ℥viij. Terantur species & bulliant omnia in si-

mul, vsque ad vini consumptionem, deinde adde cerę q. s. fiat vnguentum cum ℥ss panis assii in aceto infusi postea bene expressi.

Unguentum pectorale.

℥. Ol. de sesamo, amygd. dulc. an. ℥j. croci ℥i. viol. enulę farfarellę, ireos, anisi, fœniculi an. ℥ss. cerę q. suff. fiat vnguentum.

Unguentum stomachale stipticum temperatum.

℥. Olei mastichini de myrtho an. ℥i. citoniorum ℥ij. coral. ambor. ros. spodij, gallię moschataę sandal. an. ℥. cerę q. s. resinę, parum fiat vnguentum.

Unguentum expertum ad paralysin et laxitatem nervorum.

℥. Ol. de costo liliorum alborũ an. ℥ii. ambre ℥ss. cerę q. s. vngatur locus deorsum à collo vsque ad spincterem, videbis mirabilia certe.

Unguentum ad torturamoris elegans.

℥. Ol. de costo vulpini an. ℥i. ss. de sesamo ℥ii. de stœchad. pœonię ruthę abrotani an. ℥i. cera & herbarum olea si destitueris herbas capias.

Unguentum magistrale officinarum cuiusdam chirurgi Domini

℥. Cerussę lotę lythargyrij loti ol. ros. myrthini an. lb. viij. thuris ℥xv. vel xx. cerę albę ℥iij. succi solatri lb. v. misce & coque ad consumptionem; succi diluuntur oleo aliquo astringente, & pars eo illinetur, valet contra dolorem compositum.



INDEX RERVM

MEMORABILIVM QV AE

HOC OPVSCVLO

CONTINENTVR.

A.

A Qua experta in vlcere præ-
putij, virgæ & testiculorum.

383

alia experta ad Asthma. ibi.

Aqua qua intinea, ac in omni
cutis fœditate caput aut totum
corpus laetetur. ibi.

alia ad idem pro pauperibus.

384.

ad mundificandos dentes. ibi.

contra calculum. ibid.

experta ad grossos, id est fi-
cus, circa nasum & poma ma-
xillarum. ibi.

frigida in febricitantibus, ne
fumi à stomacho ad caput as-
cendant. ibi.

faciem dealbans. ibi.

elegans contra calculum. ibi.

somnifera. 385

multum odorifera. ibi.

frangens lapidem. ibi.

ad fistulas experta. ibi.

ad fistulas artificialis. ibi.

alia faciem dealbans. ibi.

ad caput frigidum quia caput fri-
candum. ibi.

B.

B Alnea ad matricem frigidam.

386

ad leprosos. ibi.

proleprosis & fœda scabie in-
fectis. ibid.

ad calculum. ibi.

aliud ad idem. ibi.

in dolore capitis frigidi ibi.

stipticum consolidatium, &
ex quo vlcera lotio fieri de-
bet. ibi.

ad imprægnationem. ibi.

aliud ad idem. ibi.

C.

C Aputpurgium ad sodā an-
tiquam, phlegmaticam,
ventosam, dolorem oculorum
& tinnitum aurium. 387.

ad antiquam hemisphæricam. ibi.

mirabile expertum ad debili-
tatem visus, tenebrositatem,
panum & lachrymas. ibi.

solenne & expertum ad corro-
borationem omnium sensuum.

ibid.

in materia phlegmatica. ibi.

in dolore capitis frigido. ibid.

nobile ad idem. ibi.

superinfluitatis cerebri ibi.

elegans. 388. ibi.

Cerotum nobile & expertum ad
scrophulas. ibi.

ad callos mundificandos pul-
chrum. ibi.

supra commissura coronali ap-
plicandum.

plicandum, &c. 396
 ad idem præstantius, ad descen-
 sum phlegmatis viscosi, mucila-
 ginosi, &c. 397
 cordiale. ibi.
 elegans ad duritiem splenis. ibi.
 ad dolorem sciaticæ excellens.
 ibid.
 ad nodum iuncturarum. ibid.
 ad dissoluendam natam. ib.
 calidum pro stomacho. ibi.
 stomachale fluxum dysentericū
 & vomitum vltime stringens. ib.
 ad stomachum debilem, sitim,
 mordicationem, vomitum nimi-
 rum à calore prouenientia ex fe-
 bre. ibi.
 ad stomachum frigidum. 398
 pro renibus vtile atque mirabi-
 le ad prohibendum abortum. ib.
 ad fluxum matricis album ex-
 pertum. ibi.
 Clyster conferens materiei adu-
 stæ in cerebro, vt est melancho-
 lia, mania, lupina. 388
 forte & diuersum in dolore
 nuchæ & iuncturarum. ibi.
 in dolore capitis, frigido phleg-
 matico. ibi.
 in dolore capitis calido. ibi.
 stypticum. ibi.
 conueniens apoplexiæ, paralyfi,
 subeth & lethargiæ. ibi.
 conueniens paralytico. 389
 carminatiuum ventositatis. ibi.
 in colica phlegmatica ventosa,
 cum magno dolore appropriatè
 valens. ibid.
 confortatiuum & abstersiuum.
 ibid.
 elegans ad caliditatem & sicci-
 tatem in testinorum. 390
 in schiatica. ibi.
 ad lethargiam & subeth. ib.

in tympanite cum caliditate. ib.
 vltimum sedans dolorem & ven-
 tositatem in colica. ibid.
 stypticum consolidatiuum vlce-
 ris intestino rum. ibi.
 sodæ calidæ & phrenesi somnife-
 rum. ibi.
 conferens, cephalææ, subeth, le-
 thargiæ, scotomiæ, vertigini, e-
 pilepsiæ, attrahens phlegma &
 melancholiam à capite. ibi.
 ad omnem dyscrasiam sensuum.
 ibi.
 euacuans materias calidas à pe-
 ctore, thorace, stomacho & ven-
 tre inferiori. 391
 conferens dolori intestinorum
 ventoso, & phlegmati mucilagi-
 noso. ibi.
 ad omnes passiones iuncturarū,
 vt schiatica, podagra, gonagra
 à materia frigida. ibi.
 ad præfocationem matricis, mē-
 strua alba, sterilitatem à materia
 frigida aquosa. ib.
 aliud conferens schiaticæ. ibi.
 in passione renali expertum. ib.
 aliud nobile & expertum ad dy-
 senteriam & rasuram intestino-
 rum. ibi.
 ad spasmus & paralyfin ex re-
 petitione. 392
 in febre acuta & phrenesi. ibi.
 ad ilium, quem post sedem pun-
 ctio intestinorum sequitur, ex a-
 cuitate materiæ, vnde sequitur
 excoriatio. ibi.
 magistrale in torsione & colica.
 ibid.
 Collyrium ad surditatem exper-
 tum. ibi.
 album ad oculorum inflamma-
 tionem. ibi.
 ad idem. ibi.

Aliud ad idem multotiens probatum. 393.
 Mesue nobile, visum acuens & conseruans. ibid.
 Ad interficiendū vermē in aure. ibid.
 Expertum ad sibilum & tinnitum aurium. ibid.
 Ad lacrymas oculorum. ibid.
 Sublime & expertum ad acuedum visum. ibid.
 Aliud ad lacrymas oculorū. 394
 Dolorem sedans & incarnans vlcus vesicæ, & per syringam immitti debet. ibid.
 Nobile ad idem, dolorem sedans & vlcera mundificans, vnā cum vrinæ prouocatione. ibid.
 Nobile ad ardorem vrinæ. ibid.
 Album expertum M. Petri Cathelani ad rubedinem oculorum & pruritus. 10.
 ad dolorosum vlcus virgæ, renum & vesicæ. ibid.
 Expertum ad oculorum scotomiam. ibid.
 Expertum ad surditatem. ibid.
 aliud ad idem, cui par non reperitur. 395.
 ad fistulam in oculo. ibid.
 Expertum & indubium ad imagines oculorum. ibid.
 Confectio matricalis. 396.
 ad vermes. 397.
 Bona restauratiua in febribus. ib.
 alia ad idem. ibid.
 ad imprægnationem. ibid.
 ad vomitum cholericum solutionemque. ibid.
 Pro nauigationibus & phlegmaticis. ibid.
 admirabilis ad tussim frigidā. ib.
 turbith ad purgandum humore, tuberositatem, phlegma grossū, in scrophulis, bolio, morbo Itali-

co. ibi.
 euphrasie valens aduersus oculorū caliginē, eorū sanitatē cōseruās, visū clarificans, reacuēs. ibi.
 ad hydropem. D. ibid.
Destillatio mater omniū medicaminum ad cunctas nervorum passiones. 398
 experta in vlceribus renum & vesica Cardinalis Tritel. ibi.
 ad dolorem dentium. 399
 pectoralis scretum facilitās. ib.
 Diazinziber elegans confortatiuum & solutiuum. ibi.
 E.
Electuarium conferens Nephriticis sanguinem purum & guttatim mingentibus. 13
 in hydrope frigida. 14
 ad idem nobile & pulchrum in cachexia stomachi & hepatis. ib,
 in mala dispositione calida stomachi & hepatis. ibi.
 in mala dispositione stomachi frigida humida, vomitu, vëtositate, &c. ibid.
 aliud ad idem. 400
 ad sputū sanguinis & vlcus siue vulnus pectoris, phtisicis quoque valens. ibi.
 aliud ad idem. ibi.
 nobile & artificiale in tussi sicca restaurans. ibi.
 Cordiale ad melancholiam cap. cum timore. ibi.
 ad melancholiam valens timidis ex cholera adusta. 401
 ad pulsū cordis, pauorem, & debilitatem ex melancholia, senibus conueniens. ibi.
 optimū, probatū cōtra pestē. ibi.
 nobile cordiale & excellens. ib.
 fluxū hemorrhoidarū strigēs. ibi.
 ad tussim siccam. 402
 excellens contra calculum. ibi.

E M P I R I C O R V M.

stipticū valde, ī ruptura valēs. ib.
 herniosorum. ibi.
 solēne & expertū in hydrope. ib.
 in dyscrasia calida capitis. ibi.
 ad apoplexiam. 03
 excellens contra calculum. ibi.
 de citro Mesues, stomachum cō-
 fortans, digestionē corroborans,
 odorem oris bonum faciens. ib.
 contra sterilitatem. ibi.
 expertum ad idem. ib.
 expertū & vtile ad restaurandā
 virtutē animalē & vitalem. 404
 indubiū & certū cōtra epileps. ib.
 nobile ad torturam oris. ibi.
 sublime pectorale. ibi.
 ad asthma pectoris mundificati-
 uum. ib.
 ad fastidium stomachi & caninū
 appetitum. ibi.
 ad frigiditatem & inflationē sto-
 machi. ib.
 contra inflammationem & ven-
 tris solutionem. 405
 contra crapulam. ibi.
 aliud ad idem. ibi.
 nobile & pulchrum ad fluxum
 ventris. ibi.
 aliud ad idem stipticum. ib.
 aliud ad idem. ibi.
 ad coitum ex frigidityte renū
 testiumque, sperma quoque au-
 gens. ibi.
 aliud ad idem nobile. ibi.
 aliud ad idē pulchrū & elegās. ib.
 nephriticis guttatim cum dolo-
 re & ardore mingentibus. 406
 ad iuuenes cholicos constipa-
 tos, appetitu carentes & sitibun-
 dos & exsiccatos. ibi.
 nobile pro ictericis & illis, qui
 post acutā febrē dolorē capitis
 & aurium tinnitū patiuntur. ib.
 ad omnem discrasiam stomachi
 & hepatis frigidum, &c. ib.

ad ardorem vrinæ, & vlcera re-
 nū vesicæ. ibi.
 aliud ad idem. ib.
 ad gonorrhæam. ib.
 ad coitum breue & vltimum. ib.
 aliud ad idem. ibi.
 ad botium gulæ. 407
 contra hecticam & senium pluri-
 mis restauratiuum Placētini. ib.
 contra pestem diaphoreticū. ibi.
 ad asthma propter pectus plenū.
 ibi.
 restauratiuum in sputo sangui-
 nis. ibi.
 de pulpa caponis restauratiuum.
 408
Emplastrum
 Emplastrum nobile resoluens &
 maturans omnē squinantiam. ib.
 in squinantia quando maturari
 vult. ibi.
 doloris sedatiuum. ibid.
 ad dolorem membri paralytici
 aut spasmodici ex repletionē ib.
 aliud ad idem. ib.
 sanguinis constrictiui & fra-
 cturarum conglutinatiui. ib.
 aliud ad idem. ibi.
 ad restorationem iuncturarum.
 ibi.
 nobile ad duritiem post ossium
 fracturam remanentem. 409
 excellentius omnibus in vulne-
 re capitis & saniem attrahens,
 ossa eleuans & consolidans. 22
 in dolore virgæ. ibi.
 mirabile extrahens ossa cum ve-
 locitate. ibi.
 certum & indubium ad eleuan-
 dum os cranij ex casu. ibi.
 vtrum cranium sit fractum, cum
 nulla læsio ab extra appareat. ib.
 ad idem. ibi.
 nobile & expertum ad dolorem
 capitis calidi. ibi.
 nobile ad idē & somniferū. 410.

aliud ad idem.	ibid.	ad idem fortius, vt est de centaurea.	ib.
ad splenem.	ibi.	saniei mundificatium & incarnatium.	ibi.
aliud ad idem.	ibid.	ad paralyfin colli & linguæ balbutiem.	414
sanguinis constrictium.	ibi.	valens ad extrahenda ossa & spinas, & sciaticę conueniens.	ibid.
aliud ad idem, nobile & pulchrũ.	ibid.	incarnans & mundificans.	ibi.
aliud ad idem mirandum.	ibi.	de vermibus ad idem consolidans & incarnans.	ibi.
supra ventrem ad hydropem.	ib.	gratię Dei, speciale.	ibi.
aliud ad idem elegantiss.	ib.	ad dolorem hæmorrhoidarum excellens.	ibi.
valde somniferum Mesue.	411	ad dolorem pedum.	415
matricis confortatium ad impregnationem valens.	ibi.	de lino Auicennę.	ibi.
pro vermibus supra stomacho ponendum.	ibid.	contra ossium fracturam.	ibi.
mirabile ad idem.	ibi.	anthracis furiosi maturatium.	ibi.
nobile contra contusionem.	ibi.	aliud ad idem.	ibi.
ad inflationem testiculorũ puerorum ex aqua & vento.	ib.	carbunculi maturatium.	ib.
carminatium in hydrope tympanica.	ibid.	aliud ad idem.	ibi.
ad prouocandum lac.	ibi.	aliud ad idem solennissimum.	ibi.
hæmorrhoidarum fluxum stringens.	412	ad idem maturatium in codexellis probatum.	ibi.
cordiale.	ibi.	aliud ad idem vesicatorium.	ib.
ad epilepsiam, &c.	ib.	in combustionem ignis expertum.	416.
ultimate constrictium in fluxu hepatico.	ib.	in superfluo fluxu menstruorum.	ibi.
ad duritiem mamillarum dissolutium.	ibi.	mollificans duritiem membri restaurati.	ib.
maturatium, resolutium, mitigatium doloris in apostemate auris.	ibi.	ad duritiem splenis pulchrum.	ibi.
ad extrahendum codexellas.	ibi.	remouens duritiem mamillarũ.	ibi.
ad lac coagulatum.	ibi.	optimum ad tumorem & vehementem mamillarum inflationem.	ibi.
aliud ad idem.	ibi.	nobile ad sciaticam.	ibi.
ne mamillę crescant.	ib.	ad puncturam optimum.	ib.
puerperis, vt mamillarum papillę exeant.	413	stypticum.	417
aliud ad lac coagulatum.	ib.		
scrophularum resolutium.	ib.		
in hypofarca.	ib.		
de bethonica ad vulnera capitis.	ibid.		

EMPIRICORVM.

solutium in colica. ibi.
 ad mollificiendā ossa male con-
 solidata & omnia apostemata
 dura. ib.
 ad retentionem vrinæ. ibi.
 expertum in carbunculo. ibi.
 cordiale mirabile ad pulsum &
 tremorem cordis. ib.
 maturatiuum expertum. ibi.
 constrictiui fluxus. 418
 mirabile ad omnes fluxus anti-
 quos excoatiuos, & in diar-
 rhæa excellens. ibid.
 ad nimium fluxum menstruorū,
 item om. fluxum hæmorrhoida-
 rum & dysenteriam valens. ibi.
 Epithema cordiale temperatum.
 ibi.
 cordis ad magnam caliditatem.
 ibi.
 cordis calidum. ibi.
 aliud cordiale. ibi.
 aliud ad idem nobile. 419
 ad vermes. ibid.
 aliud ad idem. ibi.
 ad hepar. ibi.
 aliud ad idem. ibi.
 frigidum reperiūm ad in-
 flammationem membri. ibi.
 Embrocha stomachalis cum spō-
 gia. ibid.
 ad menstrua prouocanda. ib.
 somnifera. ibi.
 ad pleurisin. 420

F.

Fomentatio ad dolorem ven-
 tris & hypochondriorum fri-
 gidorum. ibi.
 ad surditatem. ibi.
 Fomentatio seu lotio pedum tra-
 hens phlegma à capite. ibid.
 ad sciaticam. ibi.
 Fumigium phlegma à capite va-
 cuans & confortans. ibi.

aliud ad idem fortius. ibid.
 aliud ad idem. ibi.
 ad dolorem capitis frigidum.
 ibi.
 aliud ad idem nobile. ibi.
 ad sodam calidam expertum.
 421.
 ad prouocanda menstrua. ibi.
 ad tumorem matricis. ibi.
 ad matricem frig. ibi.
 ad fluxum albarum humidita-
 tum. ibid.
 materiam cholicam à capite e-
 ducens & caput confortans.
 ibid.
 aliud ad idem.

G.

Gargarisma ad elongationē
 vuluæ. ibid.
 melancholiam è capite educens.
 ibi.
 aliud ad idem. ibi.
 aliud ad idem. 422
 ad paralyfin, torturam & graui-
 tatem linguæ. ibid.
 ad catarrhum falsum os aut lin-
 guam vesicantem. ibi.
 stypticum ad os. ibi.
 ad idem. ibid.
 ad paralyfin & balbutiem lin-
 guæ, & phlegma valde purgans.
 ibi.
 ad idem. ibi.
 ad squinanthiam, & elongationē
 vuluæ stypticum. ibi.
 nobile & expertum ad vlcera
 gutturis ex morbo gallico. ibi.

L.

Licinium in tenafino & dysē-
 teria. ibi.
 dolorem sedans in dysenteria.
 ibi.
 aliud ad idem. ibi.
 ad idem pulchrum. ibi.

I N D E X

aliud excellentius cæteris. <i>ibid.</i>	Harmanni. <i>ibid.</i>
Linimentum in morphea sub-nigra. <i>ibid.</i>	pilulæ ad quartanam febrem. 458.
aliud ad idem. <i>ibid.</i>	ad ablationem appetitus à materia cholericæ. <i>ibid.</i>
Lixiuum ad dolorem capitis. <i>ibid.</i>	excellentes ad fœtorem oris. <i>ib.</i>
ad dolorem capitis antiquum. 423.	aliæ ad idem. <i>ibid.</i>
aliud ad idem. <i>ibid.</i>	hepaticis, aschiticis & ictericis conuenientes. <i>ibid.</i>
capitis confortatiuum. <i>ibid.</i>	ad tympanitem. <i>ibid.</i>
pro capite phlegmatico. <i>ibid.</i>	In aschite quando est febris & vrina rubra. 459.
aliud ad idem. <i>ibid.</i>	In aschite vbi non est febris neque vrina rubra. <i>ibid.</i>
aliud ad idem. <i>ibid.</i>	alia ad idem. <i>ibid.</i>
Lotio pedum somnifera. 34.	ad hydropem elegantes. <i>ibid.</i>
aliud ad idem. <i>ibid.</i>	ad pulsum cordis expertissimæ. <i>ibid.</i>
ad dolorem dentium & gingiuas putrescentes. <i>ibid.</i>	ad oppilationem splenis. <i>ibid.</i>
manuum & pedum elegans contra epilepsiam. 424.	probata & excellentes ad debilitatem memorię. <i>ibid.</i>
O.	stupefactoriæ ad dolorem dentium vehementem. <i>ibid.</i>
O Doramentum capitale & cordiale in materia mixta. <i>ibid.</i>	stomachicæ purgantes choleram & phlegma sine impedimento. <i>ibid.</i>
ad dolorem capitis frigidum. <i>ib.</i>	contra fumos à stomacho ad caput ascendentes, visumque clarificantes. <i>ibid.</i>
ultimum ad cerebrum frigidum confortandum. 425.	ad fœtorem oris. 460.
cerebrum confortans & ipsius oppilationes profundas aperiens. 36.	ad viscosos humores, & ventositatem stomachi artheticos, podagricos & calculos. <i>ibid.</i>
aliud sublime & mirandum ad caput confortandum. <i>ibid.</i>	ad epilepsiam. <i>ibid.</i>
trahens phlegma à capite. <i>ibid.</i>	ad hydropem calidam & aschitem. <i>ibid.</i>
aliud ad idem. <i>ibid.</i>	quibus Lanfræcus loquelam restituit cuidam mulieri. <i>ibid.</i>
ad dolorem capitis frigidum. <i>ib.</i>	contra pestem. <i>ibid.</i>
aliud expertum & nobile. <i>ibid.</i>	ad choleram & dolorem capitis calidum. <i>ibid.</i>
in dolore capitis calido. <i>ibid.</i>	ad dolorem capitis phlegmaticum. <i>ibid.</i>
aliud ad idem. <i>ibid.</i>	elegantes aliæ ad idem. <i>ibid.</i>
ad tremorem cordis. <i>ibid.</i>	
ad dolorem capitis calid. <i>ibid.</i>	
oleum ad erectionem virgæ. 426.	
P.	
P Asta ambra ex qua poma, aut pater noster facere potest. 454.	

ad dolorem capitis melancholicum.	461	dulcis.	ibi.
ad duritiem splenis & quartanam.	ibid.	P. pro epithemate cordialis.	ibid.
ad choleram elegantes.	ib.	P. cordialis temperatus in caliditate.	ibid.
Bechicæ.	ibi.	pulvis contra vermes expertus.	ibid.
ad materiam cholicam, melancholicam adustam elegantiores.	ibid.	pulvis in ardore urinæ & mictu sanguinis.	ibid.
Pomata quomodo facienda.	453	pulvis stomachalis pulcher & brevis.	ibid.
Pomum odoriferum ad caput frigidum.	452	pulvis stomachalis.	ibid.
odoriferum capitis confortativum, nudum manibus gestandum.	453	pulvis capitalis.	ibid.
Confortativum capitis frigidi.	ibi.	pulvis elegans ad caput frigidum qui supra commissura coronali poni debet.	ibid.
aliud ad idem.	453	pulvis aspergendus super commissuras capitis serò, quando vadis dormitum ad idem.	428.
Pomum odoriferum capitis frigidi.	ibi.	pulvis violarum Francisci Ferrarij.	ibid.
Pomum contra pestem Montagnanæ.	ibi.	pulvis alius.	ibid.
Pomum odoriferum.	ibi.	pulvis elegans solutivus.	ibid.
Pomum odoriferum in descensu catharri.	ibi.	pulvis phlegmatis & melancholicæ solutivus.	ibid.
Pulvis pro botio Montagnanæ.	426.	pulvis solutivus in dyscrasia frigida stomachi.	ibid.
Pulvis pro mingentibus in lecto	ibid.	pulvis solutivus in mixt.	ibid.
Pulvis ebrietatem tardans.	ibi.	pulvis ad idem.	ibid.
Pulvis ad idem.	ibi.	pulvis soluens humorem phlegmaticum.	ibid.
Pulvis pro cerebri confortatione deopilativus, & materiarum phlegmaticarum consumptivus.	ibid.	pulvis ad idem.	ibid.
Pulvis optimus ponendus super commissuras capitis ad vëtositatem & humiditatem in oculo.	ibid.	pulvis solutivus in mixtis humoribus elegans.	ibid.
Pulvis electus ad ardorem urinæ cholicum.	ibi.	pulvis senæ caput purgans.	ibid.
Pulvis stomachalis.	427	pulvis ventrem leniens qui horis duabus ante cibum cum brodio sumi debet.	429.
Alius stomachalis qui dicitur		pulvis ad vlcus renum & vesicæ, & ad ardorem urinæ calidum.	ibid.
		pulvis ad ardorem urinæ, renum & vesicæ.	ibid.

INDEX

Pulvis elegans in passionibus re-
 rum, vesicæ, & ardore urinæ. ib.
 Pulvis ad idem in magno dolore
 & mictu sanguinis. ib.
 Pulvis expertus in ardore urinæ.
 ibid.
 Pulvis sanguinis restrictius in
 vulnere. ibid.
 Pulvis ad idem fortior. ibid.
 Pulvis sanguinem stringens. ib.
 Pulvis ad idem. ibid.
 Pulvis ad idem expertus. ibid.
 Pulvis ad idem. ibid.
 Pulvis exsiccans & sigillans su-
 perficiem vulneris, cutimque
 generans. ibid.
 Pulvis alter ad idem. ibid.
 Pulvis herniosorum elegans &
 stipticus, vel consolidans conti-
 nuus. 430.
 Pulvis ad elongationem vulvæ.
 ibid.
 Pulvis in tenasmo & dysente-
 ria intestinorum. ibid.
 Pulvis restrictius sanguinis. ib.
 Pulvis stipticus. ibid.
 Pulvis expertus multoties ad a-
 perendas vias renum & matri-
 cis. ibid.
 Pulvis diureticus. ibid.
 Pulvis alius. ibid.
 Pulvis ad idem nobilis. ibid.
 Pulvis nobilis & expertus con-
 tra calculum. ibid.
 Pulvis ad retentionem urinæ.
 431.
 Pulvis urinam subito prouocās.
 ibid.
 Pulvis valdè odoriferus, qui su-
 pra carbones poni debet. ibid.
 Pulvis ad putrefactionem gin-
 giuarum. ibid.
 Pulvis ad idem. ibid.
 Pulvis ad morsum canis rabidi.

ibid.
 Pulvis ad morsum canis rabidi,
 & præcipuè, vbi iam incipit me-
 lancholizare, & expertum est.
 ibid.
 Pulvis cibalis pro stomacho fri-
 gido. ibid.
 Pulvis contra ebrietatem. ibid.
 pulvis ad idem. 432.
 pulvis ad idem. ibid.
 pulvis expertus contra lepram,
 & omnem sanguinis infectio-
 nem. ibid.
 pulvis papau. communis exper-
 tus ad rubedinem oculorum.
 ibid.
 pulvis cibalis in tympanite. ibid.
 pulvis calidus cibalis. ibid.
 pulvis stipticus ad destillatio-
 nem urinæ. ibid.
 pulvis exsiccans sperma. ibid.
 pulvis ad idem. ibid.
 pulvis ad impregnationem. ibid.
 pulvis pro hepate elegans con-
 fortatiuus, & præcipuè in hy-
 drope. ibid.
 pulvis quo fricantur vesicæ in
 ore vnà cum gargarismate ad
 hoc. ibid.
 pulvis exsiccationis stipticus.
 ibid.
 pulvis contra dolorem matricis.
 433.
 pulvis contra calculum. ibid.
 pulvis elegans ad stomachi de-
 bilitatem. ibid.
 pulvis capitalis qui poni debet
 supra commissuris. ibid.
 pulvis pro mingentibus in le-
 cto. iqid.
 pulvis ad idem. ibid.
 pulvis quod est magnum secre-
 tum ad putrefactionem gingi-
 uarum, & dicitur pulvis de
 Brionia.

E M P I R I C O R V M.

Brionia valens ad quascunque corruptiones cancrasas & vlce- rosas gingivas, & aliarum par- tium corporis humani. ibid.	& corruptionem. ibid.
pulvis ad botium gulæ exper- tissimus. ibid.	pulvis ad stomachum malum & colorem pallidum. ibid.
pulvis experientissimus ad e- gressionem ani & matricis. ibid.	pulvis ad idem. ibid.
pulvis contra pestem excellens. ibid.	pulvis de polypodio solutivus. ibid.
pulvis carminativus. 434.	pulvis de polypodio. ibid.
pulvis cordialis elegans. ibid.	pulvis ad dysenteriam. ibid.
pulvis expertus ad ardorem vri- næ. ibid.	pulvis ad idem. ibid.
pulvis contra dolorem post par- tum. ibid.	pulvis alter elegans ad idem. 436.
pulvis pro fluxu spermatum. ibid.	pulvis ad lienteriam. ibid.
pulvis expertissimus ad epile- psiam puerorum. ibid.	pulvis alius elegans & expertus ad fluxum antiquum & diutur- num. ibid.
pulvis ad exitum ani. ibid.	pulvis elegans in excoriationem intestinorum. ibid.
pulvis expertus ad frangen- dum lapidem in vesica. ibid.	pulvis ad sanguinem fluentem ex ano & vulva. ibid.
pulvis contra morsum scor- pionis, & phlegmaticam fe- brem, item quartanam exper- tus. ibid.	pulvis valdè stipticus pro cly- stere in dysenteria & tenasmo- ne. ibid.
pulvis ad morsum scorpionis nobilis. ibid.	pulvis ad idem. ibid.
pulvis ad occultam ventosita- tem stomachi & intestinorum. ibid.	pulvis ad mixtum sanguinis. ibid.
pulvis carminativus ventosita- tum. 435.	pulvis sanguinem stringens ex- pertus. ibid.
pulvis ad idem. ibid.	pulvis Rhasis carnem generans. ibid.
pulvis ad idem. ibid.	pulvis Lanfranci etiam ad idem. ibid.
pulvis ad grossam ventositatem & grossos humores in stomacho. ibid.	pulvis incarnativus. 437.
pulvis digestionem confortans, inflationem curans, opilationes hepatis & splenis aperiens se- nibus, &c. ibid.	pulvis sanguinem stringens. ibi.
pulvis ad frigiditatem stomachi	pulvis ad idem fortior. ibid.
	pulvis ad idem. ibid.
	pulvis incarnativus stipticus e- legans. ibia.
	pulvis incarnativus. ibid.
	pulvis vulnera consolidans. ibi.
	pulvis ad idem probatissimus. ibid.
	pulvis sanguinem stringens, os- sa consolidans, vnde in affecti- bus yulvarum magnum est se-

I N D E X

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| cretum. | ibid. | Puluis ad eminentiam ⁿ vmbilici. | |
| Puluis in stillicidio vrinæ. | ibid. | ibid. | |
| Puluis expertus in macula oculorum. | ibid. | Puluis mundificans gingiuas. | |
| Puluis expertus in icteritia & hydrope. | ibid. | Pulsus casui & percussioni. | ibid. |
| Puluis qui supra vulnera capitis debet poni. | ibid. | Puluis ad idem. | ibid. |
| Puluis aperitiuus hæmorrhoidarum. | 438. | Puluis ad idem. | ibid. |
| Puluis qui supra commissuram capitis frigidi aspergi debet. | ibid. | Potio secreta in peste, & nulli reuelanda. | ibid. |
| alius ad idem sed in calido. | ibid. | Potio brevis cordialis. | ibid. |
| Puluis ad descensum catharri. | ibid. | Potio excellentissima ad debilitatem neruorum. | ibid. |
| Puluis in dyscrasia calida cordis. | ibid. | Potio experta ad idem. | ibid. |
| Puluis carminatiuus. | ibid. | Potio sedans dolorem ventris post partum. | ibid. |
| Puluis ad idem. | ibid. | potio somnifera in phreneticis. | ibid. |
| Puluis ad oculos valens. | ibid. | potio experta diuretica lapidem frangens in renibus & vesica. | 451. |
| Puluis partum facilitans. | ibid. | potio secretissima ad debilitatem cordis. | ibid. |
| Puluis elegans contra stranguariam. | ibid. | potio ad idem sublimis. | ibid. |
| Puluis stringens fluxum sanguinis immoderatum. | ibid. | potio experta ad confortandum stomachum frigidum. | ibid. |
| Puluis elegans ad sanguinem coagulatum. | 449. | potio imperialis Maximiliani aureis literis in libro suo scripta, inuenta, contra intensum dolorem colicum, quam post primam euacuationem clysteri ieiuno tepidè dabat. | ibid. |
| Puluis ad vertiginem & epilepsiam. | ibid. | potio ad ascensum matricis experta. | ibid. |
| Puluis matricem confortans ad conceptionem. | ibid. | potio diaphoretica. | ibid. |
| Puluis ad idem. | ibid. | potio in hydrope experta quia diuretica est. | ibid. |
| Puluis lac generans. | ibid. | potio nobilis & experta, mundificans vias vrinæ, saniem, arenulam expellens, & menstrua prouocans. | ibid. |
| Puluis expertissimus ad elongationem vuluæ. | ibid. | potio ad scrophulas. | ibid. |
| aliud pulchrius. | ibid. | potio ad idem. | 452. |
| Puluis præseruans à peste. | ibid. | alia ad idem. | ibid. |
| Puluis ad imprægnationem. | ibid. | potio ad matricem frigidam. | |
| Puluis muscatus optimus ad vermes. | 450. | | |
| Puluis alius muscatus ad idem. | ibid. | | |

& humidam. ibid.
 potio Rhabar. de opilatiua hepatis ac viarum vrina excellens. ibid.
 potio in febre acuta loco potus. ibid.
 potio menstrua prouocans breui. ibid.
 potio elegans solutiua in aschite. ibid.
 potio ad imprægnationem. ibid.
 purgatio cholerae. 454.
 purgatio alia ad idem artificialis. ibid.
 purgatio ad inflammationem cholerae & sanguinis. ibid.
 purgatio ad idem. 455.
 purgatio elegans nobilis & artificiosa, itavt nulli sit manifestum. ibid.
 purgatio ad idem elegans. ibid.
 purgatio ad choleram & sanguinem. ibid.
 purgatio elegans ad idem. ibid.
 purgatio elegans sæpè experta in dolore stomachi, intestinorum & tenasmone à materia cholerica. ibid.
 purgatio elegans ad choleram. ibid.
 purgatio alia ad idem. 456.
 purgatio ad sodam phlegmaticam catharrosam. ibid.
 purgatio ad icteritiam. ibid.
 purgatio in tenasmone & dysenteria. ibid.
 purgatio elegans contra phlegma in stomacho. ibid.
 purgatio ad idem pulchra & præcipuè in mixta. ibid.
 purgatio ad Melancoliam. ibid.
 purgatio ad idem. 457.
 alia ad idem. ibid.
 purgatio sublimis ad idem, mul-

toties experta in melancholia euacuanda, & est secretum. ibid.
 purgatio elegans solutiua, experta in melancholia euacuanda. ibid.
 purgatio elegans & artificialis in melancholia. ibid.
 purgatio ad idem. ibid.
 purgatio ad idem. 458.
 purgatio elegans phlegmatis & melancholiae. ibid.
 purgatio elegans. ibid.

S.

Syrupus aperiens oppilationem hepatis, renum dolorem, & febrem mitigans, ac ventositatem in intestinis dissoluens. 461.
 syrupus in febre acuta, siti, lingue ariditate & caliditate, iuuenibus & cholericis cõueniēs. ib.
 syrupus ad idem nobilis, præcipuè in tussientibus. ibid.
 syrupus ad stomachum ventosum frigid. dolorem hypochond. & diaphragmatis, corruptionem appetit⁹, necnō aperitiuus. 462.
 syrupus ad phlegma falsum & scabiem. ibid.
 syrupus in dyscrasia stomachi & laterū vêtosa cū pallore cutis. ib.
 syrupus in omni vehementi inflammatione elegans & nobilis, qui & in peste solennis est. ibid.
 syrupus in caliditate hepatis & febre acuta, variolis aspersis à sanguinis ebullitione ipsius feruorem comprimens, vnde & crijs conueniet. ibid.
 syrupus elegans aromaticus in omni frigida dispositione stomachi, hepatis, & membrorum. ibi.
 syrupus de stœchados ad articulos. ibid.
 syrupus digestiu⁹ phlegmaticis. 463.
 V u u ij

Syrupus nobilis & expertus de
buglossa ad melancholiam dige-
rendam. *ibid.*
Syrupus vulneratorum elegans.
ibid.
Syrupus ad sanguinis corru-
ptionem vt lepra, scabies, & id
genus. *ibid.*
Syrupus ad sanguinem infe-
ctum. *ibid.*
Syrupus ad coitum. *ibid.*
Syrupus ad dyscrasiam capitis
& stomachi frigidam nobilis.
ibid.
Syrupus ad idem, & præcipuè in
subtili phlegmate. *ibid.*
Syrupus ad dolorem capitis me-
lancolicum. *ibid.*
Syrupus secretissimus in ascite,
& præcipuè calida. 464.
Syrupus urinam prouocans, &
eius dolorosum ardorem sedans.
ibid.
Syrupus ad caliditatem hepatis
elegans. *ibid.*
Syrupus contra ardorem urinæ.
ibid.
Syrupus ad scabiem, & ad san-
guinem infectum. *ibid.*
Syrupus ad formicam. *ibid.*
Syrupus elegans & pulcher cer-
tè solutius ad hydropem. *ibid.*
Syrupus ad vlcera pulmonis.
465.
Syrupus ad lapidem renum.
ibid.
Syrupus ad idem laxatius.
ibid.
Syrupus ad quartanam & oppi-
lationem splenis. *ibid.*
Syrupus ad epilepsiam. *ibid.*
Syrupus cordialis frigidus. 466.
Syrupus digerens materiã cho-
lericam in capite. *ibid.*

Syrupus ad materiam grossam
cholericam in capite. *ibid.*
Syrupus ad materiam chole-
ricam adustam in capite exper-
tus. *ibid.*
Syrupus ad phlegma in capite.
ibid.
Syrupus ad phlegma grossum in
capite. *ibid.*
Syrupus de acoro expertissimus
ad dolores iuncturarum. *ibid.*
Syrupus diuinus ad dolorem ca-
pitis oculorum phlegmaticam
debilitatem. *ibid.*
Syrupus excellens & multoties
expertus ad imagines oculorum,
scotomiam & vertiginem. 467.
Syrupus ad catharrum falsum.
ibid.
Syrupus ad materiam falsam in
capite. *ibid.*
Syrupus ad melancholiam &
morbum Italicum solutius. *ib.*
Syrupus potens ad hypofarcam.
ibid.
Syrupus nobilis aromaticus se-
nibus frigidis seu stomachicis.
ibid.
Syrupus elegans in inflatione
magnæ coleræ & sanguinis.
468.
Syrupus nobilis ad idem. *ibid.*
Syrupus ad idem perpulcher &
nobilis. *ibid.*
Syrupus hepaticis, splenetis,
aperitiuus, diureticus ad phleg-
ma valens. *ibid.*
Syrupus pro caliditate hepatis
& icteritia. *ibid.*
Syrupus ad phlegma in stoma-
cho incisius, valens etiam ad
nimiam pinguedinem. *ibid.*
Syrupus senibus dyscrasatis fri-
gido stomacho. *ibid.*

Syrupus nobilis & expertus in caliditate hepatis, febris acuta, variolas afferit à sanguinis ebullitione, ipsum feruorem comprimens, vnde & ebrijs conuenit. ibi.

Syrupus nobilis & expertus ad scrophulas. 469

Syrupus ad botium. ibi.

Syrupus vulneratorius. ibi.

Syrupus ad idem. ibi.

Syrupus expertus ad pectus vulneratum. ibi.

Syrupus contra calculum. ibi.

Syrupus elegantissimus ad idē. ibi.

Syrupus elegans ad idem. ibi.

Syrupus ad idem pulcher. 470

Syrupus ad idem. ibi.

Syrupus in paralyfi. ibi.

Syrupus ad scrophulas elegans. ibid.

Syrupus in lepra expertus. ibi.

Syrupus ad sanguinem infectū. ibi.

Syrupus rhabarb. qui ad ardorem vrinae excellens est. ibi.

Syrupus cui non par inuenitur in frangendo lapide. ibi.

Syrupus aperiens oppilationem hepatis & mezaraicar. 471

Syrupus ad oppilationem hepatis & febris tertianæ, & hepar calid. ibid.

Syrupus phlegma in stomacho & hepate digerens. ibi.

Syrupus stipticus. ibi.

Syrupus ad quartanam & sple. nem. ibid.

Syrupus de plantagine stipticus. ibi.

Syrupus & iua ad paralyfin & dolorem iuncturarum. ibi.

Syrupus ad sputum sanguinis

stipticus.

472

Syrupus aromaticus erga debilitatem stomachi. ibi.

Syrupus & cichorea ad oppilationem hepatis. ibid.

Syrupus ad stomachum & matricem frigidam expertus. ibi.

Syrupus mirabiliter sudorem puocans & sitim sedans. ibi.

Syrupus ad omnia vitia matricis frigida. ibi.

Syrupus ad epilepsiam. 473

Syrupus ad idem. ibi.

Syrupus ad tremorem experientissimus, ibi.

Syrupus ad passiones oculorum. ibi.

Syrupus multoties expertus ad materiam phlegmaticam cerebri, stomachi, & iuncturarum. ibi.

Syrupus ad dyscrasiam capitis frigidam & humidam cum debilitate membrorum. ibi.

S.

Sacculus capitalis. 474

Sacculus pro tinnitu, sibilo, & dolore pungitiuo aurium. ibi.

Sacculus temperatus pro corde. ibi.

Sacculus pro stomacho frigido. ibi.

Sacculus confortatiuus cerebri. ibid.

Sacculus ad tenasmonem. ibi.

Sacculus elegans pro stomacho scuti loco. ibi.

Sacculus cordialis. 475

Sacculus elegans capitalis. ibi.

Sacculus ad idem. ibi.

Sacculus frigidus pro corde. ibi.

Sacculus ad fluxum ventris, cum quo infirmus sedere debeat. ibi.

INDEX

Sacculus capitalis & expertus ad
sibulum & tinnitum aurium ac si
nucis frangantur. ibi.
Sacculus cordialis elegantissi-
mus. ibi.
Sacculus capitalis calidus. ib.
Sacculus alter ad idem. ib.
Sacculus quo nonnulli in peste
vtuntur. 476
Sacculus cordialis. ibi.
sacculus cordialis temperatus.
ibi.
sacculus capitalis valdè elegans.
ib.
suppositorium secretissimum vé-
rositatum carminatiuum, vt in
hydrope & colica. ibi.
suppositorium in sciatica. ib.
suppositorium fortius. ibi.
suppositorium ad tenasmonem.
ib.
spongia somnifera. ibi.

T.

TROCHISCI.

Trochisci ad defectum hepa-
tis & renum calidum appe-
titum prostratum & virtutem
debilem. 477
Troch. contra calefactionem
hepatis & sitim. ib.
Trochisci stomachicis, hepati-
cis laterum & viscerum oppila-
tionem patientibus abindige-
stione & ventositate, vnde & hy-
dropicis conuenit. ibid.
Trochisci hepaticis stomachicis
calidi. ib.
Trochisci Episcopi rigensis ex-
pertissimi in doloribus vesicæ.
ibi.
Trochisci de Benzuin suaui

admodum odoris, tam pro fumi-
gio regum quàm etiam pro fœ-
tore oris. ibi.
Trochisci vt capilli crispi bene.
oleant. ibi.
Trochisci ad idem. ib.
Trochisci de rosis laxatiui.
ibi.
Trochisci de rosis excellentes
laxatiui conuenientes stipticis
& calidis. ib.
Trochisci in tympanite excellē-
tes. 478.
Trochisci ad oppilationem sple-
nis. ibi.
Troch. ad humores grossos ven-
tosos in splene. ibi.
Trochisci ad idem elegantes.
ibid.
Trochisci valdè stiptici. ib.

V.

VNGVENTVM.

Vnguentum expertum ad de-
bilitatem iuncturarum.
ibid.
Vnguentum tum commune ad
omnes plagas malignas & viru-
lentas mundificans sine dolore,
& consolidans. ibi.
Vnguentum de galbano mira-
biliter consolidans vulnera.
ibi.
Vnguentum nihili. 479
vnguentum ad pustulas faciei.
ibid.
vnguentum certissimum ad idē.
ibid.
vnguentum nobile contra pu-
stulas faciei ex morbo Hispano.
ibid.

ibid.
 vnguentum ad scissuram lingue
 ex ariditate. ibi.
 vnguentum ad alep .virgæ exic-
 catium & incarnatium. ibi.
 vnguentum expertum ad sed an-
 dum dolorem hæmorrhoid.
 ibid.
 vnguentum ad idem. ib.
 vnguentum ad idem. ibi.
 vnguentum de ranis ad poda-
 gram. ibid.
 vnguentum sanctum & nulli re-
 uelandum in vlceribus tibiæ
 difficilis curationis a materia ca-
 lida prouenientibus, optimum.
 ibi.
 vnguentum album de cerussa ar-
 tificiali expertum sigillans &
 consolidans superficiem plagæ,
 & cutem generans eo in loco.
 480
 vnguentum nobile ad omnes
 plagas, combustiones, erysipe-
 las, & id genus calidorum mor-
 borum & prauorum affectuum.
 ib.
 vnguentum regis Angliæ conso-
 lidans & incarnans. ibi.
 vnguentum viride mundifica-
 tium & incarnatium optimum.
 ibi.
 vnguentum carnis generatiuū.
 ibid.
 vnguentum ad idem fortius.
 ibid.
 vnguentum ad idem hoc fortius.
 ibid.
 vnguentum ad idem potens,
 nobile & pretiosum. ibi.
 vnguentum ad idem excellens.

481.
 vnguentum ad idem probatum.
 ib.
 vnguentum ad idem proba-
 tum, & est barbitonforis Mon-
 tis pessulani. ibi.
 vnguentum album sigillans su-
 perficiem plagæ, & cutem ge-
 gerans. ibi.
 vnguentum ad remouendam hu-
 miditatem & saniositatem vul-
 nerum. ib.
 vnguentum ad scissuras labio-
 rum expertum. ibi.
 vnguentum carnem generans.
 ibi.
 vnguentum consolidans & cu-
 tem generans. ibi.
 vnguentum ad idem ibi.
 vnguentum exiccans vlcera vi-
 rulenta pulchrum & elegans.
 ibid.
 vnguentum ad dolorem inten-
 sum hæmorrhoid. ibi.
 vnguentum ad remouendam ca-
 liditatem & ardorem vulnerum.
 ibid.
 vnguentum ad remouendam fri-
 giditatem quamcumque vulne-
 rum. ibid.
 vnguentum ad remouendam
 siccitatem omnem vulnerum.
 482.
 vnguētū m ad escharas optimū,
 ibid.
 vnguentum supra anthraces.
 ibi.
 vnguentum carnis generatium,
 ibid.

INDEX

- Vnguentum ad idem nobile. ibi.
Vnguentum expertum in contractione neruorum. ib.
Vnguentum frigidum percussium. ib.
Vnguentum percussium mitigans ad idem. ib.
Vnguentum vt crustę cadant, dolorem quoque mitigans. ibi.
Vnguentum percussium ad idem. ibi.
Vnguentum stomachale calidū. ibi.
Vnguentum elegans certè & pulchrum. 483
Vnguentum ad sodam calidam. ibi.
Vnguentum ad idem expertum ibi.
Vnguentum nobile & expertum ad excoriationem ani, ob nimiam equitationem. ibi.
Vnguentum ad dolorem. ibi.
Vnguentum ad materiam frigidam. ibi.
Vnguentum calidum capitale. ibi.
Vnguentum in formica miliari expertum. ibi.
Vnguentum ad dolorem capitis, sed in declinatione. ibi.
Vnguentum optimum ad idem. ibi.
Vnguentum ad idem optimum. ibi.
Vnguentum somniferum. ibi.
Vnguentum ad duritiem quę remansit in membro post restorationem fracturę eam duritiem leniens. ibi.
Vnguentum ad duritiem splenis. ibi.
Vnguentum contra vermes. ibi.
Vnguentum ad maciem renum. ibi.
Vnguentum ad destillationem vrinę stipticum, ibi.
Vnguentum ad coitum. ibi.
Vnguentum optimum ad idem. ibi.
Vnguentum nobile ad dolorem hæmorrhoid. ibi.
Vnguentum ad pruritum ani. 485
Vnguentum ad neruos. ibi.
Vnguentum de corticibus castanearum valens ad immoderatū fluxum menstruorum & dysenteriam. ibi.
Vnguentum ad remotionem escharę in combustione ignis. ibi.
Vnguentum defensuum optimum. ibi.
Vnguentum frig. ad excoriationem factam in coxis ab acuitate vrinę. ibi.
Vnguentū pro vermibus vsuale. ibi.
Vnguentum ad idem nobile. ibi.
Vnguentum ad idem probatum ibi.
Vnguentum de Tuthia expertū ad vlcera virgę. ibi.
Vnguentum ad pruritum digitorum. ibi.
Vnguentum ad sanguinem è pectore emanantem. 486
Vnguentum ad sciaticam. ibi.
Vnguentum ad faciem mundificandam. ibi.
Vnguentum ad coitum. ibi.
Vnguentum somniferum. ibi.
Vnguentum dolorem & tumorem hæmorrhoidarum sedans. ibi.

Vnguentum

Vnguentum ad dolorem & scissuras ani. ibid.
 Vnguentum pro splene duro ventoso in materia mixta. ibid.
 Vnguentum ad hepar calidum. ibid.
 Vnguentum ad dolorem magnum renum & lumborum. ibid.
 Vnguentum expertum ad scissuras manuum. 487.
 Vnguentum ad confortandas iuncturas extenuatas. ibid.
 Vnguentum contra calorem hecticorum, si bis in die vngatur spina dorsi. ibid.
 Vnguentum hæmorrhoid. constrictiui. ibid.
 Vnguentum siue linimentum ad defœdationem faciei, maculas rubeas, panum, lentigines, impetigines. ibid.
 vnguentum pulchrum ad exco-riationem narium à catharro falso. 488.
 Vnguentum in calculo optimum. ibid.
 Vnguentum ad spasnum, paraly- sin, neruorum contractionem ex repletionem, factis tamen anteà euacuationibus & balneis diaphoreticis. ibid.
 Vnguentum sanguinis restrictiui. ibid.
 Vnguentum ad vulnus & puncturam neruorum. ibid.
 Vnguentum ad vlcera gingiuarum. ibid.
 Vnguentum certum & nobile ad scabiem, tineam, scabiem fœdam, & vniuersaliter omnem cutis fœditatem. ibid.
 Vnguentum ad idem. 489.
 Vnguentum ad idem. ibid.

Vnguentum ad hypofarcam expertum. ibid.
 Vnguentum resolutiuum in materia calida. ibid.
 Vnguentum ad leprosos. ibid.
 Vnguentum ad morphæam. ibid.
 Vnguentum ad combustionem ignis mirabiliter consolidans & exiccans. ibid.
 vnguentum ad idem expertum, & præcipuè aquæ, ignis & olei. ibid.
 vnguentum nobile & dignum ad plagas difficilis curationis. ibid.
 vnguentum nobile & magnum secretum in consolidanda cute, & omni vulnere malo. 490.
 vnguentum vtile ad tineam. ibid.
 vnguentum probatum ad alopeciam. ibid.
 vnguentum certum & verum Hugonis contra paraly- sin & contractionem neruorum. ibid.
 vnguentum ad spasnum & paraly- sin. ibid.
 vnguentum ad idem optimum Hugonis. 491.
 vnguentum pretiosum ad duritiem quæ remansit post fracturam cœlium aut dislocationem. ibid.
 vnguentum ad capillorum regenerationem, & cutis perfectam mundificationem. ibid.
 vnguentum mirabile ad remouendum dolorem, vbicumque fuerit. ibid.
 vnguentum ad spasnum expertum. ibid.
 vnguentum ad idem nobile, valens quoque in paraly- si. ibid.

INDEX EMPIRIC.

vnguentum ad remouenda frusta ossium corrupta. ibid.
 vnguentum ad idem. ibid.
 vnguentum stipticum stomachale, quod valet etiam ad fluxum album matricis. ibid.
 vnguentum ad idem. ibid.
 vnguentum ad idem & alias humiditates. 492.
 vnguentum ad generationem pilorum. ibid.
 vnguentum ad dolorem capitis calidum. ibid.
 vnguentum ad idem. ibid.
 aliud ad idem. ibid.
 vnguentum nobile ad idem. ibi.
 vnguentum somniferum. ibid.
 vnguentum ad dolorem & durtiem hæmorrhoidarum. ibid.
 vnguentum pro splene. ibid.
 vnguentum pro hepate temperatum. ibid.
 vnguentum pro vermibus. ibid.
 vnguentum stomachale. ibid.
 vnguentum pectorale. 493.
 vnguentum pectorale temperatum. ibid.
 vnguentum bonum ad lūbricos. ibid.
 vnguentum aliud pro vermibus. ibid.
 vnguentum de semperuiuo, valens in febribus acutis, & renibus multum calefactis. ibid.
 vnguentum appropriatum scissuris manuum in hyeme. ibid.
 vnguentum mitigatiuum doloris in combustionē ignis. ibid.

vnguentum ad idem. ibid.
 vnguentum ad pustulas totius corporis. ibid.
 vnguentum ad dolorem renum. ibid.
 vnguentum ad impregnationem. ibid.
 vnguentum calidissimum contra apoplexiā & paralyfin. 494.
 vnguentum ad dealbandam faciem, & remouendas lentigines, & phlegma falsum. ibid.
 vnguentum ad rubedinem & lentigines faciei. ibid.
 vnguentum ad fluxum sanguinis per anum. ibid.
 vnguentum pulchrum ad vermes. ibid.
 vnguentum elegans anodynum ad renum dolorem. ibid.
 vnguentum ad omnia genera vermium expertissimum. ibid.
 vnguentum ad omnem dolorem calidum oculorum. 495.
 vnguentum de Anthera stipticum. ibid.
 vnguentum ad debilitatem stomachi & malam digestionem. ib.
 vnguentum pectorale. ibid.
 vnguentum stomachale stipticum temperatum. ibid.
 vnguentum expertum ad paralyfin & laxitatē neruorum. ibid.
 vnguentum ad torturam oris elegans. ibid.
 vnguentum magistrale officinarum cuiusdam chirurgi Dominici.

Indicis Empiricorum Finis.

INDEX RERVM ET
VERBORVM PRÆCIPVE
MEMORABILIVM IN HOC OPERE
CONTENTORVM. SYLLABA OF. SIGNAT
numerus sequentem inuestigandum esse in
Officina.

A.

A Bacus Supputatorius. 13.	adeps vulpis. 517.
14.	adipum ablutio. 63.
Abominationes quarundam re- rum. 18.	adiantum verum. 254.
Absynthium Romanum anto- nicum. 339.	adiantum vulgare. ibid.
Acacia gummiſſua male depi- cta apud Mathiolum. 427.	adianti vires. 255.
Acacia. 86.	adiobolon. 449.
Acacia succoſa. 428.	Ægyptij omnes, medici. 326.
Acanthus ſeu branca vrfina. 251.	agrioti in potulentis multum inter ſe diſcrepant. 183.
Acanthi deſcriptio. vires. ibid.	arugo. 496.
Acerbus ſapor. 47.	aruginis qualitates. 497.
Acetoſa. 376.	aruginis vſtio. 77.
Acetum calidum & frigidum. 187.	as. 495.
Acetum ex vino vapido produ- citur. 242.	aris vires. 496.
Acetum gelu non conſtringitur. ibid.	as vſtum. 495.
Aceti qualitates. ibid.	æthiopis herbæ mira virtus. 16. 31.
acetum ſcilliticum vt fiat. 73.	ætites. 486.
achates. 485.	agallochum. 308.
achores capitis quomodo ſa- nentur. 220.	agaricus. 278.
acidus ſapor. 46.	agaricus præſtantiffimus. 279.
acorus. 293.	agarici vires. ibid.
adamas nullius in medicina v- ſus. 478.	agnus caſtus. 363.
additione præparantur medi- camenta. 59.	agripalma non rectè cardiaca dicta. 13.
	agryota ceraſorum ſpecies. 96.
	ahenum quid, of. 7.
	alabaſtrites. 487.
	albamazemer Arabum quid ſit. of. 135.

albus color.	174.	alumen.	463.
albus color quomodo paretur.		aluminis differentia.	ibid.
174.		aluminis vires.	464.
alcta.	250.	aluminis vstio.	77.
alchamor Arabum quid sit.	232.	alumen scissum & plumbeum	
Alchindus scripsit de gradibus		quâ differant.	530.
medicam.	58.	alyssum quid sit. of.	207.
alembicus.	98.	amara raro in eclegmatibus	
alembici multiplex acceptio. of.		exhibentur.	184.
II.		amarus sapor.	6.
alembicus rostratus cæcus re-		amaritudo multiplex.	45. 46.
pentius. of.	13.	ambarum griseum.	69.
alexipharmaca.	535.	ambra quomodo adulteretur.	
alexiteria quæ dicantur Græcis.		162.	
II5.		amethystus.	485.
alimentum quid.	5.	ammi vnum ex 4. seminibus ca-	
alimentum quodnam sit prohi-		lidis.	266.
bitum.	5.	ammi pro sifone vsurpatum.	
alimentum medicamentosum.		ibid.	
ibid.		amomum plantis incognitis an-	
alimentorum qualitas inexplica-		numeratum.	267.
bilis notatur.	18.	amomi triplicem effigiem ex-	
alimenta quæ diutissimè conser-		hibet Clusius.	ibid.
uantur.	64.	amomum Dioscorideum Cre-	
alkanach Arabum quid sit. of.		ticum Plinii.	ibid.
348.		amomi vires.	ibid.
alkekengi.	369.	ampelitis.	460.
alkool Arabibus quid signifi-		amphora mensura.	141.
cet.	113.	amuletum Cardani.	28.
aloes facultates.	15.	amuletorum duo genera.	24.
aloe ad aizoa spectat.	37.	amuleta ex mineralibus.	32.
aloe cur abluitur.	62.	amuletum impium.	29.
aloe quanam melior.	152.	amuleta prohibita & derisa.	
aloes descriptio.	276.	30.	
aloes differentia.	ibid.	amuletum ridiculum.	28.
aloes vires.	ibid.	amygdalæ.	420.
alliotica medicamenta.	37.	amygdalæ amaræ vis.	10.
alliotica quæ.	119.	amygdalæ moderate sunt ca-	
Aloysius Cadamustus optimè		lidæ.	181.
sâguinem draconis describit.		amygdalatum quomodo paran-	
431.		dum.	181.
alphenicum.	214.	amygdalata Lutetia vstatis-	
alterantium medicamentorum		lima.	ibid.
dosis. 145. 167. althæa. 250.			

amylum quî fiat.	110. 111	nea.	157
amyrberis Auicennæ of.	50	antiballomena multa recensentur.	159. 160
ana. quid significet.	140	antidotus ἰσθδεος.	2
anacatharsis quomodo mouenda.	82	antidotus analeptica.	222
analeptica præsidia.	172	antidotum asyncutum.	224
anax quæ auis sit.		antidotus Mithridatis.	249
anas pontica venenis alebatur		antipatheia rerum.	9
514		antispodium.	503
ἀντισποδικόν medicamentum		anus quæ verbis matrices releuant.	29
38		anymæ & caucamū conueniunt.	
Andræas Laurentius Syrupum descripsit exhilarantem.	67	430	
androsenum.	351	aparine quid sit. 430. eius vires.	383
anemone 26. eius differentia. vires.	332	aphronitum quid sit. 465.	
anethum.	360	466.	
anethi vires.	359	apium & apios differunt.	
angelica antiquis incognita		258	
320		apium hortense.	ib.
angelicæ vires.	ibid.	apocroustica medicamenta.	38
Anglorum & Normanorum potus.	183	apomeli.	106
anima pro Sale Epicureis.		apomelitis optima descriptio.	
96		76	
animalia animalibus medentur.	506	apophlegmatismorum vtilitas à materia.	185
animalia in officinis seruanda of.	29	apophlegmatismorum forma & descriptio.	186
animalium partes seruandæ of.		apozemata quomodo fiant.	
ibid.		34.	
animalium excrementa seruanda of.	ibid.	apozematum materia & effectus.	
animalia multa sono & cantu delectantur.	30	177	
animalia tria bene olent.	519	apozemata veterum quomodo distent à syrupis.	178
anisum.	264	apozema & vnde.	177
anodyna medicamenta.	38	apozema aperitiuum.	178
anodyna multiplicis generis.		apozema ad bene feruorem con-	
119		temperandum.	ib.
anser quæ auis.	513	aqua aluminosa quibus confect	
antalum quid sit.	530	86	
antiballomena latinis Succeda-		aquæ bonitas quo dignoscatur.	
		107	
		aqua communitatis.	211

INDEX

Aqua calcis.	486	dem.	
Aqua carnis.	174	aqua fontana melior.	ib.
Aquæ Cephalicæ quatuor.	155.	aquæ potabilis qualitates.	240
& 18.		aquæ cisterninæ curius salubres.	ib.
Aquæ Cordiales duodecim,	155. 0.	aqua optima quæ.	bid.
18.		aquæ solo haustu quidam recrea-	
Aquæ cardiacæ of.	18	ti diu vitam protraxerunt.	259
Aquæ Alexiteræ.	ibid.	aquæ medicatæ arte paratæ.	
Aquæ hepaticæ.	ibid.	376. of.	
Aquæ Spleniticæ.	ibi.	aqua Theriacalis.	ibi.
Aquæ Nephreticæ.	ibid.	arbor quid.	16.
Aquæ Cosmeticæ.	ibid.	arbor punica.	405
Aquæ Ophthalmicæ.	ibi.	arbor dysentericæ.	299
Aquæ pectorales.	ibid.	arbutum quid.	10
Aquæ specificæ of.	19	Arcana artis non detegenda.	139
Aquæ Communes.	ib.	Archangelica.	320
Aquæ extinctionis Auri.	79	Archigenes de castorei vsuscri-	
Aquæ quantitas in decoctis pa-		pstilibrum.	518.
randis.	ibi.	arcule of.	8.
Aquæ Spadenses.	63	aresta bouis.	324
Aqua contra calculum.	378. of.	argentum.	493
Aqua vitæ seu Elixir.	214. 242	argentum viuum extinguitur	
Aquæ medicatæ.	20.	salua hominis ieiuni.	493
Aqua ad gonorrhæam.	379. of.	aristolochia Dioscoridi triplex.	
Aqua Naphtæ.	405	348	
Aqua aluminosa magistralis.		arnoglossum plantaginis spe-	
213.		cies.	373
Aquæ destillatæ in officina ser-		aromata cardiaca sunt.	45
uandæ.	17	aromata calida sunt.	93
Aqua quomodo educatur per		aromata vterum recreant.	196
descensum.	99	aromaticum rosatum.	194
Aqua vtilissima.	238	aromatizatio.	93
Aqua Ophthalmica.	377. of.	aromatum humectatio.	66
Aqua omnibus elementis anti-		artemisia.	340
quior.	239	asa fœtida differt ab assa.	432
aqua communis.	379. of.	asa fœtidæ vires.	413
Aqua ad Epiphorum & oculo-		asarum.	348
rum ruborem.	289. of.	asparagi ex arietum cornibus de-	
aqua Calcis.	ib.	fossis prodeunt.	259
aqua fortis.	ib.	aspalatus.	308
aquæ comptoriæ.	ibid.	asperfione quando vtendum.	
aqua rerum omnium principium.		209	
239.		asperum quid.	45
aqua & ignis vitæ principia.	ibi.	assa quid sit.	432

afflatio quid sit & quomodo fiat.		balneo ex sanguine humano Ele-	
74.		phantiasis an curetur.	202
afflationis commoda.	75	balsamum olim in Iudæa.	303
atramentum futorium.	461	balsamum Peruvianum & de To-	
attriplex. eius vires.	253.	lut non est legitimum.	304
attagen.	515	balsamum quid sit.	295
attritio quid sit Syluio.	71	balsamum paratu facile & optimū	
auellane.	419	296.	
aves ex arboribus.	8	balsamum falso Guidoni tribu-	
angiles siue Turchesa.	485	tum.	297. of.
auiculæ Cypreæ.	223	balsamum Hollerij 297 vires. 298	
avis bouem euehens.	10	of.	
aurichalcum.	501	balsamum Fallopii.	ibid.
auripigmentum.	472	balsamum medicorū Florétino-	
auripigmenti vstio.	77	rum.	299. of.
aurum.	492	balsamum Euonymi.	ibi.
aurum non fit potabile.	ib.	balsamum vulgare.	300 of.
auri vires.	ibid.	balsamum mirabile.	301. of.
auri vsus in medicina of.	20	basis medicamentorum.	134
austerus sapor.	417	Bauderonius artis pharmacarię	
axungia quomodo differat ab a-		studiofissimus.	234
dipe.	512	Bauhinus librum edidit de absyn-	
axungia anatis.	514	thiis.	339
axungia anseris.	513	bdellium.	449
axungia gallinarum.	515	behen vtrumque. 295 vires. 296	
axungia suis.	512	bellericus marinus.	529
axungia viperæ.	536	belzoinum.	321
axungia Vrsi.	513	ben quid sit.	188. of.
B.		benedicta laxatiua of. 126. Cur	
B Aaran herba mira.	7	sic dicta vires.	127
bacce Juniperi.	424	benjuinum.	441
baccæ Lauri.	423	berberis.	418
balneum cur vsurpatum. 201. 202		Bernardus Dessennius notatur	
balneorum formæ variæ.	97	of. 48	
balneum Mariæ.	96	beryllus.	466
balneum siccum.	97	bes quot contineat vncias.	139
balneum roris.	ibid.	beta 253. eius vires.	ibid.
balnea Romani habebant in de-		beta Romana.	74
liciis.	202	betonica.	341
balneorum superba structura.		bezeardica Arabibus quid signet	
ibi.		of. 205.	
balneorum vtilitas.	ibid.	bismalua.	250
balneum sordidum Celtiberorū.		bitumen.	465
201		bituminis differentia.	466

INDEX

bitumen vitiatur pice mista.		cadus seu metretas mensura	
63		141	
blatta bizantia.	830	cepa marina.	328
bolus Armena 458. vires.	459	Cæsaris milites ex potu fontis	
bolus quid 186. præparatio. ib.		cuiusdam dentes amiserunt.	
bombyces quæ animalia.	543	389	
borax.	461	calamita.	445
bouchetum rusticorum.	184	calamita. eius differentia.	338
bouchetum à quibus fiat. ibi.		calamus aromaticus.	294
boues sine cornibus.	516	calcanthi vstio.	77
bouis astragalus lienem minuit.		calcis ablutio.	63
21		calcinatio.	78
branca vrsina.	251	calchantum	461. 462
Brasauoli ridiculus labor.	178	Calecutanæ arboris fecunditas	
brassica.	379	8	
brassica contrarias habet facultates.	10	calefacientia exotica.	291
brassica marina.	290	calefacientia indigena.	313
bretânica commendatur ad stomachacem.	381	calefactio. eius vtilitas.	80
brutorum odia.	9	calida calido loco nata deteriora.	52
borraginis descriptio. 249. vires		calida primo gradu, secundo, tertio, quarto.	56
ibid.		caliga Hippocratis of.	11
borrago semper virens.	250	calx. cruda & cocta.	489
buglossum à bubulæ linguæ figura dictum.	249	Cambyses rex Medicinæ amans.	
buglossi historia ibidem. vires		2	
ibid.		campanæ seu alembici of.	12
bugula.	375	cancrî 534. vires.	535
bulbus coronarius aut medicinalis. vires.	329	cancrorum pulvis of.	207
bulcalis compositionis penidiorum author of.	214	cancrorum vstio of.	321
butyrum.	516	candelæ odorata.	233
butyrum quomodo atteratur.		cantharides.	540
71		cantharides vesicam exulcerant.	
byssus quid.	542. 543	18	

C

C acabus of.	8
Cadmia lotio & præparatio.	
62. 77.	
cadmia. eius differentie.	501

caphura quomodo terenda.	69
caphuræ differentia.	444
caphura venerem falsò remorari credita.	ib.
caphuræ adulterium.	162
capillares herbæ quæ.	253. 154
capillus veneris ubi frequentius reperiatur.	254
capilli veneris descriptio, vires.	
ibid.	

capitella

capitella of.	12	catagmatica medicamenta.	40
capitis lotio.	208	cataplasmatum nomen, formula.	215. 215
capræ dictamni vsum ostenderunt.	343	cataplasma ex pane cibario valet ad omnia.	216
capruncula of.	15	cataplasma malacti cū anodynū.	215
caput pituitæ sedes.	227	catapotia 3. off.	
caput purgia.	195	catapotiorum incommoda.	185
capparis.	360	catenarum aurearum decoctio inutilis.	171
caranna.	442	catharticum medicamentum.	16
carbunculorum differentia.	480.	37	
vires.	481	cathartici aliquod genus deleterium.	16
cardamum seu cardamine.	301	cathartorum odor ingratus. ibidem.	
cardamomum.	ib.	cathartorum infusio.	65
cardiaca. 755. vires.	756	catharticum liquidum citius ducit.	168
cardiaca specifica.	24	cathartica selecta & probata. of.	11;
cardumeni differt à cardamomo.	351	catheretica medicamenta.	40
carduus benedictus.	355	Catholicum polyceotum off.	169
carya.	415	caucamum differt à lacca.	429
caryophyll.	301	caules cynaræ conditi of.	102
carminatiua semina.	265	caules lactuæ conditi of.	101
carnium decoctio cū pulueribus mala.	171	causæ compositionis medicamentorum.	102. 103
carnium syntherimata.	173	cauterium ad herniam.	122
caro vulpis.	517	cauterium Sericeum Parei.	223
Carolus Quintus Chynar. Rex vtebatur ad arthritidem.	312	celeniabim quid Arabibus.	108.
Caron.	266	Celtiberorum balneum sordidum.	201
carpobalsamum.	303	centaurium maius & minus.	359.
carthamus medicis enicum appellatur.	279	centinodia.	374
caryocostium. of.	131. 132	cephalica.	23
caryophylli inodori quomodo fragrant reddantur.	162	cera quid sit. 454. vires.	45
cassia.	297	cerasa præstantissima quæ.	411
cassia brasiliensis potentiùs purgat vulgari of.	115		
cassia nomine stirps triplex designatur.	273		
cassia primū ab Arabibus usurpata.	ibid.		
castonada quid sit.	245		
castoreum quid.	518		
castor: eius testiculi morsus ibid.			

INDEX

cerasa cōdita.	96	cholagoga mēdicamenta quid sint.	37
ceratum quid sit.	127. 138	cholagogi descriptio.	168
ceratum quantum olei recipiat.	128	chondrilla.	263
ceratum refrigerans Galeni.	339	Christophorus Acoſta macerem optime deſcripſit.	299
ceratum Santalium.	340	Christophorus Georgius ſcripſit in Meſuem of.	27
ceratum ſtomachicum.	341	chryſele ctum	482
ceratum æſypalum.	342.	chryſocolla.	461
343		chryſolitus.	482
cerealια multa ad ſegetes referuntur.	388	chryſolampis.	486
cerebella paſſerum venerem excitant.	75	chyliophyllum.	390
ceronea & cerata quid ſint.	127.	chymici pyrothechniam illuſtrant.	83
128		chymistarū opinio de purgatrice facultate.	19
cerui-capra animal ex quo trahitur bezaar.	526	chymica remedia non negligenda.	60
ceruſa quomodo fiat.	499	chymicis remediis quomodo utendum.	ibid.
ceruſæ præparatio 77. 500. lotio.	62	chymicorum extracta.	88
ceruus.	511	Chyna radix.	312
ceterach. vires.	255. 256	cicera rubra.	386
chalaſticum medicamentum.	38	cicera ad medicamentum. piſa ad alimentum referuntur.	
chalciteræ uſtio.	77	ibidem,	
chalcus ponderis genus.	498	cichorij multæ differentiæ.	
chalybs.	62	264	
chalybis lotio vulgaris.	208	cicuta libidines compeſcit.	
chalybis ſpagyrica præparatio of.	349	5	
chamedrys.	289	cicuta cibus ſturmis, mors homini.	10
chamædaphus.	288	oidoniatum craſſum Lugdunenſe of.	10
chamælea.	356	cinefactio.	78
chameleon.	350	cineritium of.	12
chamæpitis.		cinis cancrorum. proprietas.	18
characterum eximia virtus.		cinnabaris Dioſcoridis differt à cinnabari recentiorum.	473
characteres medicina dæmonum Paracelſo apozemata hominum.	177	cinnabaris quatuor differentiæ	474
characteres terræ lemnia.	485		
cheme meſura quædam.	141		

R E R V M.

cinnabaris artificialis.	473	cohobatio quid.	100
cinnamomum tempore Galeni		colatoria of.	11
valde rarum. 298. vires.		colatio quid sit, quibus perficia-	
ibid.		tur.	91
Cinnamomi varia nomina.		collyriorum duo genera, materia,	
298.		vsus.	211
cinnamomum quibus modis a-		collyrium Eleisir.	212
dulteretur.	162	collyrium Lanfranci quale sit.	
cinnamomi aqua of.	377	ibid.	
circulatio quid.	10	colocynthis.	287
cistus mas & fœmina.	452	colocynthis quomodo terenda.	
citonia condita of.	99	69	
citoniatum.	406	color.	94
citrium serpentibus inimicum.		coloratio medicamentorum.	
404		95	
citrulli.	261	commosis.	455
clareta multiplex of.	377	compositionis medicamentorum	
clarificatio quid sit. quot modis		causæ 103. finis.	137
fiat.	93	compositiones Alephanginæ of.	
clymeni vis.	6	226	
clysmus siue clyster.	199	compositione non vtendum cum	
clysterum vsus frequens. ibi-		simplicia suppetunt.	102
dem.		concha mensuræ genus.	141
clyster carminatiuus.	200	condita liquida.	112
clyster ad apoplexiam.	201	conditorum materia.	188
clysteres qui pinguia admittunt		conditum cordiale.	ibid.
validiùs purgant.	200	conditura cur fiat.	111
cochlearium minimorum men-		conditura medicamentorum.	
sura.	140	96.	
cochlearium materia of.	7	confectio de rebecha of.	212
coctionis tempus.	74	confectio alkermes of.	215
coctionis medicamentorum or-		confectio de hyacintho of.	217
do.	ib.	confectio de baccis lauri of.	
coctio medicamentorum quid		220	
sit.	72	confectio hamech. of.	128
coctionem leuem aut longam		confectio hamech maioris of.	
quæ requirant.	73	129.	
coctio difficilis indicat trituram		confectio diastomoma of.	299
difficilem.	70	confectiones colicæ of.	118
cocula vel cassoleta quid sit.		confectura penidiorum quid sit	
222		of.	61
cælum & solum mutant qualita-		confecturæ siccæ quæ fiant 99. of.	
tes simplicium.	156	122. of.	

INDEX

confricatio quid sit.	71	stris.	259
congrus.	141	cortices quomodo ficcentur.	83
conseruæ recentes insolantur.	80	cortices in officina asseruandi of.	7
conserua quomodo fiat.	110	cortices arantiorum iuniorum	
conserua rubra. sicca.	111	Citrriorum. quomodo condian-	
conseruæ of.	86	tur of.	99
conserua violarum of.	86	coru arbor Indica.	408
conserua Tussilaginis quid sit of.		cornu viros.	409
conserua rosarum of. quid sit.		cosmeticonum studium.	113
88. 89		costus amarus & dulcis.	294.
conserua hispidulæ, seu æluropi.		cranium hominis valet ad Epi-	
ibid.		lepsiæ.	522
conserua buglossi quid sit of.		crassa & viscera quomodo per-	
90		colentur of.	10
conserua borraginis.	ibid.	crassum quid.	44
conserua calendulæ of.	91	craticula seu locus of.	12
conserua florum Cichorij of.		creta.	60
92		cribra of.	9. 10
conserua Nenupharis.	ibid.	cribratio.	89
conserua anthos of.	93	cribrum quid.	89
conserua betonicæ of.	94	cribrationis modus varius &	
conserua saluiæ, melissæ, stœcha-		multiplex.	90
dos.	ibid.	cruciata.	322
conserua florum maluæ quomo-		crux cerui quid sit.	523
do fiat of.	95	crystallus quid sit 487. vires.	488
consolida regia.	265	cubebæ.	302. 303
contrario cuique suū est contra-		cucufa.	213
rium.	1	cucufæ capiti sunt peculiares.	227
contrariæ qualitates in eadem		cucumer agrestis.	451
planta.	9	cucumer asininus aut sylue-	
corallium.	472	stris.	287
cordumeni pro cardamomo Syl-		cucumer sylvestris aut satius.	260
uio vsurpatum.	266	cucurbitæ & citrulli non nisi co-	
coriandrum 359. vires.	360	cti comeduntur.	261
cornu monocerotis.	524. 525	cucubitarum differentiæ qua-	
cornu- musæ of.	13	tuor.	260
cornua quomodo ceruis primū			
oriantur.	511		
cornua quomodo mollescant.			
84.			
corruda siue Asparagus Sylue.			

eculeus mensura.	141.	cundis qualitatibus.	ibid.
cultrorum varietas of.	5.	delicatuli purgantia auersantur.	
cumium duplex, vires & descri- ptio.	265	186.	
cupressus.	421	denarius.	139
cuscuta.	257	dens leonis.	263
cyathus.	141	densum quid.	44
cyclamen.	327	dentalium.	529
cynara.	356	dentes quibus vitijs obnoxii.	
cynocrambe.	252	229.	
cynoglossum.	373	dentifriciorum variæ formulæ.	
cynorrhodon seu rosa canina.		229	
268.		dentiscalpia ex lentisco optima.	
cyperus.	319	443.	
cythi ægyptiacum vocabulum.		despumatio quid sit.	92
of.	225	destillata cur sic dicta.	171

D.

D Acrydium scammonium est castigatum.	284.	destillatio per insudationem.	100.
dactyli.	415	destillata per inclinationem.	ibid.
dæmones duobus modis aduo- cantur.	25	destillatio per descensum.	99
Darii balsamum.	2	destillatio in fumo.	ibid.
daucus nomen tribus plantis commune.	68	destillatio quid sit.	96
dauci vires.	ibid.	destillatum restauratiuum opti- mum.	171
decoctio catenarū aurearū.	171	destillatum valdè cardiacum.	172
decoctio communis Medicinæ.	166	detractioe præparantur medi- camenta.	59
decoctio absolute præscripta quibus fiat.	165	Deus omnia in pondere, nume- ro & mensura creauit.	141
decoctionis pectoralis descri- ptio.	166	Diaboli stercus.	433
decoctiones tres valde vsuales.	167. 165.	diabalzemer seu Costuarium seruatum of.	134. 135
decocta præstāt aquis destillatis.	17. of. 165.	diacassia. 114. vires. 115. of.	
decoquenda quæ multum aut parum.	165	diachylon. 346. 347. of.	
defrutum quid.	109	diachylon magnum. 347. 348. of.	
delectus medicamentorum.	43	diacinnamomum.	201. of
delectus medicamentorum ab odore.	45	diacodium veterum. 32. of.	
delectus medicamentorum à se-		diacodii loco syrupum de papa- uere habemus. 49. of.	
		diamargaritum frigidum Pla- tearii. 186. of.	

INDEX

diamaargaritum magistrale. 187
 of.
diambra. 190. 191. of.
diaphœnicum seu confectio de
 dactylis. 121. 123. of.
diaprunum compositum seu la-
 xatium. 120
diaprunū seu *diadamaſcenū* ſim-
 plex. ibid.
diapalma. 462
diapasma. 216
διαπυστικόν medicamentum. 39
diaphylion. 124. of.
diarrhodon Abbatis. 195 of.
diasulphur. 469
διαφωστικόν medicamentum. 38
dictamnū. 343
digestio. 67. 101
digitus pro vncia uſurpatus. 114.
dyoniſia gemma. 486
dissolutio quid ſit. 82
dissolutio non ſit niſi cum hu-
 more. 85
dissoluuntur varia in varijs li-
 quoribus 29.
doloris vehementia deſperatio-
 nis interdum parens. 118.
doronicum quid ſit. 188. of.
doronicum romanum vulgare.
 354.
doſis quid ſit. 167
doſis alterantium medicamen-
 torum roborantium. 167. 145.
doſis calidorum in quarto gradu
 uſitata. 157
doſes compoſitorum è ſimplici-
 bus educendæ. 157
doſis cathartorum varia. 167.
doſis determinata eſt cuilibet
 medicamento. 157.
doſis medicamentorū varia. 167
doſis medicamentorum pur-
 gantium. 144
doſis medicamentorum pro cæli

& ſol natura immutanda. 145
draco marinus. 159
dragina. 139
dropax quid ſit, quomodo fiat.
 219.
duella ſexta pars vnciæ. 141
dulcedo multiplex. 13
dulcia medicamenta ſalubria. 49
dura quæ. 84
durum quid. 45
dyuari quid Arabibus ſignificet.
 48. of.

E.

E*Bulus* ſambuco ſimilis. 280
Ebur. 523. vires. 524.
ebur non rectè uſur. atur pro
ſpodio. ibidem. 147. of.
ebur quomodo emolliatur. 84.
eccoproticon medicamentum.
 37.
eccoproticon non ſemper caſ-
 ſiam habet pro baſi. 187
eclegmatum uſus. 184. 114
eclegma quid. 114
eclegmatum compoſitio & con-
 ſeruatio. 114
eclegmata in rem præſentem
 imperata. 184
eclegmata conueniētia aſthma-
 ticis. 114
eclegma ſanum & expertum. of.
 110.
eclegma ſcilliticum. of. 108
eclegma de pulmonibus vulpis.
 of. 109
eclegma de pineis. of. 111. 112.
ἐκφρακτικόν medicamentum. 39
edulia à medicis excogitata.
 58.
elaphoboſcum. 260
elaterium quomodo parandum.
 87.
electio medicamentorum quo-
 modo faciendæ. 43

electum.	470	emplastrum medicamentū nul-	
electuaria liquida. sicca.	116	lum simplex.	133
electuaria amara diutiùs conser-		emplastra quomodo fiant.	345.
uantur.	117	of.	
electuaria solida.	144. of.	emplastrum diacalciteos.	462
electuarium de gemmis.	189. of.	emplastrum de mucaginibus.	
electuaria hamech.	128. of.	349. of.	
electuarium de ouo.	210	emplastrum de Meliloto.	350.
electuarium regium.	189.	of.	
electuarium iustum ad quid v-		emplastrum de ranis.	265. of.
tile.	147	Empirici fraus & astutia.	529
electuarium rosatum.	134. of.	empiricorum suffitus vitandi.	
electuarium sennatum.	135. of.	234.	
electuarium lenitium.	115. of.	emulsionum vsus multiplex.	189
electuarium catholicum.	117. of.	emulsio ad pulmonum vitia &	
electuarium valdè purgatorium.		renum ardorem.	180
114.		ἐναιμὸν medicamentum.	39
electuarium diacarthami.	144.	endiuiā hortensis.	263
of.		enemata proluūt aliquando me-	
electuarium de succo rosarum.		dia & superiora intestina.	201
146. of.		enula campana.	319
electuarium de citro solutium.		ephemerum Colchicum nostras.	
148.		282.	
elephantiasis an sanetur balneo		epithematū materia.	207
ex humano sanguine parato.		epithematū ad varios morbos,	
202.		variæ formulæ.	207
elephantis dentes.	-24	epulotica medicamenta.	40
elephas describitur.	523	eridium quid sit.	104. 325
elixatio quid sit.	73	errhinorum materia.	195. 196
elixationis multiplex vtilitas.	74.	error paruulus non pertimes-	
embotum quid sit.	204	cendus.	143
embroche ad lethargum.	209	eruca. herba salax.	356
embrochatio quid sit, & vnde		eruca nomen insecti.	ibid.
dicatur.	208	ernum.	387
emetica medicamenta.	37	erysinum.	16
emollientia quatuor commu-		erythrodamum.	324
nia.	250	escarotica medicamenta.	40
emollientes herbæ.	155	essentia medicamenti quid sit.	
empasmata.	216	412.	
ἐμπλαστικὸν medicamentum.	39	esula rusticorum rhabarbarum,	
emplastra quibus inseruiant.	130	281	
emplastrorum conficiendorum		esula Dioscoridi peplus.	281
modus.	scopus.	euaporatio.	101
129		eupatorium.	377
emplastris humiditas aduersa.	130		

I N D E X

euphorbium.	441	ferula cibus asino, mors equo.	
euphorbium difficile tritatur.		10.	
442		figus.	414
euphrasia.	358	figus indica.	7
exaltatio.	101	figura quid valeant.	26
ex angue senecta.	2	figuris vim tribuunt Pythago-	
excrementa animalium Medi-		rici.	ibid.
cine inferuentia.	518. 520	filtratio quid sit.	91. 92.
exhalatio quid.	101	folæ.	15.
exhilarantes Medicinæ.	91. of.	fissio.	72
exotica non sunt prohibenda.		flos aris.	496
expressio quid.	86	flos solis.	464
exprimenda prælo quomodo.		flores cordiales tres præcipui.	
præparanda 9. of.		&c.	248
extinctio.	179	flores quomodo siccantur.	
extractio.	87.	85.	
extracta Chymicorum.	88	flores ex quibus aquæ & olea	
extractum quomodo parandum.		trahuntur.	268
ibid.		flores ex quibus conferæ pa-	
extractum pilularum.	89	rantur.	116
extractum Rhei.	89	flores in Officina seruandi. of.	
F.		17.	
F aba inuersa.	372	florum quantitas in medica-	
facultas medicamentorum		mento componendo.	148
purgantium vnde promanat.	169	florum diuersitas.	12
facultas medicamenti quid.	15.	florum ad radices proportio in	
42. quotuplex.	ibid.	oleis.	248. of.
facultas purgatiua.	17	florum infusio.	65.
facultas occulta. 18. eius variæ		fœnum græcum.	385
appellationes.	20	fœniculi descriptio.	259
facultatis occultæ exempla.	22	foliorum conditura.	100. of.
facis vini vitio.	76	folia adianthi condita.	ibid.
Faunij Poëtæ versus de ponde-		folia tussilaginis condita.	101
ribus.	138	foliorum varietas in plantis.	
fasciæ lanæ Pyramidales ob-		11.	
longæ. 11. of.		fomenta sicca.	2. 8
fermentatio quid sit.	81	forma medicamentorum quid	
fermentatio Chymicorum.	81	præstet.	137
Fernelius descriptionem docuit		formica.	541.
syropi de Althea.	390. of.	formulæ remedium expertæ	
ferrum. 497. vires.	498	scribebantur in templo Æscu-	
ferrum magnetis alimentum.		lapij. 1. of.	
152.		fornacis structura.	97
ferrugo.	498	fornax turrata.	12. of.
		fornax	

fornax tripes ac vulgaris. 11. of.
 fossilia. 457.
 fossilia signis Zodiaci respon-
 dentia. 491
 fetus quomodo differat ab em-
 brochatione. 209
 fotuum magna vtilitas. 206
 forus differunt ab epithemate.
 207.
 fractio. 72
 fragaria. 381. 382.
 Franc. Rabelesius manigraphus.
 478.
 fraxinus antipathiam habet cum
 serpente. 363
 friabile. 44
 frigida primo, secundo, tertio,
 quarto gradu. 56
 frixio quid differat ab assatione.
 75.
 frontaliū formulæ variæ. 214
 fructus arboris dracunculum
 gerens sub cortice effigiatum.
 431
 fructus numero & pondere mē-
 surantur. 148
 fructus in Officina necessarii. 17
 of. 461.
 fructuum conditura. 96. of.
 frutex. 10
 fumaria. 358

G.

G Agates. 471
 galanga. 293
 galbanum. 433. 434
 Galeni pater mel amarum habe-
 bat. 165
 Galenus putrefactionem in fu-
 mo docuit. 81
 Galenus laudat ptisanam hor-
 deaceam. 182
 gallæ. 424. vires. 425.
 gallia. 243
 gallinæ medicæ. 515

gallina. 515
 gallina contrarias habet faculta-
 tes gallo. 172
 gallinacei decoctum. 10
 gallion. 383
 gargarismata. 179
 gelatina. 175
 gelatina ex cornu cerui. 176
 gelatina citoniorum. 100. of.
 geleniabin seu mel rosatum.
 78. of.
 gemmæ marianæ. 519
 gemmarum tritura. 69.
 genista. 361
 geni stella. ibid.
 genitale cerui. 511
 gentiana. 322
 gentianella. ibid.
 geranium. 353
 geranium moschatum. ibid.
 Germania duo naturæ monstra
 peperit. 177
 gerfa quid. 333. of.
 girasola vel lapis solaris. 486
 glans subdititia. 198
 glessum. 470
 glutinis multa varietas. 520
 glycyrrhiza. 326
 Gonerius pharmacopæus lau-
 datur. 611. of.
 gonorrhœa duplex. 240
 Gorraus reprehenditur. 189
 gossipium. 384
 gradatio quid. 101
 grad^o cuiusque tres partes. 15. 57
 gradus facultatum. 17
 gradus medicamentorum. 55
 gradus secundarum qualitatum. 57
 gradus medicamentorum qua-
 tuor. 56
 graminis quadraginta sex diffe-
 rentiæ. 326
 gramen Canarinum solum me-
 dicatum. 326

INDEX

granadilla flos passionis.	22	herbarum historiae scriptores.	
grana paradisi.	301		238
granatum.	405	herbarum quantitas in medica-	
grauellata seu grapole.	453	mento componendo.	148
granum omnium ponderum ini-		herbæ quomodo mensurentur.	
tium.	138		140.
graue quid.	44	herbarum repositio.	150
grossula rubra. 50. of.		herba Roberti.	353
guajacum.	67. 311	herba salinaris.	317
gummi Arabicum.	427	herba venti seu anemone.	332
gummi ammoniacum.	428	herba sanguinem purgans.	55
gummi elemi.	442	hermodactylus.	282
gummi seu resinæ.	425	herba quid. 117. 138. of.	
gummi resinæ.	427	herba picra Galeni. 117. 139. of.	
gummi quid.	ibid.	herba picra cum agarico. 140. of.	
gūmi quomodo extrahuntur.		herba Pacchii. 141. 142. of.	
87.		hiera diacolocynthidos. 142. of.	
gummi in officina seruanda.	17	Hippocrates solis simplicibus	
gummorum infusio.	65	medicamentis medebatur.	102
gummi hederæ.	435	hippoglossum seu laurus Ale-	
gypsum.	488	xandrina.	60
gyrini quamnam infecta.	533. 534	hippolapathum fœniculi spe-	
H.		cies.	260.
H æmatites quid.	485	historiæ animalium scriptores.	238
halosanthos quid.	467	historiæ abominationum rerum	
halmiragia.	468	quarundam.	18
hedera.	435	historia de Smaragdo Regis Hū-	
hederæ vires.	10	gariæ.	479
hedipnois.	261	historiæ variæ de hydrargiro.	475
helictica medicamenta.	38	historia cuiusdam Rustici.	313
helenium.	319	historia Elephantici casu sanati.	
helleborus albus & niger.	285.	historia de Metrodori filio.	
287.		historia Capitolii ab anseribus	
helxine seu parietaria.	252	seruati.	512
hernina.	141.	historia herbæ sāguinē purgātis.	
hemiomitis alia est à scolopen-		hominis encomia.	237
drio.	256	homo diuersis morbis obnoxius.	
hepatica.	377	ibid. 4.	
hepatica specifica.	24	homo compositus ex Elemētis.	6
hepatorium differt ab eupato-		homines cornuti. 524. hordea.	517
rio.	377	hordeum.	388
Heraclitus vocabat Sacrificia		hordeum Indicum equis delete-	
medicamenta.	177	rium.	ibid.
herba.	11	hordei qualitas.	182

hordeatum quid.	175	iaspis.	485
hordeati præparatio.	182	ibiscus.	251.152
hormium.	245	ieteri miranda curatio.	31
hormium distinguitur ab orual-		ictyocolla.	520. 521
la.	344	ignis calore quæ exsiccat. 85	
hortorum suburbanorū insalu-		ignis in destillatione qualis.	97
bria dlera.	52	ilicum multiplex varietas.	305
humectatio medicamentorū.	66	imaginationis vis.	33
humor frigidus & crassus tar-		imbutio quid Syluio.	62
diūs purgatur.	145	immutatione præparantur medi-	
humores singulis catharticis du-		camenta.	59
cuntur.	168	Imperatores medicamenta præ-	
hyacinthus.	48	pararunt.	2
hydragoga medicamenta.	17	incurabilia sunt quæ ab igne non	
hydragogum eximium.	136. of.	curantur.	222
hydragyri differentia. qualita-		infectio seu tinctura.	67
tes.	447	infusio quæ complectatur.	66
hydrargyrosis periculosa.	476	infusionis vsus.	65
hydrargyrus monstrū naturæ.	475	insipidus.	48
hydromelitis nomine quid in-		insolatio quid sit.	80
telligendum.	160. 106	instrumenta Officinæ vtilia vel	
hydromel rusticorum.	ibid.	necessaria.	4. 5. of.
hydromel vinosum simplex.	76.	insulæ ex puro ambaro visæ.	470
of.		intestinum lupi valet ad colicum	
hydromel vinosum quomodo		dolorem.	63
fiat.	80	intibum.	42. of. 263.
hydromel vinosum Anglorum		intinctus viridis.	86
& Germanorum.	77. of.	Ioannes Robin Botanicus Re-	
hydromelitis vinosi vires.	76. of.	gius.	244
hydrofaccharum.	184	Ioannes de Tornamyra syrupū	
hyosciamus.	370	analepticum descripsit.	66. of.
hyosciamus cibus & venenū.	10	iombarda.	571
hypercathartica medicamēta.	37	Iosephus pharmacie amans.	3
hypericum.	30	iris	318
hyperici floris vis.	128	iris nostra à Florentina multum	
hypnotica medicamenta.	38	differt.	156
hypocaustum.	205	iridium & graminum infinite va-	
hypocistis.	452	rietates.	150
hypoglottides siue Moschardi-		irrigatio medicamentorum.	66
ni.	192	irrigatione quando vtendū.	209
hyssopus.	352	Italica lues cur Gal. dicta.	178. of.
		iuiubæ.	414
I.		iulep quid.	170
Iacobus Carpensis hydrargy-		iulepi & syrupi vix dissimilis.	
ro primus vtitur.	476		
ialappa.	278		

I N D E X

apud Arabes acceptio. 170
iulepos potiones omnes limpi-
das vulgus vocat. ibid.
iulepi dosis. 171
iancus marinus. 490
iuniperus. 423
iuris gallinacci præparatio. 173
iura colatitia quibus fiant. ibid.
ius decrepiti gallinacci 172
ius carniū. 9. of.
ius spatulæ veruecinæ. 174

K.

KÆiri. 332
κολλιτικὸν medicamentū. 40
kerines. 304

L.

LAc. 517
lac caprinū multum alit. 174
lac virginale quī fiat. 213
lacca differt à Caucamo. 429
laccæ tres differentia, 430
lactuca. 260
lactuca interficit vt cicuta. 4
lactucæ semen quibus morbis
salutare. 262
lactuca syluestris. 263
lacus bituminosi. 466
lacus Asphaltites. 466
lacryma plantarum. 429
lacryma cerui. 511. 523
lacryma oleæ Æthiopica
lacrymę quomodo extrahantur.
88.
ladanum. 452
lagna. 14. of.
lagnæ ferri albi. 15. of
lapathum vulgo patientia 376
lapathum sanguineum. 377
lapathi facultates. 16
lapides in variis hominum mē-
bris reperti. 528
lapides pretiosi in officina ser-
uandi. 20. of.
lapides medicati. 478

lapis Armenus. 483
lapis cyaneus siue lazuli. ibid.
lapis bezaar. 526
lapis calaminaris. 501
lapis herculeus. 483
lapis hystericus. 32
lapis Iudaicus. 486
lapis Nephriticus. 32. 486.
lapidum vstio. 76
larix. 278
laserpitium. 432
lateres. 490
laudanum. 182. 183
lameola. 289
lameolæ præparatio. 65
laurus. 423
laurus à fulmine non tangitur.
423.
lecythi. 15. of.
lentiscus. 443
lentum quid. 44
λεπτοτονικὸν medicamentum. 39
lepus cornutus candidus. mini-
mè hermaphroditus. 510
libellus Galeni de occultis facul-
tatibus. 18
libra medicorum 138. 139.
libri improbatæ lectionis com-
burendi 25
lignum aloes. 308
lignum Nephriticum. 309
lignum rosaceum. 308
lignum Rhodinum. ibid.
lignum Sanctum. 311
ligulæ mensura quędam. 141.
ligusticum. 320. vires. 321.
liliorum genera multa. 270
limæ. 404
limatio. 72
limonium. 404
linctus. 114
linimentum ad pleuritidem. 209
linimenti variæ formulæ. 210
linum. 385
liquatio. 81

liquiritia.	326	maiorana.	334
liquor plantarum.	427	malabathrum.	306
lithargirium.	505	malactica medicamenta.	39
lithontripticon.	202	mala armeniaca.	410
lithontriptica medicamenta.	38	mala aurea.	409
lithontriptica in quibus dissol- uantur.	82	mala citonia.	406
lithospermon.	347	mala insana.	367
litus.	209	mala persica quomodo condian- tur.	99
lohoc Arabibus quid.	114	mala persica aliò translata vene- num deponunt.	411
lohoc incidens, concoquens, ca- tharrum sistens.	185	maleficiati.	27
lohoc pro clysteribus.	115	malicorium.	406
lotio quid.	61	malua vnde dicta.	258
lotio in quibus quomodo fiat.	61	maluæ descriptio & differentia.	
lotionis effectus.	62	ibid.	
lotio primus præparationis gra- dus.	61	mandragora, figmenta de ea cir- cumferantur.	366
lotionum variæ formulæ	208	maniot radix. cibus & venenum.	
lues Indica ab Italis aduecta of.		51	
177		manipulus quid.	140
lues Indica suffitu nonnumquam curatur.	232	manna secundum medicos quid.	
luis venereæ origo of.	336	247	
lumbrici in quibus generentur.		manna de folio præstantior. ibid.	
539		manna Calabriensis.	ibid.
lumbrici terrestres.	540	manna Brianconiensis.	ibi.
lupinus.	387	manna mastichina.	ibid.
lupulus.	380	manna hebræorum.	ibid.
lyncurius lapis.	470	manna thuris.	440
		manus Christi perlata of.	180
		marathrum fœniculi species.	259
		margaritæ.	527
		marmeladæ.	191
		marmor	487
		Marfi & Psylli.	35
		marrubium.	341
		maspetum	432
		mastiche gummi-resina.	443
		materia medica ex quibus desu- mitur.	238
		materia vnguëtorum & empla- strorum eadem.	344
		matricaria.	350
		maturatio.	101

M

M Acer falsa scripsit de sa-
phyro. 480

macer ligni cuiusdam cortex.
299

macis quid. 228.299

maceratio quid 67

magnes. 483

magnetis differentia. 484

magnes alio iustus ferrum non
trahit ibidem.

magnetis vires. ibid.

magydaris. 432

INDEX

maturatio est coctio naturalis. 73
 mazapanis vel marci panis con-
 fectio. 190
 mechoacam radix. 278
 Mechubales erāt doctores Caba-
 listæ. 26
 medica materia valde ampla
 medicamenta quæ ex animalibus
 desumuntur. 506
 medicamenta quare purganda.
 59
 medicamenta actu talia per se.
 55
 medicamenta Deorum manus.
 2
 medicamenta quæ intrinsecus
 induntur 195. quæ extrinsecus
 admouentur. 201
 medicamēta occulta proprietate
 iuantia. 21
 medicamenta quæ purgant tra-
 hendo, comprimendo, lubrican-
 do. 21
 medicamenta sex simplicia valde
 commendantur ad luis Indicæ
 curationem. 311
 medicamenta adulterata. 192. 163
 medicamenta cur aromatizētur.
 41. 94
 medicamenta recentia quando
 meliora. 51. vetusta quando
 etiam meliora. 51
 medicamenta roborantia. 185
 medicamenta purgantia vſu pro-
 bata. 113
 medicamenta quædam magna
 cautione præscribenda.
 medicamenta quando mutanda.
 151
 medicamenta quæ diutius con-
 ſeruantur. ibid.
 medicamenta comprimendo pur-
 gantia qualiter eligenda. 44
 medicamenta partes quasdam

respicientia. 23
 medicamenta certis partibus no-
 xia. 16
 medicamenta exacte acria pes-
 sima. 49. acria & amara minus.
 48
 medicamenta dulcia saluberri-
 ma. 49
 medicamenti purgantis dele-
 ctus. 42
 medicamenta quomodo asser-
 uentur. 149
 medicamenti quantitas naturæ
 viribus respondeat. 143
 medicamentum idem quomodo
 varios promat effectus. 144
 medicamenti describendi primæ
 leges. 135
 medicamentorum forma quid
 præstet. 136
 medicamentorum quantitas spe-
 ctanda. 142
 medicamentorum odor cur ven-
 trem aliquando ducat. 142
 medicamentum simplex sæpe
 tres habes facultates. 16
 medicamentorum differentia à
 loco. 53
 medicamentorum purgantium
 delectus à facultatibus sump-
 tus. 53
 medicamentorum purgantium
 duo genera. 54
 medicamentum compositum fa-
 cile admittit substitutionem 156
 medicamenta composita in offi-
 cina seruanda of. 22
 medicamenta purgantia similitu-
 dine substantiæ humores attra-
 hunt. 20
 medicamenta vſitatissima. 238
 medicamentorum ab effectu de-
 nominatio. 37
 medicamentorum alterantium &

R E R V M.

parantium descriptio.	234
medicamentorum diuifio. 5. dif- ferentiæ.	14
medicamenti & alimenti diffe- rentia.	5
medicamentum benignum & ma- lignum.	41
medicamentorum neceffitas.	132
medicamentorum compositio- nem quis primus docuit.	133
medicamentorum basis quomo- do eligenda.	134
medicamentorum gradus.	456
medicamentorum fumptuofa cõ- fectura fæpe vana.	137
medicamenta topica.	243
medicamētis quibus modis vta- mur.	195.
medicamentis validis aut beni- gnis qui egeant.	145
medicamenta cur componuntur.	103
medicamentorum purgantium dofis.	144
medicamenta quomodo iudican- tur. 84. quare ficcentur.	85
medicamenta meliora & præftan- tiora.	153
medicamentorum delectus ex fa- poribus.	48
medicina cur longa.	1
medicinæ encomium.	ibid.
medici dij Tutelares: deorum filij.	2
medici iuniores in quibus peccēt.	135
medici panificium docuerunt.	58
medici odoramētis vti debēt.	230
medicorum error notatur.	116
medicus quis.	25
medici Monfpeffulani celebres.	III.
medicis ob amiffas formulas in- terit dolore.	133

medicinæ exhilarantes of.	91
medulla ceruina.	511
medullarum ablutio.	63
mel quid.	246
mel quale debeat eſſe	ibid.
mellis qualitates.	ibid.
mellis optimi notæ.	607
mel faccharum rufticorum. ibi- dem.	
mellis vſus ad diuturnitatem confert.	245
mel variorum medicamentorum basis.	75
mel quando per ſe deſpumatur.	92
mel quomodo ex fructibus paran- dum.	108
mel amareſcit coctione nimia.	246
mel compositionem in ſe habet.	ibid.
mel amarum Galeni pater habe- bat.	105
mellis vſum qui primi docuerūt.	ibid.
mel vim habet conſeruandi.	105
mel omnibus antidotis poteſt ad- miſceri.	ibid.
mel anacardinum quâ fiat.	86
mel mercuriale of. 108. 252.	80.
mel roſatum foliatum of. 108.	79
mel violatum of.	79
mellis anacardini varia præpara- tio of.	82
melancholiam quæ ducant.	169
melanteria.	352
melanthicum.	ibid.
melicratum, mulſa, & hydromel vnum & idem ſunt.	76
melilotus trifolij genus.	385

INDEX

meliterium vas in quo mel fuit repositum.	328	molle quid	45
melissa.	340. 341	mollia quæ.	48
melepepones.	260. 261	mollitio fit duobus modis.	84
men siue Menin.	360	mollia piscis.	521
mensis philosophicus Chymico- rum.	81	molybdæna.	494
mentha. eius differentia.	337	moneta prima ex ære, vnde ara- rium.	495
mentastrum ibidem Mercurialis.	252	monoceros an detur.	510
merisæ, cerasa sunt syluestria.	411	monocerotis historia.	515
mespilum pomum.	404	Monspeliensis ager multis simpli- cibus luxuriat.	111
metallorum nomen. numerus.	491	Monspessulani medici celebres ibidem.	
materia.	491	mora.	413
metalla quibus planetis affinia.	491	morbus omnis habet suum con- trarium.	5
metalla quomodo liquantur.	83	morbi quibus verba auxiliantur.	267
metallica vt abluenda.	62. 64	morella.	368
meteglum Anglorum quid sit.	77	moriendi necessitas.	237
of.	77	morus. eius differentia.	412
mezereon planta venenata.	288	moschardini.	192
mezerei præparatio.	65	moschi adulterium.	162
miles Turca fert in zona victum menstruum.	64	moschus.	518. 519
millefolium nomen multis plā- tis commune.	390	moschus quomodo seruetur.	111
mineralia. eorum vsus. differen- tia.	457	mucaginis vsus.	210
mineralia quæ seruanda of.	20	mucago ad inflammationem.	210
mineralia omne genus medica- mentorum suppetunt of.	20	mulier lapidata quod verbis me- deretur.	29
miniosa herba.	8	mulsa quid eadem cum melicra- to of.	76
minium.	474	mumia quomodo reperta.	508
minutæ species seplasiariorum.	67	mumia antiquorum nulla.	509
mirobalanorum nutritio.	21	muria.	466
mithridatij virtus.	213	mustellæ maioris excrementa moschum redolent.	519
Mithridatis memoriæ studium.	212	mustum quid.	246
antidotus.	213	myreccum aut oleum pigmenta- tum.	261
mithridatium Damocratis.	212	miriophyllum.	390
mithridatium Andromachi.	213	myrobalanus.	275
mithridatium Nicolai Præpositi.	314	myrrha. 441. vires.	448
modius.	141	myrtidanum.	389
		myrtus	

myrtus.
myna citoniorum.

ibid.
100

oculus catti. 487
odontica specifica. 24
odor quid. 42
odor in plantis. 13

N

N Acra perlarum.

528

napha.

466

napus.

331

narcotica.

119

nardus.

307

nasalia.

195

necromantici primi.

25

nenuphar.

269

neotericorum in inueniendis
remediis sedulitas.

167

nephriticum lignum.

8

nerualia specifica.

24

Nicolaus Alexandrinus. 22. of.

Nicolaus Florentinus idem qui
& Præpositus.

39. of.

Nicolaus Præpositus aliis malè
præponitur.

23. of.

nigella.

352

nitrum.

464

Normanorum potus.

183

notis Romanis vtendum in præ-
scribendis medicamentorum
formulis.

140

nouæ Eduliorum præparationes
quatenus commiscendæ.

178

nuces conditæ.

308. of.

nuces conditæ vt non nigrescât
98. of.

nucum & amygdalarum præpa-
ratio.

64

nux moschata vel myristica.

299

nux plantis inimica.

21

nux vomica animalibus noxia.
21.

nymphaea.

269. 270

O.

O Bolus.

139

Occultæ facultates.

17

ochia.

460

odorata quædam tertio gradu
calida.

130

odoramenta quomodo præscri-
bantur.

130

odoratis quomodo vtendum.
ibid.

odores qui grati.

230

odores vnguentorum nomine
comprehenduntur.

303

oesypus.

521

Officinæ pharmaceuticæ digni-
tas.

1. of.

Officina quo in loco erigenda,
quæ in ea spectanda.

2. of.

Officina asscribus instruenda.
4. of.

Officina hypocaustū habere de-
bet.

ibid.

oinomel. 76. of. 106.

ōyos vnde.

240

oleum quid.

416

oleorum extractio.

88

oleum alimentum & medica-
mentum.

123

oleum cur emplastrorum con-
fectionem ingrediatur.

130

olea educta per ascensum &
descensum.

135

olea Veteres vnguenta nomina-
bant.

135

olea quibus vasis seruanda. ibid.

olea simplicia vel composita.
245. of.

oleum absolutè positum de quo
intelligatur.

ibid.

oleum multifariam ablui solet.
249 of.

olea quæ quouis tempore pa-
rari queunt.

262. of.

olea quæ ex animalibus conz

I N D E X

ficiantur.	269. of.	251. of.	
olea expressione educta.	275. of.	oleum Rutæ.	256. of.
olea raro parari solita..	278. of.	oleum rubellium.	472
oleum anethinum.	255. of.	oleum sulphuris.	469
oleum Acopum. 67. amygdala-		oleum scorpionum. 538.	271. of.
larum & auellanarum.	276. of.	oleum sampluchinum.	256. of.
de absynthio.	254. of.	oleum sambacium seu de iasmi-	
oleum benedictum.	294. of.	no.	156. of.
oleum cyprium.	258. of.	oleum Tartari.	453
oleum croci.	264. of.	oleum violatum.	246. of.
oleum de capparibus.	266. of.	oleum vulpium.	273. of.
oleum de castorio.	272	olibanum.	440
oleum chrysomelorum.	278. of.	oliuæ muria ac sale conditæ quo-	
oleum cydoniorum.	260. of.	modo appellantur.	417
oleum ex calco.	488	olla.	15. of.
oleum ex euphorbio.	266. of.	omphacium quid.	243
oleum formicarum.	274. of. 541	omphacii qualitates & vsus.	
oleum hypericonis simplex.	257. of.	ibid.	
oleum hyperici magis compo-		onix.	481
situm.	ibid.	Ononis vel oinone.	324
oleum primum.	248. of.	opalus.	485
oleum keirium.	247. of.	ophiogenes.	35
oleum de lateribus.	490	ophites seu serpentium marmor.	
oleum liliorum simplex.	252. of.	487.	
oleum lumbricorum.	269. of.	opiatarum appellatio amplissi-	
oleum muscillinum.	295	ma.	118
oleum de mentha.	254. of.	opiatarum materia.	186
oleum myrtinum.	259. of.	opiata cordialis stomachica ce-	
oleum myrtillorum.	ibid.	phalica.	188
oleum moschellinum.	267. of.	opiata Neapolitana.	218. of.
oleum mastichinum.	263. of.	opiata Salomonis.	ibid.
oleum nenupharinum.	253. of.	opium.	371. 450
oleum nardinum.	263. of.	opium adulteratur meconio.	
oleum nucum.	277	163.	
oleum omphacinum.	244	opobalsamum. 295. of. 303,	
oleum persicorum.	277. of.	opobalsamo liquidambar affine.	
oleum de pomis mandragoræ.		163.	
258. of.		opopanax.	434
oleum rosatum completum.	249	ὀφθαλμικὰ specifica.	24
of.		ordo in descriptione medica-	
oleum rosatum omphacinū vul-		mentorū seruandus.	23. of.
gò incompletum.	250. of.	ordo seruandus in describendis	
oleum rosatum simplex vulgare		formulis.	134
		origanum.	337

ornalla.	344
os de corde cerui.	163. 511. 512.
os Milui piscis aurum trahit.	
21.	
ossa medicata.	512
oua variegata.	516
ouorum vsus.	ibid.
oua quomodo emolliantur.	84
oxalis.	276
ἐξυδογπίστα medicamenta.	40
oxyacantha.	419
oxylapathum.	377
oxymel seu acetum mulsum.	71.
of.	
oxymel scilliticum.	72. of. 74. of.
oxymel compositum & alia multa.	ibid.
oxymelitis qualitas.	107. of.
oxyfaccharum.	47
oximum.	336

p.

P Abulum diuersis animalibus peculiare.	19
pæonia.	323
palumpissa quid.	438
Pallas olei inuentrix.	123
palma.	415
Palmarius scripsit de morbis cirotagrosis.	207
panacea.	321
panacis multa genera.	434
panatella.	175
Panchymagogon medicamen- tum.	37
panes dulciarii.	189
panis bis coctus.	190
papauer.	370
paregoricæ quæ.	119
parietaria.	252
partherium.	350
passula.	417
pastia regia.	112

pastia regia ab opiata non mul- tum differt.	189
patella.	8. of.
patina.	7 of.
peccare in medicina bis non contingit.	161
pendalea. 195. penicilli. 198.	
penidia Arabum quid sit.	32. of.
penidia hordeata cur dicta.	122.
of	
penidia quæ sint; ynde nomen.	
213. of.	
pentapharmacon.	346. of.
pepasticon medicamentum.	39
peponum varietas.	261
perforata.	351
periammata.	24
periammata physica.	33
periapta physica multa.	31
periclymenon.	361
pes catti.	30. of, 384.
peffarii nomine quid intelliga- tur.	196
peffariorum formæ & differen- tiæ.	197
peffus ad mensium acceleratio- nem.	197
peffus ad menses sistendos.	193
petrolæum.	124. 466
petroselinum vulgare.	359
petroselini vires. descriptio.	258
pharmacix definitio.	1
pharmacina in tribus consistit.	2
pharmacopea Augustana.	216.
of.	
pharmacopeoli quidam syru- pum de cassia falsò iactitant.	
45. of.	
pharmacopeus medici manus.	60
pharmacope' tria scire debet.	41
pharmacopeus quibus moribus esse debeat.	34
phlegmagogon.	169
phlegmagoga medicamenta.	37

INDEX

philonium magnum seu Romanum.	227. of.	pilulæ Ruffi, vulgò pestilentiales cornutæ.	154. of.
phœnicobalani.	415	pilulæ Scaligeri.	ibid.
phœnigruus seu synapismus.	219.	pilulæ stomachicæ.	ibid.
picatio quid sit, quomodo fiat.	219.	pilulæ de tribus solutiuis.	156. of.
Pici avis industria.	6	pimpinella.	349
pigmeleum aut oleum pigmentatium.	261. of.	pincolatum optimum.	190
Pijardus Medic. Paris. optimè puluerem Mercurii præparat.	180. of.	pingitis	460
pileolus medicamentosus.	223.	pinguedines Medicinæ inferuientes.	511
pilulæ.	120	pinguedo animalium.	15
pilularum compositio, dosis.	121	piper.	300
pilularum multarum suppressio.	179. of.	pisces multi per imbres deterius se habent.	240
pilulæ quibus officina pharmaceutica carere potest.	148. of.	pissalphaltum.	438
pilulæ de aloë tota.	156	pissoceros.	455.
pilulæ aureæ.	162. 164. of.	pistacia.	419. 420
pilulæ de agarico.	163. of.	pistilla.	6. of.
pilulæ aggregatiuæ seu polycrescæ.	167. of.	pix.	437. 439
pilulæ saieret.	170. of.	plantago.	373
pilulæ alephanginæ.	171. of.	plantarum menstruæ purgationes.	426
pilulæ bechicæ.	122. 192.	plantarum sanguis varius.	ibid.
pilulæ benedictæ.	170. of.	plantarum destillatio.	97
pilulæ coccinæ.	164. of.	plantæ à moscho denominatæ.	519.
pilulæ de eupatorio maiores.	158. of.	plantæ quæ per Antonomasiâ de præstantioribus semper intelliguntur.	153
pilulæ fœtidæ.	175. of.	plantæ quædam contrarias habent facultates.	23
pilulæ de fumaria.	168. of.	plantæ sacchariferæ descriptio.	244.
pilulæ de hiera.	170. of.	Platearii consilium de moscho improbatur.	151
pilulæ de hydrargyro.	177. of.	plumbago.	499
pilulæ de hermodactylis maioribus.	158. of.	plumbi lotio.	63
pilulæ imperiales.	157. of.	plumbi vstio.	312. of.
pilulæ lucis maioris.	160. of.	plumbum.	495
pilulæ de lapide lazuli.	169. of.	plumbum multis modis vritur.	78. of.
pilulæ Mechoacanæ.	174. of.	plumbi halitus cerebro & nervis noxius.	ibid.
pilulæ mastichinæ.	181. of.	podium Arabum fictitium est.	
pilulæ de nitro.	173. of.		

147.	of.	primula veris.	376
pæoniæ vis.	6	priscorum victus ratio.	3. of.
polium.	335	propolis.	455
pollex Pyrrhi lienosis medebatur.	221	propomata.	105
polychrestum medicamentum.		Prosper Alpinus Aspalatum vidit.	308
37.		prouerbium de lotionē.	208
polygonum mas fœmina.	374	pruna.	409
polygonatum.	374	pruna condita.	98
polypodium.	279	prunella.	375
polytrichum, Trichomanes & Callitrichum idem signant.	255	Pseudonardus seu laucndula maior.	307
poma pini.	421	psylli.	35
poma præstantissima.	402	psyllium.	379
pomaceum. 422. quâ fiat. 86.		psyllio nulla deleteria facultas.	
pomada.	33. of.	125. of.	
poma mirabilia.	369	psyllothrū.	220
pomum Medicum.	404	psyllothrū Turcarum.	ibid.
pomorum nomine fructus qui intelligantur.	402	ptisana vulgaris.	182
pomum odoratum.	231	ptisana laxatiua.	183
pompholix.	503	ptisana à Galeno laudata.	152
pompholix lota mordacitatis expers.	63	τοκωτικόν medicamentum.	39.
poncerium.	404	pumicis vstio.	77
ponderum magna varietas.	138	pulegium.	335
porrum.	330	pulmonaria.	375
porphyrites species marmoris.		pulmo vulpis.	517
487.		pulmonica specifica.	24
portulaca.	263	pulmones vulpium quomodo siccantur.	85
potiones rarissimæ debent dari.		pulmonis vulpis præparatio	
43. of.		109.	
potiones quæ ex melle parantur.	105	puluerari pistillo, quæ vix queant.	70
potionum incommoda.	185	puluis suauissimus cyprius violeticus.	231
potus diuinus Ætio quid.	183.	puluis bezaardicus.	527. 204. of.
præcipitatum.	180. of.	pulueres cardiaci quomodo cribandi.	90
præparationes medicamentorum quæ probandæ.	60. 88	puluerum crassities quid efficiat.	137
59.		pulueres cardiaci.	186
pressum caponis.	174	puluis diaireos simplex.	210. of.
priapiscota.	196	diatragacanthi frigidi.	211. of.
priapus cerui pleuriticos iuuat.		diapenidii sine speciebus.	212. of.
21.			

pulvis chyprius violatilis. 113
 pulvis Diamoschi. 191
 pulvis diacalaminthes. 203 of.
 pulvis contra rabiem. 206. of.
 pulvis flauus discutiens. 149
 pulueris leporini vstio. 76
 pulvis laticans. 177. of.
 pulvis plumbi. 70. 312. of.
 pulvis Mercurij. 179 of.
 pulvis pro cuculis. 227
 pulvis rubeus incarnatiuus epi-
 loticus catharticus. 218
 pulvis sternutatorius. 196
 pulvis stibii. 179. of.
 pulueres topici. 217
 pulvis vulnerarius. 112
 purgantia imbecillia quæ. 144
 purgantia meliora. 43
 purgantia forma potabili præ-
 scribuntur. 168
 purgantis medicamenti dele-
 ctus. 42
 purgantium medicamentorum
 dosis. 168
 purgatio medicamentorum. 63
 purgantia ventriculum lædunt.
 144.
 purpureus color. 12
 pyra condita. 92. of.
 pyrethrum. 314
 pyroticum Cardani. 243
 pyroticorum materia. 222. 223

Q.

Qualitates variæ & contra-
 riæ in eodem subiecto. 173
 quantitas medicamentorum. 147
 quantarius. 141
 quercus. 425
 quid pro quo Myropolarū. 157.
 quinqueneruia plantaginis spe-
 cies. 373

R.

Radices quando condiendæ.
 103. of.

radices quomodo siccentur. 85
 radices quo tempore colligan-
 tur. 89
 radices quinqueaperientes. 258
 radices eringiorum conditæ.
 104. of.
 radices enulæ câpanæ conditæ.
 106. of.
 radices satyrii conditæ. 106 of.
 radices symphyti conditæ. 105.
 of.
 radicum aperientium nomine
 quæ intelliguntur. 154
 radicum quantitas in medica-
 mento componendo. 148
 radicum repositio. 150
 radix chinæ. 68
 ranæ. 532
 raphanus. 331
 rarum quid. 44. rara non sunt
 præscribenda. 158.
 ratio. 72
 rastrum in officinis suspensum.
 14. of.
 refrigeratio quid sit. 80
 remora. 32
 resina quid. 427. 436
 resinarum differentia. ibid.
 resinæ quomodo extrahantur.
 87.
 retorta quando in destillatio-
 nibus vsurpanda. 100
 retorta vesica. 98
 Rex Anguinorus.
 Rha peregrino idiomate radi-
 cem significat. 273
 rhabbarum. 273
 rhaponticum differt à rhabar-
 baro. 359
 rhodomel Græcis quid. 108
 rhodomeli. 78
 rhodostactum. 79
 rhus siue sumach. 388
 ribes. 418. 50

R E R V M.

ribes & berberis condita.	96	dictum.	245
ricini descriptio. aues.	290	saccharum rubrum seu spuma	
risagalum.	473	sacchari.	244
Rinierus medicus aulicus nota-		saccharum Madarense quomo-	
tur.	541	do adulteretur.	ibid.
rob Arabibus quid.	109	saccharum candum quo modo	
rob & robub.	82. of.	fiat.	ibid.
rob seu sapa.	83. of.	sacchari panes.	245
rob berberis.	84. of.	sacchari quãtitas in tabellis.	192
rob citoniorum.	85. of.	saccharum rosatum.	88
rob de coruis.	ibid.	sacchari vires.	145
rob ribes.	83. of.	sacculi variis morbis inscruen-	
roboratium medicamentum.	16	tes quomodo parandi.	228
roborantium medicamentorum		sacculi odorati.	423
dosis.	167	sauum caprinum.	512
ros solis.	257	sagapenum.	433
rosa semel virens.	269	sagapenũ , Galbanum & opopo-	
rosarum varietates.	268	nax adulterari non solent.	163
rosata nouella.	219	scilla.	328
rosmarini vires.	363	sal, eius differentia.	464
rostrum porci.	263	sal petræ.	468
rubea.	324	salaces quibus ad Venerem v-	
rubimis.	48	tuntur.	94
rubus. idæus.	403	Saladinus triobolaris scriptor.	
Ruc auis India.	16	122. of.	
Ruellius deceptus in cardamo-		salitura medicamentorum.	95
mo.	302	saluia.	344
Ruffus non inuenit pilulas om-		saluia lita seu trita muraria.	256
nes.	155. of.	saluia romana.	337
rupticum medicamentum.	39	saluia eximiis viribus prædita.	95
rufcus.	260	sambucus.	280
rufma quid.	221	sampsuchum.	334
ruta.	346	sandaracha.	472. 424
ruta muraria.	256	sandarach quid sit.	75
		sandarax differt à sandaracha.	
		473.	
		sandicis qualitas.	77
		sanguis draconis.	431
		sanguis hirci.	509. 203. of.
		sanguis humanus	507
		sanguis humanus magnam vim	
		habet in Medicina.	508
		sanguis leporis.	203. of.
		sanguini purgãdo medicamentũ	

S.

Saccharum quomodo fiat &
vnde aduehatur. 244
saccharum ex arundinacea plan-
ta. ibid.
saccharum antiquioribus inco-
gnitum. ibid.
saccharum quomodo despu-
mandum. 2
saccharum in Ægypto alhazur

INDEX

non dandum.	54	rior.	539
sanguis suillus.	507	scorpio natus in capite cuiusdā	
santali prarubri vt fiant. 193.		ex ozimi odoratu.	336
cf.		scutum medicamentosum.	224
santalium.	308	scutum quid.	225. 226
sapa quid.	83. of. 109	scutum malagmaticum.	225
saphyrus.	479	sebesten fructus in Syria nascēs.	
sapores.	45	413.	
sapores dulces grati.	230	secacut Arabum quid sit. 104. of.	
sapores varii.	13	sectio ad pharmacopæum spe-	
sarcocolla.	435	ctat.	72
sarcocollæ nutritio.	67	secundæ qualitates quot diffe-	
sarcotica medicamenta.	40	rentiis includantur.	42
sarcoticum optimum ex faculta-		selenites.	486
tibus oppositis.	133	semicucupha.	224
sarda.	481	semicupium balnei species. 203	
sardonix.	ibid.	semicupium ad Nephreticum	
sarsaparilla.	311	dolorem.	ibid.
sartago.	8. of.	semina in officinis seruanda. 17	
sassafras quomodo adulteretur.		of.	
310.		semina quatuor frigida. cali-	
satyrium.	329	da.	154
saxolerum.	467	semina calida maiora. 264.	
saxifraga.	347	minora.	266
scammonia differt à scammonio.		semina frigida maiora. 260. mi-	
283.		nora.	262
scammonia succus quomodo		seminum quantitas in medica-	
extrahendus.	284	mento componendo.	148
scammonii optimi notæ.	ibid.	seminum repositio.	150
scarab Arabica vox, syrupum		semiobolus.	135
significat.	104	semperuium.	373
scariola.	263	semperuium maius frigidissi-	
scechacut.	296	um est, minus calidissimum.	
schœnanthum.	306	158.	
scillæ succi extrahendi modus.		senecta anguium.	22
348. of.		senna priscis incognita.	277
scincus animal.	538	senna Arabibus albazemer.	135
scolopendrium.	255	senna quomodo exhibeatur. 277	
scordium.	345	seplasiarius vnde dictus.	3
scoria & plumbago differunt.		sericum.	542
495		sericum non multis viribus do-	
scoria ferri.	498	natum.	216
scorpio.	538	sericum quomodo terendum. 69	
scorpionis ictus quibus dete-		serpillum.	333
		sefeli	

feseli.	321	balsamo.	449
fetaceum quid.	89	stannum.	493
sextarius mensuræ genus.	141	stegnotica medicamenta.	39
sief Arabibus quid.	113	stibium. 499. quomodo sumen-	
sigillum Salomonis.	374	dum.	167
signaturæ spagyricorum vanæ.		stirpes à Regibus nomina ha-	
136.		bentes.	4
siliqua ponderis genus.	138	stirpes perpetuò virentes.	372
silphion.	432	stirpium denominationes à flo-	
simplicia medicamenta quæ sint.		rum varia similitudine extractæ.	
6		12.	
simplicia in pharmacopolio ser-		stirpium diuisio.	
uanda.	16. of.	stirpium sympathiæ & antipath.	
simplicia purgantia.	272	10.	
simplicia refrigerantia.	366	stæchas.	343
stiptica medicamenta.	40	stramonium.	369
Smaragdus.	478	styrax.	445.446
smegma quid sit.	217	subcernicula.	9. of.
smegma roborans. Cephalicū.		sublimatio.	100
smyrnium.	321	substituta quæ mala.	157
solanum.	368.369.8.	subulones qui, & vnde dicti.	
soldanella.	290	511.	
Solis calore quæ exsiccantur.	85	succedanea sine medici consilio	
sorbus arbor.	408	non danda.	158
sparadrap.	374. of.	succedaneis quando vtendum.	
spagyricorum præparaciones.		155. quomodo. ibidem	
60.		succi quomodo extrahantur.	
spargula.	382	87.	
spatularum materia. nomen. 7.		succi in officina seruandi. 17.	
of.		of.	
sperma Ceti.	467	succi quomodo seruentur. 86.	
sperma ranarum.	532	456.	
sphragis seu terra lemnia.	438	succi melliti.	78
spica Indica.	307	succinum.	470
spini-vineta.	50. of.	succorum liquidorum repositio.	
splenica specifica.	24	150.	
spodium vnicum tantum, vide-		succorum tres differentiæ. 426	
licet Græcorum.	502	succus quid.	450
spodium Auicennæ quomodo		succus glycyrrhizæ. 326.453	
fiat.	ibid.	suffitus ad sanitatem.	232
spongiæ.	489. 490	suffitus ad voluptatem. ibidem.	
spuma quid sit.	92	suffitus pro cerebro, pulmone,	
staete quid.	445	mensibus mouendis. 233. ad vl-	
staete substi tui potest pro opo-		cera.	234

- suffitus ad lucem vencream. ibi.
 suffrutex. 11
 suffas Arabibus quid significet.
 113.
 suilli generis temperies. 513
 sulphur. 468
 sulphur pater metallorum. 466
 sumach siue Rhus. 388
 superpurgatio timenda. 143
 supinitas ventriculi nociua. 225
 supellectilia chymica fallacia in-
 strumenta. 5. of.
 suppositoriorum basis. 198. 199
 sydrum. 402
 Syluius gummi multa descripsit.
 425.
 sympathia & antipath. 9
 symphyta. 374
 synapsimus quid sit. vsus. 219
 synapsimum medicatum. 314
 synapi, eius differentia.
 syntherimata quomodo præpa-
 rentur. 173
 syntherimatis mulieres macre
 vt plurimum vtuntur. 173
 syrupus quid. 103. vnde dicatur.
 134.
 syrupus Arabum inuentum. 104
 syrupi quondam neglecti. 68
 syruporum materia. 104
 syruporum vnde tanta varietas.
 ibid.
 syrupi quomodo coquantur.
 104.
 syrupi qui quouis tempore que-
 unt parari. 57
 syrupi descripti secundum or-
 dinem compositionis eorum.
 29. of.
 syrupus acetosæ. of.
 syrupus de absinthio. 1058. of.
 syrupus de agresta seu ompha-
 cio. 51. of.
 syrupus acetatus. 47. of.
 syrupus de artemisia. 63. of.
 syrupus de Althea. 39. of.
 syrupus de borragine. 46. of.
 syrupus de succo buglossi. 45.
 of.
 syrupus Capilli veneris Mons-
 pel. 150
 syrupus capillorū veneris com-
 munis. 36. of.
 syrupus de cassia. 44. 45. of.
 syrupus de cichorio. 41. of.
 syrupus de caryophyllis. 70. of.
 syrupus de cinnamomo. ibidem.
 syrupus citoniorum simplex. 52.
 of.
 syrupus de corallo. 68. of.
 syrupus de dinari. 48. of.
 syrupus de endiuia. 42. of.
 syrupus exhilarans. 67. of.
 syrupus de fumaria simplex. 42.
 of.
 syrupus de fumaria maiori. 43.
 of.
 syrupus de fauis mellis. 76. of.
 syrupus florum persicorū. 25. of.
 syrupus de glycyrrhiza. 43. of.
 syrupus de hispidula seu pede
 catti. 30. of.
 syrupus de hyssopo. 62. of.
 syrupus iuiubarum. 61. of.
 syrupus de lamio seu vrtica mor-
 tua flore albo. 33. of. 318.
 syrupus limonum & granato-
 rum. 51. of.
 syrupus de lupulo. 28. of.
 syrupus mellitus. 71. of.
 syrupus de mentha. 56. of.
 syrupus de moris. 49. of.
 syrupus myrtinus. 55. of.
 syrupus de Nymphaea. 49. of.
 syrupus de papauere. 31. of. 67
 syrupus papaueris erratici. 33.
 of.
 syrupus de pede catti. 384

R E R V M.

syrupus de pomis.	53.of.	theriaca	535
syrupus de quinque radicibus.	38.of.	tela Galteri.	13
syrupus Regius siue Alexandri-		tela catagmatica.	132
nus.	58.of.	temperamenti quot differentie.	42.
syrupus Regis Sabor.	54.of.	tempus colligendi medicamen-	
syrupus resumptiuus.	65.of.	ta.	42
syrupus ribes & berberis.	50.of.	tenue quid.	44
syrupus rosarum siccarū.	57.of.	tepidarium quid sit.	204
syrupus rosarū pallidarū.	29.of.	terebinthus.	439
syrupus rosarū moschatarū.	269	terendi modus varius.	68
syrupus simplex.	170	terræ medica.	458. 459
syrupus rosaceus Rondeletii.		terrachia.	459
ibid.		terra cimolia.	ibid.
syrupus de stœchade.	59.60.of.	terra eretria.	460
syrupus de tussilagine.	26.of.	terra lemnia.	458
syrupus violatus.	24.of.	terra lemnia quomodo adulte-	
syrupus violaceus. 25. of. differt		retur.	163
à violato.	ibid.	terra melitea.	459
		terra rubrica.	460
		terra samia.	458
		terra selinusia.	459
		tertiæ facultatis medicamento-	
		rum latitudo.	18
		testudinis.	531
		testudines non possunt perpetuò	
		in aqua degere.	66.of.
		τεταράδρα medicamenta.	40
		tetrapharmacum seu basilicum	
		minus.	318.of.
		theriaca Andromachi iunioris.	
			215.of.
		à Mithridate inuenta.	216. 217.
		of.	
		thlaspi.	315
		Tholosani pharmacopei Mesuē	
		apprime sequuntur.	246.of.
		thus.	440
		thymelea.	289
		tinctura seu infectio.	67
		tinctura rosarum.	462
		θύσια omnia animalia venenata	
		significat.	217.of.
		tithymalorum species septem	
			B bbb ij

T.

T Abaxir Arabum quid sit. 14
of.

tabellæ ad fœdos colores. 209.
of.

tabellæ roborantes. 93

tabidi nunquam per vomitum
purgandi. 54

tabula marmorea mortarij vice
vsurpata. 6.of.

tacamahaca. 447

tacamahaca quomodo adultere-
tur. 163.of.

Taisneri fabulæ de magnete. 484

talkum. 488

tamariscus. 370

tamariscus lienosis confert. ibi.

tamarindi. 274

tamarindi quomodo adultere-
tur. 163

tamisiū. 89.10.of.

taraxacum. 263

tartarum. 453

taurocolla. 520

tada quid. 437

INDEX

Dioscoridi, viginti septē Bau-	282
hino.	224
topica medicamenta.	217
topici pulueres.	438
topissa.	8.of.
torcularia seu prala.	323
tormentilla.	32
torpedo.	428
tragacanthum.	112
tragemata.	376
trifolium acetosum.	23
trifolii qualitas haud miranda	349
cum Galeno.	68.71
trissago.	70
tritura.	68
triturationis tres scopi.	122
trochisci.	121
trochisci roborantes.	144
trochisci purgantes. ibidem.	220
trochisci alterantes.	151.of.
trochisci de agarico.	152.of.
trochisci alhandat.	123. of.
trochisci albi Rhasis.	227
trochisci aliptæ moschatæ.	of.
trochisci alexiterii siue contra	238.of.
pestem.	232.of.
trochisci de antispodio.	233. ci-
trochisci de berberis.	pheos. 226. of. de caphura.
	229. of. de carabe. 231. of. de
	capparibus. 236. of. diarrho-
	don. 230. of. Gallia moschatæ
	226. of. Gordonii. 234. of. ad
	Gonorrhœam. 240. of. hedi-
	chroi. 222. of. hysterici. 239. of.
	de myrrha. 237. of. neræ. 228.
	of. Narcotici. 241. of. de Rha-
	barbaro. 150. of. scillitici. 224.
	of. de vipera. 220. of.
tryphera solutiua.	132. of.
turbith.	281

turchesia siue Angires.	485
turpeti præparatio.	65
tuthia, eius præparatio.	503. 211
tuthiæ lotio.	62
Tyberii Casaris trochisci ad	
herpetas.	2

V.

V Accinia.	389
valeriana.	357
vaporarium.	204
vas figulinum plumbatum.	8. of.
venenum s. pro medicamento	
vsurpatur.	5
venena à quibus desumuntur.	
35.	
venena sunt sæpe medicamenta.	
36.	
venena occulta qualitate præ-	
dita.	33
venena quibus morbis profint.	
34.	
venena medicis explorata esse	
debent.	34
venena aliquando nutriunt.	35
venena in corpore hominis ali-	
quando genita.	34
venenis sua sunt antidota.	13
venerem bulbi stimulant.	329. sa-
tyrium, ibidem. eruca.	316.
ventriculi intemperiei quæ con-	
ducunt.	226
ventris segnities naturam male	
laceffit.	198
veratrum.	285. 11
verba qua ratione agant.	29
verbis vim tribuit Fernelius.	
26.	
herbarum virtus. ibidem.	
vermilio seu minium.	474
vermium tria genera ex intesti-	
nis profiliunt.	323. of.
vernix.	424

veronica. 6
 veronica species. 342
 veronica beneficio Gallia Regem ab elephantiasi falso curatum asserit Fuchsius. 342
 veruex. 522
 vesicatorium. 221
 vesicatorium rusticorum. ibidem
 vestes bombycinæ. 542
 vetonica. 341
 vigonium emplastrum. 372. of.
 vinum præstantissimum in pharmacopoliis requiritur. 231
 vinū quis primus aquæ miscuit. ibidem.
 vinum pro ratione vsus bonum aut malum. 241
 vinum quibus interdicebatur. 241
 vinum acuit ingenium. 2. ibtd.
 vini vsus in sacrificiis. 240
 vini laudes. 4
 vinum tanquam venenum multi auersantur. 18
 vinum ex herbis. 86
 vinum Hippocraticum. 239. of.
 violæ descriptio. 248
 violarum vires & facultates. ibidem.
 viola Martia & mariana. ibidem
 vipera. 535. 536
 vipera ingreditur theriacam. 159.
 viperæ carnis esus vitam producit. 537
 viperæ quando captandæ, deletus & præparatio. 221. of.
 viperarum vltio. 76
 viride æris. 496
 viscus epilepsiam curat. 23
 viscum quernum. 364
 vita brevis. 1
 vitis. 417
 vitriolum. 461. 462

vmbilicus marinus. 529
 vncia. 139
 vncia botanicis pro digito vsurpari solita. 141
 vnguenta cur dicta & inuenta. 136.
 vnguenta & cerata quomodo fiant. 304. of.
 vnguenta calida. 315. 155
 vnguenta quibus vasis reponenda. 127
 vnguentorum varietas. ibidem
 vnguentum ad Achoras. 324.
 Ægyptiacum. 326. of. de althea. 317. of. Agrippa. 327. of. aregon. 328. of. adiutorium. 329. of. Apostolorum. 325. of. album Rhafis. 300. of. armarium. 29. aureum. 322. of.
 vnguentum de bolo. 309. of.
 vnguentum è calce. 326. of. citrinum. 332. of. crudum. 309. of.
 vnguentum diapompholiges. 312. of.
 vnguentum fuscum quodnam dicatur. 322. of.
 vnguentum de lythargyro seu triapharmacum. 308. of.
 vnguentum de Minio. 315. of.
 Martiatum 331. mundificatum expertum. 320. of. cum Mercurio enulatum. 325. of.
 vnguentum Neapolitanum. 336. of. nutritium. 309. of.
 vnguentum odoratum. 231. of.
 ophthalmicum. 314. of.
 vnguentum pomatum. 334. of.
 populeon. 307. ad pruritum scabiosum. 303. of.
 vnguentum resumptium. 315. of. rosatum. 304. of.
 vnguentum spleniticum. 335. of.

I N D E X

sanctum.	3	vua.	417
unguentum ad vermes.	325. of.	vua lupina.	369
uniones.	527	vulpes.	517
uniones quomodo emolliantur.			
84.		X.	
vomitoria quæ seligenda.	54	X Ylobalbanum.	303
vomitu an æstate purgandū.	54	xylocassia.	297
vrceoli.	15	xylocolla.	520
vyetica medicamenta.	38	xylostrō periclimeno simile.	361
vrna mensura.	141	Y.	
vr̃a veneris appetentissima ini-		Y Vca planta Indica.	410
tur mulierum more supina.	513	Z.	
vr̃ina quodnam animal.	ibid.	Z Edoaria.	292
vytica vrens & mortua.	317	zerumbet.	292
vyticæ semen quibus cōuenit.	65	zibethum odoramenti & anima-	
vr̃tio.	75, 76, 77.	lis nomen.	519
vr̃terus quomodo afficiatur odo-		zibethum quomodo seruetur.	151
ribus.	of. 92	zinziber.	291
		zinziberi conditū aduehitur.	107

F I N I S.



DK 4.12

